






إدوار غَالِبُ الموسُوعَةِ

فِي عُلُومِ الطَّبِيعَةِ

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ ملاحظة
٦٩٦٢ رسماً • ٢٤ ملاحظة

تَبْحَثُ فِي الزَّرَاعَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْجَوِلُوجِيَا



دارالمشرق بيروت



الموسوعة في علوم الطبيعة

مَشْهُورَاتُ :
دَارُ الْمَشْهُورَاتِ ش.م.م
ص.ب. : ٩٤٦ - بَيْرُوت ، لُبْنَان



الْمُتَوَضِّعُ :
الْمَكْتَبَةُ الشَّرْقِيَّة - سَاعَةُ الْجَمْعَةِ
ص.ب. : ١٩٨٦ - بَيْرُوت ، لُبْنَان



الرسوم :

جورج ديب

جورج غنطوس

جان فرطياوي

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثالث : ISBN 2-7214-2151-4

يحتوي هذا المجلد من

المواد المكتوبة في مجلدات الطبعة

١٠١٠٤ مواد

٢٠٧٧ رسماً

٨ لوحات ملونة

الأوزان غالب

مهندس زراعي


الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور
والجراثيم والأراض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجولوجية والطبيعة والجغرافيا
وتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على سائر المصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثالث

من القاف إلى الياء



ق

٢١٣٧٠ - قابِل الإنفلاق Fissile, Fissile (F).
Fissile (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان يحتمل في تكوينه ميزة الانفلاق .

٢١٣٧١ - قابِل الانهضام Digestible (F).
ما كان هضمه هيباً كاملاً .

٢١٣٧٢ - قابِل التمثيل Assimilable (F).
هو السائغ من الغذاء .

٢١٣٧٣ - قابِل القسمة Divisible (F).
هو ما كان مقدور القسمة .

٢١٣٧٤ - قابِلِيَّة ، استعْدَاد Aptitude (F).
Taste (E). ميل طبيعي أو آفتابي نحو شيء معين .

٢١٣٧٥ - قابِلِيَّة الإنطال ، بَطْلاَن Annulabilité, Nullité (F). Nullity (E).
هو انتقاص عقد بسبب فقدان أحد الشروط الجوهرية أو الشكلية اللازمة لصحته .

٢١٣٧٦ - قابِلِيَّة الاغْذِاء Faculté nutritive (F).
Nutritive faculty (E). هي المقدور الغذائي .

٢١٣٧٧ - قابِلِيَّة الانْتِاش ، خاصِيَّة الانْتِاش Faculté germinative (F). Germinal faculty (E).
هي المقدار اللبني الى ما ينشئ من عدد بزور معين . فاذا

تنشئ سبعون برة من اصل مائة برة يقال ان قابلية الانتاش في تلك البزور هي سبعون من المئة .

٢١٣٦١ - قَاب ، قَيْب Rayon (F). Radius (E).
نصف قطر الدائرة .

٢١٣٦٢ - قَابَ Troisième année (F).
القَابَ اسم للسنة الثالثة بعد الحاضرة . يقال انك لا تستغل ارضك لا العام ولا القابل ولا القاب .

٢١٣٦٣ - قَابَة Couvi (F).
القَابَة والقَابَة : بيضة الطير المحفونة .

٢١٣٦٤ - قَابِس Récepteur (F). Receiving (E).
كل جهاز قابل أو آخذ كما في التلغراف والتلفون .

٢١٣٦٥ - قَابِض ، عَقْص Astringent
القَابِض من العلوم ما يتقبض اللسان منه . والقَابِض من الادوية ما يجبس الفضلات المتدفقة من المعدة .

٢١٣٦٦ - قَابِض ، مُقَلِّص Contractif (F).
Contractive (E). ما يجمع اجزاء العضو ويكثفه .

٢١٣٦٧ - قَابِض ، مُتَسَلِّم Accipiens (F).
هو من يقبض المقتود عليه أو الملكية .

٢١٣٦٨ - قَابِعَات الأسنان Pleurodonte (F).
Pleurodontes (E). نعت تعريفي تصوف به العظام من ذوات الأسنان القابعية

المرترزة في الحالة الداخلية من الفك . يقابلها شارفات الأسنان .

٢١٣٦٩ - قَابِل An prochain (F). Next year (E).
اسم العام المقبل بعد العام الحاضر .

Rénégé primaire, Flèche (F). ٢١٣٩٢ - قادمة
Wing primary (E).
ريشة من أرياش مقدم الجناح. ج قوام. والأشعار
والعواشر هي القوام.

Trémie (F), Hopper (E). ٢١٣٩٣ - قادوس
هو عين الطاسون. ثقب أو فرسة أو شق يلقى الحب
الذي يمر به شيئاً فشيئاً.

Albatros ٢١٣٩٤ - قادوس
طائر بحري كبير القد مشهور باسم قطرس، اطلبه.

Asphalte (F), Asphalt (E). ٢١٣٩٥ - قار
هو الزفت أو الاسفلت، نوع من الحجر المنسج الاسود
الناع. يستعمل في ترصيف الطرقات.

Carya (S), Caryer (F), Hickory (E). ٢١٣٩٦ - قار
جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الجوزيات.
انواعه عديدة اعطائها البلاد الحارة. جميعها كبيرة القد،
دائمة. اوراقها مركبة، عابلة. ازهارها الذكورية ابطية
الارتكاز، سنبلية التجميع، دقيقة متدلية. ازهارها
الانثوية طرفية الارتكاز، ثلاثية التجميع، ثمارها جزوية،
جامدة الغلاف، رباعية الفلق || اعرف انواعه
واسهرها ما يتبع.

Carya aquatica (S). ٢١٣٩٧ - قارة المتابع *
Caryer des marais (F), Swamp hickory (E), Sum-
phickorybaum (D), Caria palustre (I).
نوع من القار ثمرته كبيرة القند فارشة تملو من ٢٥ الى
٣٠ سم. وريقاتها كبيرة القند وثرية التجميع براوح
عددها بين ٩ و ١٣. نصلها اهليجي الشكل ذلق الزام
الاخير وهو يارز العروق مسن الحافة || ثمارها بيضيه
مقطوعة عادمة الجناح.

٢١٣٩٨ - قارة بيضاء، قارة بيضيه
Carya alba, C. ovata (S), Caryer blanc (F), White
hickory (E).
نوع من القار ثمرته سبروتية تملو من ١٥ الى ٢٠ سم.
براعمها متراكبة الخرافش الجوزية اللون. اوراقها كبيرة
القند. وريقاتها سنانية النصل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض
نحو ٨ سم. || ثمارها بيضيه، ولوزها صغير القند،
مستحب الطعم.

٢١٣٩٩ - قارة زيتونية *
Carya pacan, C. olivaeformis (S), Caryer pacanier,
Noyer pacan (F), Pecan-nut tree (E), Pekanbaum (D),
Caria (I).
نوع من القار ثمرته كبيرة القند فارشة تملو من ٢٥ الى
٥٠ سم. براعمها عادمة الخرافش. اوراقها كبيرة القند.
وريقاتها وثرية التجميع براوح عددها بين ١١ و ١٧
وهي اهليجية الشكل معقنة، نصلها يطول من ٨ الى
١٥ سم. ويعرض من ٣ الى ٦ سم. وهو مسن الحافة
مزغير العروق. ثمارها بيضيه الشكل مقطوعة العقب
تطول من ٣ الى ٤ سم. قشرة الثمرة تنفلق عند اللادراك
عن ٤ لوزات زيتونية الشكل لباها ابيض اللون مستحب
الطعم والنكهة.

٢١٣٩٨ - قابلية التصرف، قابلية التملك
Aliénabilité (F), Alienability (E).
صفة قانونية عاقلة بما يمكن نقل ملكيته بعوض أو بلا
عوض.

٢١٣٩٩ - قابلية النقل، قابلية العزل
Amovibilité (F), Removability (E).
تقال عن موظف يجوز نقله أو استبدال وظيفته أو عزله
بقرار.

٢١٣٩٠ - قابلية الانهضام
Digestibilité (F), Digestibility (E).
مقدور الشيء على الانهضام. وهو ما يسبب فوارق
الانهضام في الأغذية.

٢١٣٨١ - قابليق
Kapoquier (F).
هو الكايك، اطلبه.

٢١٣٨٢ - قات *، شاي العرب، حرايبه مأكولة
Catha edulis, Celastus edulis (S), Célastré comestible,
Cathé comestible, Gat (F), Cafca, Khât, Kât,
Arabian tea plant (E), Katpflanze (D), Catha (I).
نوع من الحرايبه وهي جنبة برية وزراعية من فصيلة
القناتيات. ساقها فرعا تملو نحو ٣ اثار. اوراقها معقنة،
متقابلة، اهليجية النصل، يقال انها طيبة. ازهارها
صفوية، طرفية الارتكاز، خضراء اللون، صفراء الموالج،
خاسية الفصل والبتلات والاسدية. ثمارها دقيقة مستديرة
حارزة الطعم مأكولة || تزوع في اليمن والحبشة حيث
يعضدون اوراقها المنبة المنهضة ويستخرجون من تقطير
ثمارها مشروب كحولي شديد الوقع على الاعصاب.

٢١٣٨٣ - قاتل ابيه
Arbousier (F).
هو القنطلب، اطلبه.

٢١٣٨٤ - قاتل اخيه
Orchis (F).
هو السحلب، اطلبه.

٢١٣٨٥ - قاتل البق
Cimicaire (F).
هو الاقح المنقودة، اطلبه.

٢١٣٨٦ - قاتل البقر
Cigué des marais (F).
هو الشوكران السام، اطلبه.

٢١٣٨٧ - قاتل الحشرات، حاشور
Insecticide
كل مادة تصلح للقضاء على الحشرات.

٢١٣٨٨ - قاتل الكتنب
Colchique d'automne (F).
هو سورجيان الخريف، اطلبه.

٢١٣٨٩ - قاتل النسر
Aconit napal (F).
هو الاكونيت اهرمي، اطلبه.

٢١٣٩٠ - قاتليات
Celastraceae (S), Célastracées (F), Celastraceae (E).
هي الحرايبات فصيلة نباتية من ذوات الفلقين. اشهر
اجناسها الحرايبه ونها القات.

٢١٣٩١ - قاحل
Asperme (F), Asperous (E).
القاحل من النبات العادم البذور.



قات



- ... -



قارة زيتونية (البار)

وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها جاهد الصفحة ، بحري
الون شذائي القصعة الصلبة النازعة . ازهارها خافتة العرف .
ثمآرها قرمزية || يستخرج من سآنها عصارة صمغية حمرآ
الون شآلة الاستعمال .

٢١٤٣١ - قاطر عطر
Dracena fragrans (S).
Dragonnier balsamique, D. odorant (F).
شجرة زينة تلو من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها سنآية
الشكل تطول نحو ١٠٠ سم. نصلها احسن الصفحة . فسقي
الحفسار اللامع . ازهارها فواحة العرف العطري . ثمآرها
كرزية ارجوانية اللون || زرع في المراكن والمصاري
ترغب في الارآة الدبالية .

٢١٤٣٢ - قاطع
Interruptif (F). Interruptive (E).
عمل قانوني يعطل مقفل عمل آخر .

٢١٤٣٣ - قاطع
Interrupteur (F).
اداة يقطع بها التيار الكهربائي .

٢١٤٣٤ - قاطع
Sécante (F). Secant (E).
خط مستقيم يقطع الدائرة .

٢١٤٣٥ - قاطع ، حاسم
Péremptoire (F).
نمت الحكم الفيصل الذي لا يقبل الجدل .

٢١٤٣٦ - قاطع التسمم
Cosécante (F).
Cosecant (E).

٢١٤٣٧ - قاطع التزف ، حاسيس الدم
Hémostatique (F). Haemostatic (E).
كل دواء يقطع النزف او السيلان .

٢١٤٣٨ - قاطعة
Incisive (F). Incisor (E).
هي احدى الاسنآن الامامية في كل من الفكين . والقواطع
عند الخيل ثلاث اسنآن : ثنيان وروبعيان وقارحان .

٢١٤٣٩ - قاطوب موشع
Anthrribus nebulosis (S). Anthrrib nebleux (F).
Anthrribus nebulosis (E).

حشرة واشمة قانصة وانجبة من فصيلة القاطوبيات وربة
مفصلات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر
الايض المتوسط . تألف ارجاج الصنوبر . خنافسها
واشمة تعيش على ازهار النباتات البرية تقضم البلات
والكلوس والمآبر . يرقاتها قانصة تعيش على ما تقترسه
من اليرقات الخاشية التي تمرى الصنوبر والشرين ||
جسمها صغير القد يطول من ٢ الى ٤ سم. ثوباها الى
السواد القمحي يعلو خل اشهب ينعكس عليه النور
فيبدو كأنه موشع . رأسها معتدل الهرم ، قصير الخطم .
عينها كبيرتان . زناهاا خيطيان . فكاهما ذريان .
غدهاا شديدا الصلابة ، تبياعدتا التحزيز . ارباسها
ثلاثية المقل || الانثى اكبر قدآ من الذكر وابنت ثوبا
منه واقصر زناها || لها جيل واحد في الحول . تظهر
الحشرة الجملآة في اوائل الربيع وتعيش حتى اوائل الصيف .
تسرح في النهار وبيت في الليل تحت قشور الصنوبر ||
الطور البري يستمر نحو ٣٦ اسبوعا . واليرقة عند ادراكها
الكآال الجسوري تطول نحو ٦ م . جسمها يشي الشكل ،
مستطيل القدم ، مستطيل المؤخر . ثوباها الى الخفطي
الاصفر المواج . رأسها ورواجها وبديها وشرجها الى
السورة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع



قاط امود



قاطر

٢١٤٣٣ - قاضييم
Rongeur (F).
Gnawing, Biting (E).
هو القارض ، آآله .

٢١٤٣٤ - قاضي ، حاصم
Ester en Justice, Agir en Justice
التبآ الى القضاء

٢١٤٣٥ - قاضي الجبل
Agave (F).
هو الحروزن ، آآله ومنه الازرق والاغير .

٢١٤٣٦ - قاط
Elacates (S).
Elacate (F). Elacate (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي القاط .
جنس اسمآا بحرية من فصيلة الاسقمريات شآلكآت
الزغائف . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطأها بحار
البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة وشية الشكل . رؤوسها
اسفينية ذلقة . اشداقها كبيرة . عيونها صغيرة . مآصة
زعانفها الظهرية تمتد من اواسط الظهر الى مؤخره فتقدمها
بعض المناخن الحادة . زعانفها الذيلية مقعرة || لحوبها
متوسطة الصنف ، مآكولة .

٢١٤٣٧ - قاط أسود *
Elacates nigricans (S).
Elacate noir (F). Black elacate (E).

نوع من القاط . سمكة بحرية بيوض . اعطأها البحر
الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي الشكل يطول من
٨٠ الى ١٠٠ سم. ثوباها الى السرة السوداء . يعلوها خطوط
فضية ، قاطية ، مستعرضة || رأسها معتدل الهرم ، ذلق
الخطم . فكها الاسفل يتقدم الاعل بعض الشيء . شفها
رعب الانفراج . عينها صغيرتان صغيرتان ، مآصتان .
زعنفها الظهرية مستطيلة فتقدمها ثمانية مناخن حادة .
زعنفها الشرجية تقابل الظهرية . وتمألهما شكلا . زعنفتها
الذيلية مقعرة الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مآكل .

٢١٤٣٨ - قاطر * ، دم الشين ، دم الثعبان
Dracena (S). Dragonnier (F). Dragon tree (E).

جنس اشجار وجنبات برية وزينة من سبط الحليويات
وفصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطأها البلاد
الاستوائية جميعها بطيئة النمو مديدة العمر . بعضها يشي
التخل . اوراقها طرفية الاذتكاز يكثر فيها الشكل السبي .
ازهارها عشكولية التصبع ، تاجية الاذتكاز ، يضاء اللون .
ثمآرها كرزية القد والشكل ، ورقالية اللون او حمرآ .
من خصائصها انها لا تنزع قبل بلوغ ٢٥ سنة من العمر .
يستخرج من سوق بعض انواعها عصارة صمغية حمرآ
تتحول بعد تجفيفها وتحفر الى دقيق احمر اللون كبير
الاستعمال الصنآي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢١٤٣٩ - قاطر أرجواني
Dracena terminalis (S). Dragonnier pourpre (F).

جنبه زينة صغرة القد ، مثبوبة ، بطيئة النمو ، ليفية
الجدع . اوراقها سيفية الشكل مستطيلة . نصلها احسن
الصمغ ارجواني اللون || منبها الصين . زرع في المراكن
ترغب في الارآة الدبالية .

٢١٤٣٠ - قاطر جبآار ، دم الآخوين
Dracena draco, Pleomele draco (S). Dragonnier

sang-dracón, D. gigantesque, Sang-dracón (F).
Dragon's-blood tree (E). Drackenbaum, Blutbaum
(D). Dragone, Dragoncello, Sangue di drago (I).
شجرة افريقية جبارة تنمو نحو ٢٠ م . قطر جذعها يبلغ
٤ امتار . اوراقها سيفية الشكل تطول نحو ٦٥ سم .

اي يوم من القمر يقابل ٢٥ حزيران سنة ١٩٦٦. اتبع الطريقة التالية : القاعدة ٨ اخذ بها علامة شهر حزيران اي ٤ ثم اخذ ٢٥ اي ايام الشهر الشمسي فيصيح المجموع ٣٧ ، اسقط ٣٠ يبقى ٧ هو المطلوب .

٢١٤٤٩ - قَاعِدَةُ المثلث (F). Base de triangle (E).
السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥٠ - قَاعِدَةُ الموشور (F). Base de prisme (E).
السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥١ - قَاعِدِي ، اَسَاسِي (F). Basilaire, Basique (E).
صفة الجسم الذي يحوي خاصة القاعدة . ونعت تعريفي يطلق على كل ملح حوى شططا من القاعدة .

٢١٤٥٢ - قَاعِدِيَّة (F). Basicité (E).
صفة الاجسام التي تمثل دور القاعدة في التراكيب الكيميائية .

٢١٤٥٣ - قَافِرَات الذئب (F). Collemboles (F).
هي الكهديات . اطلبها .

٢١٤٥٤ - قَافِرَةُ القطن (F). Lepidocyrtinus incertus (S).
هي كهدل القطن ، اطلبه .

٢١٤٥٥ - قَافِرَةُ الموز (F). Drépanure du bananier (F).
هي كهدل الموز ، اطلبه .

٢١٤٥٦ - قَاقُور ، قُفُور (F). Spathe (F).
هو الكافور ، وعاء طلع النخل .

٢١٤٥٧ - قَاق (F). Corneille cendrée (F).
هو الغراب الابيض . يعتبر من الطيور المؤذية .

٢١٤٥٨ - قَاق البَحْر (F). Corbeau de mer (F).
سمكة بحرية تدعى قرية سوداء ، اطلبها .

٢١٤٥٩ - قَاق الماء (F). Cormoran (F).
هو الغاق ، اطلبه .

٢١٤٦٠ - قَاقُل ، قَاقَالِيَا * (F). Cacialia (S).
جنس نباتات عشبية معمرة ، برية . وزراعية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة بعضها طبي وزرني . اوراقه متناوبة ، لاقطاسية الشكل . ازهاره عذقية التجميع ، بيضاء اللون . يزوره مهدية ، اهدائها وحيدة الصف . اشهر انواعه ما يلي .

٢١٤٦١ - قَاقُل سِرْمَكِي الورق (F). Cacialia atriplicifolia (S).
نوع من القاقل وهو جنية معمرة تعلق من ٩٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مفصصة ، عديمة التنين . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . اعدائها مستعرة ، لاقطاسية التركيب . ازهارها بيضاء . اوراقها خشنة يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١٤٦٢ - قَاقُل طَبِي ، قَاقَالِيَا بُوَصْبِرِيَّة الورق (F). Cacialia verbascifolia (S).
نوع من القاقل وهو جنية طيبة صغيرة معمرة تعلق من ٦٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها بيضوية الشكل ذائقة ، نصلها يطول

٢١٤٤٠ - قَاطُوبِيَّات (S). Anthribidae (S).

٢١٤٤١ - قَاطُوبِيَّات (F). Anthribidae (E).

فصيلة حشرات واسعة دائمة قانصة وانجحة من رتبة غديات الاجنحة || اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المتعددة الحرارة . تألف الاجراج وتميش على المواد النباتية المنحلة وعلى ما تقتصره من يرقات الحشرات الخاشية || اجسامها متباينة الاحجام بين الصغيرة والوسطى . اشكلها قرينة الشبه بالسوسيات . رؤوسها صغيرة . اعطاسها مستعرضة وقصيرة . زباناها حيطية نحيلة وقد تنتهي بفصل صقبة متطاولة . كواسلها لاقطاسية الشكل . اغمارها لاحفة . جرازمها نسيطة . ارساغها ثلاثية العقول || اشهر اجناسها القاطوب والطلعانة .

٢١٤٤١ - قَاطُوبُ العنب (F). Tordeuse de la grappe (F).

حشرة مؤذية تمرى عقائد العنب تدعى ادويس اطلبها .

٢١٤٤٢ - قَاع (F). Tordeuse de la grappe (F).

القاع : ارض سهلة منطنة قد انفرجت عنها الجبال والاكمام .

٢١٤٤٣ - قَاعِدَةُ (F). Base (F).

هي الاساس . اطلبه .

٢١٤٤٤ - قَاعِدَةُ (F). Règle (F).
الخطوط الواجب اتباعها لوصول الى الهدف .

٢١٤٤٥ - قَاعِدَةُ ، نَظَرِيَّة (F). Théorie (F).

٢١٤٤٦ - قَاعِدَةُ السَّنَوَات السَّابِقَةِ (F). Règle de la pénultième année (F).

٢١٤٤٧ - قَاعِدَةُ السَّنَوَات المسيحية والمجرية (F). Règle de la pénultième année (F).

هي القاعدة التفرعية المتبعة لمعرفة السنة الهجرية اعتباراً من السنة المسيحية او السنة المسيحية اعتباراً من الهجرية .

١) السنة الهجرية = $X + \frac{X}{2}$

٢) السنة المسيحية = السنة الهجرية - $\frac{33}{2}$

٢١٤٤٨ - قَاعِدَةُ القَمَر (F). Epacte (F).

خذ القاعدة الحالية وقدعها ٢٧ منذ اول اذار ١٩٦٥ واضف اليها علامة الشهر كما تراء اذناه ثم اخذ عدد يوم الشهر الشمسي المراد معرفة ما يقابله من القمري فان كان المجموع اقل من ثلاثين فهو المطلوب وان زاد فاسقط منه ثلاثين والباقي يكون المطلوب || وعده علامات الاشهر :

اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول تشرين الاول تشرين الثاني كانون الاول كانون الثاني شباط

٩ ١٠ ١١ ١٢ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

واعلم ان العدد الواجب اضافته ابتداء من اول اذار في كل سنة هو ١١ وان قاعدة السنة القابلة ستكون ٨ كاهمين :

١١+٢٧=٣٨-٣=٨٣ || فلو شئت معرفة



قَاقُل

Moule (F). Mould (E).

٢١١٧٤ - قَالِبْ

الجهاز الخاص بالسبك .

Fibrophage (F).

٢١١٧٥ - قَالِفْ

Fibrophagous (E).

القائف من الحيوان والحشرات ، الذي يقضي على قشور النبات والياهاها .

Maclura (S).

٢١١٧٦ - قَانَة ، مَكْلُورَة

Maclura, Maclure (F). Osage tree (E).

جنس اشجار وعجيرات معمرة قراء من فصيلة التوتيات . انواعها قليلة منها البرية والزراعية . فرعها شائكة . اوراقها معتقة متعاقبة . نصلها يبيض الصفحة الكاملة او ثلاثي التفتيص . ازهارها ثنائية المسكن ، الذكورية منها عشوية التجميع اما الانثوية نطقية . احشاشها قوية ، عتيقة ، لينه ، لوها الى الصغار الحنطلي ، تستعمل في صناعة القسي || اشهر انواعها القانة البرتغالية .



قائم ، هرمن

٢١١٧٧ - قَانَة بَرْتُغَالِيَّة * ، مَكْلُورَة بَرْتُغَالِيَّة

Maclura aurantiaca, Toxylon pomiferum (S). Maclura oranger, Oranger des Osages, Bois d'Arc (F). Bow-wood tree, Osage orange (E). Osagedorn, Osagenapfel (D). Maclura aurantiaca (I).

نوع من القانة وهي شجرة سبروتية قراء داخلة تعلق من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها تعلق من ٧ الى ١٦ سم . وتعرض من ٣ الى ١٠ سم . نصلها اخضر الصفحة اللامعة البشرة ، بارز العروق الباعثة اللون . ازهارها يستمر من سزيان الى تموز . ثمارها مأكولة يعني برتغالية الشكل والحجم واللون .

Gésier (F). Gizzard (E).

٢١١٧٨ - قَانَصَة

ثالث جيب في جهاز هضم الطير . وهي حنة دون القبة تعرف بالانطافة والجربنة والحوصل والحوصلة والفرفة والقنصة والمشفلة ...

Canon

٢١١٧٩ - قَانُون

مجموعة شرائع كنسية متباينة المصادر بعضها يركز على التاميم السابوية وبعضها يماري الحقوق الطبيعية والعرف والتقاليد والقانون المدني .



قانة برتغالية

Loi (F). Law (E).

٢١١٨٠ - قَانُون ، شَرِيعَة

القانون او الشريعة بمعناها مجموعة القواعد القانونية التي سبها المشرع || والقانون بمعناه الضيق مجموعة القواعد الاجتماعية الثابتة التي تسنها السلطة العامة وتكفل القوة تنفيذها .

Code (F). مجموعة القوانين

اسم شامل يطلق على مختلف فروع علم القانون ونصومه التشريعية المنسقة والمجموعة في ابواب ومواد .

٢١١٨٢ - قَانُونِ الاحْوَالِ الشَّخْصِيَّة

Code du statut personnel (F).

هو القانون الذي ينظم حالة المرء الشخصية من الولادة الى الوفاة وذلك من حيث الارتباط الاجتماعي والاخلاقية والخصائص .

Code de commerce (F). قَانُونِ التِّجَارَةِ

هو القانون الذي ينظم المعاملات التجارية .

من ١٠ الى ٢٠ سم . وهو جامد الصفحة ، بارز العروق المتوازية . اعناقها صغيرة القند خماسية التركيب || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١١٦٣ - قَائِلْ عُطْرِي

Calcia suaveolens, Synosma suaveolens (S). Calce odoriférante (F).

نوع من القائل وهو جنبه معمرة القند معمرة تعلق من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها السفل حراية الشكل مجنحة المماثل ، اوراقها العليا مثلثة الزوايا . اعناقها كبيرة القند ، لاقباسية التركيب تقسم من ٢٥ الى ٣٠ زهرة عرفها عطر فواح . ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١١٦٤ - قَائِلْ كَلَرِي الْوَرَق

Calcia reniformis (S). Calce réniforme (F).

نوع من القائل وهو جنبه معمرة تعلق من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها السفل كوكبية الشكل ، كبيرة القند تعرض نحو ٦٠ سم . اوراقها العليا اهليلجية مستطيلة . نصلها خضر الصفائح المسننة الحتار . اعناقها صغيرة القند ، خماسية الازهار البيض || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

Amome (F).

٢١١٦٥ - قَائِلَة ، قَائِلِي

في الهال ، اطليه .

٢١١٦٦ - قَائِلَة تَيْسِ الْفِيل

في الهال الجوزي ، اطليه .

Amome de Madagascar

٢١١٦٧ - قَائِلَة حَبَشِيَّة

في الهال الحبشي ، اطليه .

Mélégnette (F).

٢١١٦٨ - قَائِلَة ذَكْرِيَّة

في الهال الذكر ، اطليه .

Cardamome petit (F).

٢١١٦٩ - قَائِلَة صَغِيرَة

في الهال الصغير ، اطليه .

٢١١٧٠ - قَائِلَة عُثْمُودِيَّة

في حال حاما ، اطليه .

Amome cardamome (F).

٢١١٧١ - قَائِلَة مُجْتَحَة

في حال جاوا ، اطليه .

Cardamome allé de Java (F).

٢١١٧٢ - قَائِلَات

Amomaceae (S). Amomacées (F). Amomacées (E).

في الهاليات سبط من فصيلة الزنجبيلات . نباتاتها جمجورية ، صفولية ، معمرة . بعضها طبي وبعضها عطري وزراحي وزييني .

٢١١٧٣ - قَائِم * ، قَائُوم ، هَرْمِين

Ictis erminea, Putorius erminea (S). Hermine, Belette hermine (F). Ermine, Stoat (E). Hermelin (D).

حيوان من السراييب اعطانه البلاد الجبلية العالمية . ثوبه الصيني الى الجلود المايقة . اما التنوير فاييض اصفر او ابيض يقق الا طرف ذنبه الذي يبقى على لونه الجوزي يطوه ملوح اسود . جسمه اهيف القند ، قصر الجرامز ، طوله يراوح بين ٢١ و ٢٧ سم . وذنبه من ١٠ الى ١١ سم . وهو من الحيوانات الشجاعة الشرسة . يسرح في الليل ، يدور على الارض وينسلق الانجار . قوته القزاع والارنب والطير والزحافات على اختلافها من الاناعي الى العظام . انشاء تقص مرة في الحول من جروين الى ثمانية . فروته جيدة الصنف ثينة القندر .

القد، تشوبه مستسلة، مخذومة، بارزة الصلوع، لونها الى الصفرة || يرغب في الازرة المروية الخفيفة الغنية بالعناصر العضوية .

٢١٤٩٨ - قاروون المير هو اليعطين الأقرع، اطلبه .

٢١٤٩٩ - قاروون هندي *

Cucumis anguria (S). Angurie, Anguria, Concombre des Antilles, C. marron (F). Beer-gherkin, West indian gherkin (E). Birnurgurke, Anguriengurke (D). Anguria, Cocomero anguria (I).

نوع من القرعيات المحلية، غروبها عديدة منها الربة والزراعية، اعطائها البلاد الحارة. جميعها مدادة ومتسلقة. اوراقها كفية ثلاثية التفتيص، حية النصل على صفحتي. ثمارها بقلية مأكولة وهي مستطيلة المعاليق، ريفية الشكل والحجم، مضلمة القشور الثلثولية الشاذية. الوانها تختلف باختلاف الصروب منها الاخضر والاصفر والجنح والموشم والاغير.

٢١٥٠٠ - قاوية

Coccomyces جنس فطور مجهرية من الرغبات وفصيلة الحشاريات. يتميز ببدائه العائرة وفي نمته الرحية. يوجه خيطي او مخروطي الشكل مستقيم الانتصاب او اسجين، إيشلاخه كينيدي وكناثده حضية الشكل. يوفياته كيفية التجميع شفاقة خيطية مستقيمة او منمققة || انواعه قليلة منها واحد مؤ يدعى قاوية الكررز.

٢١٥٠١ - قاوية الكررز *

Coccomyces hiemalis, Cylindrosporium hiemale(S). فطر مجهرى يركب افناد الكررز واوراقه وأمن ثماره. مظهره الخارجى على الاوراق نقش كيفية، لونها الى الجؤوة تركب صفحة النصل العليا وتجنب الضلع والمروق. قطر البقعة منها يراوح بين ١ و ٢ مم. وهي شبه مستديرة او مقرنة الزوايا || يسبب جفاف النصل والاحبال الباكر بعد ان يوقف التبادل النسفي قبل زمن الركد الطليحي. وهو على الامن يقع صغيرة مبكرة لونها الى الحمرة تسبب جفاف اللسج الواصلة وتعرق نقل النسغ الى الثمار فتجهم وتسقط || اما على الفروع والافناد فهو يقع قرحية وسادية الشكل متوسطة الكثافة مبكرة بدون انتظام تركب البشرة وتقرتف البلاء فتخلل الاوعية وتعطها وتمتها عن القيام بوظيفتها || يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكسية التجارية بعد تخفيفها ٥٠ ٪ وترويديه نحو ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد. تنفض الانجبار على مرتين او ثلاث مرات. الاول على اثر العقد والثانية بعد الاول بأسبوعين والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع.

٢١٥٠٢ - قالد

Alkaid (F). Alkaid (E). القالد آخر نجم من كوكبة بنات نكش الصغرى .

٢١٥٠٣ - قالفية

Morphologie interne (F). Internal morphology (E). هي درس تركيب الاجسام وعينها الداخلية في الحيوان والنبات.

٢١٥٠٤ - قائمة

Membre (F). Member (E).

٢١٥٠٥ - قابض

Troquer (F). To truck (E). استعاض سلعة بسلعة.

٢١٤٩٤ - قانون الحراج ، قانون الأجرأج

Code forestier (F). Forest rule (E).

هو القانون الذي ينظم ملكية الأجرأج وصيانتها واستغلالها الى آترو.

٢١٤٩٥ - قانون الصناعة

Droit industriel (F). Industrial law (E).

هو القانون الذي ينظم الشؤون الصناعية ويحيها .

٢١٤٩٦ - قانون الضرائب

Droit fiscal (F). Fiscal law (E).

هو القانون الذي ينظم الضرائب على الاعيان الثابتة والمنقولة فيقدرها ويفرضها ويعين طرق جبايتها .

٢١٤٩٧ - قانون الطرق

Code de la route (F). Rule of the road (E).

هو القانون الذي ينظم السير على الطرق .

٢١٤٩٨ - قانون العرف والعادات

Droit coutumier (F). Unwritten law sanctioned by usage (E).

مجموعة القواعد القانونية التي قررها العرف .

٢١٤٩٩ - قانون العقوبات

Code pénal (F). Penal law (E).

هو القانون الذي يبين الجرائم وعقوباتها والاشخاص الذين تصح معاقبتهم .

٢١٤٩٠ - قانون المحكمة

Lex fori صيغة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على نصوص القانون الذي تأخذ به المحكمة المطروح عليها النزاع .

٢١٤٩١ - قانون زراعي

Droit rural (F). Rural law (E).

هو الذي ينظم الملكية الزراعية ويعمي الزراعة .

٢١٤٩٢ - قانون مكان التعاقد

Lex loci contractus

صيغة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على قانون البلد الذي انعقد فيه العقد .

٢١٤٩٣ - قانون موقع المال

Lex rei sitae صيغة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على قانون البلد الذي يقع فيه المال . وهو يسري على الاموال الخاصة جماعاً .

٢١٤٩٤ - قانوني

Légal (F). Legal, Lawful (E). نمت يستعمل للدلالة على مطابقة القانون او على صدور المنعوت به عن القانون .

٢١٤٩٥ - قاروند

Martin-pêcheur (F). هو القروى ، اطلبه .

٢١٤٩٦ - قاروند شائع

Martin-pêcheur vulgaire هو القروى الشائع ، اطلبه .

٢١٤٩٧ - قاروون سبطاوي *

Cucumis angulatus (S). Melon santavi (F). Santawi melon (E). Santavische melon (D). Melone santavi d'Egypte (I).

نوع من الثيام الزراعي المأكول ، وهو من ثبوت البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر . ثماره ريفية الشكل، كبيرة



قارون



قارون هندي



قاوية الكررز

Tetraophsis (S).

Tétraophase (F). Tetraophasis (E).

جنس طير من فصيلة التدرجيات . نواع المعروفان يعيشان في جبال التبت . شكله قريب الشبه بالفرغس . جسمه متوسط القد . ثوبه الى السمرة النمرة بالافغير . زوره اسود مطوق بالابيض . ذنبه متوسط الطول ، مستدير الطرف . منقاد ورجلاه الى الجؤرة السمراء .



قَبْ

٢١٥١٥ - قَبَّاح

القَبَّاح طرف عظم المقعد مما يلي المرفق .

Ours (vieux) (F). Bear (old) (E). قَبَّاح

القَبَّاح : الدب الحرم .

Claprier commun (F). قَبَّار

هو الكبر الشائك ، اطلبه .



قَبَّار

Monogénie (F). Monogeny (E). قَبَّاسَة

القَبَّاسَة منفع تناسل قوامه ان الاجسام المغضا تنتج اجساما تنفصل عنها وتستقل بذاتها .

٢١٥١٩ - قَبَّاع * ، قَبَّع ، قَبَّال البُوص

Aulacodus (S). Aulacode (F). Gane rat (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية ، من فصيلة الدافغيات . انواعه عديدة قروية . الشبه من الجردان . اجسامها ربة قوية تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . وذانها من ١٤ الى ٢٢ سم . وروسها صغيرة . مقامها قصيرة وعريضة . اذنانها نصف مستديرة . جزامها قصيرة خمسة الاصابع . اطرافها قوية منجلية الشكل ، اذنانها حليلة الشعر شائكة || اوتياها الى الصهبة السمراء تتبع مع اقترابها من الظهر وتبيض عند البلى . صوفها غثن للمس قبل الكفافة || موطنها بعض الاصقاع الافريقية تكثر في المناطق الجنوبية والوسطى . تألف مختلف الاقاليم الزراعية . اجبرتها افاحيص تنفضها في الادغال والمقاصب وبين الصخور القريبة من الخمول المزودة . قوتها الفستق وسائر النباتات الصغولية ونقص السكر والخيزران .



قَبَّاع

٢١٥٢٠ - قَبَّاع صوت الحزير .

٢١٥٢١ - قَبَّان Bascule (F). See-saw (E).

جهاز توزن به الاشياء .



قَبَّاع

٢١٥٢٢ - قَبَّيب * Cordylina (F).

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الزنبقيات ، انواعه عديدة مهداة البلاد الحارة . اربوبها ضخمة ، جذوعها منتعبة ، اوراقها عصفية الشكل مستطيلة . ازهارها هامة الارنكاز ، عذقية التجميع ، صغيرة القد يكثر فيها الابيض والبيكلي || اشهر انواعه ما يلي .

٢١٥٢٣ - قَبَّيب أَحْمَر Cordylina rubra (S).

Cordylina rouge (F). نوع من القيب وهو شجيرة تربيتية سريرية ، تلعب من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم . اوراقها عصفية الشكل معتقة . نصلها يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وهو جامد الصفعة المائلة ، شديد الخضار . علفها صغير القد ، اطبل الشمرع . ازهارها الى الحمرة يعلمها موج بنفسجي .



قَبَّيب

Telson

٢١٥٠٦ - قَبَّيب

اخر حلقة من بطن القشريات .

Sécher (F). To dry (E). قَبَّيب

قَبَّيب النبات : ييبس .

Apside (F). Apsis (E). قَبَّا

كل طرف من طرفي فلك المحور الاكبر في الكواكب الخس اي السيارة .

Pleurotomaria (S). قَبَّباب

Pleurotomaria (F). Pleurotomaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وفصيلة القبابيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، منها نحو ٥٠٠ من متحجرات الاحقاب الاولى ، واربعة انواع معاصرة منتشرة في بحار البلاد الحارة || اصداها كبيرة ، عتيفة ، رقيقة ، سابعية الدورة الخلزونية التي تضيق مع الاقتراب من القعب .

Polyprion (S). قَبَّباب

Cernier (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات شائكات الزعانف . انواعها عديدة معظمها من اسماك البحر المتوسط . جميعها كبيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . فلونها مستديرة ، نجمدة ، متراكبة . زعانفها شائكة . مستطيلة . اوتياها الى السمرة البنية يعلمها تبيج ابيض . وهي من الاسماك المأكولة المستحبة للعلم .

٢١٥١١ - قَبَّباب أَسْمَر * ، كَعْبَد ، دَبَّع

Polyprion cernium (S). Cernier brun (F).

Brown Stone-bass (E).

نوع من القباب . سمكة بحرية يبيض من فصيلة الصرانيات . كانت ، في التصنيف السابق ، تتبع فصيلة الفرغيات . اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط || جسمها اطيحي الشكل ، كبير القد ، يطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . حراشفا صغيرة ، معنية ، مسنة الحواشي . ثوباها الى السمرة البنية يعلمها تبيج ابيض || رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخط . شدقها واسع الانفراج . فكها الاسفل يتقدم الاعل . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، نائزتان || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام ومنها المنخضية الشائكة ومنها المفصلية السرحة || لحمها جيد الصفت ، مرغوب فيه الا في زمن مرض المرجان الذي يمتد من شباط الى نيسان ومن ايلول الى تشرين الثاني .

٢١٥١٢ - قَبَّبابِيَّات Pleurotomariidae (S).

Pleurotomariidae (F). Pleurotomariidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاول وبعضها معاصر || اصداها متفاوتة الاحجام والاشكال معظمها مستغلط الخلزاة التي تبدو كأنها قَبَّباب متراكبة || اعرف اجناسها واشهرها القباب والشرمة .

٢١٥١٣ - قَبَّاسَة ، قَبَّاسَة

عشبة تنبت في اللط لا تنبت في الجبل ترتفع عن الارض قيس الاصع او اقل ترعاها الموالي (١ م) . ج قبا .

منقاره الى السرة الزيتونية || مولده خضاب وسهل الشرق الاوسط واروبة . يكثر في العراق || انشاء تبويض من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها وسدها ثلاثة اسابيع .

٢١٥٣٠ - قَبْرَة ، قَبْرَة ، قَبْرَة ، قَبْرَة

Alauda (S). Alouette (F). Lark (E).

ج . قبر وقنابر . جنس طير من فصيلة القبرات ، انواعه عديدة ، اعطائها فصيلة الاربعاء تشمل خضاب البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها نافعة . اجسامها صغيرة القد تطلو من ١٤ الى ٢٠ سم . مناقيرها مخروطية قصيرة . اجنحتها مستطيلة . اذناها فارقة . اثوابا موشية مرقوشة || قوتها الحشرات واليدور البرية . اشهر انواعها مايلي .

٢١٥٣١ - قَبْرَة الحقل * ، قَبْرَة مَعْرُوفَة

Alauda arvensis (S). Alouette des champs, A. commune (F). Skylark (E).

نوع من القبرية وهو طائر صغير القد ، طوله نحو ١٨ سم . ثوبه متداخل الالوان ، رأسه وظواهره الى الكعبة الموشة بالاسود والاصهب والافبر . بطنه وخوافيه الى البياض الاغبر تملو رشفة سراء . حنار عينه الاصل مستطيل الشكل اشقر اللون . عيناه جوزيتان . منقاره الى السرة . يئن في التربة بين الزروع وفي المراعي والنتاق . انشاء تبويض من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حفضتها تشمل اربع بيضات او خمس ، اما الحضان فيدوم ١٤ يوما تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٢ - قَبْرَة الغياض *

Alauda arborea, Lullula arborea (S). Alouette lule, A. des bois (F). Wood lark (E).

نوع من القبرية ، وهو طائر صغير القد نحو ١٥ سم . ثوبه ثوب قبرة الحقل ، لكنه اصنع بياضا واشقر صهبة . يألف اليرير والحضاب والغياض والمبشرة الاشجار ، يرغب في مراتع الخلع والصعر . انشاء تبويض ثلاث مرات في السنة والحضان يكون بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٣ - قَبْرَة سَمَرَاء * ، قَبْرَة ، عَلْبَعْلَة

Alauda brachydactyla (S). Alouette calandrelle (F).

نوع من القبرية ، صغيرة القد تطلو نحو ١٤ سم . ثوبها ثوب قبرة الحقل الا انه اشد سرة . وهي اطول جناحا من قبرة الغياض واقلصر رسدا منها || تألف الاراضي الكلسية والرملية . انشاء تبويض ثلاث مرات في السنة . بيضها اصهب اللون تملو رشفة خطية .

٢١٥٣٤ - قَبْرَة مُتَوَجِّة *

Alauda cristata, Galerida cristata (S). Alouette cochevis, Cochevis huppé (F). Tufted lark (E).

نوع من القبرية ، ومنهم من جعلها جنسا مستقلا . جسمها يطول نحو ١٨ سم . رأسها مستطيل القزعة . ظهوها اسمر اللون ، وبداي المولج ، حنار ريش رأسها وظهوها وجنحتها الى الصهبة الخطية . صدرها وبطنها وخوافيها الى البياض الاصهب تملو رشفة مستطيلة سوداء اللون . اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . تألف المناطق الوعرية والمراعي والحقول المزروعة ويوانب القراقرط . قوتها الحشرات والموام واليدور والحبوب || تدن عشها في التربة بين الاعشاب او تحت التلع . وهي لا تبويض اكثر من مرتين في الحول . حفضتها تألف من ٥ الى ٦ بيضات تقوم بها الانثى بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٤ - قَبْب الجنب (S).

Cordylina australis (S).

Cordylina australis (F).

نوع من القتب وهو شجرة سريوية برية وتزيينية تملو من ١٠ الى ١٢ سم . ساقها فراء . اوراقها تشبه اوراق البوكا . نصلها يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم . وهو مالم البشرة جيل الخضار الزاهي يملو نوتيم اخضر او احمر . ازهارها الى البياض الاغبر . اذلتها كبيرة القد متوسطة الكثافة . ازهارها ينظم من اذار الى نيسان .

٢١٥٣٥ - قَبْب كثيف الزهر

Cordylina dense (S). Cordylina dense (F).

نوع من القتب وهو جنبة تزيينية تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها نحيلة فراء . اوراقها تطلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . نصلها جامد الصفحة مسنن الحافة احسن الزام الاخير ، لونه الى الخضار العايق || شراخها الزهري قرمزي اللون ، عذقا كثيف التجميع ، ازهارها ليكية .

٢١٥٣٦ - قَبْرَة

Azha النقة بعض نجوم كوكبية الاكليل الجنوبي . سميت قبة لاستوائها . ومن العرب من يسميها ادعى التمام لانها على جنوب النعامين .

٢١٥٣٧ - قَبْرَة ، قَبْرَة ، حَفْث

Feuillet (F). Third stomach of ruminants (E).

هي من الفم واسماها هنة ذات ابطاق متصلة بالكرش وهي البواء الذي يتنأى اليه الفرث .

٢١٥٣٨ - قَبْشُور * ، جَعْل مُكَرَّم

Ateuchus laticollis (S). Scarabée à large dôme (F).

Ateuchus laticollis (E).

حشرة نائلة من فصيلة الجعليات ورثة عدييات الاجنحة . يألف المزارع والبراري يعيش على الخبي والروث واليرير . مأواه يدعى كبرتل يتألف من نفق او نفقين وسجيرة فصية لسكانه ولا يولد القمموة التي يعيش عليها || جسمه متوسط القد يطول من ١٦ الى ٢٢ سم . ثوبه الى السواد اللامع . رأسه صغير الحجم ، قصير الخطم . زبانه صغيران دقيقان . عيناه صغيرتان ماصحتان . ظهرانه محجوب الشكل ، بالغ التخديف القندي ، مقطوم المؤخر ، لا يلفح كابل البطن || الاثنى اصفر قدأ من الذكر واهت ثوبا منه واكثر سريا || له جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى ايلول . تسرح في النهار . تتساق في حزيران . تمتع مكنة واحدة في القمموة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطلو نحو ٢٢ سم . جسمها غليظ البطن والطرف ، مقوس الشكل ، قصير الراجب ، ضليح التأثير ثوبها الى القبرية السراء . رأسها اسود اللون ، احمر المولج . تعيش في اربل عهدها على المواد العضوية الموجودة في القمموة ثم على الزبل حتى زمن الاكمال .

٢١٥٣٩ - قَبْج * ، قَبْج ، حَجَل أُونْد ، حَجَل عِرَاقِي

Sterna (S).

Starne, Perdrix grise (F). Sand partridge, Bonham's (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الجعليات وفصيلة الطيوريات . واحدته قبجة للذكر والاثنى ، وهي طائر ربع الجفنة ، متوسط القد ، طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه الى الردة الرصاصية النضبية المولج يملوها تجنيد نوتيم وتبويض .



قَبْشُور



قَبْج



قَبْرَة الحقل



قَبْرَة الغياض



قَبْرَة سَمَرَاء



قَبْرَة مُتَوَجِّة

الحافة . شراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم .
ازهارها الى الصفار المباهج يملوه توشم حنطلي يستقر عند
الختار || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢١٥٤٣ - قَبَس ٥
Type
هو النموذج المثالي الذي يجمع الملامح الشكلية الرئيسية
المائدة الى الضرب او السلالة او العرق .

٢١٥٤٤ - قَبَس * ، بُولْمُوِيْم (S). Polemonium
Polémoine, Polémoine (F).
جنس نباتات برية وزراعية ترابية من فصيلة القبسيات
انواعه عديدة جميعها عشبية معمرة . اوراقها متعاقبة ،
مركبة ، مستطيلة . ازهارها عنقودية او عكولك التجميع .
اشهر انواعه الزراعية الترابية ما يتبع .

٢١٥٤٥ - قَبَس اُزْرُق (F). Polémoine bleue
هو حشيشة المغرب ، اطلبا .

٢١٥٤٦ - قَبَس بَهِي

Polemonium pulcherrimum (S). Polémoine
superbe (F).
عشبة معمرة صغيرة القد زياء . تملو نحو ٢٥ سم . سوقها
فرماة منتصبه قليلة الورق . وريقاتها وريية التجميع
عدها رايوح بين ١٧ و ٢٧ عناقدها الزهرية متصلة
الكثافة . ازهارها ثنائية اللون منها الازرق والاصفر ومنها
الازرق والابيض ومنها الازرق والابيض الموشم بالاحمر .
ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٧ - قَبَس حُوقِي

Polemonium lanatum (S). Polémoine laineuse (F).
عشبة معمرة صغيرة القد . مهدا البلاد الباردة . تملو من
١٠ الى ٢٥ سم . سوقها واوراقها وازهارها زغبية البشرة .
سوقها نمجة . اوراقها قليلة العدد . وريقاتها وريية التجميع
تألفت من ١٧ الى ١٩ او ٢١ وريقة . ازهارها لبدة
زرقاء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٨ - قَبَس قَلِيل الزهر

Polemonium pauciflorum (S). Polémoine pauci-
flore (F).
عشبة معمرة زياء الفروع تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . ساها
منتصبه . اوراقها نظامية . وريقاتها ٢٧ عنقودها
الزهرية قليل الازهار . ازهارها صفراء اللون مستطيلة الشكل .
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٤٩ - قَبَس مُسَطَّح

Polemonium reptans (S). Polémoine couchée (F).
عشبة معمرة صغيرة القد . تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . سوقها
منبطحة . اوراقها مرطاة النصل صغيرة الحجم . وريقاتها
وريية ، خماسية او سباعية او تساعية العدد . عناقدها
الزهرية رطلة التجميع ، ازهارها الى الزرقا اليلكية || ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٥٠ - قَبَسِي ٥
Endémique (F). Endemic (E).
نمت تعريفني يطلق على النباتات والامراض التي تعيش
وتتكاثر في محيط مناخي معين محصور .

٢١٥٥١ - قَبَسِي ٥
Monogénique (F).
Monogenic, Monogenetic (E).
نمت تعريفني يطلق على كل ما هو عائله الى القبسية .

٢١٥٣٥ - قَبَرِيَّات
Alaudidae (S).
Alaudidés (E). Alaudidae (E).

فصيلة القبر ، من الجوامع المحرطيات المناقر . اجناسها
عديدة منها البقرة واللعل والمكاه والرهدل والرهدن والقوقيس .
معظمها من القواطع وبعضها آله || جميعها تألف الحفيس
اكثر من الاجواء والاشجار . اجناسها ربعة . رؤسها
كبيرة ، مناقيرها لا قياسية . اجنحتها مستطيلة ، اذناها
قصيرة || قوتها الحشرات والبرور البرية .

٢١٥٣٦ - قَبَرِيَّة * ، قَبَر (F). Corydalis (E). Klee-
terder (D). Corallide (I).
جنس نباتات برية وترابية من فصيلة الحشخاشيات .
انواعها عديدة معظمها جذمورية وبعضها دوصي . اوراقها
جذعية الارتكاز او قرصية ، نصلها كثير التفريش
والتشريح . ازهارها عنقودية التجميع ترتكز حل شراخ
يقوم مقام الساق || اشهر انواعها ما يتبع .

٢١٥٣٧ - قَبَرِيَّة جَوْفَاء
Corydalis cava (S).
Corydalle creuse (F).
عشبة جذمورية معمرة . جذورها دوفسية جوفاء . ساها
شراخ يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . ينهي بالعتود الزهري .
ازهارها حر او بيض || ازهارها يستمر من اذار
الى ايار .

٢١٥٣٨ - قَبَرِيَّة سُدَايَّة الْوَرَق
Corydalis rutecfolia (S). Corydalle à feuilles
de rue (F).
عشبة جذمورية معمرة . جذورها دوفسية مفلطحة جامدة
اللباب . اوراقها سدايية الشكل . ازهارها وريية كبيرة
القد . شراخها يعلو نحو ١٥ سم . || ازهارها يستمر
من نيسان الى ايار .

٢١٥٣٩ - قَبَرِيَّة صَفْرَاء
Corydalis lutea (S).
Corydalle jaune (F).
عشبة جذمورية معمرة . اوراقها متوسطة التفريش
والتشريح ، مالة البشرة . شراخها الزهري يعلو من ٢٥
الى ٣٥ سم . ازهارها ذهبيية اللون ، بزورها خمسية لامة .
ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢١٥٤٠ - قَبَرِيَّة قَبَعُونِيَّة الْوَرَق
Corydalis cheillantifolia (S). Corydalle à feuilles de
cheillant (F).
عشبة جذمورية معمرة . اوراقها قبعيةية الشكل ، مالة
البشرة تطول نحو ٢٠ سم . شراخها الزهري يعلو نحو
٢٥ سم . ازهارها كثيرة العدد ، جلة الصفار القاتم .
ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢١٥٤١ - قَبَرِيَّة مُرْعَبِيَّة
Corydalis tomentosa (S). Corydalle tomenteuse (F).
عشبة نجمية نمجة . اوراقها قرصية الانتشاب ، نصلها
يطول من ١٠ الى ١٨ سم . وهو متباعد التفريش ، كثير
التشريح ، مزفر الصنف . ازهارها الى الصفار الكبيرتي .
شراخها يعلو نحو ٢٠ سم || ازهارها يستمر طوال
فصل الربيع .

٢١٥٤٢ - قَبَرِيَّة نَيْسَلَة
Corydalis nobilis (S).
Corydalle noble (F).
عشبة جذمورية معمرة . اوراقها متباعدة التشريح ، مسنة



قَبَرِيَّة



قَبَس

٢١٥٦٠ - قُبَّيَات (S). Dermochelidae (F). Dermochelidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاحف. النوع المعاصر الوحيد من هذه الفصيلة هو القُبَّيَّس || يتنيز القُبَّيَّس بفقاره وصلوده الطليقة غير المتصلة بالذبل. وبذيله المركب من صفائح متتالية تتنم في السفن. وبجلوه من السهف القرني المادة الذي يكون ذبال سائر السلاحف || الانثى وحدها تأتي الى البر من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وذلك في زين الاشراق حيث تقع في كل مرة من ١٠٠ الى ١٥٠ شلقة تنفق بعد وضعها بنحو تسعة اسابيع. والقُبَّيَّس فور نفقه يتوجه تراً نحو البحر.

٢١٥٦١ - قَبَط (F). Mélanger (F).

To mix, To mingle (E). قبط الشيء: خلطه جيداً. يقال قبط الاسمدة الكيماوية.

٢١٥٦٢ - قَبَّع (F). Aulacode (F).

هو القباغ حيوان لبون قاصم، اطلبه.

٢١٥٦٣ - قَبَّعَة (F). Alouette calandrelle (F).

هي القبرة السراة. صفور ابقع ارض تكثر اقامته قرب اجوار الجردان فاذا فرغ اتبع فيها.

٢١٥٦٤ - قَبَّعَة * (F). Petasites (S). Pécasite (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة منها البرية والطيبة والتريبيتية. اوراقها جذعية معتقة متراكبة فائضة التصل المستدير او القلبي الشكل. ازهارها سبلي التجميع رأسي الارتفاع قاعدته مخراج غليظ متصطب تكسو الحراش. ازهارها متعددة الالوان. اشهر انواعه ما يتبع.

٢١٥٦٥ - قَبَّعَة بَيْضَاء (F). Petasite albus (S).

عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. اوراقها كبيرة فائضة طولها نحو ٧٠ سم. وعرضها ٥٠ سم. نصلها ازغب البشرة اطحل اللون اخضر العروق السفلى. شمراخها الزهري يملو نحو ٨٠ سم. حراشقه خضر، ازهاره صفر.

٢١٥٦٦ - قَبَّعَة نَلْجِيَّة (F). Petasite niveus (S).

عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها كبيرة، مثلكة الزوايا، نصلها خشن الصفحة العليا البحرية اللون ازغب الصفحة السفلى العلماة اللون. شمراخها يملو نحو ٦٠ سم. ازهارها الى البياض النلجي.

٢١٥٦٧ - قَبَّعَة عَطْرَة (F). Petasite fragrans, Nardosmia fragrans (S). Pécasite odoriférant, Héllitrope d'hiver (F).

عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها صفيرة، كلوية الشكل، خضراء التصل على صفحتيه، مسنة الحافة. ازهارها بنفسجية اللون عطرة. عرفها يشبه الزولا. تزدهج للزئين. ازهارها شوي.

٢١٥٦٨ - قَبَّعَة مَخْرَنِيَّة (F). Pétasite officinal (F).

هي حشيشة القرصان، اطلها.

٢١٥٥٢ - قَبَّيَات (S). Polemoniaceae (F). Polemoniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها واتواعها المعروفة عديدة معظما بري وبعضها زراعي تزييني.

٢١٥٥٣ - قَبِّيَّة * (F). Monogénisme (F).

وحدة الاصل والذرية. نظرية علمية، ركيزتها التسلسل المنطقي، توضح ان الاجناس البشرية تنفرع من قبس اصلي واحد.

٢١٥٥٤ - قَبَّيْرَة * (F). Gonomoarrhénie (F).

تصاب فرزي تكون انث انثاله عاقرة اما ذكوره فنائرة.

٢١٥٥٥ - قَبِيْس، قَبِيْس (F). Fourmillière (F).

Ant-hill, Ants'nest (E). مجتمع النمل الكبير الكثير. وهو ما يدعى قرية ومنسلة.

٢١٥٥٦ - قَبَّعَة * (F). Truxalus (S).

Truxale, Truxalis, Tryxalis (F). Truxalus (E). حشرة قانصة نطاطة من فصيلة الجراديات. اعطائها جميع الاصقاع الحارة والمعتلة الحرارة من العالم القديم || جسمها كبير القد يعلو من ٣٥ الى ٤٠ سم. عند الذكر ويعلو من ٥٥ الى ٦٠ سم. عند الانثى. قوبها الى الكهبة الثوراء يملوها موج اخضر ويجذع امر. زباناها قلاوبا الشكل، مستتباً الخط. اجنتها شفافة ملونة حراء القاعدة، وردية الشعاع، منطية الحاشية || تجوب المراعي والمواقع الرطبة من حزيزان الى آب || اضراها زهيدة لانها قليلة العدد.

٢١٥٥٧ - قَبِيْس (F). Truxalus (S).

هو الاخذ، اطلبه.

٢١٥٥٨ - قَبِيْس * (F). Dermatochelys coriacea, Dermatochelys coriacea (S).

Dermatochélyde, Dermochélide, Tortue-luth, Tortue-cuir géante, Sphargis (F). Leather turtle (E). سلخانة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة القَبَّيَّات. كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة الجيئات || اعطائها معظم بحار العالم. قوبها الاسماك والرخويات والنباتات البحرية والمرجان. لا تقرب من الشطوط الا في زين الاشراق. محاضنها المشهورة شواطئ الهند والخليج واليابازيل || جسمها كبير القد، يعلو من ١٨٠ الى ٢٥٠ سم. وزنها يراوح من ٥٥٠ الى ٩٠٠ كيلو. ذبلها سفي المادة والتركيب، سباعي الاكطار القاطبة المستعرضة عند قواعدها، الضيقة والضمية التجميع عند اطرافها. زعفها منبسطة الصفحة. رأسها معتدل الجرم، شبه افعس. عنقها غليظ، معتدل الطول. قوائمها مبطلية، زعنفية الشكل، عادمة المقابض. قائمتها الاماميتان كبيرتان، سليمتان، منحورتا الى مقلتين مجدافيتين لا يقل طولها عن ٣٠٠ سم. ولا يتجاوز ٣٦٠ سم. || عويلها عند اقتنائها زعاق صاعب شديد النقع || لحمها مأكول.

٢١٥٥٩ - قَبِيْصَان * (F). Strombus lambis (S).

نوع من الدلاع وهو من الحلازين الكبيرة يجحف فيكون منه اظفار الطيب.



قَبَّة



قَبِيْس



قَبِيْصَان



قَبَّة



قبب

وحيدات الأجهزة وفصيلة القبوبيات. انواعها الممارسة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. تعيش على الصخور المقنورة قرب الشواطئ || اصداؤها مخروطية قببة الشكل. اجسامها تأخذ اشكال الاصداف. رؤوسها بيضاء. افواهها مستعرضة تنتهي باعظام متفاوتة الطول. لولاسها مستطيلة ذلقة. عيونها تحت قواعد اللولاس. خياشيمها وحيدة الصف تملأ الحنجر الانامي من الرداء قرب المنق. ارجلها وحيدة، كبيرة وريفة.

٢١٥٧٧ - قُبُوعِيَّات ٥
Capulidae (S).
Capulidés (F). Capulidés (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وحيدات الأجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || تتميز باصداؤها المخروطية التي يكثر فيها الشكل القبي وبافواهها المستعرضة || اعرف اجناسها واشهرها القبوة والبابوبية والمقنة والوفس.



قبوط

٢١٥٧٨ - قَبُول . Vent d'Est (F). Easterly wind (E).
القبول : ربح الصبا.

٢١٥٧٩ - قَبُول . Acceptation (F). Acceptance (E).
هو الرضا بما يعرض.

٢١٥٨٠ - قَبُول ، مَوَاقِفَة . Acquiescement (F).
Acquiescence, Compliance (E).
هو الرضا بعمل تم أو حكم صدر.

٢١٥٨١ - قَبُول اِخْتِيَار . Levée d'option (F).
عقد يقصص فيه من كان مختاراً في الشراء يوسع مكتوب عن قبول الشراء بالشروط التي توافق عليها الطرفان.

٢١٥٨٢ - قَبُول الكَفِيل (F). Réception de caution.
قبول كفالة شخص عنه المدين الى الدائن.

٢١٥٨٣ - قَبُول اِهْبَة ، اِئْتِهَاب . Acceptation de donation (F).
تصريح الموهوب له في العقد بقبول الهبة.

٢١٥٨٤ - قَبُول تَرَكَة ، قَبُول وَصِيَة . Acceptation de succession, A. d'un legs (F).
هو قبول الوارث أو الموصى له بما لها أو عليها.

٢١٥٨٥ - قَبُول شَرْطِي ، قَبُول مَعْتَق . Acquiescement conditionnel (F).
هو اظهار الرضا أو القبول بشرط ان يؤدي الراعي أو الفريق الآخر عملاً معيناً.

٢١٥٨٦ - قَبُول صَرِيح . Acquiescement exprès (F).
هو القبول الذي يقره القابل صراحة.

٢١٥٨٧ - قَبُول ضَمِيح . Acquiescement implicite (F).
قبول يدل عليه تفويت الأجل المحددة لظمن في مقد أو طلب أو حكم.

٢١٥٨٨ - قَبُول مَسْكُوت عَنْهُ . Acquiescement tacite (F).
قبول تدل عليه ، لزماً ، بعض التصرفات ان كان مصدرها صاحب الشأن أو غيره.

٢١٥٦٩ - قَبِيب ٥

Anatina (S).

Anatine (F). Anatina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات فصليحات الخياشيم وفصيلة القفاليات. انواعها الممارسة المعروفة متوسطة العدد يكثر وجودها في بحار الهند ثم البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط || اصداؤها متباينة الاحجام ، لاقائية الشكل ، قبابية ، فارطة ، رقيقة ، ماسية ، شفاقة ، عادمة الخلزنة والتخديد.

٢١٥٧٠ - قَبُو ، مَرْب . Cave (F).
Cellar, Vault (E).
بناء او دهليز وما اشبه يصلح لحفظ بعض الخواصيل الزراعية الصناعية كالخمر والخبز والحب . ج. آباء.

٢١٥٧١ - قَبْرَاَت . Fressure (F). Pluck, Harslet (E).
هي القبط مجموعة اعضاء الحيوان الداخلية التي تسقط من حباب اللحم القائم كالقلب والسرور والطحال والكروش ، الخ.

٢١٥٧٢ - قَبُور ، قُبُول ، مَرَاة . Blottissement, Blottissure (F). Becoming over-ripe or sleepy (E).
هو ابتداء دور الذبول في الثمار وقد يكون ذلك بعد فوط الايناع || وهو في الارواق دور الذبول بعد الاثر باب.

٢١٥٧٣ - قَبْرُوط * . Antaxilus pedestris (S).
Sauterelle des champs (F).

جنس جنادب من فصيلة القبوبيات . انواعه خمسة . انوعها الى السمرة البنية المخضرة المرقطة . طولها يراوح من ١٧ الى ٢٧ سم. امتدادها الخلفية تطول من ١٧ الى ٢٦ سم. اغمارها عند الذكور نحو ٤ سم. وعند الاناث نحو ٢ سم. مرزاتها تطول من ١٣ الى ١٨ سم. حذافرها هليية ، كواسلها لاحقة . اسراك ذكورها مقلطحة مسنة الصفحة الداخلية . تألف الارض البور ويكثر وجودها في القسم الثاني من فصل الصيف.

٢١٥٧٤ - قَبْرُوط اخْضَر * ، تَقَطَّاط اخْضَر . Homorocoryphus nitidulus (S). Sauterelle verte (F).

نوع من القبوط اخضر اللون تحيل الجسم يطول من ٣ الى ٥ سم. رأسه مخروطي الشكل . رواشه كبيرة ، رقيقة ، شفاقة . زبانا دقيقان مستطيلان . اشرته تطول نحو ٢٢ سم. تألف المراعي والمغول المزروعة . يرغب في النباتات الجبيلة ومنها الزروع.


٢١٥٧٥ - قَبْرُوطِيَّات

Phasgonuridae, Tettigonidae (S). Phasgonuridés, Tettigonidés (F). Phasgonuridae, Tettigonidae, Long-horned grasshoppers, Geen meadow grasshoppers, Katyids (E). Laubheuschrecken (D).

فصيلة حشرات من مستطيات الأجنحة. اجناسها عديدة اشهرها القبوط. اجسامها متباينة الاحجام والالوان. قرونها الاستشارية طويلة. ارجلها الخلفية قاذفة. اراسها رباعية المقل. قرونها الشرجية لا عقدية. اشراها مؤلفة من ثلاثة ازواج مستطيلة. ملاسها الشرجية عامة توجد في الذكور كما في الاناث.

٢١٥٧٦ - قَبْرُوعَة ٥ . Pileopsis (S).
Capule, Cabochon (F). Pileopsis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل



قبوة

اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاقباح الغابرة . جميع أنواعها المعاصرة يمية قل ما تقترب من الشطوط . أسرابها وأفرقة العدد . زعانفها رقيقة شفافة متفارقة الانفلاق عادمة التفصيص الششائي . أصدافها كلسية المادة رقيقة الصلصات || اعرف اجناسها وأشهرها القنابة والصلصلة والدوامة .

٢١٥٩٨ - قَتَات ، قَتَاد (F). Acacia du Sénégal (F). هو سبط السنغال ، اطلبه .

٢١٥٩٩ - قَتَاد الصَّمغ (F). Astragale gommifère (F). هو الاسطراغالوس الدبق ، اطلبه .

٢١٦٠٠ - قَتَار (S). Neocosmospora (S). جنس فطور مجهرية من السناجيات وفصيلة المشويات اصحابها سطحية الارتكاز جر الششاء، تكاثفها غروبية الشكل تحضن بوضاً مستديراً اسمر اللون || انواعها عديدة جميعها حيودة كانوا يعتقدون انها مفسرة ويعطون اليها بعض امراض الفطن والبطيخ والتخيل .

٢١٦٠١ - قَتَال (F). Orque (F). هو الاركة ، اطلها .

٢١٦٠٢ - قَتَب (F). Bât (F). هو الاكاف او الرجل .

٢١٦٠٣ - قَتَب (F). Intestin, Boyau (F). Bowel, Gut (E). هو المى . وقال ابو عبيده : « القتب ما تحوى من البطن اي ما استدار منه وفي الحوايا واما الاعماء فهي الاقصاب » . ج . آتاب .

٢١٦٠٤ - قَتْرَة ، يَقْلُوم (F). Affût (F). Stand for wait (E). ناموس الصائد الذي يشيده ليستر فيه عند الصيد .

٢١٦٠٥ - قَتْرَال (S). Calurus resplendens (S). Quetzal, Calure resplendissant (F). Quetzal (E). طائر من فصيلة الطرغوثيات . موطنه بعض مناطق المكسيك وامريكا الوسطى . يألف الاحراج الجبلية التي يراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ متر عن سطح البحر || طوله نحو ١٠٠ سم . منها ٨٠ سم . للذنب و ٢٠ للجم . ثوبه متداخل الالوان الساطعة . رداؤه وصدره الى الخفصة اللحية المواج . بطنه الى الحمرة القريزية القائمة . عينه كستنية اللون . حواجه سود . متقاده وساقه الى الصفار الاسمر . عزالان ذنبه محبنا الاطراف || قوته الثار البرية والبرور والحشرات والدويبات الصغيرة || يذئن عشه في صدور الاشجار الحمرة . الاثنى تبقيش من ٤ الى ٥ يبيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

٢١٦٠٦ - قَتَع الإِجَاص * ، حَقَار سَاتِي الشَفَاح (F). Zeuzera pyrina, Z. aesculi (S). Zeuzère, Z. du polier, Z. de l'olivier, Z. du marronnier, Coquette (F). Wood leopard, Leopard moth, Wood leopard moth (E). Kastanienbohner, Blausiepe, Rosskastanienbohner, Apfelbohner (D).

حشرة من فصيلة القتييات حيفاء القد طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى البياض الاغبر . رواشها غيرة اللون تعلوها رقعة حنطية سوداء المواج . ريقها تقول نحو ٥ سم . ثوبها اغبر

٢١٥٩٩ - قَيْب (E). Foin (F). Hay (E). هو القش ، ما ييس من الخيش وجمع واخترن كملف .

٢١٥٩٠ - قَيْبِيض (F). Jusant (F). Ebb (E). القيبض حركة العجاجة عند ابتداء الجزر وسرعة تقلصه وايابه .

٢١٥٩١ - قَيْبُط * (F). Polyplectron (S). Eperonier (F). Asiatie pea-cock (E).

جنس طير من فصيلة الطرديات انواعها المعروفة ١٠ جميعها من طيور الزايج والهند الصينية . تألف المناطق الحرجية الجبلية . ايسابها قرية الشبه من التدرج ، اذبالسا مستطيلة منقشة كاذبال الطالوس . تتميز بصيص اصاغها التي يراوح عددها بين ٢ و ٦ . قنارها تاجية منتصبة . اؤلؤها عديدة الالوان يكثر فيها الاخضر الاسفع والاريد الخنطي الالفرى البقيع والتوشيح || انثاها تضع من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وسدها في افاحيص رصمها بالقرش والورق اليابس بين الادغال الكثيفة .

٢١٥٩٢ - قَيْبُط (E). Mimeux (F). Mirmous (E). نعت تعريفي يطلق على كل نبات تنقبض اوراقه من المس .

٢١٥٩٣ - قَيْبِيْعَة ، قَيْبِيْعَة ، قَيْبِيْعَة (F). Narine du porc (F). Nostril of the pig (E). هي ثغرة فتضية الخنزير .

٢١٥٩٤ - قَيْبِل (S). Calypste Helenae (S). Calypste Hélène (F).

طائر من فصيلة الفرديات . اعطاه بعض مناطق امريكا الجنوبية . يعتبر اصغر عصفور في العالم || جسمه يطول نحو ٥ سم . ثوبه متداخل الالوان الزاهية ، فيه الرمادي والاحمر والاصفر والاخضر . متقاره وقيق مستطيل || قوته الذباب والحوام وريقق الازمار . يذئن عشه في الادغال . انثاه تحضن من مرة الى مرتين في الحمل . حشنتها من ٣ الى ٤ يبيضات تربطها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢١٥٩٥ - قَت (F). Luzerne sauvage (F). هي الفصة البرية ، اطلها .

٢١٥٩٦ - قَتَابَة (S). Cavolinia (S). Cavolinie, Hyale (F). Cavolinia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة القنابات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منها ٢٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمتعدلة الحرارة ، وعشرة انواع من متحجرات الاراضي الميسانية والباسانية || اجسامها صغيرة اللد ، مكورة الصفة البطنية ، ثلاثية الاسنان او الحماط ، كبيرة الزعانف القمية الغليظة التفصيص ، لونها الى الصفرة يملوها موج يختلف مع الانواع يكثر فيه الازرق والبنفسجي اشهر انواعها قنابة البحر الاخر الثلاثة الانياب الحادة .

٢١٥٩٧ - قَتَابِيَّات (E). Cavolinilidae (E). Cavolinilidae (F). Cavolinilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل .



قَيْبُط



قَتَابَة



قَتْرَال



قَتَع الإِجَاص



قَتَّعِ البَصَل

اللون تشوبه حمرة ارجوانية ورشفة سوداء. رأسها ودقاتها الصدرية والشرجية كسنتية اللون. وهي تعيش من ٢٤ الى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والتفاح والسفرجل والزيتون والورداء... فتفتخها وتعلبها || تظهر الفراشة من حزيران الى تموز. الذكر منها اصفر قداماً من الانثى. زمن كرمها يدوم نحو الشهر ينتهي بنج الممكن على السوق ثم يتفت الملك بعد ذلك بضعة ايام من يرقات دقيقة تباشر عملها التخريبي فور اصلاحها الآول.

٢١٦١٢ - قَتَقُوتْ

هو يحمل الصخور، اعطيه.

٢١٦١٣ - قَتَمَم

الواحدة قَتَمَة. راجع ميرسين.

٢١٦١٤ - قَتَمَة

الفتحة نبات كزبرة الرائحة. (يحيط المحيط).

٢١٦١٥ - قَتَمِيَّات

هي الميرسينيات، اعطياها.

٢١٦١٦ - قَتْن ٥

Xérophile (F). Xerophilous (E). نعت تعريبي يطلق على النباتات التي ترغب في المناخات الجافة.

٢١٦١٧ - قَتْن * ٥

Gerres (S). Gerre (F). Gerres (E). جنس اسماك بحرية من فصيلة القناتيات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها بحار البلاد الحارة اغصها البحر الاحمر وشواطئ الهند وسريلانكا. اجسامها مبطلة، مرفوعة، قدر راحة الكف. زعانفها بارزة اغصها الظهيرة الشائعة المقدم والشرجية الفارقة.

٢١٦١٨ - قَتَنِيَّات

Gerridae (S). Gerridae (F). Gerridae (E). فصيلة اسماك مبطلة من شائكات الزعانف اجنتها وانواعها عديدة. اعطانها بحار البلاد الحارة. اعرف اجنتها واشهرها القتن.

٢١٦١٩ - قَتَرَابَة ٥ ، قَتَامَة ٥

Anemopaegma miranda, Catuaba (S). Catuaba (F). Folhas catuaba (E). Katuaba (D).

جنية برية طيبة معمرة من فصيلة البتونيات. مهدا بعض اصقاع البرازيل ساقها قزواء تملو نحو ٥ امتار. فروعها مستغلفة فناء. اوراقها ابيدة، متعاقبة، منعقة، ستانية التصل الجامد العابق الخضار. ازهارها عنقودي التجميع، طرفي الارتركار. ازهارها جريسية الشكل، وردية اللون، مرفقة بالابيض والاصفر. ثمارها كاليسر شكلها وقد لا لكنها لا تؤكل || اشهرت بانها اقوى منط نباتي وضادة للسرطان.

٢١٦٢٠ - قَتُون ٥

Pteroptus (S). Pteropte (F). جنس قزاد من فصيلة القناتيات. انواعه قليلة جميعها عياد. صغيرة القذ بيضيه الشكل مبطلة طرفها نحو مليمت واحد. انوارها الى الصفرة. الخنطية مبطلة يملو بعض الزراكن الجوية. يركب الطير والخفايش.

٢١٦٢١ - قَتِين *

Glyphiphagus (S). Glyphiphage (F). Glyphiphagus (E).

جنس حشرات مجهرية من فصيلة السكيات. انواعه المعروفة ثمانية. اجسامها مبطلة تملو من ٣ الى ٥ اعشار المليمتر. اعطالها ثابتة ماصة. ظهورها منشفة هلب دقيق مستطيل. قوائمها اربعة أزواج. انوارها تراوح من القيرة السمراء الى السمرة الخنطية المروج || تركب جمع المواد العضوية والغذائية والبيوع عند تحه وبعد تحه والقنطور الجافة. وقد تصيب الانسان في يديه ورجليه فتسبب له

اللون تشوبه حمرة ارجوانية ورشفة سوداء. رأسها ودقاتها الصدرية والشرجية كسنتية اللون. وهي تعيش من ٢٤ الى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والتفاح والسفرجل والزيتون والورداء... فتفتخها وتعلبها || تظهر الفراشة من حزيران الى تموز. الذكر منها اصفر قداماً من الانثى. زمن كرمها يدوم نحو الشهر ينتهي بنج الممكن على السوق ثم يتفت الملك بعد ذلك بضعة ايام من يرقات دقيقة تباشر عملها التخريبي فور اصلاحها الآول.

٢١٦٠٧ - قَتَّعِ البَصَل * ، دَسْبَسَة البَصَل

Dyspessa ulula, Endagria ulula (S). Dyspessa des olignons (F).

حشرة من القناتيات صغيرة القذ طرفها نحو ١٠ م. وبسطها ٢ م. ثوبها ابيض اللون حنطي المروج. ورشاتها الامايبان الى الياض الاطحل يملوها يتيج حنطي واصفر. ورشاتها الخلفيان سمر العروق بيض الاهداب || تظهر الفراشة من نيسان الى ايار ومن تموز الى آب. لها جيلان في الحول. رقتها صغيرة القذ سمراء اللون تركب مختلف انواع بصل الزنبقيات. يكثر وجودها على البصل في حزيران وفي ايلول.

٢١٦٠٨ - قَتَّعِ الجَفَنَة *

Paropota paradoxa (S). Paropota paradoxal (F).

حشرة من القناتيات. فراشها متوسطة القذ سمراء اللون مبقية الراش المهدبة. رقتها قصيرة، غليظة، حنطية اللون جوية المروج تركب الجفنة فتسربها تحت القشور.

٢١٦٠٩ - قَتَّعِ السَّاق * ، حَقَّارِ السَّاق

Cossus cossus, C. ligniperda, Trypanus cossus (S). Cossus gâte-bois, Gâte-bois (F). Goat-moth (E). Weidenbohrrer (D).

حشرة من القناتيات، فراشها خضعة غليظة سمراء اللون. ورشاتها حنطية يملوها يتيج وردي، وقشبي، ويجذيع سمر. رقتها تعيش من سنتين الى ثلاث سنوات وهي جوية الثوب، سمراء الظهر، حنطية اللذب. تركب سوق واصقان واناد بعض الاشجار المشعة والخرجية فتفتخها وتعلبها، سها الاجاص والتفاح والكرز والحوخ والمشش والوزر والاكينديا والربان والزيتون والسنديان والحوخ والصفصاف.

٢١٦١٠ - قَتَّعِ الصَّفَصَاف *

Cossus henleyi (S). Cossus du saule (F).

حشرة من القناتيات. فراشها صغيرة القذ تملو نحو ٢٥ م. اما بسلها فتزاح بين ٤٢ و ٤٥ م. ثوبها الى الوردية الطلحاد ورشاتها الامايبان الى الكهبة الخنطية المروج تتخللها عروق سمر. ورشاتها الخلفيان اتنع لوناً من جسمها || رقتها مستطيلة الشكل، تبلع، عند كمال دورها الحياتية، نحو ٦ سم. ثوبها في اول عهدا يدور وردي اللون ثم يتصرف تدريجياً نحو الجؤوة تشوبه صفرة شاملة وبقع سود رابعة تملو جميع حلققات الجسم ما عدا الحلقة الصدرية الاول || وهي تركب الصفصاف والسنت والائل والحوخ. تحفر السوق في شكيرها تحت القلف فتؤذيها اشد الاذى.

٢١٦١١ - قَتَعِيَّات

Cossidae, Zeuzeridae (S). Cossidae, Zeuzeridae, Carpenter moths (E). Holzbohrrer (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجنتها وانوارها زهاء ٦٥٠ معظمها جويي السرح. اجسامها لا قياسية القذ. ورشاتها كبيرة. رالها عديدة يغلب فيها



قَتَّعِ الجَفَنَة




قَتَّعِ السَّاق



قَتَّعِ الصَّفَصَاف



قَتْن



قَتِين

٢١٦٢٧ - **فَتَاءٌ ثُعْبَانِيَّةٌ * ، زَهْرَةٌ شَعْرِيَّةٌ**
Thrichosanthes angula (S). Thrichosanthe serpent, Patole, Serpent végétal (F). Snake gourd, Serpent gourd, Viper gourd (E). Haarblume, Sinesischer kürbis (D). Serpentine, Zuccetta cinese (I).

نوع من قرق الحشش وفصيلة القرعيات وهو نبات عشبي حولي عاشر ساقه تنطوي نحو ه انتار. أوراقه ثلاثية أو خماسية التفتيص ، أزهاره جميلة الشكل مهدبة البتلات البيضاء ، ثماره اسطوانية مستطيلة ملتصقة بملكة طويلا براوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٤ الى ٥ سم. لوها في أول عهدها الى الخضار البحري يملوه تسليج ابيض ، ثم ينحرف تدريجيا الى ان يستقر عند النضج على الاصفر البرتقالي || ثماره مأكولة وتطبخ كاللوبيا وغيرها من البقول .

٢١٦٢٨ - **فَتَائِيَّاتُ الْبَحْرِ**
Holothurides
رتبة حيوانات بحرية من شعبة الشوكيات .

٢١٦٢٩ - **قَتَد**
Concombres (F).
هو الخيار وأحدته قتدة .

٢١٦٣٠ - **قَتَرْد**
Moignon sec (F). Dry stump (E).
الفتاء اليابس في أصل الشجرة والكروية .

٢١٦٣١ - **قَتْعَب * ، قَتْعَبَان ***
Lixus (S).
Lixe (F).

جنس حشرات قارضة ناعرة من فصيلة السويات . أنواعه نحو ٣٥٠ جميعها مستطيلة الشكل مقطعة ، طويلا براوح بين ٨ و ٢٢ سم. أوتابها عديدة يكثر فيها الاسود والاسمر والحطلي يملوها طيل أصفر أو اسقم . رقابها دقيقة غبراء اللون متسجة الظهر تميش داخل السراويل التي تحفرها في سوق النباتات البقلية والصناعية والمروعية التي تركبها اصغها الشوندل والمفوف والتبع والبوسم والنفل الخ .

٢١٦٣٢ - **قَتْعَبٌ مُسْتَطِيل**
Lixe elongé (F).
حشرة تدعى لكسون مستطيل ، أطولها .

٢١٦٣٣ - **قَتِيت ، وَدِيَّة**
Pousse (jeune) (F).
Shoot (young) (E).
الفصيلة الفتية جاز اقتلاعه عن أرومها .

٢١٦٣٤ - **قَتِيعَةُ الْبُوط ***
Phragmatiphila typhae, Nonagra typhae (S).
Phragmatiphile des massettes (F). Phragmatiphila typhae (E).

حشرة من الفسقيات حشرقيات الاجنحة . موطنها يحد من الشرق الأقصى الى اوروبية وافريقية الشمالية . الفرائسة جارسة قوتها رحيق الأزهار . السرقة خاضلة كيمنة تميش في أول عهدها على أوراق النباتات المنقمية ثم على البوط والقصيب فتفتق سلاحياتها وتعيش في داخلها حتى نهاية طور الاكمال || جسمها مستطيل الجرم يطول نحو ٢٣ سم . يسطها نحو ٢٦ سم . رأسها حطلي اللون يملو منخس قرني المادة . عينها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشها وبطنها الى الحطلي الصنابي المواجه || رواشها صغيرة الحجم . الأزواج الانامي ، عند التفتق ، الى الحطلي الصنابي المواجه يملوه تمشيع وتفتيق وتنطيق كسني . رواشهاا الخلفيان الى الحطلي الانثى المواجه يسمر بعض

حكاكا مزعيا يبيع بشرة جلده . يقضى على الحكاك باستعمال الكمون عيار ٧٥° .

٢١٦٢٢ - **فَتَاء ، قَتِي ، مِقَتِي ، قَقُوس ، قُشْعُر**
Cucumis sativus flexuosus (S). Concombre serpent, C. flexueux, Melon serpent (F). Snake cucumber, Curving cucumber (E). Schlaugengurke (D). Cocomero serpente, C. di turchia (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات اصغرامه اربعة اوجه سقوها مدادة . أوراقها طويلة الزناد مفصصة . ثمارها اسطوانية ، مستطيلة ، حلقة البشرة في أول عهدها . طويلا براوح بين ٣٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٣ الى ٨ سم. لوها الى الخضار العابق ومنها البحري والاشير الاصفر . طعمها بين الحيار والكويو || تكثر زراعتها في البلاد الحارة . ترغب في الاثرية المتوسطة الاندماج والرطوبة .

٢١٦٢٣ - **فَتَاءُ الْبَحْرِ * ، خِيَارُ الْبَحْرِ ، ذُبُ الْبَحْرِ**
Holothuria (S).

Holothurie, Biche de mer (F). Holothurian, Sea-Slug, Sea-cucumber (E).

جنس حيوانات بحرية من فتائيات البحر . انواعه عديدة جميعها اسطوانية ععدة الجسم المستطيل ، مدنية الطرف ، مخنوقة العنق ، فارسة الحواس القمية التي براوح عدها بين ١٦ و ٢٠ || اعرف انواعه واشهرها . الثلاثة التالية :

Holothuria tubulosa (S).
فتاء البحر الأنبوبي
يكثر وجوده في المتوسط يعيش بين صفور الشواطئ .

Holothuria edulis (S).
فتاء البحر المأكول
يكثر في بحار الصين واسترالية والخليج الفارسي والبحر الاحمر .

Holothuria intestinalis (S).
فتاء البحر المصرائي
موطنه بحار الشمال وهو مستطيل الجسم الدقيق .

٢١٦٢٤ - **فَتَاءُ الْحَيَار**
Ecbale (F).
هو الفتاء البري نبات يحمل ثمرأ كالفتاء . من الطعم كربه الرائحة يسقط بخصارته للبرقان الاصفر فيقتد من الانفاد مادة صفراء يزول البرقان باستفراغها . (ا. م.)

٢١٦٢٥ - **فَتَاءُ الْهَنْد**
Bel indien (F).
هو الايكل أو البيل ، أطولها .

٢١٦٢٦ - **فَتَاءُ بَرِّي * ، فَتَاءُ الْحِمَار ، قَقُوس أَتْمِير ، عَوَزُور ، أَطْرِيُون**

Ecballium elaterium, Momordica elaterium, Elaterium officinale, E. agreste (S). Ecbale, Cornichon d'âne, Concombre sauvage, Giclet (F). Squirting cucumber (E). Echte Springgurke (D). Cocomero asinino, Eelaterio, Poonocini salvatici (I).

نبات عشبي بري من فصيلة القرعيات . يعيش في المواق الرطبة . أوراقه تشبه أوراق الفتاء والحبر تطلبها وتأكلفها . ثماره ريفية ، مستطيلة ، حجمها حجم بيض الوز ، تنفصل عن الساق عند نضجها وتقتد بزورها بعيدا عند الضغط عليها وهي سامة يستخرج من صغبرها مادة فعالة تدعى ايلاتريوم تعتبر من المسهلات المنقية ولها استعمالها الطبي المعروف .



فتاء البحر



فتاء بري



فتاء ثعبانية



قَتْعَب



قَتِيعَةُ الْبُوط



قجاج

Houppier (F). ٢١٦٤٥ - قَحْمَصَة ، بِقَاص
Crown (E).
الشجرة اقتطعت أغصانها حتى السنة . ج ققام ويقوع .

Maroute (F). ٢١٦٤٦ - قَحْرَان
هو الاقحوان الحُسن ، اطلبه .

Décrepitude (F). ٢١٦٤٧ - قَحْوَمَة
Decrepitude (E).
القحومة حالة الهرم وما ينتج عنها من وهن .



قحفة

Crania (S). ٢١٦٤٨ - قَحْيَقَة *
Cranie (F). Cranie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عصفديات الأرجل
وفصيلة القحفيقيات . أنواعها المعاصرة المرفقة قليلة العدد
بعضها من علم البحر الأبيض المتوسط والبعض الآخر
يعود الى المحيط الهندي || أمدهاها لامتساوية المضاريع ،
شبه مستديرة الشوزن ، مسطحة الصفحات السفلى الثلاثية
القفوب ، محبذة الصفحات العليا المجهزة من الداخل بكتابين
ناشريين || تعيش لاصقة بالصخور المنمورة القليلة النور .

Cranidae (S). ٢١٦٤٩ - قَحْيَقِيَّات *
Cranidés (F). Cranidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عصفديات الاربيل .
اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات
الطبقة الارضية الاول وبعضها يعود الى الطبقة الطباشيرية .
اما الانواع المعاصرة قليلة وتعيش في بحار البلاد الحارة
والمعتدلة الحرارة . جميعها ملتصقة بأصدانها ، عادة
والسويات الطينية || أعرف اجناسها واشهرها القحفة
والقحومة .



قد

Cottus (S). Cotte (F). Bull-head (E). ٢١٦٥٠ - قَدَّ
جنس اسماك صغيرة القد مسطحة الشكل من فصيلة
الطريخيات الشائكات الزعانف || انواعها عديدة منها
البحرية والبرية . جميعها تعيش في المسق . طوها دون المادي .

Chabot (F). ٢١٦٥١ - قَدَّ بَحْرِي *
Short-spined (E).
نوع من القد موطنه البحار يعيش قرب الشواطئ المصرية
المسقة النور . جسمه اهليلجي الشكل مستطيل الزعانف
الشائكة . رأسه كبير القد طوله يمازي الزام الاول من
الجسم . ثوبه متراكب الالوان فيه الازييض والاسمر والجزوي
والاشقر || اشواك زعانفه حادة مؤذية يحشاها الصيادون .



قد بحري

Cottus gobic (S). ٢١٦٥٢ - قَدَّ تَهْرِي *
Chabot (F). Father-lasher (E).
نوع من القد يعيش في المياه العذبة . وهو سمكة صغيرة
القد ، كثيرة الرأس والزعانف الحادة الشائكة . ثوبه
متداخل الالوان المراكبة . لحمه كرهه العلم لا يؤكل .



قد سهري

Arôme (F). Aroma (E). ٢١٦٥٣ - قَدَّآ
الرائحة الطيبة . يقال ناع قداء .

Fleurs de bigaradier (F). ٢١٦٥٤ - قَدَّاح
Flowers of a Seville-orange tree (E).
القدهاح هو زهر النارجون أو القناش . ومنهم من قال نور
النبات قبل ان يتفتتح . وأطراف الثبت الغض .

الشيء عند اقترابه من المختار الخارجى || لها جيل واحد
في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى أواخر
ايلول . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة
اسابيع وتمتد المكن لطفاً على الصفحات السفلى من نصال
الاوراق || السرة تقول نحو ٣٤ سم . جسمها شبه اسطواني
الشكل ، عاجي اللون ، تنبي الموج يملوه بعض الحلب
القصير الاغبر . رأسها اسود مذهباً ورواجها الى السرة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي
داخل سلامة البروط أو القصب .

Pagrus (S). ٢١٦٣٥ - قُجَّاج *
Pagre (F). Braize, Porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات الشائكات
الزعانف . انواعها نحو ١٥ اصلها بحار البلاد الحارة .
اجسامها بضيئة الشكل مسطحة طولاً يراوح بين ٢٥
و ٧٥ سم . زعانفها كبيرة ، الشرجية منها فارقة . فلوها
رقيقة مسنة . ألوانها متداخلة الالوان ، ظهورها ودية
أو مرجانية ، بطونها فضية . طوها قليلة العلم مرغوب
فيها || اشهر انواعه :

Pagrus vulgaris (S). القجاج المذلول
Pagre commun (F).
سمكة شبيهة بالمرجان . شائعة في المتوسط .

Pagrus orphus (S). Pagre orphe (F). القجاج الارفي
سمكة متوسطة القد مستطيلة الخنم تكثر في شمالي المتوسط
وعلى شواطئ الاطلسي .

٢١٦٣٦ - قُجَّاب
سعال الخيل .

٢١٦٣٧ - قُجَّار
سعال الابل .

٢١٦٣٨ - قُجَّال
هو السيل الجارف .

Benne préneuse (F). ٢١٦٣٩ - قُجَّالَة
Grab-bucket (E).
جهاز آلي يستعمل لرفع التراب والحجارة ونقلها من مكان
الى مكان .

٢١٦٤٠ - قُجَّال
داء يصيب الفم تجف جلودها .

Catabolisme (F). ٢١٦٤١ - قُجَّامَة *
Catabolism (E).
علم يبحث في دور انحطاط الكائنات الحية .

Orontium (S). ٢١٦٤٢ - قُجَّحْط
Oronce (F). Floating arum (E).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القلقاسيات .
انواعها قليلة اصلها مناطق وضيقات بحيرات البلاد الحارة
اغصانها ضفاد العاصي . اوراقها قرصية الانتساب
منقطة اهليلجية . نصلها يطول من ١٢ الى ٣٠ سم .
ويعرض من ٥ الى ١٢ شمراخها الزهري يعلو نحو ٥٠ سم .

Crâne (F). ٢١٦٤٣ - قُجَّحْ
القفح هو الجمة أو عظيمة .

Aspermie (F). ٢١٦٤٤ - قُجَّحْ *
Aspermatism, Aspermia (E).

التعلل انعدام الحويثات المنوية في المذي وانعدام الجوزور
في ثمار النبات .

Altise du tabac (F).

٢١٦٦٥ - قَدَادُ التَّبَاقِ

راجع التيز التبغ .

Altise des céréales (F).

٢١٦٦٦ - قَدَادُ الزَّرْعِ

راجع التيز الزروع .

Altise de la vigne (F).

٢١٦٦٧ - قَدَادُ الْكَرْمَةِ

راجع التيز الكرمة .

Chaton (F). Setting of a gem (E).

٢١٦٦٨ - قَدَقَةٌ

هي المهرمة ، نظام بهمة يرتكز على سنبلة مركبة من ازهار
وحيدة الشق .

Gobelet, Vase (F).

٢١٦٦٩ - قَدَحٌ *

شكل من اشكال التقليم في الاشجار .

Goblet, Vase (E).

٢١٦٧٠ - قَدَرٌ

القدر دائرة نجوم من كوكبة قيفاوس .

Puissance (F). Power (E).

٢١٦٧١ - قُدْرَةٌ

هي القوة على الشئ ، والتمكن منه .

Interligne (F).

٢١٦٧٢ - قُدْرَةٌ

Interlining, Space-line (E).

هي الفراغ اي المسافة بين الرزق والرزق في الفرس
المنسق .

Kadsura (S).

٢١٦٧٣ - قَدَصُورَةٌ

Kadsura, Kadsoura (F).

جنس جنبات برية ويزينية من فصيلة الغنجليات . انواعه
عديدة منها الشرق الاقصى . سوقها فراء تملو من ١٠٠
الى ٣٠٠ سم . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعققة . ازهارها
فردية التجميع ، ابطية الارتكاز . ثمارها نورية ثلثولية
القشور || اشهر انواعه واعمالها زراعة القدصوره اليابانية .

٢١٦٧٤ - قَدَصُورَةٌ يَابَانِيَّةٌ *

Kadsura japonica (S). Kadsoura du Japon (F).

نوع من القدصوره الزراعية واليزينية وهي جنبة جاحدة
تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اعطليجية ذرية ،
تصلها جامد الصفحة مالمس البشرة . ازهارها الى البياض
الاخضر يعلو موج اصفر . ثمارها الى الحمرة القرمزية .
اقتادها واوراقها تستعمل في صناعة الورق . نقيم افنانها
واوراقها يستعمل في تنظيف الشعر من مواده الدهنية .

Anthèse (F).

٢١٦٧٥ - قَدَفٌ ٥

نمن فخر الزهرة اي زمن افتتاح فجرة الطلع .

Caranx trachurus (S).

٢١٦٧٦ - قَدَقْدُ

نوع من الشيم وهو سمكة بحرية مستطيلة الشكل طولها نحو
٥٠ سم . مرتها المياه الاقليمية ، توجد في المتوسط . لحمها
مستحب الطعم مأكول .

Lignée (F). Issue, Progeny (E).

٢١٦٧٧ - قَدُورٌ

السلالة المنتخبة من صرم معرف الصفات الشوذية .

Piophilá (S). Piophile (F).

٢١٦٧٨ - قَدُورُوح ٥

جنس حشرات صغيرة القد ثنائية الجناح من فصيلة
القدورحيات . انواعه عديدة اؤها الى السمرة الالامه ،

Astragale (F).

٢١٦٥٥ - قَدَادٌ

هو الاسطراغالوس . اطليه .

Cricetus (S). Cricet (F).

Cricetus (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من الفأريات . انواعه عديدة
موطنها العالم ، منها ١٣ مهدا العالم القديم . اجسامها ربعة .
رؤوسها مخروطية . مقاضمها مقنطرة . آذانها متوسطة القد .
جراميزها واذنانها قصيرة . اؤها مختلفة الالوان . ديبها ناعم
قصير ، صوفها جامد مستطيل || اعرف انواعه واشهرها :

Cricetus nigricans (S).

٢١٦٥٧ - قَدَادُ اسْمَرٌ

Cricet noirâtre (F).

نوع من القداد موطنه شرقي البحر المتوسط . يوجد في
جبال لبنان من علو ١٢٠٠ الى ١٨٠٠ م . طوله نحو ٣٠
سم . وذنيه ٣ سم . ثوبه الى الزبد السمر . يعلو موج اسود ،
ظهوره اعين من بطنه || يألف الاحراج والادغال قوته
المواد النباتية والعفوية .

Cricetus arenarius (S).

٢١٦٥٨ - قَدَادُ الرِمَالِ

Cricet des sables (F).

نوع من القداد موطنه الشرق الاوسط والقفقاس واروية .
ثوبه الى الزبد السمر . طوله الكامل نحو ٢٧ سم . يألف
المناطق الرملية والجرف الدغلة المذبة .

٢١٦٥٩ - قَدَادُ هَمْسْتَرٌ ، قَدَادُ اَلْمَآنِي

Cricetus frumentarius (S). Cricet Hamster, Hamster (F). Hamster (D).

نوع من القداد طوله ٣٠ سم . وذنيه ٣ سم . ثوبه الى الاصفر
الحطبي يعلو موج اخضر . مقضمه ابيض . جبهته موشجة
مخط اسود . خذاه الى الصفرة . عنقه الى الصبغة الصنابية .
بطنه الى السمرة الباقية || موطنه بعض المناطق الاروبية
اخضها المائي والذئرك الى جحره رطب الأرجاء يقيم في
الهوم على عمق يراوح بين المتر والمترين . وهو مؤلف
من حجرة وسطى فسجة ونفق مستطيل لتعرضه من البين
والثبات عدة دهاليز مستطيلة يحزن فيها ما تبه من حنطة
وفيرا من الحبوب || انشاء قنص من ٤ الى ٨ ادراع
ترضعها ثلاثة اسابيع .

Cricétinés (F).

٢١٦٦٠ - قَدَادِيَات

عمارة حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات اجناسها
وانواعها كثيرة موطنها العالم . انواعها الامريكية فقط تم
٨٢ جميعها ربعة الجسم قصيرة الجرامز والذنب . قوتها
الحبوب ومائر المواد النباتية .

Vanne (F). Water-gate (E).

٢١٦٦١ - قُدَاسٌ

القُداس حاجز ينصب على مصب الماء لتقنين كمية انسيابه .

Altise (F).

٢١٦٦٢ - قَدَانٌ

هي الاليز جنس حشرات من النصاريات .

Altise bleue (F).

٢١٦٦٣ - قَدَانُ اَزْرَقٌ

راجع التيز زرقاء .

Altise potagère (F).

٢١٦٦٤ - قَدَانُ البُقُولِ

راجع التيز البقول .



قَدَادٌ



قَدَحٌ



قدصوره يابانية

Occipital ٢١٦٩٠ - قَدَّالِي ، قَفَّي
نمت تمريني يطلق كل ما هو مختص بالقدال .

٢١٦٩١ - قَدَّانِيَّات ٥

Aphaniptères, Siphonaptères (F). Aphaniptera, Siphonaptera (E).

رَبَّة حشرات صغيرة القد من طبقة عديمات الجناح . فصائلها خمس إما اجناسها وانواعها ٥٠٠ || اجسامها خافتة الجوانب المصفولة ، هليبة الزغب المنحج الى الوراء . رؤوسها صغيرة القد ، عويناتها بسيطة . قرونها الاستشعارية تحيلة مركبة من ثلاث فواصل . متاك اغطالها ثاقبة ماصة . ارجلها قوية مدة للقفز || وتتميز افراد بعض فصائلها بصف او صفين من الانسان تعرف بالمشط وهذا المشط قد يكون عدي او سدري الارتكاز . ذكروها اصفر من انثاها تحمل عدة الكوم في قميصاتها المنقطة نحو العلاء || اشهر فصائلها البرغوثيات .



قُدُوح الجبن

Vexille (F). Vexillum (E). ٢١٦٩٢ - قَدَّة ٥

القدة نصل الريشة . وهما قذتان ، القدة الوحشية اي الخارجية والقدة الانسية اي الداخلية .

Ejaculation ٢١٦٩٣ - قَدَف ٥

راجع اندفاق .

Ballistique (F). Ballistic (E). ٢١٦٩٤ - قَدَفِيَّة ٥

القذفية علم يبحث في رمي القذائف اي في ضبط حساب مدى المرمى وتسديده .

٢١٦٩٥ - قَر ٥

هو حبل القتر .

Froid (F). Cold (E). ٢١٦٩٦ - قَر ٥

هو البرد الشديد .

Poussin (F). Chick (E). ٢١٦٩٧ - قَر ٥

صغير الدجاج . هو الصوص والكتكوت .

٢١٦٩٨ - قَرَّة ، وَدَاق ٥

Chaleurs, Durée du rut (F). Heats, Duration of the rut (E).

مدة استحرام انثى الحيوان او زمن ودقائها وقد يدوم عادة نحو ٤٨ ساعة وهو يعاود كما يلي :

بعد الوضع

— بستعة ايام عند الفرس

— بعشرين يوماً عند البقرة

— باربعين يوماً عند الخنزيرة

— باربعة او ستة اشهر عند الشاة

عند الانثى غير الحامل

كل ٢٥ يوماً عند الفرس

كل ٢٠ يوماً عند البقرة

كل ٢٠ يوماً عند الخنزيرة

من ١٥ الى ٢١ يوماً عند الشاة

Caranx Korab (F). ٢١٦٩٩ - قُرَاب ٥

سمكة بحرية تدعى شم قراب ، اطلبها .

Gaine ovarique (F). ٢١٧٠٠ - قُرَاب بَيْضِي

Ovaric sheath (E).

عضو من سوار انثى الطير والخرشرات وهو وعاء جراي

الشكل يتكون فيه البيض

جميعها هوائية نائلة تركب مختلف المواد العضوية اخصها الجبن والذهن || اشهر انواعه قُدُوح الجبن .

٢١٦٧٩ - قَدُّوح الجبن ٥

Plophile du fromage, Mousse du fromage (F).

نوع من القُدُوح وهو ذبابة صغيرة القد طولها نحو ٣ م . ثوبها الى السرة السوداء ، مقدمها وارجلها الى الصهبة ، عويناتها حر . تتجمع مكانها في الجبن فينتفخ عن رقات دقيقة تحيلة تعيش على الجبن فتتخره وتعلميه .

٢١٦٨٠ - قَدُّوحِيَّات ٥

Plophilidae (S).

Plophilidae (F). Plophilidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها قليلة ، جميعها من الذباب الملوكة النائل الصغير القد المستطيل الارجل || رقاتها تعيش على المواد العضوية المتخرسة وعلى الحوم المتقدة والجبن والاسماك ...

Cottidae (S). ٢١٦٨١ - قَدِّيَّات ٥

Cottidae (F). Cottidae (E).

فصيلة اسماك من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها قليلة العدد تقسم الى قسمين قسم الاسماك البحرية التي تقضي حياتها في البحار وقسم الاسماك النهرية التي تعيش في المياه العذبة . جميعها من الاسماك المسنجة الشكل ، كبيرة الرؤوس ، صغيرة الاجسام المستدقة ، مستطيلة الزعانف الحادة الشائكة لحومها دنيئة الصف .

٢١٦٨٢ - قَدِّيَّات ٥

فصيلة نباتية تعرف بالمرقيات ، اطلبها .

Viande desséchée (F). ٢١٦٨٣ - قَدِيد ٥

Dried meat (E).

لحم مقدد .

٢١٦٨٤ - قَدِّيَّسيَّات ٥

هي القردديات ، فصيلة نباتية ، اطلبها .

Lamarkia (S). ٢١٦٨٥ - قَدِّيَّيُون ٥ ، لَامَرْكِيَّة ٥

Lamarkie, Codion, Eléodendron (F).

جنس نباتات عشبية برية من التنبليات المكشيات . انواعه المعروفة عديدة منها براري حوض البحر الابيض المتوسط || اوراثها صغيفة النصال المسطحة . ازهارها سبيل التجميع . سبيلاتها صغيرة .

Branchipus (S). ٢١٦٨٦ - قَدَّة ٥

Branchipe (F). Branchipus (E).

دويبة من القشريات الدنيا غشويات الاطراف . تعيش في المياه العذبة . جسمها عادم الحواف ، مستطيل الشكل ، بطول نحو ١ م . عيناها مزنتان . زباناها مستطيلان عند الذكر . قوائمها الصدرية صفيحية الشكل . تموم على ظهورها .

Brachyne (F). ٢١٦٨٧ - قَدَّالَف ٥

هي الرمانة ، اطلبها .

٢١٦٨٨ - قَدَّالَف أَحْمَرُ الرَّاس ٥

Brachyne crépissant (F).

هو الرمانة الحمراء الرأس ، اطلبها .

٢١٦٨٩ - قَدَّال ، قَفَّال ٥

Nuque (F). Nape (E).

جامع مؤخر الراس وقيل ما بين فقرة القفا الى الاذن والقدال من الفرس معقد المذار خلف الناحية . ج قذل وأقذله .



قَدَّة

٢١٧١٤ - قَرَّاص هو البراد، اطلبه .

٢١٧٠١ - قَرَابَة هي العصادة ، اطلبها .

٢١٧١٥ - قَرَّاص ، قَرَبِص ، حُرْبِق ، أَشْجَرَة

Urtica (S). Ortie (F). Nettle (E).

جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة القَرَابِيَّات
أنواعها المعروفة ٣٠ . أصلها البلاد المعتدلة الحارة . سورها
منتصبه فراء . أوراقها معنقة متعاقبة أو متعاقبة . نصلها
مزينة الحاد زغبها حليبي دقيق يفرز عصارة حمرة تركز
على الحامض التل وهو يشب ويحمي من سمه فينبج الجلد
وبلهب || أضراره خضراء وحيدة أو ثنائية المسكن .
يزورها طيبة عديدة الفوائد مثيرة للرغبة الجنسية وقد تضاعف
في العطارة إلى أكثر الادوية المنبهة المستعملة لهذه الغاية .
والقراص الجاف يفتقر الخواص اللاحقة بعد اختلال الحامض
التل || أعرف أنواعه وأشهرها الكاري والكبير والمخرق .

٢١٧١٦ - قَرَّاص كَذِب Lamier blanc (F).

هو اللابيون الأبيض ، اطلبه .

٢١٧١٧ - قَرَّاص كَارِ * ، قَرَبِص رُوماني ،

نبات النار

Urtica pilulifera (S).

Ortie à pilules, O. romaine (F). Roman nettle (E).

Pillennessel (D). Ortica romana (I).

نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طيب يحول يكثر
في البساتين والحقول . ساقه دقيقة زباء . أوراقه معنقة ،
متعاقبة ، أحليبية ؛ نصلها حشن البشرة ، سنن الحافة ،
كثيف الحلب الشائك . أضراره وحيدة المسكن خضراء اللون .

٢١٧١٨ - قَرَّاص كَبِير *

Urtica dioica (S). Ortie dioïque, Grande Ortie,

Ortie puante (F). Stinging nettle, Large nettle (E).

Grosse Brandnetel, G. Nessel, Brennessel (D). Ortica

grande, O. maschia, Orticone (I).

نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طيب يحول يكثر
في البور وقرب السياجات . ساقه فراء عالية . أوراقه
مستطيلة الزام الأخير ، سنن الحافة ؛ نصلها كثيف
الحمل اللينق مبهر الحلب المستطيل . أضراره ثنائية
المسكن .

٢١٧١٩ - قَرَّاص مُحَرَّق * ، قَرَبِص العَجَوز

Urtica urens (S). Ortie brûlante, Petite ortie (F).

Small nettle, Dwarf stinger (E). Kleine Nessel (D).

Piccola ortica, Ortica ardente (I).

نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طيب يحول يعيش
أينما كان وفي أي تربة كانت . ساقه قصيرة فراء زباء .
أوراقه بيضيه الشكل منشارة الحافة نصلها لبد الحمل
الحليبي الشائك . أضراره وحيدة المسكن .

٢١٧٢٠ - قَرَّاصِيَّات *

Prunus cerasifera (S).

Prunier cerise (F).

نوع من الفروع شجرته صغيرة اللقد تلو من ٣ إلى ٤ أمتار .
ساقها فراء . أوراقها أحليبية النصل شديدة الخضار العابق .
ثمارها مأكولة وهي كرزوية الشكل واللقد ، بنفسجية اللون ،
خضراء المواج .

٢١٧٢١ - قَرَّاصِيَّات

Urticaceae (S).

Urticacées, Urticées (F). Urticaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات اللقطين عادمة اللقعات أجناسها
وأنواعها عديدة معظمها نباتات عشبية وجنبية وبعضها
شجري . جميعها عادمة الحلبات . أوراقها حليية النصل .
أضراره رباحية أو خاسية التركيب . ثمارها فقيرة أو
لنوية ، صغيرة اللقد .

٢١٧٠٢ - قَرَّاح ، قَرُوح

Guéret (F).

Ploughed but unsown land (E).

أرض حرثت ولم تزرع ولم تفرس . وقيل المزرعة التي
ليس عليها بناء ولا فيها شجر . وقيل الأرض الخلسة لزراع
أو لغرس .

٢١٧٠٣ - قَرَاد ، قَرَاد ، حَلَم

Tique (F). Tick (E). حَلَم اسم شامل يطلق عادة لا عرفاً على معظم أنواع الطلحيات .
الواحدة قرادة وحلمة .

٢١٧٠٤ - قَرَاد الجَرَب *

Symbiote

جنس قراد يحدث جرباً في الخيل والمجترات .

٢١٧٠٥ - قَرَادِيَّات ، حَلَمِيَّات

Acariens (F). Spiders (E). Milben (D).

رتبة حشرات من التكنوبيات فصائلها وأجناسها وأنواعها
كثيرة العدد . جميعها صغيرة اللقد . أجسامها عادمة الفواصل
والخلفات . رؤوسها وصدرها وبطنها منديجة . مضغها
أزب الجلد . ملابها الفككية لانياسية الشكل منها الملقطة
والبيضة ... غاطسها قارضة أو ثاقبة ماصة . أرجلها
ثمانية في الحشرات الكاملة . سداسية في البزقات وهي معجنية
الاطراف أو غليية || أشهر فصائلها : الارغشيات
والبرانيات والجربيات والحاشيات والسكيات والشيشيات
والطلحيات والفشيات والكهديات .

٢١٧٠٦ - قَرَار

Arrêté (F). Order in council (E). هو آخر ما استقر عليه الرأي في تعيين الاجراءات التي
يقضها نشر القوانين وتنفيذها || أما السلطات التي
يؤمها القانون حق استصدار القرارات فهي سلطة القضاء
والوزير والمخلف والبلدية .

٢١٧٠٧ - قَرَار

Décision (jur.) (F). Decision (E). هو الرأي النهائي الذي تستقر عليه الآراء ، وهو من الحكم
منطوقه ومن الطلبات التصريح بها .

٢١٧٠٨ - قَرَار الائتِام

Réquisitoire (F). Lest of charges, Indictment (E). هو مرافعة النيابة العامة وطلبها تطبيق مواد معينة من القانون .

٢١٧٠٩ - قَرَار الإحَالَة

Ordonnance de renvoi (F). Sending ordinance (E). هو القرار الذي يصدره قاضي الإحالة .

٢١٧١٠ - قَرَار التَحْصِيل

Mise en recouvrement قرار تصدرة الادارة أو مصلحة الضرائب يحمل قسام
التحصيل نافذة منذ صدورها .

٢١٧١١ - قَرَار الرَّفْض


Décision de rejet (F). Carrying decision (E). هو القرار القاضي برفض الطلب المقدم .

٢١٧١٢ - قَرَار تَحْصِين التَّالِف

Arrêté de cessibilité (F). Transferability order (E). قرار تعين فيه الادارة المقررات التي ستزوع ملكيتها من
أصحابها في سبيل تنفيذ عمل تقتضيه المنفعة العامة .

٢١٧١٣ - قَرَار نَالِغ

Décision exécutoire (F). Executory decision (E). هو القرار الواجب تنفيذه .



قراد الجرب



قَرَّاص كَارِ



قَرَّاص كَبِير



قَرَّاص مُحَرَّق



قَرَّاصِيَّات

معظم أنواعها عصارة حلابية حراء اللون سريمة الجلفاف تستعمل استعمال الكينو والكاشو .

Cornouiller (F).

٢١٧٣٢ - قُرَانِيَا

هي القرونس ، اطلبه .

Cornacées (F).

٢١٧٣٣ - قُرَانِيَّات

هي القرونسات ، اطلبها .

٢١٧٣٤ - قُرْبَة

هي الزق ، اطلبه .

Corvina (S).

٢١٧٣٥ - قُرْبَة

Corb (F). Corvina (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات || أنواعها المعروفة نحو ٢٠ منظمها من اسماك المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر ، وبعضها يعيش في البحر الابيض المتوسط || اجسامها متفارقة القد ، اطوالها تراوح من ١٢ الى ٣٥ سم . اطيافها متباينة الالوان يكثر فيها الرصاصي والاسمر القاتم || لحمها جيدة الصنف مأكولة || اعرف انواعها واشهرها القرية السوداء .

٢١٧٣٦ - قُرْبَة سَوْدَاء * ، قَاقِ الْبَحْرِ

Corvina nigra (S).

Corb noir, Corbeau de mer (F). Crow fish (E).

نوع من القرية . سمكة بحرية بيوض . اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها اهليجي الشكل يطول من ١٨ الى ٣٥ سم . ثوبها الى السرة السوداء المواج . ظهرها اسود . بطنها فضي . زعانفها الى السواد الارزق المواج يعلو تنطبق ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخيط . فكها متعادلان . شدتها معتدل الانفراج . عيناها كبيرتان ناشرتان . زعانفها متباينة الاشكال . الظهريه الارزق محزومة . الظهريه الثانية مستطيلة . الصدرية مجذافية . الخوضية قديرة . الشرجية مستطيلة . الذيلية مجوفة الطرف || لحمها جيد الصنف ، ودغوب فيه .

٢١٧٣٧ - قُرَّت الْجِلْد . Kératose (F). Keratosis (E).

علة في الجلد تنشط الطليقة القرية تفتحن وتتصلب .

٢١٧٣٨ - قُرَّة * ، قُرَّة الْعَيْن

Nasturtium officinale (S). Cresson de fontaine, Santé du corps (F). Water cress, Water grass (E). Brunnenkresse, Brunnenwasserkresse (D). Crescione di fonte, Nasturcio, N. acquatico, Sisembrio acquatico (I).

بقلة معمرة من فصيلة الصليبيات تعيش على سطح الماء سوتها عشية . اوراقها منقعة ، مركبة ، ثلاثية الوربيقات . ازهارها عنقودية التجميع ، بيضاء اللون . فروعها واوراقها وازهارها مأكولة ، نائمة (راجع جداول الفيتامين).

٢١٧٣٩ - قُرُنْج

Cyclostrema (S).

Cyclostrem (F). Cyclostrema (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وفصيلة القرنفريات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصدافها صغيرة القد قرصية ، محزونة ، متدلة الانحناء ، جانبية القوطة المستديرة كالوق . لبونها الى البياض الاخير تملو زخرفة جؤوية متناسقة تمتد من القوطة والقاعدة الى القمة .



قُرَابَة



قُرَام



قُرَة سَوْدَاء



قُرَة

٢١٧٤٢ - قُرَامِيَّاتُ الْبَحْرِ Acaláphes (F).

رئة من المحفوات تنتمي الى صف الهيدرات اللوسية . فصائلها واجناسها عديدة تتميز بشكلها القمي التركيب تملو اعداب شائكة اذا لامست الجلد ألمتها كما يفعل القراص . اعطائها جيع بحار البلاد الحارة والمعتدلة تعيش على الصخور .

٢١٧٤٣ - قُرَاطَة * Karatas (S).

Karata, Karatas, Caratas, Ananas à feuilles longues (F). Curra-towplant (E). Karatas Ananas (D). Karatas (I).

جنس نباتات معمرة برية وزراعية تربينية من فصيلة الانناسيات . اوراقها حلوية ليفية مستطيلة طحلاء اللون شائكة الاطراف والمقصية . ازهارها جميلة الشكل والالوان ، سلبية التجميع || انواعها قليلة اشهرها ما يتبع .

٢١٧٤٤ - قُرَاطَة سَانَ دُومِنْجْ Karata de St. Domingue

نوع من القراطة اوراقها صناعية نسجية وقد تستعمل تنج الجذور بعد سحقها في تدويخ السلك لصيده .

٢١٧٤٥ - قُرَاطَة غُويَان ، شَجَرَة الْفَتَالِيل Karata de la Guyane, Bois de mêche

نوع من القراطة لها كالمصفاة يستعمل استعمال الفتاليل . ثمارها صغيرة القد زينة الشكل تدمي ليمون الارض لانها حازنة الطعم وتنضج في التربة .

٢١٧٤٦ - قُرَاع * Picus (S). Pic (F). Woodpecker (E).

طائر يحجم الدورار يتسلق جذوع الاشجار وينقرها لاستخراج الديد من ثغورها . راجع نقار .

Dermatomyecosis (S).

Dermatomyecose (F).

مرض جلدي سببه القراد .

Ecorce (F). Bark (E).

هي اللحاء يوجه عام وفي التخصص لحاء سوق النباتات الحولية والحرولة .

٢١٧٤٩ - قُرَام Phalaris noueux (F).

هو البشته المقدية نبات عشبي علني من التيجليات .

٢١٧٥٠ - قُرَام * Rhizophora (S).

Rhizophore, Manglier (F). Mangrove tree (E). Gemeiner Wurzelbaum, Mangelbaum (D). Rizofora (I).

جنس اشجار منتقية من فصيلة القراميات . انواعه ٥ اشجارها كبيرة القد . اوراقها معققة ، متقابلة ، جلدية التصل اللامع . ازهارها محورية الارتكاز ، نورية التجميع ، مستطيلة الزناد . ثمارها خذرونية الشكل ، مأكولة اللب . يستخرج من عصارة ثمارها بعد تحميرها مشروب خري لا بأس به .

٢١٧٥١ - قُرَامِيَّات Rhizophoraceae (S).

Rhizophoracées (F). Rhizophoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات . اجناسها ٥ وانواعها ٥٠ اعطائها المناطق الاستوائية . جميعها اشجار وجنبات . اوراقها منقعة ، متقابلة ، بسيطة ، كاملة . ازهارها نورية التجميع ، ابضية الارتكاز او تاجية . ثمار بعض اجناسها مأكولة ويستخرج من سوق

ازهاره عنقودية التجميع، كبيرة القذ، تبدو بيضاء اللون ثم تتحرف شيئاً فشيئاً الى الاحمر || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٧٥٢ - قُرْدَبُ الْمَنَاقِعِ

Renouée à feuilles de patience (F).
يعرف بالبدلار، اطلبه.

٢١٧٥٣ - قُرْدَبُ شَرْقِي

Polygonum orientale (S). Renouée d'Orient, Bâton de St Jean, Cordon de cardinal, Monte au ciel (F).
نوع من القردب التريبي شروبه عديدة سوقه سرحة قليلة الفروع تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه كبيرة القذ، نصلها يبيضي الشكل، ذلق الزايم الاخير. ازهاره سنبلية التجميع، طرفية الارتكاز وبحورية، مستطيلة الزنناد متدلية، لونها يختلف باختلاف الضرب منها الابيض والوردي والاحمر والموش || ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

٢١٧٥٤ - قُرْدَبُ صَوِي

Polygonum lanigerum (S). Renouée laineuse (F).
نوع من القردب التريبي ساقه زباء، لعله، ملحاء اللون. سنبلية، نصلها خلي الصفحة القفصية الموج. ازهارها سنبلية التجميع، متبادعة، بيضاء اللون او وردية. ازهارها يستمر طوال شهر ايلول.

٢١٧٥٥ - قُرْدَبُ صِينِي

Polygonum chinense (S). Renouée de Chine (F).
نوع من القردب التريبي ساقه فراء تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه اغليجية مستطيلة، نصلها قصير الملق، سنن الحافة، اخضر البشرة او احمر. ازهاره عنقودية التجميع، تاجية الارتكاز، قمرية اللون. ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢١٧٥٦ - قُرْدَةُ

Guenon (F). She-monkey (E).
انثى القرد.

٢١٧٥٧ - قُرْدُوح

Papion (F).
هو القردوح، اطلبه.

٢١٧٥٨ - قُرْدُوع، تَمَّ

Philopterus (S). Philoptère (F). Philoptère (E).
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة النمنمات. انواعه عديدة جميعها مقلطة الجسم. مستطيلة الرأس. طولها براوح بين ١ و ٤ م. ألوانها الى الخنثي يسمر او يصفر مع الانواع. وهي من الحشرات المؤذية، تركب الطير فتضيقه بامتصاصها الدم.

٢١٧٥٩ - قُرْدُوعُ أُسْمَر

Philopterus atratus (S). Philoptère noir (F).
نوع من القردع طوله نحو ٢ م. جسمه يبيضي الشكل، كثيف الغلب المستطيل. ثوبه الى السمره يطولها يتيج مثلث الزوايا حنثي اللون || يركب الغراب انحصها البداف.

٢١٧٦٠ - قُرْدُوعُ الْبَطِّ *، تَمَّ الْبَطِّ

Anaticola anseris (S). Anaticole des ansérades (F).
نوع من القردع طوله براوح بين ٢ و ٣ م. جسمه ضيق الشكل. ثوبه الى الصفار الخنثي. هليه صغير القذ، كثيف التجميع || يركب البط ويؤذي.

٢١٧٤٠ - قُرْطِيَّات

Cyclostromatidae (S). Cyclostrematidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الارجل حشفيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في منظر بحار العالم انحصها بحار البلاد الحارة والممتدة الحارة || اسدهاها مغطاة او شفافة، عادمة المادة القلوية، متبادنة الاحجام، يكثر فيها الصفر. جميعها قمرية محلونة، قليلة الارتفاع، مستديرة القفوة الاجنانية الارتكاز القرنية المادة || اشهر اجناسها القرع.

٢١٧٤١ - قُرْحَانَة

ضرب من الكدابة. ج. قرحان. والقرحان يبيض صفار ذوات رؤوس كروئوس القطر.

٢١٧٤٢ - قُرْحَة، قُرْحَة

Ulcère (F). Ulcer (E).
تريه نسيجي لاتيبي الشكل والشان يحل في الاجسام الحيوانية والنباتية فيعطها.

٢١٧٤٣ - قُرْحَة الْغَتَم، قُرْحَة الْحَرَاثِف

Becqueriau du mouton, Chancres des lèvres (F).
مرض عضال يصيب الفم. مظهره الحارثي يشور بقع مقروحة تملو مراشفت الحيوان المصاب.

٢١٧٤٤ - قُرْحَة الْفَقَا

Mal de nuque (F).
عارض يصيب الخيل.

٢١٧٤٥ - قُرْد، سَعْدَان

Singe (F). Ape (E).
اسم شامل يطلق على كل حيوان لبون من القرديات. كنيته ابو خاله وابو حبيب وابو خلف وابو ربة وابو قشة. جمه قردو وقردة. والاثني قردة جمها قرد. وتسمى لفة ودحية.

٢١٧٤٦ - قُرْدُ الْمَغْرِب

Magot (F).
هو الشديم، اطلبه.

٢١٧٤٧ - قُرْدُ الْهِنْدِ الْمُقَدَّس

Singe saint des hindous (F).
هو هبار التلوس، اطلبه.

٢١٧٤٨ - قُرْدُ امْرِيَكِي

Saki (F).
هو الساي، قرد كك الذنب واللحية.

٢١٧٤٩ - قُرْدُ مُقَدَّس

Semnopitèque (F).
هو الهبار، اطلبه.

٢١٧٥٠ - قُرْدَب، عَصَا الرَّاعِي

Polygonum (S). Persicair, Renouée (F). Persicaria (E). Knöterich (D). Persicaria (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة البطباطيات. انواعه عديدة منها البرية والتريبية والششية والجنسية والعارشة. سوقها عقدية، اوراقها لاذيائية الشكل، ازهارها عنقودية التجميع او سنبلية، اشهر انواعه ما يلي.

٢١٧٥١ - قُرْدَبُ التُّرْكْمَنَسْتَان *

Polygonum badschuanicum (S). Renouée du Turkestan, R. du Badschouan (F).

نوع من القردب التريبي. ساقه عارشة تملو من ٥ الى ٨ امتار، فروصها رطلة، اوراقها اغليجية الشكل، قلبية القاعدة، نصلها مالمس البشرة، سنن الحافة.



قرد التركستان




قردب شرقي



قردب صوني



قردع اسمر



قردع البط

٢١٧٦٩ - فردوس شحوت ، رباح أبو الهول ،

دهاب

Papio sphinx (S).
Papion sphinx, Papion grand (F). Cynocephalus mormon (E).

نوع من القراديع كبير الجثة افضل الزقروم . موطنه يمتد من النيل الى النيجر والكنغو. ثوبه الى الجؤرة الباهتة يمتد مع اقترابه من شج الظهر ونقرة الرأس . حاجبه اولف الشعر الابيض . اذنه متوسطة القد مواء . صوته يشبه قباغ الخنزير || جاعته متوسطة العدد .



فردوس الحام



فردوس الحام

٢١٧٧٠ - فردوس خنزيري ، ششمه

Papio porcarius (S). Papion chacma (F). Chacma (E).

اكبر القراديع جثة واسطوا زلقيا وهو عادم الفقرة صغير الكتاب . ثوبه الى الكهبة السمره يطولها موج اخضر . حنجر حار كله ابيض اللون وشعر حاجبه ١٠٠ يالفت الحجاب والجبال والمناقع . يعيش جماعات كبيرة تعد بعض العشرات .



فردوس النور



فردوس الزنج

٢١٧٧١ - فردوس ميزواج ، ميمون

Mormon malmson (S). Papion mandrill (F). Papio malmson, Mandrill (E).

نوع من القراديع ويروايع الفرد وادها واقبحا واسهلها وانسحقا واشهرها خلقا واشدها بأساً . موطنه البلاد الافريقية يكثر في القابون والكنغو || جسمه صموري يطول نحو ١٠٠ سم . ويعلو ١٠٠ سم . ذنبه ١٠ سم . قوائمه شديدة التشط . رأسه متوسط الحجم . زلقوه مستطيل مقطوم . عيناه غائرتان . انفه احمر اللون . كتابته مخددة ، بارزة ، زرقاء اللون || ثوبه الى السمره الزرقية الخفيفة الموج ، يمتد عند الظهر والرأس || يعيش جماعات كبيرة تعد بعض العشرات .



فردوس الحينة

٢١٧٧٢ - فردوس يمتسي ، رباح

Papio hamadryas (S). Papion hamadryas, Hamadryas Tartarin (F). Hamadryas (E).

اعرف واشهر انواع القراديع . موطن الحينة والسودان والجزيرة . قد قد الكلب الكبير الفليظ . ثوبه الى الكهبة الغضبية . وجهه حنطي اللون . كتابته زاوية اخمرة . قوائمه غليظة وقوية ، ذنبه بالغ الطول جثلي الطرف || الذكر منه يتحمل بغفرة كثيفة مستطيلة الشعر تحمقظ الرأس والعتق والصدر ونصف الظهر .



فردوس بيزان



فردوس خنزيري

٢١٧٧٣ - فردوس * لبيور

Lipeurus (S). Lipeure (F).
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة التسناتيات انواعها عديدة جميعها دقيقة. طول اجسامها يراوح بين ١ و ٢ سم . روبروسها مستطيلة ، حليها نحيل وكثيف . اثنائها الى التيرة الطعلاء . تركيب الدجاجيات على اختلاف انواعها فتتباين لانها تفتص الدم .

٢١٧٧٤ - فردون

Chardon (F).

هو الحرفش ، اطليه .



فردوس يمي

٢١٧٧٥ - فرددي

Simien (F). Simian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يتعلق بالفرد .

٢١٧٧٦ - فردديات

Simiens (F). Simians (E).
مرتبة الفرددي وهي حيوانات لينة من الرئيسات . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تقسم الى مجموعتين :

٢١٧٦١ - فردوس الجوانيم ، تمء الجوانيم

Philopterus subflavescens (S). Philoptère des passerseaux (F).

نوع من الفرددي طولوه يراوح بين ١ و ٢ سم . ثوبه الى الصفار الخنطي . جسمه كثيف الحلب الدقيق || يركب الجوانم اغصنها الشروبوات .

٢١٧٦٢ - فردوس احتمام ، تمء احتمام

Columbica columbae (S). Colombicola (F).

نوع من الفرددي طول ذكوره نحو ٢ سم . واناثه ٣ سم . جسمه ورأسه وزبائنه وعليه الى الاستطالة . ثوبه حنطي اللون ، اصفر الموج || يركب الحام على اختلاف انواعه .

٢١٧٦٣ - فردوس الزومج ، تمء الزومج

Degeriella ornata (S). Dégérie ornée (F).

نوع من الفرددي طولوه نحو ٢ سم . رأسه غمريوي الشكل . جسمه يضيى مفلطح . حليه دقيق مستطيل . ثوبه الى الصفرة يعلوه توشيح متعرض اسمر || يركب الزنج وزنج الماء .

٢١٧٦٤ - فردوس النور ، تمء النور

Esthiopertum monile (S). Esthiopertme (F).

نوع من الفرددي يطول نحو ٤ سم . ثوبه الى الحنطي الاسمر . زبائنه غاشدة الاطراف ، حليه صغير القد ، متوسط الكثافة || يركب النور على اختلاف اجناسها وانواعها .

٢١٧٦٥ - فردوماتا

Cardamine amère (F).

هي الحسرة ، اطلبها .

٢١٧٦٦ - فردوس ، فردوس

Papio (S). Papion, Cynocéphale (F). Baboon, Cynocephalus (E).

جنس فرد من فصيلة البهرسيات . انواعه ٩ تتميز بقبحها منظرا وسفالة اخلاقها وديارها وقذارتها واحتياها . اجسامها صمورية ، عضلاتها قوية ، ووبروسها ضخمة ، اغصانها زلقوية الشكل مقطوعة . اذانها صغيرة . قوائمه قصيرة وقوية تمكئها من العدو السريع وتحول دون خفة التسلق . اذانها لاقياسية الشكل والطول || موطنها فسح الاحراج . يعم نصف القارة الافريقية وكامل الجزيرة العربية . تآلف المناطق البويرة تتجنب الاحراج والغابات . تعيش جماعات كبيرة العدد قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحبوب والثار والجذور والحشرات والظاء ويبيض الطير || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢١٧٦٧ - فردوس احتمسة ، فردوس دوجيرة

رباح دوجيري

Papio doguera (S).

Papion doguera (F). Doguera baboon (E).

نوع من القراديع موطنه يمتد من الجفة الى الكنگو . ثوبه الى الصفار الزيتوني ، قوائمه سود . مفرة ذكره عابقة اللون يطولها موج اسمر || يالفت المناطق الجبلية البعيدة عن كل غران . جاعته متوسطة العدد .

٢١٧٦٨ - فردوس بيزان ، بيزان ، ربح

Papio babuin (S). Papion babouin, Babouin (F). Baboon (E).

نوع من القراديع العادم المفرة والكتاب . موطنه الحينة وجوارها . ثوبه الى الصفار الخنطي يمتد عند الظهر ويغير عند الرأس والبلين || يالفت الاماكن القريبة من الحقول المزروعة اغصنها حقول الذرة والدخن || يعيش جماعات تعد بعض العشرات .

من ٤٦ إلى ٤٨ م. رأسها حطلي اللون. عيناه كيرتان. زباناها خطياني. جوشها ويطها الى الحطلي الاسمر الموالج || روشنها الامانيات الى الحطلي الجوزي الموالج تملو مجموعات من الزراكش والازراق الجوزية. روشنها الخلفيان الى الحطلي الاسمر الموالج. اهدائها الى الحطلي الاسمر || لها جبل واحد في الحول. تنشر القراشة في اوائل تموز وتبقى حتى اواخر ايلول. تسهر في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمتدح المكن لعلها على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة تقول نحو ٤٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل يملو في السكة العاشرة تنو هربي. ثوبها الى الخضار الاصفر تملو جده قاطية سوداء يتخللها تنقيط ابيض ويحدها من الجانبين خط اصفر. رأسها اسود يملو تمشيش اصفر. مدهيا ورواجها الى الخضار الدايق || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي في التربة حيث تنغمن السرعة ملتصقة بجلباب من الطين.

٢١٧٨٥ - قُرْس، نَجْرُس، نَقْرُس

Simulium (S), Simulie (F), Simulium (E).
جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة القرسيات تملو الذباب. انواعه عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم. تألف الاساكين الرملية. ذكورها تعيش على الازهار. اناتها لاسمة تمتص الدم.

٢١٧٨٦ - قُرْس اَحْمَر الراس

Simulium erythrocephalum (S).
Simulie à tête rouge (F).
حشرة مؤذية من فصيلة القرسيات. جسمها مستطيل صغير يطول نحو ٤ م. رأسها كبير. عيناه متقاربتان. زباناها اسطوانيان، قصيران. روشنها كيرتان شفافان. رأسها احمر. صدرها الى السرة البنية. يطها اصفر الزام الاول والاخير، بني الزام الثاني والثالث. قوائمها بيضاء. تظهر الحشرة الجلجلة من ايار الى تموز. الذكر يعيش على رقيق الازهار. الانثى لاسمة، ماصة، تهاجم كل حيوان ولا تمتع عن الانسان. تقتحم بنوع خاص الالاف والعين والاذن والوجه.

٢١٧٨٧ - قُرْس الخيل

Simulium equinum (S). Simulie du cheval (F).
نوع من القرس طوله يراوح بين ٢ و ٤ سم. اناته تلصع الدواب انحصا الخيل وقد لا تمتع عن الانسان قترضه وتقله || يكالغ باستمال الا د د ت. واثامها من الادوية التي لا تؤذي الانسان والحيوان.

٢١٧٨٨ - قُرْسَة

Crasatella (S).
Crasatella (F). Crasatella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة القرسليات. انواعها المعروفة تناهر المنة، اكترها من متحجرات الاباج الثاني. انواعها المعاصرة وقدرها نحو ٣٠ تعيش في بحار البلاد الحارة || اصداقها متوسطة الحجم، مخرجة الشكل، ثنائية المصاريح المتساوية. مزخرفة السلوح الخارجية المالة.

٢١٧٨٩ - قُرْسِيَّات

Crasatellidae (S).
Crasatellidae (F). Crasatellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد

مجموعة قردود العالم القديم المعروفة بسفليات المنخرين. ومجموعة قردود العالم الجديد المعروفة بالخمارات او الفطاسيات.

٢١٧٧٧ - قُرْدِيَّات

Cardina (S).
Cardine (F). Cardine (E).
جنس دويبات مائية من القشريات، عشاريات الارجل، طوال الليل، وفصيلة القريدسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد، بعضها نهري يعيش في المياه العذبة وبعضها بحري || اجسامها متوسطة القند. صدرها مستطيل المتك. مؤخرها معتدل الخانة والتبسط. تنصير عمتاشها المغائية الاطراف || اشهر انواعه واكبرها قد القرديس الهندي (C. fossarum) الذي يكثر وجوده في نهر جنس.

٢١٧٧٩ - قُرْدَة

Ochradenus (S). Ochradène (F).
جنس نباتات برية جليلة معمرة من فصيلة الخزاميات. انواعها المعروفة قليلة مدهما بعض مناطق حوض البحر المتوسط. سوقها مشبكة الفروع مستشيكها. اوراقها غريزة النصل او غليظة، قليلة العدد، متباعدة الاوتكاز. ازهارها عادمة القملات. خاسية او سداسية الفص، لا نظامية الاسبدة التي يراوح عددها بين ١٠ و ١٥.

٢١٧٨٠ - قُرْوَح

Atraphaxis (S). Atraphace (F).
الواحدة قرزسة. جنس نباتات جنبية معمرة صغيرة القند من فصيلة البطيانيات. انواعه قليلة. اوراقها بيضية، كاملة، صغيرة، جلدية النصل. فصل ازهارها الداخلية تقول وتتلون بعد التئور || اعرف انواعه ما يلي.

٢١٧٨١ - قُرْوَح سناني

Atraphaxis frutescens (S). Atraphace lancéolé (F).
نوع من القروز وهو جنبية سرطوية سريعة تملو من ١٠ الى ١٥٠ م. اوراقها سنانية الشكل، صغيرة القند، بحرية اللون. ازهارها الى البياض الناصع || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٧٨٢ - قُرْوَح شَالِك

Atraphaxis spinosa (S).
Atraphace épineux (F).
نوع من القروز وهو بجلية سرطوية شائكة تملو نحو ٥٠ سم. ساقها وطرفها غير اللهاء. اوراقها صغيرة القند، سميكة النصل، بحرية اللون، ازهارها وردية || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

٢١٧٨٣ - قُرْوَح شَمَشْدِي

Atraphaxis buxifolia (S). Atraphace à feuilles de buis (F).
نوع من القروز وهو بجلية صغيرة سريعة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها بيضية ششادية الشكل والتسج. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٢١٧٨٤ - قُرْوَزَة هَرْمِيَة

Amphipyra pyramidea (S). Amphipyre pyramidal (F). Amphipyra pyramidea (E).
حشرة من فصيلة السقيات حشرغيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية المناخنة. قراشها واشعة قوتها رقيق الازهار. سرلتها خاضعة تمش على اوراق الاجمار الوريفة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٠ م. بسطها قراوح



قردود



قرديس



قروز



قروزه هرمية



قرس الخيل

مسكها مدرن القشار ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال .
لحمها متوسط الصنف مأكول . ويستخرج من كبدها
زيت مرغوب فيه .



قُرْشِ أَسْهَد

٢١٧٩٤ - قُرْشُ شَالِك * ، كَلْبُ بَحْرٍ شَالِك
Squalus acanthias (S). Aiguillat (F).
Picked dog-fish, Hound-fish, Spiny dog-fish (E).

مسكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي ||
تعتبر من الاسماك البنية . مسرحها الاغواط والثقاف ||
جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٢٠ سم . رأسها مخروطي
الشوذن ، معتدل التبليط ، ذلق الخط المستدير الطرف .
اسنانها ثلاثية الصفوف ، متباينة الاشكال بين الفكين
تكثر فيها الاطراف المشارية الحادة || ثوبها الى العنق
السمره يعلوها موانج ازرق يبق عند الظهر . جانبها الى
الطلحة الموشة بالازرق تنير مع الاقتراب من البطن
الابيض || تتميز بانعدام الزعنفة الشرجية وبالمختص
الصلب القرني المادة الذي يستيق الزعنفة الظهرية الاولى
والثانية || الاثنى متناثرة تقع في فصل الصيف نحو ٧٠
جراً || لحمها قاس ، كثير الالياف ، كامن الصنف .
مسكها مرغوب فيه ويستخرج من كبدها زيت جيد
شائع الاستعمال .



قُرْشُ خَنْزِيرِي



قُرْشُ شَالِك

٢١٧٩٥ - قُرْشَامُ *
Hoplocampa (S).
Hoplocampe (F).

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة المشاريات . انواعه
المعروفة ١٦ جميعها وحيدة الجبل الحولي اثوابها ملوقة
تكثر فيها السورة . رواشها شفاة . رقاتها جارية تركيب
الثار وتعملها || اشهر انواعه واضرها قرشامة التفاح
والاجاص والمخوخ .



قُرْشَامَةُ الْاجَاص

٢١٧٩٦ - قُرْشَامَةُ الْاجَاص *
Hoplocampa brevis (S). Hoplocampe des poires (F).
Pear sawfly (E). Birnensäggespe (D).

حشرة من القرشام طولا براوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها
حنطي اللون تملوه بقع سمر . ارجلها الى الصفار ملوقة
اناثها تمتع الممكن على زهر الاجاص فينتف عن رقات
دقيقة نحيلة تنخر الثمرة عنه بدء تكوينها فتقرض المبيض
وتقرب الانغلاص .



قُرْشَامَةُ التَّفَاح

٢١٧٩٧ - قُرْشَامَةُ التَّفَاح *
Hoplocampa testudina (S). Hoplocampe des pommes (F). Apple sawfly (E). Apfelsäggespe (D).

حشرة من القرشام . طولا براوح بين ٦ و ٧ سم . رأسها
ورزبانها ورجوها الى الصفرة تملوها رقة سوداء . بطنها
اسود اللون ملوكة بالاصفر || رقاتها حنطية لونها الموانج ،
كرمية الرائحة تركيب ثمار التفاح تقتردها سطحيا تحت
القشور ثم تنقبها باتجاه الحزور .



قُرْشَامَةُ الْخَوْخ

٢١٧٩٨ - قُرْشَامَةُ الْخَوْخ *
Hoplocampa minuta (S). Hoplocampe des prunes (F).
Plum sawfly (E). Schwarze Pflaumensäggespe (D).

حشرة من القرشام طولا براوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها الى
السمره السوية . اناثها تمتع الممكن داخل قشور الثار
فينتف عن رقات دقيقة تنابع الثقب والنخر حتى يبلوغ
العجالت .

الحارة || اصداها متشاكسة ، مألوسة ، مزخرفة ، شبه
عمرسة الشكل ، ثنائية المصارع ، عادمة المادة اللؤلؤية ||
اعرف اجناسها واشهرها القرسة .

٢١٧٩٠ - قُرْشِيَّات
Simuliidae (S).
Simuliidés (F). Simuliidae, Sand flies, Buffalo gnats (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد عينة الانتشار . جميعها صغيرة القد طولها
براوح بين ٢ و ٦ مم . اجسامها غليظة الشكل . خلية
المرشاش المستندة ، رؤوسها وجواشها كبيرة . قرونها
الاستعارية قصيرة ، ارجلها قوية ، رواشها شفاة
كبيرة || ذكورها تعيش على رقيق الانهار . اناثها
لاسعة مختص الدم ، لدغها مؤلم يذوي ، لعابها ييج البثرة
وقد يسبب عدة امراض ومجيات تنقلها الحشرات من الاجسام
المریضة الى السليمة .

٢١٧٩١ - قُرْشُ ، كَوْسَج ، لَحْم ، بُهْبَك ،
كَلْبُ الْبَحْرِ
Squales (S).
Requin (F). Shark (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القرشيات . انواعه المعروفة
٣٥ جميعها كبيرة القد مستطيلة الشكل ، مفترسة لا تمر
بشيء الا اقتصته بانسانها الى شطرين .

٢١٧٩٢ - قُرْشُ أَسْهَد *
Centrophorus squamosus (S). Centrophore

squameux, Requin chagrin (F). Porpoise (E).
مسكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الابيض المتوسط . تعتبر من الاسماك البنية .
مسرحها الاغواط والبياج ولا تقترب من الهاجح الا نادرا
جدا || جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٥٠ سم . رأسها
معتدل الجرم ، مستطيل الخطم الذلق . فها سفلي الارتكاز ،
صغير القد ، معتدل الشدق ، متباين الانسان بين الفكين
السلوي والسفلي . ثوبها الى الطلحة السبورية الموانج يسمر
ويبقى عند الظهر ويغير ويبيض عند البطن || تتميز
بمسكها المبعثر السهف اللافياسي الحجم والترتيب وبانعدام
الزعنفة الشرجية وبالمختص الصلب الدرب الذي يتقدم
كل من الزعنفتين الظهريتين || الاثنى متناثرة تقع في فصل
الصيف نحو ٧٠ جراً || مسكها شائع الاستعمال . لحمها
كامن الصنف قل من يرغب فيه . ويستخرج من كبدها
كية من الزيت الجيد .

٢١٧٩٣ - قُرْشُ خَنْزِيرِي *
Oxynotus centrina (S). Centréne, Humantín,

Cochon de mer (F). Seahog (E).

مسكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الابيض المتوسط || تعتبر من الاسماك البنية .
مسرحها الاغواط واعالي الهاجح ولا تشاهد قرب الهاجح
الا نادرا || جسمها شبه وشي الشكل ، مستضخم الخوض ،
يطول نحو ١٢٠ سم . رأسها معتدل الجرم ، مبسط المقدم
والخطم القصير . فها سفلي الارتكاز ، قصير الشدق
العرض ، متباين الانسان بين الفكين السلوي والسفلي .
اعكاسها الخيشوية خامية الفلوج الضيقة . ثوبها الى
الحمرة القريدية تبق عند الظهر وتغير عند البطن .
زعنفاتها الظهرية ثمانية الشكل ، كبريتا القد ||
الاثنى متناثرة تقع في فصل الصيف نحو ٥٠ جراً ||

المتوسطة الارتفاع . ساقه ليفية دقيقة فراء عادمة الاوراق
تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها جلدية الانتشاب متراكبة ،
نصلها متموج الصفحة الجامدة المفروشة الشائكة الانسان .
انزهاره علقية التجميع ، تاجية ، زرقاء اللون || اوراقه
ماكولة وقد تتخلل .

٢١٨٠٨ - قُرْصُفَةٌ *

Cyclostoma (S).
Cyclostome (F). Cyclostoma (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الاجرل وفصيلة
القرصفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في
معظم اقطار العالم || اشهر انواعها القرصفة المحددة
(C. sulcatum) التي يكثر وجودها في معظم مناطق حوض
البحر الابيض المتوسط . صدفها صغيرة ، بطينة ، مخزنية ،
قصيرة العقب ، برتقالية اللون .

٢١٨٠٩ - قُرْصُفِيَّاتٌ *

Cyclostomidae (S).
Cyclostomidés (F). Cyclostomidae (E).
فصيلة حيوانات برية من الرخويات معديات الاجرل
اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها
المعاصرة المعروفة عديدة . جميعها برية تعيش على الارض
في المواقع الرطبة || اصداقها شبه خذروفية الشكل ،
متباينة الخلطة ، صغيرة الاققاب ، اسطوانية الفوهات ،
كلسية الاسقاط || اعرف اجناسها واشهرها القرصفة .

٢١٨١٠ - قُرْصُوعٌ *

Cerianthus (S).
Cériante (F). Cerianthus (E).
جنس حيوانات دنيا من المزهاريات وفصيلة القروسويات .
انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة
والمعتدلة الحرارة || مداخنها لحمية تنشب في رمال القاع
حوالفها مستطيلة ، عصفية الشكل كاوراق التيلليات ||
اشهر انواعها قرصوع المتوسط (Cériante de la Méditerranée).

٢١٨١١ - قُرْصُوعِيَّاتٌ *

Ceriantidae (S).
Cérianthidés (F). Ceriantidae (E).
فصيلة حيوانات دنيا من المزهاريات . اجناسها وانواعها
عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || مداخنها اسطوانية ،
مستطيلة ، عريضة أو مغلفة ، تنتهي بحوائق متعاقبة
اللوامس || اعرف اجناسها واشهرها القرصوع .

٢١٨١٢ - قُرْصِيٌّ

Discoide (F). Discoid (E).
نعت تعريفي توصف به الاجسام القرصية الشكل كالثاير
وغيرها .

٢١٨١٣ - قُرْصِيَّاتٌ

Discomycètes (F).
فصيلة الفطور القرصية تعرف بالخشاريات ، اطليها .

٢١٨١٤ - قُرْصٌ ، تَحَاتٌ

Erosion
اختنا جوف جزء من ثيء سببه العوامل القارضة كالحياه
التي تقرض التربة وتجرفها .

٢١٨١٥ - قُرْصٌ ، عَارِيَةٌ

Prêt (F).
Lending (E).
عقد يدفع به المرء الى غيره متفقاً او عتياً او شيئاً معيناً
ليستعمله زمناً محدداً ثم يرد . فذائع القرص قارض او
معيّر وآخذ مستقرض او مستعير .

٢١٧٩٩ - قُرْشُومٌ

Paederia (S). Pédérie (F).
جنس جنبات عارضة ملتفة معمرة من فصيلة الفويات انواعها
قليلة اصطناعها البلاد الحارة . سورها تطول من ٤ الى ٦ امتار .
اوراقها عابلة منعقة متعاقبة . نصلها بيضي الشكل ، ذات
الزائم الاخير وهو حقل الصفحة السفلى ، كرهه الزائفة
عند اللس . انزهارها عشقودية التجميع ، خلية البشرة ،
كرهية الزائفة ، انابيبها وردية اللون ، ابواقها الى البياض
الاخضر الموحج .

٢١٨٠٠ - قُرْشِيَّاتٌ

Squalidae (S).
Squalidés (F). Squalidae (E).
فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاشلاخ . اجناسها وانواعها
عديدة . اجسامها مستطيلة وشحية الشكل . اخنطامها ذلقة ،
شارقة . اسنانها حادة متشاربة تقطع كل شيء . زعانفها
كبيرة . اعطائها بحار البلاد الحارة وقد تجوب انوار الانهر
المعيقة الغور .

٢١٨٠١ - قُرْصٌ

Gaufre, Rayon (F).
Honeycomb (E).
مجموعة مخاريب السطح الواحد في خلية النحل .

٢١٨٠٢ - قُرْصٌ

Pincement (F). Nipping (E).
هو القتر أي قطع رؤوس الاغصان او الانثان الطرية .

٢١٨٠٣ - قُرْصَاقٌ

Renard corsac (F).
هو الثلب التري ، اطليه .

٢١٨٠٤ - قُرْصَانَةٌ

Myletes (S). Mylète (F).
جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة القرصانيات
انواعها المعروفة خمسة منها نوعان يعيشان في انهر الهند
وسيام وبنيتام ، وثلاثة انواع تعيش في انهر امريكا
الاستوائية || اجسامها متوسطة القد ، بيضية اللون ،
مسطحة ، تطول من ١٨ الى ٢٤ سم . رؤوسها صغيرة .
زعانفها الظهرية كبيرة ورفيعة يتبعها زعنفتان شحمية
صغيرة . زعانفها الشرجية مستطيلة مقعرة . زعانفها الذيلية
منفرجة القوس ، قريبة الشبه بالحلل . اثوابها الى الخصار
الاطحل المتفاوت المآجات || لحوبها مأكولة ، متوسطة
الصفء .

٢١٨٠٥ - قُرْصَانِيَّاتٌ *

Characidae (S).
Characidés, Characinidés (F). Characidae (E).
فصيلة اسماك نهريه من مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة اعطائها انهر وبحيرات المناطق الاستوائية
الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها لاقيايسية
الشكل والقد . حراشفها صغيرة متراكبة . رؤوسها عريضة
فكوكها مرصوفة الاسنان الصغيرة الحادة . زعانفها الظهرية
والذيلية لانفاضة || اعرف اجناسها واشهرها القرصانة
والقردون والمسلين والينفوش والوقوف .

٢١٨٠٦ - قُرْصَةٌ

Scrofolaire du désert (F).
هي خنازيرية الصحراء ، اطليها .

٢١٨٠٧ - قُرْصَعَنَةٌ *

قُرْصَعَنَتِي ، شَوْلُكْ
عَقْرَبَانِي ، شَنْدَابُ الْكَرْبِي

Eryngium creticum (S). Eryngie, Panicut de Crète
(F). Field eryngo (E). Feldmannstren (D). Eringio (I).
نوع من الشنداب وهو نبات عشبي بري يكثر في الجبال



قُرْصَةٌ



قُرْصَةٌ



قُرْصٌ



قرط



قرط موز



قرطب الزرع



قرطب البط



قرطب الدجاج

٢١٨٢٦ - قَرَطُ ، قَرَصُ ، جَئَمُ Pincement (F).
Nipping (E).

قطع رؤوس الاغصان أو الانداد أو الانثان .

٢١٨٢٧ - قَرَطُ مَوْزُ * ، طَرَحُ مَوْزُ

Régime de bananes (F). Bunch of bananas, Cluster of bananas (E).

هو السنبلة الثمرية المشطية المتتابعة المتدلية التي يتألف منها حل الموزة .

٢١٨٢٨ - قَرُطَبُ

Melampyrum (S).

Mélapyre (F).

جنس نباتات برية عشبية حولية من فصيلة الحمازريات. أنواعه ٦ جميعها اشباح منتصبه فناء . أوراقها سنانية او خطية النصل . ازهارها صفراء اللون او بنفسجية . اشهرها واضرها قرطب الزرع .

٢١٨٢٩ - قَرُطَبُ الزَّوَرُ *

Melampyrum arvense (S). Mélapyre des champs, Blé-de-vache, Cornette, Queue de loup, Queue de renard, Rougeole (F). Purple cow-wheat (E). Roter Wachtelweizen (D). Melampiro, Grano di vacca, Coda di volpe (I).

نوع من القرطب يعتبر من النباتات الضارة لانه يكثر في زروع الحنطة فينبش جذوره في جلودها ويقاسمها الغذاء . يزوره الى السرة ، دقيقها احمر اللون مر الطعم .

٢١٨٣٠ - قَرُطَبُ

Ménopon (F). Menopon (E).

جنس حشرات جلدية من فصيلة القرطيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها مؤذية تركب الطير قضيه || اعرف انواعه واضرها الثلاثة التالية .

٢١٨٣١ - قَرُطَبُ الاَوَزِ

Menopon pectinatum (S). Ménopon des oles (F). نوع و القرطب وهو حشرة صغيرة القد طويلا يراوح بين ١ الى ٢ سم . رأسها مستعرض الشكل ، مقر القفص . ثوبها الى الرتبة يعلوها تشويش اشقر . تركب الاوز وتؤذيه .

٢١٨٣٢ - قَرُطَبُ البَطِّ *

Trinoton anserinum (S). Trinoton des canards (F). نوع من القرطب يركب البط فيؤذيه . جسمه الى الرتبة السمره بطول من ٤ الى ٥ سم . رأسه مثليث الزوايا المستديرة . جشته وبطنه متساويان في الطول والشكل ، ترجأت بطه بجفحة بالحظلي .

٢١٨٣٣ - قَرُطَبُ الدَّجَاجِ *

Menopon gallinae (S). Ménopon des poules (F). نوع من القرطب وهو حشرة صغيرة القد طويلا نحو ٢ سم . جسمها اهليجي الشكل ، كيف الحب اللينق . رأسها محدب القفص ، مقر القفص ، رباعي الحب المستطيل . ثوبها الى الرتبة الصفراء المواج || تركب جميع الطيور الداجنة اخصها الدجاج .

٢١٨٣٤ - قَرُطَبِيَّاتُ

Menoponiidae (S).

Ménoponidés (F). Menoponidae (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها صغيرة القد اجسامها مغلطمة ، يبقية الشكل او اهليجية . طويلا يراوح بين ١ و ٦ سم . رؤوسها مستديرة او مثلكة الزوايا . ارساغها مسطعية خادشة .

٢١٨١٦ - قَرِصُ ، سِلْفَةُ Emprunt (F).
Borrowing (E).

عقد تبرم به صفة قانونية يدفع بمقتضاها عادة مبلغ من المال او أي شيء آخر الى أحد طرفيه الذي يصبح مدينا به بشرط يتفق عليها . والقرص اشكال منها :

قرص جبري أو الزامي Emprunt forcé (F).
Forced borrowing (E).

قرص طويل الأجل Emprunt à long terme (F).
Long-dated borrowing (E).

قرص قصير الأجل Emprunt à court terme (F).
Short-dated borrowing (E).

قرص مجدد Emprunt consolidé (F).
Funded borrowing (E).

قرص مقدور الاستهلاك Emprunt amortissable (F).
Redeemable borrowing (E).

٢١٨١٧ - قَرِصُ الْمُعَامَرَةِ

Prêt à la grosse aventure (F). Bottomry lending (E). قرص يسري حل اشياء معرضة لخطر البحر . شرطه انه اذا هلكت هذه الاشياء كلياً او جزئياً كان المقرض في حل من رد مقابل ما هلك منها .

٢١٨١٨ - قَرِصُ يَفَايِدَةٍ Prêt à intérêt (F).
Lending in interest (E).

نوع من انواع الاعارة الا انه يعاقب أي ان المستير يدفع الى المعير فائدة قدرها ما جرى عليه الاتفاق .

٢١٨١٩ - قَرِصُ زِرَاعِي Crédit agricole (F).

هو التسليل الزراعي .

٢١٨٢٠ - قَرِصَابُ

Xérophage (F).

Xerophagous (E).

نعت تعريبي يطلق على الحيوانات والحشرات التي تعيش على المواد الجافة .

٢١٨٢١ - قَرِيبُ

ما يبقى في الغريال رمى به مع الرذالة .

٢١٨٢٢ - قَرِيبُ

قشر الرمان يستعمل في الدباغة .

٢١٨٢٣ - قَرِيشَةُ

القريشة ج . قرشي . « من غريب شجر البر شكك ولوذا زهره اشد صفرة من الورس . قال ابو حنيفة : « القرشي » يتلف بالشجر وينبت في اصل السرة والعرفط وزهره اشد صفرة من الورس وورقه لطاف رقاق » .

٢١٨٢٤ - قَرِظُ * ، ثَوْبُ مَعْصَرُ

Allium schaenoprasum (S). Ciboulette, Cive (F). نبات دوفسي معمر من فصيلة الزنبقيات . فصوصه خلبية الشكل غليظة . اوراقه قرصية الانتشاب . دقيقة ، ضيقة ، جفء النصل ، منتصبه ، تطول نحو ٢٠ سم . شاربجه الزهرية تملو نحو ٣٠ سم . ازهارها حراء اللون ، هامية الانكسار ، صيوائية التجميع .

٢١٨٢٥ - قُرْطُ

Mélilot à petites fleurs (F).

هو الحنطوق الصغير الزهر . نبات مرعوي تنضف الدواب بشوّه .

Panellus (S).

٢١٨٤٢ - قَرْطُوب

Panelle (F). Panellus (E).

جنس فطور من فصيلة السيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد أعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها تتركب جذوع الاشجار واغصانها دون ان تؤذيها. تتميز بسوقها القصيرة وبكثافتها الفارشة، المكفوفة الاطراف، الدبقة او الخملية السطح || اعرف انواعه واشهرها القربوط الحلو والقربوط المشخار.

٢١٨٤٣ - قَرْطُوب حُلُو *
Panellus mitis (S).
Panelle douce (F).

نوع من القربوط. يعيش على جذوع الصنوبر دون ان يؤذيها. مجموعته لا تقتل عن ثلاث وحدات ولا تتجاوز السبع. ساقه شديدة القصير. نكته فارشة لزجة دافئة مكفوفة الاطراف، طحلاء اللون الكاساك، قطرها يراوح من ١ الى ٢ سم. اطراسه دقيقة، هلامية المادة || خيته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٤ - قَرْطُوب مِشْخَار *

Panellus serotinus (S). Panelle tardive (F).

نوع من القربوط. يعيش على جذوع واغصان الاشجار العررة اخضها السنديان. مجموعته تتألف من ثلاث الى خمس وحدات. ساقه شديدة القصير. نكته فارشة، مكفوفة الاطراف، خلية السطح في اول عهدها ثم لزجة. قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الطحلة الصفراء الخضراء المواج || لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٥ - قَرْطُوزَة *
Cortusa (S).

Cortuse (F). Cortusa (E).

نبات عشبي معمر من فصيلة الربيديات. معقود التعريف على اسم العلامة «قربوزي». ينبتا بعض جبال الشرق الاقصى واروپة. اوراقها جذرية الاثناث، معنقة، كبيرة القد، مفصصة ومسننة المختار. ازهارها شبه صيواني التجميع، يتركز على شراخ يرتفع من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها صغيرة القد، وردية اللون، قصيرة المالحق || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢١٨٤٦ - قَرْطُوط *
Euchoreutes (S).

Euchoreute (F).

حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة البير بويجات موطنه يمتد من ايران الى تركستان || جسمه صغير القد. يتميز باستطالة اذنيه وفتحيته الخلفيتين. اما اذنيه فبانع اللون. ثوبه الى الشبهة بعلوها مواج اشجع يسمر في الرأس والظهر ويشقر في الصدر والبطن. ذنبه اسود الزام الاخير الذي ينتهي بالابيض.

٢١٨٤٧ - قَرْط
Acacia arabique (F).

هو السنت العربي الواحدة قرطة.

٢١٨٤٨ - قَرْع
Teigne (F). Tinea (E).

علل جلدية مختلفة تصيب الحيوانات والطيور الداجنة فتقضي على اصوالها وورثها ورشها. اسبابها فطور مجهرية تتركب الجلد وبصل الشعر والريش.

٢١٨٤٩ - قَرْع البَقَر
Teigne des bovins (F).
Cattle tinea (E).

نوع من القرع يركب رؤوس البقر واعانها.

انواعها تختلف باختلاف الانجاس والانواع يكثر فيها الرمادي الاصفر المواج.

٢١٨٣٥ - قَرْطَف بقلة وقيل ثمرة الرث.

٢١٨٣٦ - قَرْطُم، قَرْطُم، احْرِيش، بَهْرَم، بَهْرَمَان، مَرَبَق
Carchamus (S).

Cartame, Cartame (F).

جنس نباتات عشبية وجنية، برية وزراعية، طبية وصيائية من سبط الهبشريات وفصيلة المركبات. انواعه عديدة منها الحولية والمحولة والمعمرة. سوقها منتصبه. اوراقها متعاقبة مستطيلة لا تغل من الحنف. ازهارها نارية اللون، سرفشة التركيب. بزورها مضلعة بيضاء اللون طبية يستخرج منها مادة زيتية تستعمل لعلاج داء المفاصل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢١٨٣٧ - قَرْطُم الصَّبَاغِيْن *، تَرْبَاص، عَصْفُر
Carchamus tinctorius (S). Carthame officinal, C. des teinturiers, Safran bâlard, S. d'Allemagne (F). Safflower, Bastard saffron, False saffron (E). Färber-safflor, Bastardsafran (D). Cartamo officinale, Croco bastardo, Zafferano falso (I).

نوع من القرم الحولي او المحول يزرع للزئسن او لاستخراج القرمطين، مادته الغلاة الصبائية الصفراء اللون. ساقه منتصبه سرسة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه يفيضة الشكل مستطيلة الزام الاخير. نصلها بارز المرق، سن الحافة، قصير الحنف. ازهاره برتقالية اللون ذهبيه المواج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٨٣٨ - قَرْطُم بَرِّي *، قَرْطُم صُوِي، شَوَارِب عَنَتَر
Carchamus lanatus, Kentrophyllum lanatum (S). Carthame laineux, Chardon jaune, Kentrophyllum (F). Woolly safflower, Distaff thistle (E). Wolliges Spornblatt (D). Cartamo lanoso, Ceceprete, Scardicione salvatico (I).

نوع من القرم الحولي البري الطيب. ساقه منتصبه زيا تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. عصارته حراء اللون، كرية الرائحة، جللة الخضاب الزاهي. اوراقه مقشرة، نصلها غدي الصفعة، لرح البشرة. ازهاره الى الصفار البرتقالي. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢١٨٣٩ - قَرْطُم جَنَسِي *
Carchamus arborescens (S). Carthame arborescent (F).

نوع من القرم البروتي المعمر. جنينه تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها خشوشية. اوراقها سنانية مستعرجة القاعدة. نصلها جيل الخضاب الزاهي، سن الحافة الشاذكة. ازهارها الى الصفرة الوردية المواج || ازهاره يستمر طوال شهر آب.

٢١٨٤٠ - قَرْطُمَان
Avoine cultivée (F).

هو الحظراف الزراعي، اطلبه.

٢١٨٤١ - قَرْطُوب
Orang-utan mâle (F).

He orang-utan (E).

ذكر السامي ارتفاعه واقفاً على رجله يراوح بين ١١٨ و ١٢٢ سم.



قَرْطُم الصَّبَاغِيْن



قَرْطُم بَرِّي



قَرْطُوب حُلُو



قَرْطُوب مِشْخَار



قَرْطُوب

٢١٨٥٧ - قَرَعُ طَوِيل * ، ذُبَابٌ ، كَرْتِيبٌ ، ضَرْفٌ

Lagenaria vulgaris (S). Calebasse, Gourde, Bouteille, Courge d'ornement (F). Bottle-gourd, Calabash cucumber (E). Echter Flaschenkürbis (D). Zucca lunga, Z. bottiglia, Z. fiasco (I).

نوع من القَرَع الحلوي ، ضروبه عديدة منها البرية والزراعية المأكولة والتزيينية . سَوْفَ مدادة عارشة . أوراقتها كبيرة القد لا قياسية التفصيص والتفرع . ثماره مختلفة الاشكال والأحجام منها الاسطوانية والمفلطحة والبرصية والقارورية والمردنية ، الخ .



قَرَع اسود البزور

٢١٨٥٨ - قَرَعُ كَبِير * ، يَقْطِينٌ مُضَلَّعٌ

Cucurbita maxima (S). Potiron, Citrouille, Grosse courge (F). Large gourd, Spanish gourd, Winter squash (E). Speisekürbis (D). Popone, Cetrinollo, Zucca potirona (I).

ويدعى قرع حلو وقرع مائل . نوع من القَرَع الزراعي المشهور . ضروبه عديدة أوزنها قدر واشكال ثمارها الصلابة المستديرة المفلطحة التي يراوح قطرها بين ٢٥ و ١٠٠ سم . ووزنها من ٤ الى ٦٠ كيلو . لهاها جامد المكسر عادم الالياف يحوي نحو :

٩٥,٦٠ % من الماء

١٠,٦٠ % من المواد الازوتية

١٢,٠١ % من المواد الدهنية

٦٧,٣٢ % من المواد الاستخلاصية

٢١٨٥٩ - قَرَعُ مَسْكِي * ،

Cucurbita moschata (S). Courge musquée, Carabacette (F). Musky gourd (E). Moschuskürbis, Bismkürbis (D). Cetriolo muschiato (I).

نوع من القَرَع الزراعي الشائع الاستعمال . ضروبه عديدة . سَوْفَ مدادة طويلة . اوراقه مستديرة ، خلية النصل ، لا قياسية التفريغ . ثماره مستطيلة مخنوقة الوسط يبلغ طولها في بعض الضروب نحو ١٠٠ سم . ووزنها ٢٠ كيلو . لهاها اصفر اللون ، قليل الالياف ، مسكي الرائحة .



قَرَع طَوِيل

٢١٨٦٠ - قَرَعَاءُ

Céraste (F).

هي الحاربة من اعشب الحيات .

٢١٨٦١ - قَرَعْبَل

« دوية عريضة مخبضة الظهر والبطن (السان) .

٢١٨٦٢ - قَرَعَةٌ ، يَقْطِينَةٌ

Citrouille, Courge (F). Pumpkin, Gourd (E).

هي ثمرة القَرَع او اليقطين اشكالها واحجامها متباينة تختلف باختلاف النوع .



قَرَع كَبِير

٢١٨٦٣ - قَرَعُوسٌ ، قَرَعُوسٌ ، قَرَعُوشٌ

هو الفالغ جل ذو سنانين .

٢١٨٦٤ - قَرَعِيٌّ

Pépionifère (F). Pepo (E).

نمت وصفي يدل على ما شكله شكل القرع المستدير .



قَرَع مَسْكِي

٢١٨٦٥ - قَرَعِيَّاتٌ ، يَقْطِينِيَّاتٌ

Cucurbitaceae (S). Cucurbitacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعاات . اجناسها واوراها كثيرة العدد . سَوْفَ مدادة او عارشة . اوراقها متعاقبة ، حوالقها مشعبة . ازهارها وريدة المسكن ، خالصة الاكام . ثمارها لياينة مختلفة الاشكال والاحجام . اشهر انواعها القَرَع والبطيخ والشام والخيارد والقضاء والحظلل ، الخ .

٢١٨٥٠ - قَرَعُ الخَيْل

Teigne du cheval (F).

Horsetine (F).

نوع من القَرَع يركب صهوة الفرس وعنه وكفه .

٢١٨٥١ - قَرَعُ الغنم

Teigne du mouton (F).

Sheep tine (E).

نوع من القَرَع يركب الضأن والماعز فيسبب امراض اسوافها وقد يتركز غالباً في اعناقها .

٢١٨٥٢ - قَرَعُ شَهْدِيّ

Teigne faveuse (F).

Tinea favosa (E).

نوع من القَرَع يركب الطير والارانب والسنانير والكلاب .

٢١٨٥٣ - قَرَعٌ ، يَقْطِينٌ

Cucurbita (S).

Courge (F). Gourd (E).

جنس نباتات حولية او معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه عديدة . سَوْفَها مستطيلة مدادة او عارشة . اوراقها متعقبة كبيرة القد متصبية الزناد الاجوف . نصلها قلمي القاعدة لا قياسي التفصيص . حوالقها مشعبة . ازهارها وريدة المسكن ، كبيرة القد ، صفراء اللون . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام || اشهر انواعها الزراعية ، المأكولة الثمار ، ما يتبع .

٢١٨٥٤ - قَرَعُ اسْوَد البزور *

Cucurbita ficifolia (S). Courge à graines noires (F).

نوع من القَرَع الزراعي الممر . ساقه ليفية ، دقيقة ، مستطيلة ، عارشة ، فرعاء . اوراقه خماسية التفصيص ، نصلها عايق الخضار يلو تمشج وتصبح اصفر . ثماره بضية الشكل كالبطيخ قشورها صلبة خضراء اللون تملؤها رقة بيضاء . لهاها ابيض اللون كثير الالياف متوسط تركيبي يشمل :

٩٠,٨٩ % من الماء

٢٢,١٠ % من المواد الدهنية

١٤,٢٣ % من المواد الازوتية

٦,١٤٠٦ % من السليولوز

٩٣,٠٩ % من الرماد

٥٩,٤٠ % من المواد الاستخلاصية

بزوره سوية اللون الاسود لهاها يحوي ما قدره

٨٠,٢٣ % من المواد الدهنية

٩٥,١٨٩ % من المواد الازوتية

٢١٨٥٥ - قَرَعُ الحنثس

Trichosanthe (F).

جنس نباتات عارشة من فصيلة القرعيات . انواعه نحو ٣٠ معظمها حولي وبعضها معمر . اعطائها البلاد الاسيوية الحارة وبعض مناطق استراليا . سَوْفَها عشبية او ليفية مستطيلة . اوراقها كبيرة مقصصة . ازهارها عديدة البتلات . ثمارها وزورها لا قياسية الشكل والحجم . اشهر انواعه القنطار الثمبانية ، الطلها .

٢١٨٥٦ - قَرَعُ رُومِي * ، قَرَعُ مغربيّ ، عَمَامَةٌ

Cucurbita pepo (S). Courge pépion, Giraumon, Courgeron (F). Pumpkin, Gourd (E). Schmuckkürbis (D). Giramonte. Zucca Indiana (I).

نوع من القَرَع الزراعي ضروبه عديدة منها المكور والمستدير والمخيطيل والتعربي والصغير والكبير والمالسي والفصلع والخنجد || لباها ثماره جيد الصنف عسادم الالياف .

المواج . ازهارها عذقي التجميع . محوري وطرفي الارتكاز . ثمارها عنبية ، لاصقة التخت والكم ، لذينة الطعم ، قطرها نحو ١٠ م. || قرفها سمراء اللون . غبراء المواج ، جيدة الصنف . يستخرج منها ومن الاوراق والازهار والثمار طيوب وادهان فاخرة .

٢١٨٧٤ - قَرْفَة كَذَابَة
Fausse cannelle (F).
هي دريس بجلان ، اطليه .

٢١٨٧٥ - قَرْفَة مَلَكَبَار * ، سَادَج
Cinnamomum citriodorum (S). Cannellier de Malabar (F). Malabar cinnamon (E). Malabarischer Zimmetbaum (D). Cannella di Malabar (I).

شجرة زراعية من الافاوية . مهدا بلاد ملبار وقد انتشرت زراعتها في جزر الزانج وغيرها من جزر المحيط الهادي . ثمرتها صغيرة اللد ، فراء . يستخرج منها اجود الطيوب والادهان . اما قرفها فعادية .

٢١٨٧٦ - قَرْفُونِيَّة
هي الغلوبيس الفلسطيني ، اطليه .

٢١٨٧٧ - قَرْفُول *
Caryophyllia (S).
Caryophyllie (F).
جنس حويئات بحرية من الرجان عنفة المدائح ، مستديرة التبرجات المفروسة || اشهر انواعه القرفول الجملي (C. cyanthus) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

٢١٨٧٨ - قَرْفِيَّات
Cannellaceae (S).
Cannellacées (F). Cannellaceae (E).
فئة من فصيلة الغاريات تشمل القرفة والبيلون وغيرها .

٢١٨٧٩ - قَرْفِيَّات
Manidae (S).
Manidés (F). Manidae (E).
فصيلة حيوانات من الدرد اجناسها وانواعها عديدة اعرفها ام قرفة .

٢١٨٨٠ - قَرْق
Gloussement (F). Clucking (E).
صوت الدجاجة عندما تدعو فراخها .

٢١٨٨١ - قَرْق
Liège (F).
هو القلين ، اطليه .

٢١٨٨٢ - قَرْقَب
Mésange (F).
هو القرقف جنس طير من الجواثم .

٢١٨٨٣ - قَرْقَد
Apocyn (F).
هو الخوشان ، اطليه .

٢١٨٨٤ - قَرْقَدَان
Guilmauve jaune (F).
هو الابوتيلين الاسرح ، اطليه .

٢١٨٨٥ - قَرْقَدَن ، قَرْقَدُون ، قَرْقُصُون ،

جَرْدَة سَنَجَابِي
Myoxus (S). Loir (F).
Dormouse (E). Siebenschläfer, Bilch (D).
جنس حيوانات قانسة من فصيلة القرقدييات . انواعها قليلة . اجسامها صغيرة اللد مسطيلة . اناؤها سوية اللون . اذانها جيلات الصفوف . رؤوسها اسنينية الشكل . سالها طويلة قانسة . عيونها كبيرة . اذانها مستديرة رجة . تسرح في الليل . تتسلق الاشجار . قوتها النار والباطوط

٢١٨٦٦ - قَرْف
Ecimage (F).
هو المصف ، اطليه .

٢١٨٦٧ - قَرْف
Ecorce (F). Bark (E).
لحاء الشجر ، وكل قشر قرف ومنه قرف الرمان .

٢١٨٦٨ - قَرْف الزَوَالِد ، قَرْفِيَف
Epamprage (F). Lopping off, Pruning (E).
تقليم الغصينات او السروع الزائدة في الكرومة .

٢١٨٦٩ - قَرْفَة
Brou (F). Husk, Peel (E).
هي غلاف شمال الثمرة قبل جفافه او عند انفصاله بعد تمام الجفاف .

٢١٨٧٠ - قَرْفَة
Cannelle, Cannellier (F).
Cinnamon-tree (E).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من القرفيات وفصيلة الغاريات . انواعه عديدة منهاها البلاد الاسيوية . سوقها منتسبة فراء . اوراقها ابيدة معتقة . ازهارها صغيرة اللد لاقياسية التجميع والارتكاز || جميعها من الافاوية

ازهارها وثمارها واوراقها ولحاء سوقها وروصها وجنودها عطرية للمادة ، لذعة الطعم . يستخرج منها طيوب وادهان طيارة شائعة الاستعمال الطبي . يعي تقيده الملعلة والكبد ، تلبه الاعصاب وتقتشطها وتنهش بها . ومن منافها انها مفادة للتشنج . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٨٧١ - قَرْفَة بَيْضَاء
Cannelle blanche (F).
Canella (E).
هي البيلون ، اطليه .

٢١٨٧٢ - قَرْفَة سَرْدَنِب * ، قَرْفَة سِيلَان ، دَارُصِينِي

Cinnamomum Zeylanicum (S). Cannellier de Ceylan, Cinnamome (F). Common cinnamon tree, Cinnamon (E). Zimmetbaum, Zimmet, Zimmetrinde, Kaneel (D). Cannella, C. del Ceylan, Cinnamon (I).
شجرة زراعية من الافاوية مهدا سرنيديب (سيلان) ساقها منتسبة فراء تملو نحو ١٠ اطار . فروصها متقابلة الانتشاب ، مستقيمة الزوايا ، اوراقها معتقة ، متقابلة ، بيضية الشكل ، ابيدة ؛ نصلها جامد النسيج ، مالمش البشرة . اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى ، ثلاثي المروق الرئيسية || ازهارها صغيرة اللد ، غبراء اللون ، عديدة الاسدية ، سداسية البلات . ازهارها عنقودية التجميع ، تاجي الارتكاز . ثمارها عنبية لاصقة التخت والكم . جمع اعضاء الشجرة عطرية تستخرج منها الطيوب والادهان اما لحاء السوق والفروع فتعتبر من الافاوية الفاخرة الصنف .

٢١٨٧٣ - قَرْفَة صِينِيَّة * ، دَارُصُوص ، سَكِيخَة تَجَب

Cinnamomum obtusifolium, C. cassia (S). Cannellier casse, C. de Chine, C. d'Annam, C. du Tonkin, Laurier casse (F). Chinese cinnamon tree, Cassia tree (E). Kassien Zimmetbaum (D). Cinnamo cassia, Lauro cassia, Cassia lignea (I).
شجرة زراعية من الافاوية . اعضاءها فسيحة الاجزاء تمتد من اللاتم الى الصين وتتشق حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م. عن سطح البحر || ساقها منتسبة تملو من ١٣ الى ١٧ م. اوراقها ابيدة اهليلجية متقابلة معتقة . نصلها جامد الصفحة ، ثلاثي المروق الرئيسية . لونه الى الخضار البحري || ازهارها صغيرة اللد لونها الى البياض الاخضر



قرفة سرنيديب



قرفة صينية



قرفة ملبار



قرفول



قِرْقَفَنُ الْبَلوط



قِرْقَفَنُ شَائِع



قِرْقَس



قِرْقَسَة أَدِيَّة الشَّكَل



قِرْقَسَة التَّوَشُّط



قِرْقَفَنُ الزَّرَق

شديد الصغر، متكاثف الحلب، يطول من ٢ إلى ٣ سم. ثوبها إلى الكلسة. زباناها مطوقان بالاسود والابيض. وروشناها كبيراً القند، متكاثفا الخليل || ظهور الحشرة الجلجلة لا ينقطع طوال السنة، وهي مبولة في كل مكان من الغابات إلى المساكن الملوثة || الاثنى اكبر قدماً من الذكر. تنجع مكنتها في كل مكان مظلم رطب. ينقث المكان بعد متحه بأسبوعين عن قيرقات مستطيلة، بسطلة المقدم والمؤخر، حنطية اللون، حلبيّة الجسد والرأس والشرج || تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال.

٢١٨٩٥ - قِرْقَسَة المُتَوَسِّط *

Phlebotomus papatasi (S).
Phlébotome papatasi (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقسيات. جسمها صغير الجرم، يطول من ٢ إلى ٣ سم. ثوبها إلى الصفار الباهت، خلي القشار. رأسها مخروطي الشكل. خطمها معتدل القند، صدرها بيضي القلب. بطنها اسطواني. زباناها كثيفا الحلب النقي. عيناها صغيرتان. وروشناها كبيرتان، مهيان || تنفجر الحشرة الجلجلة من نيسان إلى تشرين الثاني. تألف جميع المواقع الرطبة والشلطوط الرملية. تسرح في الليل وتختبئ في النهار وراء كل شيء لانه لا تخشى وقع النور || تنجع الاثنى مكنتها في كل مكان مظلم رطب وتحت الانفاض واحجارها. ينقث المكان بعد متحه بمدة ثلث اربع من اسبوعين إلى ثلاثة || البرقة مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل، حلبيّة الجسد. خيزام اللون، سمراء الرأس، يطولها في مؤخرها زوج من الحلب الجلجا المستطيل. تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال.

٢١٨٩٦ - قِرْقَسِيَّات، سَكْبِيَّات

Psychodidae (S). *Psychodidae* (F). *Psychodidae* (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها واوراها عديدة جميعها صغيرة القند زبانا الجسم والرواشن والقرون الاستشعارية || اشهر اجناسها القرقس.

Loir (F).

٢١٨٩٧ - قِرْقَفَنُ

هو القِرْقَفَن، اطبله.

٢١٨٩٨ - قِرْقَف، قِرْقَف، قِرْقَب

Parus (S).

Mésange (F). *Tit* (E).

جنس طير من فصيلة القرقفيات انواعه كثيرة العدد اعطاهما العالم. اجسامها صغيرة القند. مناقيرها مخروطية الشكل، جالس، قصيرة، قوية. اجنحتها متوسطة القند. اذنانها مقطوعة او فارقة. ارسافها صغيرة حبيبية الخلل || تألف الغابات والحدائق. قوتها الحشرات ومكثها وقرقاتها والبروز البرية والثار || اناثها تخضع مرتين في العام، الاولى في نيسان والثانية في تموز. عدد بيض الحفنة يراوح بين ٦ و ١٦ اما الترسيم فيستمر من ١٤ إلى ١٥ يوماً. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

Parus ceruleus (S).

Mésange bleue, *M. azuree* (F). *Blue titmouse* (E).
نوع من القرقف، طوله يراوح بين ١١ و ١٢ سم. ثوبه جميل الالوان. قرة رأسه وجناحاه وذنبه إلى الزرقعة السنجابية يطولها في الجناحين يتبعج ابيض. ظهره زيتوني، بطنه اصفر، في سمراء إلى البياض الناصع. طوق عنقه اسود اللون ازرق المواج || وهو طائر آبد يألف الاحراج والحدائق والجنان.

والجزر والبلندق والكسنة وبيوض العصافير ... || اجسامها اوكان ترتبها بين شقوق الصخور او في صدور الاشجار. اناثها تضع من ٤ إلى ٦ ادراس تبصر وتكتسي بعد اسبوع وترضع نحو الشهر || اعرف انواعه ما يلي.

٢١٨٩٩ - قِرْقَفَنُ الْبَلوط *

Myoxus nitedula (S). *Loir dryade* (F).

نوع من القِرْقَفَن طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ٨. ظهره اريد احمر. بطنه ابيض اغبر || موطنه يمتد من نيج الصجر إلى اربوة. يألف احراج السديان لان ركة قوته البلوط.

٢١٨٩٧ - قِرْقَفَنُ اَنْبِق

Myoxus elegans (S).

Loir élégant (F).

نوع من القِرْقَفَن، موطنه اليابان. طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ٤. ثوبه إلى الصهبة الصنابية يمتد مع اقترابه من نيج الظهر. رأسه جزوي المواج، بطنه وتواليا جرازه إلى الصفره || قوته البار على اختلافها.

٢١٨٩٨ - قِرْقَفَنُ شَائِع *

Myoxus glis (S). *Loir commun* (F).

نوع من القِرْقَفَن. طوله نحو ١٦ سم. وذنبه ١٤. ظهره إلى الصهبة الزبداء يطولها مواج اسود. بطنه وتواليا جرازه إلى البياض الفضي. خداه وصنقه واسفل ذنبه بيض. موطنه يسبح الارياض يمتد من الشرق إلى اطراف اربوة. يوجد في لبنان وسورية.

٢١٨٩٩ - قِرْقَفَنِيَّات، قِرْقَفَنِيَّات

Myoxidae (S). *Myoxidae* (F). *Myoxidae* (E).

فصيلة حيوانات لبونة قافسة من مرتبة قِرْقَفَنِيَّات الشوزب ورتبة القواضم. اجناسها ثلاثة القِرْقَفَن والزغبة والقرفب. موطنها العالم القديم || اجسامها صغيرة القند مستطيلة الشكل والذنب. براطمها العليا مفقوفة، جرازها قصيرة. جميعها شاذرة تسرح في الليل. قوتها البار والحشرات. يابها الششوي يدوم نحو ستة اشهر.

٢١٨٩٠ - قِرْقَفَنِيَّات الشَّوْزَب

مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القواضم تشمل خمس فصائل القِرْقَفَنِيَّات والقالريات والخلديات والجوبيسيات والبريوصيات

٢١٨٩١ - قِرْقَفَنُ قَدَر

هو ابن عرس مثن، اطبله.

٢١٨٩٢ - قِرْقَس

هو الدند البري، اطبله.

٢١٨٩٣ - قِرْقَس *

Phlebotomus (S).

Phlébotome (F).

جنس حشرات من فصيلة القرقفيات. انواعه عديدة جرهما صغيرة القند، طولها يراوح بين ٢ و ٥ سم. اجسامها ورواشنها وروشنا الاستشعارية حلبيّة الغشاء، صفراء اللون، حنطية المواج. اعطاهما البلاد الحارة. ذكورها تعيش على رحيق الازهار والافرازات السكرية النباتية. اناثها تمتص الدم حيثما تستطيع. لسنتها مزججة يقال انها تنقل الحصى الباردة وجبة حلب.

٢١٨٩٤ - قِرْقَسَة اُرْدِيَّة الشَّكَل *

Psychoda phalaenoides (S).

Psychode phalénioide (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقسيات. جسمها

٢١٩٠٨ - قُرُفَاتِيَات

Alcedinidae (S).
Alcedinidae (F). Alcedinidae (E).
فصيلة طير من الجواثم المصصقات الأصابع تتميز بصغر
جرمها وسددة بصرها وسرعة اختطافها. رؤوسها غليظة.
اجسامها ربعة منكشة. مناقيرها قوية مستطيلة ذلقة.
اجنحتها متوسطة القد. أذيانها وأرأسها قصيرة. أثوابها
قزحية الألوان الزاهية || اجناسها وألوانها عديدة تتجمع
الى عمارتين القرليات والمأزوريات.

٢١٩٠٩ - قُرُفَاتِي، قَاتُود

Alcedo (S).
Martin-pêcheur (F). Pied kingfisher, Ceryle rudis (E).
جنس طير من القرليات. أنواعه ٣٠ موطنها العالم. ذكر
في المناطق الحارة والمعتدلة. تتميز باستطالة مناقيرها السود.
اجنحتها متوسطة القد مستدرة. أذيانها وأرأسها قصيرة.
أثوابها قزحية الألوان الزاهية الجميلة || وقد قيل فيه :
طائر حزمون يهوى بأحدى عينيه الى قمر الماء طمعاً في
ما يصيده ويرفع الأخرى حذراً عما يصيبه منه المثل « هو
اسزم او احذر من قري ان رأى خيراً تدل وإن رأى
شراً توله » || وذلك لانه اذا ابصر في الماء ما يستل
يعمله انقض عليه كالسهم المرسل فاصرخ من قمر الماء
وإذا ابصر في الجو كاسر دخل الى البر هرباً بسرعة النبله.
اصرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢١٩١٠ - قُرُفَاتِي أَزْرَق

Alcedo cyanotis (S).
Martin-pêcheur bleuâtre (F).
طائر من القرل. ثوبه الى الزرقه الجميلة الخضراء الملاج.
منقاره اسود. رجلاه الى الجؤرة. موطنه افريقيه القريه.
اخلاقه اخلاق القرل الشائع .

٢١٩١١ - قُرُفَاتِي بَنْغَالِي

Alcedo bengalensis (S).
Martin-pêcheur bengalais (F).
طائر من القرل. ثوبه قزحي اللون المارقة الجمال.
موطنه يمتد من الهند الى اقصى الشرق. ارياشه عزيزه،
ثمينه، مرغوب فيها || اخلاقه اخلاق القرل الشائع .

٢١٩١٢ - قُرُفَاتِي شَالِع * ، قَاتُود شَالِع ، أَبِي

الرَّقْص ، مَلَاعِب ظِلَه

Alcedo ispida (S). Martin-pêcheur vulgaire (F).
Common kingfisher (E).
طائر من القرل. منقاره اسمر. رأسه مرطف. زوره واعل
عنته الى البياض العاجي. يحسره الى الصهبة القاذية.
ظهوره لائزودي. قنته وجناحاه الى الزرقه الخضره الملاج.
صدره وبطنه الى الشهبه الصفعا. ذنبه الى الزرقه المختلفه
الملاج. رجلاه الى الجؤرة || موطنه يمتد من الهند الى
بلاد فارس والشرق الاوسط واروبه وافريقيه الشماليه.
يألت جرف مجاري الماء وصفصاف الصفصاف. قوته
الاسماك والقرقيات والحشرات || اثناء تبيض من ٦
الى ٨ يبيضات تحضنها وحدها من ١٩ الى ٢١ يوماً .

٢١٩١٣ - قُرُفَاتِي قُنْبُرَانِي *

Alcedo cristata (S).
Martin-pêcheur huppé (F).
طائر من القرل. ثوبه قزحي اللون الجميلة. رأسه قزحي
الريش. موطنه افريقيه الشرقيه والشماليه || اخلاقه
اخلاق القرل الشائع .

٢١٩١٤ - قُرُفَاتِيَات

Alcedinini (F).
عمارة طير من القرليات تشمل القرل والقراف وغيث
الماء. جميعها صغيرة الحجم، زاهية الألوان المتراكبة.

٢١٩٠٠ - قُرُفُفُ الْمَقَاصِبِ

Mésange des roseaux (F).
طائر من القرقيات يدعى مسبال، اطلبه.

٢١٩٠١ - قُرُفُفُ قُنْبُرَانِي *

Parus cristatus (S).
Mésange huppée (F).
نوع من القرقت، طوله يراوح بين ١٠ و ١٢ سم. رأسه
قنبري الريش الاسود المنق بالاكيب. ظهوره الى الصهبة
الرمداء. بطنه الى الصهبة الغراء الصفراء الملاج. زوره
اسود، عنته مطوق بالاسود والابيض. يحسره الى البياض
الاغبر تملو رقشة سماء || يألت احراج الصنوبر.

٢١٩٠٢ - قُرُفُفُ كَبِير *

Parus major (S).
Mésange charbonnière, Mésangère (F). Great
titmouse, Ox-eye (E).
نوع من القرقت، طوله يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. ثوبه
متراكب الألوان. ظهوره الى الخضار الزيتي يعلو مواج
اصفر. بطنه الى الصفرة الباهتة يعلو خط قاطب اسود
يمتد من طوق العنق الى اوسط البطن. رأسه وعنته الى السواد
اللامع، يحسره وقنته ببيض، جناحاه وذنبه الى الزرقه
الربادية. قوادمه ببيض الحمار || يألت الحدائق والجنائن
والغابات والأدغال.

نوع من القرقت، طوله يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. ثوبه
متراكب الألوان. ظهوره الى الخضار الزيتي يعلو مواج
اصفر. بطنه الى الصفرة الباهتة يعلو خط قاطب اسود
يمتد من طوق العنق الى اوسط البطن. رأسه وعنته الى السواد
اللامع، يحسره وقنته ببيض، جناحاه وذنبه الى الزرقه
الربادية. قوادمه ببيض الحمار || يألت الحدائق والجنائن
والغابات والأدغال.

٢١٩٠٣ - قُرُفُفَتَه

Fauvette orphée (F).
طائر من اللخلل. الملب دخله غريفة.

٢١٩٠٤ - قُرُفَاتِيَات

Paridae (S).
Paridae (F). Paridae (E).
فصيلة طير من الجواثم الخروطيات المناقير، اجناسها
واراسها كثيرة العدد. اعطائها العالم. معظمها غريه
ذكورها واناثها متشابهة. تعيش على الاشجار. قوتها
الحشرات وبكثها ويرقاتها والثمار والحبوب || تدن في
تجاويف الاشجار وارواق الصنوبر والابنية المهجورة.
اوكنها كروية الشكل تحببها بمهارة وتفرشها بالوبر
والصوف.

٢١٩٠٥ - قُرُفَهَان

Calendule officinale (F).
هو الاذرين الحزني، اطلبه.

٢١٩٠٦ - قُرُفُور *

Pristipoma stridens (S).
Pristipoma strident (F).
سمكة من الشجرم تنتمي الى فصيلة القرقيات. طولها نحو
٥٠ سم. ثوبها الى الكهبة القضييه الملاج. حراشها مهدية.
زعانفها كبيرة، الظهرية مستطيلة شائكة والشرجية فارقة.
يكثر وجوده في المتوسط والبحر الاحمر.

٢١٩٠٧ - قُرُفُوس *

Coriscus rostratus (S).
Sublet groin, Sublet, Sublaire (F).
Coriscus rostratus (E).
سمكة بحرية يبيض من فصيلة الكيديات. اعطائها البحر
الابيض المتوسط. سرسها حشاش المهاد والاعواط ||
جسمها اهليلجي اللون يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. ثوبها
الى الخضار الخشن الملاج يعلو تمشيع وردي واصفر.
راسها مخروطي، ذلق القلم المنقع. زعنفتها الظهرية
مستطيلة تنتهي بمسوى الشرجية. زعنفتها الشبيهة شبه
مقلوبة || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.



قُرُفُفُ قُنْبُرَانِي



قُرُفُفُ كَبِير



قُرُفُور



قُرُفُوس



قُرُفَاتِي أَزْرَق



قُرُفَاتِي شَالِع




قُرُفَاتِي قُنْبُرَانِي



قرمطة البرازيل



قرمزة استرالية



قرمزة البرتقال البيضاء



قرمزة البرتقال السوداء



قرمزة التفاح



قرمزة الثوت

المواج . مكانها غدد الصفحة ابيض اللون يحوي من ٦٠٠ الى ٨٠٠ مكنة قرمزية اللون مزامسة السنف . لها جيلان في الحول، الاول يستمر من اذار الى تموز والثاني من آب الى شباط || تركب الحفصيات والورد والسند والغار واللوبياء والبطاطا || تكافح عند نفث مكن الجليل الاول وذلك في خلال شهر نيسان .

٢١٩٢١ - قُرْمِزِيَّةُ الْبُرْتُقَالِ الْبَيْضَاءُ * . مَغْفِرِيَّةُ الْحَفْصِيَّاتِ الدَّقِيقِيَّةِ ، كُوشَنِيلُ الْبُرْتُقَالِ الْاِيبِضِ

Pseudococcus citri, *Dactylopius citri* (S). *Cochenille blanche de l'oranger*, *C. farineuse de l'oranger* (F). حشرة من القرمزيات . انتاها سمراء اللون ، حراء المواج، يضيء الشكل ، منشارية الخار، تقول من ٦ الى ٣٠ م. جسمها مثنى بمادة دقيقة بيضاء. مكانها يحوي من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكنة صفراء اللون || ايجالها الحولية يراوح بين ٤ و ٥ تركب الحفصيات والكروية والتين والخروبون والصبار ... وهي شديدة الاذى تقضي على الاوراق والاغصان والثمار || مكافحتها صعبة تستلزم عناية خاصة قوامها التطهير بالمناظرات السامة . وقد عر الآا استئصال الحشرات المضادة التي تقضي عليها اغصانها الكريبتولاموس (*Cryptolomus*) .

٢١٩٢٢ - قُرْمِزِيَّةُ الْبُرْتُقَالِ الْسَّوَدَاءُ * ، قُمَّلَّةُ الْبُرْتُقَالِ الْسَّوَدَاءُ ، حَشَرَةٌ قَشْرِيَّةُ الْبُرْتُقَالِ الْسَّوَدَاءُ ، كُوشَنِيلُ الْبُرْتُقَالِ الْسَّوَدَاءُ

Aspidiotus aspidum, *Parlatoria ziziphi* (S). *Cochenille noire de l'oranger*, *Aspidiot de l'oranger* (F). حشرة من القرمزيات . درقها مسطلة الشكل قائمة الزوايا تقول نحو ١ م. ستة خطوط وتعرض نحو ٦ خطوط. ثوبها الى السواد اللامع . مكانها تخرومي الشكل ينجح الخار الايبض يحوي نحو ٣٠ مكنة ريفية الشكل، بنفسجية اللون || ايجالها الحولية من ٢ الى ٣ تركب الحفصيات دون غيرها وهي لا تقرب الثواب ابدأ في حين ان تسميتها العلمية تشير اليه || تكالغ باستعمال مزيج من الزيوت النباتية والبيضاء .

٢١٩٢٣ - قُرْمِزِيَّةُ التَّفَاحِ * ، عَفْثَ حَمَارِي ، مَغْفِرِيَّةُ التَّفَاحِ الْمَدْلَنَةِ ، كُوشَنِيلُ التَّفَاحِ ، كَرْمِيسُ التَّفَاحِ ، دَسْبُوسُ التَّفَاحِ

Lepidosaphes ulmi, *L. ceratoniae*, *Mytilaspis flava*, *M. pomorum*, *Diapsis pomorum* (S). *Cochenille du pommier*, *C. virgule du pommier*, *Kermès virgule*, *Diapsine du pommier* (F). *Mussel scale* (E). حشرة من القرمزيات فاصلية الشكل ، دقيقة . طولا من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى الخفي الابرسم تفشاء مادة شمعية بيضاء . مكانها يحوي من ٤٠٠ الى ٦٠٠ مكنة خطية اللون || يجلبها الحولي واحد وهي تركب التفاح واللاجاص والحوخ والمشمش والجوز والزيتون والازدرخت والحوخ والصنفسا ... تكالغ عل ار نفث المكان وقد يكون ذلك في حزيران .

٢١٩٢٤ - قُرْمِزِيَّةُ الثَّوْتِ * ، قُمَّلَّةُ الثَّوْتِ ، دَسْبُوسُ الثَّوْتِ

Diapsis pentagona, *Pseudolacapsis pentagona* (S). *Cochenille du mûrier*, *Diapsine du mûrier* (F). حشرة من القرمزيات . درقها صابية قفها يراوح من

زورسا غليظة . مناقيرها حادة مستطيلة . ارساغها قصيرة . تألف شطوط البحار ويرف الانهار وضفاف البحيرات . قوتها الاسماك والقشريات والخرشوات || تدفن في افاحيص تحضرها في الامكان الربعية المشرقة على مجاري الماء .

٢١٩١٥ - قُرْم * « نبت كالدب غلظاً وبياضاً نبت في جوف البحر » (السان) .

٢١٩١٦ - قُرْم * الفحل الكريم من الابل الذي ترك للحملة لى يمه حبل ولم يعمل عليه || وقيل السيد العظيم على التشبيه بالفحل . قال المتنبي : ولكننا ندادب سنسك قوماً تراجمت القروم له حقا

٢١٩١٧ - قُرْمَاط * *Curimatus* (S). *Curimate* (F). *Curimatus* (E).

جنس اسماك نهريه من مفتوحات الحافة وفضيلة السلمونيات. انواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . اصطناعها المياه المذبة الامريكية اغصانها امريكية الجنوبية || اجسامها اهلالية الشكل، متوسطة القد . تتميز باصطناعها الحادة الاطراف الدرية القاطعة ويفكرها الخالية من الاسنان || اشهر انواعها قرمطة البرازيل .

٢١٩١٨ - قُرْمَاطَةُ الْبَرَاذِيلِ *

Curimatus laticeps (S). *Curimate à large tête*, *C. du Brésil* (F). *Curimatus laticeps* (E).

نوع من القرمات . مهدا اهر البرازيل وبحيراته وقد شاعت تربيتها في اكثر مسامك العالم لانها سبروتية قليلة التطلبات ، جيدة اللحم || جسمها اهلالي الشون يطول نحو ٣٠ سم . رأسها غزروفي الشكل ، مستعرض القاعدة . ثوبها الى الخضار الغضي يبق مع اقترابه من ثوب الظفر ويغزو عند البطن . زعنفتها الظهرية واحدة شبه شراعية الشكل يثبتها في مؤخر الظهر جذعة ففروية . زعنفتها الشريعية تقابل الجذعة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٢١٩١٩ - قُرْمِزِيَّةٌ ، مَغْفِرِيَّةٌ ، حَشَرَةٌ قَشْرِيَّةٌ ، قُمَّلَّةُ النَّبَاتِ ، كَرْمِيسٌ ، كُوشَنِيلٌ ، مَغْفِرٌ

Cochenille, *Kermès*, *Céroplaste* (F). *Cochineal*, *Kermès* (E). اسم شامل يطلق على مختلف انواع القرمز والمغفر وهي حشرات صغيرة القند تنتمي الى فصيلة المغفرات. تركب الاشجار المثمرة وغيرها من النباتات الزراعية والحرجية فتؤذيها وتوقع بها الاضرار || اعرف انواعها المؤذية ما يلي .

٢١٩٢٠ - قُرْمِزِيَّةٌ أَسْتَرَالِيَّةٌ * ، كُوشَنِيلُ أَسْتَرَالِيٍّ ، إِيْقَتَار

Icerya purchasi, *Pericarya purchasi* (S). *Cochenille australienne*, *Icerya* (F). حشرة من القرمزيات طول الذكر فيها يراوح بين ١ و ٢ م. ثوبه الى الحمرة، جناحاه الى البياض الشفاف . الاثنى تقول من ٤ الى ٥ م. ومكانها يطول من ٣ الى ٤ م. جسمها وردي اللون تفشاء خيوط زغبية شمعية فضية

شعاعية الشكل ، بيضاء اللون . مكانها يحوي نحو ٥٠ مكنة كروية الشكل حطية اللون || جيلها الحولي واحد . تركب افاد وافنان واوراق السديان فتؤذيها وقد تقضي عليها .

٢١٩٢٩ - قرمزية الصبار ، كوشنيل الصبار
Diaspis echinocacti (S). Cochenille des cactées (F).
حشرة من القرمزيات . درقها صابية الشكل قطرها نحو ٢ م . اناتها مستعرة ، مبطلة ، ثوبها الى الحفرة السوداء . ايجالها الحولية ثلاثة . تركب نباتات الصبار على اختلاف اجناسها وانواعها || تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة على عدة دفعات متتالية فترتها تراوح من ١٠ الى ١٢ يوما .

٢١٩٣٠ - قرمزية القرونوس
Eulecanium corni (S). Lecanium du cornouiller, Cochenille du cornouiller (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات . انثاء بيضية الشكل مبطلة ، طولها نحو ٦ م . وتعرض ٤ م . ثوبها الى الجوة الالام . زياها سباحية الفواصل . مكانها يحوي من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة تنفخ بعد متعها باسبوسين اذا كان ذلك في حزيران او في تموز || وهي من الحشرات البهية المؤذية . تركب القرونوس والكروية والخوخ والدارق والجوز والبنق والورد والسديان والليمونة . تصطب الانثاء وتبيض الثمار وتسبب العثان || تكافح في الشتاء باستعمال سائل الكروبيتل المركز من ٤ الى ٥ ٪ وتكافح في الصيف من تموز الى آب باستعمال مركبات الباراثيون او احد الحواشير الفعالة او الزيوت البيضاء المركزة من ١ الى ٢ ٪ على ان يتجه النضج من اسفل الى اعل ليم جميع صفحات الاوراق السفلى .

٢١٩٣١ - قرمزية الكرم القبراء ، كوشنيل الكرم القبراء
Heliooccus hystrix, Phenacoccus hystrix (S). Cochenille farineuse de la vigne (F).
حشرة من القرمزيات . طولها نحو ٤ م . لونها وردي . زفها الشمعي يلحف الظهر دون سواء . مكانها وشعي يحوي من ٤٠ الى ٦٠ مكنة رقيقة الشكل حمر اللون . ايجالها الحولية ثلاثة . تركب الكرمة والعنب .

٢١٩٣٢ - قرمزية الكرمة البيضاء ، دمة بيشة
Dactylopius vitis (S).
Cochenille blanche de la vigne (F).
حشرة من القرمزيات . جسمها بيضي مفلطح . ذكرها مجنح يطول نحو ١ م . لونه الى الصفرة . انثاء عديمة الجناح ، تطول نحو ٤ م . لها الى الجوة الصفراء . تفرز مادة شمعية بيضاء اللون تنشها بكاملها . تمتع مكها على صفحة النصل السفلي في خلال حزيران فينتفخ من رقات همة تمحص عصارة الاوراق ولا تغف عن العنب . ثم تقضي حياتها الشري في شقوق لها الجوة وعند انتفاخها الجدر في التربة || تكافح بكشط الحاء القديمة اليابسة وبطرش الجدر بماء الكلس او بسائل سلفات الحديد المحلل ١٠ ٪

٢١٩٣٣ - قرمزية الكرمة الحمراء ، قرمزية الكرم الطوطية ، كوشنيل طوطي
Pulvinaria vitis (S). Cochenille floconneuse de la vigne, C. rouge de la vigne (F). Grape scale (E). Wollige Rebenschildlaus (D).
حشرة من القرمزيات . درقها بيضية الشكل تطول من ٤ الى

٢ م . ويطول الى ٢ م . واربعه خطوط . ثوبها الى البياض الاخير . الذكر يطول نحو ١ م . وخسة خطوط وهو يرتقالي اللون ، وشفاف الجناح . سريع الحركة . الانثى مستعرة الشكل ، صفراء اللون . ايجالها الحولية ثلاثة . مكها اصفر اللون تتمتع على السوق والاصغان والافنان ابتداء من اواخر نيسان فينتفخ ابتداء من اواخر ايار || تركب الثوب والدارق والشمش والوز والكشمش واليابسين والصفصاف || تكافح باستعمال الحشرات المفادة او بعض الحواشير الفعالة اخصها المواكين الشوية كالزيوت النباتية المركزة بمعدل ٢ ٪ .

٢١٩٢٥ - قرمزية الحمضيات ، وعف الحمضيات ، وعف ارجواني

Lepidosaphes citricola, L. pinnaeformis (S). Cochenille virgule des oranges (F).
حشرة من القرمزيات . درقها مبيدة الشكل ثوبها الى السرة . حثارها اغبر ، غلافها شمعي للمادة خلي التركيب . طولها يراوح من ٢ م . وخسة خطوط الى ٤ م . وخسة خطوط . عرضها نحو ٢ م . مكانها مستطيل الشكل . يحوي من ٣٠٠ الى ٤٠٠ مكنة وشعية الشكل حطية اللون . ايجالها الحولية تراوح من ثلاثة الى اربعة . تركب اوراق افنان وثمار الحمضيات اخصها البرتقال واليوسفي وليومون الجنة || تكافح باستعمال الغازات السامة لان الحواشير والزيوت البيضاء لا تقضي عليها تماما نظرا لكثرة وجودها على صفحات الاوراق العليا .

٢١٩٢٦ - قرمزية الخرنوب ، كوشنيل الخرنوب
Chionaspis ceratoniae (S).
Cochenille du caroubier (F).
حشرة من القرمزيات ، اجاصية الشكل مفلطحة . الذكر عاجي اللون طوله نحو ١ م . الانثى يرتقالية اللون تطول نحو ٣ م || يقال ان جيلها الحولي واحد ، تركب اوراق الخرنوب والدغل والزيتون || تكافح باستعمال الزيوت النباتية والبيضاء .

٢١٩٢٧ - قرمزية الزيتون السوداء ، لبودة الزيتون المخططة ، كرميس الزيتون
Saissetia oleae, Lecanium oleae (S). Cochenille noire de l'olivier, Lécane de l'olivier, Kermès de l'olivier (F).
حشرة من القرمزيات . درقها بيضية الشكل تطول من ٢ الى ٤ م . وتعرض من ٢ الى ٣ ثوبها الى السرة الفسجية . مكانها مكور الشكل يحوي من ١٠٠٠ الى ١٦٠٠ مكنة رقيقة ، حطية اللون || جيلها الحولي واحد . تمتع مكها ابتداء من ايار ويستمر الى اواخر تموز . اما التفت فينتدق بعد المتع بنحو ثلاثة اسابيع || تركب الزيتون والحمضيات والدفليات واليوكاس ... فتسبب العثان الاسود بالإضافة الى اضرارها || تكافح باستعمال الحشرات المفادة او الزيوت الشوية البيضاء او الحواشير الفعالة الصيفية .

٢١٩٢٨ - قرمزية السديان ، كرميس السديان
Lecanium ilicis (S).
Cochenille du chêne vert, Lécane du chêne vert, Kermès du chêne (F).
حشرة من القرمزيات . درقها مستدرة ، سودا القرمص ، صفراء الجسم ، مرتفعة الختان تحقوه مادة شمعية لزجة ،



قرمزية الحمضيات



قرمزية الخرنوب




قرمزية الزيتون السوداء



قرمزية الكرم القبراء



قرمزية الكرمة البيضاء



قرمزية الكرمة الحمراء



قمرية اللوز



قمرية النخيل



قمرية الورد



قمرية فناكة



قمرية قمره



قمرود

باستعمال احد الحواشير الفعالة موزعاً بالزيت الابيض .
وقد تجري لمكافحة على عدة مرات ابتداء من زمن القملة .

٢١٩٣٨ - قمرية قمره * ، مقبرية مذنية ، وعف صيني

Lepidosaphes gloweri (S). *Serpette* (F).

حشرة من القمريات . مقضية الشكل سمراء الثوب طولها
ينبتسب من ٣ م . الى ٣ م . وخمسة خطوط ، بينها عرضها
من خطين الى ثلاثة خطوط غشاء بطنها شمعي المادة ،
نخيل النسيج ، ابيض اللون . مكنتها يحوي نحو ٢٠٠
مكنة رقيقة الشكل ، وردية اللون || ابيها الحولية
ثلاثة . تركب اوراق الحنفيات والكاميلية . تكافح
مكافحة قمرية الحنفيات .

٢١٩٣٩ - قمرية قمره ، مقبرية ، كرميات Coccidae (S). Coccidae (F). Coccidae, Scale Insects (E). Schildläuse (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الانجثة . اجتماعها
وانواعها كثيرة المدد جنبها فصيلة اللد ، مزدوجة الشكل ،
لا نظامية التناسل منها البيوضة والبيضة والسرولة || ذكورها
مستطيلة الشكل مجنحة . اجتماعها شائعة ، ثنائية العروق
القائمة . اناتها عادمة الجناح ، مستعرة مبطلة . وروسيها
وجواشها مندخمة ، متاكها ثاقبة ماصة . قوائمها قصيرة ،
ارباعها وسيدة المقلدة ، مقاطها فردية ، مدبية . اغشية
اجسادها غدية تفرز بعض المواد الزاكية كالشمع والصلع
واللغن والحرير وما اشبه || اشهر اقسامها القمريات والكاميلية .

٢١٩٤٠ - قمريل Chameaux (F). Camels (F).

الابل الصغار الكثيرة الاوبار ذات السنامين .

٢١٩٤١ - قمرية Capselle (F).

نبات عشبي بري يلقى كيس الراسي . اطبله . ج . قمريل .

٢١٩٤٢ - قمرود * Tragelaphus selousi (S).

Tragelaphe de Selous (F). *Sitatunga* (E).

نوع من الجبل قدره قدر الغلب . ثوبه اشبه احمر يعلو
تجانب وتقيج || يألث المنافع ويقيم كئاسه بقرها .
ج . قراميد . والاني قمرية .

٢١٩٤٣ - قمرود ، أفحوص Nid en terre (F). Nest in land (E).

وكر الطائر حيث يفحص في الارض .

٢١٩٤٤ - قمرود * ، سلور النيل Clarias anguillaris (S). *Clarias commun*, C. du Nil (F). Common catfish (E).

نوع من السلور يكثر ويسود في النيل وهو قريب الشبه
بالنكليس الا انه مفلطح الرأس . طوله نحو ٦٠ سم .
ثوبه الى السمرة الزيتونية يعلو موج اخضر || لحمه
عادي الصنف والمذاق .

٢١٩٤٥ - قمرية Bouquetin femelle (F). She ibex (E).

هي انثى الوط . ج . قراميد .

٢١٩٤٦ - قمرية Tuile (F). Tile (E).

صفيحة من الصلصال الجادة او المصنع المشوي .

٢١٩٤٧ - قرن Accouplage, Accouplement, Attelage (F). Coupling, Harnessing, Yoking (E).

هو شد او ربط البهائم للحرث او للجر ...

ه . م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السمرة العافية .
مكنتها كبير القد طولي المادة اللصقة البيضاء يحوي
من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة رقيقة الشكل ، سمراء اللون ،
جذوية المواج || جيلها الحولي واحد . تنجح مكنتها من
اواخر ايار الى اواخر تموز فينتفخ في تموز وآب .
تركب الكرمة والنيل والثلث . تكافح كثيرا من القمريات
باستعمال احد الحواشير الفعالة .

٢١٩٣٤ - قمرية اللوز * ، كوشيل اللوز Lecanium amygdali (S). Cochenille de l'amygdier, Lécane de l'amandier (F).

حشرة من القمريات . مستدرة الشكل قطرها نحو ١ م .
ورقة خطوط . ثوبها الى الرمادي . افرازها لزج اسمر .
مكنتها مركزي ، اطحل اللون ، يحوي نحو ٢٠٠ مكنة
ورقية الشكل ، حنطية اللون || جيلها الحولي واحد .
تركب اثنان واربعة جميع الاشجار اللوزية اخضرها اللوز .
تكافح في الشتاء باستعمال مزيج من الزيت الابيض والنيانبي
المركب بمعدل ٢٪ .

٢١٩٣٥ - قمرية النخيل * ، وزمة النخيل كوشيل النخيل

Parlatoria blanchardi, *Websteriella blanchardi* (S).

Cochenille du dattier (F).

حشرة من القمريات . اعطائها تشمل نخيل العالم . الذكر
دقيق نخيل ابيض اللون يطول نحو ١ م . الانثى بنفسجية
اللون رمعية الشكل تطول نحو ١ م وثلاثة خطوط .
ردتها سمراء اللون يحويها حاد من الرزب شمعي المادة اطحل
اللون . مكنتها يحوي من ٤٠ الى ٨٠ مكنة كروية
الشكل وردية اللون || ابيها الحولية ثلاثة او اربعة .
تركب نخوص النخيل فتؤذي اشد الاذى || تكافح
باستعمال الزيوت النباتية او بعض الحواشير الفعالة المجربة .

٢١٩٣٦ - قمرية الورد * ، ديسوس الورد قملة الورد ، كرميس الورد ، كوشيل الورد

Diaspis rosae, *Aulacaspis rosae* (S). *Cochenille du
rosier*, *Diaspis du rosier*, *Kermes du rosier*, *Pou
du rosier* (F).

حشرة من القمريات . ردتها صاجية الشكل قطرها اراوح
من ٢ الى ٣ م . ثوبها الى الجوزة حادها ابيض . الذكر
خري اللون . ابيض الجناح ، يطول نحو ١ م . الانثى
مستطيلة الشكل حراء اللون . مكنتها جراب مستعرض
يحوي نحو ١٠٠ مكنة رقيقة الشكل خرية اللون || جيلها
الحولي واحد . تركب الورد والرموس . تكافح باستعمال
الزيوت البيضاء مزوجة بالزيوت النباتية بمعدل ١,٥ ٪ .

٢١٩٣٧ - قمرية قناكة * ، قملة سنان جوزة ، كوشيل سنان جوزة

Aonidiella perniciososa, *Aspidiotus perniciosus*, *Quadrasipterus perniciosus* (S). *Pou de San José*,
Cochenille de San José (F).

حشرة من القمريات . ردتها صاجية الشكل قطرها نحو ٢ م .
ثوبها الى الرمادي الاسمر تملو رقة بيضاء . الانثى سرلوة
سمراء اللون ، حنطية المواج تنفخ بطرف سنة اربع
ما قدره ٤٠٠ رقة || ابيها الحولية تراوح من ٣ الى ٤
تركب التفاح والاباصم والدراق والخوخ والمشمش
والكرز والصبرية والقرنوس والورد ... || تتركز على
سوق وافصاف وزروع النبات حيث تنحصر السبع || تكافح

حيات سامة من فصيلة الافاعي لها نتوان صغيران في رأسها كأنهما قرنان . أنواعها اربعة جميعها خبيثة تسرح في الليل . موطنها الصحاري من مراکش الى جنوب الهند . تكثر في تونس وليبيا ومصر والجزيرة العربية حيث تنس في الرمل فاذا مر بها احد لدغته || انواعها : ابن قرة ، حادية ، قرناء مصرية ، قصرى .

٢١٩٥٦ - قَرْنَبُوش *Lotier cultivé (F).*
هو اصابع العروس ، راجمه .

٢١٩٥٧ - قَرْنَبِي *Capricorne, Longicorne (F). Longicorn, Long horned beetle (E).*
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . انواعه كثيرة العدد تتميز باجسامها الكبيرة القلدة المدببة الظهر وبجرارمها وقرونها الاستشعارية المستطيلة . قال الاخطل يصف جارية ويعلها :

الا يا عباد الله قلبي ممتع
ياحسن من صل واتجهم بعل
ينام اذا ناست حل عكناها
ويلم فساداً كالسلافة او احل
يدب الى احشائها كل ليلة
دييب القرني بات يعلو نقاً سهلا

٢١٩٥٨ - قَرْنَبِي الدُّب * *Xystrocera globosa (S). Xystrocère globuleux (F).*
حشرة من القرنبيات . رفيعة الشكل ، ممددة الظهر . طولها نحو ٢٢ م . ثوبها الى البني تشوبه حرة قائمة واخاذيد خضرة تملو الاغداد || يرقاتها تركب الدلب والنسب والليخ فتختر السوق وتمطلها .

٢١٩٥٩ - قَرْنَبِي السنديان * *Cerambyx cerdo (S). Capricorne (le grand), Capricorne du chêne (F). Great capricorn beetle (E). Grosser Eichenbock (D).*
حشرة من القرنبيات . طولها ٥٠ م . ثوبها الى السمرة ، ماجتها حنطية لامة . زباناها مستطيلة . تسرح عند الغروب || يرقاتها كبيرة القلدة تعيش اربع سنوات داخل السرايد التي تحفرها في خشب السنديان .

٢١٩٦٠ - قَرْنَبِي الصَّفَصاف * ، لاميَّة الصَّفَصاف *Lamia textor (S). Lamie des saules (F).*

حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٧ م . ثوبها الى البودا الفضي || يرقاتها نحيلة القلدة تركب جذوع وسوق الصفصاف والودور فتسرد وتطمطلها .

٢١٩٦١ - قَرْنَبِي صَغِيرَة * *Cerambyx scopolii (S). Capricorne (le petit), Capricorn beetle (E). Buchenbock (D).*
حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٢ م . ثوبها الى السمرة الداكنة . تعيش على ازهار الورديات والطيخيات والبلسان . تسرح في النهار || يرقاتها تركب سرق الاشجار المرجية ولا تمتع عن الاشجار المثمرة اعصها التفاح والكرز واللين .

٢١٩٦٢ - قَرْنَبِي مِسْكِيَّة *Aromie musquée*
هي الاروية المسكية ، اطلبا .

٢١٩٤٨ - قَرْن - هو السفة ، اطلبا .

٢١٩٤٩ - قَرْن *Corne (F). Horn (E).*
ج قرن . والقرن بوارز قاسية مختلفة الاجسام والاشكال تنشأ على رؤوس بعض الحيوانات كالبقير والغنم والظباء والماعز وغيرها ...

٢١٩٥٠ - قَرْن اسْتِشْعَارِي ، زُبَانِي ، زُبَان *Antenna (F). Antenna (E).*
عضو مفصل متحرك شكله كالقرن يكون في رأس الحشرات وبعض الحيوانات الدنيا . وهما قرنان وزبانيان تستعملهما الحشرات للحس كما في الجراد او الشوك في الذباب او للسمع كما في البومض او للتفاهم كما في النمل || والقرن الاستشعارية عديدة الاشكال مختلفة الاجسام والتركيب وقد وضع لكل شكل منها كلمة تعريف خاصة . اشهرها :
ارنسي *Aristée (F). Aristate (E).*
عيطي *Filiforme (F). Filiform (E).*
راسي *Capitulée (F). Capitata (E).*
رليتي *Pennée (F). Pinnate (E).*
شوكي *Sétacée (F). Setaceous (E).*
صيني *Lamellée (F). Lamellar, Scaly (E).*
صوياني ، صي *Calviforme (F). Calviform (E).*
قلادي ، سبيحي *Moniliforme (F). Moniliform (E).*
غزاري *Stylée (F). Stylate (E).*
مرفقي *Coudée (F). Bent (E).*
مشطي ، عالي *Pectinée (F). Pectinate (E).*
مشطي مزدوج *Bipectinée (F). Bipectinate (E).*
منشاري *Serrulée (F). Serrate (E).*

٢١٩٥١ - قَرْن الأَرُوس *Platycerium bifurcatum (S). Platycerium à cornes d'élan (F). Common staghorn fern, Elk's horn fern (E). Gewelhfarn (D). Alcidorne (I).*
نبات عشبي يساهي بمعر من السرخسيات يزرع للزينة . اوراقه قرصية الانتشاب ، فستقية اللون ، حنطية الفلج ، منشبة كقرون الاروس .

٢١٩٥٢ - قَرْن الأَكَل *Coronope (F).*
هو لسان الحمل القرني ، اطلبه .

٢١٩٥٣ - قَرْن الغَرَال *Lotier corniculé (F).*
هو اللولس القرني ، اطلبه .

٢١٩٥٤ - قَرْنَاء *Ceratocephalus (S). Cératocephale (F).*

جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية من فصيلة الشقيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جبال البلاد المتدلة الحارة من الشرق الاذن || سوقها قصيرة فروع . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، كفية ، مقرونة ومشرقة . ازغورها صغيرة صفراء اللون ، خماسية التركيب ، قليلة الاسدية ، مفترية ، يجرسها النحل || تنويعها رديمي || اشهر انواعها القراء المبذلة والمنجلية .

٢١٩٥٥ - قَرْنَاء * ، حَرِيْش *Cerastes (S). Céraste (F). Ceraste, Horned viper (E).*
ويدعوها مقردة وذات القرنين وذات الزبطين . جنس



قرومط



قرناء



قرني الدلب



قرني السنديان



قرني الصفصاف



قرني الصفصاف



قرني صغيرة



قرني صغيرة

الى ٤٠ سم. أوراقه شديدة الخضار، خالصة العروق. ازهاره الى الحمرة الزنجفيرية، كأسها تطول نحو ٢٥ سم. وقطر بتلاتها ايضا || ازهاره يستمر من تموز الى آب.



قَرْنُفُلُ

٢١٩٦٩ - قَرْنُفُلُ أَرْمِيرِيَّة *

Dianthus armeria (S). *Æillet velu*, *O. armeria* (F). *Armeria pink*, *Deftord pink* (E). *Rauhe Nelke* (D). *Armeria*, *Garofano peloso*, *Viola da lepre* (I).

نوع من القرنفل ضروبوه وهما جلعدي، سوقها فروع خلية تملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. أوراقها الجلعدية خضبة مستطيلة. أوراقك سوقها وفروعها أقصر من سلاحياتها، نصلها ثلاثية العروق، بحرية اللون. ازهارها صغيرة القد، وبيدة، ملونة الرقعة || يرغب، مع سائر ضروبوه، في الاتربة الرملية. ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.



قَرْنُفُلِ احمر زنجفيري

٢١٩٧٠ - قَرْنُفُلُ أَزْرَق

Dianthus caesius, *D. gratianopolitanus* (S). *Æillet bleuté* (F).

نوع من القرنفل ساقه فروع مسطحة. أوراقه قصيرة بحرية اللون، نصلها مسن الحافة، ثلاثي العروق. ازهاره عطرية العرف؛ بتلاتها وبيدة اللون، مسنة الخواص الخارجية، قطرها يتفرج من ٢٠ الى ٢٥ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٢١٩٧١ - قَرْنُفُلُ أَسْفَق

Dianthus ferrugineus (S). *Æillet ferrugineux* (F).

نوع من القرنفل مهد ايطاليا. ساقه منتصبه فروع تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقه الجلعدية ضيقة. أوراقه الساقية والقرعية أقصر من السلاحيات؛ نصلها عايق الخضار البحري || ازهاره صغيرة القد؛ بتلاتها ثنائية التفصيص، ثلاثية التسنين، صفراء الصفحات الخارجية، سمر الداخلية، سفح المواج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.



قَرْنُفُلِ ارميرية

٢١٩٧٢ - قَرْنُفُلُ البَلْشَكان، قَرْنُفُلُ بَنَيسِي

Dianthus Panceli (S). *Æillet de Pancel* (F).

نوع من القرنفل مهد البلقان. ساقه فروع تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقه خيطية، ضيقة؛ نصلها مالمس البشرة، سيمك الصفحة، بحري اللون. ازهاره صغيرة القد، مستطيلة الكأس، أرجوانية اللون، سمر المواج. ازهاره يستمر من حزيران الى آب.



قَرْنُفُلِ الزَّهَّارَيْنِ

٢١٩٧٣ - قَرْنُفُلُ الرِّمَالِ

Dianthus arenarius (S). *Æillet des sables* (F).

نوع من القرنفل منته الرمال. ساقه قليلة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٥ سم. أوراقه قصيرة النصل الضيق الاخضر. ازهاره فردية التجمع، متوسطة القد، بتلاتها الى البياض الناصع تملو شمة وسطى خضراء || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢١٩٧٤ - قَرْنُفُلُ الزَّهَّارَيْنِ *

Dianthus caryophyllus (S). *Æillet des fleuristes*, *O. flamand*, *O. remontant*, *O. perpétuel*, *O. fantaisie* (F). *Carnation*, *Clove pink*, *Picotee* (E). *Gartennelke*, *Gartennelken gefüllte*, *Nelke* (D). *Garofano dei fioristi*, *G. scempro* (I).

نوع من القرنفل التزييني المشهور. ضروبوه وامراره كثيرة العدد. سوقها فروع. أوراقها بحرية، نصلها جاند الصفحة. ازهارها مكسية، فواحة العرف العطري،

٢١٩٦٣ - قَرْنُفُلَات، زُعْفُفَات

Cerambycidae (S). *Cérámbycidés*, *Capricornes*, *Longicornes* (F). *Cerambycidae*, *Longicorns*, *Long-horned beetles* (E). *Bockkäfer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غديات الجناح، عماراتها واجناتها وانواعها تعد نحو ٢٠ ألف. اجسامها مستطيلة، اشكالها مختلفة، اطولها تمتد من ١٠ الى ٨٠ م. اثنائها عديدة الالوان. قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فاصلة وهي في الذكر اطول ما هي عليه في الاناث. ارساها خاسية اما تيمو كاتها رباعية لان خاسها صدير القد لاسمى الارتكاز. غناها حادة. تطير في الليل او في النهار. قوتها الازهار وجميع المواد النباتية. جيلها يمتد من سنتين الى اربع سنوات. مكنتها لاقياسي الشكل، اصفر اللون، تمتصه الانثى في لحاء النبات او تحت قشوره او ترزه في التربة قرب الجذوع || رقاتها مردنية الشكل، غليظة الرووس والمنطقة الصدرية، تحلة الاطراف والمنطقة الشرجية. قوتها المواد اللينة والخشبية، تسردب الافانذ والفروع والقصون والنوق والجذوع والجذور. حورياتها تلتمس بغشاة خشنة تصنعها من فتات الخشب المعجون بالاروال في آخر سرداب حفرته عند آخر السلاخ.

٢١٩٦٤ - قَرْنُفِلُط *، قَرْنُفِلُط

Brassica oleracea botrytis (S). *Chou-fleur* (F). *Cauliflower* (E). *Blumenkohl* (D). *Cavolfiore*, *Cavolflore* (I).

بقلة زراعية حولية شائعة الاستعمال من فصيلة الصليبيات. ترغب في الاتربة المسفوة التركيب الحكسي، المعتدلة الاندماج، المعيفة الغور، الغنية بالمواد الازوتية والمضوية. تتكاثر بالبرزر. تنقل الشتول من الاكواد الى المستقر عند بلده نشوء المادة اللينة وتفرس على ابعاد تراوح من ٦٠ الى ٧٠ سم.

٢١٩٦٥ - قَرْنُود

Corindon (F). *Corundum* (E). حجر من اللوين الصوف وهو اصطب الاجسام بعبد للماس. انواعه عديدة منها الحجارة الكريمة كالسفير. كسره يستعمل في صيغ المادن.

٢١٩٦٦ - قَرْنُوسَة

Mue des oiseaux de proie (F). *Moulting* (E).

القرنة زين تحبير الريش عند الجوارح.

٢١٩٦٧ - قَرْنُفُل

Dianthus (S). *Æillet* (F).

Pink (E). *Nelke*, *Sommernelke* (D). *Garofano* (I). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات. انواعه البرية والزراعية نحو ٨٠٠ اما ضروبوه المشهورة فزهاء ٥٠٠ جيمها زراعية تزيينية. سوقها عقدية فروع. اوراقها خاضنة متقابلة. نصلها سنائي الشكل ثغين الصفحة البحرية اللون. ازهارها بجلة الشكل، تاجية الارتكاز، مختلفة التجمع والالوان؛ عطرية العرف الفواح. بزورها صغيرة القد، مستدرة الشكل، رقيقة الجرم، سمره اللون || يتكاثر بالبرزر والمقل. يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة الغنية بالمواد المضوية والمسنوية العناصر المعدنية || اشهر انواعه الرئيسية ما يتبع.

٢١٩٦٨ - قَرْنُفُلِ احمر زنجفيري *

Dianthus cinnabarinus (S). *Æillet rouge cinabre* (F).

نوع من القرنفل مهد اليونان، ساقه فروع تملو من ٣٠

* ٢١٩٨١ - قرنفل صيني

Dianthus chinensis (S). *Œillet de Chine*, O. *régence* (F). *China pink*, *Indian pink* (E). *Chinesische Nelke*, *Indischs Nagelein* (D). *Garofano della Cina*, *G. della reggenza* (I).

نوع من القرنفل المحول. مهدد الصين. ضروب عديدة سيقها فراء تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها مستطيلة تعرض نحو ٢ سم. نصلها شديدة الخضار البحري. أزهارها بسيطة أو مكسبة، بتلاتها مهدبة الختار. ألوانها مختلفة منها السوية والبياض والمocha والمروحة والمروحة || أزهارها يستمر طوال الصيف.

* ٢١٩٨٢ - قرنفل منتصب

Dianthus strictus (S). *Œillet dressé* (F).

نوع من القرنفل ساقه منتصبة، قليلة، ضروب مستطيلة السلاحيات النحيلة، تملو من ١٥ إلى ٢٥ سم. أوراقها ضيقة النصل، بحرية اللون. أزهار فردية أو ثنائية التجميع، مستطيلة المالحق، خافتة العرف. بتلاتها يضاء اللون منفصلة الانتشاب مقرضة الأطراف. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

* ٢١٩٨٣ - قرنفليات

Caryophyllaceae (S). *Caryophyllées*, *Dianthées* (F). *Caryophyllaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القنات. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاثة أسباط: السيلانيات والفلقيات والخنثيات. جميعها عشبية، معظمها معمر وبعضها محول وسولي. ومنها أيضاً البرية والطيبة والصناعية والزينة.

* ٢١٩٨٤ - قرنفل

Eugenia aromatica, *E. caryophyllata*, *Caryophyllus aromaticus* (S). *Girofler*, *Gérofler* (F). *Clove tree* (E). *Gewürznelken* (D). *Garofano*, *G. aromatico*, *Eugenia aromatica*, *E. coriifolide*, *Chido flore* (I).

جنية معمرة من فصيلة الآسيات. مهدا البلاد الحارة ساقها وأغصانها سرحة. أوراقها متقابلة، نصلها جامدة، ريشية العروق. أزهارها صفيرة القند، كؤوسها رباعية التفصيص، بتلاتها ثمانية، أسديتها كثيرة العدد، مبيض مدتها ثنائي الخياء المنظم، ثمارها نوية متوجة، يزورها قليلة. تزود لأزهارها الطريقة الشائعة الاستعمال المعروفة باسم «كيش القرنفل».

* ٢١٩٨٥ - قرنوس

Chorinus (S). *Chorine* (F). *Chorinus* (E).

جنس دوبيات بحرية من القرشيات عشاريات الأبرجل قصيرات الذيل وفصيلة الجيحات. أنواعه المعروفة ستة، أعطتها بحار البلاد الحارة ١٠ أجسامها صفيرة شبه ريمية الشكل. سناكها تنتهي بزوائد. قرنية المادة، جالسة الانتشاب. قوائمها الامامية ملقطة الأطراف، لامتناوية الطول والسمانة. ألوانها نباتية الألوان تكثر فيها الأزودة والسمرة الحديدية المالح.

* ٢١٩٨٦ - قرنوس

Cornus (S). *Cornel-tree* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنوسيات. أنواعه المعروفة نحو ٢٥ منها الأشجار والشجيرات وألجنتها والأعشاب. أوراقها كاملة عابلة. أزهارها

كبيرة القند، قطرها ينبلج من ٦ إلى ١٢ سم. ألوانها عديدة تغلب فيها السوية.

* ٢١٩٧٥ - قرنفل الشاعر

Dianthus barbatus (S). *Œillet barbu*, O. *de poète*, *Bouquet parfait*, *Jalousie*, *Tête de chat* (F). *London tuft*, *Sweet William* (E). *Barnetke*, *Samtelke* (D). *Garofano barbuto*, *G. poeta*, *Mazzetto perfetto* (I).

نوع من القرنفل، ساقه منتصبة فراء، دقيقة السلاحيات المستطيلة، تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سانية النصل تعرض نحو ١٠ سم. لونها إلى الخضار المالحق، أزهارها كثيرة العدد، بتلاتها تطول نحو ٢ سم. وهي مستعرضة الطرف المسن. ألوانها مختلفة متداخلة عديدة || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

* ٢١٩٧٦ - قرنفل الصخور

Dianthus petraeus (S). *Œillet des rochers* (F).

نوع من القرنفل البري يعيش بين الصخور وفي الجراول. ساقه دقيقة نحيلة قليلة الفروع تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها لينة نصلها ثلاثي العروق، أخضر اللون، مدبب المقصبة الشالكة. أزهاره وردية، صغيرة القند، فردية التجميع، عادمة العرف. يوجد منه في لبنان || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

* ٢١٩٧٧ - قرنفل الهند

Tagete touffu (F).

هو الخشبية الجليية، أطالها.

* ٢١٩٧٨ - قرنفل برّي

Dianthus sylvestris (S). *Wood pink* (E). *Steinnelke*, *Œillet sauvage* (F). *Wild Nagelein* (D). *Garofano salvatico* (I).

نوع من القرنفل، ساقه فراء تملو من ١٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها جامدة النصل الأخضر المدبب الطرف، أزهاره عادمة العرف، فردية التجميع، بتلاتها مسننة الختار الخارجي، وردية اللون أو حمراء. يوجد منه في لبنان حتى ارتفاع ٧٠٠ م.

* ٢١٩٧٩ - قرنفل بهي

Dianthus superbus (S). *Œillet superbe*, O. *frangé* (F). *Fringed pink* (E). *Prachtnelke* (D). *Garofano frangato*, *G. superba* (I).

نوع من القرنفل، ضروبها عديدة سيقها فراء تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها تطول من ٤ إلى ٧ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٥ م. نصلها ثلاثي العروق، أخضر الصلصة. أزهارها عديدة، متوسطة القند، فواحة العرف، قطرها يراوح من ٢٥ إلى ٤٠ م. ألوانها سوية مختلفة منها الأبيض والبيجي والوردي والاحمر والبنفسجي || أزهاره يستمر من أيار إلى أيلول.

* ٢١٩٨٠ - قرنفل ريشي، قرنفل عطري

Dianthus plumarius (S). *Œillet mignardise*, O. *musqué* (F). *Feathered pink*, *Garden pink* (E). *Federnelke* (D). *Garofano a plumino*, *G. pennino*, *Garofanini* (I).

نوع من القرنفل ساقه منتصبة فراء تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها لينة تطول نحو ٥ سم. نصلها جامد الصفحة مدبب المقصبة، ياحت الخضار البحري. أزهاره فواحة العرف المطري قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها مستطيلة التثريم مختلفة الألوان السوية || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.



قرنفل الشاعر



قرنفل برّي



قرنفل صيني



قرنفل



قرنوس

٢١٩٩٣ - قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الْوَرَقِ

Cornus macrophylla, *C. brachypoda* (S). Cornouiller à grandes feuilles (F).

شجرة سبروتية تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها رابعة التضلع. أوراقها متقابلة تطول نحو ١٦ سم. وعرض نحو ٨ سم. نصلها مظهر البشرة على صفحتيه. عروقها سداسية أو ثمانية الازواج. أزهارها بيض. ثمارها إلى السواد الأزرق المالح.

٢١٩٩٤ - قُرْنُوسٌ كَنْدَا (F). *Cornus canadensis* (S). Cornouiller du Canada (F).

عشبة سبروتية معمرة تملو من ١٢ إلى ١٦ م. أوراقها السفلى لاطئة متقابلة أما العليا فمضغية ثلاثية. أزهارها نورية التجميع، بيض اللون، خضر المراج. ثمارها شتوية الشكل، حامضة الطعم، مأكولة || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢١٩٩٥ - قُرْنُوسٌ مُحْبِرٌ

Cornus controversa (S). Cornouiller discuté (F). شجرة فناء تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها زياد اللحم. أوراقها متعاقبة مستندرة القاعدة، نصلها يطول نحو ١٥ سم. وعرض ٨ سم. عروقها شتوية سداسية أو ثمانية الازواج. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها زيتونية الشكل والقد، سواد اللون، زرقاء المراج، حامضة الطعم، مأكولة. أخشابها شديدة الصلابة، ناعمة الرقة، فاخرة الصنف.

٢١٩٩٦ - قُرْنُوسِيَّات، قَرْنَائِيَّات

Cornaceae (S). *Cornacées* (F). *Cornaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة المغالات، اجناسها وأنواعها عديدة جميعها نباتات معمرة منها الاشعاب والجنات والاشجار. أوراقها بسيطة لكنها لا تقياسية الارتكاز منها المتقابلة والمتعاقبة. أزهارها خشوية، صويانية أو عقودية التجميع. ثمارها نورية صمغية اللون مأكولة. أخشابها شديدة الصلابة، صناعية، مرغوب فيها؛

٢١٩٩٧ - قُرْنُون هو الشوكة الصفراء، اطليا.

٢١٩٩٨ - قَرْنِيَّ *Cératoide* (F). *Ceratoid* (F). نعت تعريفي يوصف به ما كان شكله كالقرن.

٢١٩٩٩ - قَرْنِيَّات، قَطْلَانِيَّات

Leguminosae (S). *Légumineuses* (F). *Leguminosae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة المغالات، اجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاثة أسباط: القرنائيات والمشميات والسطيات || نباتاتها مختلفة الاشكال والاحجام فيها الاشعاب والجنات والاشجار. أوراقها مركبة لا تقياسية الارتكاز. أزهارها خشوية. أزهارها عقودية || وهي تشمل العديد من النباتات الزراعية الخذاثية والعلفية اشهرها الفول والعدس والحاص والمويه والبرسيم والنفل والبيقية والنبيل والسنط.

٢٢٠٠٠ - قَرْنِيَّة *Cornée* (F). *Cornea* (E). الجزء الخارجي الشفاف من العين.

٢٢٠٠١ - قَرْهَب *Taureau corpuient* (F). *Stout bull* (E). الثور المسن الضخم. وقيل الثور الكبير الضخم.

٢٢٠٠٢ - قَرْهَد ولد البومل ج. قراهد.

خشوية، رابعة التركيب، صغيرة القد، صمغية التجميع. ثمارها نورية مستطيلة مأكولة. يزورها دهنية يستخرج منها زيت حاد يستعمل في صناعة الصابون اخشابها شديدة الصلابة، صناعية || اشهر انواعه ما يتبع.

٢١٩٨٧ - قُرْنُوسٌ أَيْبُص *Cornus alba* (S). Cornouiller blanc (F).

جنبه سبروتية تملو من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ م. أثمارها مرجانية اللون أو صفراء. أوراقها بيضيه، تطول نحو ١٠ سم. وعرض ٧ سم. نصلها خلي الصفحة السفلى. عروقها خماسية أو سداسية الازواج. أزهارها غبراء اللون. ثمارها حمضية القد والشكل، بيضاء اللون، حامضة الطعم، مأكولة.

٢١٩٨٨ - قُرْنُوسٌ السُّوَيْد *Cornus suecica* (S). Cornouiller de Suède (F).

عشبة معمرة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها لاطئة متقابلة. أزهارها نورية التجميع، جؤوية اللون تحضنها أربع قنايات بيض. ثمارها صمغية القد حامضة الطعم مأكولة. أزهارها يستمر طويلا شهر حزيران.

٢١٩٨٩ - قُرْنُوسٌ ذَكَرٌ، قُرْنُوسٌ مَبْدُولٌ

Cornus mas (S). Cornouiller mâle, C. commun, Courgeiller (F). Common cornel tree, Cornelian cherry (E). Kirschenhartriegel, Kornelkirsche, Kornelbeern, Kornelbaum (D). Corniolo, Corniale, Cornio (I).

شجرة سبروتية مبدولة تملو من مترين إلى خمسة امتار. أثمارها حطيطية اللحم مبدولة الزغب. أوراقها متقابلة، صمغية القد، مائلة للبشرة، خماسية أو سداسية العروق المزدوجة. أزهارها صفراء التبرجات، خضر القنايات. ثمارها حامضة مأكولة، رقيقة الشكل تطول نحو ١٥ م. لونها إلى الحمرة.

٢١٩٩٠ - قُرْنُوسٌ عُنُقُودِي

Cornus racemosa (S). Cornouiller à grappes (F). جنبه تملو من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ م. أثمارها وأغصانها حطيطية اللون، سرحة. أوراقها متقابلة تطول نحو ١٠ سم. وعرض ٣ سم. نصلها خلي الصفحة السفلى، عروقها رابعة الازواج. أزهارها عقودية هري. أزهارها وثمارها بيض.

٢١٩٩١ - قُرْنُوسٌ فُلُورِيدَا، قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الزَّهَر

Cornus florida (S). Cornouiller de Floride, C. à grandes fleurs (F). Dog-wood, Flowing dog-wood (E). Blumen Hartriegel, Hartriegel (D). Corniolo florido (I).

شجرة سبروتية تملو من ٥ إلى ١٢ م. أوراقها متقابلة تطول نحو ١٤ سم. وعرض ٨ سم. نصلها ذات الزام الأخير، مذهب المقصعة، خلي الصفحة السفلى، سداسي العروق المزدوجة. أزهارها ودية اللون، كبيرة القنايات المحاطة. ثمارها زيتونية القد والشكل، جؤوية اللون، حامضة، مأكولة.

٢١٩٩٢ - قُرْنُوسٌ قَلِيلُ الْعُرُقِ

Cornus paucinervis (S). Cornouiller paucinerve (F). جنبه صمغية تملو نحو ٢٠٠ م. أثمارها رابعة التضلع، زياد اللحم. أوراقها متقابلة، صمغية، ضيقة، نصلها يطول نحو ٥ سم. عروقها ثنائية أو ثلاثية الازواج، خلية البشرة من الجهة السفلى. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها رقيقة الشكل حمضية القد، جراء القشرة واللباب، حامضة الطعم، مرة المذاق.



قُرْنُوس

٢٢٠١٤ - قُرَيْس - هي الصابونة ، اطلمها .

٢٢٠١٥ - قُرَيْسِيَّات

هي الصابونيات ، فصيلة اسماك بحرية ، اطلمها .

٢٢٠١٦ - قُرَيْص - Ortie (F).

هو القراص ، اطلمه .

٢٢٠١٧ - قُرَيْص أَحْمَر - Lamier pourpre (F).

هو اللاميون الأرجواني ، اطلمه .

٢٢٠١٨ - قُرَيْص الْعَجُوز - Ortie brûlante (F).

هو القراص المحرق ، اطلمه .

٢٢٠١٩ - قُرَيْص رُومَانِي - Ortie à pillules (F).

هو القراص الكاوي ، اطلمه .

٢٢٠٢٠ - قُرَيْص * ، يُونَيْتَا - Urena (S).

Urena, Herbe aux paniers (F). Indian mallow (E).

Urena (D). Urena (I).

جنس نباتات جنينية ليفية من فصيلة الخبازيات . اعطائها

بلاد الشرق . انواعها المزروعة اربية ، سوقها منتشرة .

اوراقها معققة متعاقبة ، نصلها مستعرض الشكل ،

خماسي الفصوص . جامد الصفحة . ازهارها فردية التجميع ،

ابطية الارتكاز ، خاصة التركيب || ذرع لايافها

الخشنة المثنية الشائكة الاستعمال الصناعي .

٢٢٠٢١ - قُرَيْق - Coryphaena (S).

Coryphène (F). Dolphin, Dorado (E).

جنس اسماك بحرية من الاسقمريات شائكات الزعانف .

انواعها المعروفة نحو ١٥ اعطائها بحار البلاد الحارة والمتدلة

الحرارة . جميعها من الاسماك اليمية || اجسامها اهليلجية

الشكل ، كبيرة القد ، تقطل من ٨٠ الى ١٦٠ سم .

انولها متداخلة الالوان المتباينة تكثر فيها الرعدة القصبية

المنشقة بالانخضر والاصفر الذهبي . زعانفها الظهرية

قاطبة ، الذيلية فارقة او بعيدة الفلقة || لحومها جيدة

الصنف مرغوب فيه .

٢٢٠٢٢ - قُرَيْق مَوَاكِب *

Coryphaena pompilus (S). Coryphène pompile,

Lampuge, Sourcil d'or (F). Pompil (E).

نوع من القريق . سمكة بحرية بيوض . اعطائها البحر

الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والهادي ||

جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم .

ثوبها الى الشبهة الزبئية المنشقة بالانخضر والاصفر الذهبي .

ظهورها الى الخضار الالسن الاسفع الملاج . رأسها معدن

الجرم ، قصير الخلف المستدير . عيناها كبيرتان . حاجباها

مذهبان . زعنفتها الظهرية قاطبة . الشرجية مستطيلة وصيقة .

الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٠٢٣ - قُرَيْن - Cornicule (F). Cornicle (E).

هو السرك ، اطلمه .

٢٢٠٢٤ - قُرَيْتَا - Ambrevade (F).

هي الكنجوس الهندي ، اطلمه .

٢٢٠٢٥ - قُرَيْشَة - هي الماروسية الزراعية ، اطلمها .

٢٢٠٠٣ - قُرُوح

التخلة للمسا الطويلة التي انجد كرهاج . قراريج .

٢٢٠٠٤ - قُرُوقُ الْمَلْفُوف * ، فَيْقُ الْمَلْفُوف

Plasmiodiophora brassicae (S). Hernie du chou, H. des crucifères, Maladie digitale, Gros pied (F). Clubroot of cabbages (E). Kohlhernie, Kohlkropf (D).

وصم فطري يترى معظم السليبيات واعصها الملفوف .

شتم مركب من الجذور فيسبب فتح النجج وارتفاعها .

الموالم التي تنشط انتشاره وقتكه : تربة متدجة وحرارة

معتدلة ورطوبة تفوق ٦٠ ٪ || يكالغ بظهور البذار

والتربة ويستبدال الارربة المتدجة والمواقع الرطبة بغيرها

اقل اندساجاً ورطوبة .

٢٢٠٠٥ - قُرُود دَيْبِيَّة * ، أَقْرَامُ الْقُرُود

Hapalidae (S). Arctopithèques, Hapalides (F).

Arctopitheci, Hapalidae (E). Krallentaffen (D).

فصيلة قرد من الحماريات موطنها امريكة الوسطى والجنوبية .

انواعها المعروفة ٢٨ تنضم الى جلسين : الميادس والهلبال .

اجسامها مسنونة القند ريمة ، اذنانها جللة مستطيلة . اولها

سوية الالوان ، وافرقة الشعر الوثير المستطيل . تعيش حياة

السنجاب . جماعها كبيرة العدد . قوتها الثار والحشرات

اناثها تضع من جرو الى جروين وربما ثلاثة .

٢٢٠٠٦ - قُرُودُ ذَيْلَانَة * ، قُرُودُ مَذْئَبَة

Cercopithecidae, Cercopithèques (F). Cercopithe-
cidae, Cercopithecus, Tailed apes (E). Meer-
katzen (D).

هي الهجرسيات فصيلة قرد من سفليات المنخرين تشمل

سنة اجناس : الهجرس والحودل والملاكك والشدديم والقشة

والقردوح .

٢٢٠٠٧ - قُرُوس - Bar (F).

هي القاروس سمكة مأكولة من الفرغيات .

٢٢٠٠٨ - قُرُوس مَبْدُول - Loubine vulgaire (F).

سمكة بحرية تدعى قاروس مبدول ، اطلمها .

٢٢٠٠٩ - قُرَيْةُ التَّمَل - Fourmière (F). Ant-hill (E).

هي جرثومة التمل حيث يبيت ويتكاثر ويخزن الغذاء .

وتدعى ايضاً للزبية والمنملة .

٢٢٠١٠ - قُرَيْث - Anguille (F).

هو الانقليس ، اطلمه .

٢٢٠١١ - قُرَيْثِي الشَّكَل - Anguilliforme (F).

Anguilliform (E).

نعت تعريفية يطلق على كل حيوان مائي او قازب شكله

كالقُرَيْث اي الانقليس .

٢٢٠١٢ - قُرَيْدَس - Crevettes (F).

هو الاربيان ، اطلمه .

٢٢٠١٣ - قُرَيْدَسِيَّات - Carididae (S).

Carididae (F). Carididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات المشاريات الاقدام .

اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطائها بحار الدمام . جميعها

صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، منعقة المؤخر .



قُرُوقُ الْمَلْفُوف



قُرَيْص



قُرَيْث مَوَاكِب

Bombyx

٢٢٠٣٧ - قَرِينَة ، بُمْبِيكْس

جلس حشرات فراشية من فصيلة القزيات . أنواعها عديدة معظمها ضار وبعضها اقتصادي نافع كدودة القز . أشهر أنواعها ما يلي .



قَرِينَة الحرير

٢٢٠٣٨ - قَرِينَة الحرير * ، قَرِينَة الثَوْت

Bombyx mori, Sericaria mori (S). Bombyx du mûrier, Ver à soie (F). Silk-moth, Silk-moth worm (E).
فراشة من القزيات متوسطة القد لا قدرة لها على الطيران تعيش نحو عشرة أيام . تساقط بعد اليوم الرابع . أنثى تبيض بعد السقاة بنحو ٢٤ ساعة . زين متحيا يشتر من يومين إلى ثلاثة أيام . عدد مكباتها لا يقل عن ٥٠٠ يعرف عنه المربين (بالدور) || جسمها نحني حشني . طولها نحو ٣ سم . ويسقطها ٤ سم . زياهاذا مشطية مزدوجة . الجناحين الامامين بعض الخطوط المتفرعة السوداء اللون . لا فارق خارجي بين الذكر والانثى سوى الحجم فالانثى اكبر واغظ من الذكر . مكباتها كروي الشكل يبدو اصفر اللون . عند متحه ، ثم ينحرف إلى اليسار ويسود قبيل التفت || البرقة تعرف بدودة الحرير ، أطلسها ، يرارح طولها عند تمام انسلخاتها من ٧ إلى ٩ سم . جسمها مالمس البشرة . رأسها صغير القند اسود اللون . قريبا الشرجي دقيق ويهدب . ثوبها إلى الياض الاغبر . يملو حلقات جسمها من جانبيها سمات سود تدعى سمات التسم وتغطيها التنفس || غزوها عديدة فوارقها الحجم والتوب وقد الشرنقة ولونها وشكلها .



قَرِينَة الخمر

٢٢٠٣٩ - قَرِينَة الخروع ، بُمْبِيكْس الخروع ، دَوْدَة حرير آريا

Bombyx ricini, B. arrindia, Attacus arrindia (S). Bombyx du ricin (F).
موطنها البلاد الحارة اخصها الاسيوية . ترى على ورق الخروع . صليجتها متوسطة الحجم والصف . حريرها اغبر اللون .



قَرِينَة السِّنْدِيَان

٢٢٠٤٠ - قَرِينَة الخروع * ، بُمْبِيكْس الخروع

Bombyx cecropia, Saturnia cecropia (S). Bombyx du prunier, Ver à soie du prunier (F).
موطنها بلاد امريكا الجنوبية . ترى على ورق الخوخ ، والزعرور . صليجتها متوسطة الحجم ، حريرها قوي الخيط ، غليظ ، اسر اللون .



قَرِينَة السِّنْدِيَان الجَرَّارَة

٢٢٠٤١ - قَرِينَة السِّنْدِيَان * ، قَرِينَة البسوط ، بُمْبِيكْس السِّنْدِيَان

Bombyx mylitta, Saturnia mylitta (S). Bombyx du chêne, Ver à soie du chêne (F).
موطنها الهند . ترى على ورق السنديان . صليجتها صغيرة القند مستطيلة . حريرها براق الخيط متوسط الصلث .

٢٢٠٤٢ - قَرِينَة السِّنْدِيَان الجَرَّارَة * ، بُمْبِيكْس السِّنْدِيَان الجَرَّار

Cnethocampa processionnea (S). Bombyx processionnaire du chêne (F). Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Processionsspinner (D).
حشرة ملونة توجد في جميع البلاد المعتدلة الحارة . يرقاتها سمراء اللون . كثيفة الهلب . لسها يبيح الجله كالقراص . تركب الأوراق السنديان على اختلاف أنواعه فتقرضها وتتغذى .

٢٢٠٢٦ - قَرِينَة ، شَبَهَة

Adminicule, Présomption, Contexte (F). Presumption, Context (E).
عنصر من عناصر الاثبات قد لا تقوم به الحجة تماما ولكنه يساعد .

٢٢٠٢٧ - قَرِينَة عَدَم التَّمْيِيز

Présomption de non-discrimination (F). Presumption of not discernment (E).

قَرِينَة قانونية يستدل بها ما اذا كان القاصر الذي اقترف جرما يمي او لا يمي مسؤولية جرمه . وفي القانون اللبناني اذا لم تتجاوز سن القاصر المحرم ثلاث عشرة سنة عوقب بتأديبه وراقبته .

٢٢٠٢٨ - قَرُوح

مرض يصيب القدم فيزولا ويذهب بجلدها .

٢٢٠٢٩ - قَرُوحِي * ، Iridescent (F). Iridescent (E).

نمت تعريف يوصف به الشيء الذي يعكس ألوان قوس قزح .

٢٢٠٣٠ - قَرُوحِي ، قَرُوحِي

نمت تعريف يطلق على ما كان لونه كألوان قوس قزح .

٢٢٠٣١ - قَرُوحِيَة

راجع حقله .

٢٢٠٣٢ - قَرُوح

نوع من السحاب الهيبد البعيد الارتفاع . وهو من الغيوم الماطرة . القطعة منه قزعة .

٢٢٠٣٣ - قَرُوح * ، Deverra (S). Deverre (F).

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبات بعض سواحل البحر الابيض المتوسط || سوقها فروع قليلة الازراق او عادتها . والاوراق ، عند وجودها ، في بعض الانواع تكون متعاقبة ، مركبة ريشية التفصيل . ازهارها صويالي التجميع . ازهارها متباينة الالوان منها الابيض والبنّي والاصفر والاعضر الاصفر . تنويرها ربيبي .

٢٢٠٣٤ - قَرُول * ، Polypier de Corail (F).

Polypary of Corail (E).
القزول زكية البسد ، اي المرجان ، حيث تنشب اللديفة .

٢٢٠٣٥ - قَرُوي ، Sérícicole (F). Silk-producing (E).

نمت تعري يطلق على ما هو مختص بتربية دود القز .

٢٢٠٣٦ - قَرَبَات ، Bombycidae, Liparidae (S).

Bombycidae, Liparidae (F). Bombycidae, Liparidae (E).
فصيلة حشرات من حشريات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد . فراشاتها متوسطة الحجم ، غليظة الجسم ، عديدة الخيط ، مقمرة الحياة ، لا تتنلى . اجناسها كثيفة الحراشف الزباء . ورشاتها إلى الياض الاغبر تملو رشفة سمراء خفيفة . قرنها الاستشعارية مشطية مزدوجة || مكباتها كروي الشكل ، فري المنح ، رقاتها كبيرة القند ملساء الجلود وحيدة القرن الشرجي . خادراتها تقتلف بشرائق حرارية المحيط || أشهر اجناس القرية .

المائل || البرقة تطول من ٢٢ إلى ٣٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، كثيف الملب القصر، مبهر الملب الطويل القسي التجميع. اطلال اللون، اربد الموج، يملوه خط ثنجي ابيض وخطان جانبيان اسمران وخطان متعلقات اصفران. رأسها جوزي اللون. مدنها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلصلة تحبكه على النبات المائل.

٢٢٠٤٧ - قُرْبَةُ الْكَزْرِ * ، بُمْبِيكْس الْكَزْرِ
Porthesia similis (S). Bombyx cul doré (F).
Gold-tailed moth (E). Schwan (D).

حشرة من القزليات رقتها شرقة تركب اوراق الكرز والتفاح فتفرضها وقد تقضي عليها.

٢٢٠٤٨ - قُرْبَةُ شَارِدَةِ * ، بُمْبِيكْس شَارِدِ
Liparis dispar, Lymantria dispar (S). Bombyx disparae, Spongieuse (F). Gipsy moth, Gypsy moth (E). Schwammspinner (D).

حشرة من القزليات رقتها همة تركب اوراق الاجنار الحرجية والشمرة اخصها السديان والصفصاف والتفاح.

٢٢٠٤٩ - قُرْبَةُ مُبْرِقَةِ * ، بُمْبِيكْس مُبْرِقِ
Liparis monacha (S). Bombyx nonne, Nonne, Bombyx moine (F). Nun moth, Black arches moth (E). Nonne, Fichtenspinner (D).

حشرة مذيلة موطنها البلاد المعتدلة الحارة. رقتها همة تركب اوراق عدة نباتات اخصها اجنار الفصيلة الصنوبرية

٢٢٠٥٠ - قُرْبَةُ يَمَامَايَ * ، بُمْبِيكْس يَمَامَايِ
Bombyx yamamai (S). Bombyx yamamai (F).
حشرة من القزليات موطنها الصين. تربي على ورق السديان، صلجتها متوسطة القد، حررها جيد الصنف ثخن الخيط.

٢٢٠٥١ - قُسَابَةُ رَدِي الثمر.

٢٢٠٥٢ - قُسَابَةُ
Rétractilité (F). Retractility (E).
القسابة قابلية الانقباض.

٢٢٠٥٣ - قُسْبَارِيَّاتِ
Cuspariées (F).
سبط من فصيلة السبائيات. اجنانه وانواعه عديدة جميعها اجنار وجنيات. اعطائها البلاد الحارة اخصها امريكية الجنوبية. بعض انواعه طلي دافع للحميات.

٢٢٠٥٤ - قُسْبَارِيَّةُ الْحَمِي * ، قُسْبَارِيَّةُ قَنْزَوِيلا
Cusparia febrifuga (S). Cusparie (F). Cusparia (E).
Cuspabum (D). Cusparia (I).

شجرة من القسباريات. ساقها منتصبه فروعها تملو من ٧ الى ١٥ م. اوراقها عابطة، معققة، متعاقبة، مركبة، ثلاثية الوريقات. ازهارها عنقودية التجميع، يضاء اللون، خاسية الثلاث، حيلة الشكل، مستحبة العرف. يزورها سود احادية || لحاء الشجرة عطري الرائحة غزير المركبات الفعالة يستخرج منه مادة القسبارين التي تعتبر من المقويات المرموقة ومن دوائف الحميات المشهورة.

٢٢٠٥٥ - قُسْتُ * ، قُسْتُسْ
Costus (S). Costus (F). Costus, Kust-root (E). Kostuspflanze (D). Costo (I).

جنس نباتات جذمورية عشوية برية وزراعية من فصيلة الزنجبيليات. انواعه المعروفة ١٥ منها المناطق الحارة.

٢٢٠٤٣ - قُرْبَةُ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارَةِ * ، بُمْبِيكْس الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارِ
Cnethocampa pityocampa (S). Bombyx processionnaire du pin (F). Pine processionary caterpillar (E).
Pinien-Prozessionsspinner (D).

حشرة شديدة الاذى. رقتها كثيفة الملب تركب بتناقل واهداب الصنوبر فتقضي عليها.

٢٢٠٤٤ - قُرْبَةُ الصَّيْفِ * ، بُمْبِيكْس الصَّيْفِ
Euproctis phaeorrhæa, Porthesia chrysorrhæa (S). Bombyx chrysorrhæe, Cul brun (F). Browntail moth (E). Braunschwänziger goldafter (D).

حشرة من القزليات رقتها همة تركب معظم الاجنار المشرة وتغريها من الورق.

٢٢٠٤٥ - قُرْبَةُ الصَّيْفِ السَّمَرَاءِ الذَّكَبِ
Euproctis phaeorrhæa, E. chrysorrhæa, Nygmia phaeorrhæa (S). Bombyx chrysorrhæe, Cul-brun (F). Browntail moth (E). Braunschwänziger Goldafter (D).

حشرة من القزليات حرشفيات الاجنحة. موطنها يشمل بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط واروبة المعتدلة الحارة. فراشتها عيفة تعيش على مخزونها الامعاني. سرفتها تعيش على اوراق الاجنار المشرة والحرجية اخصها الزعرور والنوخ والتفاح والسديان والقطب || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ م. بسطتها تراوح من ٣٤ الى ٤٠ م. رأسها ابيض. عينها كبيرتان. زباناها مشطيان مزويجان جوشها ابيض. بطنها ابيض الثلث الاول، جوزي اللون في الثلثين الاخيرين || رواشتها عند الشقين، صغرة الحجم، يضاء اللون، تبنية الزنزين، متراكبة الحراشف الدقيقة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز. تسرح في الليل. تعاظم بعد ظهورها بأربعة ايام وتبريق المكان لطفاً واحدة على فصل النبات المائل || البرقة تطول من ٣٠ الى ٣٥ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، كثيف الملب اللين القصير مبهر الملب الطويل. اكهب اللون يملوه خطان ابيضان من جانبي الظهر يتوسطها خط ثنجي احمر. رأسها الى الجفوة. مدنها ورواجها الى السرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلصلة تحبكه البرقة بين اعناق الازراق والافنان.

٢٢٠٤٦ - قُرْبَةُ الصَّيْفِ الْمَذْهَبَةِ الذَّكَبِ
Porthesia chrysorrhæa, P. similis, P. auriflua (S). Bombyx cul-doré (F). Gold-tailed moth (E). Schwan (D).

حشرة من القزليات حرشفيات الاجنحة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الالدي واروبة وافريقية الشمالية. فراشتها تعيش على مخزونها الامعاني. سرفتها تعيش على اوراق الاجنار المشرة والحرجية || جسمها متوسط القد يطول من ١٣ الى ١٦ م. بسطتها تراوح من ٣٦ الى ٤٢ م. رأسها ابيض. عينها كبيرتان. زباناها مشطيان مزدويجان. جوشها ابيض. بطنها حنطلي اللون مذهب الموج || رواشتها عند الشقين يضاء اللون، تبنية الزنزين يعلوها في الزوج الامعاني بقعة طرية اللون || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز. تسرح في الليل. تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة ايام وتمتع المكان ميمادياً على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات



قُرْبَةُ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارَةِ



قُرْبَةُ الصَّيْفِ



قُرْبَةُ الْكَزْرِ



قُرْبَةُ شَارِدَةِ



قُرْبَةُ مُبْرِقَةِ



قُسْبَارِيَّةُ الْحَمِي



قُسْتُ

اوراقها لمبية ، لاطئة ، متعاقبة . ازهارها كبيرة اللد ، تاجية الارزكاز ، لا قياسية التجميع منها النورية والسلفية . جذاميرها بطيية ، كانت ولا تزال تستعمل في الرِّيَاق .

٢٢٠٥٦ - قُسُوس
Ciste (F).
هو اللادّن ، اطلبه .

٢٢٠٥٧ - قُسُوس لِادَنِي
Ciste ladanifère (F).
هو اللادّن الاسياني ، اطلبه .

٢٢٠٥٨ - قُسُ بَرِي
Sisymbre (F).
هو السبارة ، اطلبه .

٢٢٠٥٩ - قُسُ شَامِي
Aunée grande (F).
هو الرّاس الطّبي ، اطلبه .

٢٢٠٦٠ - قُسُطَان ، قُوس قُرَح

Arc-en-ciel (F). Rainbow (E).
ويُدعى ايضاً قوس السحاب . ظاهرة جوية تشاهد في اثناء سقوط المطر او تنجم الجو بقطرات الماء . ذلك ان اشعة الشمس عند مرورها خلال هذه القطرات تنكسر كما ينكسر الشعاع الضوئي التانث الى موشور زجاجي ويتحلل الى الوان الطيف فيشاهد في السماء قوس يتكون من الاحمر والبرتقالي والاصفر والاحضر والازرق والتلي والبنفسجي . ويشاهد القسطنان ايضاً في بعض الليالي القمّيرة السبب نفسه .

٢٢٠٦١ - قُسُطَانِي
Irisé (F).
راجع قزحي .

٢٢٠٦٢ - قُسُطَرَان
Bétoine (F).
هو البطيخا ، اطلبه .

٢٢٠٦٣ - قُسُطَل
Châtaignier (F).
هو الكتنة ، اطلبه .

٢٢٠٦٤ - قُسُطَل الارْض
Jacinthe orientale (F).
هو الجوّث الشرقي ، اطلبه .

٢٢٠٦٥ - قُسُطَل الماء
Macre (F).
هو العكر ، اطلبه .

٢٢٠٦٦ - قُسُطَل هنْدِي
Marronnier commun (F).
هو القندلي المينول ، اطلبه .

٢٢٠٦٧ - قُسُطَلَة
Châtaigne (F).
هي الكتنة شجرة الكتنة .

٢٢٠٦٨ - قُسُطُورَة ، قُسُطُورِيَوْم ، قُسُطُورِيُون
Castoréum (F).
هو الجندبادستر ، اطلبه .

٢٢٠٦٩ - قُسُوس
Ciste (F).
هو اللادّن ، اطلبه .

٢٢٠٧٠ - قُسُوس اِقْرِيطِي
Ciste de Crète (F).
هو اللادّن الاكريقي ، اطلبه .

٢٢٠٧١ - قُسُطُورَة *
Echiostoma (S).
Echiostome (F). Echiostoma (E).

جنس اممك بحري من مفتوحات المائة وفصيلة الرعايات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها الاغوار البعيدة والنج . تتميز بجهازها

الفسفوري المشي || اجسامها مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه بالرعاس تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم . رؤوسها غليظة ، مقطوعة الاطعام ، كبيرة الاشداء ، سنّة الفكّين . اسنانها مستطيلة ذرية . فكوكها السفلى وحيدة المدية . عيونها جاحظة . قشارها مائل الصلحة . زعانفها الظهرية وسيدة ، صغيرة الحجم ، خلفية الارزكاز ، تقابل الشرجية ومثلها قدّاً رشكلاً . زعانفها الحوضية والبطنية غليظة الشكل ، مستطيلة . زعانفها الذيلية صغيرة فارقة . اذنيها الى السرة السوداء يعلوها موج اسفح .

٢٢٠٧٢ - قُسُطِيَة * ، مَهْرُ الْجَنَّة

Iris oratoria (S). Iris orateur (F).
حشرة غاصلة من مستقيبات الاجنحة وفصيلة السرعوفيات اعطائها المناطق الحارة من الشرق الاوسط والادّن واربوة الغربية وافريقية الشالية . تأثف البراري والمواقع الدغلة || جسمها مستدق نحيل يطول نحو ٤ سم . ثوبه الى السرة الاخضراء الموج . راسها صغير مستعرض . عينها جاحظتان . زباناها دقيقتان مستقيتان . قوائمها مستقيمة . الزوج الامامي مستنقض ضليح . اجنبها متدلة الطول قسطانية الالوان الزاهية الجميلة ، تلتف البطن عند الذكر ولا تلتحف عند الانثى . الانثى اكبر قدّاً من الذكر واهت لوفّاً منه ، ترزّ مكنها في التربة قرب جذوع النبات .

٢٢٠٧٣ - قُسُفَاس

نبت كالكرّس اخضر غيبث الريح ينبت في سيل الماء له زهرة بيضاء .

٢٢٠٧٤ - قُسَل
Técanos (F).
هو الكراز ، مرض غيبث ، اطلبه .

٢٢٠٧٥ - قُسَم
Division, Embranchement (F).
Division (E).
يأتي القسم في التصنيف العام بعد المملكة وهو يتألف من صفوف والصوف من طوائف والطوائف من سبب والسبب من طبقات والطبقات من رتب والرتب من مراتب والمرتبات من فصائل والفصائل من اسباط والاسباط من عمارات والعمارات من اجناس والاجناس من انواع والانواع من ضروب والضروب من اصرام وسلالات وعروق .

٢٢٠٧٦ - قُسَم ، عَصَا
Lotir (F).
To divide Into lots (E).
جزأ الملك الى عدة عقارات تهيئاً لبيعه .

٢٢٠٧٧ - قُسَمَة
Division

٢٢٠٧٨ - قُسَمَة
Partage (F). Sharing (E).
عملية يقرر بها ملاكو اموال على الشيوع ازالة حالة المشاع وتخصيص حصّة مميزة لكل مالك بنسبة ما كان يملكه في عموم الاموال المشتركة || وهذه القسمة قد تكون وقتية او نهائية وودية او قضائية .

٢٢٠٧٩ - قُسَمَس * ، رُيْنَة
Cosmos
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات الشمامية . انواعها عديدة جميعها زراعية تزيينية . اوراقها متعاقبة ثنائية التفلق الريشي ، تحت ازهارها مزينة بالطلاب الحرفي الملون || اشهر انواعه الثلاثة التالية .



قسطوة



قسم

Toxifère, Toxicophore (F). **قَشَّاب** ٢٢٠٩٢ -

Toxiferous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو سمكة أو طائر يأكل مواد سامة فلا تؤذيها إنما تؤذي الإنسان إن أكل من لحمه .

Pellicule, Tégument (F). **قَشَار** ٢٢٠٩٣ -

Pellicle, Tegument (E).

بشرة جلد الحية وسائر الزحافات التي تسلك مرة كل عام .

Relief ٢٢٠٩٤ - **قَشَامَة** ٥

هي التواء الذي يبدو على الاجسام المنبسطة .

Toxine (F). **قَشَب، نَكْسِين، ذَيْفَان** ٢٢٠٩٥ -

Toxin (E).

كل مادة سامة، مها كانت عناصرها، تفرزها الميكروبات أو البكتريات .

Kerria (S). Kerrie, Corète (F). **قَشَب** ٢٢٠٩٦ -

جنس نباتات برية وزراعية تربيت من فصيلة الورديات مهدها الشرق الاقصى . اوراقها سنانية، معنقة . ازهارها لوانهات الوردية تتجمع ، كبيرة القد ، جميلة الشكل || اشهر انواعها الوردية قش اليابان .

Kerria japonica (S). **قَشَب اليابان** * ٢٢٠٩٧ -

Kerrie du Japon, Corète du Japon, Spirée du Japon, Corchorus (F). Jew's-mallow, Summer-rose (E). japanischer Ranunkelstrauch (D). Kerria japonica (I).

نوع من القش وهو جنبة معمرة صغيرة القد تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. جلورها مدادة ، فروها جالسة ، منتسبة ، سرحة ، لامة البشرة الخضراء . اوراقها متعاقبة ، فصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٥ وهو لامع البشرة ، جميل الخضار الزاهي . ازهارها فردية التجميع ، ذهبية اللون، تحورها فصل ورقية الشكل تستقيت اخضار || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٢٠٩٨ - **قَشَبَة * ، قَشَبَة**

Ashbia gossypii, Nemastopora coryli, Spermophthora gossypii, Eramothecium ashbyii (S). Stigmatomycose (F).

وصم يصيب ثمار القطن والبرتقال والأترج واليوسفي والبنودة والفاصوليا والصوجه سبه فطر مجهرى من الفطريات يدخل نسج الثمار على اثر وبخ بعض الحشرات فيعطبها ويعفنها .

Guenuche (F). **قَشَة** ٢٢٠٩٩ -

Young she-monkey (E).

هي النحية الصغيرة اي القردة الاثني الفيتية .

Cynopithecus niger (S). **قَشَة** * ٢٢١٠٠ -

Cynopithecus nègre, Singe à toupet (F).

قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة المجرسيات . مركزه بين المالك والقرود . جسمه يطول نحو ٦٥ سم. ويرتفع ٥٠ سم. ذنبه جذمة طوله ٢ م. ثوبه الى السواد القاتم. شعره قصير ، ناعم ، اجمد . وجهه جزوي اللون . راسه مكمل بشعفة منتسبة هدبية الشعر || قوته الثار والحبوب والجذور والحشرات . انشاء تصع جرواً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور .

٢٢١٠١ - **قَشْدَة ، قَشْطَة ، كَشَا ، قَشْدَة ، قَشْدَة ، كَشَادَة**

Crème (F). Cream (E).

مادة سنية في الحليب تسلك عنه بالفرز الحلي (الميكانيكي)

٢٢٠٨٠ - **قُسُسُ جُوِّي ، أَصَالِيَا كُسْمُس**

Cosmos atrosanguineus (S). Cosmos rouge-brun, Dahlia zlmapani (F).

عشبة تربيتية سرويتية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. جلورها جنبي غليظ ، ساقها منتسبة قراء . اوراقها فردية التشرم . ازهارها عشكولية التجميع ، تحورها الزهرية جووية الطباب . ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

٢٢٠٨١ - **قُسُسُ كَبْرِيّ**

Cosmos sulphureus (S). Cosmos jaune soufre (F).

جملة تربيتية سرويتية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها قراء زباه . اوراقها سنانية التشرم مهدبة . ازهارها فردية متتامة . تحورها الزهرية كبريتية الطباب والسينات . ازهاره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢٢٠٨٢ - **قُسُسُ مُذَوِّج الرئش**

Cosmos bipinnatus (S). Cosmos bipenné (F).

عشبة تربيتية سرويتية حولية تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. ساقها منتسبة قراء فناء . اوراقها مزدوجة التشرم الرشي . ازهارها فردية التجميع . تحورها الزهرية صفر الطباب، وردية اللسينات قفراها نحو ٦ سم. || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

Lionceau (F). Young lion (E). **قَسِيل** ٢٢٠٨٣ -

ولد الاسد لم يبلغ الحول .

٢٢٠٨٤ - **قَسَوْر ***

Chasmanthère (F).

جنس نباتات برية طيبة عارشة من فصيلة القمريات . انواعه عديدة اعطائها البلاد الاستوائية والحارة . سوقها متسلقة تطول من ٣ الى ٧ امتار . اوراقها معنقة ، كفية ، خالصة التخصيص . ازهارها عشوية سداسية التركيب . جلورها طيبة يستخلص منها بعد التجفيف والسحق مادة الكولين ومادة البر برين . واحدة قسورة .

٢٢٠٨٥ - **قَسَوْرَس**

Iris à l'ail (F).

هو السون المنتر ، اطليه .

٢٢٠٨٦ - **قُسُوس** هو شاي المروج ، اطليه .

٢٢٠٨٧ - **قُسُوس مُتَسَلِّق**

Lierre commun (F).

هو الشقة المبذولة ، اطليه .

٢٢٠٨٨ - **قَسِيح**

Rétractile (F). Retractable (E).

نمت تعريفي توصف به الاعضاء القابلة الانتشار والانقباض .

٢٢٠٨٩ - **قَسِيمَة ضَامِنَة** هي سند الحزن ، اطليه .

٢٢٠٩٠ - **قَش**

Paille (F). Straw (E).

هو قصب الزرع اليابس الذي يصبح تبنياً بعد درسه .

٢٢٠٩١ - **قَش السُّت**

Glui (F).

Straw for thatching (E).

هو قصب السلت اليابس يستعمل كرباط . وقد يستعمل في تغطيت قناني الخمر وما اشبه لحفظها من المطب عند الصدم .



قور



قش اليابان



قشة



قشة




قَشَّةٌ



قَشَّةٌ سَهْفِيَّةٌ



قَشَّةٌ شَائِكَةٌ



قَشَّةٌ شَبْكِيَّةٌ



قَشَّةٌ شَرْمِيلِيَّةٌ

وقشورها عديدة المنافع والقوائل الصحية || أنواعها الزراعية المأكولة الثَّار نحو ١٢ أشهرها ما يتبع :

٢٢١١٦ - قَشَّةٌ سَهْفِيَّةٌ * ، قَشَّةٌ سَكَاوُونَا

Anona squamosa (S). Attier, Anone écailluse, Pomme-cannelle (F). Custard-apple, Sugar-apple, Sweet-sop (E). Honigapfel, Zuckersapfel (D). Anona scalliosa, Pomo cannella, Mela cannella (I).

نوع من القشَّة، تصنفيه يأتي بعد الشرميلوي. ثمرته تشبه التفاح شكلاً وقالباً وهي تملو نحو أربعة أمتار . أوراقها بيضبة النصل مستطيلة، أزهارها مفتحة اللون . ثمارها كأكواز الصنوبر، لبها أبيض المادة غزير العصارة السكرية . يزورها سود كبيرة .

٢٢١١٧ - قَشَّةٌ شَائِكَةٌ *

Anona muricata (S). Corossolier, Anone hérissée, Corossol épineux (F). Sour-sop, Prickly custard-apple (E). Sauresobbe, Sorer bissen (D). Anona spinosa, Casimenteria (I).

نوع من القشَّة، ثمرته متوسطة الحجم . أوراقها مستطيلة، ملساء، لامعة، شديدة الخضار، فواحه العرف . أزهارها قصيرة القد، غليظة الشكل . ثمارها كبيرة مستطيلة، شكلها شكل كوز الصنوبر جرهاته ناشرة مرفوعة شائكة. كلما طول الثمرة فبرواح من ٢٥ إلى ٣٠ سم. ووزنها من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ غرام. قشورها سمكية، ورائحة العرف، حامزة المذاق. لبها أبيض اللون، حلو العلم لا يخلو من الحموضة المشبعة .

٢٢١١٨ - قَشَّةٌ شَبْكِيَّةٌ *

Anona reticulata (S). Anone cœur de bœuf, Cachimau (F). Bullock's heart, Common custard-apple (E). Gustardapfel, Rahmapfel (D). Anona cuore di bua (I).

نوع من القشَّة، تصنفيه يأتي بعد السكاوونزا . ثمرته كبيرة الحجم تملو نحو ثمانية أمتار . أوراقها مستطيلة زغبية الصفحة السفلى، أزهارها كبيرة، بيضاء اللون يشوبها شيء من الخضار . ثمارها كبيرة القد، قليلة الشكل . قشورها إلى الصغار الناري . لها جامد المادة، متوسط الصنف، أبيض اللون أو أحمر .

٢٢١١٩ - قَشَّةٌ شَرْمِيلِيَّةٌ *

Anona cherimola (S). Chérimoller, Chirimoyer (F). Chirimoya, Purple-apple (E). Chirimoya, Purpurapfel (D). Anona cherimola (I).

نوع من القشَّة وهو أجودها صنفاً، ثمرته صغيرة القد تملو نحو حبة أمتار . أوراقها بيضبة فضاء، زبابة، جميلة الخضار . أزهارها محورية متدلية، بتلاتها مستطيلة الشكل بيض الصفحة العليا الداخلية، خضر السفلى الخارجية. ثمارها رداء اللون حجبها حجم البرتقال. لبها عاجي المادة، غزير العصارة، عذب المذاق، لذية العلم، فواح العرف المستحب .

٢٢١٢٠ - قَشَّةٌ مُنْبِغِيَّةٌ *

Anona palustris (S). Corossolier des marais, Corosol des marais (F). Alligator apple, Cork wood (E). Alligatorapfel, Wasserapfel (D). Anona di stagno (I). نوع من القشَّة يحدود في الاماكن الرطبة . ثماره صغيرة القد قليلة الشكل، عادية الصنف، غبراء الالباب الغزير العصارة المعتدلة الحلاوة .

نظراً لغنىها السيوية . وهي دسمة ، لذية العلم ، بيضاء اللون . ومنها تستخرج الزبدة بعد غصها .

٢٢١٠٢ - قَشَّةٌ هِنْدِيَّةٌ Cavequi (F). هي البرسام الهندي ، أطليباً .

٢٢١٠٣ - قَشَّةٌ يَاتٌ Annonacées (F). هي القشطات فصيلة نباتية ، أطليباً .

٢٢١٠٤ - قَشَرٌ Eboasage (F). هو قشعر الحبوب لاسب البرور .

٢٢١٠٥ - قَشِيرٌ، حِخَاءٌ، قَرْفٌ، قَلْتٌ Ecorces (F). Barks (E). هو في النبات الجزء الخارجي الذي يلف الخشب من الجذور والسوق والاغصان والاوتنان .

٢٢١٠٦ - قَشَرٌ Lacté (F). جنس اسماك نهريه تدعى لاطس .

٢٢١٠٧ - قَشَرٌ عَشِيرٌ Cascarille (F). هو الكركون العنبري ، اطلبه .

٢٢١٠٨ - قَشَرَانٌ Ailes de sauterelles (F). Wings of the locust (E). جناحا الجرادة الرقبان كالانشاء الشفاف .

٢٢١٠٩ - قَشْرَةٌ Pellicule (F). Pellicle (E). غشاء الشيء، حلقه أو عرساً . ج قشر وقشور .

٢٢١١٠ - قَشْرِيٌّ Cortical نعت تعربني يطلق على كل ما له صلة بالقشور أو يشبهها .

٢٢١١١ - قَشَرِيَّاتٌ Crustacea (S). Crustacés (F). Crustacea (E). صف حيوانات مفصليه مائية عديدة الرتب والفصائل والاجناس، التي تنضم الى طائفتين : حشريات الصدف ولبينات الصدف .

٢٢١١٢ - قَشَرِيَّاتٌ دُنْيَا Crustacés inférieurs (F). Inferior Crustacea (E). طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «حشريات الصدف» .

٢٢١١٣ - قَشَرِيَّاتٌ عَلْيَا Crustacés supérieurs (F). Superior crustacea (E). طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «لبينات الصدف» .

٢٢١١٤ - قَشْطَةٌ Crème (F). Cream (E). هي القشدة ، المادة السنية في الحليب .

٢٢١١٥ - قَشْطَةٌ * ، قَشْدَةٌ Anona (S). Annone, Anone (F). جنس نباتات بوية وزراعية من فصيلة القشطات . انواعه نحو ٥٠ هـ جميعها اثمار وشجيرات وجنات . أوراقها متعاقبة، مفتحة، بيضبة أو اهليلجية . نصلها جامد الصنعة ، بارز العروق . أزهارها فردية محورية أو جامعية ناجية. ثمارها كوزية لحمية || معظم انواعها البرية طلي . أوراقها

تركب جلود وسوق النجيليات اغصانها الشعر والشوفان والذئبن والذرة .

٢٢١٢١ - قَشَاطِيَات ، قَشَبَات

Anonaceae (S). Annonacées, Anonacées (F).
Anonaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقطين عديدة الفلوات . اجناسها المعروفة ٩٠ نوعها نحو ٣٢٠ . اعطائها البلاد الحارة . منها الاجنار والشعيرات والجنبات . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، بسيطة . ازهارها ثلاثية التركيب او سداسية . ثمارها اكواز خبيرة ، بزورها دهنية .



قشام ارش

٢٢١٢٢ - قَشَاطَم ، قَشَبَان

Gyps
جنس طير من الكواسر وفصيلة النسريات . انواعه ثلاثة جميعها كبيرة القد . رؤوسها مستطيلة غفيرة ، محاسرها صلح . عينها سود المقل ، صفر الاسحاق . مناسرها قصيرة ، غليظة ، منمقة الهر . اعناقها مستطيلة غفيرة . سواقها كبيرة شارفة . اذنانها قصيرة . واللقشام شرس الاخلاق قوي الشكبة جسور يسطو على جميع انواع النور التي تنابه ونخشا . طيرانه معتدل الشوط يفوق سرعته سرعة جميع النور لكنه لا يجاري العقبان . يائث الحياة الجماعية ، سره يمد من ١٠ الى ٥٠ قوته الجيف . مأواه الجبال العالية .



قشام اكلف

٢٢١٢٣ - قَشَاطَم ارَقَش ، قَشَبَة

Gyps rupellii (S). Gyps de Ruppell, Vautour-épervier (F).

طائر من القشام طولهُ نحو ١٥٠ سم . يسلمته نحو ٢٧٥ سم . نوبه الى السمة الزاغبة . عنقه اسهب ، طوق جوثوبه طويل الزغب اغير اللون ، ظهره وبطنه وباطن سقلبه ونخذه الى السرة . ظاهر سقلبه الى الرقبة الموشمة يعلوها تجذيع ابيض مترص . موطنه البلاد الافريقية . يئثن وكرو في اوتاب الصخور الفسيحة . الانثى تبيض رفنة واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يعد من ٤٠ الى ٥٠ .

٢٢١٢٤ - قَشَاطَم اكلف ، حَقَق

Gyps fulvus (S). Gyps fauve, Vautour fauve, Griffon (F). Griffon-vulture (E).

طائر من القشام طولهُ نحو ١٢٠ سم . يسلمته ٢٧٠ سم . نوبه الى الكلفة الغبراء زرهو في الظهر وتبعق في البطن . سقله راقل كبير تعرضه خطوط بيض . اعطانه فسيحة الارباب تمتد من اشدت الى الروبة وافريقية الشمالية والشرقية . يئثن وكرو في سدوع الصخور الشامعة الموشمة . الانثى تبيض رفنة واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يعد من ٣٠ الى ٥٠ وهو من الطيور القواطع .



قشام هندي

٢٢١٢٥ - قَشَاطَم هندي ، هَوَزَب

Gyps indicus (S). Gyps des Indes (F).

طائر من القشام طولهُ نحو ١١٠ سم . يسلمته نحو ٢٥٠ سم . نوبه الى السمة القائمة . عنقه اسهب . سقله جمدان بالحلي ويعلوها خط ابيض مترص . ذنبه جمدان بالابيض . موطنه جبال الهند وجوارها . انثاء تبيض رفنة واحدة . سره يعد نحو ٢٠ .



قشبان

٢٢١٢٦ - قَشَاطَم ، قَشَبَان

Dascillus (S). Dascille (F).
جنس حشرات من فصيلة القشبانيات انواعه ١٢ اجسامها اهلبيجية الشكل ملفطة ، قرنها الاستشعارية خيطية ، مستنة ، مركبة من ١١ فاصلة . سدافرها ضيقة . سقلها جمدان خمسية الاقسام . انوثها سوية الالوان يكثر فيها الاسمر الرادي . اعماها مخددة خلية . خنافسها ورققات



قشوش

٢٢١٢٧ - قَشَبَان ارَقَب

Dascillus pubescens (S). Dascille pubescent (F).
Dascillus pubescens (E).

حشرة واسمة خاضعة من فصيلة القشبانيات ورقبة مغمدات الاجنحة . تالفت المواقع القريبة من الماء . خنافسها تعيش على ازهار الصوانيات . يرقاتها تركب جلود النجيليات التي تنمو في الاراضي الرطبة . جسمها صغير القد يطول من ١٠ الى ١٢ سم . ثوبها الى الريدة الخنطية الموج . رأسها صغير الحجم . فكها ضليمان . عينها صغيرتان زباناها خيطيان ، مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف اللامع ، بين التخديف الغندي القاطب . اسرارها خاسية المقل . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار تصافد بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتع المكان تحت الجملانة والعلل وبين اشطاء العشاب الحولية . البرقة عند بلوغها الادراك الجسوري تطول من ١٦ الى ١٩ سم . جسمها مدني الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، اغير اللون اصفر الموج ، اسمر الرأس ، ضليع التأثير الفكية . طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في التربة تحت الجملانة او تحت ارومات النباتات المثلية .

٢٢١٢٨ - قَشَبَانِيَات

Dascillidae (S).
Dascillidés (F). Dascillidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنح اجناسها وانواعها عديدة جميعها ست عمارات . اعطائها العالم جميعها تاربة خاضعة . اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد او صغيرة .

٢٢١٢٩ - قَشَبَر

Concombre serpent (F).
هو القش ، اعطيه .

٢٢١٣٠ - قَشَقُوش ، حَساس المَتَوَسَّط ،

هَفَّة المَتَوَسَّط ، تَرِيك

Atherina hepsetus (S). Athérine de la Méditerranée, Saulet (F). Silveride, Sand smelt (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة الحسانيات شاكاتك الزعانف اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تتنبر من اسماك التفت . مسرحتها الجتاح والشطوط . جسمها شبه وشي الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الشهبه يعلوها في جانبيها تمشيش ازرق ومواج فقي يسمر في الظهر ويغير ويبيض في البطن . رأسها معتدل الحجم ، يرسمي الشكل . فكها السفلي يتقدم العلوي بعض الشيء . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، جاحظتان . زعانفها نظامية الترتيب . زعنفتها الذيلية فارقة . لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢١٣١ - قَشَلَب

Cladanthus (S). Cladantha (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . سوقها فرعاء تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . قرونها متعاقبة فوقة . اوراقها مفردة ضيقة التصل على فصعته . ازهارها رؤوسية ، عطرية العرف ، صفر الطياب واللبينات الثنائية الصف . اشهر انواعه قشلب الجزيرة .

٢٢١٣٢ - قَشْبُ الجَزِيرَةِ ، أَفْحُونُ الجَزِيرَةِ

Cladanthus arabicus, Anthemis arabica, A. prolifera (S). Cladanthus d'Arable (F).

نوع من القشيب الحولي يملو نحو ٧٠ سم. ساقه كثيرة الفروع المتقايلة الفرقة . اوراقه لسنة التفريضة . خلية النصل . ازهاره عديدة ، صفراء اللون ، فواصة العرف . ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢١٣٣ - قَشْمُ

Lit d'un ruisseau (F).

Brook bed, Stream bed (E).

القشم مجرى النهر ومنهم من قال مسيله .

٢٢١٣٤ - قَشْبِيْنَةُ

Chicorée endive (F).

واحدة القشيز ، بقلة مشهورة تعرف بالهندب ، اطليه .

٢٢١٣٥ - قَشْوَةُ

هي القنوة ، اطلبها .

٢٢١٣٦ - قَشِيعُ

Légume sec (F).

Dried vegetable (E).

القشيع ج ثُغْمُ هي البقول الناشفة . القشيع منها كالبايما او الهبي كالفلو والعنسد والحمص والفاصوليا .

٢٢١٣٧ - قَصْ ، قَصَصُ

Sternum

هو في الطير عظم مقدم الصدر الذي يرتكز عليه هيكل القفص الجوشي .

٢٢١٣٨ - قَصَابَةُ

Boucherie (F).

هي سطة القصاب اي الجزار .

٢٢١٣٩ - قَصَابَةُ

Tubicoles (F).

Tube-worm (E).

اسم يطلق على الحليقات الملازمة لجلات اقبائها والتي تعيش ضمن قصبات كلسية المادة او رملية او غشائية .

٢٢١٤٠ - قِصَارُ الْأَعْمَادِ

Brachélytres (F).

Brachelytron (E).

اسم يطلق على كل حشرة من غديات الجناح اغداها تلحف جزءا من بطونها فقط .

٢٢١٤١ - قِصَارُ الْأَلْسِنَةِ

Brévilingues (F).

Brevilingual (E).

رتيبة من المفاتيحات اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى فصيلتين السقنوريات والصغريات . دويباتها تتميز بقصر السنبا وصغر قوائمها وقرب شهبها من الحيات .

٢٢١٤٢ - قِصَارُ الدَّلِيلِ

Brachyours (F).

Brachyurous (E).

رتيبة من القشريات المشاريات الارجل ، اشهر اجناسها السرطان .

٢٢١٤٣ - قِصَارُ السَّرَاقِطِ

Brachyptères (F).

Brachyptera (E).

رتيبة من الطير تتميز بقصر سواقطها مما يجعلها عاجزة عن الطيران ولذا فيجمع طيورها مائية قوتها الاسماك . اشهرها البطريق والطرسوع والنفاس والنفاس ...

٢٢١٤٤ - قِصَارُ الْقُرُونِ

Brachycères (F).

اطلب قصيرات القرون .

٢٢١٤٥ - قُصَاصُ ، قُصَاصُ

هو القصة الشجرة ، اطلبها . الواحدة قصاصة وهو نبات معثري تجمره النحل فيقال لسلها عسل قصاص .

٢٢١٤٦ - قُصَاعَةُ

Epinastie (F). Epinasty (E).

حالة كل عضو نباتي ينمو الجزء الباطني منه على حساب الجزء الظاهري كالورقة المقمرة الصفحة العليا المحدودة السفل .

٢٢١٤٧ - قُصَاعَةُ

Coniocybe (S).

جنس فطور مجهرية من الرطوبات وفصيلة الحشاريات . يتميز بنكته القلنسوية التي تملو الوصية . تكاته مستطيلة يوضعها قرصي الشكل ثنائي الخلية . تكاته غطية مفصيلة تشابع التكاث || له نوع واحد مؤدى يهوى قصاصة الكرمة .

٢٢١٤٨ - قُصَاعَةُ الْكُرْمَةِ

Coniocybe pallida, Pilacre pallida, Rosleria hypogaea, Coniocybe nivea (S).

فطر مجهري يصيب جذور الكرمة وقد يصيب عرضاً وفي ظروف بيئية خاصة جذور الاجناس والفاصوليا والذرايق والنبوغ والورد والقشيب والملث || مظهره الخارجي على الكرمة في اضعائها الهوائية ، يجمع شامليته وفوت في النمو وتجمع في الاوراق . وهو في الجذور عفن خفي ناشف اصهب اللون يلحف الجراة فيسبب تمزيقها وتفجير طربوها المكاثية || لم يكلف حتى الآن لان فوخته وانتشاره نمطان عدة عوامل بيئية منها الرطوبة الموسمية ، وعدم التهوية ، وترتبط التربة وقصاصها .. لذلك فالاعمال الحثوية والعناية بالترية هي انجع علاج له .

٢٢١٤٩ - قُصَايَةُ

Aphélie (F). Aphelion (E).

القصاية البعد الاقصى لسيارة عن الشمس . الكرة الاضوية تكون في قصايتها في اول شهر تموز من كل عام .

٢٢١٥٠ - قَصْبُ ، تَرْبِيعُ ، تَحْتُ

Equarrissage (F). Squaring (E).

هو قطع الشيء وتقسيمة وترتيبه كالخجاء وجذوع الاشجار الخ .

٢٢١٥١ - قَصْبُ * ، بُوْصُ

Arundo phragmites (S). Roseau, R. commun, R. à balais (F). Common reed, Ditch reed (E). Deckrohr, Teichrohr (D). Canna, C. a spazzola, Spazzole (I). ويسمى غاب وقصب المكاس . نبات كمبروري من فصيلة النجيليات ، ساقه قصيبة ، جامدة ، متناوبة السلاخات الجوفاء . اوراقه عصفية كبيرة القد مفصلة متناوية . ازهاره مجموعة عقائيد عابية ترتكز على سراج واحد . يكثر في المنافع وعلى ضفاف الماء . يستعمل للحواجز وفي صناعات السلال والمكاس .

٢٢١٥٢ - قَصَبُ الدَّرِيْرَةِ

هو عود الوج ، اطلبه .

٢٢١٥٣ - قَصَبُ الرِّمَالِ *

Arundo arenaria (S).

Arunde, Goubet (F). Cane, Reed grass (E). Pfahbrohr, Rohr (D). Cannuccia marina (I).

نبات كمبروري قصبي من فصيلة النجيليات . اعطاله البلاد الحارة والمعتدلة . يكثر ويؤوده في الرمال الرطبة وفي المنافع . سوه تستعمل في عدة صناعات زراعية اغصنها البواوير .



قَصَاةُ الْكُرْمَةِ



قَصْبُ



قَصْبُ الرِّمَالِ

٢٢١٥٤ - قَصَبَ الرَّمْلِ * ، غَزَار

Calamagrostis (S). Calamagrostide (F). Small reed, Sea sand-reed (E). Schilf, Rohrgrass (D). Calamagrostis (I).

جنس نباتات كمبودية قصية من فصيلة النجيليات. أنواعه نحو ٨٠. أصلها البلاد الحارة والمتندلة. ترفع في الأراضي الرملية ولا تنحش المناطق البحرية. بعضها يستعمل في تثبيت رمال الكثبان القاحلة لأنه لا ينحش العشب.



قصب الرمل

٢٢١٥٥ - قَصَبَ السُّكَّرِ * ، مَصَّان ، بَرْسُوم

Saccharum officinarum (S). Canne à sucre, Cannamelle (F). Common sugar cane (E). Zuckerrohr (D). Canna da zucchero, Cannamelle (I).

نبات زراعي من فصيلة النجيليات مهدد بالانقراض في بعض المناطق. كان حتى عام ١٨٠٠ النبات الوحيد الذي تستعمل عصارته في صناعة السكر. أما الآن فالصالحه لزراعته فهي مهددة والتي لا ينمغنض متوسط حرارتها الدنيا عن ١٠° سغ. ساقه منتصبه معقولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. سلامياتها تطول من ١٠ الى ٣٠ سم. وقطرها يراوح من ٣ الى ٨ سم. ألوانها الخارجية خشية التركيب جامدة تغلفها مادة شمعية يفياء اللون. أما الألياف الداخلية فأسننية النسيج غزيرة العصاره السكرية. أوراقه متعاقبة، عسقية الشكل، حاشية. تصلها بطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. وهو جامد الصفحة مسن الحافة. أزهاره عشقودي التجميع، هامي الارتكاز. أزهاره صغيرة الحجم، فضية اللون، ثنائية، متعاقبة، كثيفة الأزغب المستطيل || ثماره برّ نجيل دقيق || ضروب القصب الزراعي عديدة أشهرها وأهمها ما يلي :

قصب أزرق ، قصب حمايك

Canne bleue, C. jamaïque (F).

ضرب سبروتي قوي المناعة يتحمل العطش وهو متوسط

القد والإنتاج السكري .

قصب أسود

Canne noire (F).

ساقه صلبة جذوية اللون سمره الموج متوسطه العصاره

السكرية . تكثر زراعتة في ملقا وجزيرة موريس .

قصب أصفر ، قصب صيني

Canne chinoise, C. de Penang (F).

متوسط القد ، أصفر اللون ، أخضر الموج ، كثيف

المادة الشمعية غزير العصاره السكرية تكثر زراعتة في

الصين وفورموزا وجزر البنجاب .

قصب الصين

Canne de Chine (F).

صغير القد ، حنطي اللون ، أصفر الموج متوسط العصاره

السكرية لكنه سبروتي وقوي المناعة ضد الأمراض الفطرية .

تكثر زراعتة في الصين والهند والهند الصينية .

قصب الكوكشيشين

Canne de Cochinchine (F).

ساقه غليظة خضراء اللون متوسطه العصاره السكرية .

قصب الهند

Canne guinghan (F).

كبير القد يطول نحو ٤ أمتار . يملك التربة ويستزف

عناصرها الغذائية . ساقه غزيرة المادة السكرية ، صفراء

اللون مجذبة بالبنفسجي .

قصب بتافيا

Canne de Batavia (F).

أصرامه عديدة سيقانها كبيرة القصد ، مجذبة بالألوان

الدايقة والفاحة ، غزيرة العصاره السكرية .

قصب بوربون ، قصب أوتايتي

Canne de Bourbon, C. d'Otaïti (F).

ساقه كبيرة مستطيلة خضراء اللون غزيرة العصاره السكرية .

والقصب يحد في جميع الأتربة المروية الغنية بالمواد العضوية

والناصر الغذائية شرط أن لا تنفتر إلى الكلس وأن لا

تكون كثيرة الانساج || أما كمية السكر الممكن

استخراجها من عود القصب فتراوح من ١٠ إلى ١٥ ٪ من وزن العود .

٢٢١٥٦ - قَصَبَ النِّيل

Roseau canne (F).

هو القصب الروبي ، أطله .

٢٢١٥٧ - قَصَبَ بَلَكْدِي

Canne de Provence (F).

هو القصب الروبي ، أطله .

٢٢١٥٨ - قَصَبَ دَرَاكُو

Jonc de l'Inde (F).

هو أصل الهند ، أطله .

٢٢١٥٩ - قَصَبَ ذَهَبِي

Lysimaque commune (F).

هو السراجية ، أطله .

٢٢١٦٠ - قَصَبَ رُؤْمِي * ، قَصَبَ بَلَكْدِي ، قَصَبَ النِّيل

Arundo donax (S).

Canne, Canne de Provence, Roseau canne (F). Giant reed-cane (E). Ehtespfahrohr Grosses-schiff (D).

Canna comune, Canna di giardino (I).

نوع من القصب الكبير المستطيل يكثر وجوده في المناطق

المتندلة وإحارة وفي الأماكن الرطبة أخضها خضاف الأنهر

حيث يفلط ويوجد تماماً || يستعمل كسائر أنواع القصب.

٢٢١٦١ - قَصَبَ قَارِسِي ، بُوْض قَارِسِي

Arundo islaca (S). Canne de Perse (F). Persian cane (E). Persianische Pfahlrohr (D). Canna di Persia (I).

نوع من القصب الكبير القد . يكثر في المناطق وعلى

خضاف الأنهر والجداول الرطبة || يستعمل في مختلف

الصناعات القصية .

٢٢١٦٢ - قَصَبَ مَرَّ

هو السمروبا ، أطله .

٢٢١٦٣ - قَصَبَات

Bronches (F). Bronchia (E).

هي مجموعة الشعب الرئيسية والثانوية التي توين الاتصال

بين الحويصلات الرئوية والرغامي فتفسح المجال للدخول

الهواء وغروجه .

٢٢١٦٤ - قَصَبَة

Bronche (F). Bronchi (E).

اسم تعريبي يطلق على جزء من الجهاز الانبوبي التنفسي

الذي يوصل الرغامي أي قصبه الرئة بالحويصلات الرئوية .

٢٢١٦٥ - قَصَبَة

Paspale (F).

هي أبو بيض ، أطله .

٢٢١٦٦ - قَصَبَة

Roseau (F). Reed (E).

وأسدة القصب .

٢٢١٦٧ - قَصَبَة ، قَلَم

Chaume (F). Thatch (E).

ساق النجيليات كالخضلة والشبر والشوفان والذرة وغيرها .

وهي مجوفة مركبة من عدة سلاميات وعقد ينشأ عليها المصنف

أي الورق .

٢٢١٦٨ - قَصَبَة الْأَنْفِ

Chanfrein (F).

Forehead (E).

جزء من رأس الدابة يمتد من بين عينيها إلى منخرها .



قصب السكر



قصب روبي

٦٠ سم. أوراقه اهليلجية قلبية القاعدة نصلها خشن
الملس أزغب البشرة. أزهاره وردية اللون زرق المواج .
ثمارة ثاقحية الشكل حقية التركيب .

Frangible (F). **قَصِف** ٢٢١٨١

Frangible, Breakable (E).

نمت تعريفي يطلق عل ما كان سهل الانكسار او
الانخلع .

٢٢١٨٢ **قَصَف** هو اليا ، اطلبا .

Brize (F). **قَصَفَة** ٢٢١٨٣

هي البريزه ، اطلبا .

Conceptacle (F). **قَصَمَة** ٢٢١٨٤

حق يحضن اعضاء التناسل في بعض اجناس الفطور .
ج قصم .

Ostéoclaste (F). **قَصِيل** ٢٢١٨٥

Osteoclasty (E).
وعن يصيب العظم في الحيوانات اخسها الحمرة فتهش ويسهل
انصداعها وكسرهما .

Cirsium (S). **قُصَوَان** ٢٢١٨٦

Cirse (F). Horse-thistle (E).

جنس نباتات شائكة ميلولة برة من فصيلة المركبات .
انواعه عديدة منها الخولية والمحولة والمعمرة . سوقها اسطوانية
تعمل من ٥٠ الى ٣٠٠ سم . أوراقها ساعدة شائكة .
رؤوساتها كبيرة القد . أزهارها انبوية . قباياتها مهدبة
الاطراف . بزورها مغلطة مستطيلة || اعرف انواعه
واشهرها ما يتبع :

Cirsium afrum (S). **قُصَوَان افريقي**

Cirse d'Afrique (F).

C. arvense (S). Cirse des champs (F).

C. oleraceum (S). Cirse potager (F).

C. lanceolatum (S). Cirse lancéolé (F).

C. ferox (S). Cirse féroce (F).

C. spinosissimum (S).

Cirse très épineux (F).

C. libanoticum (S). Cirse du Liban (F).

C. eriophorum (S). Cirse laineux (F).

٢٢١٨٧ **قُصَوَان الحَبَال** هو الملاح ، اطلبا .

٢٢١٨٨ **قُصُوص** ٢٢١٨٨

Textor (S).

Alecto (F). Textor (E).

جنس طائر من فصيلة التوتويات . انواعه المعروفة قليلة
العدد موطنها بعض مناطق افريقية البسل والجنوبية .
تألف المراعي والاحراج البعثة الانحجار . لحمها الحياتي
جماعي افواجها قليلة العدد || اجسامها متوسطة القد تعول
من ٢٢ الى ٢٦ سم . مناقبها كبيرة مخروطية الشكل .
اجنحتها مستطيلة . اذناها مغلطة الاطراف او مستديرة ||
قوتها الحشرات والديدان وبعض البذور البرية || اعرف
انواعه واشهرها قصوص احمر المشقاد .

٢٢١٨٩ **قُصُوصُ أَحْمَرِ الْبَيْقَادِ**

Textor erythrorhynchus (S).

Alecto à bec rouge (F).

طائر من القصوص . موطنه يمتد من افريقية الجنوبية الى

٢٢١٩٠ **قَصَبَةُ الرِّثَةِ ، وَخَامِي**

Trachée-artère (F). Trachea, Windpipe (E).

النفس في الجسم الذي يوصل الحنجرة بشعبي القصبة .
وعى التي يمر منها الهواء الى الرئة ان داخلاً او خارجاً .

Tubiforme (F). **قَصَبِي** ٢٢١٩٠

Tubiform, Tubular (E).

ما كان شكله كالقصبة او الانبوب .

Trachéates (F). Tracheates (E). **قَصَبِيَّات** ٢٢١٩١

هي المفصليات التي تتحلل بجهاز تنفسي انبوبي يقابله جهاز
تنفسي شعبي .

Petite centauree (F). **قَصَة الحَيَة** ٢٢١٩٢

هي مرارة الحفش ، اطلبا .

Ronce (F). **قَصَد** ٢٢١٩٣

القصد الموج . وقصد الموج فروعه الثانية .

Etain (F). Tin (E). **قَصْدِير** ٢٢١٩٤

معدن معروف منذ زمن الفينيقيين الذين نقلوه الى مصر
قبل عهد موسى . لونه الى البياض الفضي الازرق المواج .
يصهر في ٢٢٨ °سغ ويغل في ١٢٠٠ °سغ . رمزه (Sn-)
وزنه الذاتي ١١٨,٧ ثقله الذوي ٧,٢٩ اوصاليته
الكهربائية في ٢١ °سغ . تبلغ في ١١,٤٥ || وهو اطرى
من الزنك واشد صلابة من الرصاص كما انه لا يتأثر
بالخامس النباتية والعضرات العضوية || يوجد في الطبيعة
عل هيئة اكسيد القصدير « قصديريت » Cassitérite
Oxyde d'étain .

Base du cou (F). **قَصِيرَة ، دَسِيع** ٢٢١٩٥

قاعدة العنق او ممرز العنق في الكاهل .

Gemmule (F). **قَصِيرَة** ٢٢١٩٦

هي البادرة ، اطلبا .

Cerastes cornutus (S). **قُصْرَى** ٢٢١٩٧

القصرى والقصرى نوع من القرزاء صغيرة القد خيشة
تنسج في الرمال .

٢٢١٩٨ **قَصَبَةُ الْمَاءِ ، سُرَّةُ الْبَحْرِ ، هَيْدْرُوكَيْتِل**

Hydrocotyle (S). Hydrocotyle, Ecuelle d'eau (F).

Marsh pennywort, Sheep's-bane, White-rot (E).

Nabel Necke, Wassernabel (D). Idrocotile, Scodella

d'acqua (I).

جنس نباتات عشبية برية مائية من فصيلة الخبياتية تكثر
في المناطق وفي المواق المستنعية الرطاب . انواعها عديدة.
سوقها مدادة . أوراقها ثنائية الالتشاب ، مستطيلة الزناد،
دقيقة النصل المستدير العادم الانقسام . أزهارها صغيرة
خاسية البتلات .

Scorpion **قُصْل ، قُصْلُ** ٢٢١٩٩

هو القرب . وقيل ولدا .

٢٢١٩٠ **قَصِين** ٢٢١٩٠

Sauge pommifère (F). Sage apple (E). Salbeipfel (D).

Salvia baccifera, S. Spilea (I).

نوع من القوية . يقال ان منافعه الصحية عديدة . يكثر
في الاراضي البرية المصحاة . ساقه فروعاً تعمل من ٣٠ الى



قَصَة الْمَاء



قَصِين



قُصَوَان

٢٢٢٠١ - قُصْبُص نبت ينبت في اصول الكماء (أ. م).

٢٢٢٠٢ - قُصْبَصَة Pygidium
هي آخر مفصل بطني من جسم الحشرة .

٢٢٢٠٣ - قُصْبِيع ، لُقْبِيس ، مِثْحَار Tardif (F).
Tardy, Late (E).
هو ما كان بطيء النمو او ما طال زمن نموه ان في الحيوان
ام في النبات . م. قصيبة .

٢٢٢٠٤ - قُصْبِيع ٥ Epinaste (F).
نمت تعريفني يطلق على كل نبات او جزء منه اصابت به
القصاصه .

٢٢٢٠٥ - قُصْبِيعَة * Biscutella (S).
Biscutelle (F). Biscutella (E).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة السليبيات . انواعها
المعروفة قليلة العدد . منها ما ينبت في بعض مناطق حوض البحر
الايبيس المتوسط || بعضها فراءه منتصبه . اوراقها متعاقبة .
متصالها لمعقبة ، مقلوبة ، مستطيلة النصال ، مسننة
الختار . ازهارها طرية . ازهارها صفراء اللون . ثمارها
قصيمية الشكل .
اعرف انواعها واشهرها :

٢٢٢٠٦ - قُصْبِيعَة العمود ، قُصْبِيعَة جَبَل طَارِق Biscutella columnae (S).
Biscutelle de Gibraltar (F).
اوراقها الجذعية لمعقبة الشكل ، مستطيلة النصال ،
متعاقبة التسنين . اما الساقية والفرعية فرمحية الشكل
متقاربة الاسنان . تنويرها ربيبي .

٢٢٢٠٧ - قُصْبِيعَة حَقِيقَة Biscutella genuina (S). Biscutelle vraie (F).
منبتها بعض المناطق الجافة في لبنان وسوريه . اوراقها
الجذعية متراكبة ، اما الساقية والفرعية فقليلة العدد
متعاقبة التسنين . تنويرها ربيبي .

٢٢٢٠٨ - قُصْبِيعَة مُسَنَّنة Biscutella dentata (S). Biscutelle dentée (F).
منبتها بعض المناطق اللبنانية . تتميز بكثرة عدد اوراقها
الساقية والفرعية ويكثر استنابها الحادة الشائكة . تنويرها
ربيبي .

٢٢٢٠٩ - قُصْبِيعَة ٥ Patella (S).
Patelle (F). Patella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
اماميات الخياشيم المحففة وفضيلة القصيمات . انواعها
المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على
الصخور المنورة || اصداقها جلونية او مساجية او
مظلية او اهليلجية . جميعها وسيدة المصاريع ، مالة
الغشاء الداخلى القلبي الماددة ، مخددة الغشاء الخارجي
المتباين الالوان ، مسننة الختار || اجسامها متباينة
الاحجام التي تراوح من ٣ الى ١٠ سم . اردتها رمية
فضفاضة . رؤوسها صغيرة ثنائية اللواس المعبوة القواعد
الخارجية . خياشيمها مبعومت متساوية الترتيب تطلق
الجسم تحت الرءاء || جميع انواعها مأكولة مستحبة العلم .

الشرقية . يالفت المراعي وفضات مجاري الماء حيث تكثر
تطعان البقر الرعشي والغنم . ملجئه الحيواني جماعي ،
فويجه يمد من ١٠ الى ٣٠ زوجا || جسمه متدلل القد
يطول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى السواد الفحمي . قوادم
جناحه بيض الحامض الخارجية . متفاد مرجاني اللون .
حدقة عينه كستنية . رساء الى السمره الخنطية || قوته
الخشرات والديدان والبلود ويلتقط القراد والطلع من على
ظهور الغنم والابقار || يذئ عشه في السط المشوك .
عشه غارق الرخابة والكبر ، قطره نحو ١٢٠ سم . شكله
كالصاج يملوه طوق يرتفع نحو ١٥ سم . الاثنى تضع من
٥ الى ٧ بيضات تحضنها متباوية الذكر نحو ١٣ يوما .

٢٢١٩٠ - قُصُوع ، إِذْبَاس Levée (F).
Gathering (E).
خروج الزرع من الارض او ظهور بوادر البرور على
سطح التربة .

٢٢١٩١ - قُصْبِيب * Phragmites (S).
Phragmite, Canne à balais (F). Reed (E).
نبات جذموري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه
قصية ، متتابة السلاحيات والكماير ، تطول نحو ٣
اتار . اوراقه غمدية ، حاشية ، عصفية النصل الجامد ،
المسنن الحافة ، البحري اللون || ازهاره عالمي الارتكاز ،
يشكل مجموعة من السنايل المتتابة . ازهاره بنفسجية اللون ||
منته جميع الاصماغ المتعددة الحرارة من العالم القديم .
يكثر وجوده في المواقع الرطبة وعلى ضفاف مجاري الماء ||
ويدعى في مصر والسودان « الحنطة » .

٢٢١٩٢ - قُصْبِيب Tube
هي في بعض النباتات انبوية الزهرة التي ترتكز عليها
البتلات . ج. قصاب .

٢٢١٩٣ - قُصْبِيب الجَذْع Brévicaque (F).
Brevicaque (E).

٢٢١٩٤ - قُصْبِيب الجِنَاح Brévipenne (F).
Brevipennate (E).

٢٢١٩٥ - قُصْبِيب الرُسْع Court-jointé (F).
Short-patterned (E).
من كان رسنه دون المدلل الوسط وهو من عيوب الخيل .

٢٢١٩٦ - قُصْبِيب العُمُر Brachybiote (F).
نمت تعريفني يطلق على كل حيوان قصير العمر من اي
جنس كان .

٢٢١٩٧ - قُصْبِيب القَدَم Brépède (F).
Brevipède (E).

٢٢١٩٨ - قُصْبِيب المِنَقَار Brévirostre (F).
Brevirostrate (E).

٢٢١٩٩ - قُصْبِيبَات القُرُون Brachycera (S).
Brachycères (F). Brachycera (E).
لثة خشرات من ذوات الجناحين فصائلها واجناسها وانواعها
نحو ٢٥٠٠٠ اعطتها جميع اصقاع العالم || اشهر
فصائلها : اللبابيات والبريات والعنبريات والبريات
والهبيات .

٢٢٢٠٠ - قُصْبِيبَة القَلَم Brachystylée (F).
نمت تعريفني يطلق على كل زهرة قصيرة قلم السمة .



قُصْبِيب



قُصْبِيبَة



قُصْبِيبَة



قَصَب أَحْجَن الْمَغَاد

٢٢٢١٧ - قَصَب لَبْنَانِي Vinca libanotica (S).
Pervenche libanaise (F). Lebanon Periwinkle (E).
نوع من القصاب. عشية طيبة معمرة. منبهاً يمتد من السواحل اللبنانية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ متر عن سطح البحر. ساقها مسطحة لا مجاذرة. أوراقها متعاقبة، حاشنة، مستطيلة الأضلاع، نصلها شبه قلبية الشكل، جملة الخضار، جرداء البشرة. أزهارها محورية الإزهار، منعقة، خماسية البتلات، زرقاء اللون، وقد تكون بيضاء في بعض المواقع || أرواقها الخضراء والجلقة لا تخلو من المنافع الطبية أعصمها في السيلان وانقطاع الطمث. وقد تحوي بعض الفيتامينات الكثيرة النفع.

٢٢٢١٨ - قَصَب مُسَطَّح Vinca herbacea (S).
Pervenche herbacée (F).
عشبة برية معمرة تلبّل وتذوي في الشتاء. ساقها مسطحة تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أرواقها اهليلجية مهدبة الحتار. أزهارها إلى الزرقاء البنفسجية || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.



قصاب صغير

٢٢٢١٩ - قَصَب وَرْدِي Vinca rosea (S).
Pervenche rose, P. de Madagascar (F).
نوع من القصاب العمر وقد يزرع كحولي في البلاد المعتدلة الحارة. ساقه مستقيمة لينة تطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها اهليلجية مقبولة القاعدة. أزهارها متوسطة القد، وردية اللون || أزهارها يستمر من الربيع إلى الخريف.

٢٢٢٢٠ - قَصَابَة Vollis (F). Lop and top (E).
الأغصان والأفئدة المفصولة عن الشجرة.

٢٢٢٢١ - قَصَابَة *، تَعَلَب الْمَاء، قُنْطَس Lutra (S). Loutre (F). Otter (E).
جلس حيوانات لبونة من السعوييات ورتبة الأوسم. أنواعه ثمانية موطنها ضفاف وجرف بعض الأنهار الآسيوية والاروية والأمريكية. بجيها قاذبة. قوتها الأسماك. أجسامها مستطيلة، رؤوسها عريضة، قوائمها قصيرة، حظ أصابعها تمينا على السباحة. أذنانها طويلة. ألوانها كهيئة الورب القصير. ألوانها إلى الجؤوة موانجا يختلف باختلاف الأنواع.



قصاب كبير

٢٢٢٢٢ - قَصَابَة، هَيْج Etiolement (F).
Etiolement, Sickness (E).
اضفرار النبات وتحوله من جراء فقدان الخصب سببه الظل أو الطمر أي قلة النور أو اعتدائه.

٢٢٢٢٣ - قَصَام ثبت من الحمض وقيل هو الطحما.

٢٢٢٢٤ - قَصَانِي Judiciaire (F). Judiciary (E).
كل ما هو مختص بالقضاء.

٢٢٢٢٥ - قَصْب Luzerne (F).
هو القصة. الطلها.

٢٢٢٢٦ - قَصْب Recéper (F).
To cut down close (E).
قصب الكر. قطع أغصانه أيام الربيع.

٢٢٢٢٧ - قَصْبَة * Dendrochélidon (S).
Dendrochélidon (F).
جنس طير من الجواثم مشروب الماء المنقوع وفصيلة البانيات. أنواعه المعروفة خمسة. أعطانها تمتد من الهند إلى جزر

٢٢٢١٠ - قَصْبِيَّات * Patellidae (S).

Patellidés (F). Patellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الأبرجل أمابيات الخياشيم الحلقية. أجسامها قليلة العدد اما أنوعها فثلاثة منتشرة في جميع بحار العالم. تعيش على الصخور المغسورة قرب الشواطئ || أعرف أجسامها وأشهرها القصبيّة والشكلوة.

٢٢٢١١ - قَصِيل زرع الشمر يحرق أخضر لعلّ الدواب.

٢٢٢١٢ - قَصْ، قَصَص، قَصَّة Gravier pour béton (F). Gravel of concrete (E).
حصى صغيرة القد متساوية الحجم حادة المكسر تستعمل في الباطون.

٢٢٢١٣ - قَصَب أَحْجَن الْمَغَادَة *، أَبُو قَصَام Xiphorhynchus procureus (S).
Falcistroie à bec en sabre (F).

نوع من القصاب. طائر من فصيلة الطيوريات. موطنه بعض مناطق أمريكا الجنوبية وأغصها الغويان. يألف الأراجيح الجبلية حيث يكثر الرق والوقل || جسمه معتدل القد بطول نحو ٢٥ سم. بما فيه المنقاد الذي يبلغ ٧ سم. يتميز بمنقاده المستطيل الأحسن كالحسام العربي وبذيله المستطيل السدير الطرف. ثوبه متداخل الألوان. رفاقه ويطنه إلى السمرة الزيتية الموحج. زوره أبيض. رأسه وصفه وصفه إلى البياض الأصفر يعلوه تشريح مستطيل احمر. جناحاه وذنبه إلى الجؤوة. حدقة عينه كستنية اللون. منقاده وساقه إلى الشقعة السوداء || طائرانه خفيف الحركة، قصير السوط. قوته البندان وأسابع الخشرات يتلصصا إينا كانت بواسطة منقاده المستطيل || يدئن عشه في تجاويف الأشجار. الآن تقف من بيضتين إلى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً.

٢٢٢١٤ - قَصَب، عَنَابَة، وَنْكَ Vinca (S). Pervenche (F). Periwinkle (E). Sinngrün (D). Pervinca (I).

جلس نباتات عشية ومخشوشة من فصيلة الدفليات. أنواعه ١٢ معظمها بري وبعضها زراعي زينة. أرواقها متعاقبة منعقة كاملة. أزهارها أبوية فردية طويلة الزناد قمية الكأس خماسية البتلات، يكثر فيها اللون الأزرق. أشهر أنواعه ما يتبع:

٢٢٢١٥ - قَصَب صَغِير *، قَصَب مِصْرِي Vinca minor (S). Petite pervenche, Violette des serpents (F).

نوع من القصاب للممر ضرره عديده. ساقها مخشوشة فراء تعلو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أرواقها منسوجة بالابيض أو بالأصفر. أزهارها عادية أو مكسبة منها الابيض والأزرق والبنفسجي والوردي والاحمر || أزهارها يستمر من شباط إلى حزيران.

٢٢٢١٦ - قَصَب كَبِير * Vinca major (S).
Grande pervenche, Violette des sorciers (F).

نوع من القصاب للممر. ساقه مخشوشة فراء تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه صغيرة القد، نصلها سناني الشكل، قلبية القاعدة، منسج الصلصة أو مطوق الحتار بالأصفر. أزهاره كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها إلى الزرقاء الجبلية || أزهارها يستمر من آذار إلى حزيران.



قَصَابَة

S. sempervirens (S). **قَضْبِيب الذهب الدائم الخضار**
Verge d'or toujours vert (F).

S. latifolia (S). **قَضْبِيب الذهب العريض الورق**
Verge d'or à larges feuilles (F).

S. graminifolia (S). **قَضْبِيب الذهب العصي الورق**
Verge d'or à feuilles de graminée (F).

S. multiflora (S). **قَضْبِيب الذهب الكبير الزهر**
Verge d'or multiflore (F).

S. canadensis (S). **قَضْبِيب الذهب الكندي**
Verge d'or du Canada, Gerbe d'or (F).

S. serotina (S). **قَضْبِيب الذهب المتخار**
Verge d'or tardive (F).

S. virga-aurea (S). **قَضْبِيب الذهب المبدول**
Verge d'or commune (F).

S. nutans (S). **قَضْبِيب الذهب المنحني**
Verge d'or penchée (F).

Bactériacées (F). **٢٢٢٢٧ - قَضْبِيبَات**
Bacteriaceae (E).

فصيلة من البكتيريا تتميز بشكلها القضيبي . خلاياها
أسطوانية مستقيمة تنقسم عمودياً وباتجاه واحد . أجناسها
ثلاثة : البكتيريوم والبسيلوس والذوائف . أما الأنواع
فمديدة وهي مذكورة في مواقعها التسلسلية .

Procès (F). Law-Suit (E). **٢٢٢٣٨ - قَضْبِيَّة**
هي النزاع الذي يعرض على المحكمة .

Affaire en état (F). **٢٢٢٣٩ - قَضْبِيَّة مُعَدَّة للحكم**
هي القضية التي استوفيت فيها المرافعات .

Chat (F). **٢٢٢٤٠ - قَطْ**
هو السنور ، أظليه .

Serval (F). **٢٢٢٤١ - قَطْ - تَغِير**
هو البج ، أظله .

Gangas, Pterocles (F). **٢٢٢٤٢ - قَطَا**
Pterocles, Sandgrouse (E).

جنس طير من فصيلة الجولبيات وأحده قَطَا وقَطَاظ . أنواعه
عديدة جميعها قريبة الشبه من الحام تتميز باستطالة ودفق
ريشيتين من أفنيكها تكشطان الذنب . وهي سريعة
الطيران تطير مسافات شاسعة في طلب القوت والماء .
تألف الغيائي ، قوتها الحبوب والبرور ونواحي بعض
النباتات . تعيش أسراباً كبيرة . تدفن في أفصوص ترصمه
بالقش والوبر . أنانها تحضن أربع بيضات صغيرة القذ
مرقطة || وتوصف القطا بالهادية والعروب تضرب بها المثل
في ذلك . ومن قول الشاعر :

« الناس اهدى في القيتح من القطا
واضل في الحسنى من الغربان »

وقيل في وصفها :

« أما القطا فاني سوف انتها
نمتاً يوافق معنى بعض ما فيها »

« سكا مخضوسية في ريشها طرف
سود قوادما صهب غوائفها »

أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع .

الزرايع وبعض الاقاليم الافريقية || أجناسها صغيرة تطول
من ٢٠ الى ٢٢ سم . أجنحتها ضيقة مستطيلة . أذناها
قارئة . رقابها بالغة الطول . اثوابها الى السواد الأسع يملو
مواج اغفر او بنسجي . محاسرها مخططة بالأبيض .
صدورها وبطنها الى البياض الاغبر || ملاحظها الحياتية
جرامية . تدفن عشائها في قم الانجرار الباسقة . الاثنى
تحضن من بيضة الى بيشتين ثلاث مرات في الحول .

٢٢٢٢٨ - قَضْبِيَّة ، سَرْح ، طَرْح
Cadaba (S). Cadaba (F). Esel-wood (E). Ezelbaum
(D). Cadaba (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . أنواعه قليلة .
جميعها مجبريات ونباتات سرحة او شائكة . أوراقها كاملة
متقابلة ، تلتصلا جانبا للشيخ ، بحري اللون . أزهارها
فردية ، محورية وتاجية . ثمارها قرنية أسطوانية ، لوها
الى الخضار البحري ، لبابها جانبا المكسر غزير العصاراة
الحامزة المرة || يقال ان عصارها تلثم الجرح وتطرد
الديدان المعوية .

٢٢٢٢٩ - قَضْبِيَّة
نبت من الحنص ينبت في السهل . ج قضات .

Terrain peu caillouteux (F). **٢٢٢٣٠ - قَضْبِيَّة**
Pebble ground (E).
هي التربة القليلة الحصى . اما التربة الكثيرة الحصى
فتدعى حصية .

Pépins de raisin sec (F). **٢٢٢٣١ - قَضْي**
هو بزر الزبيب اني العنب الخفيف .

Pénis (F). Penis (E). **٢٢٢٣٢ - قَضْبِيب**
اسم شامل يطلق على ذكر كل حيوان .

Branche (F). Branch, Bough (E). **٢٢٢٣٣ - قَضْبِيب**
كل نبت من الأغصان يقضب . ج قضب وقضبان .

Ente (F). **٢٢٢٣٤ - قَضْبِيب التظعيم**
Graft, Branch bearing a graft (E).

قضبب او غصن دقيق له من زيمة واحدة الى ثلاث زيمات
وهو يصلح لتظعيم وقد يستعمل لعملاً للشرة .

٢٢٢٣٥ - قَضْبِيب الحَمَل
Courson, Coursonne (F). Shoot cut down to three-
or four eyes (E).
كل قضيب قلم وتركه على ثلاث الى أربع براعم ثمرة .

٢٢٢٣٦ - قَضْبِيب الذهب * ، عَصَا الذهب
Solidago (S). Solidage, Verge d'or (F). Golden-rod,
G. wings (E). Goldrute (D). Solidago, Verga
aurea (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة المركبات الشاعية الزهر .
أنواعه نحو ٦٠ معظمها عشبي وبعضها جبني . أوراقها
متقابلة رمية . أزهارها ضيقة شعاعية متتالية جميلة الشكل
صفراء اللون || أعراف أنواعه وأشهرها :

S. glabra (S). **قَضْبِيب الذهب الأجرد**
Verge d'or glabre (F).
S. bicolor (S). **قَضْبِيب الذهب الثنائي اللون**
Verge d'or bilocore (F).
S. rigida (S). **قَضْبِيب الذهب الجامد**
Verge d'or rigide (F).



قَضْبِيَّة



قَضْبِيب الذهب



قطاة كدرية



قطاس



قطاس

٢٢٢٥٢ - قُطَّاس * ، قُوتَّاش ، خُشَقَّاء ، يَّاك

Poephagus (S). Yack (F). Yak (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة البقرليات أنواعه المعروفة اثنتان موطنها جبال التبت من ارتفاع ٢٤٠٠ إلى ٥٠٠٠ م. من سطح البحر || والقطاس حيوان كبير الخنثى يعلو من ١٦٠ إلى ١٨٠ سم. وزنه من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ كيلو. شكل جسمه يأخذ من البيسون والجاموس والثور. رأسه كراس الثور إلا أنه محدد القحف، مستطيل القرون المنصبة. خنثاه متباعدتان، عيناها كيرتان، أذناه مستطيلتان. قوائمها قوية. ثوبه إلى السرة المايقة السوية تملؤها رقشة صباه. خطمه وذعره وزممة ذنبه بيض. ذنبه يشبه ذنب الفرس وكان الترك يزبون فيه العلم. قوته الاعشاب. سربه كثير المدد. انثاه تضع مقغوراً واحداً في الحول يسير وراء أمه فور وضعه || أما ثوبها فيها:

P. mutus (S). Yack muet (F).

القُطَّاس الاخضر

القُطَّاس الاخضر (F). Yack commun (F). وهناك القُطَّاس الداجن وهو ضرب من الاخضر يشمل بعض الفروق. يستعمل في الجر والنقل والحراثة. حليب انثاه غزير المادة السكرية، مستحب الحرف.

Secteur, Domaine (F).

٢٢٢٥٣ - قُطَّاع

Sector, Domain (E).

Coupe (F). Cutting (E).

٢٢٢٥٤ - قُطَّاعة

٢٢٢٥٥ - قُطَّاف ، خِرَاف ، صِرَاف

Cueille (F). Gatching (E).

اجتباء النمر او غلافه من الانتاج النباتي عند الادراك.

Vendange (F).

٢٢٢٥٦ - قُطَّاف الكَرَمَة

Vintage, Grape-gathering (E).

اجتباء عنايق العنب او وزن قطاف العنب.

Polyandrie (F).

٢٢٢٥٧ - قُطَّامة °

Polyandry (E).

القُطَّامة تعدد الأزواج عند المرأة الواحدة.

Rostrhamus (S).

٢٢٢٥٨ - قُطَّامِي * ، قُطَّامي

Rostrhame (F).

جنس طير من حمارة الحداء وفصيلة الصقرات. أنواعه ثلاثة موطنها البلاد الحارة. وهو عزيز الوجود، كبير الجفء، يبتدر من اعظم الطيور التي يصاد بها || يألف البحيرات وبحاري الماء. يطن عشه في الاشجار القربية من الماء. انثاه تبيض وتحضن من رقتين إلى ثلاث وفئات مستطيلة الشكل طعلاء اللون.

Légumineuses (F).

٢٢٢٥٩ - قُطَّانيَّات

هي الفريزات فصيلة نباتية، اطلمها.

Henné (F).

٢٢٢٦٠ - قُطَّب

هو الحناء، اطلمها.

Pôle (F). Pole (E).

٢٢٢٦١ - قُطَّب

القطبان، جغرافياً، هما طرفا محور الارض الذي يمر بمركز الكرة الارضية، وهما القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وتبلغ المسافة بين خط الاستواء وبين كل من القطبين نحو عشرة الاف كيلومتر. اما القطر القطبي للارض فهو

Catapodium (S).

٢٢٢٤٣ - قُطَّاب °

Catopode (F). Catapodium (E).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات. يألف اليرال البحرية. يبتدر من النباتات الطوعية في لبنان.

٢٢٢٤٤ - قُطَّاة الرمال، دَيلم

Pterocles arenarius (S). Ganga des sables (F).

أكبر أنواع القطا. طوله نحو ٣٥ سم. ثوبها إلى الصهبة الحمراء يعلو توشيح رمادي واسفر. بطنها عاني اللون. متقاربا اسود. موطنها شاسع الاطراف يمتد من رمال آسية إلى رمال افريقية.

٢٢٢٤٥ - قُطَّاة شَرْقِيَّة ، جُونِيَّة

Pterocles orientalis (S). Ganga oriental (F).

طائر من القطا. طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه إلى الصهبة الخنثية يعلو توشيح ابيض ارقط. صدره إلى الجؤزة الباهة، يعلو إلى السرة، متقاربا وبطن جناحيه وقواديه إلى السواد. موطنه فياني الشرق الأدنى.

٢٢٢٤٦ - قُطَّاة صَحْرَاوِيَّة ، عَطَّاط

Pterocles exustus (S). Ganga brûlé (F).

طائر من القطا متوسط القد طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه إلى الصهبة الخنثية تملو رقشة إلى الجؤزة الفاتحة الزاهية. صدره ويعلو إلى الصفرة الموشمة بالاسمر || سربه متوسط المدد. موطنه الصحاري.

٢٢٢٤٧ - قُطَّاة كُدْرِيَّة * ، كُدْرِيَّة

Pterocles alchata (S). Ganga cata (F). Large painted sandgrouse (E).

طائر من القطا. طوله نحو ٢٧ سم. ثوبه إلى البهرة ارقش الظهر والبطن. اسفر الخلق. اسود الحنار. موطنه فياني صحاري الشرق الاوسط وافريقية الشمالية والغربية. اصرابه كثيرة العدد.

٢٢٢٤٨ - قُطَّاة مُرَقَّطة

Pterocles senegallus (S). Ganga du Sénégal (F). Spotted sandgrouse (E).

طائر من القطا. صغير القد طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه إلى الصهبة المرقطة بالاسمر والاخر || موطنه رمال السنغال والصحراء الكبرى.

٢٢٢٤٩ - قُطَّاة مُكَلَّلَة

Pterocles coronatus (S). Coronetted sandgrouse (E).

طائر من القطا. صغير القد طوله نحو ٢٦ سم. ثوبه إلى الصهبة الغبراء تملو رقشة حمراء. رأسه ناشز بعض الريش الذي يبدو كالأكليل. سربه متوسط المدد. موطنه المناطق الاستوائية افريقية.

٢٢٢٥٠ - قُطَّاة مُوَشَّحة ، دَليم

Pterocles lichtensteinii (S). Ganga rayé (F). Close-barred sandgrouse (E).

طائر من القطا متوسط القد، طوله نحو ٢٨ سم. ثوبه إلى الصهبة الغبراء يعلو توشيح اسمر يقطب السواطط والذيل. صدره اطلل ارقش. يعلو وزمكا إلى البياض التي. سربه متوسط المدد. موطنه افريقية الاستوائية.

٢٢٢٥١ - قُطَّارَة ، مَشْفَاف

Compte-gouttes (F). Drop-tube (E).

انبوب من قزاز مدب الطرف المستدق يستطاع بواسطته تنقيط الحواد السائلة نقطة نقطة.

نشوية مأكولة. شراخها يعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ازهارها عاجية البتلات، صفر الاسدية. اوراقها قرصية. الانتشاب، كبيرة القد، زيادها يطول نحو المتر. ازهارها صيني.

٢٢٢٧٥ - قُطْبَة عَالِمَة، سَهْمُ المَاءِ العَالِمِ

Sagittaria natans (S). Sagittaire flottante (F). عشية سبروتية ترينية معمرة تعيش في الأكواريوم. شراخها يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها قرصية الانتشاب، طويلة الزناد، نصلها لا قياسي الشكل والحجم يوم عل سطح الماء. ازهارها ضئيلة الحجم، بتلاتها بيضاء اللون شفافة || ازهارها صيني.

٢٢٢٧٦ - قُطْبَة تَجْلِيَّة، سَهْمُ المَاءِ التَجْلِي

Sagittaria graminea (S). Sagittaire graminée (F). عشية ترينية زهرة. شراخها دقيق نحيل يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها قرصية وشرخاها فalciforme مستطيلة الزناد، نصلها متوسط الحجم عايق الخصار اما الشراخية الهوائية فضيقة النصل اللاطي البات الخصار. ازهارها ملاقية. اسديتها كبيرة رافعة الجسم، حليمة البثرة. ازهارها صيني.

٢٢٢٧٧ - قُطْبَة هَاتِكَة، سَهْمُ المَاءِ الهَاتِكِ

Sagittaria heterophylla (S). Sagittaire hétérophylle (F). عشية جادسة معمرة مهدا أمريكية الشالية. شراخها يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها السفلى لاطقة مربعة، ازهارها العليا منقطة مجدية. اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة الزناد. نصلها هاتك الشكل والحجم واللون. ازهارها صيني.

٢٢٢٧٨ - قُطْبَرُوس

Catabrosa aquatica (S). Catabrose aquatique (F). نبات عشبي يري حولي من فصيلة النجيليات. منيته ضفاف مجاري الماء. يعتبر من النباتات الطوعية في لبنان.

٢٢٢٧٩ - قُطْبِي

نبات يصنع منه حبل مرم وهو خير من الكنبار (اللسان)

٢٢٢٨٠ - قُطْبِي
نمت تمرني يطلق على كل ما له صلة بالقطب.

٢٢٢٨١ - قُطْبِيَّة
خاصة اتجاه الايزة المنقطة الى القطب.

٢٢٢٨٢ - قُطَّة
التقيق من البليغ وغيره. تقول هات قطة من البليغ.

٢٢٢٨٣ - قُطْر
خط مستقيم يمر بمركز الدائرة وينتهي عند طرفيها المتقابلين فيقسمها الى قسمين متساويين. وهو في مساحته ثلث المحيط. وقطر المربع والمستطيل والمعين والشبه بالمعين هو الخط المستقيم الواصل بين الزاويتين المتقابلتين من هذه الاشكال.

٢٢٢٨٤ - قِطْرَاس حَقْلِي

Lycocoris campestris (S). Lycocoris champêtre (F). حشرة مفترسة من فصيلة القترسيات. جسمها صغير القد

اقصر من قطرها الاسوائي بنحو ٤٣ كيلومتراً. والقطبان مغنطيسياً يتجاذبان اذا كانا مختلفين، موجب وسالب، ويتنافران اذا تشابه.

٢٢٢٩٢ - قُطْب جَنُوبِي
Pôle sud (F). South pole (E).

٢٢٢٩٣ - قُطْب حَيَرَاكِي
Pôle animal (F). Animal pole (E).

٢٢٢٩٤ - قُطْب سَالِب
Cathode (F). Negative pole (E). هو المهبط، اعليه.

٢٢٢٩٥ - قُطْب تَجْلِي
Pôle nord (F). North pole (E).

٢٢٢٩٦ - قُطْب مُتَوَلَّد
Pôle conséquent (F). Consequent pole (E).

٢٢٢٩٧ - قُطْب مَغْنَطِيسِي
Pôle magnétique (F). Magnetic pole (E).

٢٢٢٩٨ - قُطْب مَرْجِب
Anode (F). Positive pole (E). هو للمعد، اعليه.

٢٢٢٩٩ - قُطْب نَبَاتِي
Pôle végétal (F). Vegetal pole (E).

٢٢٢٧٠ - قُطْبَان *
Brachypodium (S). Brachypodium, Brome chiendent (F). False brome grass (E). Kurzstamm, Zwenke (D). Pale, Pennacchi (I).

نبات عشبي يري من فصيلة النجيليات قريب الشبه من المكروش يكثر في البور وفي الاراضي الموحدة يرعا المال ويسمن عليه. وهو اذا كثر بين الزروع وفي الاراضي المزروعة استوجب الابادة.

٢٢٢٧١ - قُطْبَة
Ketupa (F). هي الخورن، طائر من البويات.

٢٢٢٧٢ - قُطْبَة *، سَهْمُ المَاءِ
Sagittaria (S). Sagittaire, Fléchière (F). Adder's tongue, Arrow-head (E). Pfeilkraut (D). Sagittaria, Barba silvana (I).

جنس نباتات عشبية، جذمورية، مائية، معمرة، من فصيلة الزمريديات. انواعه ١٧ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمعتدلة اوراقها سهمية الشكل، مستطيلة الزناد قرصية الانتشاب. ازهارها ثلاثية التركيب والتجميع ينلب فيها اللون الابيض ثم الاحمر || اشهر انواعه ما يتبع.

٢٢٢٧٣ - قُطْبَة شَالَعَة، سَهْمُ المَاءِ الشَالَعِ
Sagittaria sagittifolia (S). Sagittaire commune, Sagette, Flèche d'eau (F).

عشبة ترينية سبروتية معمرة مبلولة في المناقع والاحواض. تعلمو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها قرصية وشرخاها فalciforme طويلة الزناد كبيرة القد مستعرضة اما الشراخية الهوائية فضيقة السنان عادمة الزناد. ازهارها ضئيلة، ثلاثية او خماسية التجميع. بتلاتها شفافة النسيج، بيضاء اللون، وردية الحمار || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٢٢٧٤ - قُطْبَة صِيْنِيَّة، سَهْمُ المَاءِ الصِيْنِي
Sagittaria sinensis (S). Sagittaire de Chine (F). عشبة ترينية سبروتية معمرة مهدا الصين. جذميرها



قطبان



قطبة

Lagocle (F).

٢٢٢٩٠ - قَطْرَب

نبات عشبي بري ، طبي ، من السكيات يدعى لغوثيا ، اطلبا .

٢٢٢٩١ - قَطْرَب

القطرب ، ويدعى ارطيون ، نبات شائك الازهار ، ينشب بمن يمر به . راجع ارطيون .

Clibanarius (S).

٢٢٢٩٢ - قَطْرَبَة

Clibanarius (F). Clibanarius (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الاربيل طوال الذيل وفصيلة الباغوريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || تعيش في الاغوار قرب الشواطئ . ملجأها الحيائي جاعي ، جامعاها متوسطة العدد || اجسامها تطول من ٤ الى ٦ سم . اناؤها زاهية الالوان الجميلة وبعضها مجذع .

Alkalurops

٢٢٢٩٣ - قَطْرَبُوس

القطربوس نجم من كوكبة المواء مركزة على رأس البقار اي المواء .

Diomedea (S).

٢٢٢٩٤ - قَطْرَس *

Albatros (F). Albatross, Diomedes (E).

جنس طيور بحرية من كليات القدم . موطنها البحار الجنوبية من جهتي خط الاستواء . انواعها سبعة جميعها كبيرة الحجم ، عظيمة القد ، طولها يراوح من ١٦٠ الى ١٨٠ سم . وبسالتها تراوح من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم . وهي طيور فصقل وتقوم قشرب وتسرع وتنطس فتجيد ذلك . اناؤها الى البياض باستثناء اجنحتها السوداء اللون او اللحماء . مناقيرها كبيرة القد ، منمنقة المنسر ، حنطية اللون ، صفر المولج || قوتها الاسماك والقشريات والجليف البحرية . تدنن في افصوص ترصده بالفتش . حفنتها بيضة واحدة ترخمها نحو حصة اسابيع .

٢٢٢٩٥ - قَطْرَس مَرْتَبِك

Anthocoris confusus (S). Anthocoris confus (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٤ م . رأسها صغير الحجم ، اسود . غطتها معتدل الطول . عينها صغيرتان . زباناها دقيقتان ، مبرتا . الحلب . كوسلها اسود وحجبتها كذلك . ظهرها لاسن يتجاوز البين بزائين . بطنها الى السرة السوداء . قوائمها الى الشقحة السوداء || تألف المواقع التي يتكثر فيها الحور والصغافور . تعيش تحت القشور . قوتها ما تقتضيه من حشرات .

Anthocoridae (S).

٢٢٢٩٦ - قَطْرِسيات *

Anthocoridae (F). Anthocoridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة لطيفة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، معتدلة التبيط ، ملونة . رؤوسها صغيرة . اعظامها نشيطة ، لثلاثية الاجزاء . عيونها جانبية ، ناشزة . قوتها الاستعمارية رباعية الفصيل . كوسلها محبة . حنطتها صغيرة . ظهرها وروافها لاصقة في معظم الانواع . حناجب ظهرها لثاقبة ، تكثر فيها منظر الاسطالة . قوائمها صغيرة || الحشرة الجميلة مفترسة في

يطول نحو ٤ م . رأسها محرمس ، جزوي اللون . غطتها معتدل الطول . عينها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها دقيقتان ، مهابان . كوسلها بني اللون ، جزوي المولج . حنطتها صغيرة . ظهرها لا يلحف كامل البطن ، حنطتها بلون الكوسل بعلوها تدبج حنطتي ونعثة سمراء . بطنها الى الحقرة الباهتة . قوائمها حنطية || تألف الغابات . قوتها الحشرات الصغيرة والهوام .

Goudron, Poix (F).

٢٢٢٩٥ - قَطْرَان ، قِير

Tar, Pitch (E).

مادة راتنجية تستخرج بالتقطير من اشعاب الصنوبر والتنوب والسرو وغيرهما . ومن الفحم الحجري .

Goudron de bois

قطران الخشب

Goudron de houille, Coal tar

قطران الفحم الحجري

يجمد في الهواء ويستعمل لطلاء جروح الشجر .

Sapin gracieux (F).

٢٢٢٩٦ - قَطْرَانِي

هو التنوب الجليل ، اطلبه .

Sapin de Cilicie (F).

٢٢٢٩٧ - قَطْرَانِي اَصْفَر

هو التنوب الاناضولي . اطلبه .

٢٢٢٩٨ - قَطْرَب

جاء في كتاب الجاحظ : « القطرب طائر يحول الليل كله لا ينام . وقالوا اجول من قطرب واسهر من قطرب » .

Colobus (S).

٢٢٢٩٩ - قَطْرَب * ، قَطْرَب

Colobe (F).

جنس قرد من فصيلة الهباريات . انواعها المعروفة ١٢ جميعها افريقية تألف غابات واسراج المناطق الاستوائية وما جاورها || اجسامها رشيقة القوام تطول من ٦٠ الى ٨٠ سم . تتميز بالعدم اهم ايديها . اناؤها حنطة الشعر . اناؤها تختلف باختلاف الانواع فيها الاسود والابلق والاسمر والاصهب . اذناها تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم . || قوتها الثمار والحبوب والجلود . تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٥٠ . اناها تضع جروا واحدا ترصمه نحو ٥ اشهر || اما انواع القطراريب فهي :

C. palliatus (S).

قطرب ابيض الناصب

C. à épaules blanches (F).

C. angolensis (S). C. d'Angola (F).

قطرب انكولا

C. ferrugineus (S).

قطرب حديدي اللون

C. ferrugineus (F).

C. ursinus (S). C. ourson (F).

قطرب دني

C. kirki (S). C. de Zanzibar (F).

قطرب زنجبار

C. Satanas (S). C. satan (F).

قطرب ساتان

C. guereza (S). C. guérez (F).

قطرب غروزي

C. vellerosus (S). C. à fourrure (F).

قطرب فروي

C. foal (S). C. de Foa (F).

قطرب فوا

C. cristatus (S). C. à huppe (F).

قطرب تباراني

C. fuliginosus (S). C. fuligineux (F).

قطرب كتي

C. polycomus (S). C. à camail (F).

قطرب مردن



قطرب



قطرس

قليلة العدد. تألفت الاغوار والمناقع وضفاف مجاري المياه العذبة || اجسامها مستطيلة ، اسطوانية الشكل او قرصية. رؤوسها مبطلعة الجرم ، شبه مخروطية الشوذن. جميعها رباعية القوائم والاصابع || اعرف اجناسها واشهرها القطروس والتقطور .

٢٢٣٠٣ - قَطَرُورٌ * Chotorhea (S).

Chotorhé (F). Chotorhea (E). طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الغنثائيات. موطنه يمتد من الهند الى جزر الزابج. يألف الرياض والحراج القريبة من مجاري الماء || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٧ سم. يتميز بكون منقاده الصليح اللبنة غروبية الشكل وباستطالة سباله التي تمتد حتى الزور. جناحاه معتدلا الطول. ذنبه عشاري الرقال ، مستدير الطرف. ثوبه العلوي الى الخضار الالامس. واسفله احمر. يحسره الى الزرق. عيناه كبرتان ، مملوحتان بالاخر. سدقة عينه ذهبية اللون. عنقه واعل صدره الى الزرق المرقوشة بالابيض. يطنه وافتيكه الى الخضار الاصفر المواج. منقاده ورسفا واصابعه الى الطحله السمره || قوته الحشرات من صغيرها الى كبيرها وبعض الباز اعصها العنبيية وبعض البلور || يذئن افحومه في حجر يحفره في التربة. الانثى تبيض ٣ الى ٤ بيضات تحضنها متناوبة الذكر نحو ١٣ يوما.

٢٢٣٠٤ - قَطَرِيّ Diamétral (F). Diametrical (E).

ما كان تابعا للقطر ككوكب خط قطري .

٢٢٣٠٥ - قَطَع ، قَطْل Abattage, Coupe (F). Felling (E).

فصل الاشجار من اربامها وطرحها على الارض .

٢٢٣٠٦ - قَطْع الْوَدَج Jugulation

احدى طرائق جزر الماشية .

٢٢٣٠٧ - قَطْع طُولِي Section longitudinale (F). Longitudinal section (E).

٢٢٣٠٨ - قَطْع مَخْرُطِي Section conique (F). Conic section (E).

٢٢٣٠٩ - قَطْع تَالِص Ellipse

٢٢٣١٠ - قَطْعَاوَات هي عديمات الارجل ، اطلبها .

٢٢٣١١ - قِطْعَة Parcelle (F). Parcel, Portion (E). هي القطعة من الارض التي تولدت في مفهوم المساحة وحدة عقارية .

٢٢٣١٢ - قِطْعَة الْفَرَس ، فَرَس صَغير Petit cheval (F). Equuleus (E).

قطعة الفرس او الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بالقرب من كوكبة الفرس الاظم || نجومها قليلة العدد منها اربعة مزدوجة ونجمان مثلثان . اشهرها « ثير قطعة الفرس » .

٢٢٣١٣ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، اختَفَرَف ، خَرَفَت ، جَتَى Cueillir (F).

To gather, To cull, To pluck (E). اقتطف الانتاج من صدره كالثمار من الاشجار والازهار من السوق والاغصان والاوراق من النبات ، الخ .

جمع الانواع . اما البرقة فانها تعيش على النبات وتحت لها الاجنحار حيث تقترس ما تستطيع من حشرات ودويبات .

٢٢٢٩٧ - قَطَرَم Nepeta (S).

Népète, Cataire, Chataire (F). جنس نباتات عشبية عطرية برية معمرة من فصيلة الشفويات. انواعه نحو ١٠٠ معظمها افرقي المنبت يتكرر في البراري الرطبة . سوقها مستقيمة فراء . اوراقها متقابلة معنفة يضيية الشكل ، نصلها سنن الحافة ، خلى الصفحة السفلى . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها فواحة العرف الاخاذ لونها الى الزرق المتباينة المواج || اعرفها واشهرها ما يتبع .

٢٢٢٩٨ - قَطَرَم الْهَر * ، حَضِيْشَة الْهَر ، قَالْدَنْج جَبَلِيّ Nepeta cataria (S). Népète cataire, Herbe aux chats (F). Catmint, Catnip, Nep (E). Echten Katzenkraut, Nept (D). Cataria comune, Erba gattaja, Gattala (I).

نوع من القطرم المميز يعيش في الموائل الرطبة . ساقه منتصبه فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقه عطرية الرائحة ، زيا النصل . عناقيد لينة . ازهاره صغيرة القد ، يبيض اللون زرقاء المواج || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٢٩٩ - قَطَرَم بَنْفَسَجِي * ، زَهْر مَرِيَم Nepeta mussini (S). Cataire violet, C. de Mussini (F). Violet catmint (E). Neptepflanze (D). Cataria violacea (I).

نوع من القطرم . ساقه مسطحة تطول نحو ٤٠ سم. فروعها منتصبه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. جميعها خلية الباه ، طحلاء اللون . اوراقه يضيية الشكل ، قلبية القاعدة . نصلها غشن اللمس اعرض الصفحة العليا ، خلى السفلى الغبراء اللون . عناقيد ازهاره رهلة . ازهاره بنفسجية . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٣٠٠ - قَطَرَم كَبِير الْهَر Nepeta grandiflora (S). Cataire à grandes fleurs (F).

نوع من القطرم ساقه منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه كبيرة القد مزينة النصل . عناقيد رهلة . ازهاره كبيرة زرقاء اللون فواحة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٣٠١ - قَطَرُوس Proteus anguinus (S).

Protée anguillard (F). حيوان قارب وحيد الجنس والنوع من فصيلة القطروسيات ورتبة السرفويات . موطنه بعض اغوار يوغوسلافية واعصها دلماية || جسمه قرني الشكل ، رباعي القوائم ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رأسه مبطل الجرم ، شبه مخروطي الشكل . عيناه شديتا الصغر لذلك يبدو كأنه اكم . ثوبه الى البياض الوردى الباهت ، خصله الخيشومية حمراء اللون || قوته الديدان والدويبات الصغيرة .

٢٢٣٠٢ - قَطَرُوسِيَّات Proteidae (S).

Protéidés (F). Proteidae (E). فصيلة حيوانات قازية من الصفدييات ورتبة السرفويات وقتة مستقرات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة



قطرم الهر



قطرم بنفسجي



قطرود

٢٢٣١٤ - قُطُنْ، إِخْتِرَافْ، جَتِيْ

Cueillage, Cuellaison (F). Gathèring, Gathering-time (E).

هو اقتطاع الثَّار من الأشجار وهو أيضاً اغْرِافُ والقَطافُ والصَّرامُ وأجزاء أي وقت القطف .

٢٢٣١٥ - قُطُنْ

Grappe (F). Bunch (E).

المنقود ساعة يقطف .

٢٢٣١٦ - قُطُنْ *

Commiphora kataf, Balsamodendron kataf (S). Baumlè de Kataf (F). Balsam of Kataf (E). Kataf Myrrhenbaum (D). Balsamo di Kataf (I).

نوع من اللسان ينتمي إلى فصيلة الجنوريات . ثمرته متوسطة القد ورائحتها العسارة يستخرج منها صمغ وادعان عطرية شائعة الاستعمال . اشباهها متينة، صناعية .

٢٢٣١٧ - قُطُنْ

Arroche (F).

هو السرق ، اطلبه . الواحدة قطفة . ومنه الايض والبحري .

٢٢٣١٨ - قُطُنْطُ

Pluvian (F).

هو التودوم، طائر يدخل في التصاح فيأكل ما فيه من اللود .

٢٢٣١٩ - قُطُنْطَة

صوت القطا .

٢٢٣٢٠ - قُطُلْ

Blanc étoc, Blanc estoc (F).

Felling clear (E).

قطف غير الحرجية من اصلها قطعاً كاملاً .

٢٢٣٢١ - قُطُنْب ، قُطُنْب ، بِيْجْ ، قَاتِلْ أَيْبِهْ

Arbutus (S). Arbousier (F). Arbutus (E).

جنس نباتات حرجية من فصيلة الخنجات ، أنواعه عديدة منها الأشجار والشجيرات . سوقها منتصبه فراء . أوراقها ابيدة ، شبه بيضيه، مستطيلة ، مسنة الحافة ؛ تصلها مائل البشرة ، لآص الصفحة العليا اخضر اللون ، أحمل السفلى . وأوراقها هذه تصلح للدباغة لأنها غزيرة المادة العافصة . ازهارها جلجلية الشكل . ثمارها عنبية ناشفة وهي بطيئة التسج حازمة المذاق ، للذية الطعم || أشهر أنواعه ما يتبع .

٢٢٣٢٢ - قُطُنْب شَالَعْ *

عَصِير الدُّبْ ،

جِنَاء أَخْشَرْ

Arbutus unedo (S).

Arbousier commun, Arbre aux fraises (F). Arbutus, Strawberry, Cane apple (E). Echter Erbeerbaum, Laudbeere (D). Albatro, Corbezzolo, Brichello (I). نوع من القُطُنْب المبلول في الاحراج اللبنانية . ثمرته تملو من ٣ الى ١٠ اثمار . ساقها وأغصانها حر اللحاء . أوراقها متناقبة متعقبة ، تصلها جامد الصفحة اللامعة المسننة الاطراف . ازهارها عتقودية التجميع وريدة اللون . ثمارها شكلية الشكل ارجوانية تطول نحو ٢ سم . لبانها ناشف اللادة .

٢٢٣٢٣ - قُطُنْب عُنْكَوِيْ

Arbutus andrachne (S). Arbousier paniculé (F).

نوع من القُطُنْب ، مهدد الشرق الاوسط . ثمرته تملو من ٥ الى ١٢ م . ساقه وأغصانه جزوية اللحاء . أوراقه بيضيه الشكل ، قلبية القاعدة ، جامدة التصل . ازهاره عتقودية التجميع . ازهاره فسقية اللون . ثماره قمرزية .

٢٢٣٢٤ - قُطُنْب مَنَزِيْسْ

Arbutus menziesi (S). Arbousier de Menzies (F).

نوع من القُطُنْب ، مهدد البلاد الأمريكية . ثمرته تملو من ١٥ الى ٣٠ م . أوراقها كبيرة القد . ازهارها عتقودية التجميع . ازهارها بيض . ثمارها وريدة تطول نحو ٣ سم .

٢٢٣٢٥ - قُطُنْطَة ، مَلَاعِقِيَّةْ *

Cattleya (S).

Cattleya (F). Cattleya (E).

جنس نباتات محببة من الجولليات . أنواعها المعروفة عديدة ، منها أمريكية الاستوائية || أوراقها مستطيلة التصل المتساكنة المقعرة كالملاقح . نصلها جملة الخضار البحري . ازهارها كبيرة البتلات الغارشة المتجمعة || تزرع في المراكب لكثافتها تحشى البرد .

٢٢٣٢٦ - قُطْمْ

Orgasme (F). Orgasm (E).

حالة الشيق، أي الانعاط المطلق التي تعقب الفج وتسبق الرجز .

٢٢٣٢٧ - قُطْطَارْ

Hille (F). Hilum (E).

هو الفتحة التي في الثؤلة وهي نكتة بيضاء مقدرة الانبات .

٢٢٣٢٨ - قُطْمِيرْ

Tégmen, Tégumen (F).

Tegument (E).

هو السيرا أي الوشاح الباطني الذي يلف البويضة والبذرة .

٢٢٣٢٩ - قُطُنْ

Croupion (F). Parson's nose (E).

هو منبت ذنب الطائر راجع زك . ج قطان .

٢٢٣٣٠ - قُطُنْ ، حَقْوْ

Lombes (F). Lumbar (E).

٢٢٣٣١ - قُطُنْ ، بُرْسْ ، طُوْطْ ، عُطْبْ ، كُرْسُفْ

Gossypium (S).

Cotonnier (F). Cotton plant (E). Baumwolle (D).

Cotone (I).

جنس نباتات زراعية صناعية من فصيلة الجازاريات . أنواعه عديدة منها شجرية معمرة تعيش عدة اعوام ومنها حولية تعيش بعض الشهور الى ان تم دورتها الحياتية وتيس .

تعريفه - القطن الزراعي، يوسه عام، يتصف بالتحلية التالية : جنبة فنواء ترتفع من ٨٠ الى ٢٠٠٠ سم . تزكز

على جثث مستقيم تملو ساق ليفية ثم خشبية التركيب تنفرع منها الفتود والافان || أوراقها متعقبة كفية

مفصصة براوح عدد فصوصها من ٣ الى ٩ || ازهارها فردية ، كبيرة القد ، جرسية الشكل تزكز على مائل

محورية . ألوانها متباينة اعمها الاصفر والاخر والايض .

والزهرة كاملة التركيب ، خشوية ، خشية القعالات

والبتلات ، عديدة الاسدية والمقات . خدوها يحوي من

ثلاثة الى خمسة مصاريح يتألف منها المبيض الثلاثي أو

الحماشي الفلق || ثمارها ارجوانية اللون تدعى عقازة ثم

كتفج . والمغارة بعد تكوين برورها وبانها التيلية تنفتح

عن ثلاثة او خمسة ابراج ملوذة بالتيل يعمل كل منها

من خس الى عشر زور ودية الشكل سيد الفتود ينشأها

الزغب اللاصق بها . اما نسبة التيل الى الزور فتراوح

من ٢١ الى ٤٢ ٪ . والتيلية هذه هي للمادة الصناعية الخام

التي تصبح بعد غزلها ونسجها تلك الاقشة القطنية المشهورة

التي تبلغ نسبة استعمالها في العالم نحو ٧٠ ٪ . من حين ان

سائر الاقشة الأخرى من حريرية وصوفية وغيرها لا يزيد

استعمالها عن ٣٠ ٪ .



قُطُنْ



قُطُنْ شَالَعْ



قُطُنْ



قُطُنْ

تنتمي الى ثلاثة عناصر رئيسية هي الازوت والفسفور والبوتاس . افضلها القطن تلك التي تركيبها يشمل ما يحتاج اليه القطن دون نقص او زيادة || ولما كانت الحاجة تختلف باختلاف مقتضيات التربة والنبات لذلك فلا بد من اعتداف صيغة وسطية يميز فيها التعديل وفقاً لحالة التربة . والصيغة الفضل الممكن اعتدافها تتركب من ١/٢/٢ اي واحد ازوت واثنين فسفور وواحد بوتاس . وقد يميز تجويرها اما بزيادة الازوت من واحد الى اثنين او بتخفيض البوتاس من واحد الى ثلاثة ارباع الواحد || اما الكمية اللازمة للدم الواحد فتراوح من ٧٠ الى ١٠٠ كيلو .

حراثة — يجب ان تكون الارض المعدة لزراعة القطن خالية من الاعشاب ، معتدلة الرطوبة ذات تربة ناعمة لا تلغ فيها ولا مدر || ولكي تأتي الحراثة بالنتيجة المنشودة يجب القيام بها في الاوقات المناسبة وفقاً لحالة التربة والعوامل الجوية .

زراعته — من مستلزمات زراعة القطن العناية المستمرة والسهر الدائم . ومن الواجب ان لا تكون كثيفة لان الكثافة تعوق النمو وتقتشئ الشواثل والادسام وتسبب التخلص الانزهار والكناج .

مجهاد الزراعة — ليس لزراعة القطن وقت معين كل من تقدمه او جاوزه كان نصيبه الاخفاق . ولكن لزراعة من اي نوع كانت اوقات ملائمة لا يميز الاستعداد بها . وحيث ان القطن يتطلب الكثير من الحرارة للوصول الى كامل انتاجه ، وهو يخشى امطار الخريف وصقيعه . لذلك يحسن بذره باكراً للاستفادة من الاحوال الجوية الملائمة اطول مدة ممكنة . وانسب وقت لبذر براجم من ٢٠ اذار الى ٢٠ نيسان || وان يذر باكراً في العقد الاول من اذار وكانت زراعته تقراً لا بد من تعطفية البزور بالرمل ممناً لمساك التربة

تحديد المسافات — لتحديد المسافات شروط عديدة اولها الصرم المستخب ثم طريقة البذر ان آلياً او يدوية ثم حالة التربة وظروفها الخاصة ثم الاقليم وعوامله المناخية ثم الموقع والمعرض ثم نوع الزراعة ان مروية او عذبة || لذلك فانسب المسافات تلك التي تراوح خطوطها من ٥٠ الى ٧٠ سم . ولا تقل فساتها البيئية في الخط الواحد عن ٤٠ سم .

البذر — يبذر القطن اما نثراً او لقطاً او نثراً فالبذر نثراً لا يلائم اقاليم البلاد العربية ومواصلها الجوية وطرق دوماً وظروف زراعتها || اما اللقط على فرشة التلم او بواسطة المبادر الآلية فهو عملية شائعة ومرتبة لكنها تستلزم الكثير من البذار وتستوجب عناية خاصة تابعة قلاً يقوم بها المزارع || اما طريقة البذر نثراً بعد التخطيط فهي الاحسن اما يجب ان تكون التفرع اما في فلق التلم ان كانت الزراعة عذبة او في الربع الاخير من سقمه اذا كانت الزراعة نصف مروية او على غارب التلم اذا كانت مروية || وكيفما كانت الطريقة المثمرة فلا بد من الانتباه الكلي لوضع البزور في التربة على العمق الانسب لانهاياتها ونشوتها لان البزور العميقة تكثر الرطوبة عليها ويقل عنها الهواء وينقل فيها الفطاه فتضوت من العفن . والبزور الطائشة يحف عليها النطاه ويكثر حواها الهواء ويحف عنها الرطوبة فيتسبب بعد الانتاش ولا لا تنبت اصل || اما البزور التي صار طمرها على العمق الانسب وهو نحو ٤ سم . فانها تكون في محيطها الطبيعي الواجب بعيدة عن تأثيرات العوامل الجوية العنيفة ومجاناً للطيور التي تلتقطها والرطوبة الزائدة التي تهلكها .

تاريخه — من المؤرخين من قال ان القطن ازين من التاريخ . ومنهم من يقول انه قدم العهد غير ان قديمه لا يتعدى اعتاب العصور الفرعونية . والدليل على ذلك عدم استعماله في اقطه القراصة بينها كانوا يستعملون الكتان والقنب || لكن صدقوا او موهوا فالهند والفرس عرفوه فزروه واستعملوه وكذلك العرب منذ ان استولوا ما بين البحرين . والعرب هم الذين نقلوه الى سورية فصر فالجزائر فصقلية فالاندلس . ومن الذين عرفوه جميع شعوب شواطئ البحر المتوسط . فادخله الاوروبيين فلانهم المختلفة بلقطة العربي (قطن cotton) دون تحريف .

القيمة — ينمو القطن في جميع الاقاليم التي لا يقل متوسط حرارتها مدة نمو الخصري وادراك ثماره عن ١٨ او ٢٠ درجة مغ . بشرط ان لا تكون فوارق الحرارتين القصوى والحدية كبيرة وبنائية . وهو يخشى الصقيع في نيسان وايار ويهاب الخريف اليارد المساطر . وكل زراعة تخرج عن نطاق هذه القنوس المناخية تعتبر من المغامرات الخطرة هذا ان لم يتوصل العلم في الآتي القريب الى استنباط ممالك جديدة سريعة النمو الخصري والدورة الحياتية تفوق بتكثيرها وادراكها الاصرام المعروفة حالياً .

زهره — يميز القطن في الآتية الطبيعية الزولية والرملية الطبيعية التي لا تقتصر الى الكلس والتي يربو غورها عن ١٠٠ سم . لان معظم جذور القطن وشرورها يلحق هذا القاع || وقد تلازمه ايضاً كل تربة عيقة الغور قليلة الاندماج بشرط ان لا تنفذ منها الرطوبة بسرعة || وحيث انه من النباتات المفروص فيها سرعة النمو والادراك لا يستحسن زهره في الآتية المندجة المسكة خوقاً من تاخير نموه واستطالة دورته الحياتية || اما الاراضي الرملية والقلبية التي لا تحتفظ برطوبة الري اكثر من ستة ايام فانها لا تصلح ايدياً لزراعة القطن وكذلك الآتية الكثيرة المحصى لان المحصى تمتع التربة من استيعاب كامل مقدورها من الحرارة الضرورية .

تسميده — يمتد القطن من النباتات الفرة التي تجهد التربة وتستنزف خواصها . فتكرار زراعته في التربة حينها يفقد هذه التربة جزءاً من عناصرها الاولى والثانوية . لذلك لا بد من البحث عن اجمع طرق الاغصاف واتباع افضلها حفاظاً على التربة وزراعتها || وحيث ان الدورة الزراعية والتسميد هما المبدأان الاساسيان اللذان يرتكز عليهما محور الحسب . فنقول في الدورة الزراعية انها ضرورية جداً بشرط ان لا تكون ثنائية لانها تصبح قليلة الفائدة . اما الدورة الثلاثية التي تلج لتربة الوقت اللازم لتعزيز نشاط جراثيمها وتجنيد بعض ما فقدته من العناصر . فانها اصلح الدورات || اما التسميد والغاية منه اعادة العناصر التي صدرتها التربة مع حاصلها فهو على شكلين عضوي ومعدني .

١ — **الاسمدة العضوية** : الاسمدة العضوية اشهر من ان تعرف وهي شائعة الاستعمال اعمها غني البقر والجاموس قروت الخيل ومائر الدواب فيبر اللحم والماغز || والخي الذي يعتبر من الاسمدة الباردة يستعمل في الآتية الثقيلة الاندماج لانه يخفف من مقدور استيعابها للحرارة ويقوي فيها خاصة الاندماج وينشط على الجراثيم المفيدة وحيث البيئة الدبالية الاندماج للحسب فضلاً عما يتركه من غذاء عصري للنبات || اما الروث فيستعمل في الآتية المندجة لانه يعدها بحرارة ويخفف من انساجها ورطوبتها بمد ايضاً عليها على القيام بجميع اعمالها الجرثومية والكأوية .

ب — **الاسمدة المعدنية** : الاسمدة المعدنية كما هو معروف

تربية - تظهر عادة بؤادر القطن بعد القطف أو التفرع بنحو عشرة أيام. ويصاحبه إلى التفرع بعد ظهور البؤادر بيويون ولا يجوز تأخير هذه العملية خوفاً من اتساع فارق النمو بين النباتات الأولى ونباتات التفرع فتأتي هذه الأخيرة سقيمة ضميعة وقد لا تسلم من شر الحشرات والأمراض .

حفظه - الحف أو التفريد عملية لا بد منها لتزاحم النباتات على الغذاء وتنشيط النمو والانتاج . وقد تم على مرحلتين في الأول وذلك بعد ظهور البؤادر بنحو ٢٠ يوماً ينزع من التفرعة كل ما هو ضعيف ويزيد من التلاوة . وفي المرحلة الثانية وذلك بعد الأولى بمسرة أيام تنزع النباتات الضعيفة ولا يترك في التفرعة الواحدة إلا نبات واحد || ولا يجوز تأخير الحف عن الزمن المعلن خوفاً من الزراعة الناشئة من الضعف والسقم || وإذا كانت التفرعة قليلاً فلا موجب لحفها على مرتين بل يباشر تقريدها عندما يرايح ارتفاع نباتاتها من ١٢ إلى ١٥ سم .

ريه - ليس للري مواعيد مقررة ثابتة لانه مرتبط بمحالة جفاف التربة والجفاف يهين عليه شئ العوامل الجوية من رياح وجفاف ويتخير ورطوبة جوية نسبية وضوح وضوء... ومن المستحسن ري القطن بعدد يذره بنحو ٢٠ يوماً إلا في حالة التفرع || وقد يتطلب القطن مبدئياً ثلثي ريات . الري الأول بعد البذر بنحو ٢٠ يوماً ومن ثم كل أسبوعين مرة حتى أواسط شهر آب حيث يجب توقيت الري خوفاً من تجريد النمو الخضري الذي يؤثر الإدرار ويمرض التوابع الخديجة إلى فتك الدودة القرنفلية التي تكثر في هذه الآونة || أما إذا كانت الزراعة بحاجة ماسة إلى الماء ولا خوف عليها من الدودة القرنفلية فلا مانع من ردها عن جديد .

٢ - معاد الحف : يستمر الحف عادة من أواسط آب إلى أواسط تشرين الأول وهو منوط بعوامل كيفية وموضعية تسير عليها عناصر المناخ || وفي سبيل التذكير نقول انه لا يجوز أبداً حفي الكفاف قبل أسوداد زهورها لان الاطمان التي يتخللها زهر احمر ين من عدم اكتمال نضجها لا يمكن اعتبارها من الاصفات الجيدة المعادة الشوائب .

٣ - طرق الحف : يحث القطن انا باليه او آلياً بواسطة القطافات . لذلك فطرق حفيه تختلف مع البلاد المنتجة لانها منوطه باسكانات اليه العاملة وسهولة النقل والجمع والحفظ .

١ - طريقة الحف الشامل . انما لا شك اهم الطرق استعمالاً في البلاد العربية، تقوم على ترك المغطة حتى اكتمال نضج جميع ثمارها فيصار اذا ذلك إلى حفي ربيع كل ما تفتح من الكفاف وما سقط منها على الارض فتنتقل إلى مكان الفرز حيث تنظف من القشور والبقايا والفصوص المبرومة . يجب هذه الطريقة عديدة لان كثرة تقليب القطن في أثناء مختلف عمليات الفرز لاترغب الفصوص المبرومة والقشور والبقايا بسبب التلف الفصوص الجيدة وتلوينها بجراثيم الففن الاسود الموجود في الفصوص المبرومة فتنتج من ذلك ذب القطن فيفسد منه وتقل اتاوته .

ب - طريقة الحف المتتابع - قوامها حفي الكفاف تباعاً . وهي عملية موفقة تزيد من وزن المحصول لانها تبعد البتلة عن أشعة الشمس اللاذعة ومن مقابيل السدى والذئب المفرسة فتصفونها من أعطاط صفحتها الرئيسية : اللون والشفافية ، وتحول دون سقط الكفاف على الارض .

ج - طريقة الحف الآلي - عملية اقتصادية تقوم بها القطافات الآلية لكها تقع بالهادرين عنها التي ذكرناها في طريقة الحف الشامل

د - جمع القطن وفرزه : يجمع القطن بعد حفيه في المكان المده لفرزه وهذا المكان قد يكون اما ثابتاً ويدهي المستودع او نقالاً ويدهي المنط . والمطعة كالمستودع يجب ان تكون نظيفة مفروشة بالخيش منة من تلويث القطن بشئ الاقذار . يتبني عملية الفرز عند وصول القطن إلى المكان اذا كان القطن من جني الصباح الباكر ولا يزال رطباً من الندى فمتدنا يقتضي نشره بعض الوقت ردها بحيث يتم يفرز || يفرز القطن عادة اما بالأيدي او بواسطة .

عطفه - ان كانت رطوبة التربة تحجب النباتات فمزق التربة الذي ينظفها من الاعشاب الضارة ويحافظ على رطوبتها عمل واجب لجليل النفع || يمزق القطن عادة على ثلاث مرات . المرة الأولى بعد الحف وقيل الريه الثانية . من الضروري ان تكون سطحية ، طائشة ما امكن ، خوفاً من اقتلاع النباتات الفتية او قطع شرونها الدقيقة || والمرة الثانية تم عادة بعد الريه الرابعة . الغاية منها اقتلاع الاعشاب الضارة وتفكيك التربة وتهويتها وتصلح الخلوطين ويجاري الماء وتخزين النباتات اذا كان ذلك واجباً || اما المرة الثالثة المروقة بالسك فبورها يأتي بعد الريه السادسة . قوامها ركش التربة لتجديد عزم الجرائم النافعة ثم كمن التبات وحسنه بالتربا ليقوى على احتال صصف الرياح || واذا كانت الزراعة حذية فن الواجب ايضاً عطفها وكهسا في الاوقات التالية : يباشر بالمركة الأولى بعد الحف بأسبوع وليس أكثر خوفاً من ان تفقد التربة الكثير من رطوبتها . ومن الافضل ان تكون هذه المرة خفيفة سطحية || اما المرة الثانية والتسعين فيباشران بعد المرة الأولى بنحو ثلاثين يوماً ومن الواجب ان يكون المزق عميقاً لتخريب كل ما امكن من انابيب استتلاب الرطوبة

جنيه - ١ - معلومات عامة : القطن كا ذكرنا جنبه فناء يستمر ازدهارها نحو ثلاثة اشهر . وهي تبشر عند استعمالها نحو ٢٠٠٠ مسرة وقد يتم ذلك في غضون ثلاثة اشهر . ومن التفسير الى اكتمال البرعمة الزهرية وانتاجها عن زهرة كاملة لزرم نحو ٥٥٠ مسرة التي يمكن الحصول عليها بمدة ٢٥ يوماً . وتستمر الزهرة نضرة زاهية نحو ٤٨ ساعة الى ان يتم تأيرها فيحمر لونها وتذبل ببضع ساعات

٢٢٣٣٨ - فُطْن مُشَجَّر

Gossypium arboreum (S). *Cotonnier en arbre* (F). *Tree cotton* (E). *Baumwollenbaum* (D). *Cotone arbusto*, *C. dipietra* (I).

نوع من الفُطْن المعمّرة الهندي. شجرته تعلو من ٤ الى ٦ أمتار. أوراقه ثلاثية أو خماسية التفتيس. صلبها قلبية القاعدة، خالية الصفحة السفلى. كنانجه كبيرة القد، قصيرة التيلة، ناعمة البياض، محدودة الاستمال الصناعي.

٢٢٣٣٩ - فُطْنَجِيَّة ٥

Ampelis (S). *Cotinga* (F). *Cotinga* (E).

جنس طير من فصيلة القطنيات ورتبة الجوارم سنيات الناقير. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها غابات ومنتقع أمريكا الوسطى والجنوبية || أجسامها صغيرة القد تطول من ١٤ الى ١٨ سم. ألوانها ساطعة الألوان الجميلة. مناقبها صغيرة مستعرضة القواعد || قوتها البار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل || أشهر أنواعها القطنية الزرقاء القلادة.

٢٢٣٤٠ - فُطْنَجِيَّة زَرْقَاءَ الْقِلَادَةِ ٥

Ampelis cincta (S). *Cotinga cordon-bleu* (F).

طائر من القطنية. موطنها بعض مناطق أمريكا الجنوبية. تألف الغابات والحدائق القريبة من الأماكن الآهلة || جسمها صغير، معتدل الرقاقة يطول نحو ١٦ سم. ثوبها العلوي الى الزرقاء البحرية السفاه المروج. ثوبها السفلي الى الخضار البنفسجي المروج تملو في الصدر قلادة من لون الظهر يطوقها الاجر. علاهاها مشيرة بالاجر. قة رأسها وأطراف جناحها وذنبها موشة بالاسود الاسف || طيراتها غريفة الحركة طويل الشوط. قوتها البار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل || تدثن عنها في كل مجرة فناء قليلة الارتفاع. الاثني تضع من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول. الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الانثى بتناوب الذكر.

٢٢٣٤١ - فُطْنَجِيَّات ٥

Cotingidae (S). *Cotingidae, Ampelidae* (F). *Cotingidae* (E).

فصيلة طير من الجوارم سنيات الناقير. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة. موطنها القارة الامريكية اخصها امريكا الجنوبية والوسطى. تألف غابات المناطق الحارة. ملجتها الحياتي زوجي باستثناء بعض الانواع الجماعية || اجسامها متوسطة القد أو كبيرة. تميز برساجها اشداهن وبألوانها الجميلة الألوان السفاه الجماعية || اعرف اجناسها واشهرها القطنية والطرغيب.

٢٢٣٤٢ - قُطْنِيّ، حَقْوَرِيّ

Lombar (F). *Lombar* (E).

٢٢٣٤٣ - قُطْرُوب ٥

Catops (S). *Catops* (F). *Catops* (E).

جنس حشرات من فصيلة القوطيات ورتبة غديات الاجنحة. انواعه المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة والحارة والمنتشرة نحو الباردة || اجسامها صغيرة القد، اهليجية الشكل، تطول من ٤ الى ٨ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها صغيرة، ممتحة. تأثيرها وفكوكها نظامية. ملامسها مستطيلة. قوتها الاستعمارية غيطية. كواسلها مستعرضة، محدبة. اغمارها مخددة، لاحقة. قوتهاها مستطيلة. أثوابها تراوح

الفرارات أو الغرايبيل الفارزة وعلى عمال الفرز ان ينتبهوا جيداً لنظافة الفُطْن وتختلف مراتبه لانها اساس المشرى وعليها التحويل || وبعد فرز الفُطْن وتقسيمه الى الرتب والدرجات المطلوبة يصار الى تعبته ضمن اكياس خاصة نظيفة ثم ينقل الى عابر المخلج حيث يفرز من جديد قبل تقديمه الى الماكينات الحالجة التي تفصل التيلة عن البذور.

٢٢٣٤٢ - فُطْن آزَب، فُطْن امْرِيكِي

Gossypium hirsutum (S). *Cotonnier américain*, *Coton à courte soie*, *C. velu* (F). *Upland cotton plant* (E). *Amerikanische Baumwolle*, *Kurze Baumwolle* (D). *Coton peloso* (I).

نوع من الفُطْن الامريكي المنبت. ساقه وفروعه وأوراقه مزينة. ضروبه واصرامه وهالجه كثيرة العدد معظمها زراعي وافر الانتاج الجيد. تيلته متوسطة القد مشكورة الصنف.

٢٢٣٤٣ - فُطْن البَرْبَاد، فُطْن مِصْرِي، فُطْن جَزِيرَةِ الْبَحْرِ

Gossypium barbadense (S). *Cotonnier égyptien*, *Coton à longue soie*, *C. d'Egypte* (F). *Egyptian cotton*, *Sea Island cotton* (E). *Ägyptische Wollpflanze* (D). *Cotone egiziano* (I).

نوع من الفُطْن الشرقي تيلته في مصر واتصف بمخاض بمرته منها استطالة التيلة واستطالة الدورة الحياتية وكثرة الانتاج. ضروبه واصرامه وهالجه عديدة لكنها محدودة الانتشار نظراً لطول مدة بقائها في التربة.

٢٢٣٤٤ - فُطْن البِيرُو

Gossypium peruvianum (S). *Cotonnier péruvien* (F). *Peruvian cotton plant* (E). *Peruvian Baumwolle* (D). *Cotone peruviano* (I).

نوع من الفُطْن، متوسط التيلة جيد الانتاج، مهد امريكية الجنوبية. ضروبه واصرامه عديدة معظمها وافر الانتاج لكنه مستطيل الدورة الحياتية.

٢٢٣٤٥ - فُطْن الهند

Gossypium indicum (S). *Cotonnier indien* (F). *Indian cotton plant* (E). *Indische Baumwolle* (D). *Cotone indiano* (I).

نوع من الفُطْن الزراعي الجيد الانتاج المتوسط الدورة الحياتية. اصرامه عديدة منها الهند والهند الصينية.

٢٢٣٤٦ - فُطْن حَشِيشِيّ، فُطْن الشَّرْق، فُطْن مَلْتَبِيّ

Gossypium herbaceum (S). *Cotonnier d'Asie* (F). *Levant cotton plant* (E). *Kurze Georgia Baumwolle* (D). *Cotone erbacea*, *C. annua*, *Bambagia* (I).

نوع من الفُطْن الشرقي الفاخر الصنف القليل الانتاج. كنانجه كبيرة القد قليلة العدد. تيلته مستطيلة ناعمة ومتينة. ضروبه واصرامه لا تحصى لانه دخل في تهجين معظم اقطان العالم اخصها الاقطان المصرية والامريكية.

٢٢٣٤٧ - فُطْن شَرْقِيّ

Gossypium obtusifolium (S). *Cotonnier oriental* (F). *Oriental cotton plant* (E). *Nanking Baumwolle* (D). *Cotone orientale* (I).

نوع من الفُطْن الصناعي المعتدل الانتاج والجودة. مهد البلاد الاسيوية تكثر زراعته في الصين والنام، تيلته متوسطة القد يبيضه اللون.



فُطْنَجِيَّة زَرْقَاءَ الْقِلَادَةِ



قُطْرُوب

٨٠ الى ١٠٠ سم. هيتبها هرمية الشكل. اوراقها ثلاثية الالوان النخالية. ازهارها سنبل التجميع منثلي الاطراف.

٢٢٣٥٣ - قُطِيْمَة جَمِيْلَة * ، دَلَق ، رُعَاف

Amarantus retroflexus (S). Amarante réfléchie (F). Wild beet (E). Gémiseamarant (D). Fior bellosa (I). نوع من القُطِيْمَة التَّريْبِيَّة. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. هيتبها هرمية الشكل. اوراقها ملونة. ازهارها عقنودي التجميع منثلف الطرف. ازهارها الى الى الحمره المختلطة الموانج.

٢٢٣٥٤ - قُطِيْمَة حَسِيْبَة * ، قُطِيْمَة ذَيْل التَّعَلْب ، طَنْطُور الجِنْدِي

Amarantus caudatus (S). Amarante d'Abyssinie, A. queue de renard, Discipline de religieuse (F). Love-les-bleeding, Prince's feather (E). Fuchschwauz, Flormour (D). Amaranto codato, Bito maggiore, Staffile (I).

نوع من القُطِيْمَة التَّريْبِيَّة. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متبارجة الالوان العالقه. ازهارها متشكليه التجميع، مستطيل القد، شديد التحسين والالتواء.

٢٢٣٥٥ - قُطِيْمَة خَضِرَاء ، شَدَح هِنْدِي

Amarantus oleraceus (S). Amarante oléracée, Brède de l'Inde (F). Edible amaranth, Pot amaranth (E). Kohlamaranth (D). Amaranto oleraceo, Spinacio marrone (I).

نوع من القُطِيْمَة التَّريْبِيَّة. ساقها منتصبه تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها زاهية اخضر الجليل. ازهارها عقنودي التجميع، مردي الشكل، محسن الطرف، ازهارها فستقيه اللون، ارجوانيه الموانج.

٢٢٣٥٦ - قُطِيْمَة بَانَعَة ، شَدَح ، بَقْلَة عَرَبِيَّة

Amarantus blitum (S). Amarante blette, A. sauvage (F). Blite, Wild amaranth (E). Gemeiner Erdmarant (D). Amaranto salvatico, Bledire, Bito (I). نوع من القُطِيْمَة الزراعيه البقله. ساقها منتصبه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها كبيره القد مأكوله. ازهارها عقنودي التجميع، هرمي الشكل.

٢٢٣٥٧ - قُطِيْمَات

Amarantaceae (S). Amarantacées (F). Amarantaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، اجناسها وانواعها قليلة العدد معظمها عشبي وبضها جنبي. سوقها ليفيه. اوراقها بسيطة متعاقبه. ازهارها لا تقاسي التجميع والارتكاز. ازهارها خنثوية او وسيده او ثنائية المسكن. اكثر نباتاتها برية صعيه ناعمة تفيد المعدة والامعاء.

٢٢٣٥٨ - قُطِم * Polyandre (F). Polyandrous (E).

القُطِم من الاناث من تزواج اكثر من ذكر. والقُطِم من النبات من كانت ازهاره كثيره الاسديه.

٢٢٣٥٩ - قُطِيْمَة * Eriocrania (S).

Eriocranie (F). Eriocrania (E). حشرة من فصيلة القُطِيْمَات ورتبه حشرغيات الاجنحه. اعطائها فصيحه الارجاع تشمل معظم مناطق البلاد الممتدله الحرارة || جسمها صغير، نحيل، مردي الشكل. بسطها نحو ١٤ سم. رأسها معتدل الجرم. عينها صغيرتان، بارزتان. خطمها وملسامها شديده القصر. زباناها

من المختطي الاسمر الموانج الى الاسود || تعيش في المزاب والدردري النباهي.

٢٢٣٥٤ - قُطُورِيَّات ° Catopidae (S).

Catopidés (F). Catopidae (E). فصيلة حشرات من غمديات الاجنحه. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم واخصها المناطق الباردة والمعتدله الحرارة || اجسامها صغيره، اهليلجيه، تطلو من ٣ الى ٨ سم. رؤوسها شبه مكوره. عينها صغيره، بارزه. تكاثرها وفكوكها نظاميه. قرونها الاستشعاريه خيطيه، مستطيله الاطراف، مركبه من ١١ فصله. كواسلها معديه. اعماها لاحقه. قوائمها نشطه || تعيش في المزاب والدردري ويجاحر القدييات الصغيره واكثر الطير وعشاشها || اشهر اجناسها القُطُوب.

٢٢٣٥٥ - قُطُورَاء Cotula (S). Cotule (F).

جنس نباتات عشبيه حويله ومعمره من فصيلة المركبات انواعها عديدة اعطائها البلاد الحاره والمعتدله. سوقها منتصبه او مسطحه، اوراقها مفصصه او مفرشه. نصلها خليه البشرة بمعثره العدد. ازهارها رؤسيه فرديه صغيره القد صفراء اللون. بزورها نجيله مستطيله عاده الجناح والافرة.

٢٢٣٥٦ - قُطُوش Nonette de Calcutta (F).

طائر من المصافير الصغيره يدعى دحسوم مكبم، اعطيه.

٢٢٣٥٧ - قُطِيْب Astragalus drusus (S).

هو الاسطرغالوس الدرزي، اعطيه.

٢٢٣٥٨ - قُطِيْع Troupeau (F).

Flock, Herd, Drove (E). الطائفه من النعم كالابل والبقر والنعم. ج قطاع وقطان.

٢٢٣٥٩ - قُطِيْمَة ، اُمْلَاك Domaine (F).

Domain, Property (E). اراض زراعيه واسعه يملكها شخص واحد.

٢٢٣٥٠ - قُطِيْمَة ، سَالَف العُرُوس Amarantus (S). Amarante (F).

جنس نباتات عشبيه حويله برية و تربييه من فصيلة القُطِيْمَات. انواعها عديدة، سوقها منتصبه. اوراقها بسيطه متعاقبه. ازهارها صغيره القد، لا قيايه التجميع. احرف وانواعها واشهرها ما يتبع.

٢٢٣٥١ - قُطِيْمَة بَضَاء Amarantus albus (S).

Amarante blanche, Fleur de jalousie (F). White coxcomb, Tumbleweed (E). Weisse Amarant (D). Amaranto alba, Erba di gelosia (I).

نوع من القُطِيْمَة التَّريْبِيَّة. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها شديده الخضر القام. ازهارها متشكليه التجميع. ازهارها بيض. عتوكها مستطيل الشكل محسن.

٢٢٣٥٢ - قُطِيْمَة لُثَالِيَة الَانُورَان ، دِجَة الِامِير

مَنْدُ فُور Amarantus tricolor (S). Amarant tricolore (F). Amarant, Joseph's coat (E). Fuchsschwanz Tricolor (D). Amaranto a tre colori, Pappagallo (I). نوع من القُطِيْمَة التَّريْبِيَّة. ساقها منتصبه تملو من



قُطِيْمَة جَمِيْلَة



قُطِيْمَة حَسِيْبَة



قُطِيْمَة

منها البرية التي تنابت الكمأة في الربيع تجني يبيضها قشوي وتطبخ فتفرك . ومنها الزيبية الشائعة الاستعمال || سرقها فراءه ، أوراقتها متعاقبة ، رؤوساتها الزهرية كبيرة القند مستعرضة . بزورها غريزية الشكل ، ثنائية الجناح ، عادمة الاغرة || أشهر أنواعه الزيبية ما يلي .

٢٢٣٧١ - قُطَبُولُ المَطَرِ

Dimorphotheca pluvialis (S). *Dimorphothèque pluviale*, *Souci pluvial*, *Souci hygrométrique* (F). نوع من القبول الزيبية الخولي . ساقه منتصبه كثيرة الفروع تملو نحو ٤٠ سم. أوراقه سنائية الشكل ، مسنة الحافة ؛ فصلها خلي البشرة دبق الملمس . رؤوساتها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٦ سم . طبياها اصفر اللون ، لسنتها بيض الصفحة العليا حر السفل . تتليج وزعو في النهار من الساعة السابعة صباحا الى الخامسة بعد الظهر وتنكش في الليل وفي الايام الماطرة || ازهراره يستمر من تموز الى آب .

٢٢٣٧٢ - قُطَبُولُ بَرْقَعَالِي

Dimorphotheca aurantiaca (S). *Dimorphothèque orangée* (F). نوع من القبول الزيبية . ساقه منتصبه فراءه تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقه السفلى كبيرة القند مقطوعة الاطراف قليلة الزغب . أوراقه العليا سنائية صغيرة . رؤوساتها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٥ سم . طبياها اسمر اللون ، لسنتها برقالية || ازهراره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٢٣٧٣ - قُطَبْتَانُ اَزْرَقُ* ، قُطَبْتَانُ بَنَفْسَجِي*

Xylocopa violacea (S). *Xylocope violet*, *Abeille charpentière* (F). حشرة خاشية من فصيلة القطبانيات قريبة الشبه من النحل طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم . لونها الى الزرقه يطلوعها موج اسود || تشيد خلياتها في الاخشاب التي تحفرها وقد شاعدها مراراً في غيب البيوم المصنوع والازديعت والازان .

٢٢٣٧٤ - قُطَبْتَانُ مُسَجَس* ، قُطَبْتَانُ مَعَجُوق*

Xylocopa aestuans (S). *Xylocope agité* (F). حشرة خاشية من القطبانيات طولها نحو ٢٢ سم . تركيب الاخشاب المصنوعة والاعمدة تحفرها وتشيد فيها خلياتها . الاثنى اكبر قدماً من الذكر ، ثوبها الى السمرة السوداء يطلوعها موج ازرق . جوشها كثيف الحلب اصفر اللون . الذكر صغير القند اصفر اللون اخضر الموج . اجنته معتدلة الطول عابقة الزرقه السراء .

٢٢٣٧٥ - قُطَبْتَانِيَّات*

Xylocopidae (S). *Xylocopidés* (F). فصيلة حشرات خاشية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها متوسط القند قريب الشبه من النحل . اجسامها كثيفة الحلب . بطونها غليظة . تأثيرها قوية مدبها تحكها من ثقب وغفر الاخشاب اليابسة اعصها المصنوعة والاعمدة تحفر فيها الانفاق المستطيلة والسراديب المنرجعة .

٢٢٣٧٦ - قَمَدٌ

القند : النخل الصنار . وقعدت الفصيلة وهي قاعد :

عيطيان . اجنتها خفيفة . مستعرضة التهديد الختاري . كوسلها ويطبخها كثيرا الخمل الدقيق الناعم . ثوبها الى السمرة || الاثنى اميز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه || السرة لانه تمشي على وثن النصال . تركيب الكثير من الثبات اعصها البندق والسنديان .

٢٢٣٦٠ - قُطَبِيَّات*

Eriocranidae (S). *Eriocranidés* (F). فصيلة حشرات من رتبة حشرغيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٣٥ منتشرة في معظم الاجساق المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واروية وامريكا || اجسامها صغيرة ، نحيلة . رؤوسها مستعرضة ، عيوبها بارزة . اعطامها وملابسها شديدة القصر . قرونها الاستشارية عيطية . اجنتها خفيفة ، شبه سنائية الشكل مهدية الخار . بطونها وشية الشكل ، متكاثفة الخمل . اثوابها ملونة || اساربعها دقيقة ، عادمة الراجب ، تلم الاوراق وتمشي في وثن النصال || أشهر اجناسها القطعية .

٢٢٣٦١ - قَعَا

Couvrir (F). *To couple with, To serve* (E). قما الفعل الاثنى وقما عليها : ارسل نفسه عليها .

٢٢٣٦٢ - قُعَاد

Immobilité (F). *Immobility* (E). داء يصيب الخمل فيقشدها عن العمل اذ يجمد بعض حركاتها متعذراً احياناً . وقد يعتبر من العيوب المبطلة للبيح .

٢٢٣٦٣ - قُعَاصُ ، قُعَاث

Clavelée (F). هو جندي الفنان ، اطليه .

٢٢٣٦٤ - قُعَاعَة*

Saunage (F). *Salt-making* (E). التماع استخلاص الملح من مياه البحر ، وتصنيع الملح والمعالجة به .

٢٢٣٦٥ - قُعَاعِي*

Halophyte هو النبات الذي ينمو في الارربة الملحية او التي تخضع لتأثير المياه الملحية .

٢٢٣٦٦ - قُعَالَة

Pétale (F). هي البتلة ، اطليه .

٢٢٣٦٧ - قُعَايِبُ ، قُعْتَب

Renard mâle (F). *He fox* (E). هو الثعلب الذكر

٢٢٣٦٨ - قُعَبَارُون

هو السلي الاسود ، اطليه .

٢٢٣٦٩ - قُعَيْل*

Actinomma (F). *Actinomma* (E).

جنس شعاعيات بحرية تتميز ببيكلها الصواني التركيب المولف من ثلاث كرات شبكية الشكل متلاحقة تتركز على مناسخ شعاعية مخروطية تجمع بين الكرات || انواعها عديدة يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط .

٢٢٣٧٠ - قُطَبُولُ* (زهرة اللؤلؤ الافريقية)

Dimorphotheca (S). *Dimorphothèque* (F). *African orange daisy* (E). *Regenblume*, *Kapkörbchen* (D). *Dimorfotea* (I).

جنس نباتات حولية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة



قبول



قبول



قشبان ازرق



قشبان مسجس

٢٢٣٨٧ - قُفَّاعُ الْآجَامِ * ، زَمَّارُ الرَّمْلِ

Actitis hypoleucos (S). Guignette vulgaire (F).
طائر من القمقم طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه الى السمرة
الزيتونية بملعوا موج جزوي ورقشة سوداء. بطنه ابيض .
صدره موشع بالاسود. منقاره رمادي. سيقانه الى الخضار
الزيتوني || اقليمه فسح الاجرام يحوي البلاد الاسيوية
والاروبية والافريقية. يرتاد المناطق وصفات المياه العذبة
ورمال اخوار الأنهر.



نقبق

٢٢٣٨٨ - قُفَّاعُ مُلَطَّخٍ

Actitis macularia (S).
Guignette grivelée (F).
طائر من القمقم طوله نحو ١٨ سم. اقليمه البلاد
الامريكية. يتصف بميزات وإخلاق وصفات قفقمع
الآجام. ثوبه اقل سمرة ورقشة. منقاره اطول القيق. سيقانه
رمادية.

٢٢٣٨٩ - قُفَّاعَةُ

Cri du faucon (F).
Cry of the falcon (E).
صوت الصقر.

٢٢٣٩٠ - قُفَّامُوسُ

ضرب من الكأمة.

٢٢٣٩١ - قُفَّوَةُ

اصل الفخذ. ج. قس.

٢٢٣٩٢ - قُفَّوُسُ

الشاة التي تمنع الدرة.

٢٢٣٩٣ - قُفَّيد

القعيد : الجراد اذا لم يستو جناحاه بعد.



قمقم الآجام

٢٢٣٩٤ - قُفَّيَّةُ

Perdrix chukar (F).
هي الحجل الشقر، اطلبه.

٢٢٣٩٥ - قُفَّيل

Bouquin (F). Buck-rabbit (E).
هو الخنزير اي الارنب الذكر.

٢٢٣٩٦ - قُفَّ

Monticule (F). Hillock, Knoll (E).
القفج. قفأ وأقاف: ما ارتفع من الارض دون

٢٢٣٩٧ - قُفَّا

Nuque (F). Nape (E).
هو القذال الجزء الخلفي من العنق مركزه تحت القف.

٢٢٣٩٨ - قُفَّارُ الْجَلَّتُوزِ *

Apoderus corylli (S).
Apodère du coudrier (F).
حشرة من فصيلة السوسيات طولها نحو ٧ م. رأسها اسود،
ثوبها وسائر جسمها الى الحمرة || تركب اوراق الجلتوز
فتفتلها وتعيش عليها فتعطها.

٢٢٣٩٩ - قُفَّارُ مَرْمَرٍ

Campanule gantée (F).
هو جريس البست، اطلبه.

٢٢٤٠٠ - قُفَّاص

Bouquetin d'Abyssinie (F).
هو الوعل الحبشي، اطلبه.

٢٢٤٠١ - قُفَّاص

داه يصيب الدواب فتتيس قوائمها.

٢٢٤٠٢ - قُفَّاع

داه في قوائم الشاة يمرضها.

٢٢٤٠٣ - قُفَّاع

Diotis (S). Diotide (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة المركبات.
انواعه المعروفة قليلة، منها خلية زباء تطلو من ١٠ الى
٥٠ سم. اوراقها متعاقبة، حاشنة، اهليلجية، صغيرة.



قُفَّارُ الْجَلَّتُوزِ

صار لها جذع تقعد عليه. وفي ارض فلان من القاعد
كلها وكلذا...

٢٢٣٩٧ - قُفَّادُهُ

كل اسيل مالك للقرابة الى البة.

٢٢٣٩٨ - قُفَّر

Déracinement (F).
Rooting up, Eradication (E).
هو الانجاء. يقال قمر الشجرة: اقتلعها مع جذورها.

٢٢٣٩٩ - قُفَّس

القمس: التراب المني.

٢٢٣٨٠ - قُفَّسَاء ، قُفَّص

Formica animosa (S).
Fourmi féroce (F).
نوع من النمل الحرجي كبير القدر احر اللون اسمر الموالج
يكثر وجوده في غابات واسراج البلاد الاستوائية والحارة.

٢٢٣٨١ - قُفَّسِيَّات

Saprolegniaceae (S).
Saprolégniacees (F). Saprolegniaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة التنسيات ورتبة البيضييات.

٢٢٣٨٢ - قُفَّص

Arcure (F). Arching (E).
قمص العود: عطفه كما تعطف عروش الكرم.

٢٢٣٨٣ - قُفَّف

Extirpation
القفف هو تلغ البنية ان جنبه او نجرة من اصولها.

٢٢٣٨٤ - قُفَّعْب * ، طَيْرُ الصَّيْبِ

Serpentarius secretarius (S). Serpenteaire, Secrètaire (F). Secretary bird (E).
طائر من فصيلة القمقييات وسيه الجنس والنوع، كبير
الجثة، رشيقي القوام، ابيض اللد، طوله نحو ١٢٠ سم.
رأسه قصير وعريض. قننه متوج بكشك من الريش
الضيق المستطيل. وهو اشبه العين الكبيرة. احر الجفن.
غليظ المنسر الاوقف الحاد. طويل العنق والذنب والساق
كبير السقط. كثيف الريش. ظهره اريد اللون يعلمو
مواج ازرق. عنقه وبعقه ويتكابه الى الطحلة الزاهية.
قوادسه الى السمرة الداكنة. ذنبه مجذع الطرف || الاثنى
اكبر حجما من الذكر لكنها صغيرة الكشة. تنبش
من ٣ الى ٤ رفقات تحضنها نحو ٦ اسابيع في انصوص
تشيده بالطين وتبشقه بالخش والريش التام || اسطانه
البلاد الحارة. يألف الاماكن الآهلة ويدجن بسهولة.
قوته الافاعي حل اختلاف اجناسها وانواعها يقتنها
ايضا شامعها ولا يفت عن سائر الزحافات والقواغم اغصها
الجرذان والفئران والبراغيث وتؤايمها.

٢٢٣٨٥ - قُفَّعِيَّات

Gypogeranidae (S).
Gypogéranidés (F). Gypogéranidae (F).
فصيلة طير من كواسر النهار ورتبة الجوارح، وحيدة
الجنس والنوع يمثلها القمقم.

٢٢٣٨٦ - قُفَّعُ ، قُفَّعُ ، رَيْبَةُ

Actitis (S).
Guignette (F). Small hoe (E).
جنس طير من عمارة الطوطانيات وفصيلة دجائيات
الارض. صغير اللد منسجم الشكل. ثوبه مرقط الرأس
والظهر. ابيض البطن. منقاره معتدل الطول. رشفه دقيق
وقصير. ذنبه كثيف الانيك مستديره || يرتاد المناطق
وصفات المياه العذبة. قوته الحشرات والديدان والناكبات
والذباب. يدن عنه في الاجمار القريبة من الماء اغصها
الحلوف والعصفصاف والائل || الاثنى قبيض. يعضات
تحضنها بمناوبة الذكر نحو الاسيوسين || له نوعان فقط.

٢٢٤١٦ - قَفَص CAGE (F). Bird-cage (E).
محبس الطير وقد شاع استعماله للصائير البيئية .

٢٢٤١٧ - قَفْط، قَمَط COUVRIR (F). To cover (E).
قطف وقط الطائر أثناء : قفدها . وقطف الماطر : رُزا .

٢٢٤١٨ - قَفْصَاء
عشبة عوارية ثمارها قرون دقيقة تستدير كالحلق دون ان
تلتقي أطرافها . وهي من اسرار البقول (السان) .

٢٢٤١٩ - قَفْل Claveau (F). Arch-stone (E).
كل من الحجارة الواقعة بين الثلق والحجرين الاسفلين في
العقد .

٢٢٤٢٠ - قَفْصَل Balsamodendron kafal (S).
Baumier de Kafal (F). Balm of Kafal (E). Kafalischer
Balsambaum (D). Balsamo di Kafal (I).

نوع من البلسان، شجرته صغيرة القند فروعها فارشة . اوراقه
مركبة . ازهاره غليظ التجميع . ازهاره صغيرة القند بيضاء
اللون فواحة العرف المطري . اخشاها بخورية الرائحة .
يستخرج من سوقها بالحز عصاره راتنجية بخورية طيبة
الاستعمال .

٢٢٤٢١ - قَفْلَة ، قَفْلَة Arbre desséché (F).
Dried tree (E).

هي الشجرة اليابسة وقد كثر اسنادها الى الشجرة الحرجية
اليابسة .

٢٢٤٢٢ - قَفْلُوط هو الكراث الاندلسي ، اطلبه .

٢٢٤٢٣ - قَفْن Occiput
الجزء الخلفي الاسفل من رأس الحيوان يعرف عنه بالقحف
في الحشرات .

٢٢٤٢٤ - قَفْصِي Occipital
كل ما له صلة بالقحف .

٢٢٤٢٥ - قَفُور ، قَفْصِيَّة Fontanesia (S).
Fontansée (F).

قَفُور هو الاسم العربي ، اما العلمي فقعود التحريف على
اسم العلامة « Desfontaines » . جنس جنبايات وشجيرات
برية وزراعية صياغية وتزيينية من فصيلة القفورييات ||
انواعها المعروفة قليلة العدد ، مهددا بموت من الشرق الاقصى
الى الصين || سوقها فروعها تلون من مَرَّين الى اربعة امتار .
شكلها قريب الشبه بالياسم . افنانها نخلة متدلية . اوراقها
متعاقبة ، سنانية النصال اللرية . ازهارها صغيرة ، رباعية
البتلات الصبيكة ، عاجية اللون . لحاء سوقها ووروعها
صياغية ، صياغها الى الصغار الكبوريي الجميل || تنويرها
يستم من حزيان الى آب .

٢٢٤٢٦ - قَفُورِيَّات Desfontainacées (F).
Desfontaineaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة العنانيات مرتفعة
المبيض . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها تمتد من
الشرق الاقصى الى الاقصى || جميع نباتاتها شجيرات ونباتات
برية . سوقها فروع . اغصانها متباعدة او متدلية . اوراقها
متعاقبة ، قصيرة الاعناق ، سنانية النصال . ازهارها
رباعية البتلات ، صغيرة القند ، عاجية اللون او تبنية ||
اشهر اجناسها القفوز .

القند . رؤسائها الزهرية صفراء اللون ، عادمة اللسنيات .
توحيها فارشة استفجية التسج . بزورها مضلعة عادمة
الجناح والاغرة .

٢٢٤٢٧ - قَفَّالَة * Mya (S). Mye (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة القفاليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
جميعها من معط بحار المناطق الشمالية || اصداؤها بيضاء
اللون ، شبه بيضوية الشكل تملوها تنوات صغيرة ||
اجسامها مستطيلة المثاب المزدوجة التجميع . مصاريها
لامتناهية القند ، منفصلة الاطراف || تعيش في الرمال
والاسمال المغورة . لحومها مأكولة .

٢٢٤٢٨ - قَفَّالِيَّات Myidae (S).
Myidae (F). Myidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم .
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معط
بحار العالم || اصداؤها لاقشائية الشكل والقند ، قليلة
الاحديد ، مائلة السطوح . تتميز بمصاريها
اللامتناهية المنفصلة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها
القفالة والققيب والكربولة .

٢٢٤٢٩ - قَفَّة Couffe, Couffin, Cabas (F).
Hamperfrall, Basket (E).

وعاء ثنائي القطة من الاسل او القنب او الليف او
الكروشك يستعمل في نقل الاشياء .

٢٢٤٣٠ - قَفَر راسع بادية .

٢٢٤٣١ - قَفَر البود ، قَفَر البود Bitume de Judée (F). Bitumen of Judaea (E).
نوع من الحمر جيد الصنف يكثر في البحر الميت .

٢٢٤٣٢ - قَفْرِي * Xérophyte (F). Xerophyte (E).
نعت ترمي يطلق على كل نبات يستطيع مقاومة الجفاف .

٢٢٤٣٣ - قَفَرَات الطيَاء
قفزات الطياء كوكبة من ستة انجم وتسمى قفزات النزالان
ايضا .

٢٢٤٣٤ - قَفْرَة أول القفزة الاول نجم ثَير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤٣٥ - قَفْرَة ثالثة القفزة الثالثة نجم ثَير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤٣٦ - قَفْرَة ثانية القفزة الثانية نجم ثَير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤٣٧ - قَفْرِي * Saltatoire (F). Saltatory (E).
نعت ترمي ي يطلق على كل عضو من اعضاء القفز او
صالح للقفز عند الحشرات .

٢٢٤٣٨ - قَفْسَاء Estomac des ruminants (F).
Stomach of the ruminants (E).
معدة الحيوانات الهجرة تشتمل الكرش والقلنسوة وام التلافيف
والجوث .



قفالة

٢٢٤٣٥ - قُفُول هو التَّمْ، اطلبه .

Cakile (F).

٢٢٤٣٦ - قُفُول

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . أعطائها الشطوط الرملية .

Murette (F). Small wall (E).

٢٢٤٣٧ - قُلْ

هو الحائط القليل الارتفاع .

Zygophyllum (S). Zygophylle (F). ٢٢٤٣٨ - قَلَاب

جنس نباتات جنينية من فصيلة الفرقديات . انواعه نحو ٦٠ معظله بري وبمضها تربيته . سقها فراء جالسة . اوراقها متقابلة مركبة ريشية . ازهارها لفظانية خماسية التركيب . ثمارها عتية || اشهر انواعه التريينية قَلَاب القرم .

Zygophyllum fabago (S). ٢٢٤٣٩ - قَلَاب القرم

Zygophylle de Crimée, Fabagelle, Faux caprier (F). Syrian bean caper (E). Bohnenkapern (D). Fabaria, Favaggine (I).

نوع من القلاب وهو جنبة تربيته شائعة الاستعمال . موطنها بلاد القرم وقد عمت زراعتها التريينية جمع البلاد المحلطة الحرارة . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل أرجوانية اللون .

٢٢٤٤٠ - قَلَادَة

القلادة سنة كواكب يعرفن بالقوس .

Moniliforme (F). ٢٢٤٤١ - قِلَادِيّ، سُبْحِيّ

Moniliform (E). شكل من الزباني فواصله كعنب القلادة أو السحبة .

Figue (F). Fig (E).

٢٢٤٤٢ - قَلَار

ضرب من التين ابيض اذا جف اصفر لونه وهو اجود من الطيار .

Merycote (F).

٢٢٤٤٣ - قَلَّاس

القلّاس من استعمال القلّس للتنذية .

Muguet, Stomatite (F).

٢٢٤٤٤ - قَلَاع

Stomatitis (E).

القلّاع مرض معد يعرف بالتهاب غشاء اللّحم . يصيب البشر واللّغم . سببه فطر مجهرى شديد الاذى . مظهره الخارجى يقع بيض تركب اللسان ودخل الخد .

Brunella (S). Brunelle (F).

٢٢٤٤٥ - قَلَاع

Self-heal, Sikle-wort (E). Brunelle (D). Brunella (I). جنس نباتات عشبية برية عطرية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . سقها فراء . اوراقها متقابلة منقطة كاملة . ازهارها سنبل التجميع طرفي الاركاناز . ازهارها عطرية متوسطة الحجم مختلفة الالوان منها الاحمر والازرق والبنفسجي والابيض || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

Brunella hyssopifolia (S). Brunelle à feuilles d'hy-

sopie (F).

نوع من القلاع البري الترييني ساقه فراء تملو نحو ٤ سم . اوراقه غشيقة كاملة تشبه اوراق الزوفا . سبلته

Blettissement, Blettissure (F). ٢٢٤٢٧ - قُفُول
Becoming over-ripe or sleepy (E).

القفول كالنقوب والمزارة أو تمام نضج الشر .

٢٢٤٢٨ - قُفِير * ، عُلْيِيَّة ، مَبَاة

Ruche à cadres (F). Frame hive (E).

هو مأوى النحل صنع من الخشب ووجهز بالنحائث والاقراص الشمعية .

Haplophyllum (S). ٢٢٤٢٩ - قُفِيل

Haplophyllle (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السلابيات . انواعه المعروفة عديدة سنبها خضاب ونجاد الشرق الاوسط وبعض الاصقاع الاروبية || سقها متصلة فراءا متصبية . اوراقها بسيطة او ثلاثية التخريم . ازهارها عتي التجميع ، طرفي الاركاناز . ازهارها متباينة الاحجام والالوان || اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية .

٢٢٤٣٠ - قُفِيل حَرَجِيّ

Haplophyllum sylvaticum (S).

Haplophyllle de Syrie (F).

نوع من القفيل . سنبته احراج المناطق الجردية . ساقه فراءا ملسة . اوراقه ريمية النصال الحادة الاطراف . ازهاره صغيرة القد ، يفضاه اللون . تنويره صيفي .

٢٢٤٣١ - قُفِيل سُورِيّ

Haplophyllum syriacum (S).

Haplophyllle de Syrie (F).

نوع من القفيل . سنبته معظم الاصقاع السورية باستثناء القلّاب البحري . ساقه متصبية فراءا تملو نحو ٦٠ سم . اوراقه شبه بيضية الشكل ، ملوئية . اما العليا فثلاثية التخريم . ازهاره صفراء اللون . تنويره يمتد من الربيع الى اوائل الصيف .

٢٢٤٣٢ - قُفِيل مُسْتَطِيل الْوَرْق

Haplophyllum longifolium (S).

Haplophyllle à feuilles longues (F).

نوع من القفيل . سنبته جلاد الودية . ساقه فراءا متباينة اللند الخضراء الزرقة . اوراقه سنانية النصال الضيقة تطول من ٤ الى ٥ سم . ازهاره صغيرة متكايفة ، لونها الى الحمرة المرجانية . تنويره ربيعي .

٢٢٤٣٣ - قُفِيل مُهْدَب

Haplophyllum villosus (S) Haplophyllle velu (F).

نوع من القفيل . ساقه مزينة البهاه فراء . اوراقه السفلى اهليجية النصال اما الوسطى والعليا فثلاثية التخريم . ازهاره مهدبة الكزوس ، وردية اللون ، معتدلة الحجم . تنويره في اوائل الصيف .

٢٢٤٣٤ - قُفِيل تَجْمِيّ

Haplophyllum fruticosum (S).

Haplophyllle branchu (F).

نوع من القفيل . سنبته الخضاب والنجاد . ساقه كثيرة الفروع المراكبة . اوراقه السفلى بيضيه الشكل اما العليا فرمجة . ازهاره صغيرة القد لونها الى البياض الاصفر المواجه . تنويره صيفي .



قُفِير

Cambium

٢٢٤٥٥ - قَلْب، كَسِينِيوم

الطبقة المولدة في النبات. ج قلوب .

٢٢٤٥٦ - قَلْب، جُمَارَة، شَحْمَة

Bourgeon terminal du dattier (F). Terminal bud of date-tree (E).

البرعمة الحامية الطرفية في النخلة وهي شطية بيضاء رخصة طيبة الطعم تكون في أعلى جذع النخلة. وقد سمي قلباً لبياضه. ج قلبية .

٢٢٤٥٧ - قَلْبُ الْأَسَد

قلب الاسد نجم نير من كوكبة الاسد الاصفر .

٢٢٤٥٨ - قَلْبُ الْأَسَدِ الْمَلِكِيِّ

قلب الاسد الملكي نجم نير من برج الاسد وهو انور النجم الجبهة .

٢٢٤٥٩ - قَلْبُ الشُّجَاع

قلب الشجاع نجم نير من المرتبة الثانية ينتمي الى كوكبة الشجاع الانثى .

٢٢٤٦٠ - قَلْبُ الْعَقْرَب

Antares, Cœur du Scorpion (F). Antares (E).

قلب العقرب او القلب منزل من منازل القمر البانية . وهو نجم نير احر الصود من كوكبة برج العقرب . مركزه في اواسط البدن وراء الاكليل بين كوكبين يقال لهما النياط . وقبب القلب يدعى الدبران || وقلب العقرب يبعد عن الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية وهو من نجوم المجرة التي يزيده حجمها ٧٠ مليون مرة حجم الشمس .

٢٢٤٦١ - قَلْبُيُوس *٥

Plebeius (S). جنس حشرات فراشية من فصيلة القنليات. أنواعه عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جميعها صغيرة القند طولها يراوح من ٢٥ الى ٢٨ سم . اجسامها سمره اللون رواشها مختلفة الالوان المتداخلة يكثر فيها الازرق والبنفسجي والامطلح الموشم والمنقط بالاسود والاحمر || اناثها اكبر قدماً من ذكورها واقم لوناً واقف ورقة ونوشياً || رقاتها تتركب اوراق نباتات الفصيلة القرعية .

٢٢٤٦٢ - قَلْبُيُوس القَطَانِيَّات *٥

Plebeius idas (S). Argus bleu des légumineuses (F). Plebeius Idas (E).

حشرة من فصيلة القنليات ورتبة حشرغيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية فراشها راحته قوتها مفتر الزهار . سرقتها خاضعة قوتها اوراق القطنيات قوتها جسمها صغير القند يقبل نحو ١٠ سم . يسقطها نحو ٢٧ سم . رأسها صغير الحجم . عينها كبيرتان . زباناها مستطيلان ، شبه صوطانيان . جوشها ازرق اللون اطحل المواج عند الذكر ، كسني اللون عند الانثى . يطها اربط اللون عند الذكر ، كسني اللون الداكن القاتم عند الانثى || رواشها عند الذكر الى الزرقه البنفسجية وطرفها اطار اسود ينتهي بهامش ضيق ابيض . وهي عند الانثى الى الكسني الاصفر اوسع اطار تحيل ابيض تنقده نقط حر وسود || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في ايار وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في النهار . تماثل بدء ظهورها بحمسة اسابيع وتحت

الزهرية متوسطة القند تحمل ست زهرات || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٤٦٧ - قَلْع شَائِع *

Brunella vulgaris (S).

Brunella commune (F).

نوع من القلاع السبروتي الميزلول . ساقه متصبية فروع تملو نحو ٣٠ سم . اوراقه اهلالية الشكل . سبلته الزهرية قصيرة . ازهاره صغيرة بنفسجية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٨ - قَلْع كَثِير الزَهْر

Brunella grandiflora (S). Brunella à grandes fleurs (F).

نوع من القلاع البري الزينبي يرغب في الارربة الكلسية ساقه فروع تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه ييشية الشكل مسننة الحافة . سبلته الزهرية مستطيلة . ازهارها كبيرة القند ، متباعدة ، اردوانية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٩ - قَلْعَة

Aphite (F). Aphtha (E).

بثرة صغيرة بيضاء اللون تظهر في فم الحيوان المريض .

٢٢٤٧٠ - قَلْعَة

هي الحفافة . اطلبها .

٢٢٤٧١ - قَلْعَة

Involucre

مجموع القنليات حول قاعدة الخيمة الزهرية او الرئيس الزهري .

٢٢٤٧٢ - قَلْعَة

Palissade (F). Palisade (E).

اعمدة من البألون او الخشب تنصب عليها الاسلاك لتعريض الزكية ورمها عن الارض .

٢٢٤٧٣ - قَلْعَم

Conandron (S). Conandre (F).

جنس نباتات جنمورية عشية معمرة من فصيلة الجنسريات . انواعه قليلة . اوراقها قرصية التجميع ، ضمية . نصالها سنائية شديدة وسننة الحمار . ازهارها نورية التجميع ليلية اللون ، خاسية التفتح الوردى || ازهاره يستمر طول فصل الصيف .

٢٢٤٧٤ - قَلْب

Cœur (F). Heart (E).

عضو عضلي اجوف . وهو العضو الرئوي في الجهاز التنفسي لان حل عمله تتوقف حياة الانسجة والجسم . مركزه عند الانسان والحيوان في تجويف الصدر بين الرئتين من اليسار والقلب مركب من جزئين : ايمن ، يحوي الدم القاسد وايسر ، يحوي الدم النقي ويتكون كل جزء من تجويفين يعرفان بالاذن والبطين . ويتصل الاذن بالبطين الذي يقابله بقنصة حمائية . ويتصل الاذن الايمن بالوردين الايمنين السفلي والعلوي . ويتصل البطين الايمن بالشريان الرئوي الذي يتفرع الى فروع اصفر فاصفر تعرف بالشعيرات الدموية . ويتصل الاذن الايسر بالوردين الايمنين السفلي والعلوي . ويتصل البطين الايسر بالشريان الاهر . اما الدورة الدموية التي تستغرق نحو ثمانية اشرار الثانية فتجري حل الشكل التالي : يرد الدم الى القلب بواسطة الوردتين الايمنين الى الاذن الايمن ثم يتدفق الى البطين الايمن ومنه يخرج عن طريق الشريان الرئوي الى الشعيرات الرئوية التي تتجمع في فروع اوسع فتكون الاوردة الرئوية التي تحمل الدم المتأكسد وتصبه في الاذن الايسر ومنه يتدفق الى البطين الايسر ثم يتدفق الى الاهر الذي يوزع وصوله الى جميع الشعيرات الدموية المنتشرة في الجسم .



قلاع شائع



قلوبس



قلوبس القَطَانِيَّات



قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

Mallophages

٢٢٤٧٢ - قُلُوبُسَات

رتبية حشرات قارضة من طبقة القمليات. فصائلها عديدة جميعها عادمة الجناح. اجسامها صغيرة مفلطحة. رؤوسها كبيرة وعريضة. تأثيرها قوية، قربها الاستثنائية قصيرة || تميش طفيلية على الطير وبعض الحيوانات البورنة فتقرض الريش والصوف والوبر وبشرة الجلد والدم الجاف. صنها وبشي الشكل اغبر اللون تصفقه حيث تتحتم ان بالريش او بالصوف او بالشرم فينفذ عن حوريات تنسلخ عدة مرات قبل اكتمال طورها || اشهر فصائلها القرمشيات والمفرنيات والتمناتيات .

Alrain (F). Brass (E).

٢٢٤٧٣ - قُلُز

سبيكة من معادن مختلفة اغصها النحاس والقصدير .

Régurgitation (F).

٢٢٤٧٤ - قُلُس ٥

القلس طريقة تغذية خاصة ببعض الحشرات اغصها النمل. راجع لتقام .

Drainage (F).

٢٢٤٧٥ - قُلُس

هي عملية تصريف المياه من الآلية الربطة .

Calotte (F).

٢٢٤٧٦ - قُلْسَاء، قُلْسَوَة، قُلْسَوَة

هي الارسوة، اطلها .

٢٢٤٧٧ - قُلْسُوس

جاء في اللسان : نبات يكون منه اللاذن .

٢٢٤٧٨ - قُلْسُن ٥

Cyon dukhunensis (S).

Colsun (F). Colsun (E).

نوع من الكلاب المتوشحة المغرسة. ونهم من جملة نوعاً من الضفول. موطنه غابات غشوات الهندوس وادي حلايا وكشمير وأصام. جاعاته تمد من ٧ الى ١٢ زوجاً يرأسها ذكر سن. يقتصر الايل الاقرط وايل المسك واوروية الشرق وجميع الحيوانات الضعيفة || جسمه منقسم التقاطع، ابيض القد، يطول نحو ١٠٥ سم. ذنبه نحو ٥٠ سم. وارتفاعه ٥٠ سم. اذنه ٨ سم. لويه الى الشقعة الصنابية تسمر بعض التي، في الصيف. بطة تبي اللون. سباله اسود الحلب. ذنبه جزل الوبر الكثيف، منخفض الطرف || يسرح في النهار ويبيت في الليل .

٢٢٤٧٩ - قُلُوبُسُ أَسَدُ الرِّاسِ ٥

Malathia melanocephalus (S). Malathe mélanocéphale (F). Malathus melanocephalus (E).

حشرة دامتة من فصيلة المبقوسيات ورتبة غديات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المتدلة الحرارة من الشرق الاذني واوروية. تألف الاراضي المنقذة الباري الكثرة الصغور حيث تراكم المواد النباتية من اوراق وعمل وقش ونظام ... || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨. رأسها اسود اللون، قصير الخط. زبانا عيطيان مستطيلان. عينها كيرتان جاسفتان. كيرتها عذوب السطح، احمر اللون. ظهراتها جزوي اللون، معتدل الاحدياد، مستدير الطرف الاصح، ثنائي التميز التمذي القاطب. ارساغها خالية العقل || الاثني اصفر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه وقرص زبانا || لها جيل



قُلُوبُسُ أَسَدُ الرِّاسِ

الممكن مبيادياً على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات المائل || السرة تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، خفي القشار. ثوبها اخضر يملو تجنيم منترس اصفر. رأسها كستني اللون. مدبها ورواجبها الى الطحلة الخضراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحببها السرة على النبات المائل حيث تتدل .

٢٢٤٨٠ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ ٥

Plebeius argus (S). Plebeius argus (E).

حشرة من القمليات ورتبة حرشقيات الاجنحة. موطنها بعض المناطق المتدلة الحرارة من الشرق الاذني واوروية. فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار. سرتها تميش على اوراق الرزائل والقصور والشيع والتندول || جسمها صغير القد يطول نحو ٩ م. يسطها نحو ٢٥ م. رأسها صغير الحجم. عينها كيرتان. زباناها مستطيلان، شبه صولجانيان. حوشها ويطنها الى الزرقه يطوها مواج اغبر عند الذكر والى السرة الكستنية عند الاثني || رواشن الذكر الى الزرقه البنفسجية يطوها حشار اسود وتهديب ابيض. رواشن الاثني الى السرة الكستنية يطوها تهديب حنطلي ويطوها في الزوج الاثني ثلاث نقط صناعية || لها جيل واحد في الخول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في النهار. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد الممكن مبيادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة تطول نحو ٢٢ م. جسمها يبيهي الشكل، كثيف الحمل القصير، اخضر اللون اصفر المواج تملوه خمسة خطوط سود. رأسها اسود. مدبها ورواجبها الى السرة القائمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي معلقاً في النبات حيث تتدل السرة .

Cordiforme (F).

٢٢٤٨٤ - قُلُنِي

Cordiform, Heart-shaped (E). نعت تعريبي يوصف به الشكل الذي يشبه القلب .

٢٢٤٨٥ - قُلُنِيَّات

هي فصيلة السفريسيات، اطلها .

٢٢٤٨٦ - قُلُن

القلت النقرة في الجبل يستنقظ ثوبا الماء. ج. قلات .

٢٢٤٨٧ - قُلُن

Salière (F). Eye-pit (E).

القرة فوق عين القوس .

٢٢٤٨٨ - قُلُن

هو الدجر، اطلها .

٢٢٤٨٩ - قُلُن

Ane âgé (F). Aged ass (E).

القلع : الحمار المسن .

٢٢٤٩٠ - قُلُن

Irriguer (F). To irrigate (E).

قلد الزرع : سقا .

٢٢٤٩١ - قُلُن

Arrosage, Part d'eau (F). Watering, Share of water (E).

القله هو السقي ويوم السقي ويقال : ما بين القلدين ظرم. وهو النصيب من الماء . يقال اخذ قلده اي نصيبه من الماء. ج. قلدي واقلاد .

٢٢٤٨٨ - قَلْقُوسَةُ هَلَالِيَّةٌ *

Calophasia lunula (S). Calophasie à croissant (F). Calophasia lunula (E).

حشرة من فصيلة النسيقيات ورَبَّة حورثيات الاجنحة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم. فراشها واشعة قوتها رقيق الازهار. سرقها تعيش على اوراق نباتات الفصيلة الخنازيرية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٢ مم. بسطها نحو ٣١ مم. رأسها حنطي اللون. عينها كبرتان. زباناها خيطيان. جوشها وبطنها الى الحنطي الاسمر المواج || درشانا الاسمانيا، عند الشقين، الى الحنطي يعلو هلال ابيض ويتبعج اسمر وتجذع بني. درشانا الخلفيان الى الحنطي يعلو مواج اسمر عند الذكر || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في الليل. تعاثل بعد ظهورها باسبوعين وتمتص المكن لطعا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل، ماس القشار. ثوبها الى الزبداء السوداء تعلو خمسة خطوط مزدوجة قاطبة جزوية. رأسها الى الحمرة المرجانية. مدنها ورواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة حيث تلتحف بجلباب من الطين.

٢٢٤٨٩ - قَلْقُوسُ

وما تقرر عن اسفل مياه السيول متشققة بعد نفوسها. والقلقة: قشرة الارض التي ترتفع عن الكماء قتل عليها (السان).

Colophane (F). Colophasie (F). Colophasie (E).

٢٢٤٩١ - قَلْقَاسُ *

Colocasía antiquorum, C. esculenta, Arum esculenta (S). Colocase, Colocasie, Arum colocasie, A. d'Egypte, Taro, Mon, Sonje, Madère (F). Colocasia, C. eatable arum, Egyptian arum, Egyptian colocasia, Taro (E). Echte Blattwarz, Agyptisches Arum, Colocasia (D). Colocasia, Aro egiziano, Gichero (I).

نبات عشقولي زراعي معمر من فصيلة القلقاسيات. اصطناعه البلاد الحارة. ساقه ارضية عشقولية غليظة. اوراقه قرصية التجميع تقوم على مالميل مستطيلة منتصبه تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وهي كبيرة القد، قلبية الشكل، نصلها جامد الصفحة المتأرجحة قائم الخضار يطول من ٥٠ الى ٧٠ سم. ويعرض من ٣٠ الى ٤٠ سم. ضروبه الزراعية عديدة جميعها ترغب في الارربة الدبالية الرطبة. زراعتها تستقيم في التربة من ٧ الى ١٤ شهرا. محصوله وافر الانتاج. لباب عساقه بؤكزل بعد طبخه او نغمة بالماء لزوال ما فيه من مواد قارصة كاوية. ولبابه هذا يحوي نحو:

- ٢,٦٥ ٪ من المواد الازوتية.
- ٥,٥٦ ٪ من المواد الدهنية.
- ١٦,٨٢ ٪ من المواد الهيدروكربونية.

٢٢٤٩٢ - قَلْقَاسُ رُوسِي

هو عباد الشمس العشقولي، اطلبه.

واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسرح في الليل وتبيت في النهار. قوتها المواد النباتية المنحلة والصائرة نحو الانحلال || البرقة عند بلوغها الادراك الجسودي تطول من ١٢ الى ١٦ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل. رأسها وصدرها وتظهر سكهما وترجها الى السمرة الكسكنية القائمة. بقعها الظورية تنضيق وتضهر تدريجيا من سكرة الى سكرة مع ابتعادها عن الرأس. مدنها ورواجها اقل سمر من رأسها. درقتها مجهزة باسنان حادة. فكها خيليان || طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة في اوائل نيسان يستمر نحو اربعة اسابيع وينتهي في مجهر البرقة طليقا من كل غلاف.

٢٢٤٨٠ - قَلْع - Arracher (F). To pull (E). قلع النبات : استخرجه من التربة.

٢٢٤٨١ - قَلْعٌ ، حَكِي ، اِحْتِفَاقٌ - Arrachage (F). Pulling up (E). استخراج النبات من التراب.

٢٢٤٨٢ - قَلْف - Phloem القلف هو اجزءه الداخلي من لحاء الشجر يتميز بيوبيد الاوعية الغربالية المقطع التي تنقل اللسع الغذائي الكامل.

٢٢٤٨٣ - قَلْفٌ - Ecorer (F). To bark, To strip (E). قلف الشجرة : نزع منها لحاءها.

٢٢٤٨٤ - قَلْقَاقُ - Calophasia (S). Calophasie (F). Calophasia (E).

جنس نباتات بحلية معمرة من فصيلة النسيقيات. موطنها يمتد من الشرق الاذن الى اواسط القياقي الروسية. سوقها قرعاء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مركبة وثرية العدد اذهارها صفراء اللون، عشقودية التجميع || انواعه المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية :

٢٢٤٨٥ - قَلْقَاقُ الصُّوْلُوكَا - Calophasia Wolgarica (S). Calophasie de la Volga (F).

نوع من القلقاق. موطنه القياقي الروسية. ساقه تملو نحو ١٠٠ سم. افئاده منتبضة الانتداد، الحولية منها حلية اللحاء، ميمرة اللغد الدهنية. اوراقه مركبة وثرية العدد الذي يراوح من ١١ الى ١٩. وريقاتها صغيرة، حلية النصال. اذهارها صفراء اللون، تطول نحو ٢ سم. || تنويره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٢٤٨٦ - قَلْقَاقُ كَبِيرُ الزُّهْر - Calophasia grandiflora (S). Calophasie à grandes fleurs (F).

نوع من القلقاق. موطنه يمتد من جبال تركية الى ايران وافغان. ساقه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. افئاده جرداء اللحاء، عادمة اللغد الدهنية. اوراقه مركبة وثرية العدد الذي يراوح من ٢١ الى ٢٧. اذهارها صفراء اللون، تطول نحو ٣ سم. || تنويره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٢٤٨٧ - قَلْفَةٌ - نبات اخضر له ثمرة صفيرة والمال عليها حريص (السان).



قَلْقُوسَةُ هَلَالِيَّةٌ



قَلْقَاسُ

٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها تشبه ورق الزاب. أزهارها صغيرة القد صيوانية التجميع || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٢٥٠٢ - قُلْفَلَةٌ مَلَسِيَّةٌ

Minuartia laricifolia (S). *Alsine à feuilles de mélèze* (F).

نوع من القلقلات منبها الأثرية الرملية. ساقها تملو من ١٢ إلى ٢٠ سم. أوراقها ملسية الشكل مجنبة النصل الدقيق. أزهارها متعاقبة الإزكاكاز على الساق، كبيرة القد مستطيلة البتلات || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.



قلقله

Alsiniées (F).

٢٢٥٠٣ - قُلْفُيَّاتٌ

سبط من فصيلة القلقلات.

Geotrupes (S). *Géotrupe* (F). **قُلْفُورَةٌ**

جنس حشرات من الجعليات. أنواعه عديدة جميعها رأسه نائلة تسرح في الليل وتعيش على البراز وتختطف المواد العضوية المنحللة || أشهر أنواعه قلقلوة البراز.

٢٢٥٠٥ - قُلْفُورَةُ الْبِرَازِ *

Geotrupes stercorarius (S). *Géotrupe stercorale* (F). نوع من القلقلوة طويلا يراوح من ١٨ إلى ٢٥ سم. جسمها بيضي الشكل مفلطح الجرم صفحته العليا إلى السواد الأخضر المواجه صفحته السفلى إلى الزرقة الأخضر المواجه. تسرح من غروب الشمس إلى أواسط أو أواخر المربع الثاني من الليل. قوتها البراز أحمر دوث اللواب. عجزها سرداب ينور من التربة ترسف فيه كامل مكها بعد أن تلتفه بلحاف تحين من الروث يمدده الحرارة اللازمة حتى تنفث ثم التوت الفروري حتى الانسلاخ.

٢٢٥٠٦ - قَلَمٌ، قَلَمٌ، قَلَمُ السِمْعَةِ، حَامِلُ السِمْعَةِ

Style

أحد أجزاء مدقة الزهرة وهو غيط أجوف يحمل السمة ويوصلها بالمبيض.

Greffon (F). *Graft* (E). **قَلَمٌ**

هو العلم.

Bouture (F). *Slip* (E). **قَلَمٌ**

القلم والمعلقة والفلة قفص أو جزء من قفص يفصل عن النبات ويغرس. راجع عقلة.

٢٢٥٠٩ - قَلَمَتَتٌ هو نمع البر، أطلبه.



قلقلوة البراز

٢٢٥١٠ - قُلْفُنْبَاقٌ، رُشْدِيَّةٌ

جنس أشجار مشرة من فصيلة الحماسيات. أنواعه المعروفة اثنتان. منبها البلاد الحارة أعصها الهند. سوقها منتصب. أعضائها داخلة منفرجة. أوراقها متعاقبة مركبة ريشية. وريقاتها اعليجية شخية. أزهارها عقدوية التجميع، محورية الإزكاكاز، طرفية. ثمارها يفسية مستطيلة، لهايا حامز العلم مستحب النكهة يؤكل رطباً ومرباً. وهو من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الأثرية الغنية والمتوسطة الاندماج || يتكاثر بالبرز. أشجاره زهر وتثمر طوال السنة.

٢٢٤٩٣ - قُلْفُيَّاتٌ *Araceae, Aroidaceae* (S).

Aracées, Aroïdées, Aroidacées (F). *Araceae, Aroidaceae* (E).

فصيلة نباتية من وحدات الفلقة. أجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجتمع إلى ثلاثة أسباط: الرسيات والرنسيات والوجيات. نباتاتها صمغورية أو صمغوية معمرة. معظمها بري وبعضها زراعي وتربتي || عساقها لتخلو من المواد الكاوية السامة التي يفصل مفعولاً بعد الدلي أو التبع بالما أو التبعيض على النار.

٢٢٤٩٤ - قُلْفُيَّاتِي كُوبَةٌ

Starnæna cyanocephala (S). *Colombi-perdrix cyanocephale* (F).

طائر من القلقلات وفصيلة الحماميات. طوله نحو ٢٠ سم. قمة رأسه رصاصية اللون زرقاء المواجه، محاسره وقفته وزوره سود. ثوبه منطلي اللون المايق يعطو ملجؤ جوي. صدره إلى الجذوة الخمرية. منقاره أحر الانتشاب أزرق اللواقط. أرجله حر || يألف الإحراج والمناطق الصخرية. أسرابه صغيرة يراوح عدد أفرادها من ١٢ إلى ٤٠. قوته الثار والحبيب والبلور. ينش في الجينات والأشجار القليلة الارتفاع. أناته تبيض بيضتين.

٢٢٤٩٥ - قُلْفُيَّاتِي كُوبَةٌ

جنس صير من فصيلة الحماميات. أنواعه قليلة تتميز بشكلها الذي يشبه شكل الحجل. مناقرها قوية مخدبة. أجنحتها قصيرة شبه مستديرة، أذناها عريضة مستديرة. أرسافها طويلة، أصابعها قصيرة. غالبها قوية || أشهر أنواعه قلقلتي كوبة.

٢٢٤٩٦ - قُلْفُيَّاتِي كُوبَةٌ

هو الزراج الأخضر، أطلبه.

٢٢٤٩٧ - قُلْفُيَّاتِي كُوبَةٌ

هو الزراج الأخضر المكلس.

٢٢٤٩٨ - قُلْفُيَّاتِي كُوبَةٌ

هو السنا البري. شجرة تقارب الرومان تحمل حباً أسود مستديراً في سيم القلقل أو أكبر يبرأ ألس فيه لزوجة وحلاوة حسن الثم وبق هذا الشجر اللغات.

٢٢٤٩٩ - قُلْفُيَّاتِي كُوبَةٌ

Minuartia, Alsines (S). *Alsine* (F). *Alsine* (E). *Scieinmère* (D). *Alsina, Centocchio* (I).

جنس نباتات شبيهة برية معمرة من فصيلة القلقلات. أنواعه المعروفة نحو ١٢ منبها الشرق الأدنى وأروبية الجنوبية. جميعها صغيرة القد قليلة الفروع. أوراقها متعاقبة نصالها مخزنية أو هدية الشكل. أزهارها صغيرة الحجم يبيض اللون || أعصرها ما يتبع:

٢٢٥٠٠ - قُلْفُيَّاتِي كُوبَةٌ

Minuartia liniflora (S). *Alsine à fleurs de lin* (F).

نوع من القلقلات، منبها الأثرية الكلسية. ساقها تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها منتصبية جامدة مهدبة. أزهارها صمغورية القد متعاقبة تشبه زهر الكتان. أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

٢٢٥٠١ - قُلْفُيَّاتِي كُوبَةٌ

Minuartia juniperina (S). *Alsine à feuilles de genévrier* (F).

نوع من القلقلات، منبها الحجاب والجبال. ساقها تملو من

٢٢٥١١ - قَلْبَاقٌ لَدِيدٌ *

Averrhoa carambola (S). Averrhoa carambole, Carambolier (F). Caramba, Carambola (E). Karambolabaum, Karambole (D). Averroa carambola, A. acellare (I).

نوع من القلبياق. شجرته صغيرة القد تملو نحو ٤ أمتار. أوراقها عابلة. وريقاتها ثلاثية أو خماسية الأزواج. تصلها مالمس البشرة، قائم الخضار. أزهارها صغيرة القد، بيضاء اللون أو وردية. ثمارها اهليلجية الشكل، خماسية التضخيد، صفراء اللون، غصراء المواج. لبها غزير العصارة، ذكي العرق، مأكول.

٢٢٥١٢ - قَلْبَاقُوسَةُ Plexus (E). Bonnet, Réseau (F). قسم من أقسام عدة المجترات صغير الحجم يتصل بالكرش من جهة وبأم التلافيف من الجهة الثانية. راجع ممد.

٢٢٥١٣ - قَلْبَاقُوسَةُ هي الارسوسة، اطلبها.

٢٢٥١٤ - قَلْبَاقُوسَةُ Collinsia (S). Collinsie (F). جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الخنازريات. انواعها عديدة منها البرية والزراعية الصياغية والتزيينية. مهدها البلاد الامريكية. أوراقها كاملة متقابلة. أزهارها زاهية الالوان فضية التجميع متتالية || تتكاثر بالبر. ترطب في التربة الحلوة الوفرة المواد الغذائية. اعرف انواعها واشهرها ما يلي :

٢٢٥١٥ - قَلْبَاقُوسَةُ ثنائية اللون Collinsia bicolor (S). Collinsie bicolor (F). عشبة تزيينية زياء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقها معتقة تصلها ساني الصفحة، سنن الحافة، قلبي القاعدة. أزهارها ثنائية اللون فيها البنفسجي والايض. أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٦ - قَلْبَاقُوسَةُ وَبَيْعِيَّة Collinsia verna (S). Collinsie printanière (F). عشبة تزيينية مزهجرة. ساقها منتصبه فراء تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها معتقة تصلها خللي البشرة سنن الحافة. أزهارها الى الزرق. اطراف بتلاتها يبيض وهي متوسطة القد مستطيلة الاذن || أزهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٢٥١٧ - قَلْبَاقُوسَةُ صَيَاغِيَّة Collinsia tinctoria (S). Collinsie tinctoriale (F). عشبة صناعية زياء. ساقها منتصبه تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها لائقة، اهليلجية، تصلها غدي الصفحة المثلثة. أزهارها الى البياض الاصفر المواج يملو توشيح ارجواني. أزهارها سني.

٢٢٥١٨ - قَلْبَاقُوسَةُ كَبِيرَةُ الزَهَر Collinsia grandiflora (S). Collinsie à grandes fleurs (F). عشبة تزيينية سرحة. ساقها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. أوراقها اهليلجية سميكة النصل المادم التسنين. أزهارها الى الزرق الموشحة بالوردي. بتلاتها كبيرة مستطيلة مجحة. أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٩ - قَلْبَاقُوسَةُ Stylium (S). Stylium, Styliolier (F). جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة القلبياق. انواعها المعروفة ثلاثة جميعها تزيينية تزور



قلْبَاقٌ لَدِيدٌ

في المراكن وفي المواقع الرطبة شرط ألا تتعرض للصقيع في فصل الشتاء. أوراقها متباينة الاشكال وبها المصفية. أزهارها حيلة ملونة.

٢٢٥٢٠ - قَلْبَاقُوسَةُ Stylidiaceae (S). Stylidiacées (F). Stylidiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القمالات منخفضة المبيض. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد جميعها نباتات عشبية وغشوشية ترطب في المواقع الرطبة والمناطق اشهر اجناسها القلفلة.

٢٢٥٢١ - قَلْبَاقُوسَةُ هي القصور، نبات بري طبي معمر.

٢٢٥٢٢ - قَلْبُوسُ Outardeau (F). Young bustard (E). فرخ الجباري (اللسان).

٢٢٥٢٣ - قَلْبُوسُ Chamelle jeune (F). Young she-camel (E).

قال الجاحظ : « الشاة من النوق. وهي اول ما يركب من اناث الابل الى ان تنثي فاذا انثت فهي ناقة ».

٢٢٥٢٤ - قَلْبُوسُ، قَلْبُوسُ Alcalin (F). Alkaline (E). نوبة الى القلي. يقال اربة قلوبية وسائل قلوبى واملاح قلوبية.

٢٢٥٢٥ - قَلْبُوسَةُ، قَلْبُوسَةُ Alcalinité (F). Alkalinity (E). خاصية المواد القلوبية. وهي اعتماد مقدار الدائف، في محلول ما او محيط ما، من رقم الاعتدال المعين وقدره سبعة الى ما فوق ذلك الرقم. راجع دائف.

٢٢٥٢٦ - قَلْبُوسَةُ، شَيْبَةُ قَلْبُوسُ Alcaloide (F). Alkaloid (E). مادة عضوية تتميز بغواصها المشابهة لغواص القلي.

٢٢٥٢٧ - قَلْبُوسُ هو اشنان القلي او الحرض، اطلبها.

٢٢٥٢٨ - قَلْبُوسُ، قَلْبُوسُ Alkali (F). Alkali (E). مواد مركبة من معدن واكسجين كالكلس والبوتاس والصودا والمغنيزيا.

٢٢٥٢٩ - قَلْبُوسُ Pâurin commun (F). هو تف البر، اطلبه.

٢٢٥٣٠ - قَلْبُوسَةُ خَطْمَاءُ، قَلْبُوسَةُ الزَرْع Aelia rostrata (S). Aelle rostré, Punaise des céréales (F).

حشرة مؤذية من فصيلة القاسيات. جسمها مفلطح، اهليلجي الشوزن، يطول نحو ١٢ مم. ثوبها الى الخفسار الاصفر المواج يملو تبشير اسمر يمتد من الرأس الى الكوسل فالجلفة فالحنجين. رأسها مخروطي. غصنها مستطيل. عينها صغيرتان. زباناها مستطيلتان. كوسلها قلمي الشوزن. حجبها وحجبها سنانة الاطراف، متقاربة الطول. قشراتها شفاف. يعلها وقوتها الى الخفسار الاصفر الاسمر المواج || مرتها النباتات النجيلية وبها الزروع || راحتها كرمية.

واجناسها وأنواعها قليلة العدد جميعها عشوية . التعامل يتم البطن على البطن واست الواحد في قم الآخر || أشهر فصائلها الخرطونيات .

Callianthemum (S).

٢٢٥٣٩ - قَلْبَت

Callianthème (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشقيقيات . أنواعه المعروفة قليلة جميعها اشباح جبلية برية تعيش في المناطق التي يراوح ارتفاعها من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ م . جذورها جنيشة يتوسطها شراخ يعمل حسب الانواع من ١٠ الى ٣٠ سم . وينتهي زهرة متوسطة القذ يفضاء اللون او وردية براوح عدد بتلاتها من ٦ الى ١٦ . اوراقها جلدية الانتشاب مستطيلة الزناد مشرمة ومفرصة . اعرف انواعه قلبت سدائي الورق C. rutaefolium (S). قلبت كزبري الورق C. corlandrifolium (S).

Saillir (F). To serve (E).

٢٢٥٤٠ - قَم

قم واقم الفحل الاابل : اشتتل عليها وضربها كلها .

٢٢٥٤١ - قِمَاء

القِماء : الاماكن التي لا تصيبها الشمس . الواحدة قَاء .

Ectopistes

٢٢٥٤٢ - قِمَارَى

جنس طير وحيد النوع من فصيلة الحانيات . يتميز باستطالة جناحيه واظفكيه . منقاره دقيق البنية . رصنه قصير وسرول . حبله الاوسط بين الانعفاف . واحد قري اطله .

Reproduction des oiseaux (F).

٢٢٥٤٣ - قِمَاط

Reproduction of the birds (E).

القِطاط : سفاد الطير . وقيل زين تراصع الطير .

Acidie (F). Ascidium (E).

٢٢٥٤٤ - قِمَاعَة

عارض جسموري يكثر في المالح ، يشو اوراق النبات بتردياته النصيلة التي تشبه القمع او البرق او الاناء .

Polycarpon (S).

٢٢٥٤٥ - قِمَاعَة

Polycarpon (F). Polycarpon (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة النونانيات . انواعها المعروفة ستة منها بعض اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || سوفها فراء ، معظمها منتصب وبضها مستلق . اوراقها متعاقبة ، فصالحا لحسية ، سنانية الشكل ، مخنجة ، خلية البشرة . ازهارها لاقائية التجميع ، منها الفردية والثنائية والثلاثية والرباعية . اوراقها تراوح بين الودي والودي الاخضر او الاربواني الموالج .

٢٢٥٤٦ - قِمَام

ايام من آخر ايلول بقدر شهور السنة يستدل منها فيما قبل عن حالة الهواء في كل شهر من السنة القابلة .

٢٢٥٤٧ - قِمَام هو الاس المحدث الورق ، اطله .

Vaccinium (S).

٢٢٥٤٨ - قِمَام

Airelle, Vaccinier (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخنجنيات انواعه نحو ٤٠ فيها الشجيرات والنباتات والجنات وسوها فراء . اوراقها متعاقبة متبادلة . ازهارها ورية التجميع ،

Kellya (S).

٢٢٥٣١ - قَلْبَة

Kellya (F). Kellya (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وفصيلة البرسنيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها صغيرة . اصداها قبابية شبه صويانية الشكل . تعيش لاصقة بالصخور . ليفها غزير المادة .

٢٢٥٣٢ - قَلْبِس

ما يترك من السل منه اشتباهه او ما تمجه النحل من السل في ظروف معينة .

٢٢٥٣٣ - قَلْبَسَة مُسَجَّجَة

Callistus lunatus (S). Calliste orné (F).

Callistus lunatus (E).

حشرة واجمة قانصة من فصيلة القليسيات وربة غمديات الاجنحة . تألف الاراضي الكلسية في التهام والمغصاب البحرية الممرض || جسمها صغير القذ يطول من ٦ الى ٧ م . رأسها قصير الخطم ازرق اللون فكها ضليمان . زباناها خيطيان ، مستطيلان . عينها صغيرتان . كرسها احمر اللون . ظهورها الى الخمرة الزاغية تملو اربع بقع كبيرة وبقيتان صغيرتان لونها الى السواد الازرق الموالج || لها جيل واحد في الحول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || يرقها تطول من ١٠ الى ١١ م . جسمها مربع السكر ، اضحل اللون اسمر اللب ، اسود الرأس والشرج ، ضليع التأثير الحادة . قوتها المواد العضوية تسمى اليها بدون انقطاع لانها شديدة النهم || طور الاكمال يستمر نحو خمسة اسابيع .

Callistidae (S).

٢٢٥٣٤ - قَلْبِسِيَّات

Callistides (F). Callistidae (E).

فصيلة حشرات لاحة قانصة من ربة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم واخصها البلاد الحارة || جميعها صغيرة القذ او متوسطة الطول الذي قلما يتجاوز ٢٥ م . اجسامها خلية القشار ، جميلة الالوان الزاغية اللامعة . رؤسوها شبه اسطوانية الجرم ، ناشزة العيون ، مستطيلة الزباني ، معتدلة الكواهل اللاقائية الشكل ، لاحقة الاغداد التساعية الاغاديد المتزاوية || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسمى بسرعة ورشاقة وتعتبر بصفة || قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر ولا تمت من فريسة تستطيع اليها سيلا || أشهر اجناسها القليسية والشلنوس .

٢٢٥٣٥ - قَلْبِسِي

هو ابلق القلع ، صغفون من الجواثم صغير القذ ابلق الثوب يكثر من الوقوف على الصخور ولذا سمي قليسي .

Fruits desséchés (F).

٢٢٥٣٦ - قَلْبِف ، قَلْف

Dried fruits (E).

هي الثيار الحقيقية الموضبة .

٢٢٥٣٧ - قَلْبِقَلَّة هي السبرغولة ، اطلها .

Oligochètes (F).

٢٢٥٣٨ - قَلِيلَات الْهَلَب

Oligochaeta (E).

ربة من الحلقيات المفرديات تتميز بخلوها من اللواس والايلل والناياشيم . اما هلبا فشد القصر ، قليل العدد اذا لا يتجاوز اربعة ازواج في كل فتحة || فصائلها



قَلْبَة



قَلْبَة مَبْجَة

اوراقه ابيدة نخيلة ملتفة الاطراف تطول نحو ١٠ سم. ازهاره الى الحمرة الفاتحة. ثماره وردية اللون مأكولة ويستقطر منها مشروب كحولى لذيد الطعم. اوراقه وافنائه وجذوره عاصفة تستعمل في الدبابة.

٢٢٥٥٥ - قِيَام كَبِير الثَمَر

Vaccinium macrocarpum, *Oxycoccus macrocarpa* (S). *Airelle à gros fruits*, *Canneberge à gros fruits* (F). نوع من القِيَام، جنينه مثدودة تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه ابيدة سنانية تطول نحو ٣ سم. نصلها جامد الصفعة ملتصق الحنار. ازهاره لاقواسية التجميع فيها الاحادية والثلاثية والخناسية والسبابة والتساعية. ثماره مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

Vaccinium arboreum (S). **قِيَام مُشَجَّر**. *Airelle en arbre* (F).

نوع من القِيَام، شجرته تملو من ٤ الى ٨ امتار. فروعها وافنائه خالية اللحاء. اوراقها عابطة سنانية تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها جامد التسنج، مالمس الصفعة العليا الالامعة الخضار، خلى السفلى البحرية اللون. ازهاره الى البياض الوردى. ثماره سود حامزة عاصفة لا تؤكل.

Ordures des villes (F). *Ordure of city* (E).

بقايا الماطبخ وكناسة البيوت والشوارع تستعمل في تسميد التربة وهي من الاسمدة العضوية.

Vacciniées (F).

سبط من فصيلة الخنجاتيشم يشمل بعض الاجناس والانواع. معظمها من نباتات جبال البلاد المعتدلة الحارة. اشهر اجناسه القِيَام.

Nanisme (F). *Nanism* (E). **قُمَاة**.

خاصة في بعض النباتات والحيوانات تمتنع عن اتخاذ حجمها المألوف فتتلبت صغيرة. من اسبابها الرئيسية في النبات فقر التربة ببعض العناصر الغذائية.

Vertex

قمة الرأس هي النافوخ، اطلبه.

Triticum (S). **قَمَح * حِنْفَة**. *Blé*, *Froment* (F). *Wheat* (E). *Weizen* (D). *Fromento* (I).

جنس نباتات عشبية زراعية حولية من فصيلة النجيليات جلورها جرة دقيقة. سوقها شطاء، قصية، اسطوانية، مستقيمة، فارقة، سلاية التركيب، مصمتة العقد والاطراف التي تنتهي بالسنايل. سنايلها محورية مركبة من عدة سفيللات متتالية. اما الاشطاء فانها ترسة الانتشاب وهي على فنتين امهات وبنيات فالامهات تلك التي سوقها وسنايلها تطول قدر السيلة الرئيسية اما البنيات فتلك التي تتأخر عن الامهات وقد تكون سنايلها عادمة البر. اوراقها متعاقبة مستطيلة مركبة من قسمين: غمد طويل ملتصق برتكز على العقدة ويحفن السلاي ونصل ضيق مستطيل يدعى المصقلة يرتكز عند قاعدة انفصاله عن الغمد على لسين مسن الحنار وعلى اذنين تكثفان الساق || اما ثمارها فيايسة لانفجرة تدعى البر. الواحدة برّة. تلوّثه - راجعه في كلمة حنفة.

محورية الازتكاز. ثمارها عنبة الشكل، حامزة الطعم. مأكولة || احرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٢٥٤٩ - قِيَام أَحْمَر *

Vaccinium vitis-idaea (S). *Airelle rouge*, *Myrtille ponctuée*, *Vigne de l'Ida* (F). *Cow-berry*, *Whim-berry* (E). *Preisselheidelbeere* (D). *Bacéri vite Ida*, *Mortella punteggiata*, *Vigna d'orso* (I).

نوع من القِيَام جنينه جبال البلاد المعتدلة الحارة. جنينه تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه سنانية صغيرة تطول نحو ٣ سم. نصلها بحري اللون على صفحته. ثماره الى الحمرة القرمزية يستخرج منها بعد تخميرها وتقطيرها مشروب كحولى لذيد الطعم.

٢٢٥٥٠ - قِيَام آسِي *

Vaccinium myrtillus (S). *Airelle myrtille*, *Abretier*, *Myrtille* (F). *Blackberry*, *Whortle-berry* (E). *Echte Heidelbeere* (D). *Bacéri mirtillo*, *Mirtille*, *Uva ursina* (I).

نوع من القِيَام. جنينه فناء تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها صغيرة القد آسية الشكل، نصلها جامد التسنج اخضر الصفعة. ازهارها وردية، خناسية الفصوص، عشارية الاسدية. ثمارها خرية اللون مأكولة ويستقطر منها كحول لذيد الطعم || جذوره وافنائه واوراقه تستعمل في الدبابة.

٢٢٥٥١ - قِيَام المَنَاقِع *

Vaccinium uliginosum (S). *Airelle des marais*, *Canneberge* (F). *Crauberry*, *Moss-berry* (E). *Mosshelbeere* (D). *Mortella di palude*, *Mortellina di lago*, *Scopa fruttifera* (I).

نوع من القِيَام المبدول يكثُر في المناطق الرطبة، ساقه فراء تملو نحو ٨٠ سم. اوراقه عابطة صغيرة، القد، نصلها سناني الشكل يطول نحو ٣ سم. صفحته بحرية اللون. ازهاره احادية او ثلاثية التجميع. ثماره سكرية الطعم مأكولة وصالحة للتقطير.

٢٢٥٥٢ - قِيَام جَبَلِي *

Vaccinium arctostaphylos (S). *Airelle de Cappadoce*, *Thé de Trébizonde* (F). *Oriental whortle-berry*, *Trebizond tea* (E). *Broussatee* (D). *Tè di Brousse*, *Vaccinio di Cappadocia* (I).

نوع من القِيَام يكثُر في بعض مناطق البلاد التركية. اوراقه ابيدة، نصلها جامد الصفعة الضيقة المسنة الاطراف. ازهاره قديمة الشكل بياض اللون احادية او ثلاثية التجميع. ثماره حامزة عصصة حراء اللون || اوراقه صعبة تستعمل استعمال الشاي.

٢٢٥٥٣ - قِيَام عُنْكَرَلِي *

Vaccinium corymbosum (S). *Airelle à corymbes* (F). نوع من القِيَام جنينه تملو من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. ساقها وفروعها وافنائه سرحة. اوراقها عابطة تطول نحو ٧ سم. نصلها مدند الصفعة، قليل اللمعة. ازهارها وردية اللون، خناسية او سبابة التجميع، عشكولية الترتيب. ثمارها الى الزرقة السوداء وهي مأكولة ومسناعية كحولية.

٢٢٥٥٤ - قِيَام صَغِير *

Vaccinium oxycoccus, *Oxycoccus palustris* (S). *Airelle commune*, *A. à maurets*, *Canneberge commune*, *Brimbelle* (F). *Small cranberry*, *Bog-berry*, *Feu-berry* (E). *Moosbeere* (D). *Bacéri canneberg*, *Vaccinio dei paduli* (I).

نوع من القِيَام، ساقه مسطحة تطول من ٢٠ الى ٨٠ سم.



قام احمر



قام آسي



قام المناق



قام جبلي



قام صغير

٢٢٥٧٧ - قَمْحُ صَبْ ، قَمْحُ قَاس

Triticum durum (S), Blé dur (F).

من الانواع الجرد تكثر زراعته في بلاد حوض البحر المتوسط. ضروبه واصرامه كثيرة العدد. سوقه مسننة او جوفاء. سنابله مسقوية. برء مستطيل الشكل صلب المكسر.

٢٢٥٧٨ - قَمْحُ لَبْن

Triticum sativum (S).

Blé tendre (F), Common wheat (E), Saatweizen (D), Fromento comune, Frumento, Biada, Grano (I). من الانواع الجرد تكثر زراعته في البلاد الاوروبية والامريكية ضروبه كثيرة العدد واصرامه ايضا. سوقه جوفاء سنابله كبيرة القد منها السفوية واللاسقوية. برء لاقشاسي الشكل والدون. لين المكسر اللينقي.

٢٢٥٧٩ - قَمْحُ تَشْرِي

Triticum dicoccum, T. amyleum (S), Blé de Jérusalem, Amidonnier (F), Two grained wheat, Emmer wheat (E), Emmer, Emmerweizen, Emmerkorn (D), Fromento di Gerusalemme (I).

من الانواع المكشبة. زراعته محصورة بعض جبال اربوة الوسطى والشرق الاذن. ضروبه واصرامه قليلة. سوقه فارغة. سنابله كثيفة مسقوية. برء حنطي اللون، ابيض المكسر، غزير المادة التشوية.

٢٢٥٨٠ - قَمْحُ وَحِيدُ الْحَبَّةِ

Triticum monococcum (S), Blé locular, Engrain, Petit épeautre (F), One grained wheat, Small spelt (E), Einkorn, Einkornweizen (D), Fromento loculare, Piccola spelta (I).

من الانواع المكشبة. زراعته معروفة في ألمانيا وهنغاريا وروسيا. ساقه فارغة. سبلك مستطيلة مسقوية. سليلاته وحيدة الحبة. برء حنطي اللون اصفر المواج.



ح

٢٢٥٨١ - قَمْحَر

Lune (F), Moon (E).

جرم سماوي كروي الشكل يشهد ضوؤه من الشمس ويمكنه على الارض. وهو اقرب الاجرام اليها فقله يبلغ نحو ٣٥٠٠ كلم. وحجمه نحو ثلث من حجم الارض وهو يدور حولها في فلك اهليلجي بعد اوجيه منها، وهو المسافة القريبة، يبلغ نحو ٣٥٤٥٨٠ كلم. وبعد مسافة البعيدة، يبلغ نحو ٤٠٤٧٥٠ كلم || ولقمر ثلاث حركات، البيوتية واليومية والصمودية وهو يتنجز دورته حول الشمس في اربعة اسابيع. والحركة الصمودية هي التي يشهد عليها في حساب السنة القمرية التي يبلغ عدد ايامها ٣٥٤ يوما اي انها تنقص ٥٨ دقيقة عن السنة الشمسية || اما الشهر القمري فلدته ٢٩ يوما و١٢ ساعة و١٤ دقيقة.

٢٢٥٨٢ - قَمْحَر

Caranx luna (S).

نوع من السم. وهو سمكة بحرية مأكولة كبيرة القد تظول نحو ٦٥ سم. اطائها مياه مجار البلاد المعتدلة توجد في المتوسط. تكثر في مناطقه النائية.

٢٢٥٨٣ - قَمْحَر التُّفَّاح

Echadure lenticulaire (F), Lenticel spotting, Apple scald (E).

عارض يصيب ثمار التفاح والاباجس اخفزة في الرباد سببه تجمع بعض الغازات الناتجة عن تنفس الثمار في اثناء تخزينها || مظهره الخارجي بقع صغيرة بيضاء اللون تملأ سطح البشرة ثم تنتشر رويدا رويدا الى ان تغطيها بكاملها فتسبب عندئذ عطب الالباب على عرق يراوح من ٢ الى

القيمه - يحتاج القمح في دورته الحياتية القائمة بين اناته واستحصاده الى كمية من السرعات الحرارية يراوح قدرها بالنسبة الى مختلف ضروبه واصرامه من ١٧٠٠ الى ٢٣٠٠ سعرة. ولا يحصل انتاش اذا كانت الحرارة دون الست درجات سنغ. او فوق ٤٥ درجة سنغ. اما اصالح حرارة لانباته فهي التي يراوح مددها من ٢٢ الى ٢٨ درجة سنغ. لذلك يمكن القول ان اقلهم الخطة يشمل العالم باستثناء المناطق القطبية والجبلية العالية ومناطق غط الاستواء التي يراوح ارتفاعها من سطح البحر من صفر الى ٢٠٠٠ م. ترتبه - ينبت القمح في مختلف الارربة التي ألفها بالزراعة المتتالية لكنه يرغب في الارربة العميقة الغور المنسوبة التركيب الحكمي المتوسطة الانتماع التي تستوعب الامطار وتحافظ على الرطوبة ولا ينجو في الارربة الكلسية والويلية لانها تجف سريعا وهو يخشى الارربة الطينية المندجة لانه يتضرر من تماسكها ومن مغاييل نقيضها الرطوبة المفرطة والجفاف الزائد.

انواعه - انواعه الزراعية سبعة اما ضروبه واصرامه فثلاثة العدد. وانواعه الرئيسية هذه تقسم الى قسمين : الانواع الجرد وعددها اربعة والانواع المكشبة وعددها ثلاثة. فالانواع الجرد التي تنفصل فيها البر عن عصيفاته والتي تتميز بلين قمار سنابله ولدانها وعدم انفصالها، اربعة : القمح الصلب والقمح اللين والقمح البولوني والقمح الششين. والى الانواع المكشبة التي لا تنفصل برها عن عصيفاته والتي يسهل انقصام سنابله وقصمها فهي : القمح الربوي والقمح التشري والقمح الوحيد الحبة.

٢٢٥٨٤ - قَمْحُ الْبَرْ

Sarrasin ménager, Bucall (F).

هو السرازان المعروف، اطلبه.

٢٢٥٨٥ - قَمْحُ الْبَرْ الْمُنْدِي

Blé de Tartarie (F).

هو السرازان التشري، اطلبه.

٢٢٥٨٦ - قَمْحُ بُولُونِي

Triticum polonicum (S), Blé de Pologne, Froment de Pologne (F), Polish wheat (E), Polnischer Weizen (D), Fromento di Polonia (I).

من الانواع الجرد تكثر زراعته في بعض مناطق اربوة وافريقية الشمالية. ضروبه واصرامه عديدة. برء شديد الاستطالة، جامد المكسر الصلب.

٢٢٥٨٧ - قَمْحُ ثَخِين، قَمْحُ عَرَبِي

Triticum turgidum, T. vulgare (S), Blé renflé, Froment renflé, Poulard, Gros blé (F), Humpy grained wheat, Turgid wheat, Rivet wheat (E), Englischer Weizen (D), Fromento turgido, Grani grossi (I).

من الانواع الجرد. تكثر زراعته في الشرق العربي لكنه يرغب في الارربة الحوارة الوافرة المواد الغذائية. ساقه مسننة في اعلاها. سبلكه مربعة الاصلع، كثيرة البر. برته غليظة عديدة، صلبة المكسر.

٢٢٥٨٨ - قَمْحُ رُؤُوسِي، قَمْحُ مَكْتَسَر، عَتَس، عَتَد رُؤُوس

Triticum spelta (S), Blé vètu, Epeautre, Grand épeautre (F), Spelt wheat, Dinkel wheat (E), Spelz-Weizen (D), Spelta, Marzolo, Fromento rosso (I). من الانواع المكشبة. زراعته محصورة بالاقليم الباردة والجبلية. ضروبه واصرامه معدودة. سوقه عالية فارغة. سنابله فرقة، مستطيلة، مسقوية، لونها يختلف باختلاف الضروب منها الابيض والاحمر والاسمر.

٢٢٥٨٠ - قَمَرُون * هو الاربيان ، اطلبه .

٢٢٥٨١ - قَمَرُون رَشِيق (F). *Gnatophyllé élégante*

دويبة من القشريات وفصيلة القريدسيات مشهورة باسم غير . اطلبه .

٢٢٥٨٢ - قَمَرِي (F). *Lunaire* (F). *Lunar* (E).

٢٢٥٨٣ - قَمَرِي (F). *Lunifforme*, *Lunulaire* (F). *Lunifirm* (E).

نمت تمريني يوصف به ما كان شكله شكل القمر .

٢٢٥٨٤ - قَمَرِي * *Ectopistes migratoris* (S). *Ectopiste migrateur* (F).

طائر من القاربي وفصيلة الحاميات كنيته ابو ذكري وابو طلحة . الانثى قرية والجمع قاري وقر \parallel يروى ان عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لما نقلت زوجته عاتكة ، نزولاً عند رغبة ابيه ، كان ينشد :

اعاتك لا انسانك ما ذر شارق

وسا ناع خير الحمام الملوّق

ولم ار مثلي طلق اليوم مثلي

ولا مثله من غير جرم يطلق

اعاتك قلبي كل يوم ويلي

الك بما تحني النفوس معلق

ها خلق جزل ورأي وينصب

وخلق سوي في الحياة ومنطق

فرق له ابو وامره ان يرجعها \parallel والقري طائر طوله نحو ٤٠ سم . ظهره الى الزرقه الرصاصية عنقه بنفسجي المواج . صدره وبطنه الى الصبغة الصنافية . زمامها ابيض الريش . افيئكه رصاصي الانتشاب اريد الطرف متمزقه بقع سود . جناحه اسود الوسط رمادي الاطوار والخاصة . منقاره اسود . عيناه برتقاليّتان ، جفونها حر . الانثى اصغر قدماً من الذكر وادكن ثوباً واقل مابة \parallel موطنه فسح الارباء يم جميع البلاد . وهو من الطيور القواطع التي تجوب البلاد سميّاً وراء الرزق وليس في سبيل المصيف والمشي . اسرابه كثيفة يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى ١٠٠٠٠ . قوته الحبيب والبذور . يدن عشه في الاشجار . اناته تبيض من المراتين الى الثلاث مرات في السنة .

٢٢٥٨٥ - قَمَرِيَّات (S). *Menispermaceae*

(F). *Menispermaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين ، اسباطها ٤ اجناسها ٣٠ وانواعها ١٠٠ . اعطائها البلاد الاسيوية والامريكية تكثر في المناطق وعلى ضفاف الانهار . معظمها من اجنبات العارضة . اوراقها متعاقبة منعقة . ازهارها صغيرة القذ ، عتقودية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها نووية صغيرة الحجم .

٢٢٥٨٦ - قَمَرِيَّة * هي حشيشة القمر ، اطلبه .

٢٢٥٨٧ - قَمَرِيَّة * ، حَبّ الهلال ، سَمّ الحَوْت

(S). *Menispermum* (S). *Ménisperme* (F). *Moonseed* (E). *Mondsamer* (D). *Menispermum* (I).

جنس نباتات عارشة من فصيلة القمريات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها ترابي . اوراقها متعاقبة منعقة كاملة او مفصصة . ازهارها صغيرة القذ ، ثنائية المسكن ، عتقودية التجميع ، ثمارها نووية لا تخلو من المواد الحذرة تستعمل في صيد السمك \parallel اشهر انواعها ما يا ، :

٥ م . \parallel يمكن اجتنابه ١ بالتبريد المنتظم والتهوية الطبيعية . ٢ بعدم الافراط في ري الاشجار قبل نزن الحني . ٣ بجني الثار عند بدء ادراكها حيث تكون نسبة المواد الاثيرة المختلطة على احسن حال .

٢٢٥٧٤ - قَمَرُ اللَّيْلِ * (S). *Citharinus Geoffroyi* (F). *Citharine du Nil* (F). *Citharinus* (E).

قر الليل هو الاسم المصري . سمكة نهريه يبيض من مفتوحات الماشاء وفصيلة السلمونيات . موطنها النيل من منبعه الى مصبه . تعيش في الاسماك والاورحال \parallel جسمها كبير القد ، مبط الجرم ، بطول نحو ٥٠ سم . عرضها من حافة بطنها الى قاعدة زعنفتها الظهرية الاولى ، نحو ٢٥ سم . رأسها صغير الحجم ، شبه اسنفي الشكل . شدتها قليل الانفراج . اسنانها صغيرة حادة ، على صف واحد . زعنفتها الظهرية الاولى كبيرة القذ شبه هريبة الشكل ، اما الثانية فصغيرة . زعانفها الصدرية والخصية صغيرة الجرم . زعنفتها الشرجية مستطيلة ناعمة المقدم . زعنفتها الذيلية فارقة ، رحية الانفراج \parallel لوها الى الشبهة الغضبية مما دعى الى تسميتها بقمر الليل \parallel لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٢٥٧٥ - قَمَرَاء (F). *Fauvette des Jardins*

القمراء طائر من الدعاخيل يدعى دخلة اليساين ، اطلبه .

٢٢٥٧٦ - قَمَرُوش * (S). *Glomeris* (F).

(E). *Glomeris*

جنس دويبات من فصيلة القمروشيات . انواعه عديدة جميعها شبه اسطوانية الشكل طولها يراوح من ١٢ الى ٢٠ م . اجسامها مركبة من ١٢ حلقة . جرامرها ٣٤ . ثوبها الى السرة . تعيش تحت الحجارة . قوتها المواد النباتية المنحلّة تسرح في الليل وتتكور في النهار .

٢٢٥٧٧ - قَمَرُوش مُهَدَّب * (S). *Glomeris marginata*

(F). *Glomeris marginé*, *Glomeris bordé* (F). *Margined glomeris* (E).

دويبة دامت من فصيلة القمروشيات ورتبة الدغداخيات شفويات الاحساك \parallel جسمها صغير القد ، محبب السطح الملوي ، منبسط الملب . الذكر اصغر قدماً من الانثى يطول نحو ١٢ م . والانثى تطول نحو ٢٠ م . \parallel رأسها مستعرج الشكل ، قليل التنوء . عيناه زنجيتان . منكما قارض قاضم . زباناها صغيران مخيلان . جرامرها قصيرة تعد ١٧ زوجاً عند الذكر و١٩ زوجاً عند الانثى . ثوبها اسود اللون ، احبل الحمل الكثيف . مدبها الى الطلعة التبرار \parallel تعيش تحت الحجارة وفي المواقع المعتدلة الرطوبة وفي الاقايص والسكن الارضية . تسرح في الليل وتتكور في النهار . قوتها المواد النباتية المنحلّة \parallel تعتبر من الدويبات اللاذعة .

٢٢٥٧٨ - قَمَرُوشِيَّات * (S). *Glomeridae*

(F). *Glomeridés* (F). *Glomeridae* (E).

فصيلة دويبات من الدغداخيات الشفويات الاحساك . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها واعها القمروش .

٢٢٥٧٩ - قَمَرُوش (F). *Amande dure*

(E). *Hard almond*

هو اللوز الصلب الذي يوجب الكسر .



قر الليل



قروش



قروش مهذب



قري



قرية

عديدة لا تقل عن ٥٠٠ من الحشرات النافعة أو القليلة الضرر . تعيش على رسيق الأثمار وأوراق الاوراق .
تكثر في الاماكن الرطبة الظليلة وعلى ضفاف الانهار .
يرقاتها تعيش في الماء او قرب الماء وفي التربة والريال على مختلف المواد العضوية والنباتية المتخرمة .

Antedon (S).

٢٢٥٩٥ - قَمْطُول

Antédon, Comatulé (F), Comatulé (E).

جنس حيوانات بحرية من زنايق البحر وفصيلة القَمْطُولِيَّات .
انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم ||
جميعها عشارية الاصابع القابلة للانعطاف والتحمج .
احادية الساق التحيلة المنغصسة عند الادراك || تسبح
بواسطة اصابعها . يكثر وجودها حيث يكثر الخث والطوح ||
اعرف انواعها القَمْطُول الاجمر والقَمْطُول الوردي .

Comatulidae (S).

٢٢٥٩٦ - قَمْطُولِيَّات

Comatulidés (F), Comatulidés (E).

فصيلة حيوانات بحرية من زنايق البحر . اجناسها وانواعها
المعاصرة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميع انواعها
ثابتة مستقرة حتى نهاية زين قوتها ثم تتحول الى متحركة
بحالة عموم وتلتصق بالاشياء بواسطة زوائد هدية ||
اشهر اجناسها القَمْطُول .

Entonnoir (F), Funnel (E).

٢٢٥٩٧ - قَنْع

جهاز يوضع على فم الاناء فيسب فيه الماء ويغيره . ج . قناع .

Cupule

٢٢٥٩٨ - قَنْع ، قَنْع

كأس صغيرة قلبية خشبية التركيب تحيط بثمار بعض
الاشجار كاليلوط والبندق .

٢٢٥٩٩ - قَمْزَة

ذباب ركب الايل والظباء اذا اشتد الحر . ج . مقامع وقع
(السان) .

Bourgeonner (F), To bud (E).

٢٢٦٠٠ - قَمْزَل

قول النبات : خرجت قاعيله اي براعمه .

Bourgeonnement (F).

٢٢٦٠١ - قَمْزَلَة

Budding, Sprouting (E).

هي نمو قاعيل النبات وزمعا . وهي مجموعة المناشع التي
تشابع تكوين البراعم ونموها .

Catocala nupta (S).

٢٢٦٠٢ - قَمْزُونَةُ حَمْرَاءُ

Lichénée rouge, Mariée (F), Catocala nupta (E).
حشرة من النسيقات حرشقات الاجنحة . موطنها يمتد
من الشرق الأوسط الى اوروبا . فراشها واثمة قوتها رسيق
الانهار . موطنها تعيش على اوراق الخور والصفصيات ||
جسمها كبير القد يطول نحو ٣١ م . بسطها تراوح من
٧٤ الى ٧٨ م . رأسها كسني اللون . عيناها كبيرتان .
زبانها خيطيان . جوشها ويطنها الى الكسني الاكلث ||
روشناها الاماميان الى الريدة السراء يطولها زراكتش
وتزويق مخلفة الالوان نيا البني والكسني والازرق الاطلح .
حناها الخارجي يتتابع الاقواس الملالية السراء . روشناها
الحفليان الى الحفرة القرمزية يطولها طرق جزوي جيدة

وسطى من اللون نفسه || لها جيل واحد في الحول . تظهر
الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل .
تماثل بعد ظهورها بنحو سبعة اصابع وتمتد المكن ميحاديًا

٢٢٥٨٨ - قَمْزِيَّةُ الصَّيْنِ

Menispermum dauricum (S), Ménisperme de Daourie, M. de Chine (F).

جينة تزيينية عارشة تملو نحو ٤ اثمار . اوراقها مستطيلة
العتق ، اهليلجية الشكل ، خضاسة التفصيص ، نصلها ماس
مالس البشرة اللامعة على صفحتيه . ثمارها الى الجؤوة
القائمة || انزعارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٥٨٩ - قَمْزِيَّةُ كَنْدَا

Menispermum canadense (S), Ménisperme du Canada (F).

جينة تزيينية عارشة تملو نحو ٤ اثمار . اوراقها قلبية
الشكل خضاسة او سباعية التفصيص ، نصلها ماس
الصفحة العليا ، خلي المروق على السفلى . ثمارها الى
السواد اللامع || انزعارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٥٩٠ - قَمْصُ اسْوَد

Tipula nigra (S).

Tipule noire (F), Black tipula (E).

حشرة من فصيلة القمصيات . جسمها اسطواني الشكل ،
مستدل القد ، يطول من ١١ الى ١٥ م . || ثوبها الى السواد
الانسف . روشناها الى البصرة العابقة . زباناها خيطيان ||
مهدبان || الاثنى اكبر قدماً من الذكر واصفر روشناً منه ||
تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى ايلول .
تألف المنافع والغايات الظليلة || تمتع الاثنى مكها في
التربة فينتفخ من يرقاات تعيش على المواد النباتية والعضوية
المنحلة .

٢٢٥٩١ - قَمْصُ البَقُولِ *

Tipula oleracea (S).

Tipule potagère (F), Leatherjacket (E), Wiesenschnake (D).

حشرة من القمصيات طولها يراوح من ١٥ الى ٢٣ م .
جسمها واجنحتها وارجلها مستطيلة . لونها الى الخطي
تشويه صفرة زيتية . ذكرها اصفر جسيماً من انثاء .
والاثنى تمتع مكها في ايان الربيع على سوق الزروع
ومختلف نباتات المراعي والمروج فينتفخ عن يرقاات صغيرة
نهمة تلهم الجذور وقد تركب الاوراق وتؤذيها . وهي
تسرح في الليل وتبيت في البهار . لها جيلان في الحول ،
الاول في الربيع والثاني في الصيف .

٢٢٥٩٢ - قَمْصُ كَبِير

Tipula maxima (S).

Tipule maximale (F), Major tipula (E).

حشرة لامؤذية من فصيلة القمصيات . جسمها مستطيل
كبير ، يطول من ٢٧ الى ٤٠ م . || ثوبها الى الخطي
الاسمر . روشناها مهدبان بالابيض والوردي الباهت ||
زبانها مرفقيان ، مهدبان . تتميز بكثر الدقة وباستطالة
القولام || الذكر اصفر قدماً من الاثنى . تظهر الحشرة
الجملانة من ايار الى تشرين الثاني . تألف الاماكن
الرطبة وضفاف مجاري الماء . تمتع الاثنى مكها في التربة .
يرقاتها تعيش على المواد العضوية والنباتية المنحلة .

٢٢٥٩٣ - قَمْصَة

Sauterelle à l'éclosion (F).

الجرادة عند تفلقها . ج . قص .

٢٢٥٩٤ - قَمْصِيَّات

Tipulidae (S), Tipulidés (F).

Tipulidae, Crane flies (E), Schnaken, Riesenschnaken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الاجناسين . اجناسها وانواعها



قص البقول



قَمْزُونَةُ حَمْرَاءُ



قُمُوتَةُ زَرْقَاءَ



قَمِيَةِ التَّيْنِ



قُمُوتَةُ

في شقوق لحاء السوق والانفصان || السرفة تعلو نحو ٧٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها الى الطحلة الخضراء يملؤها تمييز دقيق اسود ونقط جانبية فردية حراء اللون. رأسها الى الجؤرة. مدها ورواجها الى الطحلة السمره || طور الاكسلة يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي ضمن صلبة تحببها السرفة بين الاوراق التي يجتمعها الى بعضها بعض.

٢٢٦٠٣ - قُمُوتَةُ زَرْقَاءَ *

Catocala fraxini (S). Lichénée bleue, Likhénée bleue (F). Catocala fraxini (E).

حشرة من السمقيات حرقشيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاتص الى ادوية وافريقية الشالية. فراشها واسعة قوتها مغر الاثمار. سرفتها تعيش على نصال الاوراق || جسمها كبير القند بطول نحو ٣٥ م. يسطها تراوح من ٩٢ الى ٩٦ م. رأسها كسني اللون اسمر الموج. عينها كيرتان. وذاناها عظيماني. جوشها وبطنها الى الكسني الاسمر تعلو ماجة غيرة || روشاها الاماميان الى الطحلة السمره يملوها ستة صفوف من الزراكش الكسنية اللون. روشاها الخلفيان الى الكسني الكلف تملو جدة مقوسة قاطبة زرقاء اللون || لها جبل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول. تسرح في الليل. تعامل بطورها بنحو خسة اسابيع وتتمع الممكن ميحاديا في شقوق لحاء السوق والانفصان || السرفة تعلو نحو ٨٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها الى الطحلة تملوها نمشة زرقاء ونقط سود جانبية. رأسها الى الطحلة الذي الى السمره. عليها دقيق اشقر || طور الاكسلة الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن صلبة تحببها السرفة بين طيات القشور او تحت اللحاء.

٢٢٦٠٤ - قُمُوتُوطُ، قُمُوتُوطُ، قُمُوتُوطُ (دوبية (اللسان).

٢٢٦٠٥ - قُمُوتُوطُ

Bourgeon à feuille (F). Leafy bud (E). هي البرعمة الورقية. ج. قاقيل.

٢٢٦٠٦ - قُمُيجِي

Infundibuliforme (F). Infundibular, Infundibuliform (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالقبع. ويطلق في علم النبات على التوججات، متحدة القعالات، القمية الشكل.

٢٢٦٠٧ - قُمُيجِيَّةُ التَّيْنِ *، حَشْرَةُ التَّيْنِ

Asterolecanium كوشليل التين sambuci (S). Cochenille du figuier (F).

حشرة صغيرة من القرميزات. جسمها مستدير الشكل قطره نحو ٢ م. لونها الى الصفرة الخضراء الموج. تركب في التين الاسنجية اللبغية فتسبب حيث تحل تجاويف صغيرة يزداد ارتفاع حافها مع طول اقامة الحشرة.

٢٢٦٠٨ - قُمُيجِيَّاتُ

Anaploures رتبة حشرات من طبقة القمليات. فصائلها واجناسها وانواعها عديدة، زهاء ٢٠٠ منها ٢٤ نوعا يركب الانسان والحيوانات البقية الداجنة. اما الانواع الباقية فتمترى الحيوانات البرية من القردة الى الفئران || والقمليات حشرات مادمة التطور والاجنحة، جسمها صغير القند غلطع الشكل. رأسها وتدي. متكها ثابت ماص. قرنها

الاستشعاري مركب من ٥ فواصل صغيرة. رسنها وحيد العقلة ينتهي بمقطر حاد قوي || تمييز طفيلية حسل الانسان والحيوان البرون. تنصص الدماء وتسبب الامراض التي تنقلها || اشهر فصائلها القرميزات والقلميات.

٢٢٦٠٩ - قُمُيجُ Flacon (F). Case-bottle (E). انا من نحاس او زجاج يحكم السد يحفظ فيه السائل

٢٢٦١٠ - قُمُيلُ الجُبْنِ راجع سكية الجبن.

٢٢٦١١ - قُمُيلُ الحَيْثَانِ

Cyame (F). هو القنثر، دوبية بحرية من القشريات، اطلبه.

٢٢٦١٢ - قُمُيلُ الرَّأْسِ هو القرعة، اطلبه.

٢٢٦١٣ - قُمُيلُ الْعَاقَةِ هو الطبوع، اطلبه.

٢٢٦١٤ - قُمُيلُ الْكُتُبِ هو نامس الكتب، اطلبه.

٢٢٦١٥ - قُمُيلَةُ هي اللمة، اطلبه.

٢٢٦١٦ - قُمُيلَةُ الْبُرْقُقَالِ السُّودَاءِ هي قمرزية البرققال السوداء، اطلبه.

٢٢٦١٧ - قُمُيلَةُ التُّفَاحِ هي وزنة التفاح، اطلبه.

٢٢٦١٨ - قُمُيلَةُ التُّوتِ هي قمرزية التوت، اطلبه.

٢٢٦١٩ - قُمُيلَةُ التَّبَاتِ هي القمرزية، اطلبه.

٢٢٦٢٠ - قُمُيلَةُ الْوَرْدِ هي قمرزية الورد، اطلبه.

٢٢٦٢١ - قُمُيلَةُ سَانْجُورِه

هي القمرزية الفتاكة، اطلبه.

٢٢٦٢٢ - قُمُيلِيَّاتُ

Psocoptéroïdes (F). Psocopteroides (E).

طبقة حشرات صغيرة القند ثائية ماصة وقارضة من شعبة المليات. تطورها تدريجي. لا ملامس شرجية لها. قوتها المواد العضوية والنباتات القطرية || رتبها ثلاث القمليات والقمليات والقمليات.

٢٢٦٢٣ - قُمُيلِيَّاتُ الْمَاءِ

Hydrachnidae (S). Hydrachnidae (F). Hydrachnidae (E).

فصيلة حشرات صغيرة القند من رتبة القمليات اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها مائية معظمها طفيلي.

٢٢٦٢٤ - قُمُتَاكَةُ

Tique (petite) (F). Tick (small) (E).

القرادة اول ما تكون صغيرة ثم تصير خنثاة ثم قرادة.

٢٢٦٢٥ - قُمُوتُوعَةُ *

Calceola (S). Calcéole (F). Calcéole (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة التحقيقات. انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاولى والطبقة الطباشيرية، وبعضها يعيش على الصخور المغفورة البعيدة الغور في بحار البلاد المتندلة الحارة || اصداها قمية، شبه غروطية الشوزن، للؤلؤة النشاء الداخلي.

٢٢٦٢٦ - قُمُيجِي

Bruant proyer (F). عصفور من الدرر يدعى الاكمل اطلبه.

٢٢٦٣٧ - قُمَيْس Kourmis, Koumys (F).
 هي البقول الجافة من أي نوع كانت .
 ٢٢٦٣٨ - قُنْ هو الحم، البيت المد للجاج .

٢٢٦٣٩ - قَنَا Canna (S).
 Canna, Balisier (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).
 جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات.
 أنواعها عديدة منها البرية والزينة والغذائية . سوقها منتشرة . أوراقها متعاقبة كثيرة . نصلها جامدة . أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || أصرف أنواعها وأشهرها ما يلي .



قَنَا

٢٢٦٤٠ - قَنَا الهنْد، مَارْزُون Canna indica (S).
 Canna d'Inde, Balisier d'Inde (F).

نوع من القنا ضروبهِ وأصرامهِ وبعته عديدة جميعها تزيينية . سوقها خضراء تملو من ١٠٠ إلى ١٨٠ سم .
 أوراقها تطول نحو ٥٠ سم . وتعرض من ٢٥ إلى ٣٠ سم .
 أزهارها حراء اللون أو وردية يملوها شبح أصفر متفاوت الاتساع || أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢٦٤١ - قَنَا رَهْل، قَنَا سَحْلِي Canna flaccida (S). Canna à fleurs d'orchidées, Balisier flasque (F).

نوع من القنا التزييني . ضروبهِ وأصرامهِ وبعته عديدة . ساقه فسقية اللون تملو من ٨٠ إلى ١٦٠ سم . أوراقه بيضيه الزام اللون ثم سناية تطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم .
 أزهاره تشبه أزهار السحاب، لونها إلى الصفار الكبير . وهي كبيرة الشريقات المستديرة المنتسبة للوسلة .
 أزهارها يستمر طوال السنة .



قَنَا النَّم

٢٢٦٤٢ - قَنَا زَنْبِي Canna illiflora (S).
 Canna à fleurs de lys, Balisier à fleurs de lis (F).

نوع من القنا التزييني الرف الترف . ضروبهِ وأصرامهِ قليلة العدد . ساقه خضراء اللون غليظة تملو نحو ٢٠٠ سم .
 أوراقه كبيرة القد تطول من ٩٠ إلى ١٢٠ سم . وتعرض من ٤٠ إلى ٥٠ سم . أزهاره زنبقية الشكل، عاجية اللون، فواحة العرف الطري، كبيرة القد تطول نحو ١٥ سم .
 أزهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢٦٤٣ - قَنَا سَوَسِي Canna lridiflora (S).
 Canna à fleurs d'iris, Balisier à fleurs d'iris (F).

نوع من القنا التزييني . ضروبهِ وأصرامهِ وبعته عديدة . ساقه حراء اللون عتية تملو نحو ٢٠٠ سم . أوراقه كبيرة القد، سناية الشكل، نصلها خلي الصفحة السفلى . أزهاره قرمزية تطول نحو ١٦ سم . شرباقها ثنائية التفصيص .
 أزهارها يستمر طوال فصل الربيع .



قَنَا

٢٢٦٤٤ - قَنَا مَأْكُول Canna edulis (S).
 Canna comestible, Balisier comestible (F).

نوع من القنا الزراعي . عائلته كبيرة القد، لونها تشوي المادة شائع الاستعمال النذالي . ساقه حراء اللون مستطيلة تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقه جر الاغداد . سناية النصل الذي يطول نحو ٦٠ سم . ويعرض نحو ١٨ .
 أزهاره متوسطة الحجم تطول نحو ٨ سم . لونها إلى الحمرة المابقة، باطنها برتقالي || أزهاره يستمر من حزيران إلى تشرين الاول .

٢٢٦٣٧ - قُمَيْس، قُمُيز Kourmis, Koumys (F).
 Kourmis, Koumis (E).
 مشروب يستخرج من لبن الخيل المحتر وهو شائع الاستعمال في بعض الاقطار الآسيوية .

٢٢٦٣٨ - قُمَيْس، جَلْبَاب Cape
 قلعة من نصل ورقة التبغ الجاف تصنع لتغليف السيكار، اطلب كاب .

٢٢٦٣٩ - قُمَيْس يَنْتُ المَلَك اطلب ملو ليب .

٢٢٦٣٠ - قُمَيْس Scyphule (F). Scyphus (E).
 جزء من مشرة بعض أنواع الحزاز قفي الشكل منتصب الارتكاز .

٢٢٦٣١ - قُمَيْسَة
 نمت تمرين يطلق على الارواق المصابة بعارض القاعة .

٢٢٦٣٢ - قُمَيْسَة * Scroblanthos (S).
 Scroblanthos (F). Strobilanthos (E).

الاسم العلمي من اليوناني يعني « القمع » . جنس نباتات عشبية أو لفيية مخشوبة معمرة من فصيلة الاقتنيات .
 سوقها تملو من ٣٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقها متعاقبة .
 أزهارها قمية الشكل ، زرقاء اللون أو بنفسجية || تزود للزئين في المراكب والحدائق . أنواعها المعروفة ستة ، أشهرها الثلاثة التالية .

٢٢٦٣٣ - قُمَيْسَة لَامْتَسَاوِيَة الْوَرَق Scroblanthos anisophyllus (S).

Scroblanthos à feuilles inégales (F).
 نوع من القمية . عشبة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . ساقها فراء كثيرة الافناد . أوراقها مركبة ، وريقاتها سناية النصل ، لامتنساوية الطول والعرض بين الأرواج المتعاقبة . أزهارها إلى الزرق الليلية الملو، قطرها نحو ٣ سم . تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٢٦٣٤ - قُمَيْسَة مُتَسَاوِيَة الْوَرَق Scroblanthos isophyllus (S).

Scroblanthos à feuilles égales (F).
 نوع من القمية . عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . ساقها فراء . أوراقها مركبة ، سناية ، تطول من ٦ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٢ إلى ٣ سم . نصلها منشأة باير دقيقة بلورية . وريقاتها متساوية الأرواج . أزهارها زرقاء اللون ، قطرها نحو ٢٥ سم . تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٢٦٣٥ - قُمَيْسَة مُطَلَحَة Scroblanthos maculatus (S).

Scroblanthos maculée (F).
 نوع من القمية . جنبة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٢٥ سم . ساقها فراء مبشرة الافناد . أوراقها بيضيه الشكل ، تطول من ١٢ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ٦ إلى ١٠ سم . نصلها إلى الخضار الالامس يملو تلطيخ فني . أزهارها بنفسجية اللون ، قطرها نحو ٤ سم . تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٢٦٣٦ - قُمَيْسَة الْغَنَم *، مِيْلُوقَاج الْغَنَم Melophagus ovinus (S). Méléphage du mouton, Pou du mouton (F).

حشرة عادمة الجناح من فصيلة الشراويات . صغيرة القد مبطلة سمراء اللون تعيش على جلد الغنم تحت الصوف .

Connaraceae (S).

٢٢٦٥٦ - قناريات ٥

Connaracées (F). Connaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . مركزها التصنيفي يأتي بين الورديات والقطانيات . اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد ، اعطائها معظم المناطق الحارة من المابين القديم والجديد باستثناء أستراليا || نباتاتها جنبات شائكة . اوراقها صغيرة ، متقابلة نصالها سنانية الشكل ، بحرية الخضار . ازهارها محورية ، صغيرة ، معنقة || أشهر اجناسها القنارة .

Pimelia (S).

٢٢٦٥٧ - قنّاز ٥*

Pimélie (F). Pimelia (E).

الواحدة قنّازة . جنس حشرات من غديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفصيلة الغشيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم القديم || اجسامها مختلفة الاحجام يكثر فيها الاعتدال ويقلب فيها الشكل الاهليجلي رؤوسها صغيرة . قرونها الاستعمارية معتدلة الطول . كواهلها خروطية . انحرافها لاحقة ، منها المخذدة ومنها المخرّجة . جرابها بين المتدلة والمستطيلة . اوتابها تراوح من السمرة القاتمة الى السواد الامفر .

Pimélie géante (F).

٢٢٦٥٨ - قنّازة جيّارة

هي الدحلول حشرة من غديات الاجنحة ، اطلبها .

Rhinopterus (S).

٢٢٦٥٩ - قنّاصة *

Rhinoptère (F). Rhinopterus (E).

جنس اسماك بحرية من السفنقيات وفصيلة الشفنيقيات البحرية . انواعها المعروفة ستة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها كبيرة القد . اجسامها شبيهة باجسام المورمية . رؤوسها اسطوانية يملؤها ميزاب قليل العمق يقسمها الى شطرين متساويين . اذناها مستطيلة كالسياط تحميها عند قواعدها منشارية التركيب قاعدتها الزعنفة الشرجية . قوتها الاسماك . تألف المهاجم الصغرى حيث تكمن للانقضاض على فرائسها || لحومها كاعة الصنف ، قل من يرغب في اكلها .

Masque (F). Mask (E).

٢٢٦٦٠ - قنّاق

جهاز يوضع على الرأس لوقاية حواسه او بعضها .

Radiesthésiste (F).

٢٢٦٦١ - قنّاقين

Dowser (E).

من عالج اشعاع التفتنط الكهربى وعرف بوجود الماء والمعادن في جوف الارض .

٢٢٦٦٢ - قنّب ، قنّب . Alléger (F). To ease (E). قنّب الكبرية : قلمها وقطع عنها ما يؤدي حملها .

Fourreau (F). Sheath, Cover (E). ٢٢٦٦٣ - قنّب

جراب قفص الدابة ، وقيل وعاء قفص كل ذي حافر . كقنق قنّب الحمار : وعاء جردانه . وقنّب الجمل : وعاء ثيله .

Epanouir (s') (F).

٢٢٦٦٤ - قنّب

To blow, To expand, To open (E).

قنّب الزهر : خرج عن اكامه .

Cannabis sativa (S).

٢٢٦٦٥ - قنّب *

Chanvre commun, Chanvrier, Pantagruélion (F).

Bractée (F). Bract (E). ٢٢٦٦٥ - قنّابة ، قنّابة

كل ورقة شدّت في شكلها او تركيبها لوجودها قرب الزهرة كالكالافور في النخل والمصفي في النعش . الخ .

Bractéaire, Bractéal (F).

٢٢٦٦٦ - قنّاني

Bractéal (E).

نمت تعريفى يطلق على كل ما له صلة بالقنابة .

Ostrya (S).

٢٢٦٦٧ - قنّاسية ، يستوربة

Ostryer, Iron-dur (F). Lever-wood, Bois dur (E). Hopfenbaum (D). Ostrya, Legnoferro (I).

جنس اشجار حرجية وثرينية من فصيلة السومليات . انواعها قليلة العدد هيكلها واوراقها وازهارها تشبه الشرم (الحريبيوس) . سوقها تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اغصانها شديدة الصلابة ، ثقيلة الوزن اللسي . اوراقها عابلة متناوبة تطول من ٦ الى ١٣ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ م . فصلها مزغب الصفحة ، متقارب المروق المتقابلة التي يراوح عددها من ١١ الى ١٧ . ثمارها كوزية الشكل كثار الجنبيل . بزورها خلية الطرف الدقيق || اعرف انواعها واشهرها :

Ostrya japonica (S).

قنّابة اليابان

Ostryer du japon (F).

Ostrya carpinifolia (S).

قنّابة شمية الورق

Ostryer à feuilles de charme (F).

Ostrya virginiana (S).

قنّابة فيرجينية

Ostryer de Virginie (F).

Dalot (F). Scupper (E).

٢٢٦٦٨ - قنّاة

يجرى ماء من صنع الانسان يستعمل لنقل وتوزيع مياه الري .

Canal azygos (F).

٢٢٦٦٩ - قنّاة الزكّبة ٥

Azygous canal (E).

يجرى انبوي شعري ينقل زكبه ذكور الحشرات من تلاليسها الى قنّابها .

Oviducte (F). Oviduct (E).

٢٢٦٧٠ - قنّاة المبيض

يجرى انبوي ينقل البيوض من المبيض الى خارج الجسم الحيواني .

Canal cystique (F).

٢٢٦٧١ - قنّاة المرارة

Cystic canal, Cystic duct (E).

هي قناة الحوصلة الصفراوية .

Canal marginal (F).

٢٢٦٧٢ - قنّاة حافية

Marginal canal (E).

Canal rachidien (F).

٢٢٦٧٣ - قنّاة فقرية

Rhachidian canal (E).

هي القناة التي يمر بها الفقار الرشيدي .

٢٢٦٧٤ - قنّادية

القنّادية او القنّدية هي زهرة المرجان ، اطلبها .

Connarus (S).

٢٢٦٧٥ - قنّارة ٥

Connaret (F). Connarus (E).

جنس نباتات جنبية ، برية ، معمرة ، من فصيلة القناريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || سوقها وفروعها شائكة . واوراقها متقابلة . ازهارها معنقة ، صغيرة ، جميلة الشكل ، يكثر فيها اللون الاصفر . ومنها انواع زرقاء الازهار او ليلكية .



قنّاز



قنّاسة

٢٢٦٧٧ - قَنِيطُ
Chênevis (F). Hemp-seed (E).
هو بذر القنب ويصنع شهبانج يأكله الطير ويستخرج منه زيت صناعي بنسبة تراوح من ٢٠ الى ٢٤ ٪ كسبه يستعمل في تدبيل التربة .

٢٢٦٧٨ - قَنِيطَةُ
Glumelle (F). Glumella (E).
القنبية نباتية ثنائية بزرهة الزيجيات وطليها يشفا لها زهرها قنبستان لكل زهرة من زهرات السلييلة .

٢٢٦٧٩ - قَنِيطُ *
Pavonia (S).
Pavonie (F). Scarlet mallow (E). Pavonie (D). Pavonia (I).
جنس اشجار وجنبات برية وتربينية من فصيلة الحبابيات. انواعه قليلة العدد، اعطائها البلاد الحارة، جميعها معمرة فراءه فنواء. اوراقها ايلدة منتقة ، بيضيه او رحيه النصل، عطرية العرف عند السس . ازهارها لا قابسة التجميع والاركاناز، طويلة الزناد مخفلة الالوان . ثمارها رباعية الفلق . بزورها مزغبة القشور || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٢٦٨٠ - قَنِيطُ دَائِمُ الزَّهَرِ
Pavonia semperflores (S). Pavonie toujours fleurie (F).
شجرة تربينية فراءه فنواء تملو نحو عشرة اثمار . اوراقها سنانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة سنن الزام الاخير . ازهارها متدلية ، كبيرة القد ، عادمة الكيم ، ناشرة الاسدية ، لونها الى الحمرة الفاتحة || ازهاره يستمر طوال السنة .

٢٢٦٨١ - قَنِيطُ كَبِيرُ الزَّهَرِ
Pavonia multiflora (S). Pavonie multicolore (F).
جنية تربينية سرولية تملو من ٢٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها فراءه فناء . اوراقها سنانية النصل ، منشارية الحافة، تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. تعرض نحو ٦ سم. ازهارها عشوكية التجميع ، تاجية الاركاناز، ارجوانية اللون ، كيم ازهارها كثيف الوريقات الصفيقة الخلية || ازهاره يستمر طوال شهر ايلول .

٢٢٦٨٢ - قَنِيطُ مَكْرَانَا
Pavonia mackoyana (S). Pavonie de Mackoy (F).
جنية تربينية سرولية تملو من ٦٠ الى ١٧٥ سم. ساقها غليظة فنواء . اوراقها كاملة ماسية سنانية النصل خلية العنق . ازهارها خضية التجميع ، تاجية الاركاناز ، قرمزية اللون . كيم ازهارها خاسي الوريقات القلبية الشكل . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٦٨٣ - قَنِيطُ مُمَيِّزُ
Pavonia speciosa (S). Pavonie spéciale (F).
جنية تربينية زهية تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها فراءه فناء . اوراقها بيضيه الشكل ، قلبية القاعدة؛ نصلها سنن الحافة ، مزغب الصفحة السفلى الفراءه اللون . ازهارها يتفجسها الظاهر حر الباطن . قطرها نحو ٥ سم. فصلها تعد من ٧ الى ٩ كيمكتها كيم يعمل ذات العدد || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢٦٨٤ - قَنِيطِيَّاتُ
Cannabinaceae (S).
Cannabinaceae (E).
منهم من جعلها فصيلة ثنائية مستقلة ومنهم من قال انها سبط من فصيلة القرصيات || اشهر اجناسها القنب والجنجل .

٢٢٦٨٥ - قَنِيطُ
هو القرنييط ، اعطيه .

Common hemp (E). Echter Hanf, Riesen Hanf (D). Canapa, Canape (I).

نبات عشبي حولي زراعي لبني صناعي من فصيلة القنبيات. وهو نبات وحيد الجنس والنوع عديد الفروب اشهرها الهندي والجبالي . ساقه منتصبه تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. اورائه كثيفة مركبة ومنعقة. السفل منها متقابل والعليا متناحية . جميعها خاسية او سباعية الوريقات الصفيقة اللدية . نصلها خشن الملمس، ازغب الصفحة للمشارية الحافة . ازهاره ثنائية المسكن، الذكرية منها عقودية التجميع اما الانثوية فضمية || ثماره فقيرة منتفخة تملو القنبر والشهدانج وهي مأكول بعض العصافير ويستخرج منها زيت صناعي لا بأس به تبلغ نسبته نحو ٢٢ ٪ || يزرع القنب لاستخراج الياث سوه التي تستعمل خاصة في صناعة الاكياس والحبال .

٢٢٦٦٦ - قَنِيطُ النَّافِعِ
هو البتولا المنعقة، اعطيه .

٢٢٦٦٧ - قَنِيطُ جَبَّارُ
Cannabis sativa gigantea (S). Chanvre géant (F).
ضرب من القنب منبته الهند . ساقه فراءه تملو من ٣ الى ٥ اثمار . فروعها افقية فارشة مستطيلة تجعل قطر دودة النبات اطول من ارتفاعه || الياث ساقه وفروعها صناعية تستعمل في جدل حبال القنب .

٢٢٦٦٨ - قَنِيطُ سِيَّامُ
هو الرامي ، اعطيه .

٢٢٦٦٩ - قَنِيطُ كَلْكُوتُ
هو الجوت ، اعطيه .

٢٢٦٧٠ - قَنِيطُ مَسِيلَا
هو الابن ، اعطيه .

٢٢٦٧١ - قَنِيطُ هِنْدِي * ، حَشِيْشَةُ الْكَيْفِ
Cannabis sativa indica (S). Chanvre indien, Bang, Hachisch (F). Indian hemp (E). Indischer Hanf (D). Canapa indica (I).
ضرب من القنب ساقه تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. يزرع لاستخراج ما تغره النباتات الاثنى من مادة وراثنية تكثر في عناقيد الزهرية واوراقها العليا يصنع منها «الحشيش» او «الحشيشة» او «الكيف» الذي يستعمل تدخيناً فيخدع اعصاب مدمنيه ويبدل عقولهم || زراعته محظورة في لبنان .

٢٢٦٧٢ - قَنِيطُ
هو القبرية ، اعطيه .

٢٢٦٧٣ - قَنِيطُ ، قَنِيطُ ، قَنِيطُ ، قَنِيطُ ، قَنِيطُ
Huppe (F). Crest (E).

هي فصل ريش قائم . اعطه قنطرة .

٢٢٦٧٤ - قَنِيطُ ، قَنِيطُ ، قَنِيطُ
هي القبرية ، راجعها .

٢٢٦٧٥ - قَنِيطَةُ الْمَاءِ *

Arenaria interpres, Strepisalis interpres (S). Tourne-pierre interprète, T. vulgaire (F).
عائري من طوال الساق القزاع . صغبر القد طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه ابيض اللون كثير البياض والازخاف للتداعلة المركبة من الاسود والاحمر || يائث الشطوط البحرية ، قوته القشريات والديدان يلتقطها بين الحصى . يئث افوصه في الكشبان . حصنته تراوح من ٣ الى ٤ بيضات .

٢٢٦٧٦ - قَنِيطُ
هو ابو منقار ، اعطيه .



قنب



قنب هندي



قنطرة الماء



قنبيل

٢٢٦٨٦ - قَنْدَلِي * ، وَرَس مَلَوْتَا
Mallotus (S). Rottlère, Rottlérie (F). Kamala tree (E). Kamalaubum (D). Kamala (I).
جنس شجيرات برية من فصيلة اليتوسيات . منبتها المناطق الاستوائية الآسيوية . انواعه قليلة جميعها متوسطة القد . يستخرج من ثمارها صباغ احمر قرميدي مرغوب فيه .



قندلي

٢٢٦٩٣ - قَنْج - Arquer (F). To bend, To arch (E).
قنج العود : عطفه حتى يصير كالحنج .

٢٢٦٩٤ - قَنْدَاش * Candacus (S).

Candace (F). Candacus (E).
جنس دوبيات بحرية من القشريات مجذافات الاجرل وفصيلة الكلنوسيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة .

٢٢٦٩٥ - قَنْدَقَ Sucre candie (F).
هي الابلوج ، اطليه .

٢٢٦٩٦ - قَنْدَقَ Potologie (F). Potology (E).
القندقة علم يبحث في المشروبات الروحية وفي تراكيبها .

٢٢٦٩٧ - قَنْدُر Castor (F).
هو الحارود ، اطليه .

٢٢٦٩٨ - قَنْدُرُوس * Chondrus (S).
Chondre (F). Chondrus (E).

جنس نباتات بحرية من الخليات الحمر . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف Chondrus crispus (S).
واشهرها القندروس المتقبض Chondrus crispé الذي يستعمل طبيا في معالجة بعض الامراض الصدرية .

٢٢٦٩٩ - قَنْدُس Loutre commune (F).
هو القنصاعة ، حيوان من السروعيات .

٢٢٧٠٠ - قَنْدُلِي Aesculus (S).
Marronnier (F). Horse-chestnut-tree (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة القندليات . انواعه نحو ١٥ جميعها اشجار وشجيرات وجنيات فارشة ، غضة ، حيلة الشكل . اوراقها عايلة ، متقابلة ، منقطة ، مريكة ، كفية خماسية او سباعية او تساعية اللويقات . ازهارها عنقودية التجميع او علقية ، عديدة الالوان منها الاصفر والعنبري والوردي والاحمر || اشهر انواعه ما يلي :

٢٢٧٠١ - قَنْدُلِي حَلَزُونِي Aesculus turbinata (S).
Marronnier à fruit turbiné (F).

شجرة داحجة فارشة مهداة اليابان تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها خماسية او سباعية التركيب وريقاتها كبيرة القد ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، سنن الحافة . ازهارها كبيرة القد ، لونها الى البياض الاخضر تملو رقشة حراء . ثمارها اجاسية الشكل حلزونية ، قشورها مثاقلة شائكة ، لبها حنطي اللون .

٢٢٧٠٢ - قَنْدُلِي مَبْدُول * ، قَسْطَل هندي Aesculus hippocastanum (S). Marronnier commun (F). Common horse-chestnut-tree (E).

شجرة مبدولة داحجة فارشة تملو من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراقها خماسية او سباعية التركيب . وريقاتها لا تتساوية الطول والعرض ، نصلها عايق الخضار . ازهارها كبيرة القد لونها الى البياض الناصع تملو رقشة حراء او صفراء . ثمارها كستنية الشكل والقد قشورها شائكة ، لبها اسمر .

٢٢٦٨٧ - قَنْهَ Cime (F). Cyme, Summit (E).

القنّة : اشخ موقع من رأس الجبل واعلى ما يكون في الشجرة . ج قن وقنان وقنوقنات .

٢٢٦٨٨ - قَنْهَ مَبْدُولَة * ، كَنْخ Ferula communis (S). Férule commun, Pamelier, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemelens Steeukrout (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).

نوع من الاعدان وهو نبات عشبي بري معمر مبدول . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه كثيرة التشرج والتفريش نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى . جذوره غليظة يستخرج منها بعض العناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من سوقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصيل عواما ونفعا .

٢٢٦٨٩ - قَنْهَ مَهْجُونَة * ، بَارْدَدَ ، قَنْسَا وَشَق Ferula ferulago, F. galbanifera (S).

Férule bâtarde, Galbanum (F). Galbanum plant (E). Galbanpflanze, Galbenkraut (D). Galbano (I).
نوع من الاعدان وهو نبات عشبي طيب بري معمر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . تستخرج من ساقه عصارة صمغية لزجة تدعى الباردد وتناولت وتعرف عند الطائفة بالوشق تستعمل في الامراض الصدرية وغلخانا وفي مضادة للتلنجج .



قنّة مبدولة



قنّة مهجونة



قنر

٢٢٦٩٠ - قَنْشَر * ، قَنْسَل الحَيْثَان Cyam (S). Cyame, Cyamide (F). Cyam (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا وفصيلة القنثريات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها طفيلية تنشب في جلود الحيتان وفي طيات رؤوسها وثنايا زانفها || اجسامها متباينة الاحجام يغلب فيها الصفر ، جميعها مبطلة . قوائمها الصدرية خماسية الازواج ، نشيطة ، تنتهي بمخاط ذرية . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل . لولاسها رباعية الازواج متغايرة الطول ، شبه انبوية الشكل . اثارها الى الشبهة او الشقعة .

٢٢٦٩١ - قَنْشَرِيَّات * Cyamidae (S).

Cyamides (F). Cyamidae (E).
فصيلة دوبيات بحرية من القشريات العليا مزدوجات الاجرل . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها طفيلية تركب الحيتان || تتميز باجسامها المبطلة ولولاسها او لمسباتها المتغايرة الطول والجمع . قوائمها الصدرية مجهزة بمخاط مجنحة ذرية || اشهر اجناسها القنشر .



قنجل

٢٢٦٩٢ - قَنْشُجُول * Abacetus (S).

Abacète, Astigis (F). Abacetus (E).
جنس حشرات من فصيلة السلكوكيات ورتبة ممدات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٤٠ اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة من العالم القديم اعضها افريقية الشالية وبعض الانواع يعيش في الشرق الادنى وفي اودية الجنوبية ||



قندروس



قندلي مبدول

٢٢٧١٠ - قَنْزَعَة * ، مَقْتَال Machetes (S).
Combattant (F). Ruff (E).
مائل وحيد الجنس والنوع من عمارة الطولانيات. وفضيلة
دجاجيات الارض. طولها نحو ٢٠ سم. بسطه من ٦٠
الى ٧٠ سم. ثوبه الى الصبهة الورداء. ثملها ورقطة حطية
يعوقها اطار ابيض. الذكر قشري الرأس مطوق المنق،
طوقه مستطيل الريش يتصبب عند القتال والبارزة.
مبارزة الذكور تدوم نحو ثمانية اسابيع تبتدى مع زين
السفاد وتستمر حتى نهاية الحضانة || الانثى تبيض نحو ٢٥
بيضات تحضنها من ١٧ الى ١٩ يوما. تدش عشاها في
المنافع بين الاعشاب || قوته الحشرات والديدان والرخويات.



قندوس

٢٢٧١١ - قَنْزَعَة Astragale (F). Astragalus (E).
هي رشح القدم وشم الكعب.

٢٢٧١٢ - قَنْزَعَة ، قَنْزَعَة ، قَنْزَعَة Algrete (F).
ريش قائم مجتمع على رأس بعض الطيور.

٢٢٧١٣ - قَنْس ٥ Norme (F). Norm (E).
القنص ج قنوس. مبدأ يتخذ كقاعدة. او عخطط قناسي
يتخذ كقاعدة.

٢٢٧١٤ - قَنْس Aunée (F).
جنس نباتات عشبية بيرة معمرة مشهورة باسم راسن ،
اطلبها.



قندول

٢٢٧١٥ - قَنْسَطِط اَبْيَض Aesculus parviflora (S). Pavier blanc (F).
جنية زينة غضة من فصيلة القندليات تملو من متر
الى خمسة امتار. اوراقها خاسية التركيب، وريقاتها
تطول نحو ١٩ سم. وتعرض ٧ سم. تصلها بجري اللون، وتلي
الصفحة السفلى. ازهارها سنبلية التجميع لونها الى البياض
الاغبر. ثمارها كستنية الشكل واللقد مالة القشور.



قزاع

٢٢٧١٦ - قَنْسَطِط احمر Aesculus pavia (S). Pavier rouge (F).
شجرة زينة سبروتية من فصيلة القندليات تملو من مترين
الى ستة امتار. اوراقها خاسية التركيب. وريقاتها
سنانية، مسنة الحافة. تصلها جاد الصفحة يطول نحو
١٥ سم. ويمرض ٦ سم. ازهارها عقودية التجميع، بتلاتها
حراء اللون، مهدبة الاطراف. ثمارها كستنية صغيرة
مالة القشور.

٢٢٧١٧ - قَنْسَطِط اصفر Aesculus olandra (S). Pavier jaune (F).
شجرة كبيرة دائمة من فصيلة القندليات تملو من ٢٠ الى ٢٥
م. اوراقها خاسية التركيب. وريقاتها سنانية دافئة،
تصلها ازغب الصفحة السفلى، مسن الحافة. ازهارها
عقودية التجميع، بتلاتها مهدبة، صفراء اللون. ثمارها
كستنية الشكل كبيرة اللد مالة القشور.

٢٢٧١٨ - قَنْس ٥ Ciste ladanifere (F).
هو اللاذن الاسباني، اطلبه.

٢٢٧١٩ - قَنْشِيل * ، قَنْشِيل Tragus (S).
Tragus (F). Tragus (E).
جنس حيوانات لبونة بجرة. الواسها حنة جميعها صغيرة
القد، وشيقة القوام، فيها من الايل والماعز والارانب.
طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم. علوها من ٢٥ الى ٣٢ سم.



قنديل

٢٢٧١٣ - قَنْدَلِي هِنْدِي Aesculus indica (S).
Marronnier de l'Indus (F). Indian horse-chestnut-
tree (E).
شجرة هرمية الشكل مهدبا المهندوس تملو من ٢٠ الى ٢٥
م. اوراقها لانياسية التركيب منها الحاسية والسباعية
والسباعية. وريقاتها مستطيلة، تصلها جاد الصفحة،
مسن الحافة. ازهارها كبيرة القد. عناتيدها هرمية الشكل،
تطول نحو ٥ سم. بتلاتها لا متساوية اللد لونها الى الازرق
المقروش بالاصفر والوردي. ثمارها رنية، قشورها
ثولوية عادمة الشوك.

٢٢٧١٤ - قَنْدَلِيَات

Aesculaceae, Hippocastanaceae (S). Aesculacées,
Hippocastanacées (F). Aesculaceae, Hippocasta-
naceae (E).

فصيلة نباتية وسيدة الجنس، عديدة الانواع. نباتاتها
اجار وشجيرات وجنيات بيرة وزينة. اوراقها مركبة
متقابلة. ازهارها عشوية خاسية التركيب والاتسام، سباعية
الاسدية، عقودية التجميع او عذقية او سنبلية.

٢٢٧١٥ - قَنْدُوس * Coedus (S).
Coedous, Synèthere, Orleo, Couly (F).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الشحيمات. انواعه
١٣ موطنها امريكة الجنوبية || اجسامها ضخمة مستطيلة
براح طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم. واذنانها من ٢٥ الى
٥٠ سم. رؤوسها غليظة. مقاضها قصيرة مقطوعة.
خناياها عريضة. عيونها واذانها صغيرة. جرامزها متدلة
القد. اطرافها قوية حادة. اذنانها طويلة أعادة. شعرها
هليلي هدي نغاز يتخلله شوك قصير كسائل تنفضه للدفاع
عن النفس فينفذ ويصطب حيث يبرز || تألف الثنايات
والاحراج. تسرح في الليل. تتسلق الاجار وتستن
باذنانها للانتقال من غصن الى غصن || قوتها الثأر
والزيمات والاوراق والازهار والجذور ولحاء الاجار.

٢٢٧١٦ - قَنْدُول * ، دَار شَيْشَعَان، عَوْذُ الْبَرْق Spartium spinosum, Cytisus spinosus, Calycotome
spinosus (S). Cytise épineux, Genêt épineux, Caly-
cotome épineux, Aspalot (F). Spiny broom, Spiny
cytius (E). Stacheliger Ginster (D). Citiso spinoso (I).
جنية بيرة معمرة شالكة من فصيلة القرنيات. اوراقها
صفرة مركبة. ازهارها صفراء اللون عطرة. يكثر وجودها
في وعر الجبال اللبنانية السورية.

٢٢٧١٧ - قَنْدِيد * ، بَذَاق Eau-de-vie (F).
Brandy (E).

سائل كحولى يحصل من تقطير الثأر بعد تخميرها وهو
يحوي من الكحول ما يراوح عياده من ٤٥ الى ٨٥ درجة
متوية وهذا الفارق التاسع بالنسبة يعود الى نوع المشروب
وما يقتضيه من عيار خفيف او متوسط او قليل.

٢٢٧١٨ - قَنْدِيدِي ٥ Potologique (F).
Potological (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالقدندة.

٢٢٧١٩ - قَنْدِيلُ الْبَحْرِ Crysore (F).
Sea nettle (E).
نوع من المدوس، يكثر في البحر الاحمر وعلى جرف شواطئ
المتوسط. راجع مدوس.

٢٢٧٢٥ - قَنْصُور صَغِير الْوَرَق

Colutea halepica, C. Istria (S). *Bagueaudier microphylla* (F).

جنية برية سربوتية مهددة الشرق الاوسط ويكثر وجودها من حلب الى سيناء. تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. وريقاتها دقيقة تمد من ٩ الى ١٣ نصفها يطول نحو ١٠ سم. وهو يجري اللون ازرق الصفحة السفلى. ازهارها برتقالية كبيرة القد. سفاتها صغيرة جرابية مبطنة. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٢٧٢٦ - قَنْطَار *Quintal* (F).

القنطار العربي العالمي وزن مئة رطل اي الف وثنى اوقية او ما يماثلها من الوزن المتري وقدره ٢٥٦ كيلو. اما القنطار المتري فوزنه ١٠٠ كيلوغرام.

٢٢٧٢٧ - قَنْطَر *Goura couronné* (F).

هو الدبسي المتفرج، اطليه.

٢٢٧٢٨ - قَنْطَرِيُون، قَنْطَارِيُون

Centaurea (S). *Centauree* (F). *Centaury* (E).

جنس نباتات عشبية مخشوشية من فصيلة المركبات. انواعه زهاء ٤٠٠ منها الحولية والحولة والمعمرة ومعتبرا بري وبعضها ترابي. اوراقها متعاقبة لا نظامية. قناياتها لا قياسية. ازهارها رؤسية. بزورها عادمة الاغرة مختلفة الاشكال والاحجام || اعرف انواعه واشهرها ما يلي :

٢٢٧٢٩ - قَنْطَرِيُون اَسْمَر * ، رَأْس الدَّوْرِي

Centaurea jacea (S). *Centauree jaccée*, *Jacée des prés*, *Chevalon*, *Malon*, *Tête de moineau* (F). *Black centaury*, *Brown rayed*, *Knapweed* (E). *Weissenfloekenblume* (D). *Giacea*, *G. dei prati*, *Erba della ferita* (I).

نوع من القنطريون البري المعمر. ساقه زهاب فراء تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. رؤسياته الزهرية عديدة، صغيرة القد ليلكية اللون، قناياتها الى السرة || يكثر في المراعي والزرور فيصبح من النباتات الضارة || جلوده غليظة غزيرة المادة الطبية التي تستعمل في علاجات امراض الفم والحلقوم.

٢٢٧٣٠ - قَنْطَرِيُون اَلْقَفَّاس

Centaurea depressa (S). *Bleuet du Caucase* (F).

عشبة سربوتية حولية ترابينية ساقها فراء منذ السنج تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل خلية البشرة. رؤسياتها الزهرية عادمة العرف لونها الى الزرقة الزاوية تنصسطها الحمرة؛ قناياتها مالة الصفحة، مهدبة الحثار. اهدابها فضية || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٢٧٣١ - قَنْطَرِيُون اَمْرِيكي

Centaurea americana (S). *Centauree américaine* (F).

عشبة ترابينية سربوتية حولية. ساقها مزينة منتصبة قليلة الفروع تملو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها سنانية النصل مسننة تملو من ٥ الى ١٣ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. رؤسياتها الزهرية فردية التجميع عادمة العرف قطرها براوح من ٥ الى ١٠ سم. لونها الى الزرقة او الحمرة. قناياتها مهدبة الحثار || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٢٧٣٢ - قَنْطَرِيُون بَابِل

Centaurea babylonica (S). *Centauree de Babylon* (F).

عشبة ترابينية سربوتية حولية. ساقها مجتمعة تملو من ٢٠٠

وروسها مستطيلة جهاء. اذانها قصيرة عريضة منتصبة. قناياتها دقيقة. اخلاطها اربعة. اذانها مرتفعة كاذناب اللماز. سورها خل نام اللمس. اثوابا الى الصلبة المخملية المشعة والمواج || مهددا فصح الاجراء يمتد من سردينيا والهند الى الصين. تألف الغابات الجبلية الرطبة قربا الاشعاب. تمشي جماعات قليلة العدد. إجلمها يتألف من ٤ او ٥ اناث يقودها ذكر واحد.

٢٢٧٢٠ - قَنْصُور * ، قَلْوَتَه

Colutea (S). *Bagueaudier*, *Colutea*, *Faux séné* (F). *Bladder-senna tree* (E). *Baumartiger blasenstrauch*, *Gewöhnlicher blasenstrauch* (D). *Colutea*, *Cantamaggio*, *Saluno*, *Sena falsa* (I).

جنس نباتات برية طيبة معمرة من فصيلة القرنيات الفراضية. انواعه عديدة، جميعها جنبات صغيرة او متوسطة القد. اوراقها متعاقبة مركبة تشبه اوراق السناء. ازهارها عقودية التجميع، محورية الارتكاز، صفراء اللون. ثمارها سفات منتفخة مثانة الشكل || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٢٧٢١ - قَنْصُور اَسْوَد الْكَم

Colutea melanocalyx (S). *Bagueaudier à calice noir* (F).

جنية سربوتية مبدولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها مركبة كبيرة وثرية العدد مؤلفة من ٩ او ١١ وريقة بيضية الشكل، نصفها خل الصفحة السفلى. ازهارها صفراء اللون صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. اكادها زهاب البشرة زهابا اسود اللون. سفاتها متوسطة القد تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٧٢٢ - قَنْصُور الشَّرْقِي

Colutea orientalis (S). *Bagueaudier d'Orient* (F).

جنية سربوتية مبدولة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سباعية او تساعية الوريقات. نصفها يبيض الشكل، يجري اللون يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ويعرض من ٧ الى ١١. ازهارها الى الجؤوة يطولها تيمحج اصفر. سفاتها تطول نحو ٤ سم. لونها الى الخضار المشوح بالبنيجي. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٢٧٢٣ - قَنْصُور الْحَمَّ

Colutea persica (S). *Bagueaudier de Perse* (F).

جنية سربوتية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. وريقاتها صغيرة القد، عادمة العروق، خلية الصفحة السفلى. ازهارها الى الصفرة الزاوية يطولها تيقج اسمر. سفاتها متوسطة القد شدوقة الطرف || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٢٧٢٤ - قَنْصُور شَالَع

Colutea arborescens (S). *Bagueaudier commun*, *Arbre à vessies*, *Balandier* (F).

جنية سربوتية مبدولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها وثرية الترتيب مركبة من ٧ الى ٩ وريقة اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥. نصفها يجري الصفحة السفلى متلاحق العروق. ازهارها الى الصفرة البرتقالية. سفاتها متدلية مبطنة تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.



قَنْصُور



قَنْطَرِيُون اَسْمَر

Blue-bottle, Corn-flower (E). Kornblume, Kornflockenblume (D). Ciano, Battesegola, Fioraliso, Fioralino (I).

عشبة سر بوتية حولية برية طيبة وتزيينية. ساقها منتصبة فراء زيا تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. أوراقها الجذعية عذلية. رؤيساتها الزهرية زرقاء اللون عادمة العرف. قناباتها عناقية النصل سمر الخنار || كانوا يمترونه فيا مضى من اتفع عولجات العين والبصر. ازهراره يستمر من ايار الى ايلول.



قَطْرُونٌ صِفِر

٢٢٢٣٩ - قَطْرُونٌ قَنْزَل (S). *Centaurea fenzi* (S). *Centaurea de Fenzl* (F). عشبة تزيينية سر بوتية عمو. ساقها قليلة الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها بيضيه الشكل، قليلة القاعدة، مجنحة المت، رؤيساتها الزهرية فردية التجميع، كبيرة القد، صفراء اللون، عادمة العرف. قناباتها الى البياض التاسع || ازهراره يستمر طوال الصيف.

٢٢٢٤٠ - قَطْرُونٌ قَيْجَنِي الْوَرَق

Centaurea rutaeifolia (S). *Centauree à feuilles de rue* (F). بجلة برية وتزيينية معمرة. ساقها فراء منتصبة تملو ٩٠ سم. أوراقها كبيرة القد فيجينة الشكل بالة التفريغ. رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد صغيرة القد وردية اللون. قناباتها مهدبة الخنار. اهدابا سود قاسية || ازهراره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٢٢٤١ - قَطْرُونٌ قَمِيرَة السَّاق

Centaurea acaulis (S). *Centauree acaule* (F). *Centaury* (E). *Flockenblume* (D). *Centaurea* (I). نوع من القَطْرُونِ البري وهو نجمة جعدة الساق الفراء تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. أوراقها قرصية وقوية الارتكاز، صغيرة القد، سنانية النصل الحمل البشرة. رؤيساتها الزهرية فردية، زرقاء اللون، قناباتها حنطية || يكثر في المراعي والبور ويقال ان عصارة جلوده نافعة تفيد الحمة وتنشط الدم.



قَطْرُونٌ عَنَبَرِي

٢٢٢٤٢ - قَطْرُونٌ كَبِير * عَرَطَب

Centaurea centaurium (S). *Centauree officinale*, *C. commune*, *Grande centauree* (F). *Great centaury* (E). *Grosse Flockenblume*, *Tausendgüldenkraut* (D). *Centaurea maggiore*, *C. commune*, *Fiele di terra* (I). نوع من القَطْرُونِ الطبي البري المعمر. ساقه فراء تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. أوراقه كبيرة سنانية سفة. رؤيساتها الزهرية عديدة متوسطة القد زرقاء اللون || يكثر في الاراضي الجبلية الملحاة. جلوده عطرية، حارة الطعم، مرة اللذاق، عديدة الفوائك الصحية المعوية النبهة العادمة الاثر الرجمي.



قَطْرُونٌ كَبِير

٢٢٢٤٣ - قَطْرُونٌ مَسْكِي

Centaurea moschata (S). *Centauree ambrette*, *Ambrette*, *Barbeau musqué* (F). نبات تزييني سر بوتى حولي. ضروبه واصرامه عديدة. ساقه فراء تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه سنانية الشكل صغيرة القد. رؤيساته الزهرية ذكية العرف الطعري، كبيرة القد، عديدة اللوان التي تختلط مع الغروب والاصرام || ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

الى ٣٠٠ سم. اوراقها الجذعية معنقة رجمية. نصلها جامد الصفحة. اوراقها العليا رباعية صغيرة القد عناقية الصفحة السفلى، رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد، كبريتية اللون، عادمة العرف. قناباتها نحيلة مهدبة بالاسمر || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول.

٢٢٢٣٣ - قَطْرُونٌ بَهْمَن * بَهْمَنُ اَيْض

Centaurea behen (S). *Centauree blanche*, *Béhen blanc*, *Rhapontic blanc* (F). *White behen*, *White rhapontic* (E). *Weisses Behen* (D). *Behen bianco* (I). عشبة حولية برية طيبة تكثر في الحقول وفي الاراضي الملحاة. ساقها زيا منتصبة فراء تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها مزغرة البثرة على صفحتها، زغبها لبد التجميع ابيض اللون. رؤيساتها الزهرية قرصية اللون صفر الملاج. قناباتها ضيقة مستطيلة، عديدة الملاح || يقال ان قوائده الصحية جلية اخصها التنشيط لانه مقر ناض وقد يستعمل في التواليل.

٢٢٢٣٤ - قَطْرُونٌ دَلْمَاسِي

Centaurea ragusina (S). *Centauree de Dalmatie* (F). بجلة تزيينية معمرة. ساقها منتصبة سرعة عادمة الفروع تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها ريشية فضية اللون. رؤيساتها الزهرية قليلة العدد مذهبة اللون سمر الملاج. قناباتها بيضيه الشكل ماله الصفحة مهدبة الاطراف. ازهراره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٢٢٣٥ - قَطْرُونٌ رَيْشِي

Centaurea phrygia (S). *Centauree plumeuse* (F). بجلة تزيينية معمرة ساقها فراء تملو نحو ٧٥ سم. اوراقها اهليلجية النصل، حناره منشاري التسنين. رؤيساتها الزهرية صغيرة القد قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الحمرة البنفسجية الملاج، قناباتها ريشية التفريغ، حنطية اللون، سود الملاح || ازهراره يستمر من تموز الى آب.

٢٢٢٣٦ - قَطْرُونٌ شَرْوَنِي

Centaurea cineraria (S). *Centauree cinénaire* (F). جنبة سر بوتية تزيينية معمرة ضروبها واصرامها عديدة. ساقها فراء تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها كثيرة التفصيص والتفريغ، حلقة البثرة، فضية اللون. رؤيساتها الزهرية متوسطة العدد والحجم لونها الى الصفار المذهب. قناباتها حنطية اللون واخنار المذهب || ازهراره يستمر من تموز الى آب.

٢٢٢٣٧ - قَطْرُونٌ صَكِير * مَرَاةُ الْخَشَن

Erythraea centaurium, *Chirona centaurium*, *Gentiana centaurium* (S). *Erythrae centauree*, *Petite centauree*, *Herbe à la fièvre* (F). *Earth-gall*, *Feverwort* (E). *Echtes Tausendgüldenkraut* (D). *Centaurea minore*, *Biondella*, *Caccia-febbre* (I).

نبات عشبي طبي معمر من فصيلة الجنطيانيات. يكثر في البور. ساقه قصيرة فراء تملو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه لاطئة متعاقبة رجمية عذكية التجميع هامة الارتكاز وردية اللون || يستعمل في الطب لملاج بعض الحميات ولطرد الديدان المعوية.

٢٢٢٣٨ - قَطْرُونٌ عَنَبَرِي * ثَرْنُشَاه

Centaurea cyanus (S). *Bleuet*, *Bluet*, *Aubifoin*, *Barbeau bleu*, *Casse-lunettes* (F). *Bachelor button*,

٢٢٧٤٤ - قَنْطَرُونٌ مُعَمَّرٌ *

Pytho (S).

Pytho (F). Pytho (E).

جنس حشرات من فصيلة القنطريئات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق الصنوبريات || اجسامها مستطيلة الشكل، مبططة، تطول من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضليمة. قرونها الاستشعارية غليظة. كواسلها محصورة. اطرافها لاحفة. قوائمها نشيطة. الاطراف ملونة يكثر فيها البنفسجي الاسود المولاج || يكثر وجودها تحت لحاء السرو والشرين حيث تخفي فصل الشتاء.

Centaurea montana (S). Centaurée vivace, Bleuet vivace, Barbeau vivace (F).

نبات لبني ترابي معمر شكسلي. ضروبوه واسرماه عديدة ساقه فراءه زياة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه سنانية، نصلها سرج الصلصة العليا عناكيه السلسل. رؤوساته الزهرية كبيرة القد، حافية الزرق. قناباتها سود الهذاب || انزهاره يستمر من ايار الى آب.

٢٢٧٤٥ - قَنْطَرُونٌ نَجْمِيٌّ *

Centaurea calcarata, C. stellata (S). Centaurée étoilée, Chausse-trape, Chardon étoilé (F). Caltrop, Mouse-thorn, Star thistle (E). Calcaripa, Sternflockenblume (D). Calcarippa, Calcarippola, Cardo stellato (I).

حشبة برية محولة تكثر في البور والمراعي وعلى حافة الطرقات، جذبوها مأكولة نافعة طعمها كطعم الارضي شوكي.

٢٢٧٤٦ - قَنْطَرُونٌ وَحِيدُ الزَهْرَةِ

Centaurea uniflora (S). Centaurée uniflora (F). برية وزيتونية معمرة. ساقها فردية زياة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها حاضنة، سنانية الشكل، مستديرة القاعدة، ثنائية الاذنات. رؤوسها الزهرية وحيدة، قطرها ٣ سم. لونها الى الحمرة القرمزية. قناباتها مفردة حنطية اللون || انزهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٢٧٤٧ - قَنْطَرُونِيَّةٌ

Centauridie (F). جنس نباتات برية وزيتونية من المركبات تدعى قنطورة، اطليا.

٢٢٧٤٨ - قَنْطَرَوَةٌ

Cantua (S). Cantua, Bronnie (F). الاسم العلمي والعربي من البيروني. جنس شجيرات دغلة جبلية من فصيلة القنسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد مهددا بلاد البيرو من امريكا الجنوبية || سوقها منتصبه فراءه. اوراقها متباينة الاشكال، منها الكاملة ومنها المسنن والمقرضة. انزهارها عثقي التجميع. ازهارها انبوية التويج تطول من ٢ الى ٦ سم. لوانها تختلف مع الانواع اعرف انواعها واشهرها النواعان التاليان.

٢٢٧٤٩ - قَنْطَرَوَةٌ اِجْصَافِيَّةُ الْوَرَقِ

Cantua pyrifolia (S). Cantua à feuilles de poirier (F).

نوع من القنطرواة تزود للزئين. ساقها كثيرة الفروع المنتصبه، تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها كاوراق الاجاص. نصلها جبلة اخضر الاصفر المولاج. انزهارها عثقي التجميع اليب. ازهارها معتقة، بيضاء اللون، صفراء المولاج، محبنة التويجات مستطيلة الاسدية البالغة النشور || تنويرها يستمر من آذار الى حزيران.

٢٢٧٥٠ - قَنْطَرَوَةٌ بَقْسِيَّةُ الْوَرَقِ

Cantua buxifolia (S). Cantua à feuilles de buis (F).

نوع من القنطرواة، تزود للزئين. ساقها فراءه تملو من متر الى مترين. اوراقها كاوراق البقس. نصلها جبلة اخضر الاملس. انزهارها عثقي التجميع. ازهارها معتقة متبدلة حراء اللون، صفراء التويج تطول نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان.



قنطرون معمر



قنطرون نجمي



قنطرو

٢٢٧٥٢ - قَنْطَرُونِيَّات *

Pythidae (S).

Pythidés (F). Pythidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل، مبططة، تطول من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضليمة. قرونها الاستشعارية غليظة مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محصورة. اطرافها لاحفة. قوائمها نشيطة. ارساغها خماسية المقل باستثناء الزوج الخلفي الرباعي المقل. الاطراف ملونة || تعيش تحت لحاء الصنوبريات اخصا السرو والشرين || اشهر اجناسها القنطروث.

٢٢٧٥٣ - قَنْطَرَوَةٌ، قَنْطَرُونِيَّةٌ

Centauridium (S). Centauride, Xanthisme (F). Centauridium (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى شبيه بالقنطرون. جنس نباتات حولية ومحولة. برية وزراعية تزيتونية من فصيلة المركبات الشعاعية. منبتها بعض اصقاع امريكا الشمالية. ضروبها الزيتونية شائعة الاستعمال الحدائقي || سوقها غلافية، فراءه. اوراقها متعاقبة، ضيقة النصال. انزهارها طرفي الارتيكانز. ازهارها شعاعية، فردية، كبيرة القد، بنفسجية اللون او صمنجنونية. عطرية العرف المحمود.

le Centaure (F).

the Centaur (E).

٢٢٧٥٤ - قَنْطَرُوسٌ

كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها مقيم برج المذراع. وهي تمثل صورة حيوان خرافي مقدمه مقدم انسان من رأسه الى آخر ظهره. اما مؤخره، من منشأ الظهر الى الذنب، فؤنصر فرس. وجهه الى المشرق وذنبه الى المغرب. ويده شراخان وقد قبض بيده الاخرى على يد السبع || عدد نجومها ٣٧ بعضها من المرتبة الاولى والثانية والثالثة. والمغرب تسمي النبر الذي على بطن قنطروس « بطن ». والنبر الذي على حافر يده اليمنى « حصار ». والنبر الذي على يده الاخرى « الوزن ». والحصار والوزن هما اللذان يسميان « الخلفين ».

٢٢٧٥٥ - قَنْطَرُوسِيَّات *

Xanthusidae (S).

Xanthusidés (F). Xanthusidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات قابعات الانسان. اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها خمسة. موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى وكليفورنيا || اجسامها تطول من ٨ الى ٢٥ سم. رؤوسها شبه عرصة الشكل. اسنانها صغيرة كثيرة

العدد. ألسنتها قصيرة منها المألوسة ومنها المشطلة. عيونها صغيرة، حواجبها لامتحركة. قوائمها متدلة الطول. رؤوسها وعلوياتها حرشية القشار. ظهورها مشطلة. أنثاها إلى اليركة السمراء.

٢٢٧٥٦ - قُتَاب العظم من الوعل.

٢٢٧٥٧ - قُتَابَة شَقْرَاء

(F). *Physocéphale roux* (S). *Physocéphale rufipes* (F). حشرة من فصيلة القنشيات. جسمها متوسط القد، يطول من ٨ إلى ١٢ سم. رأسها مستطو، أصفر اللون. جبهتها وعبرها مجمعة بالأسود. عظمها معتدل القد. عيناها كبيرتان. مرجانيتان. زباناها مستطيلتان، أصفران. رشناتها مستطيلتان، ضيقتان، تملوها مشعة صناعية في الشطر الأمامي. صدرها قدسي الشكل، أصفر اللون، حطلي الموج. بطها قعسي الشكل، أشجع اللون، مجذع بالأسود. قوائمها الخ الشقفة السمراء. قوتها المشر ترشقه من أزهار فصيلة المركبات. تمتع الأنثى مكها على بطون اللتان والقنشيات فينتفج عن يرقات تنقب بطون الموائ وتدخلها وتعيش فيها حتى الأكامل.

٢٢٧٥٨ - قُتَار * (F). *Tragelaphus gratus* (S).

(F). *Tragelaphus des marais* (F). نوع من الجبل كبير الوجة قدرة قدر الغنيس لكنه أصغر قرناً وأصغر ثوباً وأصغر أخلاقاً. يتميز باستطالة واتساع اظلافه التي حول دون فوصه في اسمال ورمال المناسج. موطنه فسج الارباء يمتد من الكامرون إلى النابون. يعيش قرب الماء يرتاد المناسج في الليل والناهار.

٢٢٧٥٩ - قُتَاع (F). *Regard* (F). *Look* (E). الكوة في الحائط.

٢٢٧٦٠ - قُتَاعَة مَذْهَبَة (S). *Conops flavipes* (S). *Conops doré* (F).

حشرة من فصيلة القنشيات. جسمها متوسط القد، يطول نحو ١٠ سم. رأسها كبير، شبه هرمي الشوزن، مذهب اللون، يطو في النافوخ والجهة زركشة سوداء. عظمها معتدل الحجم، مرتقي الشكل. عيناها كبيرتان، كستينيتان. زباناها مستطيلتان، أشعثان. رشناتها مستطيلتان، ضيقتان، تملوها مشعة صناعية في الشطر الأمامي. صدرها قدسي الشكل، تملو نقطتان حشاريتا الارتكاز، ذيعيتا اللون وطوق ضيق مذهب. بطها إلى الجوزة الرصاصية الموج تملو ثلاثة أطواق ذيعية الخضاب. قوائمها الخ الشقفة. افتخاذها مطوقة الأطراف بالأسود. تمتع الأنثى مكها على بطون اللتان والدعاس والذبور فينتفج المكن عن يرقات تنقب بطون الموائ وتدخلها وتعيش فيها حتى الأكامل.

٢٢٧٦١ - قُتَاعَة مَزْرَعَة

(F). *Conops quadrifasciatus* (S). *Conops bandé* (F).

حشرة من فصيلة القنشيات. جسمها يطول نحو ١٢ سم. رأسها كبير، شبه هرمي الشوزن، اسر اللون اسود الجبة. أصفر النوايح. عظمها مرتقي مستطيل. عيناها كبيرتان كستينيتان. زباناها مستطيلتان أصفران. رشناتها ضيقتان. صدرها قدسي الشكل، حديدي اللون، يملو زوجان من النقط الصفراء والبني. بطها إلى الصفرة الصناعية الموج تملوها أربعة أطواق سود. قوائمها إلى

السرمة العاقبة. قوتها رقيق الانزار. الانثى اكبر قدأ من الذكر. تمتع المكن على بطون الزناير والجنادب.

٢٢٧٦٢ - قُتَاعِيَّات * (S). *Conopidae* (F). *Conopidae* (E).

فصيلة حشرات من ذرات الجناحين. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. جميعها مغترية. قوتها رقيق الانزار. اجسامها ضيائية الحجم، تطول من ٥ إلى ٣٠ سم. رؤوسها فسحة، ناشرة الياويغ. اعطائها مرتقية. عيونها كبيرة. قوتها الاستشعارية لاقياسية الطول وعدد الفصل. رؤوسها مستطيلة، ضيقة. صدرها معتدلة. يطولها مستطيلة. اجسامها عرياطة أو حلجية القشار، حلها شديد الدقة والقصر. أنثاها اكبر قدأ من ذكورها. مكها شديد الصغر مستطيل الشكل. يمتد الاناث على بطون الزناير والنسوح والجراد والجنادب فينتفج عن يرقات دقيقة تنقب قشار بطن المائل فتدخله وتعيش كامل حياتها البرقية التي تنتهي مع حياة المائل. اشهر انواعها القنشة المذهبة والمزرة والشفراء.

٢٢٧٦٣ - قُتَر

القنر: شجر مثل الكبر الا ان الاغظ شوكة ووداً وثمرتها ككثرتها ولا ينبت في الصخر. حكاها ابو حنيفة.

٢٢٧٦٤ - قُتَاشَة * (S). *Cryptos* جنس دويبات من فصيلة القنشيات. انواعها المروفة ٦ اجسامها مركبة من ٢١ حلقة تحمل ٢١ زوجاً من الجرامز. ج قنفس.

٢٢٧٦٥ - قُتَاشِيَّات * (S). *Scolopendridae* (F). *Scolopendridae* (E). فصيلة دويبات من السدخايات الشقويات الاربل. اجناسها وانواعها العدد اشهرها القنفاشة وام اربع واربعين (الجريش).

٢٢٧٦٦ - قُتَاش

Diots maritima, *D. candidissima* (S). *Diotide argentea*, *Herbe blanche* (F). *Cotton weed*, *Sea cud-weed* (E). *Silberzwelehr* (D). *Santolina maritima* (I). نبات عشبي بري معمر وسيد الجش والنوع من فصيلة المركبات. منبته السواحل البحرية. ساقه فروع زياء تملو من ١٠ إلى ٥٠ سم. رزها مستطيل القد قطبي الشكل. اوراقه شاذية لاطمة، نعلها اعليجي الصفحة، مقطوم القاعدة، خلل البشرة. رويباته الزهرية عديدة صفراء اللون، قنابا جريسي الشكل، تويجها اسفنجي النسيج. بزورها مضطمة عادمة الجناح والاعرة. أنظراره يستمر من حزيران إلى ايلول.

٢٢٧٦٧ - قُتَاد *، كُتَابَة الشوك، أنشد حسيكة، دالج، دزام، كيكاب، كيكاب الشوك، لثشة، منديلج.

(S). *Hérissou* (F). *Hedge hog*, *Urchin* (E). *Igel* (D).

كينة ابو سفيان وابو الشوك والانثى ام دلال. قنافة ويقال لها الصامس. جنس حيوانات لبونة ناعمة من آكلات الحشرات صغيرة القد طولها يراوح من ١٦ إلى ٣٠ سم. وطولها من ٧ إلى ١٢ سم. اجسامها ملحوة بغطاء من الشوك يكتنفها بكاملها دون الرأس والبطن والجرامز. قوتها الحشرات والقنرات والجرذ والعظاء والحيات



قُتَاب



قُتَاشَة



قُتَاد

٢٢٧٧٨ - قُفْقُذَةُ الْبَحْرِ * ، شَيْهَمٌ بَحْرِيٌّ
Diodon (S). Hérissin de mer (F). Sea-urchin (E).
جنس اسماك بحرية شائكة من فصيلة الفهقيات ورتبة
ملحومات الفكوك. أنواعه نحو ٤٠ معظمها من اسماك بحار
البلاد الحارة . مقدمها يشبه مقدم القنفذ || قوتها
الحشرات والمرجان . لحومها مؤذية وقد تكون سامة .

٢٢٧٧٩ - قُفْقُذِيَّات
Erinaceidae (S).
Erinacédés (F). Erinaceidae (E).
فصيلة القناذف من الحيوانات البينة ورتبة الحشرات اي
آكلات الحشرات .

٢٢٧٨٠ - قُفْقُذِيَّةٌ هِيَ الْآبَرَةُ ، اطْلَبَا . ج قناظش .

٢٢٧٨١ - قُفْقُذٌ *
Acomys
جنس دويبات لبينة قاضية من فصيلة الفأريات. أنواعه
١٦ موطنها افريقية الشرقية والجزيرة العربية وفلسطين .
اجسامها صغيرة القد مستطيلة تحمل في مؤخر ظهورها
خطوطاً من الحلب اللبيل الشائك . تألف القفر قوتها
الحشرات والوزغ والحلزون والجذور || اعرف أنواعه
واشهرها قنفعة القاهرة والقنفعة المصرية .

٢٢٧٨٢ - قُفْقُذَةُ الْقَاهِرَةِ
Acomys cahirinus (S).
Acomys du Caire (F).
موطنها مصر السفلى . حجمها حجم الفأرة . ثوبها بلون
الرميل . بطنها ابيض . ذنبها قصير . اذناها كيرتان .

٢٢٧٨٣ - قُفْقُذَةُ مِصْرِيَّةٌ
Acomys dimidiatus (S).
Acomys de l'Egypte (F). Spiny mouse (E).
موطنها مصر وفلسطين والجزيرة العربية . ثوبها بلون الرميل
يسبق عند الظهر ويبيض عند الصدر والبطن . طويلاً نحو ١٢
سم . وذنبها ٨ سم . اذناها كيرتان || تألف القفار
والقباني .

٢٢٧٨٤ - قُفْقُولُ
Chèvre (F). Goat (E).
الغز السمين الفخمة .

٢٢٧٨٥ - قُفْقُوسٌ *
Gomphosus (S).
Gomphose (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكيدميات.
انواعه المعروفة اربعة اعطائها المحيط الهندي || اجسامها
الحليمية الشكل . متنتلة التبطيط . طولها من ١٧ الى
٢٣ سم . اثنائها تراوح بين السمرة والجودة الزيتية الموج .
بطونها ابيض كثير من ظهورها . زعانفها مبلقة بالاصفر
والاسود . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل ، مستطيلة
الخطم . عيونها ماحمة . زعانفها الظهرية مستطيلة . زعانفها
الذيلية مستعرضة ، محدودة الاطراف العليا والسفلى بتماخض
غضروفية لينة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٢٧٨٦ - قُفْقُولُ
Canavalia (S). Canavale (F).
جنس نباتات برية وزراعية ، عارضة اومدادة ، من فصيلة
القرنيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات
المناطق الحارة والاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها
مركبة ثلاثية تشبه اوراق الفاصوليا . ازهارها عقدودية
التجميع ، محورية الانتكاز . ثمارها قرون كبيرة القد ،
عديدة الحب ، ثنائية الجناح الدرزي || اشهر انواعه
الزراعية ما يلي .

وهي مولدة بالتهام الاناعي لا تتأثر بسها . تسرح في
الليل وترقد في النهار وهي في رقادها تنقبض وتتكور فتبدو
ككرة من الشوك . الاثنى اكبر حجماً من الذكر تصغ
من ٣ الى ٨ جراه تبصر النور بعد وضعها باربعة اسابيع .

٢٢٧٨٨ - قُفْقُذَانِ
Erinaceus auritus (S).
Hérissin oreillard (F).
موطنه العراق والاناضول وسورية ولبنان ، جسمه بطول
نحو ٢٦ سم . ويعلو نحو ١٢ سم . اذناه كيرتان .
خطمه وجرازه مستطيلة . شوكه ابيض القاعدة اسمر الجرم
اصفر الطرف بطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٦٩ - قُفْقُذُ أُرُوبِيّ
Erinaceus europaeus (S).
Hérissin d'Europe, Echinos (F).
موطنه اوروبا ، جسمه بطول نحو ٣٠ سم . ويعلو ١٠ سم .
خطمه يشبه قنفصة الخنزير . عنقه قصير . اذناه صغيرتان .
شوكه اسمر الجرم ابيض الطرف بطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٧٠ - قُفْقُذُ الْمَغْرِبِ
Erinaceus algirus (S).
Hérissin algérien (F).
موطنه افريقية الشمالية من مراکش الى طرابلس الغرب .
جسمه بطول نحو ٢٢ سم . بطنه حنطلي اللون . شوكه فضي
القاعدة ، اسفل الجرم ، اسود الطرف ، بطول نحو ٢٥ مم .

٢٢٧٧١ - قُفْقُذُ التَّمَلِ
Echidné (F).
هو التفتاض ، اطليه .

٢٢٧٧٢ - قُفْقُذُ حَبَشِيّ
Erinaceus aethiopicus (S). Hérissin abyssin (F).
موطنه الحبشة وجوارها . جسمه بطول نحو ١٨ سم .
بطنه اسمر اللون . شوكه ابيض القاعدة مضلع الجرم
الاسمر ، اسير الطرف ، بطول نحو ٢٥ مم .

٢٢٧٧٣ - قُفْقُذُ سُفَارِيّ
Erinaceus megalotis (S).
Hérissin à longues oreilles (F).
موطنه الافغان ، جسمه كبير القد بطول نحو ٣٠ سم .
اذناه كيرتان وذنبه كذلك . شوكه اسمر اللون بطول نحو
٣ سم .

٢٢٧٧٤ - قُفْقُذُ طَوِيلُ الشَّوْكِ
Erinaceus macrocanthus (S). Hérissin à longs pi-
quants (F).
موطنه العم والافغان والكردستان . جسمه متوسط القد بطول
نحو ٢٤ سم . اذناه كيرتان ذنقتان . شوكه ابيض الجرم ،
اصهب الطرف ، بطول نحو ٤ سم .

٢٢٧٧٥ - قُفْقُذُ مِطْبَنْ
Erinaceus albiventris (S).
Hérissin à ventre blanc (F).
موطنه افريقية الشرقية والجنوبية من مصر والسودان وسائر
ال موريتانيك . جسمه بطول نحو ٢٥ سم . بطنه ابيض
اللون . شوكه الى الصبهة بطول نحو ٢٧ مم .

٢٢٧٧٦ - قُفْقُذُ مَطْوِقُ
Erinaceus collaris (S).
Hérissin à collier (F).
موطنه الهند والسند والبنجاب . يرغب في القبانى والصحاري
الربلية . جسمه اسمر اللون بطول نحو ١٨ سم . عنقه مطوق
بالابيض . شوكه اسمر الجرم ، اغبر الطرف ، بطول نحو
٢٨ مم .

٢٢٧٧٧ - قُفْقُذَةُ
Hérissin (F).
She-hedgehog (E).
اثنى القنفذ .



قنفذ البحر



قنفذ



قنفوس

٢٢٧٨٧ - قُنُول بَايز ، قُنُول هِنْدِي

* ٢٢٧٩٢ - قُنُقِيَّة *

Trigonia (S).

Trigonie (F), Trigonia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم
وفصيلة القنقنيات. أنواعها المعاصرة المعروفة خمسة أعطائها
تتمتد من البحر الأحمر الى الهند وإستراليا || أصدانها
ثنائية المصارعين المتساوية الأضلاع ، مخددة السطوح
الخارجية ، مائلة الداخلية للؤلؤة التركيب الجميلة الألوان
القنقناتية .



قنقر

٢٢٧٩٤ - قُنُقِيَّات

Trigonidae (S).

Trigonidés (F), Trigonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم.
اجتناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار
العالم || أصدانها ثنائية المصارعين ، متباينة الأحجام ،
شبه مخروطية الشوذن ، مخددة الصفحات المحزنة || أشهر
اجتناسها القنقنة والجملة .

٢٢٧٩٥ - قُنَم

Rancissement (F), Rancidity (E).

فساد الدهن أو الزيت رغبث رجمها .

٢٢٧٩٦ - قُنُو

Thyrse

شكل من أشكال الانزهار المتقوي تكون فيه الأجزاء
الوسطى أطول من السفلى والعليا .

قنقر مشقن

٢٢٧٩٧ - قُنُو ، قُنَى ، كِبَاسَة

Régime de dattes (F), Cluster (E).

هو العلق الذي يحمل ثمار النخل وهو كالمتعود من العنب
ج أقناء وقناتان وقنوان .

٢٢٧٩٨ - قُنُوب

Bourgeons à fleurs (F).

Blossoms buds (E).

هي أبن النبات أو أكتة زهرة فإذا بدت قيل قد أقتب .

٢٢٧٩٩ - قُنُوس التَغْدِيَة

Normes d'alimentation (F), Feeding norms (E).

ما يجب اعتدائه في تمييز مقادير العناصر الغذائية اللازمة
لكل حيوان أو فئة من الحيوان بالنسبة إلى سنه ووزنه
وجرمه وعمله .

٢٢٨٠٠ - قُنُوس

Chanos salmoné (F).

سمكة بحرية من الصابوغيات تدعى شنوص ، أطلها .

٢٢٨٠١ - قُنُوم *

Mormyrus (S), Mormyre (F).

جنس اسماك نهريه من فصيلة القنقنات . أنواعه نحو ١٨
معتلها من اسماك المياه الإفريقية اخضها النيل والنيجر .
أشهر أنواعه القنومة الخطاء وقنومة النيل والقشوة .

٢٢٨٠٢ - قُنُومَة خَطْمَاء ، أُبُو يُوُز

Mormyrus caschive (S).

Mormyre rume (F).

سمكة مستطيلة الجسم ، لينة الزعانف ، صغيرة الفم ، مستدقة
الخطم الطويل . يتكرر وجودها في النيل . كانت من الاسماك
المكرمة عند قدماء المصريين .

٢٢٨٠٣ - قُنُومَة خَطْمَاء ، أُبُو يُوُز

Mormyrus oxyrhynchus (S), Mormyre à bec (F).

نوع من القنوم وهي سمكة لينة الزعانف ، مزودة الخطم ،
تكثر في النيل والنيجر .



قنوم

Canavalia gladiata (S), Canavale en glaive, Pois
d'Inde (F), Jamaica horse-bean (E), Kanavalbohne
(D), Dolico Indiana (I).

نوع من القنقول الزراعي . منبته البلاد الاستوائية ودائرة
وهو قريب الشبه من النوع السني . يتميز بانزاعه الحمر
وقرنيه الجمالة كصقل الحنوط وحبه الحنطى اللون الاسمر
المزاج . خواصه لا تختلف عن خواص السني وهو مأكول
مشله .

٢٢٧٨٨ - قُنُقُول سِنِيّ ، قُنُول سِنِيّ

Canavalia ensiformis (S), Canavale ensiforme, Har-
ricot-sabre, Pois-sabre (F), Sword-bean, Jack-bean
(E), Kanavalbohne (D), Canavalia (I).

نوع من القنقول وهو نبات زراعي مأكول الثأر كاللوباء
والقول . منبته البلاد الحارة . يعيش من ٣ الى ٥ سنوات .
ساقه عارضة ملتفة . أوراقه كبيرة . وريقاتها بيضيه ذلقة ،
تصلها جلدي الصفحة . انهاره جزئية اللون . عتقودية
التجميع . مستطيلة المالمق . ثمارها قرون متدلية ، مقوسة
كالكسيف طول نحو ٣٠ سم . وقمرض ٣ سم . تغلف من ٨
الى ١٢ حبة كبيرة القند مفلطحة الشكل يضاء اللون أو
وردية || قرونه الخضراء تستعمل استهلاك اللوباء وهي
للذبة العلم جيدة الصنف . حبوبه مأكولة ، غزيرة المواد
الغذائية ، تحوي ما تعرفه وقدره :

مواد آزوتية ٢٥,٦٢ ٪

مواد دهنية ٢,٣٢ ٪

مواد هيدروكربونية ٤٧,٩٤ ٪

٢٢٧٨٩ - قُنُقُر *

Macropus (S).

Kangourou, Kangaroo (F), Kangaroo (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة القنقريات ونبية الجرابيات ،
أنواعه ستة ، موطنها أستراليا ، قوتها الاضباب . تنبت
بقصر اليدين واستاطلة الرجلين والذنب . تألف الغابات
والروج تمشيش بجاعات صغرية يقودها فحل من سن .

٢٢٧٩٠ - قُنُقُر مَسَلَق *

Dendrolagus (S).

Dendrolague (F).

جنس حيوانات لبونة جرابية من فصيلة طوالب الأربيل .
أنواعها المعروفة أربعة موطنها أستراليا وغينيا الجديدة ||
اجسامها شبيهة بأجسام القنقر إلا أن قوائمها الأمامية
أطول من قوائمها الخلفية أقصر . رؤوسها صغيرة . أذنانها
مستطيلة || تتسلق الأشجار بحفنة وتسير على الخفيض
وتقفز جهده خلافا لما يفعله القنقر || لحونها سكية
الدوف قل من يرغب فيها .

٢٢٧٩١ - قُنُقُرِيَّات

Kangourous (F).

Kangaroo (E).

فصيلة حيوانات لبونة عاشبة من الجرابيات طوالبات
الأربيل . أنواعها المعروفة نحو ٢٥ تنضم الى ثلاثة اجناس
القنقر والولاب والثغاب || اجسامها متباينة الأحجام
التي تتراوح من قد الأرب الى قد الصلادة . رؤوسها شبه
مخروطية الشكل . أذنانها كبيرة منتصبة . أعناقها وأذنانها
مستطيلة . قوائمها الخلفية بالغة الطول . ألتها رباعية
الاخلاف || موطنها أستراليا وتسمانية وغينيا الجديدة والجزر
الجارية .

٢٢٧٩٢ - قُنُقِين صند بحري .

- Ductule ٢٢٨٢٠ - قَنِبَرَةٌ
قناة جهازية دقيقة تكون في الحشرات والحيوانات الدنيا .
- ٢٢٨٢١ - قَنِبَلَةٌ
كل حشرة تنتمي الى القهلبات .
- ٢٢٨٢٢ - قَنِبَسٌ
كل حشرة تنتمي الى فصيلة القهلبات .
- Psocidae (S). ٢٢٨٢٣ - قَنِبَسِيَّاتٌ
Psocidés (F). Psocidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة القهلبات اجناسها وأنواعها عديدة
جميعها صغيرة القد طويلاً براوح من ١ الى ٣ م . قوتها م . اثنائها
الى الرعدة السريعة يعلوها موج اسفع || قوتها ما ينمو
على النبات من الفطور .
- Corrodentia, ٢٢٨٢٤ - قَنِبَسِيَّاتٌ
Psocoptera (S). Psocoptères (F). Psocoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة القمليات تشمل القهلبات
والنامسيات .
- Perdrix robuste (F). ٢٢٨٢٥ - قَنِبَسِيَّ
هو الحجل النباهي ، اطلبه .
- Narcisse (F). ٢٢٨٢٦ - قَنِدٌ
هو النرجس ، اطلبه .
- Aubergine blanche (F). ٢٢٨٢٧ - قَنِبَبٌ
ضرب من الباذنجان ابيض الجار يستعمل كنبات تزيين .
- Fibres du dattier (F). ٢٢٨٢٨ - قَنِهْرٌ ، قَنِهْرُ
قشرة حمراء مسعرمة الالياف الهيكلة تكون على لب النخلة .
- ٢٢٨٢٩ - قَنِهْقَةٌ
صوت اللب .
- Anorexie (F). Loss of appetite (E). ٢٢٨٣٠ - قَنِمْ
قلة الشهوة للطعام عند الحيوان .
- Perdrix robuste (F). ٢٢٨٣١ - قَنِبَسِيَّ
هو الحجل النباهي ، اطلبه .
- Amphisbenus (S). ٢٢٨٣٢ - قَنِبَسَرَانٌ *
Amphisbène (F).
جنس عظام من فصيلة القهقرانيات انواعه ثلاثة طويلاً
من ٣٠ الى ٥٠ سم . اجسامها اسطوانية . اثنائها
الى السمره السوداء يعلوها تجذيع اغبر . قوتها الحشرات .
تعيش في التربة وتكثر قرب التماسل حيث تؤين الغذاء .
- Amphisbenidae (S). ٢٢٨٣٣ - قَنِبَسَرَانِيَّاتٌ
Amphisbénidés (F). Amphisbénidae (E).
فصيلة من العظائيات الديمات الارجل والروح الجوزي .
اجناسها قليلة العدد . تعيش تحت الارض . جميعها من
الزحافات الناعمة .
- Rémiges primaires, Flèches (F). ٢٢٨٣٤ - قَوَادِمُ
Wing primaries (E).
ريش مقدم جناح الطائر وهي الاعشار والعواشر .
- Rongeurs (F). Rodentia (E). ٢٢٨٣٥ - قَوَاضِمُ
رتبة حيوانات من البهونات تتميز باجسامها الصغيرة القد
وبشائنها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكها من القضم .
- Mormyridae (S). ٢٢٨٣٦ - قَوَائِمَاتُ
Mormyridés (F). Mormyridae (E).
فصيلة اسماك نهريه من مفتوحات المائدة اشهر اجناسها
القوم .
- Vasculaire (F). ٢٢٨٣٧ - قَوَتَوِيٌّ ، وَعَالِيٌّ
Vascular (E).
نمت تعريفي يطلق على النباتات القوية اي الوائية النسيج .
- Botryoïde (F). Botryoid (E). ٢٢٨٣٨ - قَوَتَرِيٌّ
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالقنور .
- ٢٢٨٣٩ - قَوَتَوِيَّاتُ
هي المارزوانيات ، اطلبها .
- Vascularisation (F). ٢٢٨٤٠ - قَوَتَوِيَّةٌ ، وَعَالِيَّةٌ
Vascularization (E).
القوية ، جسمورياً ، تكوين اوعية جديدة في النسيج
المضوية . وهي ايضاً النمط الذي تتخذه الاوعية في حالة
عضوية معينة .
- Nuque de l'éléphant (F). ٢٢٨٤١ - قَنِثَلُ
Nape of the elephant (E).
رقبة الفيل حيث يجلس الفيل .
- Nuage épais (F). Thick cloud (E). ٢٢٨٤٢ - قَنِثَبٌ
سحاب متكاثف التجميع عابق اللون .
- Involucelle (F). ٢٢٨٤٣ - قَنِثَبٌ
قناة صغيرة القد تملو قاعدة الرؤسة الزهرية .
- Bractéole (F). Bracteole (E). ٢٢٨٤٤ - قَنِثَبِيَّةٌ
قناة صغيرة الحجم تملو قاعدة القنثب .
- Feuilles mortes de pins (F). ٢٢٨٤٥ - قَنِثَبَرَةٌ
اوراق الصنوبر اليابسة تلحف الارض .
- Glumellule (F). ٢٢٨٤٦ - قَنِثَبِيَّةٌ
حبة شفاقة صغيرة القد تحت العنيفة ملاصقة للزهرة . وما
قنينتان لكل زهرة من زهرات السنبله .
- Phénotype (F). Phenotype (E). ٢٢٨٤٧ - قَنِثَسٌ
هو من النبات الذي يتحل بالصفات الشوزية المنسوبة
الى عكسه .
- ٢٢٨٤٨ - قَنِثَسِيَّةٌ
راجع صيد .
- ٢٢٨٤٩ - قَنِثَسِيَّةٌ
راجع أناسيكولوس .
- Verticilliolepis (S). ٢٢٨٥٠ - قَنِثَسِيَّةٌ
جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة الوطحيات .
جره الكنديه منتصبة ، فروعه ريشة الشكل ، قاعدية
الارتكاز . كنانته شفعية التجميع ، يفضية الشكل شفاقة .
انواعه قليلة العدد والاذا تلبو في تكاثرها ككتل من الففن
الابيض تركيب المواد النباتية والعنصرية المنحلة .
- ٢٢٨٥١ - قَنِثَسِيَّةٌ
قزم زجاجي ألمادة صغير القد يحكم السد .



قَهْرَانٌ

Malandre (F).

Malandre, Rotten Knot (E).

مرض جلدي يمتري ركة الفرس .

Dartrose de la vigne (F). **قُوَيْعَة الكَرَم**

Dartros of the vine (E).

وصم نباتي مظهره الخارجي قروح وفلوج في اصول وسروع الكرمة . سببه علل مختلفة احصاها الفحوص .

٢٢٨٤٥ - **قُوَيْعَة وَطِيَّة** ، اكزيميا وطية

Impétigo, Eczéma humide (F). Impetigo, Eczéma damp (E).

مرض جلدي يركب الحيوان .

Alouette cochevis (F). **قُوَيْعَة**

في القبرة المنحوسة ، اطلها .

Sternite (F). **قُوَيْعَة**

في الاسرنة مفصل من مفاسل بطن الحشرة . ج قوب .

Coque d'œuf (F). Shell (E). **قُوَيْعَة**

قشرة البيض بعد انفلاتها عن الفرج . ج قوب وقواب .

Bergeronnette printanière (F). **قُوَيْعَة**

راجع ذمرة الربيع .

٢٢٨٥٠ - **قُوَيْعَة الارضي شوكي**

Depressaria subpropinqua (S). Teigne de l'artichaut (F).

حشرة من القربيات فراشتها صغيرة القدد ، حنطية اللون ، بسطتها نحو ١٠ م . يرتقبها غبار اللون ثلاثية الخطوط القاطبة . تركب الارضي شوكي .

٢٢٨٥١ - **قُوَيْعَة الازالية** * ، **قُوَيْعَة الجُلَسَان**

Gracilaria azalae, G. azaleella (S). Teigne de l'azalée (F). Azalea leaf miner (E). Azaleenmotte (D).

حشرة من القربيات بسطتها نحو ١٠ م . رواشتها خبيقة حنطية اللون فضية اللون . يرتقبها دقيقة الجسم غبارا الثوب تلغم الادرار وتؤذيها .

٢٢٨٥٢ - **قُوَيْعَة الأشجار المثمرة**

Teigne des arbres fruitiers (F).

في الشبكية الصغيرة ، اطلها .

٢٢٨٥٣ - **قُوَيْعَة البراعم**

Teigne des bourgeons (F).

في الشبكية الصغيرة ، اطلها .

٢٢٨٥٤ - **قُوَيْعَة التفاح**

Teigne des pommiers (F).

في خرطيط التفاح ، اطلها .

٢٢٨٥٥ - **قُوَيْعَة التين** * ، **لاغمَة التين**

Simaeis nemorana (S). Mineuse du figuier, Teigne du figuier (F). Fig moth (E). Feigenblattmotte (D).

حشرة من القربيات فراشتها سمراء اللون تظلو نحو ١٠ م . رواشتها مستعرضة حنطية يعلمها تبيج اسفح اللواج || لها جيلان في السنة . يرتقبها صغيرة دقيقة تركب في جيلها الاول السطح العلوي من الورقة وتركب في جيلها الثاني الورقة والثمرة معاً .

فصائلها ١٤ تنتمي الى ٤ مراتب : السجائيات الشوزب ، والقرقديئات الشوزب ، والشجيمات الشوزب ، والبيكيات الشوزب || اما اجناسها ونوعاتها فكبيرة العدد .

٢٢٨٣٦ - **قَوَاع** (F). Migratory (E).

الطيور التي تنهب من بلاد الى بلاد وهي ضد الازايد .

٢٢٨٣٧ - **قَوَاع** * ، **أَرْتَب بَرِّي** ، **أَرْتَب وَحْشِي**

Lepus (S). Lièvre (F). Hare (E).

جنس حيوانات لبونة تنافس من فصيلة الارنيئات . انواعه

٦٩ موطنها العالم . اجسامها مستطيلة منسجمة . طولها

الكامل ، من برطمانها الى طرف ذنبها ، لا يقل عن ٦٠

سم . ولا يفوق ٧٥ سم . اذنانها مستطيلة ضيقة متصبة .

عيونها كبيرة . براطمها مقلوبة . جرابها الالمانية قصيرة القدد

خاسية الاصابع ، اما الخلفية فستطيلة ورباعية الاصابع .

اظانها قوية حادة . اقلها سوية اللون منها الاكعب

والاسمر والاصهب والابيض الغ ... || تألف اليهر

والجبال والنايات والاحراج والحضاب والسهول . ترحل

في الليل . اجترتها رداء مستطيلة الشكل تخلدها عن اعماق

مختلفة تراوح من ٤٠ الى ٧٠ م . مدخلها مغرورها عنق

واحد مستقيم || قوتها النبات والحيوب . اناثها ثنوية

تضع من ٣ الى ٥ مرات في السنة وكل مرة من الدرصين

والأمنسة تخلق باصرة كاسية ترحل برفقة امهاتها بعد

وضعا ياسرع . واثي القواع تدعى درامة . وقواع || اعرف

انواعها واشهرها :

قَوَاع ابيض ، **قَوَاع جعول**

Lepus timidus (S).

Lièvre timide, L. blanc (F).

قَوَاع اروي

Lepus europæus (S).

Lièvre européen, L. commun (F).

قَوَاع التبت

Lepus tolai (S). Lièvre du Tibet (F).

قَوَاع الشمال

Lepus arcticus (S). Lièvre arctique (F).

قَوَاع القطب

Lepus capensis (S). Lièvre du Cap (F).

قَوَاع المتوسط

Lepus mediterraneus (S).

Lièvre méditerranéen (F).

قَوَاع المراعي

Lepus campestris (S).

Lièvre des prairies (F).

قَوَاع امريكي

Lepus americanus (S).

Lièvre américain (F).

قَوَاع مصري

Lepus aegyptius (S).

Lièvre d'Egypte (F).

قَوَاع مقلد

Lepus nigricollis (S).

Lièvre mossel, L. à cou noir (F).

٢٢٨٣٨ - **قَوَال**

القوال طائر معروف باسم عديمس شرقي ، اطلها .

٢٢٨٣٩ - **قَوَاعَة** هي الولاية ، اطلها .٢٢٨٤٠ - **قَوَالِيم**

Membres (F). Limbs (E).

اعضاء الحيوان كاليدين والرجلين التي تؤن انتقال الجسم .

٢٢٨٤١ - **قَوُب**

هو الصوص والكنكوت . ج أقواب .

٢٢٨٤٢ - **قَوَيْعَة**

هي الاكزيميا ، اطلها .



قواع



قويعَة الارضي شوكي



قويعَة الازالية



قويعَة التين

٢٢٨٦٥ - قُوَيْعَةُ الشَّحْمِ

Aglossa pinguinalis (S). Teigne de la graisse (F).
حشرة من القويبيات. رقتها صغيرة دقيقة وردية اللون تعيش
على اللحم الجامد.

٢٢٨٦٦ - قُوَيْعَةُ الشُّوَدَرِ ، لَيْتِه

Lita ocellatella (S). Teigne de la betterave (F).
حشرة من القويبيات. بسطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ سم.
نوبها إلى الطحلة العاقبة. رقتها خضراء اللون حمراء الحواف
تلغم جنود الشودر وتقع بها أشد الأذى.

٢٢٨٦٧ - قُوَيْعَةُ الصَّلِيلِيَّاتِ

Teigne du colza هي القويعة المائية، اطلبها.

٢٢٨٦٨ - قُوَيْعَةُ الصُّوفِ * ، سَعْفَةُ الصُّوفِ

Tineola bisellialis (S). Teigne de la laine. Mite
des vêtements (F). Webbing cloth moth (E).
Kleidermotte (D).

حشرة من القويبيات رقتها صغيرة دقيقة زهراء اللون تركب
جميع الانسجة الصوفية بما فيها السجاد.

٢٢٨٦٩ - قُوَيْعَةُ الْفِرَاءِ * ، سَعْفَةُ الْفِرَاءِ

Trichophaga tapetzella, *Tinea tapetzella* (S). Teigne
des fourrures, Mite des fourrures, Mite des
tapis (F). Carpet moth (E). Tapetenmotte (D).

حشرة من القويبيات رقتها صغيرة اللون سمراء اللون تركب
الفراء وتقرضها.

٢٢٨٧٠ - قُوَيْعَةُ الْفَلَيْنِ ، سَعْفَةُ الْفَلَيْنِ

Aenophila flavum (S). Teigne du liège (F).
حشرة من القويبيات رقتها صغيرة اللون دقيقة سمراء اللون
حشيتية المواجه تلغم الفلين المصنوع قطعته.

٢٢٨٧١ - قُوَيْعَةُ الْكُرَاتِ

Acrolepia assectella (S). Teigne du poireau (F).
Leek moth (E). Lauchmotte (D).

حشرة من القويبيات صغيرة اللون بسطها نحو ١٢ سم.
نوبها إلى الطحلة السمراء رواشها منشفة بالأسود. رقتها
دقيقة حشيتية اللون تلغم الكرات بأوراقه وقمرس ساقه.

٢٢٨٧٢ - قُوَيْعَةُ الْكَرْزِ *

Argyresthia ephippella (S). Teigne du cerisier (F).
Cherry fruit moth (E). Kirschblütenmotte (D).

حشرة من القويبيات. بسطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ سم.
رواشها الاخلاص إلى الرمادي يعلوها تمريغ أسود.
رواشها الاخلاص إلى السمرة الحشيتية السوية يحويها اطوار
من الخمل الاصفر الناعم. رقتها تركب ازهار وتثمّر
الانجبار المشرة انحصا الكرز.

٢٢٨٧٣ - قُوَيْعَةُ الْكَيْشِيشِ

Incurvaria capitella (S). Teigne du groseillier (F).
حشرة من القويبيات بسطها نحو ١٥ سم. رواشها جوية
اللون يعلوها تبيج اصفر مثلث الزوايا. رقتها تبيد حمراء
اللون في اول معدها ثم خضراء زاهية فقاومة وهي تقرض
براعم وتثمّر الكشمش.

٢٢٨٥٦ - قُوَيْعَةُ الْعِيَابِ * ، سَعْفَةُ الْعِيَابِ

Tinea pellionella (S). Teigne des vêtements (F).
Pelt moth (E). Pelzmotte (D).

حشرة من القويبيات. رقتها صغيرة دقيقة تعيش على
التياب الصوفية. اجيالها الحولية من ٣ الى ٥. فيالغ
عذارياتها غدية الشكل متينة النواص.

٢٢٨٥٧ - قُوَيْعَةُ الْجَزْرِ

Depressaria nervosa (S). Teigne de la carotte (F).
Carrot moth (E). Kümmelmotte, Möhrenschebe (D).

حشرة من القويبيات. رقتها صغيرة غبراء اللون تعيش على
ازهار الجزر وغيره من نباتات الفصيلة الخيمية فتفشي
على الازهار وقد لا تمتص من البذور.

٢٢٨٥٨ - قُوَيْعَةُ الْخُبُرِ * ، حُنْطُ الْخُبُرِ

Tinea granella (S). Teigne des grains (F).
European grain moth (E). Kornmotte, Weisser
kornwurm (D).

حشرة من القويبيات. بسطها تراوح من ١٠ الى ١٤ سم.
رواشها إلى البياض الاغبر يعلوها تبيج حشيتي ومجاة فضية.
رقتها وسيدة الجيل الحولي، صغيرة اللون، تركب جميع انواع
المواد الغذائية المخزونة ولا تمتص من الحنطة والشعير.

٢٢٨٥٩ - قُوَيْعَةُ الْحُمْصِيَّاتِ *

Prays citri (S). Teigne du citronnier (F).

حشرة من القويبيات. صغيرة اللون بسطها نحو ١٠ سم.
نوبها إلى الطحلة. رواشها مرقشة. ثلاثية الاجيال الحولية.
رقتها صغيرة اللون، تركب ازهار وتثمّر الحمصيات.

٢٢٨٦٠ - قُوَيْعَةُ الْخَشَبِ

Teigne du bois mort (F).

هي الهربيلة النبكة، اطلبها.

٢٢٨٦١ - قُوَيْعَةُ الدَّرَاقِنِ ، سَرَسْتُوم *

Cerostoma persicella (S). Cérostome du pêcher (F).
حشرة من القويبيات كبيرة اللون بسطها نحو ٢٥ سم.
رواشها الاماميان إلى الصفار الكبريتي والخلقيان إلى
الطحلة. رقتها رحيمة الجيل الحولي تركب اوراق الدراقن
والوزر.

٢٢٨٦٢ - قُوَيْعَةُ الدَّرَاقِنِ الصَّغِيرَةِ * ، أَنْرَسِيَا *

Anarsia lineatella (S). Petite mineuse du pêcher (F).
Peach twig borer (E). Pfirsichmotte (D).

حشرة من القويبيات. بسطها تراوح من ١٤ الى ١٦ سم.
رواشها ضيقة طحلاء اللون. لها جيلان في الحول. تركب
رقعة الجيل الاول الاثنان الثانية فتلتهمها وتحول دون نموها.
اما رقات الجيل الثاني فتتركب الثمار وتنخرها.

٢٢٨٦٣ - قُوَيْعَةُ الزُّعُرُورِ

Teigne de l'aubépine (F).

هي التميكة الصغيرة، اطلبها.

٢٢٨٦٤ - قُوَيْعَةُ الزُّيْتُونِ *

Prays oleellus (S). Teigne de l'olive (F). Olive moth (E). Oliven-
motte (D).

حشرة من القويبيات. صغيرة اللون بسطها نحو ١٠ سم.
نوبها رمادي اللون فضي المواجه. اجيالها الحولية ثلاثة.
رقتها صغيرة اللون حشيتية اللون ثلاثية الخطوط السمرة القاطية
تركب الارواق فتلتهمها والازهار فتسبب املاسها والثمار
فتنخرها وتعلتها.



قويعة الثياب



قويعة الحبوب



قويعة الحمضيات



قويعة الدراقن الصغيرة



قويعة الزيتون



قويعة الصوف



قويعة الفراء



قويعة الكرز

مكنها ذري القد مستدير الشكل لاقياحي الصمغ . ررقها صغيرة ملونة تلغ الاوراق والاعار . خادراتها تحلج ضمن فبالج حبكها نواس لبد متين .



قوبعة ماسية

٢٢٨٨١ - قُوْبِيَّاتٌ Cobeeaceae (S).

Cobécées (F). Cobeeaceae (E).


فصيلة نباتية وسيدة الجنس، نباتاتها عارضة مهدها امريكة الاستوائية . ومن النباتين من قال انها عارة من القبيسات ومنهم من اعتبرها عارمة من البغنيات .

٢٢٨٨٢ - قُوْبِيَّةٌ Cobaea (S). Cobéa, Cobée (F).

جنس نباتات عارضة معمرة من فصيلة القوبيات، انواعها اربعة اعطائها البلاد الامريكية . جميعها تريبتية . ازهارها جرسية الشكل ملونة . ثمارها حقية مستطيلة . بزورها مبطلة || اعرف انواعها واشهرها القوية العارضة .

٢٢٨٨٣ - قُوْبِيَّةٌ عَاشِرَةٌ Cobaea scandens (S). Cobée grimpante (F). Cups and saucers, Cathedral bells (E). Klettertulpen, Glockenrebe (D). Cobea (I).

نوع من القوية ساقها ليفية عارضة تطلو نحو ١٨ م . اوراقها مركبة وريقاتها يضيء النصل تطلو من ١٥ الى ٢٢ سم . ازهارها كبيرة القد تطلو نحو ٨ سم . اكائها بنفسجية مضلمة . نويجها جرسى الشكل ، اخضر اللون ، بنفسجي الموالج || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .



قوبعة ناسجة

٢٢٨٨٤ - قُوْبُونُ، حُوتُ الجِنِّ Gobius (S).

Gobie (F). Goby (E).

جنس اسماك بحرية بؤرية ترشب في المياه الرلكة . اجسامها صغيرة . رؤوسها كبيرة ، اشداها واسعة ، انواعها عديدة جميعها من الاسماك الوثائية التي تنقفز فوق الماء . منسلها في الاسماك السامة وبعضها مأكول . انواعها السامة تكثر في البحر الاحمر والخليج الفارسي وبحر العرب .



قوبية عارضة

٢٢٨٨٥ - قُوْبُونُ أَسْوَدُ*، كُرُوجُ أَسْوَدُ Gobius niger (S). Gobie noir, Boulérot noir (F). Black goby, Rock-fish (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة القوبيويات ورتبة شائكات ااعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط .

تعتبر من اسماك النفاذ والمجادح . تعيش بين الصخور وفي الاووالج || جسمها مستطيل الشكل ، مستعدل السطح ، يطول نحو ٢٠ سم . ثوبها الى الكعبة السراء يطولها تنحيز اسود في الظهر وتنقش اسود في الجانين تتخلله بعض النقط الصفراء . رأسها كبير الحجم ، يرمي الشكل ، قصير الخيط . شفاها معدل الانفراج ، فكها متعادلان . اسنانها صغيرة ، ذرية ثنائية الصف . عينها بيضيتان ، رديتا الانزكار . زعانفها متباعدة التركيب والاشكال . زعنفتها الذيلية رديحة الشكل || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .



قوبون اسود

٢٢٨٨٦ - قُوْبُونُ مَدَمَّى*، كُرُوجُ مَدَمَّى Gobius cruentatus (S). Gobie sanglant (F).

Bloody goby, Sea-gudgeon (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة القوبيويات . اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من اسماك النفاذ والمجادح . جسمها معدل القد ، شبه اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٠ الى



قوبون مدنى

٢٢٨٨٤ - قُوْبَعَةُ اللَّيْلَك Gracilaria syringella, Xanthosyllapteryx syringella (S). Teigne du lilas (F). Lilac leaf miner (E). Fle-dermotte (D).

حشرة من القوبيات صغيرة القد بسطها تراوح من ٩ الى ١٠ م . ثوبها حنطى اللون . ررقها تلغ اوراق اليك وتقتل اطرافها قطعها .

٢٢٨٨٥ - قُوْبَعَةُ المَضَاصِ Hyponomeuta cognatella, H. evonymella (S). Hy-ponomeute du fusain (F).

حشرة من القوبيات فراشها صغيرة القد ودياء الثوب . ررقها غيرة اللون تلهم ورق المضاص بعد ان تجلبه بفشارة من النراس العنكبوتي تعيش في داخلها حتى اكبال تطورها .

٢٢٨٨٦ - قُوْبَعَةُ التَّجِيلِيَّاتِ* ، اَكَيْسَةُ

Elachiste argentella (S).

Teigne des graminées, Elachiste argentée (F).

حشرة مؤذية من القوبيات . فراشها صغيرة القد ، بسطها تراوح من ١٢ الى ١٥ م . روشنها الاماميان الى الطحلة الفضية . روشنها الخلفيان الى الصبهة يحويها اطار من الحبل المهدب الصنابي اللون || يرقها صغيرة دقيقة خطية اللون تركب عصمت التجليات فتلمج النصل بين بشرته || تظهر القرفة في ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . لها جيل واحد في الحول . تنشط البرقة وتظهر دها ليزعا في النصل في شهر نيسان .

٢٢٨٨٧ - قُوْبَعَةُ اَلْهَلْبِ ، سَعْفَةُ اَلْهَلْبِ

Tinea crinella (S). Teigne des crins (F).

حشرة من القوبيات ررقها صغيرة القد سمرها اللون تركب الهلب وتقرضه .

٢٢٨٨٨ - قُوْبَعَةُ مَاسِيَّةٌ* ، قُوْبَعَةُ الصَّلْبِيَّاتِ

Plutella maculipennis (S). Teigne du colza, Teigne des crucifères (F). Diamond back moth (E). Kohlschabe, Kohlmoette, Schlieirmotte (D).

حشرة من القوبيات . بسطها تراوح من ١١ الى ١٢ م . رواشها خطية اللون تقرضها صفرة تملو الحبل المستطيل ، فتلع كالاس . ررقها زبابة، ثوبها الى الخضار الفاتح، تطلو نحو ١٢ م . تركب نباتات الفصيلة الصليبية اصعبها السلم فتقرض الازهار والبزور .

٢٢٨٨٩ - قُوْبَعَةُ نَاسِجَةٍ*

Hyponomeuta padella, H. malinella (S). Hyponomeute, Chenille fileuse (F).

حشرة من القوبيات ، تحيلة الجسم ضيقة الرواشن، بسطها تراوح من ١١ الى ٢٠ م . جيلها الحولي واحد . ررقها تركب التفاح والخوخ والزعرور فتتسع على الاوراق جلباباً مزياً من النراس تعيش في داخله .

٢٢٨٩٠ - قُوْبَعِيَّاتٌ ، سَعْفِيَّاتٌ

Tineidae (S). Tinéides (F). Clothes moths (E). Echte motten (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجتة . اجناسها وانواعها زهاء ١٤٠٠٠ معلها من الحشرات الناصة، صغيرة القد ضيقة الرواشن المهدة الاطواف . ملاسها الشفوية صغيرة مدبية . قرضها الاستعمارية خطية حرورية .

٢٢٨٩١ - **قُوَّةُ الإِنْتِاشِ** (F). Pouvoir germinatif (F).
Germinal power (E).
من المعلوم ان لكل نوع من النبات مدة فصل من الزمن تستغلها البذور الى ان يتم انتاشها || قُوَّةُ الانتاش قياس نسبي نوعي يقدر بواسطته نسبة البذور الجيدة والسريعة الانثاء .

٢٢٨٩٢ - **قُوَّةُ جَاذِبَةٍ** (F). Force centripète (F).
Centripetal force (E).
هي القوة التي تدفع الشيء نحو المركز .

٢٢٨٩٣ - **قُوَّةُ غَامِرَةٍ ، قُوَّةُ غَمْرِيَّةٍ**
Force marémotrice (F). Tide-moving force (E).
هي القوة التي تكوّن موج البحر الطاغية الغامرة في مدحا وقد توصلوا في فرنسا الى استخدامها لتوليد الحركة الاندفاعية .

٢٢٨٩٤ - **قُوَّةُ نَائِذَةٍ ، قُوَّةُ طَارِدَةٍ ، قُوَّةُ مَبْعِدَةٍ**
Force centrifuge (F).
Centrifugal force (E).
هي القوة التي تدفع الشيء لابتعاد من المركز .

٢٢٨٩٥ - **قُوَّتَانِ** (F). Yack (F).
هو القطاس ، اطلبه .

٢٢٨٩٦ - **قُوِّيَّةٌ**
Bromatologie (F).
Bromatologie (E).
القويّة علم يبحث في الاعتداء مع وصف الاذية وتراكيبها ومعاييرها العنصرية .

٢٢٨٩٧ - **قَوْنَعٌ** هو الظلم ذكر النعام .

٢٢٨٩٨ - **قَوَسٌ** (F). Arc (F). Arch (E).

٢٢٨٩٩ - **قَوَسٌ** (F). Cintre (F). Curve of an arch (E).
٢٢٩٠٠ - **قَوَسٌ**
القوس مجموعة من ستة كواكب تدعى القلادة .

٢٢٩٠١ - **قَوَسٌ قَوْحٌ** (F). Arc-en-ciel (F).
هو القسطن ، اطلبه .

٢٢٩٠٢ - **قَوَسِيَّاتٌ** (F). Arctotées, Arctotidées (F).
سبط من فصيلة المركبات الهيشريات .

٢٢٩٠٣ - **قَوَصَرَةٌ** (F). Pot (F).
هي المكن تركب فيه الزهور . ج قواصر .

٢٢٩٠٤ - **قَوَطَلَةٌ**
كلمة عامية تستعمل للدلالة على الثمر وعلى البندورة .

٢٢٩٠٥ - **قَوَاطِي** ، **نَوَاطَةٌ** (F). Nasua (S). Coati (F).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة الرتوليات . انواعها المعروفة خمسة ومنهم من قال انها نوعان وثلاثة غروب . جميعها امريكية الموطن ، صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستندرة الاذن ، كثيفة الصوف الناعم ، مستطيلة الذيل الجلل .
انها تضع من ٣ الى ٥ جراء . تألف الغابات الكثيفة . قوتها الثمار والدويبات والحشرات .

٣٠ سم . حراشفها صغيرة ، جامدة . ثوبها الى الربعة والفترة الحمراء يعلوها في رأسها وظهرا وبطنها يتيج عابن الجمره كالد . زعانفها الظهرية والصدريه والذيلية مرقوفة بالاسر والاخر || رأسها كبير الجرم مستعرض الخلف والظلم . شدتها واسع الانفراج فكها الاسفل يتقدم الاعلى قليلا . اسنانها صغيرة ذرية ، ثنائية الهنث . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيعتا الارتكاز . زعنفتها الظهرية الاولى مستطيلة المناخس . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || الاثني تسراً في فلق من الصدف الكبير بعد تنظيفها من الرمال والاوخال وتتناوب مع الذكر على حراسة السرم حتى التقف || لهما جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٧ - **قَوِيُونٌ مَصْبٌ * ، كَرُوجٌ أَغْبَرٌ**
Gobius nebulosus (S). Gobie nébuleux (F).
Gobius nebulosus (E).

سمكة بحرية بيوض من القويون . اعطانها تمتد من الخليج الى البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط عبر قناة السويس || تعتبر من اسماك النقا والمخادج . جسمها صغير الحجم ، مستطيل الشكل ، معتدل التليط ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم . حراشفها معيئة جامدة . ثوبها ابيض اللون ويعملو من الخط الجانبى الى الظهر تمتدح غير متفاوت الكثافة يبدو كالغيباب . اما القسم السفلى فقضي المراج . زعانفها الظهرية والشرجية شفافة . الصدريه والحوضيه الى الخفصار البحري ويعملو الحوضيه موج اسمر . الذيلية شفافة ملوكة بخمار اسود || رأسها كبير الحجم ، غزور في الشكل ، قصير الخلف الذلق . اسنانها صغيرة ، متراسة . عينها معصرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيعتا الارتكاز . زعانفها الظهرية اثنتان تتميز باستطالة الشعاع الثاني من الظهرية الاولى الذي يبدو كسلك دقيق ، مستطيل اسود اللون . زعنفتها الحوضيتان متلاصقتان لهما جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٨ - **قَوِيُونِيَّاتٌ** (S). Gobilidae (S).
Gobilids (F). Gobilids (E).

فصيلة اسماك بيوضة من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، معظمها بحري وبعضها نهري والبحري يكثر وجوده عند الاغوار . اعطانها مياه البلاد للمتلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد او صغيرة . رؤوسها كبيرة . اشداقها معتدلة الانفراج . عينها مستديرة ، ناشرة . زعانفها الظهرية الاولى منخسية الاطراف || اشهر اجناسها القويون .

٢٢٨٨٩ - **قُوَّةٌ** (F). Force (F).

هي صفة الانزامية المفروضة وهي تستعمل في الصيغ التالية :

قوة الاليات (F). Force probante (F).

قوة الالتزام الخاص (F). Force d'obligation privée (F).

قوة القانون (F). Force de loi (F).

قوة المحكوم به (F). Force de chose jugée (F).

قوة تنفيذية (F). Force exécutoire, Exécution parée (F).

قوة قاهرة (F). Force majeure (F).

٢٢٨٩٠ - **قُوَّةُ الْإِمْتِصَاصِ ، قُوَّةُ الْمَصِّ**
Pouvoir absorbant (F). Absorptive power (E).

خاصة الثراب التي تمكنه من الاحتفاظ بين ذراته بعض العناصر الذائبة القابلة للذوبان .



قويون مصب



قُوطِي مَعْرُوف



قُوتَحان



قُوتَحان الحقل

قُوتَحان المروج



قُوتَحان كَبِير

قُوتَحان ذَهَبِي



قُوتَحان مَنيات

قُوتَحان مَخرَني

والبور. ساقه فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقه سفيرة
فضيكة زياة النصل. رؤسياته الزهرية فردية التجميع،
قلنسوة الشكل، صفراء اللون.

٢٢٩١٧ - قُوتَحان المَروُج * ، كَرويتَم البَرّ ، مَندِيلِيه

Chrysanthemum coronarium (S). *Chrysanthème à carène*, C. des jardins, Marguerite des champs (F). Crown daisy, C. marigold, Garden chrysanthemum (E). *Kronenwucherblume* (D). *Crisantemo da nazi*, *Bambagelle*, *Margherita gialla* (I).

عشبة حولية برية ورّيشية. ساقها فراء متشعبة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها قدية التفريش. رؤسياتها الزهرية متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم. طبانها اصفر اللون اخضر الملاج. لساناتها الى الصفار الزاوي || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٢٩١٨ - قُوتَحان ذَهَبِي * ، لُؤبُيا ، كَرويتَم مَحْصَل

Chrysanthemum segetum (S). *Chrysanthème des blés*, *Marguerite dorée*, M. jaune (F). *Corn chrysanthemum*, C. marigold, Yellow corn-flower (E). *Echte Wucherblume*, *Kornringelblume* (D). *Margherita dorata*, M. delle messi, *Crisantemo* (I).

عشبة حولية برية ورّيشية ساقها قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها قدية التفريش، بحرية اللون، ثخينة النصل، متباعدة التنسج. رؤسياتها الزهرية ذهابية اللون، متوسطة القد، قطرها نحو ٤ سم. معاليقها متفتحة حقة الشكل || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٢٩١٩ - قُوتَحان كَبِير *

Chrysanthemum leucanthemum, *Leucanthemum vulgare* (S). *Chrysanthème grande marguerite*, *Œil de bœuf* (F). Ox-eye daisy, White-weed, Dog daisy (E). *Gänsewucherblume*, *Riesenmargerite*, *Goldsblume* (D). *Margherita grande*, M. dei prati, *Margaritone* (I).

عشبة برية مبدولة معمرة ساقها فراء تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها لاقباسة الشكل والقد، رؤسياتها الزهرية كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. لساناتها فضيكة مستطيلة. ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الثاني.

٢٢٩٢٠ - قُوتَحان مَخرَني * ، زُبدِيه ، سُوسِي

Calendula officinalis (S). Souci officinal, S. des jardins, S. à bouquet, S. double, Mirliton (F). Hen and chickens, Pot marigold (E). *Ringelblume*, *Gartenringelblume* (D). *Calendola*, *Calta dei giardini* (I).

نبات عشبي حولي ويحول من فصيلة المركبات. فروعها الزراعية عديدة سوفها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سنالية متعاقبة. رؤسياتها الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفرة الذهبية العابقة.

٢٢٩٢١ - قُوتَحان مَنيات * ، شَجَرَة مَرمَر ، كَرَمَاش

Chrysanthemum parthenium (S). *Chrysanthème-Matricale*, *Grande camomille* (F). Feverfew chrysanthemum (E). *Goldfederwucherblume*, *Grosse Kamillen* (D). *Amarella*, *Matricale*, *Morella*, *Partenio* (I).

عشبة برية معمرة فواحة العرف. ساقها حيداء فراء تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم. اوراقها رطلة لاقباسة التشرّج تطول

Nasua rufa (S).

Coati roux (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٤٨ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ١٩ سم. ثوبه الى الجُرّة الزاهية يمتد عند الظهر. رأسه ويحصر الى السمرة الرمّاد. ذنبه اسهب اللون ملطوق بالاسود || اعطانه شامسة الحدود تم جمع بلاد امريكا الجنوبية.

٢٢٩٠٧ - قُوطِي مَعْرُوف * ، قُوطِي مَستَجابِي ه

Nasua narica (S). *Coati ordinaire* (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم. ثوبه الى السمرة السوداء المراج. يطنه الى الصفرة. خطمه ابيض الطرف. جمراته قصيرة وقوية، تخالبه حادة خماسية || اعطانه فضيكة الارباح تشمل المكسيك وغواتمالا وهندوراس وكوستاريكا.

٢٢٩٠٨ - قُوتَحان ، مَستَعارَة ، صِبْوان

Pavillon de l'oreille (F). *Pavillon*, *Auricle* (E).

قُوتَحان الاذن وبمارة الاذن وصِبْوان الاذن، ثلاثة اسماء لمسي واحد.

٢٢٩٠٩ - قُوتَحان

Sillex meulier, *Pierre meulière* (F). *Millstone grit* (E).

حجر اسود اسفنجي شديد الصلابة تعمل منه الرسى.

٢٢٩١٠ - قُوتَحان هَر البَيع ، اطابِه

٢٢٩١١ - قُوتَحان

Caquet (F). *Cackle* (E).

صوت الدجاجة على البيض وصوت الارواح.

٢٢٩١٢ - قُوتَحان *

Pyrola (S). *Pyrole* (F). *Wintergreen* (E). *Wintergrün* (D). *Pirola* (I). جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القُوتَحانيات انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطائها بلاد الاقاليم المعتدلة. جلودها ليفية. سوفها مثبونة. اوراقها متعاقبة متفتحة بيضيه. شماريحها الزهرية متبسة. ازهارها سلبية التجميع يبيض اللون.

٢٢٩١٣ - قُوتَحانيات

Pyrolaceae (S). *Pyrolacées* (F). *Pyrolaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات اللقطين متحدة القللات. اجناسها وانواعها عديدة جميعها برية لا تنفع ثيابا. اشهرها القُوتَحان.

٢٢٩١٤ - قُوتَحَة طائر يَألف الخَربة من الاماكن

٢٢٩١٥ - قُوتَحان

Chrysanthemum (S). *Chrysanthème* (F). جنس نباتات عشبية حولية ويحول ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعها عديدة منها البرية والزرّيشية واللبية. سوفها فراء. اوراقها متعاقبة مقرفة. ازهارها رؤسية صفراء اللون او يبيض || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٢٩١٦ - قُوتَحان الحَقْل

Calendula arvensis (S). Souci des champs, Fleur de tous les mois (F). Field marigold, Gools (E). *Feldringelblume*, *Wilde Ringelblume* (D). *Calendula*, *Calta dei campi*, *Fiorancio* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول

Delphinapteridae (S). **قَوْسِيَّات * ٢٢٩٣٠**

Delphinapteridae (F). Delphinapteridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة متألمات الانسان
ورتبة الحفويات || انواعها المعروفة قليلة تتميز بقصر
المخاط وباندغام الزعانف الظهرية || أشهر أنواعها
وأعرجها القوي وباللوعة .

Otocoris (S). **قَوْسِيَس * ٢٢٩٣١**

Otocoris, Alouette de montagne (F). Otocoris (E).
جنس طير من فصيلة القديرات انواعه قليلة جميعها قاطعة
تجوب جبال البلاد الاسيوية والاروبية . تتميز بقصرها
الرأسية الفارقة التي تبدو كقرنين صغيرين . انواها متباينة
الألوان ، ظهورها الى الريدة الحمراء الجوان يطولها تجذيع
اسمر . بطونها الى الكهية البغراء . رؤوسها وانعناقها موشحة
بالاصفر || قوتها الحشرات والبزور البرية .

Koulam **قَوْلَان ٢٢٩٣٢**
هو فراء الهند ، نوع من حجر الوشش ، احليه .

قَوْلَد زَعْفَرَانِي * ٢٢٩٣٣

Colias croceus (S). Coliade safran, le Souci (F).
Colias croceus (E).

حشرة من فصيلة الكرنيبات حرشغيات الاجنحة . موطنها
المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشها واسعة
قوتها مشر الزهار . سربها تعيش على اوراق فصيلة
القرنيات الفراشية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٩ م .
يسطحها نحو ٤٨ م . رأسها اسمر اللون . عينها كبرتان .
زبانها صولجانيان . جوشها يرتقالي الحلقة الصدرية
الاولى ، اريد الثانية والثالثة . بطنها احمر اللون ، اسمر
المواج عند الذكر ، اللمع عند الانثى || ريشها الالامانيان
الى الصفار . الزعفراني تملو نقطة سوداء وجدة كستنية عند
الذكر ، سوداء اللون عند الانثى . وريشها الخلفيان الى
الصفار الزعفراني يتوسطه بقعة حمراء يطولها اطراف اسمر
عند الذكر ، اسمر عند الانثى || لها جيلان في الحول .
تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل
الثاني في آب . تسرح في النهار . تتناول بعد ظهورها
بسة اسابيع وتتمتع المكن مباحداً على نصال الوراق ||
السرعة تطول نحو ٤٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها
الى الخضار الاصفر يملو خطان جانبيين اغبران قاطبان
وعشرة اطواق كستنية وتغطي متباعد اسود واصفر . رأسها
اسود . مدنها ورواجها الى السمره || طول الاكمال الذي
يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في
الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً .

قَوْسَس ٢٢٩٣٤ العظم الناقى بين اذني الفرس .

قَوْسِيَّة ، قَوْسِيَّة ، قَوْسِيَّة ، نَاعِمَة ٢٢٩٣٥

Salvia (S). Saugé (F). Sage (E).
جنس نباتات برية ويزينية من فصيلة الشفويات . انواعه
نحو ٥٠٠ معظمها مجلي وبعضها جنبي . منها الحولي
والحول والمعمر . سوقها عشوية فزاحة سريعة الانحصاص .
اوراقها متقابلة معتقة . ازهارها متباينة الاشكال والاحجام
والالوان . لاقياسية التجميع والارتكاز || اعرف وأشهر
انواعها البرية والطبية والزيينية ما يتبع .

نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٥ سم . رؤوسها الزهرية صغيرة
القد قطرها نحو ٢ سم . لسانها متساوية الطول والمرض .
ضروبها عديدة منها الاصفر والابيض . والذهبي والبحري .

Milvago (S). **قَوْقَش ٢٢٩٢٢**

جنس طير من فصيلة الاشويديات ورتبة الجوارح . جسمه
ربع القد ، طوله نحو ٤٠ سم . رأسه مستطيل الشكل .
سقطه ضيق مستطيل وذنبه كذلك وهو مسرول الرفع ،
دقيق الخلب || موطنه البلاد الاسيوية والامريكية .
اشهر انواعه قوقش شيشيا .

قَوْقَش شِيْمَشِيْمَا ٢٢٩٢٣

Milvago chimachima (S). Chimachima (F).
طائر من القوقش ، طوله نحو ٤٠ سم . ثوبه الى الصهبة
الداكنة . قوادم سقطه موشحة بالابيض . منسره ازرق
اللون . رجلاه الى الخضار البحري . مخالبه دقيقة || موطنه
امريكا الجنوبية . يكثر في البرازيل والشيلي يعيش منفرداً
الا في زمن الرضع والحضانة || قوته الجيف والزحافات
والاناعي والحشرات على اختلاف اجناسها . اثناء تخضن
من ٥ الى ٦ بيضات .

Helix (S). Escargot (F). **قَوْق ٢٢٩٢٤**

هو الحلزون ، احليه .

Cantharellus (S). Chanterelle (F). **قَوْقَع ٢٢٩٢٥**

جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات . انواعه قليلة تتميز
باطراسها الخارجية الخامة المنتظمة التي تكثف كامل
الستلان || اعرف انواعه واشهرها الاصفر والبرتقالي .

قَوْقَع أَصْفَر * ٢٢٩٢٦

Cantharellus cibarius (S). Chanterelle comestible.
Girolle, G. comestible (F).

فطر مأكول كبير القد ، بوقي الشكل ، غني الصفار ،
تجن الصفحة . يتباعد الاطراس .

قَوْقَع بُرْتَقَالِي * ٢٢٩٢٧

Cantharellus coronilla (S). Chanterelle orangée,
Girolle orangée, Fausse girolle (F).

فطر مژد وقد يكون ساماً في بعض الاحيان . عسقلانه
اقل تحمواً من عسقلان القوقع الاصفر ، لونه الى البرتقالي .
اطراسه متقاربة الارتكاز حادة الاطراف .

Tetraoallus (S). **قَوْقَل ٢٢٩٢٨**

Tétragalle, T. du Caucase, T. Caspien (F).

Tetraoallus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الحجلليات وفصيلة
الطيوريات . كبير الجففة طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى
الطلحة الريداء الموشة بالاسود والاصهب . منقاره احذب
احسن . عنقه مطوق الزور ، قوادمه يبيض القواعد سود
الاطراف ، افضيكة كثيف الريش المستطيل المبيض بالصهبة
والسود . ريشه ومخالبه الى الريدة || موطنه الجبال الريفية
القليلة الاشجار . قوته الاشعاب والحبوب والعسقلان والجففور .
اثناء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها .

Narval (F). **قَوْقِي ٢٢٩٢٩**

هو حريش البحر ، احليه .



قَوْقَع اصفر



قَوْقَع برتقالي



قَوْسِيَس



قَوْلَد زعفراني

وفرورها خلية زياء. اوراقها بيضية الشكل، نصلها مدبب الطرف سنن الحافة. ازهارها كبيرة القند مستطيلة لونها الى الحمرة العافية، توجيهاً تربو على اكمامها نحو ست مرات ٥٥ ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢٩٤٣ - فُوَسَّةُ سَمَاجُوتِيَّة (S). *Salvia azurea*
(F). *Sauge azurée* (F).
جنية تريينية سروتيعة معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فروع خلية اللحاء. اوراقها سائبة مقطوعة، نصلها سنن الحافة اخضر اللون يطول من ٦ الى ٨ سم. ازهارها سبيلية التجميع، كبيرة، القند سمنجوني اللون. اكمامها لا قياسية الشكل والقند لونها الى الخضار المشرب الزرقاء ٥٥ ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

٢٢٩٤٤ - فُوَسَّةُ صِينِيَّة (S). *Salvia flava*
(F). *Sauge chinoise* (F).
جنية سروتيعة معمرة فروعها تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اعطائها الصين. ازهارها عنقودية التجميع، منشبة، كبيرة القند، تطول من ٦ الى ٧ سم. اكمامها الى الصفار الكبريتي يملو توضيح ارجواني ٥٥ ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٢٩٤٥ - فُوَسَّةُ هُمِيَّة (S). *Salvia verticillata*
(F). *Sauge verticillée* (F). Whorled blue flowered sage (E). *Quirlsalvei* (D). *Salvia verticillata* (I).
جنية تريينية معمرة. ساقها فروع تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها قليلة الشكل نصلها جامد الصفحة الخشنة الزياء. ازهارها ستيل التجميع. ازهارها نسيبة متعاقبة مستطيلة القند زرقاء اللون ٥٥ ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢٩٤٦ - فُوَسَّةُ هَيْفَةِ الْوَرَق (S). *Salvia angustifolia*
(F). *Sauge à feuilles étroites* (F).
جنية تريينية سروتيعة معمرة. ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها غسيفة النصل مدبية الاطراف تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ ازهارها سبيلية التجميع، زرقاء اللون، صغيرة القند ٥٥ ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٢٩٤٧ - فُوَسَّةُ فُصِيَّة (S). *Salvia argentea*
(F). *Sauge argentée* (F).
جنية تريينية محولة. ساقها فروع مزقية اللحاء تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها كبيرة القند نصلها خلي البشرة على صفحتيها يملو كأنه مطلي باللون الفضي. ازهارها متوسطة الحجم تطول نحو ٤ سم. لونها الى البياض العاجي يملو مزاج رودي. اكمامها غدية دقة ٥٥ ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٩٤٨ - فُوَسَّةُ قَاسِيَّة * ، كَتَفُ الدَّب (S). *Salvia sclarea*
(F). *Sauge sclairée*, *Sclarée*, *Toute-bonne*, *Orvale* (F). *Clary* (E). *Muskatsalvei* (D). *Salvia sclarea*, *Matrisalvia*, *Tuttasana* (I).
جنية برية مبذولة معمرة مسكية العرف الفواح. ساقها فروع تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها بسيطة بيضية الشكل، نصلها يطول من ٧ الى ١٨ سم. وموخل البشرة على صفحتيها. ازهارها وردية اللون، للكتي المراج. اكمامها مسننة شاذكة قليلة الخمل ٥٥ ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٢٩٤٩ - فُوَسَّةُ كَبِيرَةِ الزَّهَر (S). *Salvia patens*
(F). *Sauge à grandes fleurs* (F).
جنية تريينية معمرة. تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ساقها

٢٢٩٣٦ - فُوَسَّةُ الْجَبَل * (S). *Salvia sylvestris*
(F). *Sauge de montagne* (F). *Wild sage*, *Wood sage* (E). *Waldsalvei*, *Wilde Salvei* (D). *Salvia montana*, *S. salvatica* (I).
جنية برية طيبة مبذولة معمرة. ساقها زياء فروع تملو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها اعليلجية ضيقة، نصلها جامد الصفحة المسنة الخلية البشرة. ازهارها عنقودية التجميع زرقاء اللون بتفسيح المراج ٥٥ تكثر في الاراضي الجبلية المخداحة مناهلها الصحية المعوية عديدة ويقال انها تستعمل في علاجات الفالج.

٢٢٩٣٧ - فُوَسَّةُ الْمَرْوَج * (S). *Salvia pratensis*
(F). *Sauge des prés* (F).
جنية برية مبذولة معمرة. ساقها فروع زياء دقة تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقها بيضية الشكل، قليلة القاعدة. نصلها متعرج الصفحة، سنن الحافة يطول من ١٢ الى ١٧ سم. ازهارها عنقودية التجميع، زرقاء اللون، بتفسيح المراج، متوسطة القند ٥٥ ازهارها يحصل على دفتين الاول من ايار الى حزيران والثانية طوال الحريف.

٢٢٩٣٨ - فُوَسَّةُ بَهِيَّة (S). *Salvia splendens*
(F). *Sauge éclatante* (F).
جنية تريينية معمرة ترطب في المواقع الظليلة الرطبة. ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٧٥ سم. اوراقها بيضية مدبية نصلها رمل التسج الناعم، سنن الحافة، مائل البشرة على صفحتيها. ازهارها سبيلية التجميع، ياقوتية اللون تطول من ٥ الى ٧ سم. ٥٥ ازهارها يحصل على دفتين الاول في الصيف والثانية في الشتاء.

٢٢٩٣٩ - فُوَسَّةُ ثُنَائِيَّةُ الْوَلَن (S). *Salvia bicolor*
(F). *Sauge bicolor* (F).
جنية تريينية معمرة فروعها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مفرفة، مزقية، دقة. ازهارها ثنائية اللون. اقسامها العليا الى الزرقا البنفسجية المنشبة بالاصفر الذهبي، اقسامها السفلى الى البياض السوي. اكمامها متوسطة القند، غدية النصل. عنقودها الزهري يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ٥٥ ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٩٤٠ - فُوَسَّةُ حَبَشِيَّة ، اَلْيُفُوس (S). *Salvia aethiopica*
(F). *Sauge d'Ethiopie*, *Ethiopienne*. (F). *Ethiopian sage* (E). *Unigarische Salvei* (D). *Salvia di Candia*, *S. lanata* (I).
جنية برية طيبة معمرة. ساقها فروع زياء تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. وهي كتيقة الخمل والزغب السوي الشكل. اوراقها متوسطة الطول. نصلها خلي الصفحة. ازهارها صغيرة القند يضاء اللون. اكمامها مزقية عادمة التثنيق. توجيهاً يطول نحو ٢ سم. ٥٥ ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٢٩٤١ - فُوَسَّةُ دَقِيْقِيَّة (S). *Salvia glutinosa*
(F). *Sauge glutineuse* (F).
جنية مبذولة معمرة تكثر في الجبال. ساقها فروع تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها السفلى كبيرة القند تطول من ١٨ الى ٢٠ سم. نصلها غدي الصفحة. ازهارها تطول نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الجميلة. اكمامها انبوبية الشكل غدية البشرة ٥٥ ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٢٩٤٢ - فُوَسَّةُ رَشِيْقِيَّة (S). *Salvia elegans*
(F). *Sauge élégante* (F).
جنية تريينية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها



فُوَسَّةُ الْجَبَل



فُوَسَّةُ الْمَرْوَج



فُوَسَّةُ صَمِيَّة



فُوَسَّةُ قَاسِيَّة

٢٢٩٥٧ - قِيَاس ، تَقْطِيع ، انْتِفَاح Grasserie
مرض يصيب دودة القز في طورها النهائي أي قبل الصمود
على الشجر فينتفخ جسمها ويصفر لونها ويصبح جلدها
شفافاً فيفرز مائلاً غروباً يلوث الورق فتضخم أجسامها
الدخالية وتموت . ويمكن للديد المصاب بهذا المرض أن
ينسج سلجته ويتحول فيها إلى خادرة ولكنه لا يلبث أن
يموت فيصبح مادة فاسدة مائعة تعطب الفيلجة .

٢٢٩٥٨ - قِيَاس Jockey
هو الجوكي ، اطلبه .

٢٢٩٥٩ - قِيَاس Mesure

٢٢٩٦٠ - قِيَاس الارتفاع ، تَقْدِين Nivellement (F). Levelling (E).
تعيين الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الشيء .

٢٢٩٦١ - قِيَاس الأشعة Actinométrie (F).
Actinometry (E). هو قياس قوة الاشعة .

٢٢٩٦٢ - قِيَاس التحليل Acétimétrie (F).
Acetimetry (E). قياس درجة تحليل الخلل أي حوضته .

٢٢٩٦٣ - قِيَاس الحموضة Acidimétrie (F).
Acidimetry (E). قياس الحامض بجمدة من مائها .

٢٢٩٦٤ - قِيَاس الرطوبة ، رَزَاغَة Hygrométrie (F).
Hygrometry (E). قياس كمية بخار الماء في الجو .

٢٢٩٦٥ - قِيَاس السكر Saccharimétrie (F).
Saccharimetry (E). طريقة تعيين مقدار السكر في السوائل والعصارات السكرية

٢٢٩٦٦ - قِيَاس القلبي Alcalimétrie (F).
Alkalimetry (E). معرفة مقدار القلبي الحقيقي في البوتاس وغيره .

٢٢٩٦٧ - قِيَاس الكحول Alcoolométrie (F).
Alcoholometry (E). مجموعة الاساليب او الطرائق المستعملة لتحديد مقادير
الكحول الموجودة في السوائل او المشروبات الروحية .

٢٢٩٦٨ - قِيَاس املاح الماء Hydrotimétrie (F).
Hydrotimetry (E). قياس مقدار املاح الجصية الموجودة في الماء .

٢٢٩٦٩ - قِيَاس Mensuration (F).
Measurement (E). وسيلة استقصاء تستعمل في الطب وفي علم الطبايع والحيوان
لتحديد بعض القياسات وتقدير مواقع وأحجام بعض
الاعضاء .

٢٢٩٧٠ - قِيَاسِي ، تَنَاسُفِي Symétrique (F).
Symmetrical (E). نعت تعريفي يطلق على ما كان منسجم التركيب منسويه .

٢٢٩٧١ - قِيَاسِيَّة الشكل Actinomorphe (F).

فراء زباء . اوراقها رحيمة الشكل ، نصلها خشن اللمس
متجمع الحمار . ازهارها كبيرة القند زرقاء اللون . اكلها
تطول نحو ٢ سم . وهي خلية البشرة || ازهارها يستمر
من آب الى تشرين .

٢٢٩٥٠ - قُوْسَة كَرْدِيْنَالِيَّة
Salvia cardinalis, S. fulgens (S). Sauge cardinale (F).
جنية ترينينية معمرة . ساقها منتصبة فراء تملو من ١٠٠
الى ١٢٠ سم . اوراقها بيضية الشكل قليلة القاعدة طول
نحو ١٢ سم . نصلها جاهد الصفحة خلي البشرة الخسل
مدب الطرف . ازهارها كبيرة القند ارجوانية اللون سنبلية
التجميع تتعاقب على ابعاد متساوية قدرها نحو ٣ سم .
ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٢٩٥١ - قُوْسَة مُتَقَابِلَة الْأَزْهَار
Salvia oppositiflora (S). Sauge à fleurs opposées (F).
جنية برية وترينينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم .
اوراقها بيضيه مغنوية تطول من ٢ الى ٥ سم . وتعرض
من ١٥ الى ٤٠ سم . نصلها تحدد الصفحة ، يارز المروق .
ازهارها سنبلية التجميع ، متقابلة ، برتقالية اللون .
ازهارها يستمر طوال الخريف .

٢٢٩٥٢ - قُوْسَة مَخْزِنِيَّة * ، مَرِيْمِيَّة ،
أَسْفَلَس

Salvia officinalis (S).
Sauge officinale, Herbe sacrée, Thé de France, Thé
de Grèce (F). Common sage, Garden sage (E).
Echte Salbei, Garten Salbei, Salbey (D). Salvia offi-
cinalis, S. grande, S. cultivata (I).
جنية برية طيبة مبدولة معمرة . ساقها فراء زباء تملو من
٢٠ الى ٧٠ سم . اوراقها كاملة ، اهليجية ، اذينية للقاعدة .
نصلها خلي البشرة على صفحتي . ازهارها بتفصية اللون
تطول نحو ٣ سم . اكلها ملونة خلية || ازهارها يستمر
من حزيران الى تموز . وهي تستعمل استعمال الشاي . منافها
الصحية عديدة .

٢٢٩٥٣ - قُوْسَة مُشْدُوْلَة
Salvia hians (S).
Sauge béante (F).

جنية برية جبلية معمرة . ساقها فراء غدية لزجة تملو
من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها لا قياسية الشكل منها البيضية
والقلبية والرحيمة ، جميعها مستطيلة الاضلاع المملاتية التي يبلغ
طولها نحو ٢٥ سم . نصلها تطول من ١٣ الى ١٥ سم .
وهي سنبنة المائلة خلية البشرة . ازهارها الى الزرق الزاهية ،
توجهها يطول نحو ٤ سم . قسها العلوي منمق الى الخارج
يبدو كأنه مشدوق الشفة || ازهارها يستمر من تموز
الى آب .

٢٢٩٥٤ - قُوْسَة مُهَيَّجَة
في المردكوش الآخر ، اطلبه .

٢٢٩٥٥ - قُوْسَة يَابَانِيَّة
Slavia nipponica (S).
Sauge japonaise (F).
بجلة سبروتية فراء تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اسطها
اليابان . ساقها وفروها زباء القاء . اوراقها صغيرة القند
خلية النصل . ازهارها تسمية الانتكاز ، عقودية التجميع ،
مستطيلة الشكل ، صفراء اللون . اكلها رطلة فضفاضة
خلية البشرة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٩٥٦ - قُوْسِيَّة ، قُوْسَة Sauge (F).
هي القويسة . راجعها .



قُوْسَة مَخْزِنِيَّة

٢٢٩٧٢ - قِيَاسَةٌ، قَيْضٌ، مَقَابِضَةٌ

Troc (F), Truck (E).

هي الاستعاضة، من الاعمال الاقتصادية التجارية . ترتكز على مبادلة شيء بشيء .

٢٢٩٧٣ - قِيَاسٌ

القِيَاس من الزرع ما زرع في الخريف قبل المطر .

Bathymétrie (F).

Bathymetry (E).

٢٢٩٧٤ - قِيَاسَةٌ

سير عمق البحر .

Morphologie (F).

Morphology (E).

٢٢٩٧٥ - قِيَاسَةٌ

القِيَاسَة علم هيئة الاجسام الحية وتركيبها . وقد ترجموها بكلمة مورفولوجية .

Despotisme (F).

Despotism (E).

٢٢٩٧٦ - قِيَاسَةٌ

القِيَاسَة الحكم المطلق المستبد النافذ الارادة .

٢٢٩٧٧ - قِيَاسَةٌ، سَلْيَاقٌ، سَلْحَفَاةٌ

Lyre, Tortue, Testudo (F), Lyra, Testudo (E).

القِيَاسَة والسلياق والسلفعاة ثلاثة اسماء لكوكبة نجوم شمالية الموضع . مركزها بين الدجاجة والجاثي . وقد تسموها بالسلفعاة نظراً لشدته ببط حركتها || عدد نجومها ٢١ منها « النسر الواقع » الذي يعتبر من المرتبة الاولى وقد شبهته العرب بنسر ضم جناحيه الى نفسه كأنه واقع على شيء . وقدام النسر الواقع نجم صغير تسميه العرب « الاطفاار » علم الفلك يقولون ان النظام الشمسي يجذب ببطه نحو النسر الواقع .

Inscription (F).

Inscription, Registry (E).

٢٢٩٧٨ - قَيْدٌ، تَقْيِيدٌ

Poix (F).

٢٢٩٧٩ - قَيْرٌ

هو القطران ، اطبله .

Carat

٢٢٩٨٠ - قَيْرَاطٌ

حصة توازي واحداً من اربعة وعشرين . وهو في بعض المداين الكتيبة اخمصها الذهب يبر من مقدار الذهب الصنف . فالذهب حيار ٢٤ هو الذهب الخالص من كل جرم غريب والذهب حيار ١٨ مثلاً هو ما شمل ١٨ جزءاً من الذهب الخالص واربعة اجزاء من غير الذهب || والقيراط يساوي في وزن الحجاراة الكريمة كاللأس ما قدره :

في فرنسا ٠,٢٠٥٩ غرام

في انكلترا والمانيا ٠,٢٠٥٥ غرام

في البرازيل ٠,١٩٢٢ غرام

Quirat

٢٢٩٨١ - قَيْرَاطٌ

هو نصف دانق . كان وزن حبة غرنوب . والديرم اثنتا عشرة حبة . وهو في الحجاز ربع مسد دينار وفي العراق نصف عشرة || وعند استعماله في المساحة يعني عرض الامص || وقد جعلوه دستوراً في الحساب فقسوا التيجرات الى اربعة وعشرين قيراطاً .

Muscar botryoides (F).

٢٢٩٨٢ - قَيْسَمَةٌ

هي الخمل الجليل ، اطبله .

٢٢٩٨٣ - قَيْسَبٌ

نجر من الحمض . وهو شجرة تثبت عيوطاً من اصل واحد

ورقق قدر الذراع ونورها كنورة البنفسج يستوقد بسوقها رطبة . الواحدة قيسبة (السان) .

٢٢٩٨٤ - قَيْسُونٌ * ، قَيْصُومٌ اَنْثَى ، عَيْشَبَةٌ مُقَدَّسَةٌ

Santolina Chamaecyparissus (S). Santoline, Petit cypresse, Aurone femelle, Garde-robe (F). Lavender cotton, Ground cypress (E). Zypressenhellgenplanze, Zypressenkraut (D). Santolina, Abrotano femina, Crespolina (I).

نبات جنوبي عطري بري معمر من فصيلة المركبات . ساقه فروعاً تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه صغيرة القد ، ضيقة النصل المسن المزب البشرة . رؤوساته الزهرية فردية التجميع صغيرة القد صفراء اللون || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

Lampris

٢٢٩٨٥ - قَيْصَانَةٌ

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات . انواعها عديدة جميعها كبيرة القد ، بيضية الشكل ، صغيرة القم والخطم ، عذبة الاسنان ، زرقاء اللون ، وردية المواجه ، قصبية التيج . زعانفها الى الحمرة الفاتحة || اسماها بحار البلاد المحتلة الحرارة . اشهرها قيصانة البدر .

Lampris luna (S).

Lampris lune, Poisson lune, Chrysotosse (F). Moonfish, Opah (E).

٢٢٩٨٦ - قَيْصَانَةُ الْبَدْرِ *

نوع من القيصانة وهي سمكة بحرية غريبة الوجود في المتوسط طولها نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الزرقاء الوردية المواجه . جانباها مضيان بالفضة .

Pinna (S).

٢٢٩٨٧ - قَيْصَلٌ *

Pinne (F). Pinna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة الميديات . انواعها المعروفة متوسطة العدد ، بعضها من سمكيات الاراضي الجوفية والباشيرية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها كبيرة تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . وهي غروبية الشكل متساوية المصاريح البالغة التخديط العلوي تملوها زركمة وزعانف وخطوط متفرقة متباعدة الالوان . داخلها لؤلؤي المادة وكثيراً ما يوجد في تجويفها لؤلؤ ووردية اللون فاقرة الصنف ثمين . لبنيها غزير المادة يستعمل في صناعة القفازات والجوارب وغيرها ، لونه الى الصفار المذهب ، تسجيده ناعم الخط متين || تعيش لاصقة بالصخور على اعماق تراوح من ٤ الى ١٢ م . ملجئها الحياتي جماعي . مجموعاتها تعد من ٥٠ زوجاً الى اكثر من مئتين .

Verge du taureau (F).

Penis of a bull (E).

٢٢٩٨٨ - قَيْصُومٌ

قصب الثور .

٢٢٩٨٩ - قَيْصُومٌ * ، اَبْرُوطُونٌ ، رَيْحَانُ الْأَرْضِ ، مَسْكُ الْاِخِيْنِ

Artemisia abrotanum, Abrotanum (S). Aurone, Citronnelle (F). Abrotanum, Southern wood, Old man (E). Eberaute, Citronkraut (D). Abrotano, Citronella (I).

جنيبة عطرية طيبة برية معمرة من فصيلة المركبات الانبورية الزهر . عرفها فلاح مستحب . ازهارها ابطية الازرناز عذوقية التجميع ذهبية اللون عطرية العرف . ازهارها



قيسون



قيصانة البدر



قِصَل



قيصوم

المائية . بلايعيها عادة الحاطل القرنية والاسنان الشفوية .
لكنها مزودة بلواس مستطيلة تملو زوايا الاشداق ||
منها انواع تعيش وتتكاثر في الاكواريوم ، اخصها قيلم
لفيس (Xenopus laevis) .

٢٢٩٩٨ - قَيْم هو السنور .

٢٢٩٩٩ - قَيْعُثْن Cheilanthus (S). Chélanthe (F).
جنس سراسخ من البسباجيات . انواعه نحو ٣٠ اعطائها
مختلف مناطق العالم اخصها الاستوائية والحارة .

٢٣٠٠٠ - قَيْفُكَلْتَشْس Céphalanthé (F).
هو الرأسية ، اطليه .

٢٣٠٠١ - قَيْفَاوُس Cephé (F). Cephus (E).

كوكبة نجوم شمالية الموقع . مركزها بين الدجاجة والتنين
وذات الكربي . عدد نجومها ٢١ || والعرب تسمي النجم
الذي على الصدر « النثرة » والذي على الكتف الايمن
« الفرقة » . والذاتة التي تحصل من نجوم ذراعها وما هو
خارج ضبا « القدر » . والذي على الرجل اليسرى يدعى
« الراعي » . والنجوم الصغار الموجودة بين الرجلين تدعى
« الاغنام » .

٢٣٠٠٢ - قَيْشَة Physionomie (F).
Physiognomy (E).

هي مجموعة التقاطيع والملامح والقبسات الفارقة التي تميز بين
شيء وبشيء .

٢٣٠٠٣ - قَيْشُوع
بنت ذات ثمرة في قرون وهي ذات ورق وغصنة تثبت بكل
مكان (السان) .

٢٣٠٠٤ - قَيْقُ * ، زُرْيَاب Garrulus lanceolatus (S). Geai lanceolé (F). Jay (E).
طائر من الزرياب وفصيلة الغرابيات . يألف القفص
فيقتبس الاصوات ويردها || وهو طائر مؤذ ضار .
شكله كالبومة ، جسمه يطول نحو ٣٥ سم . اصدا الثوب .
اسود الرأس . ازرق الزمكي . يجزع الجناحين والذنب
بخطوط متراكبة السواد والزرقة والبياض || قوته الحبوب
والثآليل البانعة ويختلف انواع الصانير الصغيرة ويضعها
وفرأخها والمظا والحشرات الكبيرة والصغيرة || يدن في
الاشجار الحرجية الظليلة ، اثناء تضع من ٤ الى ٦ بيضات
تحضنها ١٦ يوما .

٢٣٠٠٥ - قَيْب هو البوق ، اطليه .

٢٣٠٠٦ - قَيْب ، أَسْتَدَان Acer (S).
Erable (F). Maple-tree (E).

جنس اشجار حرجية ويزينة من فصيلة القيقبيات . انواعه
نحو ١٨٠ منها الكبيرة القد والصغيرة . جميعها حسنة
الهيكال والقالب . سكرية العصارة . اوراقها متعاقبة ،
لا قياسية الشكل ، معظمها عايل وبعضها ابيد . ازهارها
مختلفة التجميع والالوان ، غزيرة الرحيق ، يجربها النحل .
ثمراها جناحية مركبة من جناتيتين ملتصقتين || اعرف
انداه ، اشدها ما يتد .

يدوم من تموز الى آب . ثمارها لينة صغيرة تشبه حب
الآس ، طعمها مر ، رائحتها ذكية . يقال انها مضادة
للحيات وناغمة تخفف اوجاع الصدر وضيق النفس
والمفاصل . بينهم من قال انها من المقويات وقد تستعمل
ايضا كطاردة للديدان || اما اسم مسك الجن فيطلق
على عدة نباتات اخصها القيصوم والشفرور والزريرج والورام
وحشيشة الريح .

٢٢٩٩٠ - قَيْصُوم أنثى Santoline (F).
هو القنيسون ، اطليه .

٢٢٩٩١ - قَيْصُوم جبكي Achillée suave (F).
هو الاخيلا المنشدة ، اطليه .

٢٢٩٩٢ - قَيْصُوم طَبِي Armoise santonique (F).
هو الشج الخراساني ، اطليه .

٢٢٩٩٣ - قَيْصُوم كافوري * ، مُسِيكَة Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée, A. dorée (F). Gold wormwood, Rock wormwood (E).
Wermut (D). Assenzio salvatico (I).
نبات عشبي طيب ري من المركبات الانبوية الزهر .
سناه فرعاء تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه معنقة صغيرة
القد ، غدية النصل . رؤسياته الزهرية خلية القناب ،
ذعية اللون ، عفوفية التجميع ، كافورية العرف المستحب .
ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٢٩٩٤ - قَيْصُ Coquille d'oeuf (F). Egg-shell (E).
القشرة العليا اي الخارجية البايسة على البيفة اما القشرة
الداخلية فتدعى القرق .

٢٢٩٩٥ - قَيْطَالِيَا Noisetier de Turquie (F).
هي البندق التركي ، اطليه .

٢٢٩٩٦ - قَيْطَس ، قَيْطُوس Baleine (F).
Cetus (E).

كوكبة نجوم جنوبية تشرق على خط الاستواء وتمتد
جنوبي برج الحمل وبرج الحوت . وهي على صورة حيوان
يجري مقدمه في ناحية المشرق ويؤخره في ناحية المغرب ||
عدد نجومها ١٠٢ . والعرب تسمي الكواكب التي في الرأس
« الكفت الجذماء » ونها تير يدعى « المنقب » . وتسمى
الحسة التي في اواسط البدن « النعامات » . والتي على اصل
الذنب « النظام » . والتي على الشعبة الجنوبية من الذنب
« الصفدع الثاني » . والتي على الشعبة الشمالية « ذنب قيطس
الثاني » . وفي عتق قيطس نجم يدعى « الاعصوبة » او
« اعصوبة قيطس » لان حجمه يتحول في اثناء مداره من
المرئية الثانية الى الثامنة ولان لونه يتحول ايضا من الاحمر
الى الاصفر .

٢٢٩٩٧ - قَيْطَم * Xenopus (S).
Dactylète (F). Xenopus (E).

جنس ضفادع من فصيلة البباليات عاداته اللسان .
انواعه المعروفة قليلة العدد مهدا بعض المياه الافريقية
اخصها مياه المناطق الاستوائية || اجسامها صغيرة تطول
١٠ الى ١٠ سم . رؤوسها مستطيلة . عيونها عادية
الاجفان . ذكرها العليا عادية الانسان . اصابع قوائمها
الامامية عادية الخطاب اما الخلفية تكاملة الخطاب والثلاث
الداخلية منها منفلوطة الاطراف باغاد قرنية المادة تبدو
كالحبال || انشأ تدأ نحو ٢٠٠ دصلة تلصقا بالثانات



قيصوم كافوري



قيلم



قين

صفحة ثلاثية العروق ، بحرية اللون ، زيتية المواج .
أزهارها خضراء اللون . تنور في شهر شباط .

٢٣٠١٣ - قَيْبٌ تَتَرِي Acer tataricum (S). Erable de Tartarie (F).

شجرة حرجية سر بوتية تملو نحو ٨ أمتار . مهدا آسية الصغرى ، أوراقها عابلة منقطة . نصلها بيضي الشكل ، قلبى القاعدة ، مدب الطرف ، سن الحافة ، أغرب الصفحة السفلى ، باغت الخضار . أزهارها عذقية التجميع ، خاسية البتلات البيض جناحياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .



قَيْبٌ حَبَرِي

٢٣٠١٤ - قَيْبٌ ثَلَاثِي الْأَجْزَاءِ Acer trifidum (S). Erable trifide (F).

شجرة حرجية وُربينية جادة تملو نحو ٨ أمتار . مهدا اليابان . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفصيص . نصلها أسفني الشكل لامع الصفحة الخضراء . أزهارها عذقية التجميع ، فسقية اللون ، جناحياتها متصالة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١٥ - قَيْبٌ جِيمِيزِي * جَرْمَشَق Acer pseudoplatanus (S). Erable sycomore, Faux platane, Grand érable (F). Great maple, Sycamore maple, Mock-plane (E). Bergahorn, Falscher platanus (D). Acero liso, A. sicomoro, A. fico, Mollacero (I).

شجرة حرجية جبلية مبذولة تملو من ١٥ إلى ٤٠ م . أوراقها عابلة منقطة ، ثلاثية أو خاسية التفصيص ، تقوّل وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها مائل البشرة على صفحته وهو أخضر العليا بحري السفلى يتشعب ثم يحمر في الخريف . أزهارها عقودية التجميع متدلية . جناحياتها متباعدة المشافر ، حادة الزوايا . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ حَقْلِي

٢٣٠١٦ - قَيْبٌ حَقْلِي * شَجَرَةُ الرَّبِّ Acer campestre (S). Erable champêtre, Auzevole (F). Bird's tongue, Dog oak, Maple tree, Master tree (E). Angerbaum, Feldahorn, Maszholder (D). Acero campestre, Averliello, Ceppolo (I).

شجرة سر بوتية مبذولة تملو من ١٥ إلى ٢٠ م . ساقها مغلقة اللحم . أوراقها عابلة منقطة صغيرة اللد ، ثلاثية أو خاسية التفصيص . نصلها جابد الصفحة ، مبهر الحمل ، أخضر اللون . أزهارها عذقية التجميع خضراء اللون . جناحياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .

٢٣٠١٧ - قَيْبٌ دَلِيسِي * Acer platanoides (S). Erable plane, E. platane, Plane (F). Norway maple (E). Spitzahorn, Norwegischer ahorn (D). Acero platano, Amilacero, Acero riccio (I).

شجرة حرجية مبذولة تملو من ١٥ إلى ٣٠ م . أعطاها البلاد الباردة . ساقها ملساء ، عصارتها لبينة . أوراقها ثلاثية التفصيص تقوّل من ٨ إلى ١٨ سم . وتعرض من ٩ إلى ٢٥ م . نصلها مائل البشرة مدب الطرف . أزهارها عذقية التجميع صفراء اللون . جناحياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ دَلِيسِي

٢٣٠١٨ - قَيْبٌ رَاحِي Acer palmatum, A. polymorphum (S). Erable palmé (F).

شجرة حرجية وُربينية تنفر من الآرية الكلسية . مهدا الصين واليابان . تملو من ٥ إلى ١٥ م . أوراقها عابلة ،

٢٣٠١٧ - قَيْبٌ أَيْضٌ Acer saccharinum, A. dasycarpum (S). Erable blanc, E. tendre (F). Silver leaved maple, White maple (E). Silber-ahorn, Weissler Ahorn (D). Acero bianco (I).

شجرة سر بوتية حرجية وُربينية تملو من ١٠ إلى ٣٠ م . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خاسية التفصيص . نصلها يعقوّل من ٦ إلى ١٥ سم . ويعرض من ٥ إلى ١٣ صفته العليا باغة الخضار ، صفته السفلى خلية البشرة ، غبراء اللون ، بيضاء المواج . أزهارها عذقية التجميع ، صفراء اللون ، عادمة البتلات . جناحياتها كبيرة اللد متقاربة المشافر طولها يراوح من ٥ إلى ٧ سم . تنور من شباط إلى نيسان .

٢٣٠١٨ - قَيْبٌ أَحْمَرُ Acer rubrum (S). Erable rouge, E. femelle (F). Red flowered maple, Swamp maple (E). Roter ahorn, Virginischer ahorn (D). Acero rosso (I).

شجرة سر بوتية حرجية وُربينية ، مهدا أمريكا الشمالية . تملو من ١٠ إلى ٢٥ م . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خاسية التفصيص . نصلها يعقوّل ويعرض من ٥ إلى ١٥ سم . صفته العليا مائلة البشرة ، زاهية الخضار ، صفته السفلى خلية البشرة ، أزهارها عذقية التجميع حراء اللون . جناحياتها حر الأهن ، متباعدة المشافر . تنور من آذار إلى نيسان .

٢٣٠١٩ - قَيْبٌ أُرِيدُ Acer griseum (S). Erable gris (F).

شجرة حرجية وُربينية مهدا الصين . تملو من ١٠ إلى ١٢ م . أوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . نصلها بيضي الشكل ، ذرب الطرف يعقوّل من ٥ إلى ٦ سم . وهو مسن الحافة ، خلى الصفحة السفلى . أزهارها متدلية ثلاثية أو خاسية التجميع ، مهدية التوجعات والبتلات . جناحياتها خلية البشرة متباعدة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠٢٠ - قَيْبٌ الْيَابَانُ Acer japonicum (S). Erable du Japon (F).

شجرة وُربينية سر بوتية مهدا اليابان . تملو نحو ٨ أمتار . ساقها ملساء اللحم ، فروعها مستطيلة ، مستدقة ، جؤوية اللون . أوراقها عابلة منقطة خاسية أو سباعية أو تساعية التفصيص . نصلها مسن الحافة ، مائل البشرة ، أخضر اللون ، مذهب المواج ، يحمر في الخريف . أزهارها عذقية التجميع حراء اللون . جناحياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠٢١ - قَيْبٌ أَمْرَطُ Acer glabrum (S). Erable glabre (F).

شجرة حرجية جادة تملو من ٧ إلى ١٣ م . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفصيص ، عنها جؤوي اللون ، نصلها يعقوّل ثلاثية التفصيص . صفته العليا لامة البشرة شديدة الخضار ، صفته السفلى خلية غبراء . أزهارها عذقية التجميع . جناحياتها متباعدة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠٢٢ - قَيْبٌ إِهْلِيلِي الرَّقْ Acer oblongum (S). Erable à feuilles oblongues (F).

شجرة حرجية سر بوتية تملو نحو ١٨ م . مهدا الصين . أوراقها عابلة منقطة . نصلها عادم التفصيص ، إهليلجي الشكل يعقوّل من ١٥ إلى ٢٠ سم . ويعرض من ٥ إلى ٦ سم .

ويرى من ٩ إلى ١٢ سم. وهو مسن الحافة، خلى الصفحة السفلى، يصفر ويحمر في الخريف. جناحيها مستطيلة الاذن متوازية المشافر. تنور في نيسان.

٢٣٠٢٥ - قَيْبُ كَبِيرِ الْوَرَقِ

Acer macrophyllum (S). Erable à grandes feuilles (F).
شجرة حرجية جاذبة تملو من ١٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابطة منقطة خاسية أو سباعية التفصيص طول نحو ٣٥ سم. وتعرض نحو ٢٠ نصلها لامع الصفحة العليا الخضراء اللون، أزغب السفلى. أزهارها عتقودية التجميع، متدلية، فصلها وامدنيها خلية البشرة. جناحيها متوازية المشافر الزباء. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٦ - قَيْبُ مَرْنَانِي الْوَرَقِ

Acer negundo, *Negundo fraxinifolium* (S). Erable à feuilles de frêne (F).
شجرة حرجية وريينية مهدا امريكة الثالية تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أوراقها مركبة وريية التجميع. وريقاتها خس اوسع، نصلها لا قياسية الشكل طول من ٥ إلى ١٣ سم. لونها إلى الخضار الجميل اللامع يملوه توشيح اصفر وايض. أزهارها عنائيد مستطيلة متدلية. جناحيها متساوية المشافر الدقيقة المستعرضة. تنور في نيسان.

٢٣٠٢٧ - قَيْبُ مُسْتَدِيرِ الْوَرَقِ

Acer circinnatum (S). Erable à feuilles rondes (F).
شجرة حرجية وريينية تملو من ٨ إلى ١٢ م. فرصها وافنانها إلى الجؤوة. أوراقها عابطة، منقطة، ثلاثية التفصيص. نصلها مستدير الشكل قطره نحو ١٠ سم. صفته خضراء اللون، خلية العروق، مسنة الحافة، نصلها في الخريف. أزهارها عتقودية التجميع، متدلية. فصلها إلى الحمرة. بتلاتها إلى البياض. جناحيها صغيرة القد شبه مستديرة. تنور في أيار.

٢٣٠٢٨ - قَيْبُ مِلْوَان

Acer opalus (S). Erable opale, Duret, Ayale (F).
شجرة سرروتية مبذولة تملو من ٨ إلى ٢٠ م. أوراقها عابطة ثلاثية التفصيص. نصلها يضيي الشكل، مستدير الطرف، مسن الحافة، بارز العروق المتتاعبة. أزهارها عتقودية التجميع. جناحيها متباعدة المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٩ - قَيْبُ مِيَابِي

Acer miyabei (S). Erable de Miyabe (F).
شجرة حرجية تملو نحو ١٢ م. مهدا اليابان. ساقها مغلقة اللحاء. أوراقها عابطة ثلاثية التفصيص. نصلها اخضر الصفحة العليا، خلى السفلى، باهت العروق. أزهارها عتقودية التجميع. جناحيها خلية البشرة. تنور من أيار إلى حزيران.

٢٣٠٣٠ - قَبَائِيَت، أَسْتَدَائِيَت

Aceraceae (S). *Acéracées*, *Acérinées* (F).
Aceraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين كثيرة القعالات. اجناسها وانواعها عديدة اشهرها القيقب || جميع نباتاتها شجرية. اغشائها صناعية مرموقة يكثر فيها اللون الاحمر.

منقطة، خاسية أو سباعية التفصيص. نصلها جامد الصفحة، راسي الشكل، اخضر اللون، مذهب الملاج. أزهارها عتقودية التجميع حراء اللون. تنور في أيار.

٢٣٠١٩ - قَيْبُ رُبَاعِي الْأَجْزَاءِ

Acer tetramerum (S). Erable tétramère (F).
شجرة حرجية سرروتية تملو من ٥ إلى ٨ امتار. مهدا الصين. أوراقها عابطة منقطة بيضية الشكل. نصلها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٣ إلى ٥ صفته السفلى خلية البشرة، خاسية العروق البارزة، حثاره مزدوج التسنين. أزهارها عتقودية التجميع، رباعية الاجزاء والبتلات اخضر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٠ - قَيْبُ زُغُرُوْرِي الْوَرَقِ

Acer crataegifolium (S). Erable à feuilles d'aulépine (F).
شجرة حرجية تملو نحو ٨ امتار. مهدا اليابان. أوراقها عابطة منقطة. نصلها ثلاثي التفصيص مسن الحافة يطول من ٤ إلى ٨ سم. ويعرض من ٣ إلى ٦ سم. وهو اخضر الصفحة العليا، يحمر السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها عتقودية التجميع لونها إلى الخضار الفتتي. جناحيها مستقيمة الزوايا. تنور في أيار.

٢٣٠٢١ - قَيْبُ سَكْرِي

Acer saccharum, *A. barbatum* (S). Erable à sucre, E. dur (F). Hard-maple, Rock-maple, Sugar-maple (E). Zuckerahorn, Zucker massholder (D). Acero zucherino, A. del Canadie (I).
شجرة سرروتية داتحة تملو من ٣٠ إلى ٤٠ م. ساقها ملساء، عصارتها غزيرة المادة السكرية. أوراقها عابطة، منقطة، ثلاثية التفصيص. تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. وتعرض من ١١ إلى ١٦. نصلها مائل البشرة، مدبب الطرف، اخضر الصفحة العليا، يحمر السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها عتقودية التجميع، غبراء اللون. جناحيها انقية المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٢ - قَيْبُ سَلَمِي الْوَرَقِ

Acer clusifolium (S). Erable à feuilles de cissus (F).
شجرة سرروتية وريينية مهدا اليابان تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ م. أوراقها مركبة، وريية التجميع، لاقياسية الحد. وريقاتها غرطية الشكل تطول نحو ٨ سم. نصلها مائل البشرة على صفحته، مسن الحافة. أزهارها خلية، رباعية الفصل والبتلات. جناحيها صغيرة القد، متباعدة المشافر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٣ - قَيْبُ شَرْمِي الْوَرَقِ

Acer caprinifolium (S). Erable à feuilles de charme (F).
شجرة حرجية سرروتية تملو من ٥ إلى ٨ امتار. مهدا اليابان. أوراقها عابطة منقطة. نصلها لامع الصفحة المحبونة المسنة الحافة، بارز العروق التي يراوح عددها من ١٦ إلى ٢٠ زوجاً. أزهارها عتقودية التجميع متدلية، رباعية البتلات المخضر. جناحيها مستقيمة المشافر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٤ - قَيْبُ شَيْطَانِي

Acer diabolicum (S). Erable diabolique (F).
شجرة جاذبة مهدا اليابان تملو من ٦ إلى ١٠ امتار. أوراقها عابطة، منقطة، ثلاثية التفصيص. نصلها يطول

Hématocèle (F).

Haematocèle (E).

ورم يسببه ارتشاح الدم في بنس اجزاء الجسم .

Despotique (F). Despotie (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو استبدادي او تعسفي .
كفوك سلطة قبلية او حاكم قبلي .

Curateur (F).

Guardian, Trustee (E).

هو الذي يمين لادارة مال المحجور عليه او لادارة شؤون القاصر .

Valeur (F). Value (E).

هي من الشيء او قدره اي ما يقوم مقامه . ج قيم . والقيمة تستعمل في تمايز عديدة . اشهر صيغها ما يلي :

Valeur locative (F).

قيمة مصرحة ، قيمة مبنية

Valeur vénale (F).

قيمة متعامل بها

Valeur agréée (F).

قيمة معتمدة

Valeur fournie (F).

قيمة مقدمة

Valeur mobilière (F).

قيمة منقولة

Coquillière (F). Conchiferous (E). قِيقَة

قشرة البيفة الرقيقة الداخلية تغلف البياض تحت القيش ج قيق .

Taon des bœufs (F). Ox-fly (E). قِيقُوبَة

ذبابة مؤذية من الثعرايت . اناها تلسع البقر ولا تعف عن الخليل والحصير ، راجع نكرة البقر .

Cuculidae (S).

Cuculidés, Cuculés (F). Cuculidae (E).

فصيلة طير من رتبة المنسلقات . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى ثمان عائل ، اشهرها البوقايات . اصطلحها العالم . تألف الاحراج الكثيفة . معظمها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الحبوب والمشي . قوتها الحشرات والديدان وهي لا تحسن بيضها ولا ترق فراخها .

Despote (F). Despot (E). قِيسِل

الذي الحاكم المطلق التصرف المستبد .

Hydrocèle (F). قِيسَة

هي الأذرة ، اهلها .

جدول ١

القيمة الغذائية في لتر واحد من التمار المدرجة ادناه

قيمة غذائية

| النوع | خلاصة جافة غ | حوامض ^(١) غ | سكر منحل غ | سكرز غ | رمان غ | بروتين ٦,٢٥ × ن غ | سعة (وحدة حرارية) |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|
| اجاص | ١٧٢ | ٢,٧ | ٩٠ | ١٣ | ٣,٥ | ٣,٥ | ٥٦٧ |
| اناس | ١٦٠ | ٦,٧ | ٣٥ | ٧٥ | ٥,٢ | ٤,٣ | ٥٩٥ |
| برتقال | ١٥٧ | ١٣,٥ | ٦٠ | ٢٥ | ٤,٨ | ٧,٠ | ٥٨٠ |
| نفاخ | ١٦١ | ٦,٥ | ٨٣ | ١٦ | ٤,١ | ٣,٧ | ٥٧٠ |
| تين | ٢١٥ | ٠ | ١٥٨ | ٠ | ٧,١ | ١١,٥ | ٧٤٥ |
| خوخ | ١٩٦ | ٩,٥ | ٧٥ | ١٨ | ٥,١ | ٦,٩ | ٧١٨ |
| خوخ زركلود | ١٨١ | ١٢,٥ | ٦٥ | ٣٦ | ٦,٠ | ٦,٥ | ٧٠٤ |
| دراق | ١٧٣ | ٨,١ | ٣٥ | ٤٢ | ٥,٨ | ٦,٦ | ٦٠٨ |
| سفرجل | ١٨١ | ٩,٣ | ٦٧ | ٦ | ٥,٨ | ٤,٨ | ٥٨٥ |
| شمشون توت | ١٥٠ | ٨,٦ | ٥٥ | ٤,٧ | ٥,٠ | ٩,٦ | ٤١١ |
| شليك (فراولة) | ١٤٦ | ١٨,٤ | ٥١ | ٧ | ٧,٤ | ١٠,٦ | ٤٣٣ |
| عنب | ٢٠٩ | ٧,٧ | ١٥٠ | ٠ | ٤,٨ | ٥,٩ | ٧٥٧ |
| قمام احمر | ١٦٣ | ١٩,٨ | ٨٢ | ٥,٣ | ٢,٦ | ٥,٩ | ٥٦٠ |
| قمام آسي | ١٦٤ | ٨,٥ | ٥٤ | ٢,٢ | ٣,٧ | ٦,٨ | ٥٢٧ |
| كرز | ١٨٣ | ٦,٨ | ١٠١ | ٥,٧ | ٤,٩ | ٧,١ | ٦٨١ |
| كشمش شائك | ١٤٥ | ١٩,٠ | ٥٥ | ٤,٨ | ٤,٩ | ٧,٧ | ٤٤٥ |
| كشمش عقودي | ١٦٢ | ٢٣,٠ | ٥٠ | ٢,٤ | ٦,٦ | ١١,٢ | ٤٤٠ |
| ليون حامض | ١٧٤ | ٥٤,٠ | ٣٠ | ٣٠,٠ | ٥,٦ | ٦,٣ | ٥٧٥ |
| شمش | ١٤٨ | ١٢,٧ | ٣١ | ٣٦,٠ | ٦,٧ | ٨,٠ | ٥١٦ |
| موز | ٢٦٢ | ٣,٨ | ١٠٨ | ٨٩,٠ | ٨,٩ | ١١,٣ | ٩٧٠ |

(١) الحوامض التي تدل في تركيب التمار عديدة . لا مجال للدكرها الزائدة . اشبعها التفاحي ثم الليون ثم الطرطي الموجود في العنب .

جدول ٢
القيمة الغذائية في أشهر البقول وفي بعض الثمار الجافة^(١)

| النوع | ماء % | مواد معدنية % | بروتين % | مواد دسمة % | غلويسيد % | عدد السعرات في كيلوغرام واحد |
|----------------|----------|------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| بازيلاً خضراء | ٧٨ | ٠,٨٠ | ٤,٧٠ | ٠,٣٠ | ١٠,٤٠ | ٦٥٠ |
| بصل | ٨٨ | ٠,٦٠ | ٠,٦٠ | ٠,٠٧ | ٦,٢٠ | ٢٨٩ |
| بطاطا | ٧٥ | ١,٠٠ | ١,٥٢ | ٠,٠٧ | ٢٠,٧٠ | ٩١٨ |
| بنلوره | ٩٣ | ٠,٥٠ | ٠,٧٠ | ٠ | ٢,٢٠ | ٢١١ |
| ثوم | ٦٤ | ١,٤٠ | ٣,٤٠ | ٠,٠٣ | ١٧,٤٠ | ٨٥٤ |
| جزر | ٨٨ | ٠,٧٠ | ٠,٧٧ | ٠,١٣ | ٦,٩٠ | ٣٢٥ |
| حمص (جاف) | ١٤ | ٢,٨٠ | ١٦,٣٠ | ٠,٦٠ | ٤٤,٧٠ | ٢٥٦٠ |
| خرشوف | ٨٦ | ١,٣٠ | ١,٣٠ | ٠,٠٥ | ٥,٥٠ | ٢٨١ |
| خس | ٩٢ | ١,٠٠ | ٠,٩٠ | ٠,٣٢ | ٣,٠٠ | ١٨٩ |
| خيار | ٩٥ | ٠,٤٠ | ٠,٤٥ | ٠,١٠ | ٠,٧٠ | ٥٩ |
| دبق زراعي | ٨٠ | ١,٠٠ | ٠,٥٠ | ٠,٢٠ | ٩,٨٠ | ٤٤٥ |
| سبانخ | ٩٣ | ١,٩٠ | ١,١٠ | ٠,١٠ | ١,١٠ | ١٠٧ |
| سرفل لقي | ٦٥ | ١,٧٠ | ١,٩٥ | ٠,١٦ | ١٨,٤٠ | ٨٣٨ |
| سلق | ٩٢ | ١,٦٠ | ١,٢٠ | ٠,٢٠ | ١,٩٠ | ١٤٧ |
| شمام | ٩١ | ٠,٥٠ | ٠,٦٠ | ٠,٠٨ | ٥,٣٠ | ٢٥٠ |
| شمندر سكري | ٨٠ | ١,٠٠ | ١,٠٠ | ٠,١٠ | ١٥,٤٠ | ٦٧٩ |
| سوجا (جافة) | ١٠,٢٠ | ٥,٢٠ | ٢٣,٦٠ | ١٧,٢٠ | ٢٣,٠٠ | ٣٥١٤ |
| عدس (جاف) | ١٢,١٠ | ٣,٠٠ | ١٨,١٠ | ٠,٦٠ | ٤٤,٦٠ | ٢١٣٠ |
| فاصوليا (جافة) | ١٤ | ٣,١٠ | ١٨,٠٠ | ٠,٥٠ | ٤٠,٢٠ | ٢٤٣٠ |
| فجل | ٩٣ | ٠,٧٠ | ٠,٩٠ | ٠,١٠ | ٣,٢٠ | ١٧٦ |
| فست عبيد | ٧,٥٠ | ٢,٤٠ | ١٩,٣٠ | ٤٠,٠٠ | ١٣,٢٠ | ٥٠٦٠ |
| فول أخضر | ٨٢ | ٠,٨٠ | ٤,٣٠ | ٠,٢٠ | ٧,٤٠ | ٥٠٢ |
| قرع | ٩٠ | ٠,٧٠ | ٠,٥٠ | ٠,٠٧ | ٤,٢٠ | ٢٠٢ |
| قرنيط | ٩٤ | ٠,٨٠ | ١,٢٠ | ٠,١٧ | ٣,٠٠ | ١٨٩ |
| كرات أندلسي | ٧٥ | ٠,٥٠ | ١,٣٠ | ٠,٠٥ | ١٧,٠٠ | ٧٥٥ |
| كرات معروف | ٨٨ | ١,٢٠ | ١,٤٠ | ٠,١٥ | ٤,٣٠ | ٢٤٩ |
| كرنس | ٩٠ | ١,٤٠ | ٠,٥٠ | ٠,١٧ | ٤,٣٠ | ٢١٠ |
| كرنب | ٩٠ | ٠,٧٠ | ٠,٦٠ | ٠,١٠ | ٤,٠٠ | ٢٠٠ |
| لفت | ٨٩ | ٠,٧٠ | ٠,٧٠ | ٠,١٠ | ٤,٩٠ | ٢٣٦ |
| لوبيا خضراء | ٨٩ | ١,٧٠ | ١,٣٠ | ٠,١٠ | ٤,٢٠ | ٢٣٤ |
| ملفوف | ٨٠ | ١,٥٠ | ٢,٤٠ | ٠,٤٥ | ٦,٨٠ | ٤٢٠ |
| هليون | ٩٤ | ٠,٦٠ | ١,٠٠ | ٠,٠٧ | ١,٦٠ | ١١٠ |
| هندب (طرخشقون) | ٨٥ | ٢,٠٠ | ٢,٠٠ | ٠,٤٠ | ٦,٣٠ | ٢٥٠ |
| يندق | ٧,١٠ | ٢,٥٠ | ١٢,٢٠ | ٥٦,٣٠ | ٦,١٠ | ٦٠٢٦ |
| جوز | ٧,٢٠ | ١,٦٠ | ١١,٧٠ | ٥٢,٢٠ | ١١,٠٠ | ٥٨٢٤ |
| فستق | ٧,٠٠ | ٢,٠٠ | ١٣,٥٠ | ٥٠,٢٠ | ١٠,٥٠ | ٥٧٦٠ |
| لوز | ٦,٣٠ | ٢,٣٠ | ١٥,٠٠ | ٤٧,٨٠ | ١١,٢٠ | ٥٥٢٠ |
| كستناء | ٤٧,٥٠ | ٢,٠٠ | ٤,٣٠ | ٣,٧٠ | ٣٣,٥٠ | ١٩٠٠ |

(١) القيم الغذائية المدونة في الجدولين ١ و ٢ هي قيم مريئة لا تدخل فيها القشور والبذور.

مستطيلة ذرية . اثوابها متراكبة الالوان || تألف الغابات ويجاري الماء . قوتها العطاء والحشرات اخصها الجراد . تنش في تجاويف الاشجار . اناثها تضع من ٣ الى ٤ بيضات مستديرة الشكل تحضنها بمناوبة الذكور .

٢٣٠٤٦ - قِيَمَةُ الْجَبَلِ (F). Cuon de montagne
حيوان مفترس يدعى شهل الشال ، اطلقه .

٢٣٠٤٧ - قِيَمَةُ الْغَاب * ، قِيَمَةُ إِزْمِرْتِي

Halcyon smyrnensis (S). Halcyon de Smyrne (F).
Halcyon (E).

طائر من المازوريات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى الهند وسيام وجزر الزابج . اعطاه الالبانية تشمل بعض الرياض وصفات الانهر في فصل الخريف || جسمه متوسط القد ، منكش الشكل . طوله نحو ٢٢ سم . وبسطه نحو ٢٨ سم . ثوبه متراكب الالوان . رأسه وعنفه وخوشاه وبطنه الى الكستاني الداكن . زوره واعل صدره الى البياض . رداؤه وظهره وعجزه الى الزرقه الخضر . جناحه متراكب الازرق والاخضر والاورد والكستاني والابيض . قوادمه الى الزرقه الخضر . كلاه الى السمرة القامحة . اياهره الى السمرة المنطية . مناكبه مجذعة بالابيض عيشه كبيرتان . حذقة عينه صناعية . متقاده كبير الجرم . مستطيل الشكل ، محدوب الافك الاسفل ، احمر اللون . ساقاه الى الجؤرة رشفه قصيرة سَرْدِيَّة القشار || يألف الغابات والرياض ويجاري الماء . قوته العطاء والحشرات اخصها السحالي والجنادب والجراد || يدشن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات كروية الشكل ، عاجية اللون تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٨ يوماً . يعتبر من الطيور النافعة .



قَبُونُ الْغَاب

٢٣٠٤٠ - قِيَمَةُ غِذَائِيَّة (F). Valeur alimentaire
Alimentary value (E).

القيمة الغذائية هي ما يحويه الغذاء من عناصر تتحول في الجسم بعد الامتصاص والتشيل الى طاقة ومواد استهلاكية لا حياة الجسم بدونها || وقد وضعنا في الجدول الاول ما تيسر لنا من القيم الغذائية المعادة لبيض الطائر المشهورة . اما الجدول الثاني فللقبول ولبعض الطائر الجافة .

٢٣٠٤١ - قِيَمَةُ مَرِيثِيَّة (F). Valeur alibile
Nutritive value (E).

هي نسبة ما تحويه كل مادة من عناصر غذائية قابلة التشيل والامتصاص .

٢٣٠٤٢ - قِيَمَةُ تَرَاغَلَفُس (F). Tragelaphus angasi
Tragelaphe d'Angas (F).

نوع من الجهيل وهو اكبر جفء من البرع واصغر من الغلب . ثوبه احمر اللون يعلو موج اصفر ويتجدع ابيض . موطنه جنوبي شرقي افريقية .

٢٣٠٤٣ - قِيَمَةُ وَجْهِ (F). Face
وجه الشيء كقولك قبل البناء ...

٢٣٠٤٤ - قِيَمَةُ وَجْهِ (F). Facial
نعت تعريضي يطلق عل ما له صلة بالتهيل .

٢٣٠٤٥ - قِيَمَةُ دِيَكِ الْبَحْرِ (F). Halcyon (F). Halcyon, Kingfisher (E).

جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد اعطاه البلاد الافريقية واسترالية . اجسامها متوسطة القد . منافعها

Conidiophore

٢٣١٤١ - كامب ٥

جهاز تكاثر ي تتميز به بعض الفطور الفيزية . قوامه سوط نواصي التركيب ، قاعدة ارتكازها المشيج ، طرفه صفي الشكل ، ينتهي بشفرة أو بشماغ من الشفاير يحمل الكائنات المرصوفة المتتابعة كحبوب السحبة .

Décembre (F).

٢٣١٤٢ - كانون الأول

December (E).

يعرف أيضاً بديسمبر . الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الخريف والشتاء . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الرابع عشر منه تبدل الأريجنيتات . وفي الواحد والعشرين ينتهي فصل الخريف ويكون الانقلاب الشتوي وهو ما يمتد به مخرج النور من حد نقصان إلى حد الزيادة . وفي الثاني والعشرين ينتهي فصل الشتاء فتخرج الشمس من برج الدلو لتدخل في برج الجوز . تقويمه الزراعي - احص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية . متابعة واهام بدر القول والعنسد والباكية وسائر النباتات العطيفة . متابعة توصيب وزرم اوراق التبغ الجافة . تحضير مشاتل التبغ وتوزيع الاسمدة العضوية على الاكباد .

٢ - في الاشجار المثمرة ، متابعة اعمال المكافحة الشتوية والتسميد الكيماوي في المناطق الساحلية والوسطى . الابتداء بالتقليم مع الانتهاء الى وجوب جمع كل ما قطع من الاشجار وحرقه بويماً . المباشرة بفرس النصبوب في المناطق التي لا تحصى التلج والاعتناء بالنقاية بعد الفرس لتأمين البيئة الفضلى الضرورية . اتخاذ الحيطه اللازمة لمنع ركود المياه في تربة البساتين . متابعة تشذيب وتسميد وحرق الكرمه والزيتون . وتوزيع الاسمدة العضوية على الموز . تغليف كياشه اي طروحه لوقايتها من البرد والتصقيع . انجاز تفضيد البزور ثم تليطها في المشاتل الخاصة بها او في مستورها . اقتلاع النصبوب للمدة للفرس قبل طفر البزرم .

٣ - في الحمضيات : متابعة قطاف البرتقال وتوزيع الاسمدة الكاملة والخاصة وفرس نصبوب التاننج (ابو صفيح) في البساتين المستحدثة وتقليم نصبوب المشاتل .

٤ - في الاشجار المختلفة : فرس نصبوب الاشجار الحرجية والتريينية وتفرع وتشذيب وتقليم معظم اشجار الحدائق والطرقات .

٥ - في البقول والزهور . متابعة العناية بالتربة والنبات و مشاتل البنورة والنس والباذنجان وباكباد الزبيب والتربس والسوسن .

Janvier (F). January (E).

٢٣١٤٣ - كانون الثاني

يعرف أيضاً بيناير . الشهر الاول من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء الغزيرة الامطار . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الثاني والعشرين منه تنتهي الأريجنيتات . تقويمه الزراعي - احص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية . تفقد زروع الحنطة واستلحاقها بالاسمدة الازوتية التجارية اذا كانت متأخرة او سقيمة . حرق التربة المدة لزراعة التبغ اذا كان حرمها لم يتيسر في الشهر المنصرم . اعداد مشاتل التبغ وتحضير الاكباد والمباشرة بنف البزور .

٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة فرس الاشجار المثمرة والمكافحة الشتوية والتسميد والتقليم . المباشرة بعنطة فسائل السفرجل والربان والتفاح ايسن مولين والكرمه والزيتون . متابعة تغليف كبالش الموز .

التركيب ، مسنة الاطراف . ازهارها فردية او عقدية التجميع كبيرة القذ يضاء اللون او حمره || اشهر اجناسها الشاي والكاميليا .

Caméline (F).

٢٣١٣٣ - كاميلية

هي النصار ، اطلبه .

Camélinées (F).

٢٣١٣٤ - كاميلينيات

هي النصاريات سبط من فصيلة الصليبيات .

Latent (F). Latent, Hidden (E).

٢٣١٣٥ - كامين

ما هو مقدور الوجود الخفي .

Chamidae (S).

٢٣١٣٦ - كاميات ٥

Chamides, Camacés, Chamacés (F). Chamidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشم . اجناسها وزايعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الجورية والعلياشورية . انواعها المعاصرة منتشرة في سبط بحار البلاد الاستوائية والحرارة || اصداقها متفارقة الاشكال والحجوم . ثنائية المضاربع الانظامية للامتساوية جميعها عادمة المتاعب . مستغلطة الاربل || اعرف اجناسها واشهرها الكامة والظفير .

Camellia (S).

٢٣١٣٧ - كاميليا *

Camellia, Camelia (F). Camellia (E).

جنس اشجار وشجيرات وسجات برية وتريينية من فصيلة الكاسليات . انواعها نحو ١٤ سوفها منتصبة فراءه . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقة ، كاملة . نصالها جامدة الصفحة حيلة الخضار الزاهي . ازهارها ابيطة او تاجية الارتكاز ، كبيرة القذ ، خاسية او سباعية الفصل وخاسية او سباعية او تساعية البتلات المندمجة القواعد || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣١٣٨ - كاميليا سرديية

Camellia reticulata (S). Camellia réticulé (F).

نوع من الكاميليا الفاخر الصف . جنبه جاذبة متوسطة القذ فراءه تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها سرديية عابقة الخضار . ازهارها عادمة العرف ، كبيرة القذ ، قلعها براوح من ١٣ الى ١٥ سم . لوها الى الحمة الكرزية ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

٢٣١٣٩ - كاميليا سسكا

Camellia sasanqua (S). Camellia sasanqua (F).

نوع من الكاميليا وهي جنبه سرديية فراءه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها مقطوعة القاعدة مسنة الحافسة . ازهارها مكسبة قلعها براوح من ٦ الى ٨ سم . لوها الى البياض المعالي || ازهارها يستمر من شباط الى حزيران .

٢٣١٤٠ - كاميليا يابانية

Camellia japonica (S). Camellia du Japon, Rose du Japon (F). Camellia, Japan rose, Rose of the world (E). Japanische Kamellie, Japanische Rose (D). Camellia, Rosa del Giappone (I).

نوع من الكاميليا الشائع الزراعة . ضربه واصرامه نحو ١٥٠٠ جميعها هريبة الشكل تملو من ٤ الى ٨ امتار . اوراقها ماسلة ، لامعة ، حيلة الخضار . ازهارها عادية او مكسبة ، كبيرة القذ ، عادمة العرف ، يضاء اللون او حمره .



كاميليا

٢٣١٥٨ - كِيدَاة * Cédrat (F).
في الارترجة، ثمرة الارترج، اطبلها .

٢٣١٥٩ - كُبَار * Lasius (S).
Lasius (F). Lasius (E).

جنس نمل من فصيلة المعروفيات يتميز باستعانة القوائم وبضخامة البطن || انواعه المعروفة عديدة اعطاهن البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم . بعضها حرجي يألف الغابات والبعض الآخر يعيش في الحدائق قرب المنازل المسكونة وفي الحرايات || معظم انواعه يتغذى ثرية الارق اما في زرائب قراه او على النباتات البعلية والرائحة والاشجار المثمرة .

٢٣١٦٠ - كَبْر Căprier (F).
هو الكبر ، اطبله .

٢٣١٦١ - كَبْرِيَّات Capparidées (F).
سبط من الكبريات اشهر اجناسه الكبر .

٢٣١٦٢ - كَبَس Epoque de fructification (F).
Epoch of fructification (E).

الكباس هو الزمن الذي يتسبق تفتح اكام الاشجار عن ازدهارها وقد يشمل ايضا زمن الانزهار والعتق .

٢٣١٦٣ - كَبَاة Régime de dattes, R. de bananes (F). Bunch, Cluster, Stem (E).

هي القناه والقنو وهي من النخل كمنقود العنب من الكروية . وهي في الموز مجموعة امشاط الطرح الشري . ج كباس

٢٣١٦٤ - كَبَّاش Plantain triomphe (F).
هو لفحة النعجة ، اطبلها .

٢٣١٦٥ - كَبَان Caiman (F).
داه يصيب الابل ينتقبض ثم تسكن كاتي اعياءه التلب .

٢٣١٦٦ - كَبَّة Balayures des étables et routes
كناسة المزاب والفرقات وهي من الاسمدة العضوية النافعة . ج كبون .

٢٣١٦٧ - كَبَّة * Cirsium spectabile (S).
Chardon spectaculaire (F).

نوع من القصاصان المحول، اوراقه خلية النحل على صفحتيه وهو نبات من الحنظل يصلح ورقه لاذناب الخيل يحسبها ويعطونها وله كمرب وشوك مثل السلق ينبت فيها رق من الارض سهل . ج كب .

٢٣١٦٨ - كَبْتِيَّة Liberticide (F). Liberticide (E).
الكبتية تقويض الحربة .

٢٣١٦٩ - كِيد ، كَبْد ، كِيد Fois (F). Liver (E).
الكبد والكبد والكبد . ج اكباد وكبد هي احد اعضاء الجهاز الهضمي في الجسم . وهي غدة كبيرة القد شبه هرمية الشكل تفرز الصفراء . مركزها وراء الحجاب الحاجز ، في الكشح الامين من التجويف البطني . وهي تحضن حويصلة الصفراء المغروطة الشكل التي تفرز المادة المرارية . وفضلًا عن وظيفتها في اخزان الصفراء فالكبد تحول كل ما زاد من حاجة الجسم من السكر الى نشا حيواني تدخرو للخاصة حيث تحولوه عنه الانتفاض الى سكر ناقل مائل . ويعرف عن حالة عجز الكبد عن القيام بهذه المهمة بمرض السكري .

٣ - في الحفصيات : متابعة اعمال كانون الاول الخاصة بالقطاف وتوزيع الاسمدة وغرس النصب وتقليم المرافي .

٤ - في الانجار المختلفة : غرس نصوب الاشجار الابدية الارراق من حرجية وزينية يضاف اليها الاركاليتوس والصفصاف والميموزا والكتورونيا والشكشيس والورد ...

٥ - في البقول والزهور : متابعة اعمال الشجر المنصرم والعناية بالملقون والتقليم والخس والاسبانخ والتروم والفجل والجزر والكرفس واللفت والبقدونس والشوندر والهلين والاراضي شوكي والورياء والبازيلا والشيك ... تمهد زراعات ومشاغل الزهور على اختلاف انواعها والعناية بمختلف اوضاعها الخاصة واستمرار مكافحة اوسامها وحشائها .

٢٣١٤٤ - كَانِيش Caniche (F). Poodle (E).
سلالة من الكلاب الصغيرة القد تتميز بصوفها الجعدي وبقرص حرسها على اصحابها .

٢٣١٤٥ - كَاو Caustique (F). Caustic (E).

٢٣١٤٦ - كَاوَرُون Bourrache officinale (F).
هو المحسم الخزي ، اطبله .

٢٣١٤٧ - كَاوَشِير ، جَاوَشِير ، سِفَسَارَن بَرِي Opopanax (S). Opopanax, Panais sauvage (F). Opopanax, All heal (E). Gummipastinak, Pastinake (D). Opopanax, Panacea (I).

جنس نباتات برية طيبة معمرة من فصيلة الحلييات . انواعه ثلاثه جذورها خشية غليظة . سوقها منتصبة دقيقة صلبة . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها خيمية التجميع ، صفراء اللون ، صغيرة القد ، يستخرج منها سمع رائحتي يستعمل في الطارة والطب .

٢٣١٤٨ - كَايْمَان ، كَيْمَان Caiman (F).
هو تمساح كان ، اطبله .

٢٣١٤٩ - كَبَا ، كَبِّي Fosse à fumier (F).
المزلة . ج اكبا . Dunghill (E).

٢٣١٥٠ - كَبَاة في فلفل كباة ، اطبله .

٢٣١٥١ - كَبَاة الشوك Hérissou (F).
هي القنفذ ، اطبله .

٢٣١٥٢ - كَبَّاش Salvadore (fruit) (F).
نفسج ثمر الاراك واحده كباة . والبرير ما لم ينضج من الكبات .

٢٣١٥٣ - كَبَا ، كَبِي ، مَنَع Inhibition

٢٣١٥٤ - كَبَاة ، كَبَاة ، قَرْمَل Frein (F). Brake (E).

٢٣١٥٥ - كَبَا حِي Inhibiteur, Inhibitif (F).
Inhibitory (E).

نعت تعريفي يوصف به كل عامل يحول دون سير الحركة الطبيعية فيزولها او يوقفها كليًا .

٢٣١٥٦ - كَبَاد Hépatite (F). Hepatitis (E).
التهاب الكبد ، ويكون حادًا أو مزمنًا .

٢٣١٥٧ - كَبَاد Cédratier (F).
هو الارترج ، اطبله .



كاشير



كباة



كبار



كبة

Câpre (F), Caper (E).

٢٣١٧٧ - كَبْرَة
ثمرة الكبر. ج. اكبار وكبار :

Coproah (F), Coco-nut (E).

٢٣١٧٨ - كَبْرَة
هي لب الناربيل ، اطليه .

Soufrage (F), Sulphuring (E).

٢٣١٧٩ - كَبْرِيَّة
هو التغير بالكبريت اي ذر مسحوق الكبريت على النباتات لوقايتها من بعض الاوصام الفطرية أو لمكافحة تلك الاوصام .

Coléoptère mâle (F).

He-coleoptere (E).

٢٣١٨٠ - كَبْرَقْل

ذكر الخنفساء ، وهو ايضاً جحر الجبل المقدس .

Capromys (S).

٢٣١٨١ - كَبْرُوسِيَّس *
Capromys, Houtia, Chemi (F). Capromys (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الدايات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الجراد . اجسامها ريمية ضخمة تطول من ٤ الى ٥٥ سم. واذناها من ١٥ الى ٢٧ سم. رؤوسها مستطيلة . مقاضسها مقطوعة . اذناها مستعرضة معتدلة الحجم . عيونها كبيرة . براطها العليا مغلوقة . اعناقها قصيرة غليظة . جرائرها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فخراسية . اطرافها طويلة مقوسة حادة . اذناها حشرافية الجلد يكسوها حلب مستطيل دقيق . ثآلف مؤلفا من فريزلا وهنتوراس وكوبا والجاييك ... تألف الغابات والاحراج والادغال . تتسلق الاشجار بحفة وتسير على الارض ببطي || قوتها الاوراق والثمار والحاء .

Capros (S).

٢٣١٨٢ - كَبْرُوس *
Capros (F), Capros (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكبرسيات شاكات الزعانف . انواعه المعروفة عديدة . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سارحها حشاش المجاحد في الاعماق التي يراوح غورها من ١٠ الى ٣٠ م. || اجسامها صغيرة القد ، مستعرضة الجرم ، مستطيلة الرأس والحلم ، كبيرة العين . زعانفها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة الأطراف || اعرف انواعه واشهرها الكبروس الخنزيري .

٢٣١٨٣ - كَبْرُوس خنزيري *
Capros aper (S).

Capros sanglier, Sanglier (F). Boar-fish (E).

سمكة بحرية من الكبروس . اعطائها البحر الابيض المتوسط . جسمها صغير القد ، بيضي اللون ، مبط الجرم ، يطول نحو ١٥ سم. رأسها منخفض الارتكاز ، مخروطي الحظم المستند الطرف كفتطيلة الخنزير . عيناها كبريتان . زعنفتها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة . سفنها مهذب الصفعة الخشنة . ثوبا الى المؤخرة الفضية المواج || لحمها كاعن الصنف ، مستهجن الرائحة ، قل من يأكله .

Caproidae (S).

٢٣١٨٤ - كَبْرُوسِيَّات *
Caproides (F), Caproidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شاكات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اجسامها صغيرة مستعرضة . اعطائها ذلفة . عيونها كبيرة . زعانفها الظهرية كثيرة المناسخ الحادة حراشفها خشنة || اشهر اجناسها الكبروس .

٢٣١٧٠ - كَبْدِيَّة (F). Liverwort (E).
صنف من قسم الطحلبات .

Capparis (S).

٢٣١٧١ - كَبْر ، كَبَار
Capprier (F), Caper-tree (E).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه زهاء ١٢٥ منظرها من نباتات المناطق الحارة ، منها الاشجار والشجيرات والجنبات ومنها الشائكة والرسحة . اوراقها منقطة متناقبة بيضيه النسل . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، طويلة الزناد ، جميلة الشكل ، كبيرة القد ، مستطيلة الاسدية المدينة الملونة || اعرف انواعه واشهرها الكبر الشائك .

٢٣١٧٢ - كَبْر شَالِك * ، كَبَار شَالِك ، اصْف ،

لصْف ، كَبَار
Capparis spinosa (S).

Câprier commun, C. épineux (F). Caper tree, Common caper-bush (E). Kappenstrauch, Echter Kappenstrauch, Kapper (D). Cappero, C. spinosa (I).

نوع من الكبر وهو جنبة فراءه فناء شائكة تطول ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. منبتها اقليم البحر المتوسط . فروعه دقيقة منبسطة ، الشواكها معجنة . ازهارها وردية اللون كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثمارها كالتينار شكلاً وقالباً لكنها لا تطول اكثر من ٥ سم. || ازهارها وثمارها تستعمل في الخللات . جذورها طيبة يقال انها نافعة ومطلعة ومدرية للبول .

Coccinia (S).

٢٣١٧٣ - كَبْر هِنْدِي
Coccinie, Céphalandre (F). Scarlet fruited gourd (E). Scharlachranke (D). Cefalandro (I).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه المعروفة قليلة اعطائها البلاد الحارة . جذورها صقولية . سوقها مدادة او عارشة . اوراقها مقصصة او مثلثة الزوايا . ازهارها كبيرة القد ، بيضاء اللون او صفراء . ثمارها رقيقة الشكل ، صغيرة الحجم ، جامدة الباب . يزورها الى السواد المرقط بالابيض || اعرف انواعه ما يلي .

٢٣١٧٤ - كَبْر هِنْدِي قَلْبِي الْوَرَق
Coccinia cordifolia (S). Coccinie à feuilles en

coeur (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات زراعي مداد يطول نحو ٢٠٠ سم. اوراقه صغيرة القد ، خماسية التفصيص ، قلبية الشكل ، تطول نحو ١٠ سم. فصلها لامع البشرة على صفحتي . حوالقه بسيطة . ازهاره الى البياض العاجي ، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم. ثماره رقيقة تطول نحو ٥ سم. لونها الى الحمرة ، لهاها جامد المادة ارجواني الخضاب . ثماره وصافله مأكولة .

٢٣١٧٥ - كَبْر هِنْدِي كَفِّي الْوَرَق
Coccinia palmata (S). Coccinie à feuilles palmées (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات متسلق يطول من ٦ الى ٨ امتار . اوراقه كثيفة الشكل طولها يراوح من ٨ الى ١٠ سم. حوالقه فارقة . ازهاره الذكرية عشقودية التجميع صفراء اللون . ثماره بيضيه الشكل والحجم ، عتيقة اللون ، لهاها جامد المادة الصفراء || ثماره وصافله مأكولة .

٢٣١٧٦ - كَبْرُون *
Sulfurer (F). To sulphurate (E).

استعمل الكبريت .



كبر شائك



كبريس



كبروس خنزيري

٢٣١٩٢ - كبريتات البوتاسيوم
Sulfate de potasse (F). راجع سلفات البوتاس .

٢٣١٩٣ - كبريتات الحديد
Couperose verte, Mélanterie (F). Green vitriol (F).
مركب معدني طبيعي اخضر اللون يوجد في بعض الكدبان.

٢٣١٩٤ - كبريتات الزنك
Couperose blanche, Goslarite (F). White vitriol (E).
مركب معدني طبيعي ابيض اللون، سهل الكسر واللويان،
عفص العلم، قليل الوجود.

٢٣١٩٥ - كبريتات الصوديوم
Sulfate de soude
راجع سلفات الصوديوم.

٢٣١٩٦ - كبريتات الكلس
Sulfate de calcium
راجع سلفات الكلسيوم.

٢٣١٩٧ - كبريتات النحاس
Couperose bleue, Cyanose, Chalcantite (F). Blue vitriol (E).
مركب معدني ازرق اللون، زجاجي المكسر، عفص العلم، يذوب في الماء. يوجد في مناجم النحاس.

٢٣١٩٨ - كبريتات الأمونيوم
Sulfate d'ammoniaque (F).
راجع سلفات الأمونيوم.

٢٣١٩٩ - كبريتات الحديد
Pyrite (F).
هو البيريت، مركب من كبريت وحديد.

٢٣٢٠٠ - كبريتات الكربون، سلفور الكربون
Sulfure de carbone (F). Sulphide of carbon (E).
مائع نئ الرائحة شديد الفاعلية لا لون له يشتمل في الزراعة
لقضاء على الحشرات ولتطهير التربة من بعض الاوصام
الفطرية المستعصية.

٢٣٢٠١ - كبريتي
Sulfureux (F). Sulphurous (E).

٢٣٢٠٢ - كبسة، لوزة الآلهة
Cabosse (F).
ثمرة الكاكاو، راجع كاكاو.

٢٣٢٠٣ - كبسود الزعرور
Bump (E).

Capsodes flavomarginatus (S).

Capsode de l'aubépine (F).

حشرة غاصلة من فصيلة الفميجيات. جسمها صغير يطول نحو ٨ مم. رأسها مجرسم، اصعب اللون. خطمها شديد السمرة. عيناها بارزتان. زباناها مستطيلان، احمران. كوسلها اصعب يملو موج احمر. حجبها صغيرة، صناعية. ظهرها لاصف، حجبها الى الشبهة البيضاء المواج، يطوقها حمار ضيق اصفر ذهبي يتحول في الزام الاخير الى صناعي. بطنها شديد السمرة، احمر الخمار. قوائمها مبلقة بالاسمر والاصفر || تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها الزعرور.

٢٣٢٠٤ - كبش
Bélier (F). Ram (E).
ذكر الضأن يستطيع السداد. ج اكيش واكباش وكباش.

٢٣٢٠٥ - كبش
Fascine (F).
اعشاب واغصان واعشاب توضع في سبيل الماء لتحويل
قوس منه الى مجرى آخر.

٢٣١٨٥ - كبروفيلس مُحَرَّز
Coprofile strié (F).
هو الطروب الحز، اطلبه.

٢٣١٨٦ - كبروليت
Coprolithe (F). Coprolithe (E).
سماد الفائط المتحجر. وقد يعتبر من التسفئات الطبيعية.

٢٣١٨٧ - كبرومة
Coproisma (S). Coprosme (F).
جنس نباتات معمرة بخر من فصيلة الفويات. انواعها المعروفة قليلة. مهدها بلاد زيلندا الجديدة. سوقها تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها مستديرة الشكل، مقنطرة القاعدة، فصلها يطول ويعرض من ٢ الى ٨ سم. صفحته جميلة المخضار الزاهي تملو حثارها رقشة صفراء. والكبرومة تستعمل في الحدائق استعمل المضاض الياباني.

٢٣١٨٨ - كبريتات
Capparidaceae (S).
Capparidacées (F). Capparidaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها اربعة اسباط: الابيات والزويات والكلياريات والميرويات. نباتاتها مختلفة الاشكال والاحجام منها الاشجار والشجيرات والجنباث ومنها الاعشاب الحولية والمعمرة. أوراقها متعاقبة، معتقة، اذنية. ازهارها جميلة القالب فردية او عنقودية التجميع. ثمارها حبة ثنائية الفلق || معظمها من نباتات المناطق الحارة وهي تحوي بعض الزيوت الطيارة الطيبة وبعض العناصر المختلفة اخصها الصحية والشاقة والسامة.

٢٣١٨٩ - كبريت
Soufre (F).
Sulphur, Brimstone (E).

جسم صلب اصفر اللون قابل للكسر رمزه (ك - S) وزنه الاناثي ٣٢٠٠٦٦ يتصهر في ١١٣ م.ع. ويتقد في ٢٥٠ م.ع. حبة احتراقه زرقاء اللون ساطعة خائقة. وهو رديء الاتصال الحرارة والكهرباء يذوب في الاثير والبنزين والزيوت ولا يذوب في الماء || عرفه الانسان واستخدمه منذ قديم الزمان وهو يوجد في الطبيعة اما نقياً واما مزججاً ينزهر من العناصر كالحديد والنحاس والرصاص. يستهلك منه العالم سنوياً ملايين الاطنان في صناعة الاسمدة والاصباغ واللقاب والبارود والادوية الطيبة الجلدية والادوية الزراعية ... من انواعه النقية التي تستعمل في الزراعة ضد الاوصام الفطرية :

الكبريت الميكروني

Soufre micronisé (F).

الكبريت الزهرة

Soufre sublimé, Fleur de soufre (F).

الكبريت المسحوق

Soufre trituré (F).

الكبريت المتبلور، الكبريت العمود

Soufre cristallisé (F).

٢٣١٩٠ - كبريت الرصاص

Galène (F). Galena (E).

مركب معدني يحوي نحو ٨٦,٥٠٪ من الرصاص و ١٣,٥٠٪ من الكبريت وبعض الشوائب النزر من الفضة او الحديد او الزنك او الالمنيوم. وهو رصاصي اللون، ازرق المواج، اسفغ البريق، سريع الكسر. ثقله النوعي يراوح من ٧,٤ الى ٧,٦ وهو شائع الاستعمال الصناعي يستخدم خاصة في طلي الآلية الخزفية منسما لاتصاها الماء.

٢٣١٩١ - كبريتات

Sulfate (F).
راجع سلفات.

البياض الفضي. اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢١٤ - كَبُوعَةُ مَلَوَانَة

Megaptera versabilis (S). *Mégaptère changeante* (F). موطنها شمالي المحيط الهادي طويلا يراوح من ١٨ الى ٢٥ م. رأسها وظهورها الى الزبداء السمراء الزرقاء المزاج . بطنها الى البياض الماسي تغلوه ماجة وردية . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السمره القاتمة .

٢٣٢١٥ - كَبُوكَابُ الشُّوَلَة
Hérissor (F). هو القنغذ ، اطلبه .

٢٣٢١٦ - كَبُول
Fourrure garnie (F). الكبيل : الكثير الصوف من الفراء .

٢٣٢١٧ - كَبُوعَةُ ٥
Cabomba (S). جنس نباتات مائية معمرة من فصيلة النيلوفرديات . انواعها المعروفة قليلة . سوتها شجيلة . جلورها كالشمر تشعشعها مادة لزجة . اوراقها متناقصة صاجية النصل ترتكز على معاليق مستطيلة . ازهارها فردية التجميع ابيلية الارتكاز سداسية البتلات . بتلاتها صفراء الانتشاب بيض الاطراف . اوراقها وازهارها تنطقو على سطح الماء . وهي تعيش في الاكواريوم وتستهمل كبرى لاسماك المياه العذبة ٥ اعرف انواعها ما يلي .

٢٣٢١٨ - كَبُوعَةُ كَرُولِيَّة ٥

Cabomba caroliniana (S). *Cabomba de la Caroline* (F). نوع من الكبيمة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كبرى للاسماك . اوراقها صاجية طافية . ازهارها بيض الاطراف ، صفر الانتشاب والاقراص ٥ تنورها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٢١٩ - كَبُوعَةُ مَالِيَّة ٥

Cabomba aquatica (S). *Cabomba aquatique* (F). نوع من الكبيمة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كبرى للاسماك . اوراقها طافية بيضية النصل الاخضر الذي يطول من ١ الى ٣ سم . ازهارها صفراء اللون تشبه زهر الحوذان المائي ٥ تنورها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٣٢٢٠ - كَبُونْد ٥
Capnodium (S). هو التيج ، قطر مجهرى ، اطلبه .

٢٣٢٢١ - كَبُون
Chabot, Chabotage (F). مرض جرثومي يصيب الكرمة فينشطها على افراخ الجذور المحالطة الشبكية .

٢٣٢٢٢ - كَبُونْل ٥
Copris lunaris (S).
Copris (F). حشرة من الجملليات يكثر وجودها في الربيع والصيف . طويلا يراوح من ١٥ الى ٢٢ سم . ثوبها الى السواد اللامع . ذكرها مسلح بقرن مستطيل حاد . انتفاها سلسلة بشفرة ذرية عمودية الارتكاز . وهي من الحشرات الصريرية الثائلة التي تعيش على مختلف انواع البراز . مجبرها سرداب فردية نميعة تبيع فيها اكر الزبل التي تحفرها الانثى بالاشتراك مع الذكر ثم تمتع في كل اكرة مكثه وتقوم على حراستها حتى اكتمال التفك الذي يستمر اكثر من اسبوعين .

٢٣٢٢٠ - كَبَشُ الْجَبَل
Mouflon (F). حيوان لبون يجتر يعرف بالاروية ، اطلبها .
Mountain Sheep (E).

٢٣٢٢٧ - كَبَشُ الْقَرْنَفُول
Girofle, Clou de girofler (F). *Clove* (E). هو زهرة القرنفل المجافة . طعمها حريف ، رائحتها ذكية المرف فواحة . يستخرج منها زيت شائع الاستعمال الطبي وهو مضاد لله و التشنج يحد من الاعصاب ويسكن ألم الانسان .

٢٣٢٢٨ - كَبَشِي الرَأْس
Criocéphale (F). *Criocephalous* (E). نعت ترميضي يطلق على كل من كان رأسه كراس الكيش .

٢٣٢٢٩ - كَبُوع ٥
Megaptera (S). *Mégaptère* (F). *Humpback whale* (E). الواحدة كبة . جنس حيتان عظيمة القد مدنية الشكل . انواعها المعروفة حدة تألف المحيطات . طويلا يراوح من ١٢ الى ٣٥ م . تتميز زعانفها الصدرية المستطيلة الضيقة الرباعية الاصابع . رؤوسها ضخمة ، صفائح احناكها قصيرة مستعرضة مطاطة . صدرها مكدبة متوازية التخذيد الطويل ٥ قوتها الاسماك الصغيرة . تجوب الاعماق والمياه السطحية والاقليمية في طلب الرزق . اناتها تقصع من جرو الى جرون ترصعها بقعة شهود ٥ صرعتها تفوق سرعة المراكب البخارية . صيدها خطر وشاق دهنها مرغوب فيه وقد يراوح انتاج الكبة الواحدة من ٤ الى ٥ اطنان . اما انواعها الخمسة فهي ما يتبع .

٢٣٢٢٠ - كَبُوعَةُ الْجَنْتُوب ، كَبُوعَةُ لَانْتَد
Megaptera lalandi (S). *Mégaptère de lalande* (F). موطنها جنوب المحيط الاطلسي . طويلا يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م . رأسها وظهورها الى السمره الزرقاء . بطنها الى البياض الاخضر . صفائح حنكها الى السمره العاقبة .

٢٣٢٢١ - كَبُوعَةُ الْخَلِيج
Megaptera indica (S). *Mégaptère indienne* (F). موطنها الاقائس الهندي تكثر في الخليج الفارسي . طويلا يراوح من ١٢ الى ١٥ م . رأسها وظهورها الى الكبة السمراء الصفراء المزاج . بطنها الى البياض الاخضر الكدر . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢٢٢ - كَبُوعَةُ الْقُطْب ، جَمَلُ الْبَحْرِ
Megaptera Boops (S). *Mégaptère Boops, M. longimane, Baleine à bosse, Jubarte, Gibbar, Poisson de Jupiter, Képorak* (F). اكبر انواع الكبع واضنها جنة وطولها هيكل واغرها شكا . طويلا يراوح من ٣٠ الى ٣٦ م . تتميز بسلام كسان الجبل بطول تيج الظهر ورزعة ظهريه منجلية الشكل صغيرة القد . رأسها وظهورها الى السواد اللامع . بطنها الى البياض . اخاديد صدرها الى السمره القاتمة . صفائح حنكها سود ٥ موطنها فسج الارباء يشمل بحار القطب الشمالي والقسم الاعلى من المحيط الاطلسي .

٢٣٢٢٣ - كَبُوعَةُ كُوزِيْرَا
Megaptera Kuzira (S). *Mégaptère Kuzira* (F). تكثر في مضيق بارين والبحار المحاذية . طويلا نحو ٢٠ م . رأسها وظهورها الى السواد الازرق المزاج . بطنها الى



كبع



كبيمة كروليه



كبول (١)



كبول (٢) منظر جانبي

Swine-book ٢٣٢٢٧ - كِتَاب أَنَسَابِ الْخَنَازِيرِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات الخنازير .

Stud-book ٢٣٢٢٨ - كِتَاب أَنَسَابِ الْخَيْلِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات الخيل .

Flock-book ٢٣٢٢٩ - كِتَاب أَنَسَابِ الضَّأْنِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات الضأن .

Canis-book ٢٣٢٣٠ - كِتَاب أَنَسَابِ الْكَلَابِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات الكلاب .

٢٣٢٣١ - كِتَابُ نَبَاتِ الْكَارْمِيرِ . (اللسان) .

Agglomérat, Conglomérat (F). ٢٣٢٣٢ - كِتَابَةُ ٥

Agglomerate, Conglomerate (E).

حالة تدمج طبيعية تكون عليها بعض المواد المختلفة . أشبهها طبقات الحصى والريال المتناسكة .

Imperméabilité (F). ٢٣٢٣٣ - كِتَابُ ٥

Impermeability (E).

خاصة مسك الماء في بعض أنواع التربة . وفي من عيوب التربة الزراعية لأنها تجعلها شديدة الصلابة والاندماج .

Linum (S). Lin (F). Flax (E). ٢٣٢٣٤ - كِتَابُ ٥

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الكتانيات . أنواعه المعروفة زهاء ١٠٠ معظمها حولي وبعضها معمر . سوقها خشبية أو ليفية منتصبة غليظة . أوراقها لاطئة متعاقبة سنائية النصل أو غطية . أزهارها خالصة التركيب عقدوية التجميع مختلفة الألوان منها الأبيض والأصفر والوردي والأزرق والأحمر . ثمارها حقية ، زهورها بفسية صغيرة

ملساء تستعمل في الطب ويستخرج منها زيوت حارة تستعمل في الدعان والطلاء . كما وأنه يستخرج من خاء سوقها الليفية الياف صناعية نسيجية تحمل المركز الثاني بعد القطن ٥ أشهر أنواعه البرية والزراعية الصناعية والزينة ما يتبع .

٢٣٢٣٥ - كِتَابُ أَبْيَضِ ٥

Linum suffruticosum (S). Lin blanc (F). White flax (E).

نوع من الكتان البروتي الزينة . وهو عشبة حولية تملو نحو ٣٠ سم . ساقها خشبية ، منتظمة ، معمرة ، فراء ، خلية اللحاء . أوراقها غززية الشكل ، جامدة النصل . أزهارها إلى البيضاء الناصع . حنار تنبت إلى الحمرة البنفسجية المولج ٥ أزهاره يستمر من أيار إلى آب .

٢٣٢٣٦ - كِتَابُ الزَّرِيرِ * ، كِتَابُ زَهْرِي ، كِتَابُ

كَبِيرِ الزَّهْرِ ٥

Linum grandiflorum (S). Lin à grandes fleurs (F). Flowering flax (E).

Leinblume (D). Lino d'Africa (I).

نوع من الكتان وهو عشبة حولية زينة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . ساقها فراء ، فروها منتصبة منتصبة . أوراقها سنائية ، نصلها بحري اللون . أزهارها كبيرة القد حيلة

الحمرة مهدبة النصل ٥ أزهاره يستمر طوال شهر حزيران

٢٣٢٣٧ - كِتَابُ الشَّرْقِ ٥

Lin d'Orient (F). Oriental flax (E).

نوع من الكتان الطبي البري المبدول ، منته الشرق الأوسط . عشته معمرة تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم . ساقها خشبية فراء . أوراقها صغيرة القد ، نصلها وحيد العرق

Productif (F). Productive (E). ٢٣٢٢٣ - كَبُوس

كثير الحمل . يقال نقاحة كبوس ونقطة كبوس .

Capucine (F). ٢٣٢٢٤ - كَبُوسِيْن

هي السلية ، نبات عشبي زينة مأكول الأوراق والأزهار ، اطلبها .

Loche (F). ٢٣٢٢٥ - كَبِيْت

هو اللغ من الإسمك الأثرية ، اطلبها .

Copalifera (S). ٢٣٢٢٦ - كَبِيْت * ، كَبِيْتَة

Copaier, Copahier, Copayer (F). Copaliba-tree (E).

جنس أشجار حرجية من فصيلة القرنيات . أنواعه المعروفة نحو ٢٠ . أصلها البلاد الحارة الإفريقية والأمريكية . جميعها أشجار كبيرة القد يراوح ارتفاعها من ١٥ إلى ٢٥ م . أغصانها منسطة . أوراقها مركبة متعاقبة . أزهارها سنبلية التجميع . ثمارها قرن صغيرة رقيقة وحيدة البزرة المستطيلة البطة ٥ أغصانها جووية اللون صلبة تستعمل في التجارة . يستخرج من سوقها حليب راتنجي المادة ، يسمي العرق يستعمل في الصيدلة .

Macrocarpe (F). ٢٣٢٢٧ - كَبِيرُ الشَّعَرِ

Macrocarpus (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتج ثماراً كبيرة .

Mégalocephale (F). ٢٣٢٢٨ - كَبِيرُ الرَّأْسِ

Megalocephalous (E).

نعت تعريفي ووصفي يطلق على الحيوانات الشاذة بفسخامة رؤوسها .

Renoncule des fleuristes ٢٣٢٢٩ - كَبِيْتَج

هو المحوذن الآسيوي ، نبات قصير الساق ، كزبه الرائحة ، اطلبها .

Blométrie (F). ٢٣٢٣٠ - كَت ، بِيَوْمَتِيَا

Biometry (E).

بحث بيولوجي يطبق القواعد الإحصائية وحساب الاحتمالات على حياة الكائنات الحية .

٢٣٢٣١ - كَتَا

الواحدة كتاة . نبات كالجرجير يطبخ فيوكل (اللسان) .

Book ٢٣٢٣٢ - كِتَاب

يحمل الانساب في الحيوانات الداجنة .

Lettre de crédit (F). ٢٣٢٣٣ - كِتَابُ الإِعْتِمَادِ

Letter of credit (E).

رسالة يبعث بها صاحب المصرف إلى وكلائه لكي يخطرو مبلغاً من المال رهن تصرف شخص مسمى .

Pedigree (F). ٢٣٢٣٤ - كِتَابُ الْأَنْسَابِ

Pedigree (E).

يحمل تدون فيه انساب سلالات الخيول العرب وحياد الرهان وسائر الحيوانات الموصلة .

Lettre de garantie (F). ٢٣٢٣٥ - كِتَابُ الضَّمَانِ

Letter of guaranty (E).

كتاب يتعهد به شاحن البضائع ونقلها بأصلها على الحالة البينة في تذكرة الشحن .

Herd-book ٢٣٢٣٦ - كِتَابُ أَنَسَابِ الْبَقَرِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات البقر .



كَبِيْت



كَتَان الزَّرِير

Linum viscosum (S).
Lin visqueux (F).

نوع من الكنان الزبِّيُّ وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فراء مزرية . أوراقها سنانية ثلاثية او خاسية المروق . فصلها مبشّر الغدد ، خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها وردية اللون مشوطة بالبنفسجي . أزهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٣٢٥٣ - كَنَان مَسْهَل * ، فَرقِ
Linum catharticum (S). Lin purgatif (F). Purgif. flax, Fairy flax, Cathartic flax (E). Purgier-Lein, Purgier-Flachs (D). Lino a foglia purgative (I).

نوع من الكنان البري الطبي المبلول وهو عشبة معمرة تملو من ١٠ الى ٢٥ سم. ساقها مخشوشة فراء . أوراقها طيبة مسهلة ، السفلى منها ضمية التجميع ، سنانية النصل ، الوسطى والعليا متعاقبة غطلة . أزهارها كبيرة القد لونها الى الصفار النبي || أزهاره يستمر طوال شهر تموز .

٢٣٢٥٤ - كَنَانِيَّات
Linaceae (S).
Linacées (F). Linaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التعلات. اجناسها ١٤ تشمل ٢٣٠ نوعاً منها جميع الاصناف المعتدلة . معظمها عشبي حولي او معمّر وبعضها شجري او جنبي . أوراقها متعاقبة او متقابلة . أزهارها تاجية الارزكاز ، لاقياسية التجميع منها الفردية والمتقودة والمشكولية . اشهر اجناسها الكنان والكوكا والردبولا .

٢٣٢٥٥ - كَنَانِيَّة
Démographie (F).
Demography (E).

الكناية علم احصاء الجماعات البشرية .

٢٣٢٥٦ - كُتُبُ الْاَنسَاب
Livres généalogiques (F). Genealogical books (E).
سجلات تدون فيها الحيوانات باسمائها واشكالها مع اسماء واشكال الآباء والامهات وصفاتها المميزة وما اشهرت به الخ .

٢٣٢٥٧ - كَعْد ، كَعْد
الكند والكند هو اعل الكنف وقيل هو الكاهل وقيل هو ما بين الكاهل الى الظهر . ج اكناد وكند .

٢٣٢٥٨ - كَثَر ، كَثَر ، كَثَر
Milieu d'une chose (F). Middle of one thing (E).
هو جواز كل شي اي اوسطه .

٢٣٢٥٩ - كَثْرِيَش * ، جَمِيْلُ الشَّعْرِ
Callitriche (S). Callitriche, Callitriche (F). Wasserstern, Sternkraut (D). Callitriche (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الكثرشيئات . انواعه قليلة العدد ، اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة تعيش في المياه العذبة || يستخرج منها عصارة لزجة ملينة تقيد الشعر وتمهد لملده وحسته .

٢٣٢٦٠ - كَثْرِيَشَات
Callitrichaceae (S).
Callitrichacées (F). Callitrichaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها مائية . اشهرها الكثرش .

يطول نحو ٦ م . ويمرض نحو ٢ م . عقصته تنتهي هلبة دقيقة ذرية . أزهارها برتقالية اللون ، غدية الفصل الشفافة . أزهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٢٤٨ - كَنَان بَرِّي * ، كَنَان هَبِيْق الْوَرَقِ ،
فِيَنَاس
Linum angustifolium (S).

Lin sauvage (F). Pale flowered flax (E). Wilder Lein (D). Lino salvatico (I).
نوع من الكنان البري المبلول وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. ساقها مخشوشة قليلة الفروع المتصبة . أوراقها خفيفة ، نصلها غطلي الصفحة ، وسيد المرق . أزهارها قليلة العدد لونها الى الزرقة اليلكية المسواج . أزهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٢٤٩ - كَنَان ذَهَبِي
Linum flavum (S).
Lin jaune d'or (F).

نوع من الكنان السبروتي الزبِّيُّ وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ساقها غلظة فراء . أوراقها ملوئية الشكل ، نصلها يطول من ٢ الى ٣ سم . ويمرض من ١٥ الى ١٠ سم . وهو ثلاثي المروق ، بحري اللون . أزهارها فرقة ، كثيرة العدد ، ذهبية اللون || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٢٥٠ - كَنَان زِيْلَنْدَة
Lin de la Nouvelle Zélande (F).

هو القربوم المتصلب ، الحلبه .

٢٣٢٥١ - كَنَان شَالِع * ، مَلَسَج
Linum usitatissimum (S). Lin cultivé, Lin commun (F). Common flax (E). Echter Lein, Gemeiner Flachs (D). Lino usuale, Lino comune (I).

هو الكنان الزراعي الصناعي المشهور - شروبه عديدة . جذوره وثنية متوسطة الانشعاب . ساقه منتصبه فراء تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . أوراقه سنانية النصل ، مخضراء اللون . انزهاره الى البياض او الزرقة الباهجوية . تمام جبراه كروية مقطوعة الرأس والعقب ، عشارية المصاريع وفي كل مصراع بزره . والبزره ماسلة ، لامعة ، سمراء اللون ، مغلطة . تطول من ٤ الى ٦ م . وتعرض من ٢ الى ٣ سم .

لبها زيتي الماذة ينتج من ٢٣ الى ٤٢ ٪ من الزيت . يقال انه من اقدم النباتات الصناعية لان زراعتها وصناعة اليافه في بلاد ما بين النهرين في مصر تعود الى ابد من اربعة الاف سنة || زراعتها الحالية فيسحة الارباح تشمل الولايات المتحدة والارجنتين وروسيا وبولونية ولتوانية والمانيه وفرنسه وهولنده وبلجيكا وتركيا || وهو موجود في الاقاليم المعتدلة ويفضل المناخات الرطبة على الجافة والاجواء العكرة المبهمة النجوم على الصافية الادم || وهو يرغب في الاربة الخصبه الغنية المنسوبة التركيب الحكمي ، المتوسطة الاندماج ، لانه من النباتات الشجرة التي تستنزف كل ما وصل اليها من العناصر العضوية والمعدنية || يكثر عادة في اوائل الربيع ويقطع عندما تصفر ساقه وقد يكون ذلك في اوائل الصيف . فيترك في الحقل بضعة ايام الى ان تجف ساقه ثم ينقل الى المغارب حيث تفصل البزور عن السوق . اما الالياف الصناعية النسيجية فتفصل عن السوق اما بواسطة الحرارة في معامل خاصة مجهزة لهذه الغاية واما بواسطة الماء وهو ما يسدده التعلين وقد يتم بنقع حزم سوق الكنان بالماء الراكد مدة من الزمن تقربها حرارة الموق لكنها مبدئياً تراوح من اسبوع الى اسبوعين .



كَنَان بَرِّي



كَنَان شَانِع



كَنَان سَهْل



كَثْرِيَش

Catalpa bungei (S). - كَتَلْبَة صِينِيَّة

Catalpa de Bunge, Arbre puant (F).

نوع من الكتلة مهدها الصين. تجربها صغيرة اللقد تملو من ٧ الى ١٢ م. اوراقها رعية الشكل مقنطرة القاعدة. نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ١٤ وهو مائل البشره على المروق على الصفحة السفلى. ازهارها تطلو نحو ٤ سم. وتعرض ٥ سم. لونها الى البياض المشج بالاصفر والجلوي. ثمارها مخروطية تطلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

Catalpa speciosa (S). - كَتَلْبَة ظَرْفِيَّة

Catalpa elegant (F).

نوع من الكتلة وهو شجرة سرية النمو تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. مهدها امريكية الشالية. ساقها منتصبه فضاء. اوراقها تطلو نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٨ سم. نصلها ذرب المعصه المستطيلة. ازهارها عنقودية التجميع، كثيرة اللقد تطلو نحو ٧ سم. وتعرض ٨ سم. لونها الى البياض المرقط بالاصفر. ثمارها تطلو نحو ٥٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

Catalpa ovata (S). - كَتَلْبَة يَابَانِيَّة

Catalpa du Japon (F).

نوع من الكتلة السبروتية مهدها اليابان. تجربها صغيرة اللقد تملو من ٦ الى ١٠ امتار. اوراقها ثلاثية اوخاسية التفصيص البياض الشكل. نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ١٥ سم. ازهارها صغيرة اللقد، صفراء اللون، ملطخة بالبنفسجي. ثمارها مستطيلة دقيقة كالاصابع. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

Catalpa (S). - كَتَلْبَة صَفْرَاء

Immortelle des sables (F).

هي الخالية الطاقية، اطلها.

Masse d'air (F). - كَتَلْبَة هَوَاء

Mass of wind (E).

تعريف جولاي يدل على مجرى الهواء المتحرك في اتجاه معين.

23275 - كَتَم

« نبات جبلي ورقة كورق الاس يخضب به مرققاً وله ثمرة كثر اللقلل ويسود اذا نضج وقد يمتصر منه دهن » (١، م).

Tubercularia (S). - كَتَن

جنس فطور مجهرية من عماره الوطنيات، وفصيلة الككتيات. جرابه الكندي كثير الفروع العادمة الترتيب. كنهاده وسيدة الخلية، كروية او اسطوانية الشكل. وسادته مجنية تيمو عند انفلاتها خلية اللؤلؤ زاهرة اللون || انواعه قليلة. اعرفها الثلاثة التالية.

23277 - كَتَن الإِجَاص

Tubercularia piricola (S).

فطر مجهرى يركب الثار المخدوشة. الخزونة اخصها الاجاص والتفاح || ينشط ويتكاثر في بيئة خاصة حرارتها تفوق الاربعة درجات ستيفارد ووطنها من ٨٠٪ وصاعداً || مظهره الخارجى ندف خلى. آخر اللون، ابيض المروج، يركب البشره فيعلبها ثم ينور في اللب فيعفته ويهره.

23211 - كُنُسُوس

Chatoussus (S). Chatoussus (F). Chatoussus (E).

جنس اسماك بحرية زهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابوشيات. انواعه المعروفة عديدة معظمها نهري وبعضها بحري. والبحري منها يؤم النهر في زمن الاسراء || اجسامها اهليجية التوزن، تطلو من ٢٠ الى ٢٦ سم. رؤوسها صغيرة، مثانة الاشداق. عيونها ماصحة. زعانفها الظهرية صغيرة، شبه مزوانية. الصدرية والخوضية صغيرة. الترجية مستطيلة. الذيلية فارقة. اوراقها متقاربة تسمر في القسم الاعلى وتغير في الاسفل || يكثر وجودها في الهند والصين واليابان || لحومها مأكولة وبعضها جيد الصنف.

23212 - كَتَشُول

Catéchol (F).

بلورات ابرية عادمة اللون براقه تستخلص من الكاشو والتعبير والطعان الخ... تغلي عند ١٧٧/١٧٥ °م.

23213 - كَتِيد

Cernier (F).

سمكة بحرية تدعى قباب، اطلها.

23214 - كَتِف، عَاتِق، مَتَكِب

Epaulé (F). Shoulder (E).

الجزء العلوي من البدن.

23215 - كَتَفَان

الكفتان الجراد اول ما يطير. ويقال هو الجراد بعد التوقاف اوله السرم ثم اللبي ثم الغفاه ثم الكفتان. الواحدة كفتانة.

23216 - كَتَكُوت

Poussin (F).

هو القروب والصوص.

23217 - كَتَكَلَز

Catalase

خيرة نباتية تهيم على انتاج واتزان هيدرات الاوكسجين في النبات.

23218 - كَتَلْبَة

Catalpa (S).

Catalpa (F). Catalpa (E). Trompetenbaum, Trompetenstrauch (D). Catalpa (I).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة البنونيات. انواعه المعروفة ٩ جميعها اشجار صغيرة او متوسطة اللقد. سقوها منتصبه. اغصانها فارشة. اوراقها بسيطة، عابله، متقابلة. نضفاضة النصل. ازهارها جريبية الشكل. ثمارها جرد مستطيلة كالحيار || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

23219 - كَتَلْبَة شَاعِلَة *

Catalpa bignonioides (S). Catalpa commun, C. de la Caroline (F).

نوع من الكتلة الحرجية السبروتية المبدولة مهدها امريكية الشالية. ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م. اوراقها كبيرة اللقد، بيته الفصوص؛ نصلها بطول نحو ٢٥ سم. ويعرض ٢٠ وهو ازغب المروق كربه الزائفة عند اللس. ازهارها عنقودية التجميع تطلو نحو ٥ سم. وتعرض ٦. لونها الى البياض المرقط بالاصفر والاحمر. ثمارها تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.



كتله شائنة

تعيش على الصخور المغمورة قرب الشواطئ || اصداؤها داخلية رقيقة صغيرة . اجسامها لحمية ، بيضية الشكل او امليلية تغلفها الادرية الغضغضة . غياشيمها عيمنية الارتكاز نظامية الترتيب الثنائي الصف . افواها غطبية الشكل . لواسها ثنائية انبوية مفلوجة السطوح الخارجية .

٢٣٢٨٧ - كُتَيْمِيَّات (S). Pleurobranchidae (E).
Pleurobranchidés (F). Pleurobranchidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || دوبياتها تتميز باصداؤها الرقيقة الصغيرة التي تلتحف الظهر . غياشيمها هدية عيمنية الارتكاز . افواها غطبية الشكل ؛ ثنائية اللواسم الانبوية المفلوجة من الخارج || اعرف اجناسها واشهرها الكتيمة والغساجة والتيدة .

٢٣٢٨٨ - كُتَيْلَة
الكتيلة هي النخلة فاتت اليد . ج كئائل .

٢٣٢٨٩ - كُتَيْن ٥ ، كُتَيْنَة (F). Catène (F).
Catena (E).
جموعة ترابية لاقامية التركيب الحكمي جمعها العوامل الطبيعية تميزت بوحدها الشكلية .

٢٣٢٩٠ - كُتَيْهَة
Lotier corniculé (F).
هي القوس القرني ، اطليه .

٢٣٢٩١ - كُتَاء
Brachycome (F).
هي البراكيم ، اطليه .

٢٣٢٩٢ - كُتَاب ٥ ، زُقْرَاقُ الْخُص ٥
Sarciphorus (S). Sarciphore, Vanneau à caroncule (F).

جنس طير من طوائف الساق وفصيلة الزقراقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض الفلوات الافريقية القريبة من مجاري الماء . ملجنها الحيائي جماعي . قوتها الحشرات والدواب الصغيرة والذباب . تتميز بسرعة عدوها على الرمال || اجسامها صغيرة الدهن ، متراكبة الالوان الجميلة ، فيها الاصفر والاسود والجواري والاشهب والابيض . رؤوسها صغيرة . مناقبها مبطلة الصفحات السفلى وتعلوها في قواعدها العليا لحص صغيرة لحمية المادة . اجتنبها لاحقة . اذنانها شديدة الصغر . سيقانها دقيقة سمراء اللون كالنكتيد .
نوعها المعروفان :

كُتَاب السنغال ٥
Sarciphorus tectus (S).
Sarciphore du Sénégal (F).
كُتَاب الصومال ٥
Sarciphorus latifrons (S).
Sarciphore des Somalis (F).

٢٣٢٩٣ - كُتَاء
Crème (F).
هي القشدة ، المادة السنية في الحليب .

٢٣٢٩٤ - كُتَاء
Roquette (F).
هي الجرجير من احرار البقول ، اطليه .

٢٣٢٩٥ - كُتَافَة
Densité (F). Density (E).
هي مقدار الشيء في وحدة معينة . كوكراك ١٠ شتول في المتر المربع .

٢٣٢٧٨ - كُتْنُ الْبُقْس ٥

Tubercularia versicolor (S).

فطر مجهري يعيش على اغصان البقس اليابسة وقد شوهد على لحاء المطاط في الاوغندا .

٢٣٢٧٩ - كُتْنُ شَالَع ٥

Tubercularia vulgaris (S).

فطر مجهري رمي يكثر في الخريف والشتاء . يركب لحاء الاغصان اليابسة في مختلف الانجار الحرجية والمثمرة .

٢٣٢٨٠ - كُتْنَة ، كُوتَيْلَة

Hymenaea verrucosa (S). Copalier, Hyménée ver-rueuse (F). Gum copal tree (E). Henschrecken-baum (D). Imeneo (I).

شجرة حرجية من فصيلة القرنيات . مهدا افريقية الجنوبية وبنفسكر . ساقها كثيرة اللعوم متوسطة الارتفاع تملو نحو ١٠ اثمار . غشها صلب المكسر احمر اللون مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالثقب عصارة صفية رائتجية صفراء اللون فواحة العرف المستحب تدعى كوبال شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٣٢٨١ - كُتَيْمِيَّات ٥
Tuberculariaceae (S).

Tuberculariades (F). Tuberculariaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الهيفانيات ورتبة الزريعات . اجناسها وانواعها عديدة تجمعها عمارتان : اللطحاتيات والوطحاتيات .

٢٣٢٨٢ - كُتَيْلَة ٥
Tuberculina (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الوطحاتيات وفصيلة الكتيقات . جراهه الكتيقي بسيط التركيب قليل الفروع . كئائده وسيدة المدلة كروية او اسطوانية الشكل || انواعه قليلة العدد والاذى تركب اوراق بعض الصنوبريات والاجاص البري فتوشها ببثور صغيرة القد لوها الى الحمرة البنفسجية .

٢٣٢٨٣ - كُتُوم

Imperméabilité (F).

Impermeability (E).

الكثوم والكثام هي خاصة مسك الماء في بعض انواع التربة . وهي من عيوب التربة الزراعية لانها تجعلها شديدة الصلابة والاندماج .

٢٣٢٨٤ - كُتُوم ، كُتيم ، مِكتام

Imperméable (F). Impermeable (E).

نمت وصفة التربة التي تمسك الماء .

٢٣٢٨٥ - كُتَيْبَلَة ٥

Kitaibella (S).

Kitaibélie (F).

جنية معمرة برية وتزبينية من فصيلة الحجازيات معقودة التعريف على اسم البوتاني المخفاري بولس كيبيل (١٧٥٧-١٨١٧) ساقها فرعاء تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها متعاقبة خاسية التفصيص . نصلها جبل الخضار . مسن الحافة . ازهارها ابوية الارتكاز ، كبيرة القد ، خاسية البتلات ، يفضاء اللون .

٢٣٢٨٦ - كُتَيْبَعَة ٥
Pleurobranchus (S).

Pleurobranche (F). Pleurobranchus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيقيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة .



كتيلة



كتاب

Amphicomma (S).

٢٣٣١١ - كَحْص

Pomme (F). Apple (E).

٢٣٢٩٦ - كَلَّة

الكَلَّة : ثمرة التفاح . ج كَلَل .

Amphicome (F).

Pommé (F).

٢٣٢٩٧ - كَفَلِي ، كَفَاحِي

Grown to a round head (E).

ما كان شكله شكل التفاح .

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة البقوليات .
أنواعها المروفة قليلة . بعضها تملو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم .
أوراقها متناقية . ريشية ورية . أزهارها عنقودي التجميع ،
طرفي الإزتيكار . أزهارها جرسية الشكل متدلية ، مستطيلة
الأنابيب ، خلية البثرة ، ودية أو برتقالية اللون . حب
ثمّارها يشبه بعين الجراد . جذورها لحية غليظة مستطيلة
يقال أنها نافعة .

Corbeille de fleurs (F).

٢٣٢٩٨ - كُفَنَة

Dune (F). Dune, Sand-hill (E).

٢٣٢٩٩ - كَفْتِيْب

رمال تسفوها الريح لا تستقر على حالة . ج أكنية
وكثبان .

Orcanette tinctoriale (F).

٢٣٣١٢ - كَحْلَاء

Polyvalent (F).

٢٣٣٠٠ - كَثِير التَعَادُل

Adragant (F).

٢٣٣٠١ - كُفَيْزَاه

راجع اسطرغالوس كثيره .

Spare marron, Rousseau (F).

٢٣٣١٣ - كَحْلَاء

٢٣٣٠٢ - كُفَيْزَاه بَيْضَاء

Astragale gommifère (F).

راجع اسطرغالوس ديق .

Alcool (F).

٢٣٣١٤ - كُحُول ، سَبِيرُو

Alcohol (E).

كلمة عربية الأصل تطلق على طائفة من المركبات العضوية
السايلة المتطايرة المتشابهة الخواص || عرف الإنسان
الكحول منذ زمن بعيد . وهي على أنواع عديدة أشهرها
الكحول الايثيلية أي كحول النّب والثّار والمواد السكرية
والنشوية والكحول المشيلة أي كحول الخشب || فالكحول
الايثيلية النقية سوائل عديمة اللون ، قليلة الرائحة التبرجية
لاذعة الطعم ، تحوي ٩٥ ٪ من الكحول و ٥ ٪ من الماء .
وهي تغل في ٧٨ ٪ سبغ . وتختلط بالماء بأية نسبة كانت
ومن خواصها أنها تذيب أكثر المركبات العضوية
وبعض الاملاح المعدنية وهي تشتت في الموالء . تستعمل
كشروبات رحيّة وفي المركبات الطبية وفي صناعات
كثى || أما الكحول المشيلة فهي تستعمل من نشارة الخشب
بعد معالجتها بمخاض الكبريتيك المركز . وهي تستعمل
كوقود وفي مختلف الصناعات والطلاء والتطهير .

Polychètes (F).

٢٣٣٠٣ - كَثِيرَات الهَلَب

Polychaeta (E).

رتبة من الحلقيات المفرديات . فصائلها وأجناسها وأنواعها
عديدة . جميعها بحرية . تتميز بفتوحها الكثيرة الهلب
وبرؤوسها الزائفة العالاء وبوجود الخياشيم والأرجل
والأولاس . بعض أنواعها يفرز مواد قسغورية تقيء في
الظلام . معظم أنواعها منفصل الشق وبعضها خثوي ||
وهي تقسم إلى قسمين : كثيرات الهلب الجواله وكثيرات
الهلب الركينة . فالجواله تجوب الشواطئ وتعيش على
الزبل وبين الحصى والصخور والفوس والضرع ... أما
الركينة فتعيش ضمن أنابيب كلسية المادة أو في أنفاق
تخفرها في رمال القاع وتبطنها بمادة كلسية أيضاً .

Alcool éthylique (F).

٢٣٣١٥ - كُحُول إِيْلِي

Ethylic alcohol, Ethyl alcohol (E).

يوجد بكميات قليلة في بعض ثمار نباتات الفصيلة
الصبوانية وهو يتكون خاصة في أثناء التخفير الكحولي
الذي يبين على المواد السكرية المختلفة .

Mille-pattes (F).

٢٣٣٠٤ - كَثِيرَة الأَرْجُل

صف من الحيوانات الفصيلة يعرف بالسدخايعات . راجعها

Dense

٢٣٣٠٥ - كَثِيْف

صفة ما كان له الشيء .

Alcool amylique (F).

٢٣٣١٦ - كُحُول أَمِيلِي

Amyl alcohol (E).

كحول يستخرج من البطاطا والشوندر والثّار والحبيب بعد
تخميرها .

Endophyte (F). Endophyte (E).

٢٣٣٠٦ - كَثِيم ٥

نعت تعريفي يطلق على كل حي يعيش داخل حي آخر
أن من الحيوان أو النبات أو من الاثنين معاً كالحشرة
التي تعيش داخل الزهرة أو الثمرة .

Alcool méthylique (F).

٢٣٣١٧ - كُحُول مَشِيلِي

Methyl alcohol (E).

ويسمى روح الخشب كحول يستخرج من الأخامات الخشبية
واللغية المختلفة .

Cajan (F).

٢٣٣٠٧ - كُجْنُوس

هو الكنيس ، اطلبه .

Alcool absolu (F).

٢٣٣١٨ - كُحُول مُطْلَق

Absolute alcohol (E).

هو الكحول الصرف عيار ٩٧ ٪ سبغ .

Alcométrie (F).

٢٣٣٠٨ - كَحَالَة ٥

هي قياس الكحول .

Alcool dénaturé (F).

٢٣٣١٩ - كُحُول مُعَيَّب

Denatured alcohol (E).

أنواع من الكحول يجب القاءون تخميباً بالتلون منأ
لاستعمالها في المشروبات الروحية .

Vipérine rouge (F).

٢٣٣٠٩ - كَحَالِي

هي الاخوين الخمرى ، اطلبه .

Raisin vert (F).

٢٣٣١٠ - كَحَب

هو البروق أي الحمصر منه نهاية طور الحوضفة . يقال
كحب الكرم وأكحب اذا لوح عنه . واحده كحبة .

٢ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة ، ملحوفة . عيونها بارزة . تأثيرها ولامستها نظامية . قرونها الاستثمارية دبوسية الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كوالسها نصف دائرية الشكل . اغادها لاحقة . قوائمها نشيطة . ارساها خاسية العقل . اثارها ملونة || جميعها واشمة تعيش على الازهار وتمضي بيئاتها الشوي تحت اللحاء . يرقاتها مؤذية تقضم تحوت الازهار والمبيض والجراهم تنقضي عليها || اشهر اجناسها الكحيصة .

Eternuement des bêtes (F). **كُدَّاس** - ٢٣٣٢٩
Sneezing of beast (E). هو عطاس البهائم .

Moyette, Dizeau (F). **كُدَّاسَة** - ٢٣٣٣٠
Hay cock, Shock, Stook (E). مجموعة عامات من الحصيد تهرم وتكدس وتحفظ رطبا تُدرَس .

كُدَّال مُتَوَجَّه - ٢٣٣٣١
Gubernatrix cristatella (S).
Commandeur huppé, Cardinal vert (F).

مائل من فصيلة التشرشوريات ورتبة الجواثم غروريات الناقير . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى ومنها البرازيل . يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . نظامه الحياتي جماعي الا في زمن الترخيم || جسمه صغير القد ، يطول من ١٨ الى ٢٠ سم . ثوب الذكر متراكب الالوان الجميلة . ظهره الى الشبهة انضغاص المالح . صدره ويطن ولواحت جناحيه وافيته الى الصفار الزاهي . قبتيره ورأسه وعقته الى السواد الاسفع . منقاد حشطي اللون . رسنه الى السررة السوداء . اما الانثى فصدرها الى الشبهة ويطن الى الخضار الباهت . صدغها ومصرها الى البياض العاجي || قوته الحشرات والبدور . يألف حياة الاسر ويميش ويتكاثر في القفص شرط ان يكون فسيحاً || يدثن عشه بين اُتُناد الانجبار القريبة من سطح الارض . الانثى تحضن على مرتين في الحول . حشنتها من يعضين الى ثلاث يعضات تقوم برعيها دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

Mouvement (F). **كُدَّاهَة** - ٢٣٣٣٢
Movement (E). الكدامة هي الحركة ، اطلها .

كُدَّاهَة - ٢٣٣٣٣
Leptodactylus (S).
Leptodactyle (F). Leptodactylus (E).

جنس ضفادع قازية من فصيلة الكدمايات . انواعه المعروفة ستة مهدا المناطق الاستوائية الامريكية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٦ الى ٨ سم . عند الذكور ومن ٧ الى ١٠ سم . عند الاناث . رؤوسها معتدلة والبصر . عيونها مستديرة جاحظة . فكوكها السفلى عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الخلفية نصفية الخطاب . جلودها مثالة دقيقة الصول || اثارها الى السررة الخضراء الناقية الالزمة لتعلوها رقتة جزئية على الظهر ، صفراء على البطن || تعيش قرب المنابع ويجاري الماء اكثر من عشرة اعوام . تسرح في الليل وتبيت في النهار بين اوراق النبات او في المنابع . قوتها الحشرات والديدان || الانثى تسرا نحو ٥٠٠ دعبلة في شلة تطرحها في مكان منتخب قليل العمق لا تتجاوز مساحته المتر المربع الواحد تطوقه بالسهال والخز والنباتات المائية المختلفة .

كُحُولاز ، زِيمَاز - ٢٣٣٣٠

Alcoholase, Zymase (F). Alcohohase, Zymase (E). خيرة كياوية تحول السكر على اختلاف اشكاله الى كحول وفاز كربوني .

Spiritueux (F). **كُحُولِي** - ٢٣٣٣١
Spirit, Spirituous (E).

نعت تعريبي يطلق على السوائل التي تحوي بعض الكحول .

كُحَيْبَة - ٢٣٣٣٢
Stilbella (S).
جنس فلور مجهرية من عمارة الخثيات وفصيلة الكحيبيات . يتميز بكرميته المستطيلة القضيبان الدبوسية الرأس . بويغاته كروية الشكل ، صغيرة القد || انواعه المؤذية قليلة امهرها كحيبة الشاي .

كُحَيْبَة الشاي * - ٢٣٣٣٣
Stilbella theae (S).
فلر مجري يتطفل على افاد الشاي . مظهره الخارجي يقع خلية زياء تشبه القنابر تركب لحاء الافناد . تلبو وردية اللون ثم يبيض . مشجيه يسير في الارعية وقد يستقر في قم الافناد فيوقت نموها ويسبب ياسها || يكالنج (١) باقتطاع الاغصاء الموصية وحرقها . (٢) بتطهير الجروح . (٣) بتفضيض التربة لصفوف المياه الزائدة التي تسبب هذا الورم .

كُحَيْبَة - ٢٣٣٣٤
Stilbaceae (S).
Stilbacées (F).
فصيلة فلور مجهرية من مرتبة الميفانبات ورتبة الزويات تتميز بكتائدها المجموعة الى كرميات . هيئها لا نظامي الاكثر منه المنتصب المتوازي ومنه المتشابك اللانقياسي الترتيب . مشجيهه فربي الثول . بويغاتها قلادية التنجيج . اجناسها عديدة تجمعها عمارتان الخثيات والمودانيات .

كُحَيْبَة - ٢٣٣٣٥
Crypte (F). Crypte (E).
كحيبة ج كحيثات . الكحيثات ، جسوريا ، اسم يطلق على غدييات صغيرة او انايبس نحيلة ، غير نافذة ، تشب في القننة الخضمية عند بعض الحشرات .

كُحَيْبِيلَة - ٢٣٣٣٦
Fauvette orphée (F).
طائر من الدنل ، اطلب دخلة غريبة .

كُحَيْبَة - ٢٣٣٣٧
Phalacrus (S).
Phalacre (F). Phalacrus (E).

جنس حشرات واشمة من فصيلة الكحيبيات ورتبة غدييات الاجنحة . اثارها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في بعض المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، بيضيه الشكل ، تطول نحو ٣ سم . رؤوسها غروريطه ، صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها ولامستها نظامية . قرونها الاستثمارية دبوسية الاطراف . كوالسها محدودة نصف دائرية الشكل . اغادها لاحقة يملوها تحديد نحيل ، قاطب . قوائمها نشيطة . اثارها ملونة || جميعها واشمة تعيش على الازهار . يرقاتها تقضم تحوت الازهار ويبيضاتها .

كُحَيْبِيَّات - ٢٣٣٣٨
Phalacridae (S).
Phalacridés (F). Phalacridae (E).

فصيلة حشرات واشمة من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، بيضيه اللون . تطول من



كحيبة الشاي



كحيصة

٢٣٣٤٧ - كَدَو

Lenteur (F).

Slowness, Tardiness (E).

يقال كدت الارض اذا بطل نباتها . وربة كاداة اي بطيئة الانبات .

٢٣٣٤٨ - كَدَوَة

Leptosphaeria (S).

جنس فطور مجهرية من السخابيات وفصيلة العشويات . تتميز بأصنافها الغائرة في نسيج النبات النضار وبيوضها الوشي الشكل الملون والمديد اللزج المتعرضة || أنواعه عديدة أشهرها ما يتبع .

٢٣٣٤٩ - كَدَوَة الأرز

Leptosphaeria salvinii, Helminthosporium sigmoideum, Sclerotium oryzae (S).

فطر مجهرى يركب الارز في جميع اعضاء الحولية فيؤذيها ويعطيها || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة مهيبة ، لون عورها الى الجوزي ثم يزداد اسمرارا مع اقترابه من الاطوار المتأخرة || تركب المصغ والسوق والسبيل || اغراضه تختلف باختلاف انتشاره واذا || يكافح بتطهير الشلب المعد الى البذار .

٢٣٣٥٠ - كَدَوَة الحنطة

Leptosphaeria tritici (S).

فطر مجهرى يركب عصف الزروع وانحصا الحنطة ثم الشعير والشونان والشيلم || مظهره الخارجي بقع صفراء تتشعب على المصغ والاعناق تسبب جفافها الباكر . اغراضه تقوم على مدى نتائج انتشاره لانه يعيق نمو النبات ويحد من نشاطه .

٢٣٣٥١ - كَدَوَة السُّقْدَرَة

Leptosphaeria rusci (S).

فطر مجهرى يصيب بعض انواع السقندر وأخصها السقندر الالاس || مظهره الخارجي نكت كثيفة لثولية الشكل تكثف الانفاد تسبب ذبولها وجفافها || يكافح باستعمال سائل بورديو وغيره من السوائل السلفوقلسية .

٢٣٣٥٢ - كَدَوَة السَّلْم

Leptosphaeria napi, Pleospora napi, Alternaria exitiosa, A. brassicae, A. herculea, Macrosporium brassicae, Sporodermium exitiosum, S. brassicae (S).

فطر مجهرى يصيب بعض النباتات السليبية وأخصها السلم واللفت والملفوف والفجل ... || مظهره الخارجي بقع شقر تملأ سطح المادة الخضراء في السوق والاوراق والخريفات تسبب يباس النسيج وجفاف الخريفات وتجفيفها وانفلاتها || ومنهم من قال ان عفن جلور اللفت يعود الى هذا الفطر الذي يتكاثر بسرعة مذهلة اذا لامته العوامل الجوية وأخصها الرطوبة || يكافح بتطهير البذار .

٢٣٣٥٣ - كَدَوَة الشَّوْفَان

Leptosphaeria avenaria, Septoria avenae (S). Maladie des taches sombres (F). Oat leaf spot (E).

فطر مجهرى يركب عصف الشونان فيؤذيها ويبيد الى نحو . مظهره الخارجي بقع صغيرة مبيضة الى اتصال المصغ ، تبدو اقل اخضراراً من النصل ثم تسمر بعد ان يملؤها في وسطها نكتات خلية بيضاء || اغراضه زعديرة لانه قليل الاذى والاساءة .

٢٣٣٥٤ - كَدَوَة الصَّجَمَان

Leptosphaeria herpotrichoides, L. culmifraga, L. amphibola (S). Piétin-verse des céréales (F).

فطر مجهرى يركب سوق الزروع أخصها الشيلم والحنطة



كدة الارز



كدة الحنطة



كدة السلم



كدة الشونان

٢٣٣٤٨ - كَدَمَات ٥ Leptodactylidae (S).

Leptodactylidés (F). Leptodactylidae (E).

فصيلة حيوانات ديداء قازية من الرقيات السويات ورتبة البتروات اي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها عديدة . مهدا امريكة الوسط واسترالية . مظهر انواعها قارب ومها البري والمائي والشاخر والجالس . جميعها مسنة الفكوك العليا ، عادمة الانسان في السفلى . وفرة عجزها شبه غالية من التنوعات العظمية الجانبية || أشهر اجناسها واعرفها الكدامة والالوزيا والحيلود والسيراتوفريس .

٢٣٣٥٥ - كَدَمَان (E). Schist, Slaty rock (E).

أرتبة صفيحية التركيب مرقصة متوالية صلبة المكسر .

٢٣٣٣٦ - كَدَر Lie (F). Lees, Dregs (E).

كل مادة ترسب في قعر الابعية التي تحفظ فيها المشروبات الكحولية ويبرها كأكبر والزيوت .

٢٣٣٣٧ - كَدَرِيَة Ganga cata

طائر من القطا يعرف بقطاة كدرية ومنهم من قل كدارية . الجلع كدرى وكدارى وكدر .

٢٣٣٣٨ - كَدَس ، كَدَسيس Bottelage (F).

جمع الحشيش وامثاله الى اكادس . Tying up in bundless (E).

٢٣٣٣٩ - كَدَس ، كَدَس Entasser (F).

جعل الشيء كدسا بمعنى على بعض . To hoard up (E).

٢٣٣٤٠ - كَدَم Tondre le gazon (F).

كدم الحضر جزء بالكدامة او المكدمة . To mow a grass (E).

٢٣٣٤١ - كَدَم نوع من الجراد سود الاجسام خضر الرؤوس الواحدة كدة .

٢٣٣٤٢ - كَدَمَة Brebis grasse (F).

نجة سمينه غليظة . Fatted ewe (E).

٢٣٣٤٣ - كَدَمَة Ecchymose (F). Ecchymosis (E).

أثر نفسيجى او احمر اللون يظهر في الجلع عقب جرح او رضه سببه انكساب الدم تحت الجلد .

٢٣٣٤٤ - كَدَمِيَوْم Cadmium

معادن ثنائي الذرة ، ابيض اللون ، ازرق الموانج ، لدن المادة ، قابل التصفيح ، شديد المظولية ، اصلب من القصدير . قله النوصى براوح من ٨٦٠ الى ٨٦٩ رمزه (كد - Cd) وزنه الانويى ١١٢.٤١ ينصهر تحت ٣٢٠ مع . ويبل في ٨٦٠ مع . بخاره ذوائى ، شديد الاذى ، يرتاقى اللون ، يتكثف بلورات ثمانية الارجح من المدن التي الحر . وهو يذوب في بعض المحامض منها الكبريتي والازوتي والكلوريدىيكي .

٢٣٣٤٥ - كَدَن Frutescent (F). Graze (E).

نمت تمرينى يدل على الاصول الصلبة في النباتات الجنبية .

٢٣٣٤٦ - كَدَه Talure (F).

عارض فيزولوجي يعترى لاه الاجمار .

٢٣٣٦٣ - كُرَات ، كُرَب Scariflage (F).
هو السلف أي الحُرث السطحي بالمسلفة يبعثر ذرات التراب ويفتت المدر ولا يقلب التربة .

٢٣٣٦٤ - كُرَات
شجر كبير بجبال الطائف . الواحدة كرات (أ. م.) .

٢٣٣٦٥ - كُرَات البَرَّ ، طَيْطَان

Allium vineale (S). Ail des vignes, Porreau sauvage, Porrette (F). Crow garlic, Crow onion (E). Hundslauch, Feldlauch (D). Aglio cipolla (I).

نوع من الكرات البري يكثر في الكروم . دوفسته مستديرة مبطلة . أوراقه مستطيلة تعرض من ٨ إلى ١٥ سم . لونها إلى الخضار البحري المائي . شراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . نوره صيوانية كروية الشكل ، أزهارها إلى البياض الودي المواج .

٢٣٣٦٦ - كُرَات الدُبَّ * Allium ursinum (S).

Ail des ours, Ail des bois (F). Bear's garlic, Ramsons, Wild-leek (E). Bärenlauch, Wilder Knoblauch (D). Aglio confoglio pedunculata (I).

نوع من الكرات البري الميزل . أوراقه مستطيلة مستعرضة . شراخه يعلو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . نوره صيوانية كروية ، أزهارها غبراء اللون وريدة المواج .

٢٣٣٦٧ - كُرَات الصُّخُور * ، كُرَات إسبانيا

Allium scorodoprasum (S). Ail rouge, Rocambole, Ail d'Espagne (F). Rocambole, Sand leek, Spanish garlic (E). Grasilauch, Rocambole (D). Aglio di Spagna, Scalogno di Spagna (I).

نوع من الكرات المعمر . شراخه الزهري ينتهي بنورة صيوانية كروية تكتنفها الأوراق الزهرية والفصوص الخلفية الشكل . أزهاره إلى البياض الأخضر يعلو مواج أحر . زراعته شائعة في أروبة وهو أقل مادة حريفة وفعالة من الثوم . يتكاثر بالفصوص لأنها اصعدت وأسرع من البزور . يوجد في جميع الأتربة غير أنه يفضل الدبالية .

٢٣٣٦٨ - كُرَات عَسَقْلُون * ، كُرَات أندلسي
كُرَات أَبُو شَوْشَة ، قُفْلُوط

Allium ascalonicum (S). Echalotte (F). Ascalonian garlic, Shallot (E). Eschlauch, Schalotte (D). Cipollina, Scalogno (I).

نوع من الكرات الزراعي الشائع الاستعمال . زراعته من البزرة إلى البوصة تستلزم ثلاث سنوات . يوجد أيتها زرع ولا يخفى سوى الأتربة الكلسية . يقال أنه طيب ويستعمل كطارد للديدان الموية .

٢٣٣٦٩ - كُرَات مَعْرُوف * ، كُرَات رُومِيَّ

Allium porrum (S). Poireau, Porreau (F). Leek (E). Lauch, Porree, Porrei (D). Porro (I).

بقلة زراعية معلقة شائعة الزراعة والاستعمال . يصلها اهليلجية الشكل . أوراقها قرصية متتابعة حاشية ، نصلها مستطيل الصنفعة عابق الخضار . شراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . ينتهي بنورة صيوانية كروية الشكل أزهارها إلى الحمرة . يرغب في الأتربة الدبالية التوسطة الانحدار . يبلو في أكواد خاصة وينقل إلى مستقره عندما يبلغ ارتفاعه نحو ١٥ سم . تقطع أوراقه وتكدم جذوره ثم يصار إلى غرسه .

والشعير والثوفان فيسبب قصفها في ايان تحبيب السنايل أو قبل تمام الإدراك . مظهره الخارجي بقعة سمراء مستطيلة تكتنف غمد الشرافت بالسلاية الأولى حيث تعلب جدار القصبة . ثم يعلو مع الزرع من غمد إلى غمد بعد أن يدخل في التربة حتى مستوى الجذور الأولى فيمتطها بنشأة فعمية لبدة تمرقل التبادل الشفني إن لم تقض عليه .

٢٣٣٥٥ - كُدَّوَة الفِصَّة ٥

Leptosphaeria circinans (S).

فطر مجهري يصيب الفصّة فيؤذيها ويشلل نشاطها . مظهره الخارجي بقع خلية بنفسجية اللون لاقياسية الشكل والحجم تركب الجنت والجذور فتعطيا وتشل نشاطها وقد تسبب ذبول النبات وموته . لم تنجح فيه مكافحة حتى الآن .

٢٣٣٥٦ - كُدَّوَة المُرَّ ٥

Leptosphaeria musarum (S).

فطر مجهري يركب أوراق المُرَّ فيؤذيها بعض الشيء . مظهره الخارجي لطح حنطية لاقياسية الشكل والحجم تركب نصل الأوراق وتسبب جفاف النسيج المتحار . أضراره زيدة لانه قلما يعزل ويؤخر تبادل النسج . يكافح باستعمال الفطاري غير المركزة على النحاس .

٢٣٣٥٧ - كُدَّوَة الورْد ٥

Leptosphaeria coniothyrium, Coniothyrium Fuckelii, Septoria sarmenti (S).

فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الورد والمعلق والموجع والكشمش والخمضيات . مظهره الخارجي كلف باهت اللون لاقياسي الشكل والحجم يعلو النواحي فيسبب ذوبها كما في الورد والموجع ، ويملأ نصل الأوراق كما في الخمضيات فيؤذيها ويؤخر نشاطها . ومن العلماء من قال أنه يصيب النبات الضعيف دون غيره . يكافح بتسميد النباتات الضعيفة وباستعمال أحد الادوية الفطورية اعخصها سائل بورديو وسائل سلفوكسليك .

Cystocarp (F).

Cystocarp (E).

اسم يطلق على كل مجموعة من البوغ أو أكياس البوغ عند الخياش الحمر .

٢٣٣٥٩ - كُدَّيس الزَبَاك هو رباح دنفله ، اطلبه .

٢٣٣٦٠ - كُدَّان ، نِسْفَة ، خَفَّان Ponce (F).

Pumice (E).

حجارة خفيفة نخرة يكثر وجودها عند مرعى الموج .

٢٣٣٦١ - كُدَّو * ، كُورْبَرِيل

Hymenaea courbaril (S). Hyménée courbaril, Courbaril (F). Courbaril tree (E). Kourbaril (D). Courbaril (I).

شجرة حرجية كبيرة القد حيلة الشكل من فصيلة القزليات . مهددا البلاد الافريقية الحارة . ساقها منتصبه فراء تملو من ١٥ إلى ٢٥ م . خشبها صلب المكسر ، ناعم الرقة ، جزوي اللون ، صناعي الاستعمال ، مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالخز حليب غزير المادة الراتنجية ، اصفر اللون ، منتحب العرف يدعى « كوربرين » يستعمل كطلاء فاخر الصنف .

٢٣٣٦٢ - كِرَاء Louage (F).

رابع اجارة .



كُدَّوَة المُرَّ



كُدَّوَة الورد



كُدَّو



كرات الدب

كرات البر



كرات الصخور



كرات معروف



كرات صفلون



كُرَاتٌ نَبَيطِيَّةٌ



كُرَاتٌ وَرْدِيَّةٌ



كُرَاتُةُ الْحَرَاةِ



كُرَاتُةُ الْخَوْرُجِ



كُرَاتُةُ الْكَلْوَرِ



كُرَاتُةُ الشَّمْشِ



كُرَاتُةُ الْمَيْسِ الصَّغِيرَةِ



كُرَاتُةُ عَشْنَةِ

٢٣٣٧٨ - كُرَاتُةُ الْمَيْسِ *، سَكُولِيَتِ الْمَيْسِ
Scolytus scolytus (S). Grand scolyte de l'Orme (F).
Larger European elm bark beetle (E). Großer
Ulmensplintkäfer (D).

حشرة من الكراشيات. جسمها مفلطح الشكل مقطوع
الطرف. طولها نحو ٦ م. رأسها وصدرها وكولها الى
السواد الازرق المواج. غداها الى الجوزة العنابية. تركيب
الميس وبض الاجزاء التزيينية فتخلج الشكير وتوقع به
اشد الاذى.

٢٣٣٧٩ - كُرَاتُةُ الْمَيْسِ الصَّغِيرَةِ *

Scolytus multistriatus (S). Petit scolyte de l'orme
(F). Lesser European elm bark beetle (E). Kleiner
Ulmensplintkäfer (D).

حشرة من الكراشيات. جسمها مفلطح الشكل اسطواني
الحية يطول نحو ٤ م. رأسها اسود اللون. جسمها كستني
اللون. غداها سطحية التخذيد. تركيب الميس ولا تغت
من الاجزاء المثمرة فتخلج شكير الاغصان والافئاد وتوقع
به اشد الاذى.

٢٣٣٨٠ - كُرَاتُةُ خَشِيبَةِ *، سَكُولِيَتِ خَشِيبِ

Scolytus rugulosus (S). Scolyte rugueux, Petit scolyte
des arbres fruitiers (F). Fruit bark beetle, Shot-hole
borer (E). Ruzzeliger Obstbaumpinnkäfer (D).

حشرة من الكراشيات، طولها نحو ٣ م. كولها اسود اللون،
غداها الى الجوزة البنية. تركيب جميع الاجزاء المثمرة
اغصانها الفتاح والكرز والخوخ فتخلج شكير الاغصان
وتوقع به اشد الاذى. لها جيلان في الحول. بيائها الشتوي
يحصل في الطور البرقي.

٢٣٣٨١ - كُرَاتُةُ لَامْتَجَانِسِلَةِ

Xylébore disparate (F).
خنفساء مؤذية تدعى كُرَاتُةُ الْحَرَاةِ، اعطاه.

٢٣٣٨٢ - كُرَاتُشِيَّاتٌ *، سَكُولِيَتِيَّاتٌ *

Scolytidae (S). Scolytidae (F). Scolytidae, Bark
beetles, Engraver beetles (E). Borkenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها
عديدة جميعها صغيرة القد. اجناسها اسطوانية. انوعها
الى السواد ومشتقاته والجوزي واللبي والحطبي. قرونها
الاستعدادية قصيرة، رفيقة او صرمانية. ارجاسها رابعية.
تميش باكثرها تحت لحاء الاجزاء وفي الشكير فتخلجه
وتعطيه ثم تمتع مكها الذي ينقف من رقات دقيقة تميش
على المواد النشوية والسكرية التي يفرزها النبات.

٢٣٣٨٣ - كِرَاضِ *، Sperme des oiseaux (F).

Sperm of the birds (E).
هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند الطير.

٢٣٣٨٤ - كُرَاعُ Tibia

الكراع من القدم والبقير بمنزلة الوطيف من الفرس وهو
مستند الساق. وقيل هو ما دون الكعب من البهائم. ج
أكرع وأكارع وكرعان.

٢٣٣٨٥ - كُرَامٌ Vigneron, Viticulteur (F).

Vine-dresser, Viticulturist (E).
من تعاطى زراعة الكرمة لاستثمار العنب.

٢٣٣٧٠ - كُرَاتٌ نَبَيطِيَّةٌ *، بَصَلُ الْعِصْرِثِ،
ثُومُ الثَّرَقِ

Allium ampeloprasum (S). All d'Orient, A. à cheval,
Poireau sauvage, Pourrai, Pourriole (F). Blue-leek,
Vine-leek, Wild-leek (E). Perl Lauch, Wilder Lauch
(D). Porro salvatico, Porro bastardo (I).

نوع من الكراث البري المبذول. اوراقه مسطوية،
مستعرضة، شديدة الخضار. شمره يملو من ٣٠ الى
٦٠ سم. ينتهي بنورة صيوانية قلنسوية الشكل،
ازهارها الى البياض الاغبر.

٢٣٣٧١ - كُرَاتٌ وَرْدِيَّةٌ *، قُرْطُ

Allium roseum (S). Ail rose (F). Rosy-flowered garlic
(E). Rosen Lauch (D). Porro piccolo (I).

نوع من الكراث البري والزرع المأكول. دوفسته يفضية
الشكل سمراء اللون تحويها فصوص خلبية صغيرة القد.
اوراقه مسطوية محددة تعرض من ٥ الى ١٢ م. شمره
الزهري يملو نحو ٧ سم. ينتهي بنورة صيوانية كروية،
ازهارها وردية اللون.

٢٣٣٧٢ - كُرَاتِز Menon (F).

تيس أو كيش يقود القطيع.

٢٣٣٧٣ - كُرَاسُولا Crassula (F).

هي الكرنب، اعطيه.

٢٣٣٧٤ - كُرَاتُةُ الْحَرَاةِ *

Xylébore dispar, Anisandrus dispar (S). Xylébore
dispar (F). Shot hole borer (E). Ungleichler,
Holzböhrer (D).

حشرة من الكراشيات. ثوبها الى السمرة السوية. الذكر
اصغر قدماً من الانثى التي يراوح طولها من ٣ الى ٤ م.
تركب الاجزاء الخرجية على اختلاف فصائلها واجناسها
ولا تغت عن الدراق والمشمش والجوز. تخلج الشكير
وتسرده على حدود الخشب حيث تمتع المكان.

٢٣٣٧٥ - كُرَاتُةُ الْخَوْرُجِ *، سَكُولِيَتِ الْخَوْرُجِ

Scolytus pruni (S). Scolyte du prunier, Grand scolyte
des arbres fruitiers (F).

حشرة من الكراشيات طولها نحو ٥ م. رأسها وكولها
وصدرها الى السواد اللامع، غداها وبطنها الى العنابي
الزاهي. تركيب الخوخ وسائر الاجزاء المثمرة فتخلج
الشكير في السوق والاغصان. لها جيلان في الحول.
بيائها يتم في الطور البرقي.

٢٣٣٧٦ - كُرَاتُةُ الْكَلْوَرِ *، سَكُولِيَتِ الْكَلْوَرِ

Scolytus amygdali (S). Scolyte de l'amandier (F).

حشرة من الكراشيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. ثوبها
كستاني اللون حطلي المواج. تركيب معظم الاجزاء
الورزية اغصانها الورز فتخلج الشكير وتعطيه.

٢٣٣٧٧ - كُرَاتُةُ الْمَشْمِشِ *

Xylébore saxenli, X. xylographus (S). Xylébore
de l'abricotier, X. xylographe (F). Flat-celled shot
borer (E). Borkenkäfer, Kleiner Holzböhrer (D).

حشرة من الكراشيات جسمها اسطواني الشكل، قصير القد،
يطول نحو ٢ م. ثوبها الى الحطبي العابق || تركيب
اغصان المشمش فتخلج الشكير وتعطيه.

Porcellio scaber (S). * كَرْبَس ٢٣٣٩١
Porcellion (F). Porcellio (E).

دودية من القشريات مساويات الارجل من فصيلة
الظروبيات مبلولة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتعددة
الحارة || جسمها قليل الصلابة، صغير القد، سمي
التركيب، يطول نحو ٨ سم. عند الذكر ونحو ١٤ سم.
عند الانثى. رأسها صغير الحجم. متحركا قارض.
قربها الاستعمارية اربعة. جرابها صغيرة. تربيها
ينتهي بأربع زوائد لامتناهية القد. ثوبها الى الطلحة
الرصاعية الملوحة. مدها اغبر || تألف المواعظ الربطة
والواقية والسكان الارضية حيث تعيش بمعية حمار قبان،
وفي مثله بطيئة الحركة تسمى يهدو وتتكاثر عند الشعور
بالخطر || تسرح في الليل وتبيت في النهار. قوتها المواد
العضوية المنحلة وبعض اوراق البقول وسوقها وعساقها
ويطورها.

Grape-fruit ٢٣٣٩٥ كَرْبُورُوت
هو ليمون الجنة، اطلبه.

٢٣٣٩٦ كَرْبَل
هو الشفش، نوع من الاسماك، اطلبه.

Kalmia (S). * كَرْبَل ٢٣٣٩٧
Kalmie (F). Calico-bush (E). Kalmie (D). Calmia (I).
جس نباتات معمرة من فصيلة الخنجنيات. انواعه عديدة
جميعها سامة الاوراق والازهار. منها الارضية الربلية. منها
الانجبار والشجيرات والجنبات والاعشاب. معظمها بري
وبعضها تزيين. اوراقها كاملة ابيدة لا قياسية النظام
الدوري. ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز، خاصة
البتلات الثنائية الغضن، عشارية الاسدية، بحيلة الشكل،
مختلفة الالوان || اشهر انواعه ما يلي.

٢٣٣٩٨ كَرْبَلٌ بَحْرِيٌّ الْوَرْقِ
Kalmia polifolia, K. glauca (S). Kalmie glauque (F).
نوع من الكربل وهو بجلة سبروتية معمرة تملو من ٥٠ الى
٧٠ سم. ساقها فروع فروعها مفضلة. اوراقها متعاقبة
سنائية الشكل، نصلها يطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١ سم.
صفحة السفلى خلية البشرة بيضاء اللون، صفحة العليا
الى الخضار البحري. ازهاره علقية التجميع، هامة
الارتكاز، وردية اللون، ليلكية الملوحة || ازهاره يستمر
من نيسان الى ايار.

٢٣٣٩٩ كَرْبَلٌ زَهْبِيٌّ الْوَرْقِ
Kalmia hirsuta (S). Kalmie velue (F).
نوع من الكربل وهو عشبة سبروتية معمرة. شكلها شكل
الصنوبر. ساقها ليفية فروعها تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها
متعاقبة لاطنة صغيرة القد. نصلها يطول نحو ١٠ سم.
ويعرض من ٢ الى ٣ سم. وهو خلي البشرة على صفحته.
ازهارها ابطية، فردية، حراء اللون || ازهاره يستمر
من ايار الى حزيران.

٢٣٤٠٠ كَرْبَلٌ صَيْقُ الْوَرْقِ
Kalmia angustifolia (S). Kalmie à feuilles étroites (F).
نوع من الكربل وهو بجلة سبروتية معمرة تملو من ٦٠
الى ١٠٠ سم. ساقها خشوية فروعها. اوراقها متعاقبة
منقطة تملو نحو ٧ سم. ويعرض نحو ٢ سم. ازهارها علقية
التجميع، تاجية الارتكاز، وردية اللون || ازهاره يستمر
طوال شهر حزيران.

٢٣٣٩٦ - كَرْوَايَا *، كَرْوَيَاء، كَمْوَنُ اُرْمَي
Carum carvi (S). Carvi, Cumín des prés, Kummel
(F). Common caraway (E). Echter Kümmel, Kümmel
(D). Carvi, Comino tedesco, Kummel (I).
نبات من الاناثية وهي عشبة حولية من فصيلة الخيميات.
منها المروج والمراعي الجبلية وتزرع بكثرة. جميع اجزاء
النبات عطرية من الجذور الى الازهار والبرور وهي
تستعمل استعمال الانيسون وتدخل في تمليز الاسبان وسائر
المأكلا || بزورها حاضنة تفتح الشهية وتدر الغالب
وتنشط المعاصر المدية وتمنع التخم وحض الطعام
وتحلل الفلغ وتطرد الرياح وتدر البول. غير ان الاكثار
من استعمالها، يضر بالكلى || ويستخرج من بزورها
زيت طيار فاخر الصنف ذكي العرف.

٢٣٣٩٧ - كَرْب
اصول السنف الغلات المراض التي تقطع معها. الواحدة
كربة.

٢٣٣٩٨ - كَرْبَة، رَهَم
Emblaver (F).
حرت الارض وسمدا وبذرها. (E). To sow with wheat

٢٣٣٩٩ - كَرْبَايَا
Entelurus (S).
Entelure (F). Entelurus (E).

جس إملاك بحرية من عصيليات الخياشم وفصيلة زمارات
البحر. انواعه المعروفة قليلة العدد، اعطائها بعض مناطق
البحر الابيض المتوسط. جميعها دقيقة الاجسام المستطيلة.
اطولها تراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها غنية الاعظام
الحافرية اطرافها.

٢٣٣٩٠ - كَرْبَايَايَات
Flagellariaceae (S).
Flagellariacées (F). Flagellariaceae (E).
فصيلة نباتية من سحيدات الفلقة قريبة الشبه من الاسليات.
اشهر نباتاتها الكرباجية.

٢٣٣٩١ - كَرْبَايَا *
Flagellaria (S).
Flagellaire (F). Wild ratan (E). Wilder Ratang (D).
Flagellaria (I).
جس نباتات جذموية معمرة متسلقة من فصيلة
الكرباجيات. انواعها عديدة مهدها البلاد الحارة. تألف
المناق وضفاف الأنهار. اوراقها حاضنة، عصفية الشكل،
مستطيلة. نصلها سميكة الصفعة، بحري اللون، ينتهي
بجواق حلزونية مزدوجة.

٢٣٣٩٢ - كَرْبَة *
Carapa (S). Carapa.
Carape, Bois de Crabe (F). Crab-wood tree, Carapa-
oil tree (E). Carapa-Baum, Crabbaum (D). Carapa (I).
جس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الازدشتيات.
مهدها البلاد الاستوائية. تثبت قرب الشواطئ. وعل صفات
الاشجار. اشجارها كبيرة القد دالحة براوح ارتفاعها من
٢٠ الى ٣٠ م. ثمارها جراء ليفية التركيب تحض بعض
البور المختلفة الاشكال والاحجام، يستخرج من لبها
مادة دهنية مرة الطعم صفراء اللون يستعملونها في افريقية
لوقاية من الاجرات فيهدنوها باجسادهم واخشاب منازلهم.
وقد يستعمل دهن الكربة في صناعة الصابون. اما لحاء
الاشجار فليفية ويستخرج منها مادة مرة تستعمل استعمال
الكينا في مكافحة الحميات.

٢٣٣٩٣ - كَرْبِيْن
الكربز: القثاء الكبار الطول.



كاروايا



كرباجية




كربة



كربس



كربل



رقم ٦

شبكة صفائح الكرة الأرضية وما يحفّ بها من أسرار دفيئة

الشبكة المثقبة بتخوم الصفائح الكردية. أما مناجم النفط فعدت التقاطع. والدليل على ذلك منجم «تيومن» الذي يفوق كل حدّ.

تركيب التربة - النقص العنصري في تركيب التربة يسبّب بعض الشذوذ والغرائب في تطور النبات كما هي الحال في الرقبن ٢ و ٤ إذ أن ٧٥٪ من الأنواع الحيوانية والنباتية لا توجد إلا في هاتين المنطقتين. احتضنها منطقة بحيرة بيكال.

توزيع الطير - أنواع الطيور القواطع التي تجوب البلاد عديدة أشهرها تلك التي رجاعها محصور بمناطق معينة لا تتخطاها وهي رقم ١٢ و ٢٠ و ٤١.

الساحل الجوفية والبحرية.

عوارض بطائية - اعرفها حتى الآن الصدع الوسط - اطلسي الذي يمتد من رقم ١٠ إلى ٣٧.

الأشعاع الشمسي - المواقع المعرضة للضخ الأقصى تقع في الأرقام ١ و ١٧ و ٤١.

الانفجار الانوي - يقولون، بعد الأبحاث العلمي، أن انفجاراً نووياً وقع تلقائياً منذ ١٧٠٠ مليون سنة في حدود الرقم ٤٠. أما سببه فيعود إلى الأورانيوم ٢٣٥.

المعادن - مناجم المعادن تختشد طوال الخطوط

النواحي الزهية - عشر مناطق، توزيعها حول الكرة الأرضية متناسق الخطوط، تميّز بنواحيها المدهشة. يدخل في إطارها مثقت البرمود. المناطق العشر تحمل الأرقام ١٦، ١٨، ٢٠، ١٢، ١٤، ٤٧، ٤٩، ٤٣، ٤١ و ٤٥.

البراكين - معظمها واشدّها نشاطاً يقع على خطوط الصداع صفائح الغلاف اليابس الذي يأتي مباشرة تحت الغلاف الجوي.

جويكات - مراكز العصف محصورة في بعض عقد الشبكة وقد ينجم عنها زوايا وأعاصير لا قياسية الضغط والسرعة تسير مع الخطوط كما هي الحال في

٢٣٤٠٨ - كَرْبُوكْسِيلَاز Carboxylase
نوع من الأزيم الكبير المسئول في منظم أعضاء النبات .
نشاطه ينحصر بتأثيره في الحوامض .

٢٣٤٠٩ - كَرْبُونْلَه * Corbula (S).
Corbule (F). Corbula (E).



كربوس منقط

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة القفاليات . أنواعها المعروفة عديدة نحو ٧٠ ،
قسم منها أي نحو ٢٥ من متحجرات الاراضي الثانوية
والثالثية ، اما الباقى فتنتشر في جميع بحار العالم || احدائها
سميكة الصفحة ، بيضيه اللون ، لامتساوية المصاريح
المفصلة الاطراف .

٢٣٤١٠ - كَرْبُولِيغَاز Carboligase
أزيم شاذلة توجد في الخبز وفي التفاح وفي بعض اوراق
النبات . جهدها يماكس حميد الزيملز .

٢٣٤١١ - كَرْبُون Carbon (F). Carbone (E).
جسم بسيط رمزه (C) وزنه الاتومي ١٢.٠١ وهو
من عناصر المركبات العضوية الاساسية ان نباتية او
حيوانية . ونظراً لكثرة اهمية هذه المركبات الكربونية
فقد جعلوا الكيمياء العضوية لدراستها || والكربون لا
ينصهر وهو قابل للانقاد ويحل ويبدد الاصلية الحرارية
والكهربية || يوجد في الطبيعة على اشكال مختلفة احصاها
المبلورة كالاس والاسرب وغير المبلورة كالصمغ والساج .



كربوله

٢٣٤١٢ - كَرْبُونَات Carbonate
ملح الحامض الكربوني .

٢٣٤١٣ - كَرْبُونَات الْبُوتَاسِيُوم Carbonate de potassium (F). Potassium carbonate (E).
ملح ابيض سريع الذوبان في الماء يحوي من ٥٢ الى
٦٢ ٪ من البوتاس || يستعمل كصاب يوتاسي .

٢٣٤١٤ - كَرْبُونَات الْكَلْسِيُوم ، كَرْبُونَات الْكِلْس Calcium carbonate (E).
ملح الكلسيوم الطبيعي الذي يؤلف معظم الطبقة السطحية
من الكرة الارضية .

٢٣٤١٥ - كَرْبُونِي Carbonifère (F).
Carboniferous, Coal-bearing (E).
نمت تعريفى يطلق على الصخور التي تحوي
بعض الكربون او الفحم الحجري || ويطلق خاصة على
الحقبة الرابعة من الاباج القدم وفي الطبقة الارضية التي
تركز على الديفونية . راجع مادة حياة .



كريته

٢٣٤١٦ - كَرْبُونِيل Carbonyle (F). Carbonyls (E).
مركب مضاف للتغذ يستعمل في صيانة الاشعاب .

٢٣٤١٧ - كَرْبُونِيْدَرَاز Carbohydraz
هو العمل الذي تقوم به الازيمات في مضاعفة الجلوسيد
والهتر وسيد .

٢٣٤١٨ - كَرْبُونِيَه * Couroupita (S).
Couroupite (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الآسيات . انواعها
المعروفة خمسة منها بعض اصناف امريكة الجنوبية احصاها

٢٣٤٠١ - كَرْبَلْ عَرِيضُ الْوَرَقِ ، غَارَ سَامَ ،
لُورَه Kalmia latifolia (S).

Kalmie à feuilles larges, Laurier de montagne (F).
Mountain laurel (E). Breitblättrige Kalmie (D).
Calmia a foglie larghe, Lauro di montagna (I).
نوع من الكربيل وهو شجرة جميلة الشكل تطلو من ٧
الى ١٢ م . اوراقها متعاقبة او ضمية ثلاثية . نصلها يطول
نحو ١٣ سم . ويعرض ٤ سم . ازهارها عشكولية التجميع ثنائية
الارتكاز عديدة الالوان التي تختلف مع الضروب || ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٤٠٢ - كَرْبَلَه Carpel (F).
هي الحياء ، اطليه .

٢٣٤٠٣ - كَرْبَلَه Carbonylage (F).
المعالجة بالكربونيل وفي عملية تقوم على طلاء الاشياء
الخشبية او تقمها بالكربونيل لحفظها من التلف .

٢٣٤٠٤ - كَرْبُر Carbu (F). Carbide (E).
قسم ثنائي او هيدروجيني .

٢٣٤٠٥ - كَرْبُوس Pelodytes (S).
Pelodyte (F). Parsley-frog (E).

جنس ضفادع من فصيلة الهكسريات . انواعها المعروفة
قليلة العدد مهدا بعض اصناف العالم القديم || اجسامها
صغيرة القدر تطلو من ٤ الى ٦ سم . عيونها كبيرة ناشزة .
حداقات عيونها عمودية الارتكاز . جلدها مبرمة التعلو
والقعد || اوقاها في الطحلة الخضراء تعلوها زراكن
متباينة الاشكال تختلف مع اختلاف النوع || من ميزات
هذا الجنس رائحة الدوم الخامسة التي تفوح منه واستمراره
على التفرقة نحو تسعة اشهر من كل عام || اشهر انواعه
الكربوس المنقط .

٢٣٤٠٦ - كَرْبُوس مُنْقَط * Pelodytes punctatus (S). Pelodyte ponctué (F).
Spotted Parsley-frog (E).

نوع من ضفادع الكربوس وفصيلة الهكسريات . اصطناعه
تحدد من الشرق الاوسط الى اطراف البلاد الاسبانية دون
ان تتجاوز الاقاليم المتدلة || جسمه صغير القدر . الذكر
يطول من ٤ الى ٥ سم . والاثنى تطلو من ٦ الى ٧ سم .
رأسه متوسط الحجم . خطمه مستدير الطرف . عيناه كبيرتان
ناشرتان . حدقة عينه عمودية الارتكاز . اصابع قوائم
الخلفية قليلة الخطاط الذي يكتنف قواعدها فقط . جلده
مائل البشرة . ظهوره مجهز ببض التعلو والقعد المتدلة
الشوز تنفس المادة الثوبية الرائحة التي يتميز بها || ثوبه
الى الطحلة الخضراء تعلوها زراكن غضة عابقة ||
يعيش في المناطق وجاري الماء . يصر نحو عشر سنوات .
مسرعه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوته
الحشرات والديدان || الاثنى تسراً خلال موسمها السنوي
الذي يستمر نحو تسعة اشهر من ١٢٠٠ الى ١٦٠٠
دعيلة ضمن حبال مستطيلة تلفها على بعض النباتات
المائية . الصف يتم بعد التفرقة بنحو ثلاثة اسابيع والبلعاط
عند اكتمال طورها البلعوطي تطلو نحو ٦ م .

٢٣٤٠٧ - كَرْبُوبِيل حَنْطِي Carpopile brune (F).
هو الزوحة الخنطية ، اطليه .



كربيس

ترسب لحاء وشكير جلوع النباتات البرية || جسمها صغير القذ يطول من ٨ الى ١٢ م. رأسها وكسولها وبطنها وجرانها الى السواد الاسفع. ظهرها الى الخضار الازرق الموج. عيناها كبيرتان جاحظتان. زباناها دقيقان مستطيلان || ظهرها مقطوم الطرف اللاص. غذاها متباعدة التخذيد. ارسافها رباعية العقل الظاهرة || الاثنى امين قدام من الذكر واضخم بطناً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانية في نيسان وتميش حتى اواخر حزيران. تسرح في النهار || البرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٨ م. جسمها مستغلط المقدم والرأس، مستدق المؤخر، قليل الملب المبعثر. ثوبها الى الخنطي الاسمر. رأسها وشرجها الى الصرة السوداء.

٢٣٤٢٥ - كُرْدُ ٥
Karst
هي الطبقة الطباشيرية السطحية كُثرت فيها الإمات والكتل اللاقياسية الارتكاز والاجرام.

٢٣٤٢٦ - كُرْجُولَة ٥
Corrigiola (S).
Corrigiole (F). Corrigiola (E).
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة النومانيات. انواعها المعروفة ستة منها الشرق الادنى واروية وبعض مناطق افريقية وامريكة الجنوبية || سوقها نحيلة. ازهارها لحيمة مستطيلة. ازهارها هامي فصي التجميع. ازهارها صغيرة خاسية البتلات والاسدية، تبينة اللون. تنويرها ربيعي. اعرف انواعها واشهرها كرجولة السواحل.

٢٣٤٢٧ - كُرْجُولَة السَّوَّاحِل ٥
Corrigiola littoralis (S). Corrigiole du littoral (F).
نوع من الكرجولة. طوعية في بعض مناطق الساحل الليتاني ونها فواحي بيروت || ساقها نحيلة مستطيلة. اوراقها رحيمة الشكل، مستطيلة التصال. ازهارها هامي. ازهارها الى الصفار الباهت. تنويرها ربيعي.

٢٣٤٢٨ - كُرْد ٥
Base du cou (F).
Basis of the neck (E).
هو اصل العنق او قاعدة ارتكازها.
٢٣٤٢٩ - كُرْد ٥
Ferme, Métairie (F).
Farm, Lease, Land (E).
المشارنة من المزارع. ج. كرد.

٢٣٤٣٠ - كُرْد *، عَشْبَة السَّيِّح، دَقْنَة قَاتِلَة

Daphne tartonraira, Thymelaea tartonraira (S).
Daphné tartonraire, Tartonraire, Herbe terrible (F). Silver leaved daphne (E). Tartonraire (D). Laureola bilkeia, Salamandra (I).
نوع من الدفنة البرية السامة منهاها الكسبية الرطبة. شكلها يشبه الخلنج. ساقها فروع تملو نحو ١٢٠ سم. اوراقها متقابلة ضيقة، نصلها جامد الصفحة، باهت الخضار. ازهارها سنبلية التجميع، هامة الارتكاز، صغيرة القذ، يفضاء اللون.

٢٣٤٣١ - كُرْدَانَة ٥
Cordana (S).
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة الطحجيات. جريه الكيندية اسطوانية قصيرة تملوها كنانك سولجانية غنية التجميع ثنائية الخلية || انواعها قليلة العدد والاذى، اعرفها كردانة الموز.

الغويان || سوقها معتدلة الارتفاع فروع. فروعها فارشة. اوراقها متمائلة، معتقة، سنائية التصال الجامدة. تطول من ٢٥ الى ٣٥ م. ازهارها محوري الارتكاز، سنبلية التجميع. ازهارها جلجلية الشكل قبل الانبلاج، متباينة الاولان، فواحة العرف المعطرى المستحب. ثمارها كروية الشكل، بهجم البرتقالة الكبيرة، مأكولة السوقي والسمجات.

٢٣٤١٩ - كُرْبِيس ٥
Corbis (S).
Corbis (F). Corbis (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اللويذيات. انواعها المعروفة عديدة منها المعاصرة ونها الغابرة المتحجرة التي تعود الى الحقبة السيلورية || اصداها شبه بيضية الشكل متساكنة، مخددة، عابكة الالوان، يكثر فيها الجؤري القاتم || اجسامها متوسطة الحجم او صغيرة و ثنائية الشاعب المستطيلة الطليقة || اعطائها معظم بحار العالم. تميش منفعة في الرمال المنفورة بالماء المعتدل القور.

٢٣٤٢٠ - كُرَّة ٥
Sphère, Globe (F).
Sphere, Globe (E).
جسم مستدير الشكل يتميز بتساوي جميع خطوطه المستقيمة الممتدة من المركز الى السطح. تؤخذ مساحة الكرة بضرب مربع قايها بعدد ١٢٥٠٦٦٤ ويؤخذ حجمها بضرب مكعب قايها بعدد ٤١٨٨٨٨.

٢٣٤٢١ - كُرَّة اُرْضِيَّة *
Globe terrestre (F).
Terrestrial globe (E).
الكرة الارضية كوكب سيار من النظام الشمسي. (راجع ارض) || كيف تكونت ومتى ؟ بحث يقودنا الى عدة نظريات لا مجال لرسدها جميعها، انما نذكر اشيعها واقربها للعقل || عند حصول الانفجار السديمي، اي منذ نحو ٧ مليارات سنة، تكونت الشرج الرقيعي المعروف بالنظام الشمسي، لانه يتألف من الشمس وكواكبها ونها الكرة الارضية التي بعد ان دارت حول الشمس مليارات السنين اصبحت ما نعرف عنها الآن : ارض متباينة التضاريس والقشامة تطلوها مياه البحر، حركة مستمرة لا يمكن ان تتوقف لان وقوفها يعني الزوال. وحياة تنبت من كنه الخالق فتتجدد وتنو ثم تلوي وتندثر. (راجع تاريخ الكرة الارضية) || اما الحراظت الاربع المدرجة تباعاً فانها تبين مدى التطورات العظيمة المفعلة التي حصلت عبر الازمنة السميقة الغابرة، وما سيحصل في المستقبل البعيد بعد مرور ٤٠ او ٥٠ مليون سنة.

٢٣٤٢٢ - كُرَّة الثلج ٥
Boule de neige (F).
هي الافلوس الثلجي، اطلبه.

٢٣٤٢٣ - كُرَّة هَرَبِيَّة ٥
Photosphère (F).
Photosphere (E).
سطح الشمس المضي.

٢٣٤٢٤ - كُرْتَلُوم اُسُود الرَأْس ٥
Cartallum ebulinum (S). Cartallum à tête noire (F).
Cartallum ebulinum (E).
حشرة واسمة غاخلية من فصيلة القرينيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف البراري والزواطين. خنافسها تميش على بتلات الازهار واغصنها ازهار الصبوانيات. يرقاها نمة



كرتلوم أسود الرأس



كرد

٢٣٤١٠ - كُرْدُهَانُ الْعَاب



Codonopsis silvestris (S). Codonopside des bois (F).
نوع من الكرديهان. ساقه فراءة متسلقة ملتفة تملو نحو ١٥٠ سم. أوراقه معتقة قليلة الشكل، نصلها بمجر الزغب الجامد. ازهاره لا يقاسية الارتكاز، كثيرة العدد، صغيرة القد، فستقية اللون || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٣٤١١ - كُرْدُهَانُ بَيْضِي الْوَرَق

كردانة الموز

Codonopsis ovata (S). Codonopside à feuilles ovales (F).
نوع من الكرديهان. ساقه متسلقة متلو نحو ٨٠ سم. فروصها متقابلة قليلة الاستطالة. أوراقه بيضيه الشكل، خلية البشرة، تطلو من ٢ الى ٣ سم. ازهاره تطلو نحو ٣ سم. لنها الى الزرق الباهتة يملوها توشيم عاب || ازهاره يستمر طوال الصيف.



كردون

٢٣٤٤٢ - كُرْدُهَانُ مَرَعَانِي

Codonopsis clematidea (S). Codonopside-clématite (F).
نوع من الكرديهان. ساقه متسلقة متلو نحو ١٢٠ سم. فروصها لا يقاسية الارتكاز. أوراقه معتقة كاملة، السطح منها متقابلة والعليا متضاربة، نصلها خلية البشرة، بيضيه الصفحة المدببة عند زامها الاخير. ازهاره طرفية الارتكاز، بيضاء اللون، مفصلة بالازرق || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٣٤٤٣ - كُرْدُوسُ

Epiphyse (F). Epiphysis (E).
٢٣٤٤٤ - كُرْدُولَةُ *
Cordylura (S). Cordylure (F). Cordylura (E).



كرديس

جنس حشرات قانصة من فصيلة الطرواحيات ورتبة ذوات الجناحين. أنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها هيفاء، تطلو من ٨ الى ١٢ م. رؤوسها كبيرة، مستعرضة. عيونها ناشزة، متباعدة عند الشقين. قرونها الاستشعارية شديدة القصر، تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطائها ضليعة. ملاسها صغيرة. بطونها صقاية الشكل. كواسلها ويطونها ورؤوسها وقوائمها متكاثفة الملب. رواسها ضيقة، ملونة. قوائمها نشيطة || الحشرة الجمالانة قانصة. البرقة قازية والجمه.

٢٣٤٤٥ - كُرْدُومُ *

Cardium (S). Cardium, Bucarde (F). Cardium (E).
جنس حيوانات نهريه وقماعية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الكرديويات. أنواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها نهري وبعضها قماعي يعيش في مياه الاخوار || اصداؤها شبه قليلة الشكل، متساوية المصارع. اصداؤها ماسية او غمدية او مفصلة. جميعها محززة ملونة عادمة الاغشية. مفصلاتها رباعية الاسنان. مشاعها ثنائية طليقة || تعيش متغمة في الاسماك والزرايل.



كردوم

٢٣٤٤٦ - كُرْدُومِيَّات *

Cardilidae (S). Cardilids (F). Cardilidae (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منها البحرية التي تعيش في المياه المدية ومنها البحرية ومنها القماعية التي تعيش معصيات الاخر || اصداؤها متباعدة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل القلبي. مداريها متساوية الفلق



كردوم

٢٣٤٣٢ - كُرْدَانَةُ الْمَوْز *

Cordana musae (S).
فطر مجهري يركب أوراق الموز فيؤذيها بعض الشيء. مظهره الخارجي رفقة عدية الشكل تركب النصل على صفحته العليا. تبدو سيرة اللون ثم تنصرف الى الخلفي يحيطها حار اشهب قائم || ازهاره زهيدة لا تتدعي العناية.

٢٣٤٣٣ - كُرْدَرَّة

Kruberia (S). Krubère (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الخبيات. انواعها المعروفة عديدة منهاها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستضخمة، غمدية، لمساء اللحاء، فراءة. أوراقها غمرية، متباعدة التفصيل الريشي. ازهارها صيراني التجميع، طرفي الارتكاز، لاستساوي الاشعة عددا وطولاً. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون او صفراء او ارجوانية || تنويرها ربيعي.

٢٣٤٣٤ - كُرْدُوتُون *

Cordulia
جنس حشرات من فصيلة اليعسوبيات، انواعها المعروفة قليلة جميعها مفترسة تقضي على الحوام. طول اجسامها راوح ٤٨ م الى ٥٠ م. بسطة اجنتها راوح من ٦٠ الى ٦٤ م. ألوانها الى الخضار الزرقي. اناتها عقب ثوباً من ذكورها.

٢٣٤٣٥ - كُرْدُكَيْس *

Corydalis (S). Corydalis (F). Corydalis (E).
جنس حشرات من فصيلة الكرديليات ورتبة سادات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة موطنها الاقطار الامريكية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها غليظة، متسلسلة التبطيط. عيونها صغيرة. قرونها الاستشعارية خيطية. تتميز بتأثيرها المستطيلة خاصة عند الذكور. اجنتها غشائية، شبه متساوية. ألوانها تراوح من السمر الى الكهبة || يرقاتها مفترسة تعيش كائيل طولها الريفي في الماء.

٢٣٤٣٦ - كُرْدُكَيْسِيَّات *

Corydalidae (S). Corydalids (F). Corydalidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة سادات الاجنحة. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة، منتشرة في معظم اقطار البلاد الامريكية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها مستطيلة يكثر فيها التبطيط. قرونها الاستشعارية خيطية. عيونها صغيرة جانبية. اجنتها غشائية || مسرهما دجوي. يرقاتها مائية مفترسة.

٢٣٤٣٧ - كُرْدُوتِين

Cordylone (F).
هو القلب، جنس نباتات زينة، اطليه.

٢٣٤٣٨ - كُرْدَمَانَة

Garou (F).
نوع من الدقة، اطلب مثان.

٢٣٤٣٩ - كُرْدُهَان

Codonopsis (S). Codonopside (F).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى يشبه الجرس. جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها عديدة معظمها بري وبعضها ترابي. اعطائها بلاد الشرق. جذورها لحية. سوقها متسلقة متسلقة او ملتفة. أوراقها لا يقاسية الشكل والارتكاز يلبب فيها التقابل. نصلها بحرية اللون. ازهارها جريسية متدلية || اشهر انواعها ما يتبع.

Cerasus (S).

Cerisier (F). Cherry tree (E).

جلس اشجار برية وزراعية شجرة من الفصيلة الوردية .
انواعه وفروبه كثيرة العدد تختلط باحجامها وواكها
وارتكانا اغصانها وقد ثمارها واشكالها . ويرف هذا التباين
في الاعسام الجسورية فالصفات الشوزية الجفنية
الرئيسية واحدة : جذور عمودية ثم حزبية ، سوق منتصب .
لحاء ملس ، خشب جوي اللون . اوراق معتقة ، مسنة
الحافة ، ناعها بيضيه الشكل او رمية . ازهار نوري
التجميع يشمل من ٣ الى ١٢ زهرة . ازهار بيض ، خامسة
البتلات ، عديدة الاسدية . ثمار لحمية ، مستطيلة الاذن ،
كروية الشكل ، ملسة القشور اللامعة ، لذيلة اللباب
الدم ، مستديرة البزور الصلبة || وهو من الاشجار
التي تألف المناطق الباردة في الاقاليم المعتدلة لكنه ينحس
المواقع الممرضة لرياح الموسما لانها تخلص ازهاره .
يوجد في جميع الاربع من الفقيرة بالماء الغذائية الى الخصبة
ومن الرمي الى الطينية غير انه لا يتحمل الاربة الشديدة
الاندماج ، المستحكة الرطوبه . وهو يتكاثر بالبزور
والغسائل وبالترقيد والتغصم . امنع واجود مظهراته المقلب
والبري والشرية وسناليوئية .

Cerasus avium (S).

Cerisier des oiseaux, C. des bois, Mèrisier (F). Gean
cherry, Hedge-berry, Sour-cherry (E). Süßkirsche
(D). Ciliegio visciolo, Ciregiolo (I).

نوع من الكرز الزراعي المشتر . اليه تنسب أكثر واشهر
الضروب الموصوفة المعروفة ، اغصانها كبيرة اللد تملو من
١٠ الى ٢٠ سم . سوقها واغصانها منتصبه . ثمارها مستديرة ،
كروية ، صغيرة ، سكرية الطعم ، مستحبة المذاق ،
لذيلة النكهة .

Cerise des Juifs (F).

هو الحبة الكاكجية ، اطلبها .

٢٣٤٥٥ - كَرْز عَادِي * ، كَرْز حَامِض

Cerasus vulgaris (S). Cerisier acide, Griottier, Bi-
garreaudier (F). Cherry tree (E). Sauerkirsche, Sauer-
kirschen (D). Ciliegio agerotto, Cirlegio (I).

نوع من الكرز الزراعي المشتر العديد الضروب . ساقه
منتصبه تملو من ٦ الى ١٢ م . اغصانها منفرجة مسترسلة .
ثمار كروية ، قليلة الحمرة ، خيرة المادة ، لذيلة الطعم ،
بينه الحفوة التي تتفاوت نسبها مع الضروب وقد تكون
حامزة في الضروب المعروفة بالوشنة .

Cerasus padus (S).

Cerisier à grappes, Putier, Putlet (F). Bird-cherry,
Hach-berry, Hog-cherry (E). Gemeine Trauben-
kirsch (D). Pado, Ciliegio a grappoli (I).

نوع من الكرز البري المشتر . ثماره صغيرة اللد ، عشوية
التجميع ، حامزة الطعم مأكولة . منيته اغصانها والجبال
الصخرية . شجيرة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اغصانها
مسترسلة متدلية . اوراقها اهليلجية ذرية مسنة الحافة .

٢٣٤٥٧ - كَرْز غَارِي * ، كَرْز الْغَار

Prunus lauro-cerasus (S). Laurier-cerise (F). Cherry
laural (E). Larbeer-kirsche (D). Lauro ceraso, L.
mandorlo (I).

جلس نباتات برية وترية من فصيلة الورديات . انواعه
قليلة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنيات . سوقها

المضلة والمنسنة الاطراف المنفرجة . جميعها ثنائية المشاب
الطليقة || اعرف اجناسها واشهرها الكردوم .

Cardita (S).

Cardite (F). Cardite (E).

جلس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة الكرديتيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة
في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها
شبه قلبية الشكل ، مسنة التخديد . مشابها ثنائية ،
طليقة || تعيش لاصقة بالصخور المعنورة القليلة الغور .
ليفها غزير المادة النشيطة .

Carditidae (S).

Carditidae (F). Carditidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم .
اجناسها وانواعها عديدة . الماصرة منها منتشرة في جميع
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اما البائرة فن
متحجرات الاتربة الدفوية || اصداها شبه قلبية الشكل ،
مدببة الفتن . خياشيمها لاشاوية القد ، خلفية الرباط .
مصاريمها متساوية ، منفرجة الاطراف || اعرف اجناسها
واشهرها الكرديت .

Cardinalis (S).

Cardinal (F). Cardinal (E).

جلس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة اربعة
موطنها بعض مناطق امريكا الشمالية والوسطى . يألف
الغابات . فوجه يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجاً || اجسامها
صغيرة القد . رؤوسها متوسعة بفتانع شباينة الاحجام .
اثوابها ملونة يكثر فيها الاحمر والجوي . تتميز بمناقيدها
الشبه مخروطية الشكل القصيرة والفصلية . اذنانها مستطيلة ،
مقعره الاطراف او مستديرتها || طيراتها خفيفة الحركة ،
معتدل الشوط ، كثير التصعيد والتبسيط . تتنقل على الارض
بحفة وعلى اغصانها برشاقة || قوتها الثار العنيفة واليلبور
والخيرات ولا تنف عن ثمار الفاكهة والحبوب والذرة ||
اشهر انواعه كريدنال فيرجينية .

٢٣٤٥٠ - كَرْزِيْنَال فيرجينية *

Cardinalis virginianus (S). Cardinal de virginie (F).
Cardinal tanager (E).

طائر من الكريدنال . موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية
اغصانها فيرجينية . يألف الغابات ويحبو البلاد باستمرار
الا في زمن الترحيم . فوجه يمد من ٢٠ الى ٤٠ زوجاً ||
جسمه صغير القد . ربع القامة ، يطول نحو ٢٣ سم . بما
فيه الذنب الذي يطول نحو ١١ سم . لونه الى الحمرة
القرمزية تبهت في الظهر وتيق في الجناحين والذنب .
جنبته الى الجوزة وكشته كذلك . زوره اسود . صدقه عينه
ياقوتية اللون يطوقها حطار جوي || طيرانه خفيف
الحركة ، سريعها ، معتدل الشوط || يدن عشه في
الادغال وبني الاشجار القليلة الارتفاع الملتفة الانداد
والاننان . الاثني قنع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وسدها
نحو ١٣ يوما بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

Cône, Strobile (F).

Cone, Pine-cone, Strobile (E).

ثمرة اشجار الفصيلة الصنوبرية وغيرها من الثار الخروطية
او الخروطية الشكل .



كرديت



كريدنال فيرجينية



كرز



كرز الطير



كرز عادي



كرز عشقودي

٢٣٤٦٣ - كَرْسُوفَة دَرْبِيَّة

Botryodiplodia tubercicola (S). Java black-rot (E).
فطر مجهري يتطفل على درنات البطاطا الحلوة فيغنيها.
مظهره الخارجي يحاكي فطريات البياض والقشور وتفسد
وتسود وتسلب ثم تتفكك ويعلو العفن || علاجه الوحيد
يقوم باجتناث الزرعة في المواقف الرطبة وفي الآثرية
المؤبودة مع التأكد بضرورة تطهير البذار قبل الزرع.

٢٣٤٦٤ - كَرْسُوف ، كَرْسُوف
Coton (F).
هو القطن ، اطلبه .



كرز غازي

٢٣٤٦٥ - كَرْسُوفِيَّة ، عَنَقَلَال
Gnaphale (F).
جنس نباتات برية طليحة من فصيلة المركبات . أنواعها
عديدة منها العشبية الحولية والخشبية المعمرة . سوقها وأوراقها
زباه ، زغبها أبيض اللون . أوراقها متعاقبة لاطئة كاملة
صغيرة اللد سنانية النصل . أزهارها روئيات طرفية .
معظم أنواعها طبي يستعمل ضد السعال وينفع الصدر .
أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٣٤٦٦ - كَرْسُوفِيَّة جَبَلِيَّة * ، عَنَقَلَال جَبَلِي
Gnaphalium leontopodium (S). Gnaphale pied-de-
Lion (F). Lion's paw cudweed, Everlasting (E). Ruhr-
kraut, Ruhrpflanze (D). Canapicchia, Immortali (I).
نوع من الكرسوف البرية الطليحة المتباعدة الجبال العالية ،
زغبها لبد أغبر اللون . أزهارها ليلكية . تنبت السعال .



كرسوفية جبلية

٢٣٤٦٧ - كَرْسُوفِيَّة حَمْرَاء * ، عَنَقَلَال أَحْمَر ،

دَم الْفَرَّال
Gnaphallium sanguineum (S). Roter
Gnaphale rouge (F). Red cudweed (E). Roter
Ruhrkraut (D). Canapicchia rossa (I).

نوع من الكرسوف البرية الطليحة المتباعدة . تنبت في الأراضي
للحصاد من ارتفاع ٤٠٠ م إلى ١٢٠٠ م . عن سطح البحر .
زغبها أبيض اللون براق . أزهارها إلى الحمرة الجميلة . تفيد
السعال والصدر .



كرسوفية حمراء

٢٣٤٦٨ - كَرْسُوفِيَّة *

Ervum ervilia, *Vicia ervilia* (S). Ers, Ervillier, Lentille
ervillière, Vesce noire, Faux orobe (F). Ers, Ervil,
Bitter vetch (E). Stachelwicke (D). Ervo, Fragellini,
Girlo, Lero, Moco, Veggolo (I).

نبات عشبي حولي علني من فصيلة البقوليات ، يزرع لمحبه
رشته . وهو يعطي غللاً للبهائم اخضها البقر والغنم إلا أن
كثرت مستشقة لذلك يحسن الثروي في استعماله || جلوده
سطحية متوسطة الانشباب . ساقه عذرة قليلة الفروع
تتلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، شبيهة ،
مؤلفة من ١٠ أو ١٢ أو ١٤ زوجاً من الورديات
الامتقابلة ، نصلها يفيش الشكل ، أشمل الصلصة .
أزهاره صغيرة القد ، بنفسجية اللون مسطيلة الزناد . ثماره
سنت صفار وكل سنف تحسن من حبيتين إلى ثلاث حبات
صغيرة القدر لا قياسية الشكل لأنها إلى السرة البنية .
زراعتها بعلية وهو يحد بعد الحطة أو الشعير وفي جميع
الآثرية الخفيفة والمتوسطة الانتاج ولا يخشى سوى المواقف
الرطبة || يذرع عادة في الكواكن ولزوم الدم براوح
من ١٠ إلى ١٢ كيلو .

٢٣٤٦٩ - كَرْسُوفِيَّات هي البقيعات ، اطلبها .

٢٣٤٧٠ - كَرْسُوعِي
Grégaire (F).
Gregarious (E).

صفة النبات الذي يعيش ويتكاثر جاعياً متجانساً .



كرسوفية

متحصنة ، أوراقها أبيدة ، اهليجية ، سنانية و نصلها
جامد الصلصة ، مشاري الحافة . أزهارها عتقودية التجميع
ثمارها صغيرة القد زيتونية الشكل ذببة العقب ، لأنها إلى
الحمرة أو السود .

٢٣٤٥٨ - كَرْزَة
Cerise, Guigne (F).
Cherry, Sweet cherry, Heart cherry (E).

هي ثمرة الكرز ، اشكالها وألوانها عديدة جميعها مستحبة
العلم المركب . لباب سوتها يحوي نحو :

| | |
|-----------------------|---------|
| من الماء | ٨٠,٠٠ ٪ |
| من المواد السكرية | ١١,٦٠ ٪ |
| من المواد الاستخلاصية | ٣,٨٥ ٪ |
| من المواد الازوتية | ١,٣٥ ٪ |
| من المواد الدهنية | ٠,٣٥ ٪ |
| من السليولوز | ٢,٥٢ ٪ |
| من الرماد | ٠,٤٣ ٪ |

وهو يحوي أيضاً بعض المحامض الضوئية اخضها الحامض
التفاسي وما لا يستهان به من العناصر المعدنية كالبرناتس
والفسفور والمغنيزيوم والكبريت والكلسيوم والصوديوم
والحديد والنحاس واليود ... اخض إلى ذلك نحو ١٥ ٪
من الفيتامين «ث» وما لا يقل عن ٥٠٠ وحدة من الفيتامين
«آ» .

٢٣٤٥٩ - كَرْزِي
Bacciforme (F).

Bacciform, Berry-shaped (E).
ما كان شكله شكل حبة العنب أو الكرز .

٢٣٤٦٠ - كَرْس ، صَاعُورَة ، مِرَاع

Chèvrerie (F). Goat-pen (E).
مأوى الماعز المبني المسقوف . والكرس هو ما تنبت من
البر والبول . ج . اكراس ومرح ووايعز .

٢٣٤٦١ - كَرْسُوفَة

Botryodiplodia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يكتبداته
غنية كثيفة تجمعها ونيسة غليظة شارة . بويضاته حطية
اللون ثنائية الخلية || أنواعه المؤذية قليلة ، يكثر وجودها
في البلاد الحارة ، اعرفها ما يتبع .

٢٣٤٦٢ - كَرْسُوفَة الكَاكَاو

Botryodiplodia theobromae, *Lasiodiplodia theobromae* (S).

فطر مجهري يصيب عدة نباتات تخلفة الفصائل اخضها
الككاو والكاكاو والبن والمخاط والقطن والموز || فهو على
الككاو آكلة تنخر الجذور فتذبل الأوراق بعد أن تحترق
السنج بمسحة من العفن الاسود وبعد أن توشع لحاء الساق
يبض البقع المنخفضة السمراء اللون || وهو على الموز
عفن يركب قلب الارومة فينويها او يصيب الطرح فيوشع
الثار يبقع قطرها وعقمها نحو ٨ م . لأنها إلى الخضار
الزيتوني || وهو على المخاط ذبول على بقعة الشجرة يبقع
امرار واسوداد في لحاء الساق || ويصيب الشاي والبن
فيابل الانتان والاناداد ويؤذيها || وهو في القطن وصم
يركب العفازة فيمنعها من النمو بعد أن يركم ثيلها ويتغيب
يشبهه الاسود || يكافح بالقنطاق وشرق الاغصاء المؤبودة ،
يتطهر الجروح ، وباستعمال أحد القواطع الفعالة أما
نفساً على النبات أو تدفيراً على الآثرية والنبات .

قصيرة وغليظة ، جذورها عمودية . أوراقها لاطئة متناوبة مركبة . السفلى منها قرصية الانقشابت مستطيلة الاعناق الضلعية ، اما العليا فتباعدة وكثيرة التفريش . أزهارها صولانية التجميع ، لونها الالباض الاخضر || وهي من النباتات الطبية تدر البول وتفتت الصدر وتحلل الورم وتنفذ الحصى || تنكأثر بالبزور وترغب في الازرية البدالية الحصى .

* كُرْقَس الجَبَل * ٢٣٤٨٢

Athamanta oreoselinum, Petroselinum oreoselinum (S). Ache de montagne (F). Moutain parsley (E). Augen Wurz (D). Appio di montana (I). نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الخيميات ، منبته الجبال الريفية . ساقه مخشوشة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها مستطيلة الاعناق كثيرة التفريش والتشعير . أزهاره صولانية التجميع صغيرة القذ وريدة اللون .

٢٣٤٨٣ - كُرْقَس الماء * Sium latifolium (S).

Ache aquatique, A. d'eau, Berle (F). Water parsnip, Water parsley (E). Breiter Merk, Wasser Peterlein (D). Erba crociana, Sedano d'acqua (I). ومن اسمائه أنس النفس وجرجير الماء وهو نبات عشبي طبي معمر ، من فصيلة الخيميات ، يكثر في المنابع والأراضي الرطبة . أوراقها وجذوره مضادة للحفر ومدرة البول . يزود منطقة الكبدول وهي مهيجة لقروة الجنسية وقد تكون شاذية نظراً لما تحواه من الفسفور والكلسيوم . وإذا رعته الماشية من غم وماعز وبقر كثر درها وباد صنفه .

٢٣٤٨٤ - كُرْقَس بَرِّي * ، سَمِيرْنُوم

Smyrniolum olusatrum (S). Maceron, Mac. potager, Ache large, Gros persil (F). Alexander's, Horse parsley, Wild celery (E). Gespenstgelbdole, Smyrnerkraut (D). Macerone, Olosatro, Smirno (I). نبات عشبي بري يغلي من فصيلة الخيميات . ينبت في معظم الاسواق المتدلة الحارة . قريب الشبه من البقدونس والكرفس . أوراقها مأكولة مستحبة العرف والطعم .

٢٣٤٨٥ - كُرْقَس رُومِي Persil (F).

هو البقدونس ، اطليه .

* كُرْقَس لَفِي ٢٣٤٨٦

Apium graveolens rapaceum (S). Céleri-rave, Céleri navet (F). Turnip rooted celery, Celériac (E). Kohlrabellerie, Selleriak, Knoll-Sellerie (D). Sedano rapa (I). ضرب من الكرفس يزرع لجذوره وأوراقه المأكولة . وهو نبات محلي يندر في الاكواد ثم ينتقل الى مستقره . يرغب في الازرية الخوارة الحصى .

٢٣٤٨٧ - كُرْقَس Auchenoglanis (S).

قال الفريق امين المملوف : « الكرفس او شال كرفس ، سلك سلوري ذكر منه بولونه نوعين في التيل » .

٢٣٤٨٨ - كُرْفُكُرُول Carvacrol

سائل زيتي عديم اللون يتخلص من عطور الشفويات والسمبولانيات ، اخضها عطور الصمغ والقودينج والندع . ثقله النسبي عند ١٥°مغ = ٠.٩٨٥٦ . وهو يغلي عند ٢٣٦°مغ .

٢٣٤٧١ - كُرْسِي الْجَوَّاء

كربي الجوزاء مجموعة كواكب بالقرب من الجوزاء .

٢٣٤٧٢ - كِرْش Souchet à nattes (F).

هو سم الحصر ، اطليه .

٢٣٤٧٣ - كِرْش Panse, Rumen (F).

Belly, Paunch, Rumen (E). اكبر اقسام معدة المجترات تتصل بالمريء وتشغل ثلاثة ارباع الجوف .

٢٣٤٧٤ - كُرْقَسْب ٥ Calyptré (F). Calyptra (E).

سوقل الجراثيم الفطرية واشباهها .

٢٣٤٧٥ - كُرْقَسْب ٥ Calyptré

نمجد غشائي مركزه عند الزاوية الخلفية من قاعدة ظهوران الحشرة .

٢٣٤٧٦ - كُرْشُون * ، رأس الحنّش

Hertia cheirifolia, Othonna cheirifolia (S). Hertie, Othonne à feuilles de giroflée, Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E). Schleierkraut (D). Fiorrancio d'Africa (I). نبات عشبي سروتي معمر وحيد الجلس والنوع من فصيلة المركبات المشرقيات . ضروبه التزيينية عديدة . سوقها مخشوشة مسطحة ، فروعها منتصبة . أوراقها عروية وهي متناوبة مشورة الشكل واللون نصلها شريك النسيج الشبه للحصى . أزهارها وريسية كبيرة القذ صفراء اللون . أزهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٤٧٧ - كُرْمان Oursin melon

هو التوتياء ويحدي السفور نوع من الاغنيوس المأكول يكثر على الشواطئ الصخرية اللبنانية .

٢٣٤٧٨ - كُرْمانِيَّات * Echinides, Oursins (F).

Echinidea, Sea-urchins (E). رتبة حيوانات بحرية شاذة الاعداد . فصائلها واجناسها وانواعها الحالية والمنذرة عديدة ، معظمها شائع على الشواطئ البحرية في جميع اسواق العالم .

٢٣٤٧٩ - كُرْمانِيَّة ٥ Echinocystis (S).

Echinocyste (F). Echinocystis (E). بجلة معمرة عارشة من فصيلة القرعيات . مهدا بعض مناطق امريكية الشالية . ساقها تطول نحو ستة امتار . سوقاتها ثلاثية الشعب . أوراقها كفية ، خاسية القصوص . أزهارها بيضاء اللون ، نجمية الشكل ، المتكية منها عنقودية التجميع ، الملقية فردية . ثمارها بيضية الشكل ، لونها الى الخضار الاصفر ، تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٤ سم . طليها تافه المذاق تؤكل مطبوخة .

٢٣٤٨٠ - كُرْف كُرْف

كُرْف وكُرْف : تسم . يقال كُرْف الفحل او الحار . عندما يشم طروقه ثم يرغ رأسه ويقلب جفلفه .

٢٣٤٨١ - كُرْقَس * ، كُرْقَس تَبْطِي

Apium graveolens (S). Ache, A. des marais, A. douce, Céleri (F). Celery, Marsh parsley, Smallage (E). Sellerie, Echter Sellerie (D). Accio, Appio, Sedano, Seleno (I). نبات بقلية محولة من فصيلة الخيميات ، ساقها عشية



كرشون



كرش



كرش الحبل



كرش الماء



كرش بري



كرش لفي



كرفة جيتا



كرفة ذوية



كرك



كركب



كركدن افريقي

صغيرة ، مخروطية الشكل ، ضيقة الاشداد . عيونها ماسحة ، محاسرها متراكبة السيف . زعانفها الظهرية ضيقة مستطيلة . الذيلية فارقة || الثوباء ضيقة يملؤها تجذيع متعرض اسمر ورقة سمراء تجدد من الرأس الى ثنيج الظهر والذنب || لحومها جيدة الصفت مرغوب فيها .

٢٣٤٩٧ - كَرْكَاش (F). *Chrysanthème matricaire*
هو قوقان منيات ، اطليه .

٢٣٤٩٨ - كَرْكَب * ، كَرْسَلَا

Crassula (S). *Crassula* (F). *Crassula*, Thick-leaf (E). *Dickblatt* (D). *Crassula* (I).

جنس نباتات لحية معمرة من فصيلة الخلدات . انواعه زهاء ١٠٠ ، منها افريقية الجنوبية . معظمها بري ونعشها زيبى . اشهر انواعه الكركب القرزى . اعزاهو قرزوية اللون ، نورية التججيع ، جميلة الشكل ، فواحة الورد الياشمي .

٢٣٤٩٩ - كَرْكَة
هي الياشمي ، اطليه .

٢٣٥٠٠ - كَرْكَج
هو الخلف الصبي ، اطليه .

٢٣٥٠١ - كَرْكَدَن * ، كَرْكُند ، مَرْميس

Rhinoceros (S). *Rhinoceros* (F). *Rhinoceros* (E).
جنس حيوانات ليونة من الحافريات وفصيلة الكركدنات . انواعه خمسة ، موطنها البلاد الحارة ، منها ثلاثة اسبوعية واثنان افريقيان . جنبها ضخمة الاجرام . قوائمها قصيرة ثلاثية الاصابع . رؤوسها غليظة وكبيرة ، اذنانها قصيرة مستقيمة ، عيونها صغيرة . سفنها اخشن بالغ السك . تحمل قرناً او قرنان فوق انفها || وهي هنية الطبع لكنها شرسة اذا هوجمت . تقم قرب الماء . قوتها الجلود والافصان والراسخ والاشعاب الغليظة . تعيش ازواجاً ذكر وانثى .

٢٣٥٠٢ - كَرْكَدَن اَبْيَض ، هَرْميس

Rhinoceros simus (S). *Rhinoceros camus* (F).
اكبر واضخم انواع الكركدن وهو من ذوات القرنين . سفنه الى البياض الاغبر . جثته تطول نحو ٣٧٠ سم . وتعلو ١٩٠ سم . ذنبه نحو ٧٠ سم . قرنه الكبير يطول من ١٢٥ الى ١٦٠ سم . والصغير من ١٨ الى ٢٢ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى اواسط افريقية وصفات بر الأورنج .

٢٣٥٠٣ - كَرْكَدَن اَفْرِيقِي * ، عَرْثِيَت

Rhinoceros bicornis (S). *Rhinoceros bicornis* (F).
كبير الجثة الغليظة الضخمة . طوله نحو ٣٥٠ سم . وطوه ١٧٠ سم . ذنبه ٧٠ سم . سفنه الى السرة الخطية الداكنة . وهو من ذوات القرنين ، قرن كبير طوله زهاء ١٠٠ سم . وقرن صغير مستعرض القاعدة طوله نحو ٢٠ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى القطب . يرغب في المنافع وشفاف البحيرات .

٢٣٥٠٤ - كَرْكَدَن اَلْبَحْر . *Licorne de mer* (F).
هو حريش البحر ، اطليه .

٢٣٥٠٥ - كَرْكَدَن السِّنْد ، كُنْدَة

Rhinoceros sondaicus (S). *Rhinoceros de la Sonde*, R. de Java (F).
كركدن وحيد القرن كبير الجثة . جرمه يصفر جرم الهندي .

٢٣٤٩٩ - كَرْفُول ، كَرْفُون
Carvol, Carvone
سائل زيتي عادم اللون يستخلص من عطر الثيار والكرويا والكمون والنعنع الجدي والصعترى . ثقله النسبي عند ١٧ سم³ = ٠,٩٦٠ ، وهو يغلي عند ٢٢٥ °م .

٢٣٤٩٠ - كَرْفِئَة
Coque d'oeuf (F).
Chell, Empty egg (E).
قشرة البيضة العليا اليابسة وتدعى القوية .

٢٣٤٩١ - كَرْفِئَة
Corypha (S). *Coryphe* (F).
ج . كرفى . جنس اشجار ريفية الجماع المنصب الجالس من فصيلة النخلات . منهاها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها هامة الارتكاز ليفية التركيب ، يستخرج منها نسج الكرفى الذي يستعمل في صناعة القبعات وبعض اللزائم المنزلية || وهي من الاشجار الزرقية التي تعيش في بعض المراتع الخاصة من شواطئ المتوسط || اشهر انواعها الزرقية ما يلي .

٢٣٤٩٢ - كَرْفِئَة جَبَنْجَا * ، كَرْفِئَة مستديرة
الورق

Corypha gebanga, *Gebanga rotundifolia*, *Tallera gebanga* (S). *Coryphe à feuilles rondes*, *Tallère* (F).
نوع من الكرفى الزرقية الشائع الاستعمال ، يوجد في جميع الاربة واقلاها خصيصاً اما لا يتحمل العطش الشديد والمعارض الباردة التي يخفص فيها القر الى خمس درجات م . فوق الصفر || ثمرته تملو من ٤ الى ٦ امار بمدة ٢٠ سنة . جذعها منتصب القوام ، مالمس اللحاء ، ينهي بقسمه من الاوراق المستديرة المروحية والمستطيلة الجريدة المشوكة .

٢٣٤٩٣ - كَرْفِئَة ذُؤَبِيَّة * ، شَقْلَج

Corypha umbraculifera (S). *Coryphe parasol*, *Talipot de Ceylan* (F). *Great fan-palm*, *Talipot palm* (E). *Talipotbaum*, *Gross Schirmpalme* (D). *Palma corifa*, *Corifa del Malabar* (I).

نوع من الكرفى . جلدها اسطواني الشكل منتصب كالشعمة يملو نحو ١٠ امار . قشرته ماسلة . الياف الخشبية شديدة الصلابة . اوراقها هامة مروحية كبيرة القذ مستطيلة السعف جميلة الخضار الالامس .

٢٣٤٩٤ - كَرْفِئَات *
Coryphinées (F).

سبط اشجار برية وزرقية من فصيلة النخلات . اجناسه وانواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . منهاها الاقاليم الاستوائية . يكثر وجودها في بعض مناطق الهند وجاوا وجزر الزايب وسيلان || سفنها منتصب ريفية . اخشابها صلبة تستعمل في البناء . اوراقها هامة الارتكاز صناعية الانتماء || اشهر اجناسها الكرفنة .

٢٣٤٩٥ - كَرْكَة
وقف عن البنى . يقال كركت الدجاجة وهي كركة اذا وقفت عن البيض .

٢٣٤٩٦ - كَرْكَة *
Charax (S).
Charax (F). *Charax* (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسبوريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجناسها مبطلة ، شبيهة بضيعة الثورن ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها



كركدن الهند

طوله نحو ٢٨٠ سم. وارتفاعه ١٧٠ سم. اثناء جلاء لا قرن لها. يفيم في الغابات الكثيفة قرب جداول الماء على ارتفاع ٢٠٠٠ م. عن سطح البحر. موطنه الهند وبرمانيا وجاوا.

٢٣٥٠٦ - كَرْكَدَن سُمُتْرَا ، نَشَان ، نَوْشَان
Rhinoceros sumatrensis (S). Rhinoceros de Sumatra (F).

اصغر انواع الكركدن جرماً واقلها غلاظة . جسسته تطول نحو ٢٤٠ سم. وتبلغ ١٣٠ سم. ذنبه ٦٠ سم. اما وزنه فلا يقل عن ١٠٠٠ كيلو . قرنه غليظ القاعدة المبطلة . ذرب الطرف يطول نحو ٧٠ سم. || موطنه صومترا وسيام وملقة ...

٢٣٥٠٧ - كَرْكَدَن هِنْدِي * ، وَحِيد الْقَرْن ، زَيْعَرِي

Rhinoceros unicornis, R. Indicus (S). Rhinoceros unicornis, R. de l'Inde (F).

اعظم انواع الكركدن الاسيوية وسيدة القرن. وهو كبير الجثة الغليظة طوله نحو ٣٠٠ سم. وعلوه ١٧٥ سم. اما ذنبه فنحو ٦٥ سم. وقرنه ٣٥ سم. وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو || موطنه مستنقعات الهند وضاف نهر الكنج .



كركر

٢٣٥٠٨ - كَرْكَدَنِيَّات
Rhinocoridae (S). Rhinocoridae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من الحافريات . اشهر اجناسها الكركدن .

٢٣٥٠٩ - كَرْكَدَنِيَّات *
Palinuridae (S). Palinuridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، طولك الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف اجناسها واشهرها العنقوس والجراد البحري المعروف ايضاً بالكركند او الكركند .

٢٣٥١٠ - كَرْكَرْ
Fourreau (F). Sheath (E).

الكركر وعاء قصب الثور والتيس .

٢٣٥١١ - كَرْكَرْ *
Stercorarius (S). Stercoraire, Mouette pillarde (F). Jaeger, Skua (E).

جلس طير بحرية من كفيات الدواب . انواعه ثلاثة تجوب البحار من النرويج الى الجنوب . اجسامها هيفاء ، القد ، حيلة الشكل ، بقاء الثوب ، مستطيلة الاذنان . بسطة جناحها يراوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم. مناقيرها طويلة منعققة المنادق || تطارد زيج الماء والحريشة فتنازلهما ما يصيدان من سمك وقد ترهبها على لفظه تلتفتهم .



كركة مدنية

٢٣٥١٢ - كَرْكَرْ غَاصِب *
Stercorarius catarractes (S). Stercoraire ravisseur, Labbe cataracte (F). Cataracta Skus (E).

نوع من الكركر . طائر بحري من كفيات القدم وفصيلة النورسيات . اعطاه البحار القطبية . ملبته الحيات فردى . لا تقترب الذكور من الاناث الا في زين الكوم والحضن . جسمه هيف الشكل ، مستطيل الذنب والجانح . طوله نحو ٥٧ سم. وبسطه نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى السمره العابقة المضلعة بالشمعة السوداء . بطنه الى السمره الرمادية .



كركم

عيناه جؤونيا اللون . متفاده اسمر القاعدة والجسم ، اسود البهره . ساقاه الى السمره السوداء || قوته كل ما استطاع اقتراضه من اسماك . وحيوانات وطيور وحشرات . يطارد الزبج ويغريها من طير الماء فينازعها ما تصطاد من سمك || يدشن عشه في افحوس يبطنه بالحشيش والطحلب . الاثني تقع يبيضان في اوائل شهر محرم . الحفن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثني بمناوبة الذكر . الفرخ يستقل بطنه اثناء ابداء من اوائل ايلول .

٢٣٥١٣ - كَرْكَرْو *
Carcharodus (S).

جنس حشرات من فصيلة الحسيرييات . انواعه الفساره قليلة تركيب الخيازيات || فراشاته صغيرة القد طولها يراوح من ٢٨ الى ٣٢ مم . اجسامها مخروطية الشكل ، كستنية اللون . وراشها بيضاء يعلوها تجديع وتبيغ وزرا كش مختلفه الالوان || تظهر من حزيران الى ايلول . تمتج مكها على الاوراق ينثف من رقات صغيرة القد مستعقة الجسم . رؤوسها سود ، انواها الى الزرقه يعلوها تحطيط وتجديع اسمر .

٢٣٥١٤ - كَرْكَسَة مُدْنِيَّة *
Charaxes jasius (S). Charaxe jasini, Pacha à deux queues (F). Charaxes jasius (E).

حشرة من فصيلة البشوريات حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها واسعة قوتها مفر الاظهار . سرقتها تعيش على اوراق الخنجيليات || جسمها كبير القد بطول نحو ٢٢ مم . بسطها نحو ٧٥ مم . رأسها جؤوي اللون ، عيناه كبيرتان . زبابان صولجانان . مرشها دقيق الجسم . جوشها وبطنها الى المرة البراءه المالح || ورشها الاماميان الى الصمرة الخنطية تملوها بيج وتزويق فيها الازرق والاسود والبرتقالي والاصفر العسائي والاحلح . ورشها الخلفيان الى السواد الازرق المالح تملوه بيج وتزويق كا في الزوج الامامي وثلاث جدات الالوي بيضاء . الثانية متراكبة الالوان ، الثالثة صفراء || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الالوي في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في النهار . تعاطل بعد ظهورها بسنة اسابيع وتمتج الحول طلعاً على نصال اوراق النبات المائل || السرة تطول نحو ٦٥ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مالم القشار . ثوبها الى الخضار الاحلح يعلوها السكتين الخاصة والسامة بقتان مستديرتان مركزهما اسود يحوقه الاصفر ويطوقه اطار اسفر . رأسها سداسي الزوائد القرنية الجلودية اللون . سكتها الشرجية مفلوقة الطرف الاخاذ || طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الالوي نحو ثلاثة اسابيع يستمر في الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً .

٢٣٥١٥ - كَرْسُم *
Curcuma

جنس نباتات جذمورية عشوية معمرة من فصيلة الزنجبيليات . مهدها المناطق الاسيوية الحارة . انواعها قليلة اعرفها الكركم الاسود والكركم الزهراور والكركم الصياغي || اوراقها منتصبه مستطيلة الزناد سكتية النصل الشاروف . ازهارها صفراء اللون مثلية التجميع تتفتح على شراخ قصير || يستخرج من صاقها مادة تشوية ما كولة تدعى ارزوت الهند ويستخرج من ازهارها وزبدانها مادة صبغية صفراء اللون ومادة طيبة تدعى كركين (Curcumine) .



كركي



كركتد الزيتون



كركي رمادي



كركي منشورية

Grus (S).

Grue (F). Crane (E).

جنس طيور كبار من فصيلة الكركيات ورثة طول الساق. كنيته أبو حريان وأبو عين وأبو العيزار وأبو نعم وأبو المصم. ج. كراكي. ١٢. أنواعه ١٢. جميعها من القواطع. طويلة العنق والساق. قوية المنقار الخروطي المستطيل. أوتابها تختلف باختلاف أنواعها يكثر فيها الأبيض والرمادي. رؤوسها ملس أو ثنائية القزعة || تألف المناطق وشطوط الأنهار. قوتها الأعشاب والحبوب والذرة والديدان والخشرات والصفاد والرحاحات من عظام وأفاعي || تنفث في أفرس رتبته في الإدخال السرحة أو بين الأعشاب الرقيقة. الانثى تضع من ٣ إلى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

Grus cinerea (S). * كُرْكُمِي رَمَادِي *
Grue cendrée, G. commune (F). Common grey crane (E).

نوع من الكركي، كبير الجثة، طوله يراوح من ١٣٠ إلى ١٤٠ سم. ثوبه أبيض اللون. رأسه ومقدم عنقه إلى السواد الأزرق المولاج. محسره وجانبه عنقه إلى الأبيض التاسع. أباهره وأنيكه وساقه إلى السمرة النحسية اللامعة. منقاره اسود اللون أخضر المولاج. عيناها جؤوبتان مستديرتان. يآلف المناطق وأخوار الأهر وجزرها. يحبب العالم في طلب الرزق ويعود مع البرد إلى مشاته الذي يمتد من السودان إلى الهند.

* كُرْكُمِي مَشْشُورِي *
Grus viridirostris (S). Grue de Mandchourie (F). Demoiselle crane (E).

نوع من الكركي أكبرها جثة وإجلها ثوباً. طوله يراوح من ١٤٠ إلى ١٥٠ سم. ثوبه إلى الأبيض العاصي جيته إلى الحسرة. عيناها كالياقوت. قاعدة منقاره ومقدم عنقه إلى السواد الأزرق المولاج. منقاره إلى الخضرة الزرقية. أباهره وأنيكه إلى السواد العاصي يطوق مولاج أخضر. ساقه إلى الأخضر الاسمر || مشاته بعض الأقاليم الصينية. يكثر في منشورية. يآلف الشطوط النهرية والبحرية.

Gruidae (S).

* كُرْكُمِيَات *

Gruidae (F). Gruidae (E).

فصيلة طير من رتبة طول الساق. أجناسها وأنواعها قليلة العدد أشهرها الكركي والنرونق.

* كُرْكُمِيَش *

Camomille odorante (F).

هو البابونج العطري، أطله.

Crocus (F).

* كُرْكُمِيَس *

هو الزعفران، أطله.

Stapelia (F).

* كُرْكُلُومَة *

هي التلف، نبات من الصقلابيات، أطله.

* كَرَلِين *

Carlina (F). Carlina (F).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من الحشريات وفصيلة المركبات. أنواعه عديدة تكثر في الأربطة القاحلة وفي الأراضي المنحاة وبين الصخور. سوقها قصيرة جدسة، أوراثها كبيرة، مستطيلة، مفروسة، شائكة. أزهارها روكسية ملونة، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٤ سم. أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

* كُرْكُم أسود، جَدُوَار أسود *

Curcuma caesia (S). Curcuma vert, Zédoaire noir (F). Black zedoary (E). Schwarze Zedoarywurzel (D). Zedoaria nera (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي عشقولي معمر تكثر زراعته في الهند وسائر بلاد الشرق الأقصى. عساقله نشوية غذائية مأكولة ويستخرج منها ومن الأزهار بعض المواد الطبية والعصبانية.

* كُرْكُم زَدُوَار، زَدُوَار، جَدُوَار *

عَقِيد، سَطْوَال

Curcuma zedoaria (S). Curcuma zédoaire, Zédoaire (F). Zedoary, Setwall (E). Zedoarywurzel, Zittwerkurm (D). Zedoaria (I).

نوع من الكركم تكثر زراعته في الشرق الأقصى ويستخرج من عساقله مادة نشوية غذائية تدعى أريون الهند. أزهاره صباغية نقيها منه وسق.

* كُرْكُم صِبَاغِي، هُرْد، عَقِيد *

هندي، ماميران، أصابع صُفَر

Curcuma longa, C. tinctoria (S). Curcuma long, Safran des Indes (F). Long rooted curcuma, Turmeric (E). Gilber ingwer, Gilbwurzel (D). Curcuma longa, C. di Levante, Croco indiano (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي عشقولي معمر. ينبت الحقم ويذر البول ويكثر إفراز القلب ويفتح الشبه. يزرع ويحضر في الهند ويباع تحت اسم «كاربي».

Mélilot-bleu (F).

* كُرْكُمَان *

هو الخندقوق الأزرق، أطله.

* كُرْكُمِيَس *

جنس حشرات من فصيلة اليسويبات أنواعه قليلة العدد جميعها مفترسة تقضي على الحوام. ذكورها حر، أنثاها إلى الصغار الخنطي. أجسامها تطول من ٣٥ إلى ٤٠ سم. وبسطة اجتناباً تراوح من ٥٢ إلى ٦٠ م.

* كُرْكُنْد *

هو الكركند وهو أيضاً الجراد البحري، أطله.

* كُرْكُنْد الرَبْتُون *

Oryctes nasicornis (S). Rhinocéros de l'olivier (F). خنفساء كبيرة القدر من الجمليات. طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها إلى الكستنائي يعلو مولاج اسمر لاعم. رأس الذكر مسلج بقرن منعك إلى الوراء. الانثى جاء لا قرن لها || يآلف التروائين. يسرح من الغروب إلى الشروق ويبعث في النهار. يعيش على الأشجار اليابسة وبين نشارة الخشب. يرقه كبيرة القدر، غليظة الشكل، حلزونية الجسم مقبوة، غبراء اللون، سمراء الرأس، تركيب جلود الزيتون فتقظها.

* كُرْكُمِيَس *

Amethystea (S).

Amethyst (F). Amethyst (E). Amethystpflanze (D).

Amistea (I).

نبات عشبي حولي زراعي تربيني من فصيلة الشفويات. يزرع لزهره الأزرق الجليل المستحب العرف. نبتة صفراء اللون، نخيلة الساق، قصيرة الفروع المستطلة || يتكاثر بالبذر. أزهاره صيني.

* كُرْكُلُومَة *

Meinete (F).

طائر من الزرايزر يدعى مينات، أطله.

٢٣٥٣٣ - كَرَلِين أَفْتَشِي الْوَرَقِ °

Carlina acanthifolia (S). Carlina à feuilles d'acanthé, Chardousse (F).
نوع من الكرلين المبدول في الجبال. ساقه جذعة تملو من هـ إلى ١٠ سم. أوراقه كبيرة القند أفتشي الشكل. نصلها خلى البشرة على مساحتها السفل. رؤوساتها قصيرة الزناد. قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. قناباتها صفراء اللون. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.



كلين شائع

٢٣٥٣٤ - كَرَلِين شَالِع °، زَيْد الْعَبْد

Carlina vulgaris (S). Carlina vulgaire (F). Carlina thistle (E). Kleine Eberwurz (D). Carlina vulgaris (I).
نوع من الكرلين المبدول يكثر في المراعي الجبلية وفي الاراضي المذلاة. ساقه تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقه كبيرة القند، شديدة التفريش، خلية الصفحة السفل ترعها الماشية قبل الادراك والهج. رؤوساته الزهرية ملونة، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. قناباتها حنطية اللون || يقال أنه من النباتات الطبية التي تفيد افادة الحرفش والاراضي شوكي.



كرميوس المراعي

٢٣٥٣٥ - كَرَلِين عَدِيم السَّاقِ °، كَرَلِين تَجَسِي °

Carlina acaulis (S).
Carline acule, Baromètre, Loque (F). Carlina (E). Carlina acule, Baromètre, Loque (F). Carlina (E).
نوع من الكرلين المبدول. ساقه جذعة تملو من هـ إلى ١٢ سم. أوراقه كبيرة مستطيلة مقوسة، نصلها اخضر اللون، مائل البشرة على صفحته. رؤوساتها كبيرة القند ملونة، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٣ سم. قناباتها قفصية. ازهارها يستمر من تموز الى تشرين وهو ينكش عند وجود النعم وينبلج مع اشعة الشمس.

٢٣٥٣٦ - كَرَم °

Vignoble (F). Vineyard (E).
ومن اسمائه القردوس. كل ارض مفروسة كرمه.

٢٣٥٣٧ - كَرَم °

Cépage (F). Vine-plant (E).
الضرب المعروف الموصوف من الكرمة.

٢٣٥٣٨ - كَرَم زَيْتُون، بَسْتَان زَيْتُون، زَوَائِن

Olive, Olivaraie, Olivieraie (F). Olive-plantation (E).
كل ارض غرس فيها الزيتون.



كرميوس النجيليات

٢٣٥٣٩ - كَرَمِيُوسُ الْمَرَايِي °

Crambus pratensis (S). Crambe des prairies, Teigne des prairies (F). Crambus pratensis (E).
حشرة من فصيلة التاريات حرشيات الاجنحة. موطنها معظم اقاليم البلاد المحتلة الحارة من الشرق الاوسط واوربية. فراشها واسعة قوتها رقيق الانهار وظلمها. سرقتها غاصلة تميش على اوراق النباتات المرصدة || جسمها صغير قمصيت يطول نحو ٨ سم. بسطها نحو ٢٤ سم. رأسها صغير الجرم. عينها زويتان صغيرتان. زباناها خيطيان. ملاحسها دقيقة. مرشها معتدل الطول. جوشنها وبطنها الى الرملة || روشنها الاماميان الى السمرة الكستنية يطلوها دركة متربعة صفراء وجدة مستطيلة بضاء. روشنها الخلفيان الى السمرة الكستنية السوية. اهدابها الى التني || الاثني امير قدأ من الذكر واغلظ بطنأ منه وأطول مرشأ || لها جيل واحد في الحول. تظهر القراشة في ايار. تسرح في النهار ويبيت في الليل || الاثني تلقى المكن ميحادي على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || الطور



كرمة العنب

الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر والسرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١١ م. جسمها اسطواني الشكل، واضح التقسيم السكي، اريد اللون يطلو تنقيط اخضر الس يتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود. مذهبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة في المجالاة او تحت قشور الاشجار الحرجية القريبة من المراعي.

٢٣٥٤٠ - كَرَمِيُوسُ التَّجَلِيَّاتِ °

Crambus perillius (S). Crambe perle, Teigne des graminées (F). Crambus perillius (E).
حشرة من فصيلة التاريات حرشيات الاجنحة. موطنها معظم اقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واوربية. فراشها واسعة قوتها رقيق الانهار وظلمها. سرقتها غاصلة تميش على النجيليات البرية والزراعية || جسمها صغير يطول نحو ٩ سم. بسطها تراوح من ٢٨ إلى ٣٠ سم. رأسها معتدل الجرم. عينها زويتان، بارزتان. زباناها خيطيان. ملاحسها دقيقة. مرشها معتدل الطول. جوشنها وبطنها الى الرملة القفصية المواج || روشنها الاماميان الى الرملة القفصية يطلوها خفيف متداخل الاخضر والازرق. روشنها الخلفيان الى الرملة السمره المواج. اهدابها عاجية || الاثني امير قدأ من الذكر واغلظ بطنأ منه وأطول مرشأ || لها جيل واحد في الحول. تظهر القراشة في مطلع حزيران ويبيت حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. الاثني تلقى المكن ميحادي تغلفه مادة غروية تثبته على عصف النجيليات || الطور الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر. والسرقة عند بلوغها الكال المجسوري تطول نحو ١٢ م. جسمها اسطواني الشكل، واضح التقسيم السكي، اغبر اللون يطلو تنقيط جزوي يمتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود اللون. مذهبها ورواجبها الى الحطلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة بين فروع النجيليات او تحت اروماتها.

٢٣٥٤١ - كَرْمَة °

Vitis (S). Vigne (F). Vine (E).
جنس نباتات معمرة عارشة من فصيلة الكرديات. انواعها عديدة، معظمها بري ويزيني وبعضها زراعي || اشهر انواعها واعها زراعة واكثرها غروباً واجزلاً نغماً الكرمة العنابية.

٢٣٥٤٢ - كَرْمَة الْعَبَب °، كَرْمَة عَنِيَّة °

Vitis vinifera (S). Vigne commune, Vigne noble (F). Cultivated vine, Grape vine (E). Weinrebe (D). Vite (I).
نوع من الكرمة ضرورها المعروفة زهاء ٢٥٠٠ مجيها زراعية مشرة. سوقها عارشة ليفية مخشوشة. جنودها حزنينة منسطة لا تضرب الثور العميق. مرقعها سروح غيبة اسطوانية مستطيلة السلايات. اوراقها مقفصة متعاقبة عابلة تنمو على العقد. نصلها كني الشكل يكثر فيه التفصيص الخامسي وهو مسن الحافة، ازغب البشرة على صفحته او على الصفحة السفلى. حولها فارة حلزونية تنمو قبالة الاوراق. ازهارها عنقودي. عناقيدها تكون على عقد سلايات الزجون الحولي ازاء الاوراق. ازهارها صفيرة القند خضراء اللون وهي مركبة من كأس خامسي الفصل وتوتج خامسي البتلات المندمجة التي تبدو كالقلمعة فوق الاسدية والمدة. والاسدية خمس والمدة ذات مغلفين فروع يحضن كل منها بويضتان تصبحان بعد التاير والاصحاب

٢٣٥٤٨ - كُرْمِيس الزَيْتُون (F). Kermès de l'olivier
هي قزمية الزيتون المخططة ، أطلبا .

٢٣٥٤٩ - كُرْمِيس السَّنْدِيَّان Kermès du chêne
هي قزمية السنديان ، أطلبا .

٢٣٥٥٠ - كُرْمِيس الْوَرْد Kermès du rosier (F).
هي قزمية الورد ، أطلبا .

٢٣٥٥١ - كُرْمِيسِيَّات Coccidés (F).
فصيلة حشرات مشهورة باسم مغفريات ، أطلبا .

٢٣٥٥٢ - كُرْمِيَّ Vinicole, Viticole (F).
Wine-growing (E).
كل ما هو مختص بالكرومة من زراعة وصناعة .

٢٣٥٥٣ - كُرْمِيَّات Ampelidaceae (S).
Ampélidacées (F). Ampelidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات سفلية الاسدية . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الكرومة .

٢٣٥٥٤ - كُرْتَاب أصول الكرتاب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف .
الواحدة كرتافة . ج كرايف .

٢٣٥٥٥ - كُرْتَاب * Brassica caulorapa (S).
Chou-rave, Colrave (F). Hungarian turnip, Kohl-rabi (E). Knollenkohl, Knollkohl (D). Cavolo rapa (I).
نوع من الملفوف الزراعي المأكول . ساقه غليظة مستنيرة تنمو على سطح التربة || يجود في جميع الارربة الزراعية .
يؤخذ في الاكوادم وينقل الى مستقره حيث يغرس على ابعاد تراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم . بين السطر والسطر . وهو ينزق ويك .
قوته الغذائية لا بأس بها لذلك يكثر استعماله كمكلف للبهائم اخصها البقر .

٢٣٥٥٦ - كُرْتَاب الْجَمَل Moricandie (F).
هو الجم ، اطلبا .

٢٣٥٥٧ - كُرْتَاب الْمَاء Nénuphar bleu (F).
هو التيلوفر الازرق ، اطلبا .

٢٣٥٥٨ - كُرْتَاب بَحْرِي * Crambe maritima (S). Crambe maritime, Crambé, Chou marin (F). Sea cabbage, Sea kale (E). Echter Meerkohli, Seekohl (D). Crambe maritima, Cavolo marino (I).

بقلة معمرة من فصيلة الصليبيات تثبت برية على الشواطئ البحرية وتزرع في بعض البلاد اخصها اكثرها حيث يأكلونها بكثرة . طعمها كالقنبيط .

٢٣٥٥٩ - كُرْتَاب عُلْفِي Rutabaga (F).
Swedish turnip, Swede (E).
نبات علفي يدعى رباغة ، اطلبا .

٢٣٥٦٠ - كُرْمِيَّات Pieridae (S). Piéridés (F).
Pieridae, White butterflies, Sulfur butterflies (E). Weisslinge (D).
فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها متوسط الحجم وبعضها كبير وصغير . انواها

زبور الثمرة . والثمرة عنبية مختلفة الاشكال والاحجام والالوان مركبة من قشرة خارجية ولباب وزور . لبابها يولفت من ٨٥ الى ٩٠ ٪ من الثمرة وما تبقى فيعود الى القشرة والوزور . وهو يكون عند الادراك قليل الحموضة . كثير المادة السكرية ، لذلك الطعم ، مستحب النكهة والعرف ، متوسط تركيبة .

ماء من ٧٥٠٠ الى ٨٠٠٠ ٪
سكر قابل الاختار من ١٨٠٠ الى ٢٥٠٠ ٪
حيماض طليقة ثرثرة وقشاحية من ٠٣٠ الى ٠٤٥ ٪
بيتر ترات البوتاس من ٠٠٥ الى ٠٠٧ ٪
مواد ازوتية وبمعدنية عطرية من ٠٠٢ الى ٠٠٣ ٪
والكرومة ترضف في الاقاليم المعتدلة التي تؤمن لها الحرارة الكافية لادراك الثمار . هذا لا يعني انها لا تعيش في الاقاليم الباردة فهي تعيش وتتمثل الفر الشديد شرط ان تؤمن لها حرارة الصيف ما هي بحاجة اليه من السرعات اللازمة لادراك الثمار . وهي تفضل السفوح والمضارب والمواقع المنحدرة على البقاع المنبسطة او المنحدرة . وهي تجود في جميع الارربة يستثنى منها الربلية الصروف والكلسية البحت والطليعية المنحدرة . اما تكثرها فقد يتم على اربعة اشكال : باليزر والتفصيل والتبريد والتطعيم || فاليزر يستعمل عادة للحصول على اسرام ارقاء جديدة . اما التفصيل فهو الاشيع الطرق واسهلها واصلمها ، قوامه اصطفاء المغلة من زرعين بلغ الحول شرط ان لا تقل عقدا عن الاثنتين . اما التبريد فيتركز على لي وطر بعض سرور الجفنة الى ان تشرش وتفصل . يبقى التطعيم وهو اشهر من ان يعرف وقد كثر استعماله في الاجبان الأمريكية التي لا تحشى الفيلوكسره .

٢٣٥٤٣ - كُرْمَة بَيْضَاء Bryone blanche (F).
هي الفانشار البيضاء ، اطلبا .

٢٣٥٤٤ - كُرْمَدَان ، مَشَّان

Narthecium, Abama (S).
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة اربعة . جذاميرها مدادة . اوراقها عصفية الشكل مستعرضة النصل الجامد المخدد . شماريحها الزهرية متصبية مستطيلة تعلوها اوراق صغيرة ذرية متعاقبة متباعدة . ازهارها عتقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد سداسية البتلات . يستخرج من جميع اعضائها مادة جحالية فعالة شديدة التشظ .

٢٣٥٤٥ - كُرْمَدَان مَتَقَبِيّ ، حُثْنِي كَذَّاب Narthecium ossifragum (S). Nartécie des marais, Anthéric des marais (F). Bastard asphodel, Bog asphodel (E). Echter Beinbrech, Beinbrechgras (D). Asphodillo bastardo (I).

نوع من الكردان وهو نبات عشبي طبي معمر زرع للزئين . يتكاثر بالقلع واليزور . اوراقه عصفية متوسطة الاستطالة . نصلها جامد الصفحة غائر التخذيد . ازهاره صغيرة القد لونها الى الصفرة يدلوها موج اخضر . يستخرج من جميع اعضائه مادة جحالية فعالة يقال انها منشطة ومفيدة .

٢٣٥٤٦ - كُرْمِيس Kermès (F).
هي القزمية ، اطلبا .

٢٣٥٤٧ - كُرْمِيس الثَّفَاح Kermès virgule (F).
هي قزمية التفاح ، اطلبا .



كُرْب



كُرْب بحري

Cranchiidae (S). ٢٣٥٦٦ - كَرْتَشِيَّات

Cranchiidae (F). Cranchiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل مزدوجات الخيشوم. اجناسها وأنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد أعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل. تتميز برباطها العضلي الذي يجمع بين الرأس والجسم. زعانفها شرجية الارتكاز، خاصة الأضلع. عيونها كبيرة جاحظة || أشهر اجناسها الكرنشة.

Carnallite (F). ٢٣٥٦٧ - كَرْتَلِيَّت

Carnallite (E).

ملح معدني يستخرج من الأرض يستخلص منه البوتاس والمغنيزيوم.

Carnauba (F). ٢٣٥٦٨ - كَرْنُوبِيَّة

Carnauba palm (E).

كرنوبية هو الاسم البرازيلي. شجرة من التعليلات تدعى البتقوس تكثر زراعتها الصناعية في البرازيل. راجع بتقوس.

Calebasse (F). ٢٣٥٦٩ - كَرْتَب

هو القرع الطويل، اطلبه.

Chernetidae (S). ٢٣٥٧٠ - كَرْنِيَسِيَّات

Chernetidae (F). Chernetidae (E).

فصيلة دويبات من العقربيات الكاذبة. اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد، معظمها من دويبات المناطق الباردة || تتميز بصغر الجسم المغطى بالمطوق الطرف ويشامها المستطيلة المسلسلة بملاطق طرفية قريبة الشبه بملاطق العقارب || تعيش في المواقع المظلمة وتحت قشور الأشجار وفي البيوت الخشبية اعشاشها الخشبية السفوف || جميعها من الدويبات النافعة تقضي على الحشرات الصغيرة المؤذية.

Numenius (S). ٢٣٥٧١ - كَرَوَان

Curlis (F). Curlis (E).

جنس طير من الكروانيات القرواط. الاثنى كروانة والجمع كراوين وكروان. انواعه ١٠ تتميز باستطالة ودفق منقارها وسيقانها. اجنحتها ذلقة. اذنانها مستديرة. ارساها جحيفية الجهة الامامية، سرديلة الخلفية || تألف الماء وتعيش قرب الشاطئ. والحيوانات والايشات. قوتها الرخويات والديدان والحشرات والاسماك الصغيرة لتلتقطها عند جزر البحر || اناها تلدن في افاحيص تنفذ قوتورها بالخشيش وهي تقم من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها ٣ اسابيع. اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

Numenius arquata (S). ٢٣٥٧٢ - كَرَوَانُ ارْمَد

Numenius arquata (S). Courlis cendré, Grand courlis (F). Common curlew (E).

نوع من الكروان، كبير الجفنة طوله نحو ٦٥ سم. وبسطه ١٣٠ سم. ثوبه الى الريدة الزمادية المرطقة. يطنه الى البيضاء. عيانه عسلتيان. منقاره اسمر. ساقاه الى الرصاصي. يألف مختلف مناطق حوض البحر المتوسط يحومها مرتان في السنة.

Numenius tenuirostris (S). ٢٣٥٧٣ - كَرَوَانُ افْرِيقِي

Numenius tenuirostris (S). Courlis à bec grêle (F).

نوع من الكروان، صغير الجفنة طوله نحو ٤٠ سم. وبسطه

سوية اللونان يملعوا تجذيع وبقيق || يرقاتها شبه ملساء. رباط خادرتها يحزم اوساطها ويمعنها من التذلي.

Aporia crataegi (S). ٢٣٥٦١ - كَرْتَشِيَّةُ الزُّعُرُور

Aporia crataegi (S). Aporie de l'aubépine, le Gazé (F). Black-veined white (E). Baumweibling (D).

حشرة من الكرنشيات وسيدة الجبل الحولي. بسطها تراوح من ٦٠ الى ٧٠ م. رواشها الى البيضاء العاجي، عرقها سود. رقبها سمراء اللون، غيراه المدب، تعيش على اوراق الزعرور وسائر الاشجار المشرية. بيئاتها الشتوي تقفصيه داخل الاوراق التي تفتلها وتجمعها الى بعضها بجيوب من الحرير حطلي اللون.

Pteris rapae (S). ٢٣٥٦٢ - كَرْتَشِيَّةُ الْكُرْتَب

Pteris rapae (S). Piéride de la rave (F). Small garden-white (E). Kleiner Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنشيات، بسطها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ م. ذكورها يفس الراش، سمر الزوايا الامامية والبقع الثلاثية. اناها عادمة الزوايا السمر، ثنائية البقع الصغيرة. لها في الحول من جيلين الى ثلاثة. رقبها تعيش منفردة على مختلف اوراق الصليبيات البرية والزراعية اعشاشها الكرنب.

Pteris napi (S). ٢٣٥٦٣ - كَرْتَشِيَّةُ الْفَلْت

Pteris napi (S). Piéride du navet (F). Green-veined white (E). Rapsweibling (D).

حشرة من الكرنشيات، بسطها تراوح من ٣٥ الى ٤٠ م. رواشها الى البيضاء الاغبر يملع موج اغبر. ذكورها سمر الزوايا الامامية. اناها وذكورها ثنائية البقع السود المستطيلة الاشكال || رقبها خضراء اللون تركب الفلت وسائر الصليبيات. اذاها يستمر من حزيران الى ايلول.

Pteris brassicae (S). ٢٣٥٦٤ - كَرْتَشِيَّةُ الْمَلْفُوف

Pteris brassicae (S). Piéride du chou (F). Large garden-white (E). Grober Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنشيات بسطها، تراوح من ٦٠ الى ٧٠ م. رواشها الى البيضاء الاغبر، زواياها الامامية سودالاطراف. اناها ثلاثية البقع السود || من جيلان في الحول تمتع مكها على الصفعة السفل من التصل. مكها غمروبي الشكل، اصفر اللون، رزني التجميع، رزته تد من ٣٠ الى ٥٠ مكنة || رقبها نمة مؤذية تلهم اوراق الملفوف وسائر الصليبيات البرية والزراعية ولا ترك منها سوى الضلوع والمروق. ثوبها الى الخضار الاكعب يملعو تنميش اسود وثلاثة خطوط مستطيلة قاطية غيراه اللون.

Cranchia (S). ٢٣٥٦٥ - كَرْتَشِيَّة

Cranchia (F). Cranchia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل وفصيلة الكرنشيات. انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة. اعطائها بحار البلاد الحارة. ملجنها الحياتي جماعي. اسراها وافرة العدد. جميعها يمية لا تقرب الشطوط. مسرحها جدوي || اجسامها اسطوانية الشكل، زعانفها صغيرة، خاصة الاضلع، شرجية الارتكاز. ملاسها مندفعة بحجمة الاطراف.



كرننية الزعرور



كرننية الكرنب



كرننية الفلت



كرننية الملفوف



كروان ارمد



كروان افريقي

٢٣٥٨٢ - كروان مدسي Gobie sanglant (F). هو القويون المدسي، سمكة بحرية، اطلبه.

٢٣٥٨٤ - كروان امونياك، كروان الامونياك، حريف الشكادر

Crud ammoniac, Crude ammoniac (F). سماد كبري ازوتي يستعمل كحاشور وعشاب. وهو من عوائل صناعة غاز الانارة بحوي من ٢ الى ١٠ ٪. الازوت البطيء الانفعال والنترجة الذي يستعمل لتحويله في التربة من ٤ الى ٥ ٪ شهر ١١ اما خواصه الدافعية ان على الحشرات والديدان او على الاعشاب فسرعة المفعول الجيد النتاج. وهو يستعمل في هذا السيليل بمعدل يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ كيلو للدم الواحد.

٢٣٥٨٥ - كروان البصل *

Lilloceris merdiger, Lilloceris brunnea (S). Cricore de l'oignon (F). Onion-beetle (E). حشرة خاضعة مؤذية من النضاريات ورتبة مفسدان الانجحة. تألف البراري والمزارع وحقول البصل. غنائها ويرقاتها تعيش على اوراق البصل والكراث والروم البري وزيتق الوادي ١١ جسمها صغير القديط من ٦ الى ٧ م. ثوبها العلوي الى الحمرة القرمزية الصائبة الملاج. ثوبها السفلي الى السرة السوداء. رأسها مستعرض الجرم. عينها صغيرتان. زباناها خيطيان. ظهورها مستدير الطرف الاصح. غداها متشابها التحيز القاطب ١١ لها جيلان في الحول. تظهر الحشرة الجملة في اوائل نيسان. تسرح في النهار. تسادد بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتد المكن على نصال الارراق ١١ البرقة عند ادراكها الكال المجسوري تطلون نحو ٨ م. ثوبها الى الخنطي الاصفر الملاج. رأسها ورواجها سود.

٢٣٥٨٦ - كروان الزرع *، اوليسما الزرع

Ulema melanopus (S). Cricore des céréales (F). Cereal leaf beetle (E). Rothsaliges Getreidehähnchen (D). خنفساء من فصيلة النضاريات طوبا يراوح من ٤ الى ٥ م. رأسها وغداها الى الزرق الالامعة. كوسلها الى الحمرة. تركب مع برقاتها عصف التجليات فتؤذي وتسي. الى النباتات.

٢٣٥٨٧ - كروان الزئبق *

Crioceris lili, Lilloceris lili (S). Cricore du lis (F). Lily beetle (E). Lilienhähnchen (D). خنفساء من النضاريات طوبا يراوح من ٧ الى ٨ م. رأسها وقولها سود. كوسلها وشارها حر. مكبا ناري اللون وشعي الشكل تمتد الاثني على اوراق الزئبق فيفتق عن برقات تقطع الارراق وتقرضها.

٢٣٥٨٨ - كروان الهليون *

Crioceris asparagi (S). Cricore de l'asperge (F). Asparagus beetle (E). Spargelhähnchen (D). خنفساء من فصيلة النضاريات طوبا يراوح من ٥ الى ٦ م. رأسها اسود اللون، ازرق الملاج. كوسلها الى الحمرة يعلو توشيع اسفع. غداها الى الزرق المابقة عبقها اطار اصهب ويتخللها تبيج نصي متقابل لونه الى الصغار الاغبر الخنطي ١١ تركب المليون ويؤذي.

١٠٠ م. منقاره دقيق نحيل. ثوبه الى الربة الغبراء المرقطة. بطنه وانفيكه وشتر جناحه الداخلي الى البياض. مشتاه الرقية الاستوائية. مصيفه يمتد من مراکش الى الصعيد وقد شوهد مراراً في صقلية.

٢٣٥٧٤ - كروان الجبل

Edicnème (F). Stone curlew (E). هو البرهني، طائر من دجاجيات الارض، اطلبه.

٢٣٥٧٥ - كروان الهندسن

Numenius hudsonicus (S). Courlis du Hudson (F). نوع من الكروان متوسط الجثة، طوله نحو ٥٠ سم. وبسطه ١١٠ م. ثوبه الى الربة المرقطة بالابيض والاسود. بطنه تبي اللون وصدره وانفيكه كذلك ١١ يحبب امريكية الشمالية لكنه يكثر الاقامة في مناطق المدن اخصها الخليج.

٢٣٥٧٦ - كروانيات

Numeniens (F). عمارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها وانواعها عديدة تتميز بشكلها الرقيق الاهيف. مناقيرها مستطيلة، حلالية التفويص، مخدة الجرم. سيقانها دقيقة. اراسها سرديّة، اصابعها رباعية ١١ أشهر اجناسها الكروان.

٢٣٥٧٧ - كروان

Croton جنس نباتات حرجية وربة من فصيلة البتويجات. انواعه كثيرة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنبات والاعشاب. معظمها من نبات المناطق الاستوائية ١١ اوراقها كاملة متعاقبة، معققة، رمحية. ازهارها حنقودي تاجي. ازهارها وسيدة المسكن، ثمارها جراه كروية او بيضبة الشكل، يزورها نفعية منها هدنية طيبة ومنها صناعية. قشور بعض انواعها طيبة ١١ اشهرها ما يتبع.

٢٣٥٧٨ - كروان الزيت *، حب السلاطين، خزوع صيني

Croton tiglium (S). Croton cathartique (F). Croton-oil plant, Purging croton, Tiglium (E). Purgierkroton, Tiglibaum (D). Croton, Tiglio drastico (I). نوع من الكروان، منته المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية. يستخرج من بزوره مادة زيتية خواصها خواص زيت الخروع وتستعمل استعماله.

٢٣٥٧٩ - كروان عنبيري، قشر عنبيري

Croton eluteria, Cascarilla elutia (S). Cascarille, Croton eleutherie (F). Cascarilla-bark tree, Seaside balsam (E). Kaskarillenstrauch (D). Cascariglia, China aromatica (I). نوع من الكروان، منته البلاد الامريكية، يستخرج من طائه مادة عنصرية مرة زكية العرف العنبري المستحب، تستعمل ضد الحيات.

٢٣٥٨٠ - كروان

Gobie (F). جنس اسماك بحرية مشهورة باسم قويون، اطلبه.

٢٣٥٨١ - كروان اسود

Gobie noir (F). هو القويون الاسود، سمكة بحرية، اطلبه.

٢٣٥٨٢ - كروان اغبر

Gobie nébuleux (F). هو القويون المشب، سمكة بحرية، اطلبه.



كروان الزيت



كروان البصل



كروان الزرع



كروان الزئبق



كروان الهليون

Sphérique (F).

Spherical (E).

ما كان شكله كالكرة او ما كان له صلة بالكرة .

Carvi

٢٣٦٠٢ - كُروِيَاء

هي الكراويا ، اطلبها .

Micrococceae (S).

٢٣٦٠٣ - كُروِيَّات

Micrococccées (F). Micrococeae (E).

فصلة من البكتيريا . اجناسها وانواعها التي هم الزراعة قليلة العدد تتميز باحجامها الذرية الكروية وبانقسامها التكاثري الذي يحصل في اتجاهات مختلفة يمكن حصرها بالاتجاه الفردي والاتجاه الثنائي والاتجاه الثلاثي || اعرف انواعها المضرة ما يتبع .

٢٣٦٠٤ - كُروِيَّة البُرَّ * Micrococcus tritici (S).

Microcoque du blé, Maladie du blé rose (F).

مرض يكثري من الكرويات ، نحازه شديد الوبق واللاثر على برّ الحنطة فيقبحه ويغندده ويمطيه ويشبهه بالخضاب الوردي اللون .

٢٣٦٠٥ - كُروِيَّة إمبراطوريَّة

Micrococcus imperatoris (S). Microcoque impérial (F).

مرض يكثري من الكرويات ، نحازه شديد الوبق على درنات البطاطا المخروسة والمحفوفة في اماكن رطبة عادمة البهوية لانه يهرىها ويسبب تلفها .

٢٣٦٠٦ - كُروِيَّة بِيضَاء

Micrococcus albidus (S). Microcoque blanc (F).

مرض يكثري من الكرويات يعثرى البطاطا والقلعاس والبصل فيعفنهما ويهرىها .

٢٣٦٠٧ - كُروِيَّة ذَهَبِيَّة

Micrococcus flavidus (S). Microcoque doré (F).

مرض يكثري من الكرويات ، نحازه يميل على عدة المحدثوشة المحفوفة فيفسدها ويسبب تلفها .

٢٣٦٠٨ - كُروِيَّة قِصْرِيَّة

Micrococcus pellucidus (S). Microcoque pellucide (F).

مرض يكثري من الكرويات ، نحازه يميل على عدة نباتات بصلية وبوصية وقد يركب البطاطا ويسبب لها الجرب الدرري .

٢٣٦٠٩ - كُروِيَّة بِنَكُورِيَّة *

Micrococcus phytophthorus (S). Microcoque noir, Maladie de la jambe noire (F).

مرض يكثري من الكرويات ، نحازه شديد الوبق على سوق البطاطا حيث يعمم بعض اقسامها فيسبب اسودادها وتلفها . وقد يصيب الدرر فيبدو كبقع سود تحوّلها حالات سمر تجفف القشرة وتصلبها وتشتققها ثم تهري القلب .

٢٣٦١٠ - كُريّ Curage (F). Cleansing (E).

اخراج الرجل والحماً والاعشاب من القنوات والجحاري المائية

٢٣٦١١ - كُريّات

Corpuscules du sang, Globules (F). Blood corpuscles, Globules (E).

الوحدة كُريّة . والكريات مجموعة من الاجسام السائجة في الدم منها الحمر والبيض ثم الصفية والمخاطية او الحيودة .

Crossing-over

٢٣٥٨٩ - كُروسيّن أوفر

هو الحاصل الناتج عن تشابك والتفاف النشب .

٢٣٥٩٠ - كُروْلَا اُرْجُونِيّ الصّدر *

Querula rubricollis (S). Plauhau de Cayenne (F).

طائر من الجوارثم سنيات المنقير وفصيلة القطنجيات . اعطاه بعض مناطق امريكا الاستوائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى السواد الاسفع . زوره وصدره ارجوانيا اللون عند الذكر || ملجته الحياتي جماعي الا في زين التسافد والحضانه . يالف الغابات والحراج . قوة البذور والثار البائنة وبعض الحشرات اخصها النمل .

٢٣٥٩١ - كروم Chrome (F). Chromium (E).

معادن اكهب اللون شديد الصلابة ثقله النوعي يراوح من ٦ الى ١٨ ، ينصهر في ١٥٢٠ سغ || رمزه (كـ - Cr) ونقه الاتوبي ٢٥٠١ وهو لا يتأثر بالهواء الجوي ولا يتأكسد الا في درجات الحرارة العالية . يذوب في الحامض الكلوريدريكي والحامض الكبريتي || يوجد في الطبيعة مركبا مع بعض العناصر بسبب تخلفه . تحريره واستخلاصه من غلفه يستوجب صهره في افران خاصة تتحمل الحرارة العالية || اشهر مركباته الطبيعية كرومات الرصاص . اما اشهر مركباته الصناعية فهي كرومات البوتاسيوم وكرومات الصوديوم التي تستعمل في ديع الجلود وصباغها .

٢٣٥٩٢ - كروماتيد Chromatide

هو من النشبة نصف شطرها الطولي وذلك عندما تكون في طور الميوزة .

٢٣٥٩٣ - كُرومَاتِيكِي، صِبغِي Chromatique (F).

Chromatic (E).

نمت تعريفي توصف به الاعضاء الصبغية في الاجسام الحيوانية والنباتية .

٢٣٥٩٤ - كُرومَاتِيْن، كروميتين Chromatine (F).

Chromatin (E).

مركب آسي - حامضي - فسفوري تتكون منه مادة النشب وقسم من الجبهة الخليوية .

٢٣٥٩٥ - كُرومُوبلاست Chromoplaste (F).

Chromoplastid (E).

٢٣٥٩٥ - كُرومُوبلاست

مادة الأثلة الملونة .

٢٣٥٩٦ - كُروموزوم Chromosome

هو النشبة ، اطلبها .

٢٣٥٩٧ - كُرومُولُوسِيْت Chromoleucite

حبيبة الخشب في ودة الخلايا النباتية .

٢٣٥٩٨ - كُرومُومِيْر Chromomère (F).

اصفر جزئيات تشغل بالشكل والمركز في شعاع الببتون الكروماتيكي .

٢٣٥٩٩ - كُروْنِيْلَة Coronille (F).

هو الامروس نبات من الفريتيان ، اطلبه .

٢٣٦٠٠ - كُرونومتر Chronomètre (F).

Chronometer (E).

آلة تستعمل في قياس الوقت لا يفرقها عن الساعة العادية سوى دقة الاداء والضبط الفائق والتوقيف الحيازي .



كرولا ارجواني الصدر



كروية البر



كروية ينكورية

٢٣٦١٢ - كُرْبَات يَفِيْ

Globules blancs, Leucocytes (F). Leucocytes (E).
حجيرات حيوانية متحركة وظفيتها الرئيسية القضاء على
الجُكروبيات السابحة في الدم || المليمتر المكعب من الدم
يحتوي نحو ٧٠٠٠ كرية .

٢٣٦١٣ - كُرْبَات حُمْر

Globules rouges, Hématies, Erythrocytes (F). Erythrocytes (E).
حجيرات حيوانية من ذوات النواة . وظفيتها الرئيسية حمل
الاكسيجين من الرئة الى جميع اجزاء الجسم وهي تعيش
بضعة اسابيع ثم تنقسم وتفتت . نسبتها الى الكريات
البيضاء نسبة ٥٠٠ الى ١ || المليمتر المكعب من الدم
يحتوي ما يراوح قدره من ٤ الى ٥ ملايين من الكريات
الحمر . اما لونها الاخر فيزي الى المادة الملونة الحمراء
المعروفة بالهيموغلوبين (Hémoglobine) .

٢٣٦١٤ - كُرْب

Rhizome de roseau (F).
Rhizome of reed (E).
الكعب من القصب او القنا تعريفه العامي «صلطون» .

٢٣٦١٥ - كُرْبِيْسِيْسُورِيْم

Cryptosporium (S).
جنس فطور مجهرية رمية من فصيلة الزيفيات . انواعه
قليلة قليلة ولاضرار . تركيب لحم الاغصان والافناد اليابسة .
ونيمته مجنية او عسبة الشكل ، تنشا محضنة ثم ترقى .
بويضاته شفاقة ، بسيطة ، قوسية الشكل .

٢٣٦١٦ - كُرْبِيْتورْك *٥

Cryptorrhynchus (S).
جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة السويات . انواعه
المعروفة سبعة . اولها تراوح من ٦ الى ١٠ سم . اولها
حنطية او سمراء اللون تعلوها تراويق وزرا كثر سود . تعيش
على الحوز والصفصاف والبيتولا . يرقاتها تسردب
الاجنار الفتية والجنود المنطوعة اليابسة وقد تنخرها حتى
اقتلاها .

٢٣٦١٧ - كُرْبِيْتورْك الصَفْصَاف *٥

Cryptorrhynchus lapathi (S). Cryptorrhynque
des saules (F). Cryptorrhynchus lapathi (E).
حشرة خاضعة غاشبة مؤذية من فصيلة السويات ورتبة
معدنات الاجسمة . تألف المواقف الرطبة والمنائع . خنافسها
تعيش على اوراق البث والحميض . يرقاتها غاشبة تركيب
الحوز والصفصاف والحوز تسردب الاجنار الفتية والجلود
المنطوعة وقد تتخلجها حتى اقتلاها || جسمها صغير القد ،
يطول نحو ٨ سم . ثوبها اصفر اللون تعلوه فصوص متراكبة
وتتراويق وزرا كثر فيها الاسود والخطي والكسني والاصهب
والاشقق الصنابي . رأسها صغير الحجم . عينها صغيرتان
زباباها صوغانيان ، مرققيان . ظهرها مذهب المخضر
اللاصق . غمداه متشابته التحزيز الخفيف القاطب ||
لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها
الشوري في اوائل نيسان ويبقى حتى اوائل الحول . تسرح
في النهار تزد المكان ميحاديا في ثوب تتخلجه يمتكها في
لحم الجلود || البرقة عند بلوغها الادراك التام تظل نحو
١٢ سم . جسمها اهليجي الشكل ، مكور الرأس ، مذهب ،
الطرف ، حنطي اللون اسود الرأس والشرج .

٢٣٦١٨ - كُرْبِيْتولِت

Cryptolite
هو فسفات السيريوم الطبيعي ، يكثر وجوده في الايديت
الاخضر .

٢٣٦١٩ - كُرْبِيْتورِيَا

Cryptomérite (F).
شجرة من الطقوسيات تعرف بالسوي ، اطلها .

٢٣٦٢٠ - كُرْبِيْسِيْس

Coreopsis (S).
Coréopsis (F). Callopsis, Tickseed (E). Schöngesicht, Wauzenblume (D). Coreopsiside, Callopsis (I).
جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة ،
منها البرية والزرينية . اوراقها لاقياسية الشكل والاركانز .
ازهارها زردية ، ثمانية السينات الملمة . بزورها
مستطيلة مبطلة متوجة بسنن او حسكتين او حرفشتين .
اشهر انواعه الزرينية ما يليج .

٢٣٦٢١ - كُرْبِيْسِيْس اُنِيْ

Coreopsis elegans, C. tinctoria (S). Coréopsis élégant (F).
نوع من الكريبيس ضرورية عديدة ، اولهاها ، جميعها
اشباب زرينية حولية تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها
متقابلة مفرشة . فروصها قدية الشكل ، ثلاثية او خماسية او
سباعية العدد . فصلها مائل البثرة حايق الخضر .
رويساتها الزهرية ملونة اللبالب والسينات ، قطرها نحو ٤ سم .
ازهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٣٦٢٢ - كُرْبِيْسِيْس بَحْرِيْ

Coreopsis maritima (S). Coréopsis côtière, C. maritime (F).
نوع من الكريبيس وهو بجلة زرينية معمرة تملو نحو
٣٠ سم . تألف الشطوط البحرية الدافئة . ساقها غليظة
قصيرة متشعبة . اوراقها متقابلة قدية التفريش الضيق .
رويساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد صاحبة الشكل ،
قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طول
فصل الخريف .

٢٣٦٢٣ - كُرْبِيْسِيْس كَبِيْر الزَهْر *

Coreopsis grandiflora (S). Coréopsis à grandes fleurs (F).
نوع من الكريبيس وهو عشبة زرينية معمرة تملو من ٣٠
الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة مفرشة . فروصها قدية
الشكل ثلاثية او خماسية العدد . فصلها مائل الصفحة العليا
خلي السفلى . رويساتها الزهرية مكسبة قطرها نحو ٥ سم .
طباها الى الصفرة ، لسيناتها رباعية التفصيص ذهبية اللون .
ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٦٢٤ - كُرْبِيْسِيْس مُتَوَحّج

Coreopsis coronata (S). Coréopsis couronné (F).
نوع من الكريبيس وهو عشبة زرينية حولية تملو من ٣٠
الى ٥٠ سم . ساقها نخيلة مستقيمة . اوراقها متعاقبة كاملة ||
فصلها اهليجي الشكل ، مقطوع القاعدة ، رحل الصفحة
المائلة . رويساتها الزهرية صفر اللبالب . لسيناتها
برتقالية اللون حنطية الخطار . قناباتها سنائية مهدبة .
ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٢٣٦٢٥ - كُرْبِيْسِيْس نَجْمِيْ

Coreopsis stellata, C. major (S). Coréopsis étoilée (F).
نوع من الكريبيس وهو بجلة زرينية معمرة تملو من ٦٠
الى ٩٠ سم . ساقها وفروصها مزيفة اللحم . اوراقها ضمية
الاركانز ، ثلاثية التفريش الضفي . فصلها خلي البثرة .
رويساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد نجمة الشكل
مستطيلة السينات الناشرة || ازهارها يستمر من تموز
الى آب .



كُرْبِيْتورْك



كُرْبِيْتورْك الصَفْصَاف



كُرْبِيْسِيْس اُنِيْ



كُرْبِيْسِيْس كَبِيْر الزَهْر

المتوازية. ازهارها خاسية او مداسية التركيب. ثمارها مختلفة الاشكال تكثر فيها الاستدارة. سؤذها لباني المادة المأكولة || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٣٦٣٥ - كرزوفيلم إفريقي *

Chrysophyllum africanum (S). *Chrysophylle african* (F).

نوع من الكرزوفيلم منته البلاد الافريقية الاستوائية. ثمرته تملو نحو ١٢ م. ثماره مأكولة بيضيه الشكل مقبوة القاعدة تحوي من ٣ الى ٥ عجات .

٢٣٦٣٦ - كرزوفيلم كيميتو *، كيميت *

Chrysophyllum caimito (S). *Chrysophylle caïmite*, *Caimitier* (F). *Common star apple* (E). *Echter Sumpfelbaum* (D). *Crisifollo caimito* (I).

اشهر انواع الكرزوفيلم واعما زراعة. ضروريه الثالثة خسة. اشجارها تملو من ١٥ الى ١٠ م. سوقها منتصبة، مثققة السماء. اغصانها فارشة. قشها فروع قلنسوية الشكل. اوراقها متناوبة اهليلجية. فصلها جامد السنج، اخضر الصفحة العليا، خلى السفل، مذهب الخمل، ازهارها صغيرة، اللد، بيضاء اللون، خماسية التركيب، مستطيلة الاذن. ثمارها كروية الشكل حجمها حجم التفاح. قشورها مألثة ملونة، لبانها جامد المادة متوسط العصارة السكرية اللزجة .

٢٣٦٣٧ - كرزوفيلم مكوكو *

Chrysophyllum macoucou, *Aubletia macoucou* (S). *Chrysophylle de Macoucou* (F).

نوع من الكرزوفيلم الزراعي. ثمرته تملو نحو ١٠ اثمار. ثماره مأكولة اجاسية الشكل واللذ، برتقالية اللون مداسية المعجات .

٢٣٦٣٨ - كرزوفيلم وحيد العجمة *

Chrysophyllum monophyrenum, *C. oliviforme* (S). *Chrysophylle monosperme* (F).

نوع من الكرزوفيلم الزراعي. ثمرته تملو نحو ٨ اثمار. ثماره وحيدة العجمة بيضيه الشكل والحجم. لوها الى البفسجي المايق. لبانها لذيق الطعم عند الادراك التام .

٢٣٦٤٠ - كرزوكوم *

Chrysocome (F).

هو ذنب القط، اطلبه .

٢٣٦٤١ - كرزويوميكه *

Chrysomyxa (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الرخايات يشتر بذانجته الوادية وبمسائله الشفافة الرقيقة. طوره الاديدي يتكون وينقيض على اهداب الصنوبريات حيث يلو كالحوصلات المرصوة بموازة الصلغ على جانبها || انواعه الاقتصادية المعروفة قليلة منها كرزويوميكه الايصة وكرزويوميكه المعصل .

٢٣٦٦٦ - كرزوبسيس وزدي *

Coreopsis rosea (S). *Coréopsis rose* (F).

نوع من الكريسيس وهو عشبة زينة معمرة تملو ١٥ الى ٦٠ سم. اوراقها متناوبة لاطنة. فصلها مائل البشرة وحيد العرق يطلو من ٣ الى ٧ سم. ويعرض من ١ الى ٣ م. رؤوسها الزهرية صفر الطياب، بيض السنبتات قتلها نحو ٢ م. ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٣٦٦٧ - كريتة *

Butyrospermum parkii (S). *Karité*, *Si* (F).

شجرة مشرة من فصيلة الطليحات . منتهيا البلاد الافريقية الاستوائية. تكثر في ساسب السودان وغينيا والشاطئ العاجي والدهوبي والفرنزا والكيمون وتشاد والابوني || ساقها غليظة منتصبة نخبة السماء الرطبة . اوراقها ضمية طرفية. فصلها سناني الشكل، مستطيل المنق، بارز العروق العديدة. ازهارها ضمية التجميع، طرفية الارتكاز، خنثوية. ثمارها برتقالية اللذ مأكولة الاباب تخض عجينتين لوزيتين لبها يحوي من ٤٠ الى ٥٠ ٪ من المواد الدهنية الجامدة المعروفة باسم الكريتة وهي تستخرج من اللوز بعد تحميمه ونفشه .

٢٣٦٦٨ - كيريرة *

Carriérée (F).

هي النوار الصبي، شجرة زينة، اطلبه .

٢٣٦٦٩ - كيرير *

Conus (S).

Cône (F). *Conus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاجل وفصيلة الكيريزيات، انواعه المعروفة نحو ٥٠٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اصداها غروية حلزونة قريبة الشبه باكرار الصنوبر. مرادها سننة. اسنانها نبال صغيرة ذرية لسها ذرابي مؤذ .

٢٣٦٣٠ - كيرنثم *

Chrysanthème (F).

هو القوتحان، اطلبه .

٢٣٦٣١ - كيرنثم البر *

Chrysanthème à carène (F).

هو قوتحان المروج، اطلبه .

٢٣٦٣٢ - كيرنثم مخصّل *

Chrysanthème des blés (F).

هو القوتحان الذهبي، اطلبه .

٢٣٦٣٣ - كيرزويوميكهس *، سيميريس *

Chrysorthrix (S). *Saimiris* (F).

جنس قرد امريكية من فصيلة السوسيات. انواعه ٣ موطنها امريكة الوسطى اخصها البرازيل والنيوان وكولومبيا وبوليفيا والبيرو || اجسامها صغيرة القد. رشيقة القوام. قوامها دقيقة متوسطة الطول. اذنانها مستطيلة نخلة. انواها متباينة الالوان الزاهية. شعورها ناعمة، لبدة وثيرة. تألف الاجراع والغابات. مرمها الاشجار دون الخفيض. قوتها البرام والادراق والحشرات والمصافير .

٢٣٦٣٤ - كرزوفيلم *

Chrysophyllum (S).

Chrysophylle (F). *Star apple* (E). *Sernsappelbaum* (D). *Crisifollo* (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية مشرة من فصيلة الطليحات. انواعه عديدة. اصطانها البلاد الاستوائية. سوقها منتصبة. مصانها حلابية المادة. اوراقها اهليلجية مستطيلة. فصلها جامد الصفحة، كثير العروق النخيلة



كريتة (١)



كيريه (٢)
(الثمرة والبذرة والزهر)



كيريز



كيروز ييكس



كرزوفيلم كيتينو

٢٣٦٤٢ - كريزوميكس الأيسنة

Chrysomya abietis (S). Rouille des aiguilles de l'épicéa (F). Needle rust of the spruce (E). Fichtennadelrost (D).

فطر مجهرى يتطفل على اهداب الايسنة فيذبلها ويسبب سقوطها || مظهره الخارجى يقع منخفضة متناوبة متجانسة صفراء اللون تظهر في اواخر حزيران على ظهور ميازيب الاهداب ثم تتطور وترتفع وتصيب كل بقعة من البقع قاعدة لحوصليتين مستطيلتين لونها الى الصفرة الزاهية تقومان على جانبي نسيج الهدب || وهو يركب الايسنة في جميع المراتع اما يفضل الاشجار الفتية التي تراوح اعمارها من ١٠ من ٢٠ سنة.

٢٣٦٤٣ - كريزوميكس العفصل

Chrysomyxa rhododendri, *Uredo rhododendri*, *Acidium abietinum* (S). Rouille vésiculaire du rhododendron (F).

فطر مجهرى يتطفل على العفصل في المناطق الجبلية التي تملو سطح البحر من ١٠٠٠ م. وما فوق || مظهره الخارجى يشور مستندرة او بيضيه الشكل تركب النصل على صفته السفلى يقابلها على البهفصة العليا يقع بنفس الحجم النسيج الى الجقوة ثم تنحرف الى الخنفي وترتفع بشرة النسيج وتغيرها وتسبب جفاف النصل وسقوط الورقة.

٢٣٦٤٤ - كزيميات

Conidæ (S). Conidés (F). Conidæ (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطباشيرية والبعض الآخر معاصر || اصداقها محلزنة اسطوانية الشكل او مخروطية. فروبها مستطيلة مفردة الحمار. اسفلها قرنية المادة || اعرف اجناسها واشهرها الكريز والزراعة.

٢٣٦٤٥ - كريزيل

Crésyl (F). Cresyl (E). سائل مظهر خزوني اللون يستخرج من قطران الفحم الحجري.

٢٣٦٤٦ - كزيمية الحما

Astragalus peregrinus (S).

نبات يدعى اسطرافالوس رحال، اطلبه.

٢٣٦٤٧ - كريفون

Pomelo, Grape-fruit هو ليمون الجنة، اطلبه.

٢٣٦٤٨ - كريكة

Carychium (S). *Carychie* (F). *Carychium* (E).

جنس حيوانات برية من الرغويات مميزات الارجل وفضيلة الحفصيات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الاراضي الجوردية والطباشيرية. انواعها المعاصرة منتشرة في جميع اصقاع العالم. تعيش في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداقها شبه مردنية الشكل، محلزنة الصف الخلفي، مستدقة الاقواب.

٢٣٦٤٩ - كريكة

جنس نباتات شجرية معمرة من فصيلة البياضيات. مهددا البلاد الحارة الاستوائية. سوقها اسطوانية منتصبة عريضة تحمل في زاهها الاخير ومنه قبا بعض الاوراق المزندة الكبيرة النصل وبعض الثمار الكبيرة اللد || ثمارها

ماكولة البلب نافمة تقيد المعدة وتتشط الحقم. اشهر انواعها ما يتبع.

٢٣٦٥٠ - كريكة الالند

Carica candamarcensis (S). نوع من الكريكة، مهددا جبال الالند الامريكية اخصها الوالمة قرب خط الاستواء. تجربها تملو من ٤ الى ٦ امتار. ساقها غليظة. اوراقها مستطيلة الزناد. نصلها سباعي التفصيص، متباعد التفريض، بحري اللون، ازرق المواج، خلى الصفحة السفلى || ثمارها اهليلجية الشكل، خاسية الفلوع، ناعمة الصرة اللدية. قشورها عند نفضها يرتقالية اللون لا تقل سماكتها من ١٠ سم. لبها رخو، المادة، عادم اللون. بولورها بيضيه الشكل، سمراء اللون، حريفية الطعم، لاذعة. قشورها ولها توكل طازجة ومطبوخة. تتكاثر بالبلدر، ترب في الارربة الخفيفة المتوسطة الاندماج. تعيش على الساحل اللباني.

٢٣٦٥١ - كريكة بيبايا

هي البياض الزراعي، اطلبه.

٢٣٦٥٢ - كريكة بنتاغون، كريكة خماسية

التضلع *Carica pentagona* (S).

نوع من الكريكة البربرية الشائعة الزراعة. تجود وتثمر في معظم البلاد الحارة، لكنها تنحى الصقيع ولا تنحلل درجة الصفر اكثر من بضعة ايام. ساقها منتصبة نحلة عريضة تملو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها خاسية التفصيص، نصلها مالمس البشرة على صفحتي، زائداها ثلاثي التضلع. ثمارها مقطوعة القاعدة، مدببة الطرف، قطرها نحو ١٢ سم. وطولها يراوح الى ٢٥ من ٣٠ سم. لبها حامض المذاق، ابيض اللون، مستحب العرف. ترب وتؤكل مطبوخة ومصورة.

٢٣٦٥٣ - كريكة صفراء البتلات

Carica chrysopetala (S).

نوع من الكريكة، مهددا البلاد الامريكية الحارة. ساقها اسطوانية منتصبة تملو من ٣ الى ٦ امتار. اوراقها مستطيلة الزناد الثلاثي الاصلع. نصلها خاسي التفصيص، متقارب التفريض، بحري اللون، مالمس البشرة. ثمارها اهليلجية الشكل، مقطوعة القاعدة، ناعمة الثقل، سباعية الفلوع تطول نحو ١٥ سم. لونها عند نفضها يراوح من الفسقي الى الاسفر المايق. لبها تافه الطعم مستحب العرف يؤكل مطبوخا.

٢٣٦٥٤ - كريكة متخاضية الزهرة،

كريكة كزولوبا

Carica cestriflora, *Vasconcella cestriflora* (S).

نوع من الكريكة، مهددا كولومبيا وفرنطة الجديدة. ساقها تملو من ٣ الى ٥ امتار: اوراقها سباعية التفصيص خلية الصفحة السفلى، غليظة الزناد. ثمارها عظرية العرف، مستحبة المذاق، تؤكل مع السكر. لبها اصفر اللون، بطيخي التركيب || تتكاثر بالبلدر. ترب في الارربة الخفيفة العميقة الغور. تعيش وتثمر على الساحل اللباني.

٢٣٦٥٥ - كزيم

Dicholopus (S). *Cariama* (F). جنس طير من طرال الساق، اقواه المعروفة قليلة العدد تجمع بين التفلق والروو. اخلاقها اخلاق التعقب وهي قريبة الشبه منه. موطنها امريكة الجنوبية. اجسامها



كريكة

كريكة (١)
(الورقة والزهرة)

كريكة (٢) (الشرة)

سفعه مركب الخوص المتقابلة . كافوره ابطي الاينكاز ، صغير القد ، ينشق من طلمة متدلية . ثماره جوزية الشكل والقد . يستخرج من جاراته لباب كالسغو متوسط الصنف .

٢٣٦٦٣ - **كُريوسوت**
Créosote (F).
Creasote, Creasotum, Creosote (E).

سائل مطهر كاو عديم اللون فواح الرائحة يستخرج من قطران خشب الزان . يستعمل في علاج مرض السل ولتسكين ألم الإنسان .

٢٣٦٦٤ - **كُريوفيلين**
Caryophyllène (F).
Caryophyllin (E).
هيدركربور سائل يستخلص من عطر القرنفل والدارسيني والكيبية . ثقله النسبي عند ١٥ °س = ٠,٩٠٨٥ ، ويغل عند ٢٦٠/٢٥٨ °س .

٢٣٦٦٥ - **كُريوكار**
Caryocar
جنس الشجر بريّة وزراعية من فصيلة الكريوكاريات . انواعه المعروفة ثمانية منها البرية والزراعية والتربينية . سوقها منتصب ، رفيعة ، فروعها . اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل ، بعضها مأكول والبعض الآخر دهنى الايوب يستخرج منه دهن نباتي يستعمل استعمال السمن او الزبدة || اشهر انواعه الكريوكار السمني والحسفي .

٢٣٦٦٦ - **كُريوكار حَسْفِي**
Caryocar nucifère (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية وتربينية منها امريكية الجنوبية وتعيش في المناطق المعتدلة الحرارة . ساقها فروعها . اوراقها متقابلة . اثمارها ارجوانية سوداء المواج يطرقها حنار احمر زاهي . اسيدها عديدة مستطيلة ذهبية اللون . ثمارها حسفي اي جوزية مأكولة الصلّام .

٢٣٦٦٧ - **كُريوكار سَمْنِي**
Caryocar butyracé (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية يستخرج من البوب ثمارها الجوزية مادة دهنية دسمة شائعة الاستعمال كسمن نباتي .

٢٣٦٦٨ - **كُريوكاريات**
Caryocaracées (F). Caryocaracées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منها مطع اصفاع امريكية الحارة والاستوائية . نباتاتها اشجار وشجيرات مستنصبة القالب . اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل والقشور ، مأكولة الايوب الوافر المادة الدهنية || اشهر اجناسها الكريوكار .

٢٣٦٦٩ - **كُريوليز**
Caryolyse (F). Karyolysis (E).
الكريوليز انحلال نواة الحجرية او الخلية .

٢٣٦٧٠ - **كُرْزَا ، كُرْزَا ، تَتَانُوس ، تَيْتَانُوس**
Tétanos (F). Tetanus (E).
شَوْهَار ، قَسَل
مرض خبيث خطر تقتضي منه العضلات وتشنج . سببه تسم المراكز الدماغية بتأثير ميكروب خاص يدهي قصية تيكلولايت تدخل الجسم عن طريق الجرح .

٢٣٦٧١ - **كُرْب**
Nothoscorde (F).
Nothoscorde (F).
جنس نباتات بصلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه

واعناقها مستطيلة ، رؤوسها كبيرة متوجة الجباه بكثرة من الزئبق المنتصب الدقيق . مناقبها قوية مدببة الملاحظ المحدة الحادة . اجنسها مزيلة . سيقانها واراسها رفيعة . غالبها غالب الجوارح || اعرف انواعها واشهرها الكرم المتوج .

٢٣٦٥٦ - **كُرْب مُتَوَجَّح * ، لَقْلَقُ الْأَقَامِي**
Dicholopus cristatus (S). Carliama huppé, Cigogne des serpents (F).

طائر من الكرم ، كبير القد ، طوله نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الكهبة ، كل ريشة من جسمه تملوها خطوط دقيقة متعرجة شبيهة اللون زاحية . ريش رأسه وصقعه الى الربعة السمر المراج . افيكه ابيض الاطراف . حذقة عينه كيرينية الصفار . زقده ازرق . منقاده ورسفاه حر || موطنه امريكية الجنوبية . يألف الحفصاء الدفلة والمواقع الكثرة الحشب الرفيع . قوته الخمرات والنظام والافاعي وتختلف انواع القار والفران || يدين في الاشجار القليلة الارتفاع . عشه مزيج من القصبان والحشائش المنموه بالطين . اثناء تضع بيضتان تحضنها نحو ثلاثة اسابيع || يألف حياة الاسر ويعيش بسهولة مع سائر الطيور الدواجن .

٢٣٦٥٧ - **كُرْبِيَمَة**
Corémie (F).

٢٣٦٥٨ - **كُرْبِيَمَة ، كُرْبِيَمَة**
Coryanthes (S).
Coryanthe (F). Helmet orchid (E). Helmbloome (D). Coriantio (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السحليات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية والتربينية . اصطلها المناطق الاستوائية اعضها الامريكية . اوراقها لحمية . ازهارها جميلة الشكل كرجة الرائحة .

٢٣٦٥٩ - **كُريوة**
Oosphère (F). Oosphere (E).
البويضة النباتية الانثوية الى ان تتحد بالذكورة فتصبح النواة . راجع خلية .

٢٣٦٦٠ - **كُريوته * ، نخلة الجوز**
Caryota (S). Caryote (F).

جنس نخل منته يمتد من الهند الى الكونغو وجزر الزايج . انواعه المعروفة تسعة اشهرها الكريوته المنقودة وكريوته سقسطر والشمشاع . جذوعها منتصب السوق المستمرة الحيد . جريدها مستطيل القد ، غليظ الكرب . سفعها ثنائي التركيب متقابل الخوص الاقواسي الشكل . كافورها مستطيل العنق صغير القد . ازهارها وحيدة المسكن في طلمة واحدة .

٢٣٦٦١ - **كُريوته سَقْطَر**
Caryota rumphiana, Saguaster major (S). Caryote des Célèbes (F).

نوع من نخل الكريوته مهدد جزر الزايج . جذعه منتصب الساق يعلو من ١٢ الى ١٥ م . سفعه مركب الخوص يطول من ٥ الى ٦ امتار . ثماره جوزية الشكل ، صغيرة القد ، حاملة العلم ، حريفة . يزرع لاستخراج جواه ولاستعمال جذعه الصلب .

٢٣٦٦٢ - **كُريوته عَشْقُودِيَة**
Caryota sobolifera (S). Caryote sobollifère (F). Fish-tail palm, Sago palm (E). Nusspalme, Brennpalme (D). Palma carlota (I).

نوع من نخل الكريوته . مهدد حشباب ويرتفعات ملقة ويلييزه . جذعه منتصب الساق يعلو من ٨ الى ١٢ م .



كرم متوج



كريوته

٢٣٦٧٨ - كزبرة مزروعة * ، تكدة

Coriandrum maculatum (S). *Coriandre cultivée* (F). *Coriander* (E). *Echter Korlander* (D). *Coriandro*, *Erba cimicina* (I).



كزبرة البير

نوع من الكزبرة وهو نبات عشبي حولي يزرع لأثمار الطبية والمستعملة كأفاويه . ساقه دقيقة فراء . أوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاته مفردة ، خيطية للتفرع . أزهاره خفية التجميع ، صغيرة القد ، وردية اللون ، عاجية الملاج . ثماره من كرتبة الرائحة المسببة لثقل جفافها تصعب بمد الجفاف ذكية الرائحة المسببة العرف .

٢٣٦٧٩ - كزمارك

Fruits du tamaris (F).

Fruits of the tamarisk (E).

هو شجر الطراخ . يقال انه طيب نعيمه يقيد الصدر والامعاء .

٢٣٦٨٠ - كزوان ، فضبة

Cisticola (S).

Cisticole (F). *Fan-tailed-warbler* (E).

فصية هو الاسم المصري . جنس طير من فصيلة الدخليات انواعه المعروفة ٢٠ اعطاهنا العالم القديم . جميعها صغيرة القد ، انثواها الى الطحلة السرماء . ظهورها واجنحتها مجمعة بالاسود . قوائمها بيض الاطراف او ربادية . نحوها يبيض . جواشها ونحوها الى الشفرة . مناقيرها وسيقاتها الى السرة || تألف المنافع والمراعي والحقول المزروعة . قوتها الحوام والذباب والاساربع الصغيرة . تدن في الادغال وفي الاعشاب التي تملو سطح التربة او الماء من ١٠ الى ١٢ سم . عشها جراب يرمي الشكل . تحفن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حفسنها بأرواح من ٤ الى ٦ يفضات لنها الى الليافس الاخير تملو ماجة وردية او زرقاء اللون .



كزبرة البير الجبلية

٢٣٦٨١ - كزوان مبدول * ، فسكة

Cisticola schenckii (S). *Cisticole ordinaire* (F).

فسكة هو الاسم اللبناني . طائر من الكزوان ، صغير القد ، طوله يراوح من ١٠ الى ١١ سم . ثوبه يختلف عن ثوب جلته بالتوشيم الاسود الذي يملو اواسط ريش الظهر فقط . اعطاهنا حوض البحر المتوسط . يألف المنافع وفضاف الاثمار والمراعي والحقول المزروعة اخصها حقول القمح والذرة الصفراء || الانثى تحفن ثلاث مرات في العام الواحد . حفسنها اربع يفضات .



كزبرة مزروعة

٢٣٦٨٢ - كزود

Pupe (F). Pupa (E).

عدناه الحشرات من ذوات الجناحين وهي كالفسادة للرحشيات والحورية للعديات .

٢٣٦٨٣ - كزور

Casuar. (F).

هو الشيم ، من الرواكس ، اطلبه .

٢٣٦٨٤ - كزورينة بهشية

Casuarina torulosa (S). *Casuarine toruleuse*, *Filao toruleux* (F).

نوع من الكزورينة ساقها تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . قشورها فليظة سلفة كقشور البش . غراسيها دقيقة . فسستها تجمع من ٣ الى ٥ بناتق اسطوانية الهرم ، خلية البشرة . اكرازاها خلية الجراوات الناشئة || ترب ، كرفاقها ، في الاثربة الخفيفة الرطبة الساحلية وقد لا تنأدى من القر العابر .



كزوان مبدول

قليلة منبتها شطوط وهضاب حوض البحر المتوسط . يصلها صغير القد مستطيل . اوراقها قرصية الانتشاب ؛ نصلها مستطيل الصفحة الغضبية المستوية . شراخها الزبري يملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . يلتقي بصيوان من الزهر الابيض الموشح بالوردي || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٦٧٢ - كزبرة ، كزبرة ، كسيرة

Coriandrum (S). *Coriandre* (F). *Coriander* (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الخيميات . انواعها ١٠ منبتها حوض البحر المتوسط . جميعها طيبة تستعمل في عدة تركيب وعلاجات . وهي هاضمة ، مقوية ، مضادة للصداع والتشنج تنفع من ضغط الدم وتصلب الشرايين ، تمنع العطش والخفقان وتحبس البخار عن الرأس . ويقال ان قلبها مع الساق يفيد الزنطاري . سورها دقيقة فراء . اوراقها مركبة متعاقبة ، ازهارها صغيرة القد ، خفية التجميع || اشهر انواعها الكزبرة المعروفة المزروعة .

٢٣٦٧٣ - كزبرة البير * ، شعر الجن ، شعر

الفول ، شعر الأرض ، وصيف ، برشاوشان

Adiantum capillus veneris (S). *Adiante capillaire*, *Cheveux de Vénus*, *Capillaire* (F). *Maidenhair*, *Venus's hair*, *Capillaire* (E). *Capillärkraut*, *Frauenhaar*, *Yenushaar* (D). *Adianto*, *Capel-veneris*, *Capoveneris* (I).

نبات عشبي بري جذموري معمر من السراخس البسيجايات . يكثر في المواقع الرطبة الظليلة . يقال ان منافعها الطبيعية عديدة انما احقق منها هو انه مرقق وقايش . يباهه يقوي الشعر ويطلو || اوراقه تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم . نازدها اسود اللون ثنائي الانتشاب وكل شعبة منه تحمل اربعة فروع لاجسية الطول ، مروحية الترتيب ، كلوبة الورقيات المتجمعة الاطراف .

٢٣٦٧٤ - كزبرة البير الجبلية *

Polytrichum commune (S). *Polytrich commun*, *Capillaire doré* (F). *Bear moss*, *Golden maiden hair* (E). *Echter Widerton* (D). *Politric* (I).

نبات عشبي بري معمر من الطحالب يكثر في الاماكن الرطبة الظليلة . ساقه اسطوانية دقيقة متعصبة . اوراقه هدية متراكبة جذعية الارتكاز . ثمرته جراب يبغي هالي يكمل الساق || وهو من النباتات الصحية يستعمل استعمال الشاي لكنه بحث حل النوم .

٢٣٦٧٥ - كزبرة البير المكسيكية

Adiantum tenerum (S). *Capillaire du Mexique* (F). *Brittle maiden hair* (E). *Capillär Kraut* (D). *Capel-veneris de Mexico* (I).

نوع من كزبرة البير وهو نبات عشبي طلي بري معمر ينبت في المواقع الرطبة في ظل الصخور والاشجار . يقال انه ينفع الاراض الصدريه وضيق النفس . يستعصر منه شراب يستعمل ضد السعال .

٢٣٦٧٦ - كزبرة العطب

Pimpinella sanguisorbe (F).

هي البلاون المحجام ، اطلبه .

٢٣٦٧٧ - كزبرة الحيشة

Pigamon jaune (F).

هي الطليب الاصفر ، اطلبه .

٢٣٦٨٥ - كُزُورِيَّةٌ كُنْبَايِيَّةٌ *

Casuarina equisetifolia (S). Casuarine à feuilles de préle, Filao à feuilles de préle (F). Beef-wood tree, She-oak, Swamp-oak (E). Kasuarbaum (D). Casuarina (I).

نوع من الكزورينة ساقها منتصبه تملو من ٣٠ إلى ٤٥ م. ،
بناتها دقيقة متدلية وباعية التضلع . غلف عقدها مألوة
البرشة وباعية التسنين . منبها البلاد الحارة . تزرع لصد
الرياح والسياح . ترغب في الأثرية الساحلية الرملية ويجود
قرب الشواطئ البحرية .



كزورينة كنبائية

٢٣٦٨٦ - كُزُورِيَّةٌ مُنْتَصِبَةٌ

Casuarina stricta (S). Casuarine dressée, Filao dressé (F).

نوع من الكزورينة . ساقها وأغصانها منتصبه تملو من
٦ إلى ٩ أمتار . غراسيها غليظة ، ضمتها تجمع من ١٠
إلى ١٢ بليقة . بناتها منتصبه متدلة . غلف عقدها
مأسية التسنين والتخديد || تألف المناطق الساحلية الرملية
الدافئة .

٢٣٦٨٧ - كُزُورِيَّاتٌ

Casuarinaceae (S). Casuarinacées (F).

فصيلة نباتية وحيدة الجنس من ذوات الغلفتين . أنواعها
نحو ٢٠ جميعها أشجار منتصبه سريعة النمو عادمة الأوراق .
ترقب في الموائل الرملية أخصها الشواطئ البحرية . غراسيها
وبناتها أسطوانية الشكل والترتيب والانظام . أزهارها
الذكورية قدي التجميع ، مستطيل الحجم ، أسطواني
الشكل ، زهرته وحيدة السداة . أزهارها الانثوية قدي
التجميع ، قصير الحجم ، كثيف الأزهار ، زهرته وحيدة
المبيض والقلم القصير . ثنائية السمة الخيطية المستطيلة .
ثمارها أكواز صغيرة ريفية الشكل .

٢٣٦٨٨ - كُزُورِيَّاتٌ

Xeromys (S). Xéromys (F).
جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات . أنواعها
قليلة موطنها بعض جزر المحيط الهادي . أجسامها مستطيلة .
طولها الكامل يراوح من ٤٠ إلى ٤٥ سم . رؤوسها ذلقة .
أذنانها كبيرة . جرائدها قصيرة . أصابعها خاسية . أطرافها
حادة || تألف الادغال والحقول . قوتها المواد النباتية
على اختلاف مصادرها والحشرات والديدان .

٢٣٦٨٩ - كُسْتَايٌ

Pareseux (F).

هي الدبابات ، أطليها .
٢٣٦٩٠ - كُسْبٌ
Tourteau (F). Cake, Oilcake (E).
ما يبقى من ثفل بعد عصر البزور الدهنية كالقطن
والسمن والفتسق السوداني والكتان الخ .. منظم يستعمل
كغلف للبها . راجع جدول العلف .



كستنة مبدولة

٢٣٦٩١ - كُسْبَرَةٌ

هي الكزبرة ، أطليها .

٢٣٦٩٢ - كُسْتَنَةٌ، كُسْتَنَةٌ، أَبُوقُرَّةٌ، قُسْطَلَةٌ

Châtaigne (F). Chestnut (E).

ثمرة الكستنة أو القسطل أو الشاهيلوط وهي مأكولة مغذية ،
لبها يحوي نحو ٣٠ ٪ من الفيتامين « ث » ونحو ٩٠
وحدة من الفيتامين « ب » ولعرقه عناصرها الغذائية راجع
كستنة مبدولة .

٢٣٦٩٣ - كُسْتَنَةٌ

Castanea (S). Châtaigner (F).
Chestnut-tree (E). Kastanie (D). Castagno (I).
جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة السمليات .

أنواعها المعروفة ١٥ أقليمها البلاد المعتدلة الحارة . تنمیز
بضخامتها سوقها واستطالة أعمارها التي تبلغ بصفة قرون .
أغصانها داحجة . أوراقها عابلة ، متعاقبة ، معنقة ،
بسيطة . نصلها نافرة العروق المتوازية ، منشارية الحافة .
أزهارها وحيدة المسكن . أزهارها قدي التجميع ، شبارق
مستطيلة منتصبه . كثيرة الأزهار الذكورية المتناهية ، قليلة
الانثوية السفلية الارتكاز ، الفردية أو الثنائية أو الثلاثية
التجميع التي تكثفها بعد التضلع والأصابع ولقطة كثيفة
الشوك الدقيق تحضن الثمرة أو الجار || ثمارها مأكولة الباب
التشوي الماددة .

٢٣٦٩٤ - كُسْتَنَةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ

Castanea dentata (S). Châtaigner d'Amérique (F).
نوع من الكستنة الحرجية والأزراعية البريوتية . مهددا
أمريكة الشمالية . تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . ساقها غليظة .
أوراقها تطول من ١٢ إلى ١٤ سم . وتعرض من ٤ إلى ٦
سم . نصلها منشاري الحافة ، الملمط الصفحة العليا ، الزغب
الشغل على غصنها وعروقها || ثمارها صغيرة اللد مأكولة .

٢٣٦٩٥ - كُسْتَنَةٌ حُمْرَاءُ

Pavie (F).

هي القسطل الهندي ، أطليها .

٢٣٦٩٦ - كُسْتَنَةٌ صِيْنِيَّةٌ

Castanea duclouxii (S). Châtaigner de Ducloux, C. de Chine (F).
نوع من الكستنة الحرجية والأزراعية مهددا الصين . تملو
من ١٥ إلى ٢٠ م . ساقها غليظة متوسطة الضخامة .
أغصانها فاشرة ، أوراقها متباعدة التسنين المنشاري
المهدب ؛ نصلها شمع الصفحة السفلى ، قليل العروق الغائرة ،
الملمط البرشة على صفحتها || ثمارها صغيرة مبطنطة
مأكولة .

٢٣٦٩٧ - كُسْتَنَةٌ مَبْدُولَةٌ * ، قُسْطَلٌ ،

قُسْطَلٌ ، شَاهِيلُوطٌ ، أَبُوقُرَّةٌ

Castanea vulgaris, C. sativa (S). Châtaigner commun, Marronnier (F). Sweet chestnut (E). Echte Kastanie, Kastanienbaum (D). Castagno domestico (I).

نوع من الكستنة الحرجية والأزراعية المبدولة . ضرورها
كثيرة المدد ، منبها الشرق الأوسط وأروبة الجنوبية والغربية .
شجرتها تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . ساقها ضخمة عظيمة .
أغصانها غليظة قائمة . فروعها جاسلة ، قنتها فاشرة .
أوراقها أليلحية مسنة الحافة تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم .
وتعرض من ٧ إلى ٩ سم . نصلها قلبية القاعدة . ذرب الطرف .
بارز العروق المتساوية الإبعاد ، لونه ال الخضر الاصفر .
أغصانها صناعية تفوق السنديان صنفًا وصلابة وطولًا .
ثمارها مأكولة غذائية . قشورها كستنية اللون لامة الصفحة
الخارجية خلية الداخلية لبها إلى البياض التني . تحليلها
الكيميائي يفيد أن ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المسلوقة
بالماء يحوي ٢٧,٧٦ ٪ من الوحدات الغذائية المنهضمة ،
تتميز فيها :

١,٥٦ ٪ مواد ازوتية

١,٧٢ ٪ مواد دهنية

٢٤,٤٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وأن ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المشوية يحوي ٥٦,٤٥ ٪

من الوحدات الغذائية ، تتميزها :

٢,٤٩ ٪ مواد ازوتية

٢,٢٥ ٪ مواد دهنية

٤٩,٦٦ ٪ مواد هيدروكربونية

وان ١٠٠ غرام من دقيق لباب الكستنة الخفيف المسحوق
يعوي ٨٨,٩٩٪ من الوحدات الغذائية، تعريفها :
٧,٥١٪ مواد زوتية
٥,٦١٪ مواد دهنية
٧,٥٨٧٪ مواد هيدروكربونية

Fraction كسر العدد . ج. كسور وكسورات .
٢٣٧٠٦ - كَسِير

Pampille كَسَمَة
الريش الابيض المجتمع تحت ذنب الطائر .
٢٣٧٠٨ - كُسْفَرَة الحِمَار هي الشامتج ، اطليه .

٢٣٧٠٩ - كِسْكَال *
Quisqualis (S). Quisqualis (F). Creeper (E). Sonderling (D). Quisqualis (I).
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الالهليجات .

انواعه اربعة اعطائها بعض المناطق الحارة الاسيوية
والافريقية . جميعها شجيرات عارضة تطول من مترين الى
عشرة امتار . اوراقها معتقة متقابلة اهلجية . ازهارها
عنفودية التجميع طرفي الارتيكار . ازهارها جميلة الشكل
مستطيلة الانابيب يكثر فيها الابيض والاحمر والوردي .
يزورها طليعة طاردة للود .

٢٣٧١٠ - كُسْكُوس
Couscous (F).
الكسكوس حيوان لين من الجرابيات الشاجرات يدعى
كُسْتَشَجَر ، اطليه .

٢٣٧١١ - كَسْكُول * ، كَسْكُول *
Cassculus (S), Cassicle (F). Cassculus (E).
جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة عشرة

جميعها من طيور امريكا الوسطى والجنوبية . تألف
الغابات ولا تقترب من الاماكن الاطلة . نظامها الحياتي
جامعي . فوجها يعد من ٢٠ الى ٥٠ زوجاً || اجسامها
محمشة تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . مناقدها مخروطية ذرية .
رؤوسها متوجة يقتنازع قنصل في الجاه وليس في قم
الرؤوس . اجنحتها معتدل الطول . اذناها مستطيلة ،
مستنرة الاطراف . انواها تختلف مع الانواع إنما يكثر
فيها الاسود الخلف الاماجات || قوتها الحشرات على اختلاف
فصائلها والثمار والحبوب || اعرف انواعه واشهرها كسكول
المكسيك .

٢٣٧١٢ - كَسْكُول المكسيك *
Cassculus melanicterus (S).
Cassicule du Mexique (F).

نوع من الكسكول . يكثر وجوده في المكسيك . تألف
الغابات . ملجئه الحياتي جامعي . فوجه يعد من ٢٠ الى
٣٠ زوجاً || جسمه ابيض الشكل يطول نحو ٤٥ سم .
ثوبه الى السواد اللامع يعلوه مواج اخضر . تغذته جزوية
اللون . هامش جناحه الى الغيرة . متفاده الى السمرة
الزيتية . قائمته ونحاله الى السمرة القائمة || قوته الحشرات
على اختلاف فصائلها وانواعها والثمار والحبوب والبقور ||
يدفن عشه في الاشجار الكبيرة الدائمة لان الفروج يكامله
يدفن في ذات الشجرة . الاثنى تحضن وسعدا من يبيستن
الى ثلاث بيضات بيضا الذكري يؤمن لك الغذاء .

٢٣٧١٣ - كَسِير *
Excaecaria (S). Exécaille, Excécaille (F).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تربينية من فصيلة

اقليلها البلاد الجبلية المعتدلة الحرارة . وهي ترقب في
الآرتية الخفيفة العميقة الغور المشبعة بالعصر الربلي .
وقد تنمو وتضرب في الآرتية الطليعية المتوسطة الاندماج
لكنها لا تنمر كثيراً فيها . وهي تخشى الآرتية الكلسية
لان الكلس لا يوافق مزاجها الجسموري || تنكأثر
بالدبر وقد تزور البذور اما في مستقروا مباشرة او في
الشتل ان ان يبلغ ارتفاع النصب نحو ٢٠٠ سم . وقد
يكون ذلك بعد البذر بستين فتفتل اذ ذلك الى مستقروا .

٢٣٦٩٨ - كَسْتَنَّة هِنْدِيَّة
الكستنة الهندية وابو قرقه الحصان وتسلل القرس ،
ثلاثة اسماء لشجرة واحدة تعرف بالقندلي ، اطليه .

٢٣٦٩٩ - كَسْتَنَّة يَابَانِيَّة
Castanea crenata (S). Châtaignier du Japon (F).
نوع من الكستنة الحرجية والزراعية . مهدا اليابان . تملو

من ١٠ الى ١٥ م . ساقها غليظة متوسطة الفصاحة .
اغطائها قائمة . اوراقها صفراء القند ؛ نصلها مرتفع
الجانب كثير العروق الناشئة الاطراف ، لونه الى الخضرة
الصفراء تملوها لمة سفراء || ثمارها متوسطة القند مأكولة .

٢٣٧٠٠ - كَسْتُونِيَّة
Xestobium (S). Xestobie, Vrillette (F).
جنس حشرات صغيرة من فصيلة الغفريات . انواعه قليلة

العدد . رقاتها مؤذية تنخر الخشب وتعلطه . اعرفها واعماها
كستونية الخشب .

٢٣٧٠١ - كَسْتُونِيَّة الخَشَب * ، غِفْرِيَّة
الخَشَب
Xestobium rufovillosum, X. tessellatum (S). Xestobie brunâtre, Vrillette opiniâtre, Horloge de la mort, Vrillette damier (F). Death watch (E). Buntwürfeller Nagekäfer (D).

نوع من الكستونية طولها يراوح من ٦ الى ٩ م . ثوبها
حنطلي . نمشة كوسلها وتظهرها صفراء اللون || رقاتها
مؤذية تنخر منظر انواع الخشب اليابس والمصنوع ان في
الطبيعة او ضمن المنازل والمخازن .

نوع من الكستونية طولها يراوح من ٦ الى ٩ م . ثوبها
حنطلي . نمشة كوسلها وتظهرها صفراء اللون || رقاتها
مؤذية تنخر منظر انواع الخشب اليابس والمصنوع ان في
الطبيعة او ضمن المنازل والمخازن .

٢٣٧٠٢ - كَسْتُور
Castor (F).
هو الحارود ، اطليه .

٢٣٧٠٣ - كَسْتُورَة
Porte-musc (F).
هي أبيل المسك ، اطليه .

٢٣٧٠٤ - كَسْج *
Ravalement (F). Trimming (E).
قيل فروع الشجرة بغية تجديد شياها .

٢٣٧٠٥ - كَسْدُولَة *
Cassidula (S). Cassidule (F). Cassidula (E).
جنس حيوانات من الرخويات معديات الاجرل وفصيلة

الحضفريات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد
اعطائها الهند بعضها فارتب يعيش في المنافع التي تنكأثر
فيها احراج الشورى ، وبعضها بحري يعيش في رمال



كستونية الخشب



كسكول



كسكول



كسكول المكسيك

الزيتية الطبية النافعة. وريقاتها حشوية الشكل والتركيب، متتابعة الارتكاز، تبينة اللون. ازهارها هامة، سفلية التجميع، قصيرة السبلبة، يبيضه اللون او وردية || جميع انواعها طفيلية، عوائلها جذور الصنوبر والسرو والمولود والسنديان.

٢٣٧٢٢ - كسيدييات
Monotropaceae (S).
Monotropacées (F). **Monotropaceae (E).**
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القلمات. اجناسها ٤ وانواعها ٢٠ منها البلاد المعتدلة المنشرة نحو الحارة. معظمها طفيلي يعيش على جذور الصنوبريات والسوليات. جميعها عشية. سوقها فردية الالتشاب عادية الفروع. وريقاتها حشوية النصل. ازهارها سفلية هامة.

٢٣٧٢٣ - كسوف
Eclipse
 ظاهرة طبيعية تتميز باحتجاب ضوء الشمس عن الارض وقد تحدث عندما يتوسط القمر بين الارض وقوس الشمس. ولا يحدث الكسوف الا اذا كان القمر في المحاق وقد يكون كلياً او جزئياً. فالكل يكون عند احتجاب كامل قرص الشمس عن البصر والجزئي يكون عند احتجاب بعض قرص الشمس.

٢٣٧٢٤ - كسيية ٥ ، بُلْدُر ٥
Polder (F)
Polder (E).
 اسم يطلق على الاراضي المنخفضة الممتدة من سواحل بلجيكية الى هولندية وبولندية وقد صار استعمالها بعد تخصيصها للجواجز وعزلها عن مساوي مياه البحر.

٢٣٧٢٥ - كسيدي اخضر ٥ ، كسيدي الحُرْشُف ٥
Cassida deflorata, C. viridis (S). **Casside de l'artichaut, C. verte (F).** **Tortoise beetle (E).** **Artischokenschildkäfer, Grüner schildkäfer (D).**
 حشرة صغيرة القد من فصيلة النشاريات. جسمها يضيء الشكل مفلطح. طولها يراوح من ٧ الى ٨ سم. ثوبها اخضر اللون اسفح المزاج. مدنها اسود. لها جيلان في الحول. ريقاتها مستقيمة القرون الشرجية المنمكة على الظهر. تركيب هي وريقاتها اوراق الارضي شوكي وجميع انواع الحُرشف تنقعط البشرة وتميش على خلايا النسيج.

٢٣٧٢٦ - كسيدي الشوْندَر ٥
Cassida nebulosa (S). **Casside nébuleuse, C. de la betterave (F).** **Clouded tortoise beetle (E).** **Nebliger schildkäfer (D).**
 حشرة صغيرة مبطنمة من فصيلة النشاريات طولها يراوح من ٥ الى ٧ سم. ثوبها الى الصفرة الخطية الباهتة. غمداتها متقاطن بالاسمر والاسود. لها جيلان في الحول وهي تركيب مع ريقاتها اوراق الشوْندر فتتخرها وتميش عليها.

٢٣٧٢٧ - كسيدي نيل ٥ ، كسيدي السروقييات
Cassida nobilis (S). **Casside noble, C. des salsolacées (F).** **Cassida nobilis (E).**

نوع من الكسيد، حشرة خاضلة مؤذية. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية. تألف المزارع التي تكثر فيها السروقيات. خنافسها وريقاتها تميش على نصال الاوراق || جسمها صغير القد، يضيء الشوزن، عموذوب الصفحة العليا، يطول من ٦ الى ٨ سم. ثوبها العلوي الى الخضار الاصفر يملوه في منطقة درز الظهران

الفربيويات. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منها المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية || سوقها ماسة بحرية اللون. اوراقها متعاقبة معنقة. نصالها يرمية الشوزن. ازهارها سنبلية التجميع || يستخرج من لحائها بالخر عصاره لبنية تختلف تركيبها ومفعولها مع اختلاف الانواع. منها تهيج البشرة وتؤذي العين ان احسبها ومنها طيبة تنقي الدم والاعلاط ومنها المفادة لداء السلسل وسنها الصناعية التي يستخرج من ثمارها مادة دعنية يبيضه اللون شائعة الاستعمال المنزلي || اشهر انواعها الخمسة التالية :

***Ex. sebifera (S).** **كسيدي الدهن**
Ex. sylvatica (S). **كسيدي حرجي**
Ex. spinosa (S). **كسيدي شالك**
Ex. hibernica (S). **كسيدي فتوي**
Ex. agallocha (S). **كسيدي يغشي البصر**

٢٣٧٢٤ - كستلن
Bradype, Ai, Paresseux (F).
 هو الداب، اطلبه.

٢٣٧٢٥ - كسم
Habitus (F).
 هو الامدود والطلالة، اطلبه.

٢٣٧٢٦ - كسمولوجية ٥
Cosmologie (F). **كسمولوجية (E).**
 الكسمولوجية علم فوايس العالم عامة اي فلسفة معقولات العالم المجردة.

٢٣٧٢٧ - كستوريزا * ، صفراء العروق
Xanthorrhiza (F).
 جنس جنبات برية ويزيئية من فصيلة الشقيقيات. انواعها قليلة. سوقها فراءة تملو من ٧٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها زنادية، متعاقبة، مركبة، ثلاثية او خاسية الورقيات المفردة الصفراء العروق. ازهارها عقدوية التجميع، ابطية الارتكاز، صغيرة القد، تبينة اللون، خاسية البتلات الصغيرة السنائية الشكل || ازهارها يستمر طول فصل الصيف.

٢٣٧٢٨ - كستوسيرنا ، صفراء القرون
Xanthoceras (S). **Xanthocère (F).**
 جنس اشجار وشجيرات برية ويزيئية من فصيلة السبنديات. مهدها الصين، تتميز بازدهة قرنية الشكل مغنرية الرحيق تتوسط بتلات الزهر. انواعها المعروفة قليلة العدد. سوقها تملو من ٢ الى ٨ امتار. اوراقها عابلة متعاقبة وزية التركيب. ازهارها عقدوية التجميع. ازهارها متراكبة الاالوان، كبيرة القد، نظامية، خاسية الفصل والبتلات، ثمانية الاليدية. ثمارها تفاحية الشكل والقدر غير مأكولة.

٢٣٧٢٩ - كستنج
 جنس من الكماء ينبت في الرمال لذية جداً (السان).

٢٣٧٣٠ - كسو هو الشاروا، اطلبه.
Cousso

٢٣٧٣١ - كسوب *
Monotropia (S). **Monotrope (F).** ***Ice plant, Indian pipe (E).** **Fichtenspargel, Monotrope (D).** **Monotropia, Erba da cera (I).**
 جنس نباتات عشية برية طفيلية من فصيلة الكسوبيات. منها بلاد المعتدلة الحارة. انواعها نحو ٨ سوقها فردية ليفية. لها دماغ، عصارته عادية اللون تجفح بعض المواد



أنواعه المعروفة سبعة موطنها بعض مناطق استرالية. تألف الحراج والبراري. ملجئها الحياتي جماعي. فوجها يعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً || أجسامها متوسطة الحجم، قريبة الشبه بالصدر وبالزناجر. مناقبها كبيرة ضلعية. أثوابها الى السمرة القاتمة يتخللها بقع ابيض || قنبا الحشرات والزروع والمطاه والفئران والمصاير الصغيرة. طباعها شرسة كالصرد. تتميز بالجسارة والشراسة ومن عادتها انها تسفد قصتها في اشواك الاشجار لتصد البها حينما يطلب لها اعرف انواعه واشهرها الكسيكان الغرب.



كُشِك قنبراني

٢٣٧٢٢ - كُسيكان مُعَرَّب * Cracticus torquatus (S). Cassican destructeur (F).

نوع من الكسيكان. موطنه شمالي استرالية. فوجها يعد نحو عشرة ازواج. يألف الادغال والحراج المبعثرة الاشجار. يعتبر اشرس انواع الكسيكان وانهمها || جسمه معتدل الحجم يطول نحو ٢٧ سم. رأسه مستقيم الشكل. منقاده كبير وضلع. ذنبه متوسط الطول، مقطوم الطرف، مستدير الزوايا. فوقه ابيض اللون، رأسه وظهوره وجناحاه وذنبه الى السواد الفحمي. عنقه ومدره واثنيكه الى البياض الاخير. قوائمه الى السمرة القاتمة || يدفن عنه في الاشجار الرقيقة. الاثنى تحضن من ٤ الى ٥ بيضات بينا الذكر يئن لها الغذاء.

٢٣٧٢٣ - كسيلوز
Xyloste (F).
هو الخشبوز، اعطبه.

٢٣٧٢٤ - كُسيوية * Cassiope (S). Cassiopelia (E).

نبات معقود التعريف على اسم الملكة لغرافية كسيوية. جنس نباتات نجمية معمرة من فصيلة الحنطليات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من ثبوت البلاد الحارة || سوقها قصيرة فراء تملو من ١٥ الى ٣٥ سم. اوراقها ابيدة، صغيرة، سنانية التصال الجامدة الخلفية البشرة. ازهارها فردية، متدلية، جلبةية الشكل، بيضاء اللون او وردية || تنويرها يستمر من نيسان الى تموز.

٢٣٧٢٥ - كُسيوة * Vestiture (F).

الكسيوة مجموعة الاعضاء الثانوية كالزغب والشوك والمناسخ التي تلحف قشور النبات او جلود الحيوانات وذيلها.

٢٣٧٢٦ - كُش * Androcée (F).

هو جهاز التذكير في النبات، راجع جش.

٢٣٧٢٧ - كُشاة * Défaut apparent (F). Visible défaut (E).

هو العيب الظاهر.

٢٣٧٢٨ - كُشاح * Empreinte du fer rouge (F).

سمة بالنار في موضع الكشع وقد تطلق على كل سمة بالنار في اي موضع كان من الجسم.

٢٣٧٢٩ - كُشت * Pueraria (S). Puérarie (F). Pueraria (E). Knollengrische (D). Pueraria (I).

جنس نباتات ليفية عارشة معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعها ١٠ مهدها الشرق الأقصى من الهند الى اليابان. جذورها غليظة درنية. سوقها تملو من متر الى ١٠ أمتار. اوراقها عابلة، مركبة، ثلاثية الوريقات الكبيرة.

جدة قاطبة لؤلؤة اللون تنشأها ماجة ذبية. ثوبها السفلي ومدها الى السمرة || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان. تسرح في النهار. تباشر الاثنى مع الملكن بعد ظهورها باسبوع. وينتفج الملكن بعد متحه بنحو عشرة ايام || البرقة عند بلوغها التكامل الجسوري تطلق نحو ١٠ م. ثوبها الى الخضار الاصفر تملو بقجة بيضاء في مقدم الصدر. رأسها مكور الشكل. اسود. سكتها الشرجية تحمل ثلاث زوائد منها اثنتان علويتان متمكنتان على الظهر واحدة سفلية جاسمة. سرهما علوي الفتحة يلتقي البراز على الزوائد || طور الاكثار يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً وينتفضي لاصفاً ينصل النبات العائل بعد ان تملق فيه البرقة بزلاتها السفلية.

٢٣٧٢٨ - كُسيعة * Pelote (F). Pad (E).

تضخم جلدي يحصل في اطراف بعض الحيوانات. وتضخم في الزوائد الخلفية عنه بعض الحشرات.

٢٣٧٢٩ - كُسيك * Cassicus (S). Cassique (F). Cassicus (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبيجات. انواعه المعروفة ٢٣ جميعها من طيور امريكة الجنوبية والوسطى. تألف الغابات وبعضها يقترب من الحدائق. نظامها الحياتي جماعي. اسراجها متفاوتة العدد منها الانواع التي لا يتجاوز عددها ١٠٠ زوج وبها الارباب الوفرة العدد || أجسامها بين المتوسطة والكبيرة. اطالها قراوح من ٢٦ الى ٤٠ سم. مناقبها مخروطية الشكل، مستعرجة القواعد، حادة الاطراف. رؤوسها متوجة بقنازح مختلفة الاحجام. اجنتها معتدلة الطول. اذنانها مستطيلة، مستديرة الاطراف. اثوابها مختلفة الالوان، يكثر فيها الاسود. اناثها اصغر قدراً من ذكورها || قنبا الثار والحبوب والذبور والحشرات المختلفة الانواع والجناس || اعرف انواعه واشهرها الكسيك القنبراني.

٢٣٧٣٠ - كُسيك قُنبراني * Cassicus cristatus (S). Cassique huppé (F).

نوع من الكسيك يكثر وجوده في البرازيل والفويان حيث يدعى «يايو». يألف الغابات ويقترب من الحدائق والجائان والحقول. سربه يراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ زوج || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم. قنزته كبيرة تمتد الى منتصف الالفن. ثوبه الى السواد الاسم الاسفع. اثنيكه وذنبه الى الجوزة. رفال ذنبه الجانبية صفراء اللون اما الفزانان فالى السواد الاسم الاسفع. منقاده اصفر اللون. صدقة عينه زرقاء. ساقاه الى السواد الاسمر الموج || من ميزات انه يتقلد ويردد الاصوات التي يسمها فريد صياح الديك وثغاء الغم وصهيل الخيل زهيق الحمير وصجج البقر ... || قوته الثار والحبوب والذبور والحشرات || يدفن منه في الاشجار الرقيقة الكبيرة الغصان القارشة الالنفية الانتادة. عنه جراب مستطيل يملق في النعند ويحك بالالايات والفس اخصها اليات الباهرة واليوكا. وقد يوجد على الشجرة الواحدة من ٢٠ الى ١٠٠ عش. مداخلها جانبية عليا. الاثنى تحضن من بيضتين الى ثلاث بيضات بينا الذكر يئن لها الغذاء.

٢٣٧٣١ - كُسيكان * Cracticus (S). Cassican (F).

جنس طير. من الجوامئ منيات المناقير وفصيلة الغرابيات.



كُسيكان عرب

Reaumuria (S). Réaumurie (F). كَيْشْتِي ٢٣٧٥٢
جنس نباتات نجمية برية معمرة من فصيلة الالديات .
أنواعه المعروفة خمسة ، منهاها البلاد الحارة اخصها
الصحراوية || سوفها شديدة القصر ، كثيرة الفروع الجانسة
والمفرجة . اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، سختيانية النصال
او لحميتها ازهارها لاقسيانية الانتظام والازدكار ، منها
العنقودي والمعدني والباطني والظري والمستطيل الزناد القصيرة .
اشهر انواعه الثلاثة التالية :

- R. mucronata (S). كَيْشْتِي حويوة
R. palestina (S). كَيْشْتِي فلسطينية
R. hirtella (S). كَيْشْتِي مهدية

Ribes (S). كَيْشْتِي ٢٣٧٥٣
Grosellier (F). Currant-bush (E).
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة القليقيات . انواعه
نحو ٦٠ معظمها بري وبعضها زراعي يزرع لثماره
المأكولة . اوراقه متعاقبة ، معنقة ، كفية ، فلقية ،
مسنة . ازهاره عنقودية او فردية التجميع . ثماره عنينية
سكرية وحامضة او مرة . اشهر انواعه ما يلي .

٢٣٧٥٤ - كَيْشْتِي أحمر* ، كَيْشْتِي عنقودي
Ribes rubrum (S). Grosellier rouge, G. à grappes,
Castillier (F). Garnet-berry, Red-currant bush (E).
Johannisbeere, Rote Johannisbeere (D). Ribes, R.
vulgare, R. a grappoli (I).
نوع من الكشش، ضرابه الزراعية كثيرة العدد جميعها
جنبات فرعاء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية
واخماصة الفلق المسنة . نتائجها الزهرية تجمع نحو ٢٠
زهره لونها الى الخضار الموشع بالاحمر . ثماره متصلة القدة ،
كروية الشكل ، حراء اللون ، لذينة الطعم ، مستحبة
العرف || يعود في جميع الارضية لا يغني سوى المنتجات
المرباط . يتكاثر بالتمليقة ويشر على الافئدة المحولة .

٢٣٧٥٥ - كَيْشْتِي أسود* ، هلمش
Ribes nigrum (S). Grosellier noir, Cassissier (F).
Black currant bush, Quinsy-berry (E). Schwarze
Ribisel (D). Grossularia nera (I).
نوع من الكشش البري والزراعي . ضرابه قليلة العدد
تتميز ببندها البنية الطرية الصفراء اللون المبشرة على
الاوراق والافئان والثار . سقه تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم .
اوراقه خالصة التفصيص لاقسيانية التنتين المنشاري .
ازهاره عنقودي . ازهاره حراء اللون خلية القنابات .
ثماره كروية عطرية سوداء اللون .

٢٣٧٥٦ - كَيْشْتِي شائك*
Ribes grossularia (S). Grosellier à maquereau, G.
épineux (F). Gooseberry bush, Cat berries (E). Stachelbeere,
Stachelbeere-Ribisel, Stachelburen (D).
Grossularia rossa, G. dei giardini (I).
نوع من الكشش البري والزراعي الشائك الميزول . تكثر
زراعتي في انكلترا . ازهاره فردي الانتساب فسي التجميع ،
ضمت تجمع من زهرتين الى خمسة ازهار . ثماره رقيقة الشكل
جقوية اللون مجرمة بالأخضر . وهي تتميز من المرباطات
الصعية الشائعة في المانيا وانكلترا وهولندا وبلجيكا .

٢٣٧٥٧ - كَيْشْتِي
Groselle (F). Currant (E). ثمرة الكشش .

ازهارها عنقودية التجميع ، حراء اللون او زرقاء . ثمارها
سختيلة . يزورها كالدواليب || اشهر انواعه ما يلي .

٢٣٧٥٨ - كَيْشْتِي دَرَنِي
Pueraria tuberosa (S).
Puerarie tubéreuse (F).

نوع من الكشش الزراعي ساقه منتصبه تملو نحو ١٠٠
سم . اوراقه مفصصة . ازهاره زرقاء اللون ، حنابله مستطيلة
عنقوية الفواصل تخشن بغض البذور . جلوره درنية
لايها نشوي المادة . بلوره وجلوره مأكولة تطبخ
كالفاصوليا والبطاطا .

٢٣٧٥٩ - كَيْشْتِي ياباني
Pueraria hirsuta (S).
Puerarie hirsute, Koudzou (F).

نوع من الكشش الزراعي السبروتي . ساقه تطول نحو عشرة
امتار . فروعها خلية النحاء ، وريقاتها معنيفة الشكل
تطول وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم . ازهاره الى الزرقسة
البفسجية الموشحة بالابيض . عنقوده الزهرية يطول نحو ٢٥
سم . حنابله مستطيلة ، زياه الغلاف || جلوره درنية
مأكولة . سقه صناعية نسجية . يزوره واوراقه عطرية .
يعود من النباتات التي تزرع في المواقع المعرضة لاحت
لأنها تتشبت بالترية وتسن انجرافها .

٢٣٧٦٠ - كَيْشْتِي
Huppe (F). Crest (E).
شكل من اشكال القزعة .

٢٣٧٦١ - كَيْشْتِي العجوز
Lichen (F).
هي الخزاز ، اطليه .

٢٣٧٦٢ - كَيْشْتِي
Marquage au fer rouge (F).
الكشش : الكي بالنار .

٢٣٧٦٣ - كَيْشْتِي
Geitonogamie (F).
Geitonogamy (E).

هو في الحيوانات الاليفة والداجنة التصلاب بين اقارب
من اصل واحد .

٢٣٧٦٤ - كَيْشْتِي
Haricot mungo (F).
هو الماش ، اطليه .

٢٣٧٦٥ - كَيْشْتِي ، تقشير
Décortage, Décortication (F). Décortication,
Stripping off bark (E).
ازالة لحاء الاغجار او سقوطها طبيعيا وانتزاع تشور بعض
الثار والبزور كالجلوز والوز والارز .

٢٣٧٦٦ - كَيْشْتِي الطحلب
Emoussage (F).
Removal of moss from trees (E).
زوع الطحلب من لحاء الاغجار .

٢٣٧٦٧ - كَيْشْتِي
Niquetage (F). Nicking (E).
الكشش في الخيل : التواء في عيب الذنب .

٢٣٧٦٨ - كَيْشْتِي ، معاينة
Constat (F).

٢٣٧٦٩ - كَيْشْتِي التخاروب
Désoperculation (F). Uncapping (E).
هو رفع الغطاء الشعي من عين الشهاد عند جني العسل .



كشش احمر



كشش اسود



كشش شائك



كشيشة التين

- Or. luteus (S). Orobe jaune (F). **كشيشة صفراء**
Or. aureus (S). Orobe dorée (F). **كشيشة ذهبية**
Or. roseus (S). **كشيشة وردية** ، **عجوة** ، **عجوة** ، **عجوة**
Orobe rose (F).

23766 - **كشيشة**
Vicia fulgens (S).
Vesce brillante (F).
نوع من الباقية وهو نبات عشبي حولي بري ويزرع. ساقه
فراء عارية تملو من ٦٠ إلى ٢٠٠ سم. حوافه مستقيمة
منشعبة. أوراقه مركبة، وريقاتها شعبة تعد من ١٦
إلى ٢٤. أزهاره عقدية التجميع. سداسية التصنيف،
حمراء اللون، فضية الموالج اللامع || أزهاره يستمر من
أيار إلى تموز.

- 23768 - **كشيشة** ، **كشيشة** ، **أكشيشة** ، **لقلان**
Cuscuta (S). Cuscuta (F). Dodder (E). Seide (D).
Cuscuta, Carpaterra (I).

جاء عن الكشوش في لسان العرب :

« هو الكشوش فلا أصل ولا ورق
ولا نسج ولا ظل ولا ثمر »

جنس نباتات طفيلية من فصيلة المحموديات. أنواعه المعروفة
نحو ٨٠ مظهرها أمريكي النبات. جميعها من النباتات
المؤذية العادة للورق. سوقها مستقيمة ، فراء ، كشيشة
التجميع ، غطية الشكل ، صفراء اللون أو صفراء ، تلتف
على حاضنتها وتلتصق فيها مرافقها المماسية فتستريح نسجها
وتتجيب. أزهارها صغيرة الحجم بيضاء اللون أو وردية .
أعرف أنواعه الشرقية والأوروبية ما يتبع .

كشوش السعتر ، **أنفوس**

- C. epithymum, C. minor (S). Cuscuta du thym,
Petite cuscuta, Epithym (F).

- C. epilinum (S). Cuscuta du lin (F). **كشوش الكتان**

- C. trifolii (S). Cuscuta du trèfle (F). **كشوش الثفل**

- C. suaveolens (S). **كشوش زكي الرائحة***

- Cuscuta à odeur suave (F).

- C. arabica (S). **كشوش عربي** ، **شربين**

- Cuscuta d'Arabie (F).

- C. racemosa (S). Cuscuta grosse (F). **كشوش غليظ**

- C. palaestina (S). **كشوش فلسطيني***

- Cuscuta de Palestine (F).

- C. major (S). Cuscuta grande (F). **كشوش كبير**

23769 - **كشيشة** شجرة كلية القصب .

23770 - **كشيشة** صوت الحية يجلدها .

23771 - **كطري** ، **كندش جوال**

- Dendroctitta (S). Dendroctitte, Pie vagabonde (F).
Dendroctitta (E).

كطري هو الاسم الهندي . جنس طير من الجوارم وفصيلة
الغرابيات . أنواعه المعروفة عشرة موطنها الهند . تألف
الحراج المبهمة الأجنار . ملجئها الحيائي جماعي . جماعاتها
قليلة العدد . قوتها البنور والحبوب والتأثر والغشرات ||
اجسامها متوسطة القدر تطول من ٢٨ إلى ٤٦ سم . بما فيه
الذنب الذي يطول من ٢٢ إلى ٢٧ سم . تتميز بأذنانها
المستطيلة الشبه سمية الشكل وبأولائها الخنطية القائمة
المبلطة بالاسود والاحمر والاشهب .

- Cassia (F). **كشيشة سوداء**
Black-currant (E). **ثمرة الكشيش الآسود** .

23769 - **كشيشيات**

- Ribésiées, Grossulacées, Grossulariées (F). Gros-
sulacées (E).

سبط من فصيلة القليات يشمل الكشيش والربياس
وبغيرها . اجناسه وأنواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع
الاصقاع المعتدلة المنحرفة نحو الباردة من العالم القديم
والجديد .

- 23769 - **كشيشة**
Androsace (F). **كشيشة**
هو الاندروزاس ، اطلبه .

- Guérîte (F). Shelter (E). **كشيش**

- 23769 - **كشيشة**
Truffe noire (F). **كشيشة**
هو الكرم الاسود ، اطلبه .

- 23769 - **كشيشة**
Kuehneola (S). **كشيشة**

جنس فلور مجهرية من فصيلة السحمايات ، يتميز بمشاعله
الرئيسية التجميع التي تركب نصل الاوراق على صفحاتها
المليا . نامتجه صفراء اللون قلادية التجميع والشكل . نكاته
عديدة مترافعة . سامه الساسية شعبة التركيب ، رباعية
البريقات || انواعه المعروفة حتى الآن قليلة ، منها كشيشة
التين وكشيشة القطن .

- 23769 - **كشيشة التين***

- Kuehneola ficl, Physopella ficl, Uredo ficl (S). Rouille
du figulier (F).

نظر مجهري يتطفل على اوراق التين فيؤذيها ويهيء الى
نمو الأجنار ونفج النار || مظهره الخارجي بقع مبهمة
صفراء اللون تركب نصل الاوراق على صفحاتها السفلى
تتسبب جفاف التجميع وذبول ثم الايصال الباكر الذي
يؤذي نمو الشجرة ويؤخر نفج النار || يكافح باستعمال
سائل بوردو المخلول ١ ٪ عند ظهور عوارض الوبس وبعد
ذلك بأسبوعين .

- 23769 - **كشيشة القطن***

- Kuehneola gossypii, Uredo gossypii (S). Rouille
du cotonnier (F).

نظر مجهري يتطفل على اوراق القطن فيؤذيها ويسبب
سقوطها الباكر || مظهره الخارجي بقع صفراء اللون مبهمة
او متلامسة تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا
تقابلها على الصفحات السفلى حالات بنية تمرقل سير التفسخ
تذبل الاوراق بعد ان تقضي على نسجها التي تلوي وتموت .
يكافح باستعمال احد الفواطير النحاسية الارتكاز الضعيفة
التركيز .

- 23769 - **كشيشة***

- Orobis (S). **كشيشة**
Orobe (F). Orobe, Bitter vetch (E). Bergerbe (D).
Orobo (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القطنيات
الفراسية . انواعها نحو ٤٠ سوقها فراء مستطيلة . أزهارها
مغترية يحرسها النحل . ثمارها سنية . بزورها مستديرة .
اشهر انواعها :

- Or. vernis (S). Orobe printanière (F). **كشيش ربيعية**

- Or. variegatus (S). Orobe panachée (F). **كشيش لقطاء**

- Or. niger (S). Orobe noire (F). **كشيش سوداء**



كشوش فلسطيني

وصفه وأعل صدره وذنبه إلى السواد اللامع . قفنه قبري الريش الأسود الأزرق المالح . ظهره ومثابه إلى الجؤرة . قوامه وأباهره إلى السواد المطروق بالأحر . سائر ريش جسمه إلى الحمرة النارية . أثناء أقل تلوناً ولعبة || يألف القفص ويضاهي الحسون في التفرية .

٢٣٧٨٥ - كُفْرٌ مَبْدُول *

Chrysomitris spinus (S). Tarin commun (F). Common siskin (E).

نوع من الكُفْر ، موطنه يشمل الشرق وأروبة وبعض مناطق أفريقية الشمالية . يألف الجبال والبلاد الباردة في الصيف ويجوب غابات وحدائق المناطق المعتدلة في الشتاء . وهو صغير القد ، جيل الثوب يطول من ١١ إلى ١٢ سم . الذكر منه متوج الرأس بالسواد . ظهره إلى الخضار الأصفر . يعلمو تجنيد أسمر . جناحاه إلى السواد يعترضها خطان أصفران . محسره وزوره وصدره إلى الصفار الأخضر . عقه أسود . منقاره حنطلي الجسم أسود الملقط . حدة عينه كستنية اللون ، ساقاه إلى الوردية . الأني أكثر بياضاً واقل حمرة واسوداداً . أما رأسها فإلى الخضار الالكهف بدلاً من الأسود . أثناء تبنيص وتحقق مرة واحدة في العام وقد يكون ذلك في الويزة الأولى من حزيران || وهو يألف القفص بسرعة ويدجن بسهولة .

٢٣٧٨٦ - كُفْرِيَّيْ ٥

Botrytite (F). نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كزهره القزديط أو كالمعتقد القصير المستدير .

٢٣٧٨٧ - كُفْرْدِيَّة ٥

Toile d'araignée (F). هي الشح ، راجحه .

٢٣٧٨٨ - كُفْرْدَة ٥

Pézize (F). Peziza (E). جنس فطور مقعرة من الكدمات . أنواعه عديدة منها واحد مهم الاقتصاد الزراعي يدهى الكدمة الجراحية .

٢٣٧٨٩ - كُفْرْدَة جَرَابِيَّة ٥ ، أَلْوَرِيَّة ٥

Peziza vesiculosa, Aleuria vesiculosa, Edocephalum fimetarium (S). Pézize vésiculeuse (F). عسقلانه

كبير القد مركب من سدائن غليظة قدسية الشكل ملفوفة الحافة . قطره براوح من ٣ إلى ٩ سم . مواجه الخارجي غير خلي . سطحه النكمي ملمس البشرة داكن اللون الحنطلي أضراره قائمة على ما يتلف من شتول يتغلغلها من التربة عند شق طريقه نحو النور .

٢٣٧٩٠ - كُفْرْدِيَّات ٥

Pezizaceae (S). Pézizacées (F). Pezizaceae (E).

فصيلة فطور من رتبة الزقيات . أجناسها وأنواعها عديدة جميعها مقعرة ، بعضها عادم العنق . معظم أجناسها يعيش على المواد النباتية والنباتية المتحللة . منها أنواع كبيرة القد ، لحية المسقلان ، ما كولة || أشهر أجناسها الكدمة والاستبولة والسركوسينا والأوتيدا ، الخ .

٢٣٧٩١ - كُفْر ٥

الكرم : « شك يسبب له ورق كبار امثال الذراع كثيرة الشكل ثم تخرج له شمع وتظهر في رؤوس شعبة هنات امثال الزجاج يطيف بها شك كثير طوال ، وفيها وردة حراء مشرقه تجمرها النحل وفيها حب امثال العصفور الا انه شديد السواد » (اللسان) .

٢٣٧٩٢ - كَيْطَامَة

Canal souterrain (F). Underground duct (E).

القناة جـر الماء مدودة ومقيبة تحت الأرض .

٢٣٧٩٣ - كُفْر ٥

Carène (F). Keel (E). كل اخدود بارز يملو احد اضواء الحشرة أو الزهرة . ومنهم من دناه قارب وزورق .

٢٣٧٩٤ - كُظْرَان ٥

Capsules surrénales (F). Suprarenal capsules, S. bodles (E). غدد فوق الكلا .

٢٣٧٩٥ - كُغَب ٥

Nœud (F). Knot (E). العقدة ما بين الانبوبين من القصب والقنا . وقيل الكعب هو طرف الأنبوب الناشئ . ج كعوب وكعاب .

٢٣٧٩٦ - كُغَب ٥

Malléole, Talon (F). Malleolus, Heel (E). هو عقب الرجل .

٢٣٧٩٧ - كُغَب الْفَرَال ٥

راجع سكايبوزا حقلية .

٢٣٧٩٨ - كُغْبَرَة ٥

Nœud (F). Knot (E). الكبيرة : عقدة انبوب الزرع ونحوه . ج كمار .

٢٣٧٩٩ - كُغْبَرِي ، كُغْبِي ٥

Radial Capsule

٢٣٧٨٠ - كُغْبُور ٥

هو الجرو ، اطلبه .

٢٣٧٨١ - كُغْبُورِي ٥

Capsulaire (F). Capsular (E). نعت تعريفي يوصف به ما كان شكله كالكمبور .

٢٣٧٨٢ - كُغْبَة ٥

Pirula (S). Pirule (F). Pirula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مذنبات الارجل وفصيلة الخنثنيات . أنواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصداؤها شبه اجاصية الشكل ، رقيقة ، سريعة العطب ، كبيرة الفوهات المستطيلة القاطبة ، صغيرة الاعقاب الملهونة المدببة ، حجلة الالوان المتناسقة || أشهر أنواعها الكتمة التينية (Pirula ficus) التي يكثر وجودها في البحر الاحمر .

٢٣٧٨٣ - كُغْفَر ٥

Chrysomitris (S). Tarin (F). Siskin (E).

جنس عصافير صغيرة القد تالعة من فصيلة الشرشوريات . انولاه المعروفة ٨ انولاه متداخلة الالوان المركبة المتباينة اذنانها مستعرضة فارقة . مناليعها مخروطية قصيرة . تألف الغالبات ومجاري الماء . تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي ، قوتها زور النباتات البرية ونولي الاوراق والخضراوات الصغيرة على اختلاف فصائلها وأنواعها . تتش في الاشجار الكثيفة اخضر السرو والصنوبر . انائها تقسم من ٣ الى ٥ . بيضات تحضنها وحدها ١٢ يوماً . أشهر أنواعها المبدول والقنبري .

٢٣٧٨٤ - كُغْفَر قُفْرِيَّيْ ٥

Chrysomitris cucullata (S). Tarin rouge à tête noire (F).

نوع من الكُفْر ، موطنه امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل وفنزويلا . طوله براوح من ١٣ الى ١٤ سم . رأسه وزوره



كعة



كُفْر مَبْدُول



كدمة جرابية

٢٣٧٩٢ - كَفَرَة هي المقعدة الغدية الشكل .

٢٣٧٩٣ - كَفَس Os des phalanges (F).

الكعس عظام السلاحي في الاصابع . ج كعاس .

٢٣٧٩٤ - كَفَسَم Ane sauvage (F).

هو الحمار الوحشي .

٢٣٧٩٥ - كَفَسُوم Ane domestique (F).

هو الحمار الاحلي .

٢٣٧٩٦ - كَفَل ٥ Métamorphose (F).

الكفل هو الاكمال ، اطلبه .

٢٣٧٩٧ - كَفَنَد Germon (F).

هو الكند ، اطلبه .

٢٣٧٩٨ - كَفْب * شَوْك الدَمَن ، حَرَشَف بَرِي Carduus Marianus, Silybum Marianum (S).

Chardon-Marie, C. argenté, Lait de N.D., Artichaut sauvage (F). Milk thistle, St. Mary's thistle (E). Echthe Mariendistel (D). Cardio di Maria (I).

نبات عشبي بري يحول من فصيلة المركبات . ساقه تملو من ٢٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة مفرصة حاشنة . نصلها لامع الصفحة المستجبة بالابيض . حثاره شائك الاحداث . رؤوساته الزهرية تكبر من ٤ الى ٨ سم . ازهارها ارجوانية ، قناباتها ماسية سنانية تنتهي بشوكة مبطلعة الجرم مستطيلة الحمة .

٢٣٧٩٩ - كَفَبَت Pycnonote (F).

هو البلب ، اطلبه ، ج ، كعتان .

٢٣٨٠٠ - كَفَبَتَات ، بَلْبَتَات Pycnonotidae (S).

Pycnonotidae (F).

فصيلة طير من الجوائم مشرومات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة . اعطائها معظم اقاليم البلاد الحارة والاستوائية || اجسامها صفرة . مناقيرها مخززية الشكل ، مستعرضة القاعدة ، منفضلة الجوانب ، مدببة الاطراف . اجنتها مستعرضة ، معتدلة الطول . اذنانها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف . ارياشها ناعمة وفزيرة . ارسافها قصيرة ، سرديّة الفصالح الامامية . اصابعها قصيرة وقوية . قوتها الحشرات والثمار المعنبة واليدور البرية وبعض نواصي النبات || اشهر اجناسها الكميث اي البلب .

٢٣٨٠١ - كَفَبَص Cri de la souris (F).

صوت القارة او صراخها .

٢٣٨٠٢ - كَفَبِظ ٥ Brachyslen" (F).

نمت وصفي يطلق على ما كان ظله شديد القصر . ويطلق جغرافياً على الشعوب التي تسكن المناطق الاستوائية لان ظل افرادها عند الظهيرة يكون شديد القصر .

٢٣٨٠٣ - كَف آدم

« نبت نحو ذراع مستدير الورق خشن بين سواد وصفرة داخله احمر لونه زهر كالقرطم لكنه اذق وفيه مرارة . ييرة

منع الحفقاء شرباً باللين ويحلل الرياح ويقوي الكبد » (التذكرة) .

٢٣٨٠٤ - كَف الدُب Sauge sclarrée (F).

راجع قويسة قاسية .

٢٣٨٠٥ - كَف السَّع Renoncule asiatique (F).

راجع حوذان اسيري .

٢٣٨٠٦ - كَف الصَّبَاغ Iris d'Allemagne (F).

راجع سوسن جرمانى .

٢٣٨٠٧ - كَف العَدْرَاء * ، وَرْدَة أُرْبَا Anastatica hierochuntica (S).

Rose de Jéricho, St. Mary's flower (E). Jerichorose, Marienrose (D). Anastatico, Rosa di Gerico (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الصليبيات . منبته الاصقاع القاحلة اخضها البراري الفلسطينية . ساقه قراء تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقه اهليلجية الشكل ، غليظة التسنين ، نصلها ابيض الصفحة زفيه نجمي التركيب . ازهاره اهبطية الارتكاز ، فردية التجميع ، لاطنة الانتشاب ، يقياس اللون || وهو من النباتات التي تعيش من جديد ، بعد يباسها ، فيما لو وضعت في الماء .

٢٣٨٠٨ - كَف النَّسْر ، عَفْرَبَان ، حَشِشَة دُورِيَّة ، فَايس Scolopendre officinale, Herbe à la rate (F).

Official hart's tongue (E). هو السرخس الخزفي من النباتات الطبية المشكورة ، يستعمل في علاجات الطحال ويطرد الحمى ويدبر البول ويزيل البرقان .

٢٣٨٠٩ - كَف المَهْر Renoncule des champs (F).

هو الحوذان الحقل ، اطلبه .

٢٣٨١٠ - كَف الْبَد Dessaisissement (F).

Parting with, Abandonment (E). هو منع الشخص عن ادارة ماله . وقد يكون الانتناع طوعاً واختياراً .

٢٣٨١١ - كَف جَدْمَاء

الكف الجذماء بضعة نجوم من كوكبة قيطس مركزها في الرأس .

٢٣٨١٢ - كَف مُخَضَّب

الكف المخضب نجم نير من كوكبة ذات الكرسي . ويدعى ايضاً الكف الخفيف .

٢٣٨١٣ - كَف مَرْتِم

هو الارلثة ، جنية طيبة معمرة . وهو كوكب البحر ، اطلبه .

٢٣٨١٤ - كَفَّاسَة *

Sparassus (S).

Sparasse (F). Sparassus (E).

دوبية من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايات سداسية المشانق تنتمي الى فصيلة الهاجيات || جسمها صغير القد يطول نحو ٧ م . عند الذكر ونحو ١٢ م . عند الانثى . صداسها ناعمة المقدم ، حنطي اللون ، مكثيف الحمل .



كعب



كف العذراء



كفَّاسَة

الى الكسني الاحمر المواج . ملذها ورواجها الى السرة
الحالكة || طور الاكمال يستمر نحو ١٦ يوماً وينقضي
في الجفلة او في التربة حيث تنغم السرة ملتصقة بجلباب
من الطين .

Cautionnement (F).
Security (E).

٢٣٨١٧ - كَفَّالَة

هو العقد الذي يلتزم به الكفيل نحو الدائن المكفول له .
وهو أيضاً الذميمة المرتهنة سواء كانت أوراقاً مالية أم تقوياً
تستوعد تأميناً لدين احتماله .

Garantie (F).

٢٣٨١٨ - كَفَّالَة ، ضَمَان

Guaranty, Warranty (E).

شهادة خطية من البائع بان ما يبيعه من بذار واسمدة
وادوية وادوات وغيرها حائزة على التركيب المتفق عليه .

Ducroire

٢٣٨١٩ - كَفَّالَة الشَّارِي

هو ان يلتزم الوسيط دفع ثمن المشتري الى البائع اذا لم
يفعل الشاري ذلك .

Caution juratoire (F).

٢٣٨٢٠ - كَفَّالَة الْقَسَم

Juratory security (E). قسم تعتبره المحكمة بمثابة كَفَّالَة .

Caution légale (F).

٢٣٨٢١ - كَفَّالَة قَانُونِيَة

Common bail (E).

هي الكفالة التي تقدم تنفيذاً لنص القانون .

Caution judiciaire (F).

٢٣٨٢٢ - كَفَّالَة قَضَائِيَة

Judicial security (E).

هي الكفالة التي يجب تقديمها تنفيذاً لحكم المحكمة .

Limite du feuillage (F).

٢٣٨٢٣ - كَفَّة

Limit of the foliage (E).

كفة الشجرة : منتهى حدود دوحها حيث تنقطع أوراقها .

٢٣٨٢٤ - كَفَّة جَنُوبِيَة

الكفة الجنوبية كوكب .

٢٣٨٢٥ - كَفَّة شَالِيَة

الكفة الشالية كوكب .

Bitume

٢٣٨٢٦ - كُفَّر

هو الحمر الغروي ، راجع حر .

Kaempferia (S).

٢٣٨٢٧ - كُفَّرِيَة

Kaempféria (F).

جنس نباتات جذمورية دوفضية معمرة من فصيلة
الزنجبيليات . انواعه نحو ٢٠ منبتها المناطق الحارة . اوراقها
كبيرة اللد ، قرصية الانتشاج يتوسطها سراجح تملوه زهرة
كبيرة ، جملة الشكل ، ثنائية الالوان || جذاميرها طيبة
يستخرج منها مواد ناعوظية شديدة الفاعلية .

Selaginella (S).

٢٣٨٢٨ - كُفَّان

Sélaginelle (F). Resurrection plant (E). Auferstehungs-
pflanze (D). Selaginella (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخدرديات .
انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات البلاد الحارة
والمعتدلة . سوقها نخيلة مدادة فراء . فروصها منتسبة فناء
تكسوها الاوراق الصغيرة المتركة الحرشية الشكل ،

عينها زيمتان . شيسفاها صغيران ذريان . فكاهها كبيران
مجهزان بغلاف حادة . جزامرها كبيرة مستطيلة . بطنها
بيضي الشكل ، حطلي اللون تملوه شمسة سمراء واربع نقط
سود || تألف البراري والمواقع الدغلة . قوتها الحشرات
والذباب : تسرح في الليل . ماراها سنة صغيرة قلنسوية
الشكل تنسجها عند سوق النبات . بيئاتها الشتوي يستمر
نحو خمسة أشهر تقضيها في مكانية صلجية تنسجها بين
الحجارة وتحتها || تعتبر من الدويبات النافعة .

٢٣٨١٥ - كَفَّاشَة تَرَاوِيَة *

Calymnia trapezina, Cosmia trapezina (S).

Calymnie trapézoidale, Cosmie trapézoidale (F).

Calymnia trapezina (E).

فراشة من فصيلة العنقيات حرشقيات الاجنحة . موطنها
يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة . فراشها جولة
قوتها رحيق الازهار . سرفها غاضلة تركيب اوراق الاشجار
الوريفة || جسمها يطول نحو ١٣ سم . بسطها تراوح من
٣٠ م . ٣٢ م . رأسها معتدل الجرم ، ناقى الجبهة .
عينها كبيرتان ناشزتان . زباناها غيطيان . ملاسها
نخيلة . مرشفاها معتدل الطول . جوشها وبطنها الى الخطني
الاحمر المواج || روشناها الامامية الى الخطني الاكلفت
تملوه شمسة غنائية وضغان ممرضان اسمران . روشناها
الخلفية الى الخطني الاسمر المواج يطوقه حطار تني ينتهي
بالاسمر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في
ايار ويني حتى تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار ||
الانثى تلقي المكن لطعاً لامساوية الشكل تغلفها مادة
غريبة تقيها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق ||
السرة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٨ سم . جسمها
مالس القشار ، مستدق المقدم ، مستنطق المؤخر الذي
يبدو كعقرب المدقة . ثوبها الى البني الاسمر تملوه خطوط
صفر ممرضة . رأسها كسني اللون . ملذها ورواجها
الى السرة القاذرة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٥
الى ١٧ يوماً وينقضي في التربة حيث تنغم السرة على
عمق ٣ او ٤ سم . ملتصقة بجلباب خفيف من الطين ينفلق
عند انطلاق الفراشة في ايار .

٢٣٨١٦ - كَفَّاشَة مُوَاطِئَة

Calymnia affinis, Cosmia affinis (S).

Calymnie complice, Cosmie complice (F).

Calymnia affinis, Cosmia affinis (E).

حشرة من العنقيات حرشقيات الاجنحة . موطنها يمتد
من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشها جارية قوتها رحيق
الازهار . سرفها غاضلة تعيش على اوراق السديان ||
جسمها صغير اللد يطول نحو ١١ سم . بسطها نحو ٢٩ سم .
رأسها الى الخطني . عينها كبيرتان . زباناها غيطيان .
ملاسها دقيقة . مرشفاها معتدل الجرم . جوشها وبطنها
الى الخطني الاسمر المواج || ورأسها ، عند الشقين ، الى
الخطني الاكلفت تملوه في الزوج الامامي ماجة صائبة
ويطول سمر ممرضة ويقبضان الى الطلعة || لها جيل
واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران ويني حتى آب .
تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ٤٠ يوماً وتمتد
المكن لطعاً مستطيلة الشكل على الصفحات السفلى من
نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الكمال الجسدي
تطول نحو ٢٤ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالس
القشار . ثوبها الى الطلعة يملوها مواج اخضر وخطوط
سود ممرضة يتخللها من الجانبين نقط غبراء اللون . رأسها



كَفَّاشَة تَرَاوِيَة



كُفَّرِيَة



كُفَّان

الزيتونية اللون || تزرع للتزيين يستعملها الزهارون في صناعة ارماش وباقات الزهر.

Croupe (F). ٢٣٨٢٩ - كَقَل
هو الردف ، اطلبه .

Glechoma (S). گلکوما - ۲۳۸۳.
Gléchome, Glécome (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات .
انواعها قليلة بعضها طبي . سيقها لاقياية الشكل منها
المادة والمتنصة . اوراقها متقابلة معتقة ، نصلها مستدير
الصفحة المشارة الحافة . ازهارها ابطية الارتكاز مختلفة
الالوان منها الابيض والازرق والارجواني والبنفسجي .
تعيش في الموام الرطبة وفي الاقنية والسياحات .

٢٣٨٣١ - كَفَنَةُ مَدَّادَةٌ * ، لَبْلَابُ أَرْضِيّ
Glechoma hederacea (S). Glécheme hédéracé, Herbe de St. Jean, Rondelotte, Terrette, Lierre terrestre (F). Ground ivy, Hedge maids (E). Echter Gundermann (D). Corona di terra, Erba di San Giovanni, Eders terrestre (I).

نوع من الكفنة المبدولة وهو نبات عشبي طبي بري معمر. ساقه تطول نحو ٣٠ سم. أوراقه جميلة الخضار المشوح إزهاره ضيقة التجميع ، محمية ، زرقاء اللون .

٢٣٨٣٢ - كَفَيَّاتُ الْقَدَمِ

رتبة من الطير تنتمي الى قسم الجوارحيات، فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى اربع رتبيات :

شاملات الكفوف منها البجع
 صفيحيات المناقير منها الوز والبط
 طويلات الريش منها القطرس
 عديمات الريش منها البطريق .

Kéfir, Képhir (F). ٢٣٨٣٣ - كَفِير

مشروب كحولي حامز العظم يستحضر من مضارة اللبن
بعد تخثيرها بخار فطرية خاصة تعد من نشاط الحامض
اللبنى.

Caution, Fidejussor (F). ٢٣٨٣٤ - كفيل
Caution, Surety (E).
هو الذي يلتزم للدائن مع المدين الأصلي بتنفيذ الالتزام
إذا لم ينفذه المدين.

Garant (F). ٢٢٨٣٥ - كفيل ، ضامن
Guarantor, Warrant (E). هو الملتزم بالكفالة او الضمان .

٢٣٨٣٦ - كَفِيلُ النِّفَقَاتِ الْقَضَائِيَّةِ
Caution judicatum solvi
هو الكفيل الذي يضمن دفع النفقات القضائية .

٢٣٨٧ - كَفِيل مُتَضَامِن (F). Caution solidaire (F).
 Binding on several caution (E).
 هو الكفيل الذي تنازل للدائن عن حق المطالبة بتجريد
 المكفول فاصبح موقفه من الدائن موقف الشريك المتضامن
 في الدين .

Cacatua, Plectolophus (S). * كَكْتُوْه - ٢٣٨٣٨
Cacatoès, Cacatois (F), Cockatoo (E).

جنس طير من الببغاء . انواعه قليلة العدد جميعها متسلقة اعطائها فيحة الارحاء تمتد من الهند الى جزر الزابنج اواستراليه . اجسامها كبيرة القد . اناؤها الى البياض الناصع . طارها كبيرة فارشة لها يختلف باختلاف النوع ، يراوح من الابيض الى الوردى والاصفر || وهي هينة الخلق تعيش في الفقص وتقتبس العلم والكلام .

٢٣٨٣٩ - كُكْجَة الظِّيَّان ٥ *

حشرة من الككجيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. ثوبها الى الخططي تعلقوه ماجة جزؤية . كوسلها عادم التستين . زباناها صوجانية مهدة || تعيش على سوق الفليان بعد ياسها .

٢٣٨٤٠ - كُكْجَة المَخَازِين * ، كُكْجَة
سُورِيَّاه

Oryzaephilus surinamensis (S.). Silvain (F). Sawtoothed grain beetle (E). Getreideschmalkäfer (D).
خشرة من الشكليات تهاجم الحنطة القمح . جسمها مستطيل الشكل بطول نحو 3 م.م. كسلها مسن الحافة .
زباناها صلبة مبهدة . تركب مع برقائها جميع الحبوب الخمرية والبر والحبطة والسكرار والتبن . وقد تفرس وتبيد رزقا الكلدنا (Calandra).

* ٢٣٨٤١ - كُكْبَةُ مُفْلَطْحَةٍ ٥*

Uleiota planata (S).
حشرة من الككبيات جسمها مستطـق مفلطح . طولها
يرواح من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى الصبـة يملوها موج
قائم . كوسلها الى السـرة ثنائي التـنين الطرفي الامامي .
زباناها خيطية ، مستطيلة مهدبة . || تعيش تحت لحاء
الاشجار المرححة اغصانها النديان .

Cucujidae (S). كُجَجِيَّات - ٢٣٨٤٢
Cucujidés (F). Cucujidae, Flat bark beetles (E).
Rindenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الانجحة . اجناسها والنوعا
عديدة اعطائها العالم . جميعها من الخنافس الصغيرة المستطيلة
الشكل . قرونها الاستشعارية خيطية او صولجانية مركبة
من ١١ فاصلة . ارساغها خاسية العقل || تعيش بين
الاخشاب وتحت القشور وفي مخازن الحبوب حيث تغترس
ما تقوى عليه من الومام والحشرات الصغيرة .

٢٣٨٤٣ - كُكْسِيْنَدَة هـ. المَفْثَرَة ، اَطْلُهَا .

۲۳۸۴۴ - ککسید یوز
مرض فثاك يدمى خرزة الارنب ، اطله

٢٣٨١٥ - كَكُئِب ٥
Coccoloba (S).
Coccoloba (F).
جنس اشجار وشجيرات برية من فصيلة البطيانيات . انواعه
المعروفة نحو ١٦ منها المناطق الاستوائية الامريكية .
تتميز بصلابة ومناعة اغصانها الصاعدة || اشهر انواعه
ما يتم .

٢٣٨٤٦ - كُكُلُوبُ اَزْغَب ٥
Coccoloba pubescens (S). Coccolobe pubescent,
Bois de fer (F).
شجرة عظيمة دائمة تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. خشبها احمر



كفنة مدادة



ککتو:



ككجة الطمان



ككحة المخازن



ككحة مفلطحة

طوله نحو ١٠ سم. وبسطه نحو ٣٠ سم. رأسه شبه مخروطي؛ عيناه صغيرتان، ماسحتان. خنثاه، مقطوستان، مقوستان. سباله متكاثف مستطيل. أذناه مستطيلتان، كبيرتان. جناحاه عريضان. ذنبه مدرج في الغشاء الجلدي || يألف البيوت والكهوف والمغاور القريبة من الجاري الماء. يعيش جماعات متوسطة العدد. الذكر لا يغتر بالإنثى إلا في زمن الكرم. من في الحول || سمرسه يستمر من الفسق إلى الفجر. قوته الحشرات على اختلاف أجناسها وأنواعها.

٢٣٨٥٥ - **كلادة***
Chelodina (S).
Chelodine (F). Chelodina (E).

نوع من السلاحف القازية المفترسة تنتمي إلى فصيلة الحسبيات. تعيش في المياه العذبة وعلى ضفاف الأنهر. قوتها الاسماك والرخويات والصفادع والوزغ والسحالي والحيات || جسمها يطول نحو ١٠٠ سم. منها ٢٢ سم. عتقا لراس والعتق رأسها مبسط الشكل، ذلق الخلع. عتقا اسطواني مستطيل. ذنبها جذعة. ذيلها شبه يضيي الشكل، متدلل الإحديدياب، ويتربك من ٢٥ فترة لامتسارية الحجر، لونه إلى السمرة الصفراء الكدرة || موطنها بعض مناطق امريكة الجنوبية || لحمها كاعن الصنف، مأكول من بعض قبائل تلك البلاد.

٢٣٨٥٦ - **كلاديون***
Cladium (S).
Cladion (F). Marsh shear-grass (E). Schneidegras (D). Panicastrella di padule, Serrazo (I).
جنس نباتات برية عشبية معمرة من فصيلة السعديات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطانها العالم. تألف المنافع والمواقع الرطبة. سوقها دقيقة قرصية التفريع، مستطيلة السليميات، تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم || تستعمل في تغليف الخيم لأنها آمن وأبقى من قش الزروع.

٢٣٨٥٧ - **كلاركيا، إكلركية***
Clarkia (S).
Clarkia (F). Clarkia (E). Clarkia (D). Clarkia (I).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الإخندريات مهدها البلاد الامريكية. أنواعها قليلة جميعها صغيرة القند زرر للترئين. أرواقها متعاقية. أزهارها فردية التنسج، محورية الارتكاز، رباعية البتلات والسمات ثمانية الاسدية. اعرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٣٨٥٨ - **كلاركيا رشيقة***
Clarkia elegans (S). Clarkia élégante (F).
عشبة ثريبتية سبروتية حولية تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. أرواقها اعطليجة ذلقة، نصلها مسنن الحافة، بحري اللون. أزهارها كبيرة القند عادية أو مكسية، بتلاتها مستديرة أو كلوية الشكل، مسنة الخبار المتجمع. ألوانها تختلف مع الفسروب منها الوردي والبفسجي والابيض. أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٣٨٥٩ - **كلاركيا تحيقة***
Clarkia pulchella (S). Clarkia délicate (F).
عشبة ثريبتية سبروتية حولية تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ضروبها عديدة. أرواقها سنائية ذرية، نصلها خلي البشرة. أزهارها كبيرة القند، منها البادية والمكسية؛ بتلاتها لاثباسية التفصيص، ألوانها تختلف باختلاف الفسروب منها الاحمر والابيض والبفسجي والابيض. أزهارها يستمر من حزران إلى ايلول.

اللون شديد الصلابة ناعم الرقة يقاوم التبخ يعرف بنخب الحديدي.

٢٣٨٤٧ - **ككلوب كينو*، وذن الفيل، عتب الشقة***

Coccoloba uvifera (S). Cocolobe à baguette, Bois baguette, Raisinier des bords de la mer, R. à grappes (F). Sea-side grape, Kino tree (E). Gemeine Seet-raube (D). Coccoloba uvifera, Uva di mare (I).
نوع من الككلوب وهو شجرة برية تألف الشطوط البحرية. ساقها تملو من ٣ إلى ٥ أمتار. أرواقها متعاقية، معتقة، كبيرة. نصلها مستدير الصفحة الجامدة اللاصقة. أزهارها سنبل التجميع، تناسج الارتكاز. أزهارها جليجية الشكل، صفرة القند، وردية اللون || يستخرج من ساقها بالحز عصاره لزجة، قابضة، مفراة اللون يطلق عليها اسم « كينو » (Kino).

٢٣٨٤٨ - **ككم***
Ierax (S).
Hlerax, Faucon nain (F). Ierax (E).
جنس طير من عرأة الصقور وفصيلة الصقريات. أنواعه عديدة جميعها صغيرة القند، ربة القوام، طولها يراوح من ٢٠ إلى ٢٢ سم. أنفها إلى الكلسة المرقوبة يكثر فيها الاطمل والاسمر والأزرق العابق، ريش صدورها أحر. رؤوسها مستديرة. عينوها جليية وكيرة. مناسرها مسنة ومنعقة. غالبها حادة || موطنها البلاد الاسيوية من تركيا إلى اليابان. تألف الاجام ويحاري الماء. قوتها اللوديات والخشرات اعصها الجنادب والسراعب والفرشاة الكبيرة.

٢٣٨٤٩ - **ككلا***
Fourrage (F).
Fodder, Provender (E).
كل ما ترعا الماشية من اعشاب خضر او تعلفه من نخيش وصقال مخزونة كالطاطا والشولدر الخ.

٢٣٨٥٠ - **ككلا يابس***
Foin (F). Hay (E).
الككلا اليابس والنن والصالرة والقيب هو العشب امحشوش الميحف المفوظ كملف للحيوان.

٢٣٨٥١ - **ككلاية***
Pâturin des prés (F).
هي ثف المروج، اطليه.

٢٣٨٥٢ - **ككلاب***
Canidae
فصيلة حيوانية من اللواسم تعرف بالكليات.

٢٣٨٥٣ - **ككلاية***
Quillaja, Quillaya
جنس اشجار برية من فصيلة اللوديات. أنواعها قليلة اعطانها البلاد الامريكية. سوقها وفروعها منصبة، أرواقها متعاقية معتقة يضيية النصل. أزهارها نوري. أزهارها ثنائية المسكن، ابطية وتاجية الارتكاز || أشهر أنواعها الككلاية الصابونية التي تميز بسكاكة قشور سوقها واغصانها الفنية بمادة الصابونين.

٢٣٨٥٤ - **ككلاج، خففاش أسبل***

Vespertilio mystacinus (S).
Vespertilion mystacin, V. à moustaches (F).
الككلاج والككلاية نوع من الخفاش، حيوان من فصيلة الخفاشيات. مولته نسج الاجراء يمتد من الصين إلى اربوة مروراً بالشرق الاوسط والاندل || ثوبه إلى الطحلة السمراء تعبق في الرأس والظاهر، وتغير في البطن.



ككلوب كينو



ككم



كلادة



كلادة



كلاديون



كلاركيا رشيقة

٢٣٨٦٨ - كَلْبُ الْجَبَّارِ

كلب الجبار كوكب .

٢٣٨٦٩ - كَلْبُ الرَّاعِي

كلب الراعي نجم نير من كوكبة الجاني ، يسمى أيضاً رأس الجاني ، اطلبه .

٢٣٨٧٠ - كَلْبُ الصَّيْدِ

Chien de chasse, C. courant (F). Pointer, Beagle (E). صرم من الكلاب النشطة الحاذقة الثمر تستعمل في الصيد . عروقها عديدة تتميز باختصاصها واشكالها واثرها .



كلب (١)

Ligne du dos (F). كَلْبُ الفَرَسِ
Line of a back (E). هو الخط الذي يوسط ظهر الفرس .

٢٣٨٧٢ - كَلْبُ المَاءِ

Lutra (S).
Loutre (F). Otter (E). هو القضاة والفتنس وتُلب الماء . جنس حيوانات لبونة قازية من فصيلة السعويبات . انواعها ثمانية اصطلحها العالم . تألف السيرات والاذنر والاخوار . قوتها الاسماك والقشريات . والصفادع وبعض الثار والاعشاب || اجسامها مستطيلة . رؤوسها مستعرضة مفلطحة . اعطالها مقبولة . اعتاقها غليظة . قوائمها قصيرة ، اصابعها خاسية ملتصحة . اذنانها مستطيلة . جلودها غروية فاخرة الصنت || اجارها دالزين منحدره الانفاق تبتني تحت سطح الماء تخسبن او ستين سم . وتنتهي على بعد ٢٠٠ سم . ردهات مستمرة تملو مستوى الماء بنحو ١٠ سم . وتتصل مع الخارج براديب تزين الهواء والحرب عند الحاجة || اناها اصفر قدام ذكورها وفي تقصم من جروين الى اربعة جراء . رضعها ورضيها نحو ٥ شهور .

كلب (٢)

Courtilière (F). كَلْبُ المِي
هو الخالوش ، اطلبه .

٢٣٨٧٤ - كَلْبُ مُتَقَدِّم

الكلب المتقدم كوكب .

٢٣٨٧٥ - كَلْبَان

الكلبان « نجان صفران كاللترقين بين الثريا والدران » .

Chienne (F). She dog (E). كَلْبِيَّةٌ
انثى الكلب .

كلب (٣)

Canidae (S). Canidés (F). كَلْبِيَّاتٌ
Canidae, Dogs (E). فصيلة الكلاب من اللواحم تشمل الكلب والذئب والكلب وابن آوى .. قوائمها الاسامية خاسية البرانث اما الخلفية فرباعية ورائتها لا تنقبض كما في السنابير وفي لا تتسلق الاشجار ولا تنقبض على فريستها برائتها بل بانهاها .Cynocéphales (F). كَلْبِيَّاتُ الرُّؤُوسِ
Cynocephalus (E). هي القراذيع جنس قرد من فصيلة الحمرسيات . راجع قردوح .٢٣٨٧٩ - كَلْتُم
هو الفيل والزنديل ، اطلبها .

٢٣٨٦٠ - كَلْبِيَّةٌ

جنس نباتات برية معمرة من النقيات تدعى مياكة ، اطلبها .

٢٣٨٦١ - كَلْبٌ ، سَعَارٌ ، سَعَرٌ

Rage, Hydrophobia, Lyssa (F). Hydrophobia (E). مرض خبيث يصيب الكلاب والذئاب والثعالب والسنابير ويسري الى سائر الحيوانات كالليل والبقر والغنم والماضر والارانب . علاؤه بالخرج من العالب .

٢٣٨٦٢ - كَلْبٌ *

Canis familiaris (S).
Chien (F). Canis, Dog (E). جنس حيوانات شاردة واعلية من فصيلة الكليليات . سلالته كثيرة العدد تجتمع الى اربع فئات :Lupoïdes فئة الكلاب الصبورية
Braccoides فئة الكلاب الشمسية او المرجعية
Molossoïdes فئة الكلاب الدوراسية
Graloïdes فئة الكلاب السلوقية

اثنائه حشارية الاطباء تحمل من ٦٣ الى ٦٥ يوماً وتضع من ٦ الى ١٠ جراء تبصر النور بعد وضعها بنسبة ايام . وتفقد اسنان الحليب بمر ثلثة اشهر ويكتمل تسنيها النهائي بمر ثمانية اشهر . وللكلب خمسة اصابع في قوائمه الاحامية واربع في الخلفية . اصابعه مبطة قوية البرانث || وهو حيوان متناسل ايف وفي يستخدبه الانسان في الحراسة والصيد والرعاية والطاراة .

٢٣٨٦٢ - كَلْبُ اصْفَر

le Petit chien (F).
Canis minor, the Lesser Dog (E). الكلب الاصفر كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها بعد الكلب الاكبر الى الشرق || مجموعها قليلة العدد ، منها سبعة مزدوجة وكوكب انور من غيره تسميه العرب « الشعرى الشامية » لانه يغيب في ثقب الشام . وتسميه ايضاً « الغميضاه » . وتسمى الكوكبين اللذين على الذراع « الذراع المتبوس » او « مرزم الذراع » .

٢٣٨٦٤ - كَلْبٌ اكْبَرُ

le Grand chien (F).
Canis major, the greater Dog (E). الكلب الاكبر كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها خلف كوكبة الجوزاء ولذلك تدعى كلباً || عدد مجموعها تسعة وعشرون . والعرب تسمى النير الاعظم الذي على موضع الفهر « الشعرى العبر » . وكان قوم في الجاهلية يعمدونه لانه يقطع الباء عرضاً دون غيره من الكوكب . وسمي عبوراً الى عبر الهجرة الى سهيل ، ويسمى ايضاً « الشعرى البانية » لان مغيبه في ثقب الين . اما الاربعة التي منها على كتفه وعلى ذنبه وما بينها وعلى فخذيه فتدعى « المذارى » والاربعة المصطفة على الاستقامة تدعى « القرد » .

٢٣٨٦٥ - كَلْبُ الاَوْكَارِ

Chien-terrier, Fox-terrier (F). Terrier (E). سلاله من الكلاب النشطة الشقيقة تستعمل في صيد الجرذان والثعالب والارانب وغيرها .

٢٣٨٦٦ - كَلْبُ البَحْرِ

Requin (F). هو القرش ، اطلبه .

٢٣٨٦٧ - كَلْبُ البَحْرِ

Emissole (F). سمكة بحرية ، كبيرة ، مفترسة تدعى سيتل ، اطلبها .

٢٣٨٨٧ - كَلْسُومَةُ حَرَشَةِ ٥

Calosoma rugosum (S). *Calosome rugueuse* (F).
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها نحو ٢٥ م.
ثوبها اسود اللون. غمداءا مخدائد يعلوها مولج أخضر.
اسفح || تكثر في الصيف على الانجبار الحرجية وفي
الحادائق والجنان حيث تقترس يرقات غيرها من الحشرات
أخصها يرقات فصيلة السفيقيات .

٢٣٨٨٨ - كَلْسُومَةُ مَاكِرَةِ ٥

Calosoma sycophanta (S). *Calosome sycophante* (F).
European Calosoma beetle (E). *Puppenräuber* (D).
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها براوح من ٢٥
الى ٣٥ م. رأسها وكسليها الى الزرقه ، غمداءا مستعرضان
الشكل ، لونها الى الخضار المنهب الاسفح الموج .
تألف الغابات والحادائق حيث تقترس على تيسر لها من
يرقات الحشرات أخصها اساربع القرزيات .

٢٣٨٨٩ - كَلْس ، جَبْر ٥
Chaux (F).
هو اكسيد الكلسيوم ، اطبله .

٢٣٨٩٠ - كَلْسِبُورَةُ ٥
Calospora (S).
جنس فطور مجهرية من الرفقيات . تتميز ببوغها المستطيل
القد ، الشفاف الجسم ، الشفعي الانقسام والبوري
المعترض || له نوع واحد هم الاقتصاد الزراعي يدعى
كلسبورة الويلية .

٢٣٨٩١ - كَلْسِبُورَةُ الْوَيْلِيَّةِ ٥ ، لَصُوفُ الْوَيْلِيَّةِ ٥
شُحْرَانُ الْوَيْلِيَّةِ ٥

Calospora vanillae, *Gloeosporium vanillae* (S). *Anthraxnose de la vanille* (F).
فطر مجهرى يركب اوراق وممار الويلية فيقطعها ويذوبها .
مظهره الخارجى على الاوراق فقط سمر توشم صفحة النصل
البيا فتعطب النسيج وتمرقل وتلف اللجسموري . وهو على
المبار قروح صغيرة مستديرة فحمية اللون تمسب القرن
في احد طرفيه او في وسطه فتسبب ذبوله وسقوطه || يكافح
فور ظهوره على الادواق لمحلول بورود المركز من ١
الى ١٥ ٪

٢٣٨٩٢ - كَلْسُومُ ٥
Callistemon (S). *Callistème* (F). *Callistemon* (E).

جنس اشجار وجنبات معمرة من فصيلة الاريات . انواعها
المعروفة عديدة ، منها فسيح الاجزاء ، يمتد من الشرق
الاسوط والاقصى الى امريكا واوراقها استرالية || سرفها تملو من
مترين الى سبعة اثمار . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متقاربة ،
منعقة . نصلها ستانية ، جامدة ، ازدهارها سنبل التجميع .
ازهارها مختلفة الخصب والعرف || اعرف انواعها واشهرها ،
التالية :

٢٣٨٩٣ - كَلْسُومُ أَيْنِ ٥

Callistemon speciosa (S). *Callistème élégant* (F).
نوع من الكلسوم . يثيرته تملو نحو سبعة اثار .
أغصانها وأفانها وأفانها حمر اللون . اوراقها تملو نحو
١٠ سم . نصلها فواحة العرف الطري ، خلية البشرة
في اول عودها . سنابلها الزهرية قرمزية اللون . مياس ازهاره
الى الصفار المايح الجميل || تنويره يستمر من آذار الى
حزيران

٢٣٨٩٠ - كَلْبَم ٥
Géophyte (F). *Geophyte* (E).
كل نبات تكون أعضاء كائنه المائية مدفونة في التراب
كالباتبات السقولية والدوفصية والبصلية .

٢٣٨٩١ - كَلْبَمُ * ٥ ، لِسَانُ الْمَزْمَارِ

Salpiglossis (S). *Salpiglosse* (F). *Painted tongue*, *Valvet flower* (E). *Trompetenzunge* (D). *Salpiglossa* (I).
جنس نباتات عشبية حولية ثريينية من فصيلة الباذنجانيات.
انواعها المعروفة خمسة اما عروبه فكثيرة العدد جميعها زياه
الاعضاء لزجة . سرفها فراء منتصبه تملو من ٤٠ الى
١٢٠ سم . اوراقها منعقة اهلجية ذرية . ازهارها قمية
الشكل ، كبيرة ، القد تملو من ٤ الى ٦ سم . اقلام مدقاتها
مبطلة . ألوانها عديدة تختلف مع الصروب منها الاصفر
والاحمر والازرق والبنفسجي والايض والموشح والمنسج
والمرقط || ازدهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٣٨٩٢ - كَلْبَخ ٥
Férule commun (F).
هي القنة المبذولة ، اطبلها .

٢٣٨٩٣ - كَلْدُ ٥
Cumuler (F). *To accumulate* (E).
كالد الشيء : جمعه وجمل بعضه على بعض .

٢٣٨٩٤ - كَلْدَةً ٥
Terrain dur et compact (F).
هي التربة الصلبة المنعجة .

٢٣٨٩٥ - كَلْدُودَةُ مَبْدُودَةٍ ٥

Eupithecia vulgata (S). *Eupithécie vulgaire* (F).
Eupithecia vulgata (E).
حشرة مبدولة من الريفات حرشيات الاجنحة . مطبها
معظم الاصقاع المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى الى
اروبه . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفها
خاضعة قوتها اوراق الصيرانيات والشفويات والمركبات
جسمها صغير قضيض يطول نحو ٨ م . بسطها نحو ٢١ م .
رأسها حنطى اللون . عينها صغيرتان . زبانها مشطيان
عند الذكر ، غيطيان عند الانثى . جوشها وبطنها الى
الحنطى الاكلف الموج || رواشها ، عند الشقين ، الى
الحنطى الاكلف تملو في الزوج الامامي بقجتان ونقطة
مستطيلة الى البني الاسمر الموج وسبع نقط بنية في الحثار
الخارجي . تملو في الزوج الخلفي مشعة بنية وسبع نقط
صغيرة تتأخم الحثار || لها جبل واحد في الحول . تظهر
الفراشة في نيسان وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح
من العصر الى فحة الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة
اسابيع وتتبع المكان مباحداً على الصفحات السفلى من
نصل الاوراق || السرعة تملو نحو ١٩ م . جسمها شبه
وشمي الشكل . ثوبها الى الخضار الزيتي تملو رقشة غبراء
وسط بجي قالب اسمر وقسمه خطوط جانبية وردية . رأسها
اسود . رواجها البطنية الوسطى ماسحة مما يجعلها تنقوس
عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٦٠
يوماً ينتهي في الجلالة او بين فروع النبات التي تلاس
التربة ضمن جراب مخرومي الشكل يتفلق عند انطلاق
الفراشة .



كَلْم



كَلْدُودَةُ مَبْدُودَةٍ



كَلْسُومَةُ مَاكِرَةِ

٢٣٨٩٦ - كَلْسُومَةُ ٥
Calosoma (S). *Calosome* (F).
جنس خنافس نافعة من فصيلة السلكوتيات . انواعها
عديدة تقتلك بيض الحشرات الضارة .

كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا

والاستوائية || معظم انواعها اشباح حولية او معمرة ، بعضها بري والبعض الآخر تزييني . اكثر انواعها زياه السماء خلية الوراق . ازهارها رؤسية ، عديدة الالوان . تنويرها ربيعي وصيفي || اشهر اجناسها الكلسير والطاعة والقلادة .

٢٣٩٠٢ - كَلْسْتُوم

Calcium عنصر فلزي غير اللون ، لين الجسم ، ثنائي التكافؤ . رمزه (Ca-ك) وزنه الذري ٤٠.٠٨ ينصهر في ٨١٠°مغ ويغلي في ١٤٨٧°مغ . وهو من الاجسام الشرفة التي تمتص الماء والغازات || يوجد في الطبيعة مركباً من بعض العناصر اهمها اكسيد الكلسيوم او الكلس الحلي . ثم كربونات الكلسيوم وهو ملح ابيض يوجد في الطبيعة على هيئة رخام او طباشير او جص . ثم كبريتات الكلسيوم الموجود في الطبيعة على هيئة حصى ومرس . ثم فسفات الكلسيوم الذي يعتبر المادة الرئيسية في تكوين العظام وفي تكوين الاسجة النباتية .

٢٣٩٠٣ - كَلْسُفِين ، كَلْسُفِين ، سُوْرْتَجِين

Colchicine (F). Colchicin (E). مادة قلوية بلورية متياسرة تستخرج من سورجان الحريف تقل عند ١٤٥°مغ . تلوب في الماء البارد والكحول والكلوروفورم .

٢٣٩٠٤ - كَلْع

Crevasses (F). Chaps (E). قش صفى يحصل في جلد اسراع الدواب .

٢٣٩٠٥ - كَلْف

Macule du soleil (F). Sun-spot, Macula (E).

٢٣٩٠٦ - كَلْفَانُومِيْر

Galvanomètre (F). Galvanometer (E). مقياس القوة الكهربائية اي شدة التيار .

٢٣٩٠٧ - كَلْفَةُ

Phyllosticta (S). جنس فطور مجهرية من الفصليات . بكتيدات فمية التجميع تنشأ تحت ادمة النصل ثم ترق الى السطح . اشكالها متعددة ، الوانها عابكة ، مقه واضع الازتكار ، شفراتها بسيطة ، قصيرة وشغافة || يركب الوراق فيوشم نسيجهما ويؤذيها || انواعه عديدة . اغمرها ما يتبع .

٢٣٩٠٨ - كَلْفَةُ الْاِسْبَانِج

Phyllosticta spinaciae (S). فطر مجهرى يركب اوراق الاسبانج فيلذوها . مظهره الخارجي يقع كبيرة مستطيلة تملو نصل الوراق . تبدو حنطية اللون ثم غبراء ، تسب ذبول النسيج ويابه . يكلفها باقتطاع الوراق المصابة عند ظهور الومص .

٢٣٩٠٩ - كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا *

Phyllosticta fusiformis (S). فطر مجهرى يصيب اوراق الاكيدنيا . مظهره الخارجي بنور مستدير فطرها نحو ٣ م . تركب النصل على صفحته العليا . تبدو حراء اللون ثم سمراء || بكتيدات حكاكية ، قياسها نحو ٣٠٠ × ٨٠ ميكرون . شفراتها نغفية الجسم . يوفغاته مستطيلة قياسها نحو ٤×٩ ميكرون || يمري الاجشجار الضعيفة دون سواها . لذلك يجدر الاعتناء بالتسميد .

٢٣٨٩٤ - كَلْسْتُوم جَامِدِ الْوَرَق *

Callistemon rigida (S). Callistème rigide (F). نوع من الكلسيوم . جنبته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها ضيقة ، جامدة ، ذرية ، تطلو من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ م . || سنبها الزهرية حراء اللون ، قريزية الموج || تنويرها يستمر من ايار الى تموز

٢٣٨٩٥ - كَلْسْتُوم سَنَافِي ، الْوَرَق *

Callistemon lanceolata (S). Callistème à feuilles lancéolées (F). نوع من الكلسيوم . جنبته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه سنانية ، ضيقة ، تطلو نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٨ م . نصلها جلدية ، حراء اللون في اول عهدها ثم خضراء . سنبها الزهرية الى الحمرة الدودية || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٦ - كَلْسْتُوم فَصْفَانِي الْوَرَق *

Callistemon saligna (S). Callistème à feuilles de saule (F). نوع من الكلسيوم . تجرته تملو نحو ستة امتار . اوراقها سنانية تطلو نحو ٨ م . وتعرض نحو ٢ م . نصلها جامدة ، مبيضة الغدد الدهنية العطرة . سنبها الزهرية صفراء اللون . ازهارها شديدة الصغر || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٧ - كَلْسْتُوم صَوْبَرِي الْوَرَق *

Callistemon pinifolia (S). Callistème à feuilles de pin (F). نوع من الكلسيوم . جنبته صغيرة القد ، تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابرية كأوراق الصنوبر . سنبها الزهرية كثيفة التجميع ، لونها الى الخضار الاصفر الموج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٨ - كَلْسِي ، جِيْرِي ، جِصِّي

Calcaire (F). Calcareous (E). ما كان جصي التركيب او ما كانت تغطي على تركيبه مادة الجص .

٢٣٨٩٩ - كَلْسِيْت *


Calcite (F). Calcite, Calc-spar (E). كربونات الكلسيوم الطبيعي المتبلور .

٢٣٩٠٠ - كَلْسِير

Calycera (S). Calycère (F). جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية او معمرة من فصيلة الكلسيريات . انواعه المروفة قليلة البد ، منبها الطوي بعض اسحاق البلاد الحارة ، اغصها الشيل والبيرد || سوفها غفائية وبرية متكاثفة الرطب . اوراقها صفيرة ، سنانية النصال الخلفية او المرطاب . ازهارها وويبية متراكبة التلات يكثر فيها الاحمر ثم الوردى فالازرق || تنويرها ربيعي .

٢٣٩٠١ - كَلْسِيرِيَّات *

Calyceraceae (S). Calycéracées (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . تربتها بين المركبات والديسميات . اجناسها وانواعها المروفة متوسطة العدد ، منبها بعض اسحاق البلاد الحارة



كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا

عديدة، مبعثرة، قصيرة، سوداء اللون. بويغاته بيضيه شفافة، قياسها ٢×٥ ميكرون .

٢٣٩١٦ - كَلْفَةُ عَابِقَةٍ *

Phyllosticta congesta (S). Blotch du prunier (F). Plum blotch (E).

وصم يصيب الخوخ سببه فطر مجهري يركب الأوراق واللحاء || مظهره على الأوراق يقع صغيرة تقشق النصل، تبدو حطية ثم طحلاء وأخيراً قضيبة اللون || وهو على الثآليل يقع قرحية مستديرة لونها إلى السمرة يكتنفها إطار مهدب || يكافح مكانة كلفة التفاح. وبهم من فضل الفوطير غير المرتكزة على النحاس .

٢٣٩١٧ - كَلْفَنَ - *Galvaniser* (F). To galvanize (E).

٢٣٩١٨ - كَلْفَنَة ، كَلْفَنَ - *Galvanisme* (F). *Galvanism* (E).

٢٣٩١٩ - كَلْفَنِي - *Galvanique* (F). *Galvanic* (E).

٢٣٩٢٠ - كَلْفَسَة - *Putois* (F). هي ابن عرس ، أطلبه .

٢٣٩٢١ - كَلْمَار - *Calmar* (F). *Calamary* (E).

جنس حيوانات بحرية مقرنة من الرخويات رأسيات الأرجل . أنواعه المعروفة عديدة . أعطانها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والهندى || أجسامها شبه أسطوانية الشكل متباينة الاحجام التي تطول من ٥٠ إلى ٣٠٠ سم. وبها نوع جبار يبلغ طوله نحو ٧٥٠ سم. جميعها عشارية الجرامز المستطيلة ، العادمة الفاصل المنبهة بكتل من المهاجر تمكثها من القبش على صيدها || قوتها الاسماك والقشريات

٢٣٩٢٢ - كَلْمَبُولِيَّات * - *Collemboles* (F). هي الكهليليات ، اطلها .

٢٣٩٢٣ - كَلْمَكَانِيَّة * - *Ubiquité* (F). *Ubiquity* (E).

الكلمكانية الوجود في كل مكان وفي آن واحد .

٢٣٩٢٤ - كَلْمِيدَة * - *Chlamydospore* (F).

اسم يطلق على بوغ بعض الفطور التي تتميز بارتكازها الطرفي. ولكنكيد يعتبر من البوغ المتخدر الذي لا ينشئ قبل انقضاء زمن بيانه .

٢٣٩٢٥ - كَلَنْثِيَّاس * - *Callanthias* (S).

Callanthias (F). جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وعضلية الفريخيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد المتدلة الحرارة | اجسامها رشيقة تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم. زعانفها الظهرية مستطيلة مقعولة . زعانفها الذيلية فارقة دقيقة الاطراف . اثوابها اقراوش من الشقعة الصنانية الى الوردي . ظهورها اعقب لونا من بطونها || لحومها مأكولة جيدة الصنف .

٢٣٩٢٦ - كَلَنْدَرِين * - *Calandrinia* (S).

Calandrine, *Calandrinie* (F). جنس نباتات عشبية حولية بعمره من فصيلة الرجليات . انواعه قليلة جميعها تزيينية اعطانها البلاد الامريكية الشمالية

٢٣٩١٠ - كَلْفَةُ التَّبَغ * ، فِلُتُوسْتِيكَ نِيكُولِيَّانَا

Phyllosticta nicotianae (S).

فطر مجهري من الصنفيات، بكتنيده خضيه التجميع نشأ تحت ادمة النصل ثم رقى الى السطح . مقه واضح الارتكاز شفرته بضيئة التركيب ، قصيرة القد ، شفافة || يركب اوراق التبغ فيوشم وثن النصل يقع مستديرة لاقياسه براوح قطرها من ١ الى ١٠ م. تبدو صنانية اللون وتستقر على الخشلي الاسمر || اغماره زيدة لا تستوجب العناية .

٢٣٩١١ - كَلْفَةُ التَّفَاح * - *Phyllosticta solitaria* (S). Blotch du pommier (F). Apple blotch (E).

فطر مجهري يصيب التفاح في اوراقه وافناده ومغاره . مظهره الخارجي على الأوراق يقع صغيرة عديدة مقرنة الزوايا، غبراء أو مغراء اللون، تركيب النصل فتقشي على نسجه الادمية || وهو على الافناده قروح مستديرة أو مستطيلة طولا نحو ٣ سم. لونها الى الجؤرة تركيب البعاء كقتيب جفافه وانصداع بشرته || وهو على الثآليل يقع لاقياسية الشكل والحجم ، لونها الى السمرة يكتنفها إطار اخر ، تتسع مع حجم الثمرة فيبلغ قطرها نحو ١٠ م. || يكافح باستمال سائل يورده المحلول ٠,٦٪ حيث تنضج الاشجار على ثلاث مرات ، الاول بعد سقوط التويجات الزهرية ياسويين ، والثانية بعد الاول بثلاثة اسابيع ، والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع || وبهم من استعمل سائل يورده الحادي ٠,٤٪ من سلفات النحاس مع ٠,٨٪ من الكلس .

٢٣٩١٢ - كَلْفَةُ المَخُوح * - *Phyllosticta prunicola* (S).

وصم يصيب المخوخ والاجاص سببه فطر مجهري يركب الارراق فيعطبا ويقودها الى الاعمال الباكرا || مظهره الخارجي بثور مستديرة او بيضيه الشكل تملو النصل على صفحته العليا . تبدو حطية اللون ، وماء المحور ، بنفسجية الاطار || يظهر في اوائل آب ويعمل الاوراق في اوائل تشرين .

٢٣٩١٣ - كَلْفَةُ الزَيْتُون * - *Phyllosticta oleae* (S).

فطر مجهري يمتري الزيتون بارواقه الفتية فيؤذيها بعض الشيء || مظهره الخارجي بثور مستديرة قطرها نحو ١ م. تركيب النصل على صفحته العليا . تبدو حطية اللون ثم غبراء يحيطها إطار اسمر || بكتنيده عكازية الشكل ، شفافة، قياسها ٣×٣,٥ ميكرون || لا يستوجب المكافحة نظراً لقلّة اذاه .

٢٣٩١٤ - كَلْفَةُ السِّيَم * - *Phyllosticta antirrhini* (S).

فطر مجهري يصيب السيم في اوراقه وفروعه . مظهره الخارجي ، على الاوراق ، بثور مستديرة قطرها من ١ الى ٢ م. لونها الى الصهبة يكتنفها إطار اخر || وهو على الفروع يقع قرحية لونها الى الجؤرة السمره || بكتنيده غليظة ، لاقياسية التجميع ، قياسها نحو ١٠٠ ميكرون ، بويغاته مستطيلة قياسها ٢×٥ ميكرون .

٢٣٩١٥ - كَلْفَةُ الصَلْبِيَّات * - *Phyllosticta brassicae* (S).

فطر مجهري يصيب نباتات الفصيلة الصليبية . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٨ م. تركيب النصل الاوراق ، تبدو فاقمة الخضار ثم غبراء اللون || بكتنيدها



كلفة التبغ



كلفة الخوخ



كلفة عابقة



كلثياس



كلنكو

والجنينة . اوراقها متعاقبة . ازهارها جملة الشكل ، زاهية الالوان ، لاثامية التجميع والارتكاز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣٢٢٧ - كلندين خيمية

(F). *Calandrinia umbellata* (S). *Calandrinia en ombelle* (F). جملة تزيينية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . ساقها فناء جزئية اللون . فروصها فائشة . اوراقها صغيرة ضيقة تطول نحو ٢ سم . نصلها خلي البشرة على صفحتي . ازهارها صغيرة التجميع ، تاحية الارتكاز ، كثيرة العدد ، صفيرة القذ ، حراء اللون ، بنفسجية الموالج || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٣٢٢٨ - كلندين زخيفية

(F). *Calandrinia discolor* (S). *Calandrine discolor*, C. *élégante* (F). جملة تزيينية معمرة تملو نحو ٨٠ سم . ساقها منتصبه فراء . اوراقها ملعقة مقطوعة ، نصلها بحري الصفحة العليا ، احمر السفلى . ازهارها عقنودية التجميع ، كبيرة القذ ، قطرها براوح من ٤ الى ٦ سم . لونها الى البنفسجي الازرق الموالج . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٣٢٢٩ - كلندين فاخرة

(S). *Calandrinia spectabilis* (S). *Calandrine remarquable* (F). عشية تزيينية حولية تملو نحو ٦٠ سم . ساقها منتصبه فراء . اوراقها معينة الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم . نصلها بحري اللون جامد الصفحة . ازهارها عقنودية التجميع ، كبيرة القذ ، قطرها براوح من ٥ الى ٧ سم . لونها الى الازرق الموش والمضلع بالاسود || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٣٢٣٠ - كلندين كبيرة الزهر

(S). *Calandrinia grandiflora* (S). *Calandrine à grandes fleurs* (F). جملة تزيينية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها منتصبه فراء . اوراقها بيضيه ذرية تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض نحو ٨ سم . نصلها اخضر اللون ، سميك الصفحة . ازهارها كبيرة القذ نورية التجميع ، محورية الارتكاز ، قطرها براوح من ٤ الى ٦ سم . لونها الى الودي الموش بالاصفر والاسود || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٣٢٣١ - كلندين متزي

(S). *Calandrinia menziesii* (S). *Calandrine de Menzies* (F). عشية تزيينية حولية منتبسة . ساقها تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها السفلى ملعقة الشكل تطول نحو ٨ سم . اوراقها العليا سانية ضيقة . جميعها مالة النصل الاخضر . ازهارها عقنودية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية ، صفيرة القذ ، ارجوانية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٢٣٢ - كلندينليات

(F). *Calandrinia* (E). بسيط من فصيلة الرجليات يشمل بعض الاجناس والانواع . نباتاته عشية او مجلية وبنجينة . معظمها امريكي المنبت . ازهارها خشوية . ثمارها جراء ثلاثية الفلق .

٢٣٢٣٣ - كلنكو

(F). *Kalanchoe* (F). *Kalanchoe* (E). جنس نباتات طيبة معمرة من فصيلة الخلدات . انواعه نحو

٢٣٢٣٤ - كلنوس

(S). *Calanus* (F). *Calanus* (E).

دوبية بحرية من القشريات مجذافات الارجل وفصيلة الكلنوسيات || جسمها صغير الجرم ، شبه غروفي الشكل مستعرض الصدر ، وريد العين ، عديم الحواف || تعيش على الطلوح . جماعتها وافر العدد .

٢٣٢٣٥ - كلنوسيات

(S). *Calanidae* (F). *Calanidae* (E).

فصيلة دوبيات مائية من القشريات مجذافات الارجل . اجناسها قليلة العدد اما انواعها لكثيرة ، معظمها بحري يعيش في مختلف بحار العالم وبعضها بحري يعيش في الانهر والبحيرات والمناطق .

٢٣٢٣٦ - كلوة ، كلية ، حقو

(E). *Rein* (F). *Kidney* (E).

عضو في الجسم كلوي الشكل يفرز البول . هما كلتان او سقوان مركزهما من جانبي السلسلة الفقرية .

٢٣٢٣٧ - كلوة الماء ، لاجم الضفدع

(S). *Hydrocharis morsus-ranae* (S). *Hydrocharis*, *Hydrocharide*, *Morrène*, *Mors de grenouille* (F). *Frog-bit*, *Frogs-bit* (E). *Echter Froschbiss* (D). *Favagello di chiana*, *Morso di rana* (I).

نبات عشية بري مائي معمر وصيد الجنس والوتع من فصيلة كلويات الماء . يعيش في المياه الراكنة وتزين بها الاحواض . سوقه سلبية متقاربة القذ . جلوه صفية التجميع تنشب من القذ . اوراقه مستطيلة الاضلاع كلوية الشكل تطول وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها سميك الصفحة اخضر اللون . ازهاره ثلاثية الفلج والبسات البيضاء || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٢٣٨ - كلور

(E). *Chlore* (F). *Chlorine* (E). غاز سام اقل من الهواء لونه الى اخضر الزيتي . رائحته محرقة تثير السعال . وزنه الاتوني ٣٥.٤٦ رمزه (كل Cl) || يوجد في الطبيعة مختلطاً بغيره من العناصر المختلفة اخصها ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) وهو يتميز بجملة الشدي الى الاتحاد بالفلزات والالافزات . يتبر من المظهرات المشهورة يستعمل في تطهير مياه الشرب . كما انه يستخدم في اغراض ثي اهمها تبييض للمنسوجات القطنية والكتانية وصناعة قابيل الغازات السامة .

٢٣٢٣٩ - كلوروس

(S). *Chlorops* (S). ذباب اسفر اللون يعرف بخضراء العين ، راجع خزياء .

٢٣٢٤٠ - كلوروبلست

(E). *Chloroplaste* (S). جسمات الخلايا النباتية الملونة بالمخضف والتي يتركز عليها التمثيل الخفصبي .

٢٣٢٤١ - كلوروفرم

(F). *Chloroforme* (F). *Chloroform* (E). سائل عادم اللون اثره الرائحة يتبع عن الكلور مع الكحول يستعمل في الطب كمنج يخذل الاعصاب .



كلوة الماء

كيرثان. زباناها صولجانيان. جوشنها الى الطحلة الرصاصية الزرقاء المواج. بطنها اصغر القوب اسمر المواج || رواشتها، عند الشقين، الى الخططي الاسمر الاسفع المواج يملو في الزوج الخلفي حثار ضيق اغبر وتنفوذا حنطية تبدو كزوائد نودلية الشكل || لها جويلان في الحول. تظهر فراشة الجليل الاول في مطلع نيسان وتظهر فراشة الجليل الثاني في تموز. تعاقل بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتص المكن ميحاديا على الصفحات السفلى من نصال الماعل || السرعة تطول نحو ١٤ م. جسمها مستطيل البسط، مستدق المقدم والمؤخر، كسني اللون يملو غطان جانبيين اصفران وعشرة اطواق جزوية. اما الطوق الصدري الاول فأسود كالرأس. مدنها ورواجها الى السمة || طور الاكمال الذي يستمر في الجليل الاول نحو ١٥ يوما وينتقص معلقا بافنان النبات، يستمر في الجليل الثاني نحو ٣٠ اسبوعا.

Kaloula (S). **كلولة** ٢٣٩٥٠
Kaloula (F). Kaloula (E).

جنس ضفادع قازية من فصيلة الرزانيات. انواعها المرفوقة حسة. موطنها الهند والصين وماليزية والفلبين || اجسامها مستدلة القد أو صغيرة. تتميز باصابعها الممددة المجهزة بمحاجر طرفية. حطائها قليل الانبساط تمتد حتى اوائل الزام الثاني من الاصابح || انوثاها السائلة الى السمة الزيتية يملوها تبغيع اشهب اسمر ورقعة حنطية تمتد من مؤخر الرؤوس الى اطراف القوائم.

Collomia (S). **كلوميّة** ٢٣٩٥١
Collomie (F). Collomia, Queen Ann's thimble (E). Blumenschleimame (D). Collomia (I).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القبياس. انواعها قليلة، سوقها واوراقها زياء لينة. ازهارها رويسية كثيفة التجميع. يستخرج من بزورها غراء نباتي يدخل في عدة تركيب || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

Collomia coccinea (S). **كلوميّة أزجوانيّة** ٢٣٩٥٢
Collomie écarlate (F).
عشبة زرينية سبروتية تملو نحو ٥٠ سم. ساقها قليلة الفروع، زياء اللحاء. اوراقها بيضيه مستطيلة، نصلها ثلاثي او رباعي التشرع القدي. رويساتها الزهرية متوسطة القد. ازهارها حر الابواق صفر الاناياب || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

Collomia grandiflora (S). **كلوميّة كبيرة الزهر** ٢٣٩٥٣
Collomie à grandes fleurs (F).
عشبة زرينية سبروتية تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم. ساقها فراء. اوراقها سنانية ضيقة تطول من ٤ الى ٥ سم. وتعرض من ٥ الى ١٠ م. نصلها خيل البثرة. رويساتها الزهرية كبيرة القد. ازهارها مستطيلة، كؤوسها سننة الحافة، توجعها تظهر صفراء اللون ثم تنحرف، مع الادراك، الى الحمرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين.

Hydrocharidae (S). **كلوريات الماء** ٢٣٩٥٤
Hydrocharidae (F). Hydrocharidae (E).
فصيلة نباتات مائية من فصيلة الغلقة. اجناسها وانواعها عديدة. اعرف اجناسها الاقطنان والطورق وكلفة الماء ووش الماء.

٢٣٩٤٢ - **كلوريدات ، هيدروكلورات**
Chlorhydrate (F). Hydrochlorate (E).
هو ملح الخافض الكلوريديني.

٢٣٩٤٣ - **كلوريد هـ***
Chloridea (S). Chloride (F).
جنس حشرات ضارة من فصيلة الزعقوقيات. انواعها ١٠ جميعها متوسطة القد خيفاس الجسم. مستطيلة القرون الاستشعارية الشاربه الفواصل. ألوانها زاهية. اتحادها مخددة يعترضها تجلديج وتسنيج. رقبتها خاضلة أو ناهمة تركب بعض النباتات من مختلف الفصائل.

٢٣٩٤٤ - **كلوريد البوتاسيوم ، كلوريد البوتاس**
Chlorure de potassium (F). Chloride of potassium (E).
سماد بوتاسي يحوي من ٤٦ الى ٥٠ ٪ من البوتاس الصريف وهو ملح ابيض اللون يتميز بسرعة ذوبانه في الماء ويبيض انفعله وتركيبه في التربة.

٢٣٩٤٥ - **كلوريد الصوديوم ، كلوريد الصوديوم**
Chlorure de sodium (F). Chloride of sodium (E).
هو ملح الطعام المعروف.

٢٣٩٤٦ - **كلوريل هـ**
Chloreille (F).
جنس نباتات مائية من الخليات الخضر وحيدات الخلايا المجهريات. هيكلها كروي الشكل، قطرها نحو ٨ ميكرون. تعيش في المياه العذبة جماعات واقر العدد على المدارات والجذريات وغيرها || وهي وافرة المواد الغذائية اغصها البروتايين والفولوسيد والدم والفيتامينات والكثير من طفيف المتاصر || تكاثرها الصنعي في المحيط الملائم يعطي اجود النتائج. نتاجها الجاف واقر المواد الغذائية القيمة.

٢٣٩٤٧ - **كلوزيات**
Clusiaceae (S). Clusiaceae, Guttifères (F). Clusiaceae (E).
فصيلة نباتات من ذوات الفلقين عديدة القعالات سفلية الاسدية. اجناسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات سوقها منتصبة أو عارشة. اوراقها ابيدة جامدة النصل. ازهارها عشقودية التجميع، محورية الارتكاز أو تاجية. ثمارها نورية، ثمرورها جلدية، لبها غزير المصارة الراتنجية الصفراء اللون التي تصعب بنية بعد جفافها.

٢٣٩٤٨ - **كلوزيّة**
Clusia (S). Clusie, Clusier (F).
جنس نباتات عارشة متسلقة من فصيلة الكلوزيات. انواعها قليلة، سوقها تطول نحو ١٠ امتار تركب الاشجار الحرجية فتقتضي عليها || يستخرج من سوقها حليب اصفر اللون، دبق المادة الراتنجية، يستعمل في تلييب جروح الحيوانات اغصها الخليل والبقير.

٢٣٩٤٩ - **كتوفريس العوسج هـ***
Calliphrys rubi (S). Calliphrys des ronces (F). Calliphrys rubi (E).
حشرة من فصيلة اللقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرقها تعيش على العوسج واللوزاك والزان || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ م. يسقطها نحو ٢٨ م. رأسها معتدل الحجم. عينها



كلوريد هـ



كتوفريس العوسج

التجميع ، محورية الارتكاز أو تاجية . ثمارها عنبية لا مأكولة لأنها إلى الحمرة البنفسجية || أشهر أنواعها ما يلي .

٢٣٩٦٥ - كليكرتبه أرجوانية ٥

جنية ترينينية وفرة مهدا اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها بيضيه الشكل طول نحو ٧ سم . نصلها انخفض
الصفحة العليا ، ازغب السفل . عناقيدها الزهرية رطلة ،
أزهارها أرجوانية اللون زاحية || أزهارها يستمر طوال
شهر تموز .

٢٣٩٦٦ - كليكرتبه أمريكية ٥

جنية ترينينية رفعة مهدا أمريكا الشمالية . تملو من ١٠٠
الى ٢٠٠ سم . ساقها فراء . أوراقها مستطيلة الاعتناق ،
نصلها خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها تاجية . بنفسجية
اللون رطلة المناديد || أزهارها يستمر من حزيران الى
تموز .

٢٣٩٦٧ - كليكرتبه صينية ٥

جنية ترينينية جادة مهدا الصين . تملو من ١٠٠ الى
٢٠٠ سم . ساقها فراء . أوراقها طول من ٥ الى
١٠ سم . نصلها ازغب الصفحة السفل وفيه نجسي التركيب .
أزهارها تاجية كثيفة التجميع ودية اللون || أزهارها
يستمر طوال شهر تموز .

٢٣٩٦٨ - كليكرتبه يابانية ٥

جنية ترينينية سريرية مهدا اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها منقطة طول من ١٠ الى ١٥ سم . وتعرض من
٥ الى ٦ سم . نصلها لامع الصفحة العليا ، ازغب السفل ،
متباحه التستين المشاري . عناقيدها الزهرية صغيرة القد .
أزهارها ودية اللون || أزهارها يستمر من حزيران الى
تموز .

٢٣٩٦٩ - كليكنثس *

جنى جنات ترينينية سطرية من فصيلة الكليكنثوسيات .
أنواعه ستة . سوقها منتصبه تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم .
أوراقها كاملة متقابلة . أزهارها فردية ، محورية أو هامة
الارتكاز ، جملة الشكل ، جذورية اللون ، فواحة العرف
الطري الشبيه بالتفاح والشام .

٢٣٩٧٠ - كليكنثوسيات *

فصيلة نباتية من فوات الفلقين ، اجناسها وأزهارها عديدة .
نباتاتها أشجار وجنات . سوقها وفرةها مضلعة . أوراقها
متقابلة . أزهارها جملة الشكل ، عطرية العرف .

٢٣٩٧١ - كليمنيه * ، كليمنتيت

جنى حيوانات من الرغويات رأسيات الاجل رباعيات
الحياش وفصيلة الفلنياتيات . أنواعها المعروفة نحو ٤٠
جميعها من متحجرات الحقبة البليينية || اصدها قرصية
الشكل ، معتدلة القد . اخدودها القروي يستمر من القرفة
الى العقب .

٢٣٩٥٥ - كلى Cosses, Grandes tectrices (F).

من ريش جناح الطائر ما يكو قواعد الابار . والكل
قسان صغيرة وكبيرة . الصغيرة تلحف الكبيرة والكبيرة
تكو الابار .

٢٣٩٥٦ - كلىة Rein (F).

هي الكوة ، اطلبه .

٢٣٩٥٧ - كليترش * Callitrix (S).

جنس قردو امريكية من فصيلة السيبيات . انواعه ١٠
موطنها حوض الامازون . اجسامها رشيقة . رؤوسها
مستندرة . قوائمها متوسطة الطول . اذنانها كاسية معلقة لا
اخاذة . اثنائها قصيرة الشعر المتجاين الالوان || تألف
الاحراج والغابات . منزها الاشجار تنفتل بينها بخفة الطير .
قوتها التار والحشرات والمصابير .

٢٣٩٥٨ - كليش ازغب Clytus pollu (F).

هو الصملول الازغب ، اطلبه .

٢٣٩٥٩ - كليش اهيف Clytus étroit (F).

هو الصملول الاهيف ، اطلبه .

٢٣٩٦٠ - كليثوسيب ٥ Clitocybe

جنس فلور مؤدية من الفارغونيات مركب بمشبه القدي
الشكل اريوات واساخ وجذور بعض النباتات الزراعية
منها الموز والفواكه والكمية والكنيا والكروريه وقد تألف
ايضا ، في ظروف خاصة ، التفاح والمشش والقسط
والجهمزة والياسمين ٥ مشبه غزر المادة وافر القدد
المتشبه . يتركز بين الحاء والشكر او بين الجردة
والخشب فيعط الارضية والتنج على اختلافها ثم يقضي على
التبادل اللسني || يكالنج بقتلح الاشجار الموسومة وتطهير
التربة بالكلس الحراق .

٢٣٩٦١ - كليجة * Caliga (S).

جنس دوبيات بحرية من القشريات الدنيا وفصيلة
الكليجيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد . اجسامها
صغيرة ، وحيدة العين ، عادمة الحاف . تنطفل على
الاسماك .

٢٣٩٦٢ - كليجيات ٥ Caligidae (S).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات الدنيا مجذافيات
الاجل . اجناسها وأنواعها عديدة . جميعها طفيلية تعيش
على مختلف انواع الاسماك اغصها الفادسيات .

٢٣٩٦٣ - كليش ٥ Caliche (F).

هو ملح الشيل كما يستخرج من المناجم وهو يذى بعد
استصلاحه وتكريره نترات الشيل او نترات الصودا الطبيعي

٢٣٩٦٤ - كليكرتبه * Callcarpa (S).

Callcarpa (F). Beauty-berry, Mulberry (E).
Schönfrucht (D). Callcarpa (D).
جنس نباتات خنثية معمرة من فصيلة الساجيات . أنواعها
قليلة معظمها ترابي . أوراقها متقابلة اهليجية ، مستطيلة ،
مسنة الحافة ، غدية الصفحة السفل . أزهارها عنقودية



كليترش



كليجة



كليكرتبه



كليكنثس



كليمنيه

٢٣٩٨١ - كَمَّءُ اسْوَد * كُفْنُج

Tuber melanosporum (S). Truffe noire, T. de Périgord (F). Black truffle, French truffle (E). Echte Trüffel, Schwarze Trüffel (D). Tartufo nero (I).
نوع من الكم المأكول الجيد الصنف. درنته كبيرة القدح حجمها قدر البيضة الصغيرة. ثمولها بارزة لونها الى الصبغة. لبها ابيض اللون اسف المواج عند الادراك. تدرك في الخريف.

٢٣٩٨٢ - كَمَّءُ شَتْوِي * بَسَات الرَعْد

Tuber brumale, T. hiemale (S). Truffe d'hiver, T. hiemale (F). Winter truffle (E). Französische Trüffel (D). Tartufo brumale (I).
نوع من الكم المأكول المتوسط الصنف. درنته مستديرة حجمها حجم الجوزة. ثمولها الى السمرة السوداء. لبها احمر اللون يتحمل بتهكة خاصة. تدرك في الشتاء.

٢٣٩٨٣ - كَمَّاء Rabassier (F).

جامع الكرم.

٢٣٩٨٤ - كَمَّاء Truffe (F). Truffe (E).

واحدة الكرم.

٢٣٩٨٥ - كَمَّاء الماء Macre (F).

هي المكر، نبات من الاعديرات، اطليه.

٢٣٩٨٦ - كَمَّاح Préfloraison (F).

نشور اجزاء واعضاء الزهرة داخل الزمرة اي البرعمة الزهرية.

٢٣٩٨٧ - كَمَّاحة Frein (F).

هي الكياحة، راجعها.

٢٣٩٨٨ - كَمَّاح Pampination (F).

الكبح نومة براعم الكرم وانتشارها.

٢٣٩٨٩ - كَمَّاخة Protérante (F).

كلخ م كاخة. نمت تعريفي يطلق على كل نبات يزهر قبل ان يورق.

٢٣٩٩٠ - كَمَّاد رِيُوس Germandrée officinale (F).

هو الطوقيون الحزني ويدي ايضا حامادريوس.

٢٣٩٩١ - كَمَّاس Kemas (S).

Céma (F). Kemas (E).

جنس حيوانات لبونة عاشية بحيرة من فصيلة الابلات. انواعه المعروفة اربعة موطنها يمتد من الهند الى الصين وبشوروية. تألف الحفاب والجبال من ارتفاع ١٠٠٠ م. حتى ٢٧٠٠ م. عن سطح البحر. ملجئها احيائي جماعي. ايجالها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٩ اناثا || اجسامها قريبة الشبه باجسام الظباء كما وانها تشبه الحزى. قرونها صغيرة متتابة الحيد، مستدقة الاطراف المنحرفة الى الوراء. رؤوسها صغيرة ذلقة الاعظام. اعتاقها مستطيلة. قوائمها شديدة النشط. اثارها تختلف مع الانواع تكثر فيها السمرة الثابتة للماجات. فروع اناثا ثنائية الاخلاف. تحبل الاثنى يدمم نحو ستة اشهر تضع في تمامه بغفورا واحدا || اعرف انواعه واشهرها كاس غورال.

٢٣٩٩٢ - كَلْبُوب * Calliopes (S).

Calliope (F). Calliope (E).

طائر من الجالوم وفصيلة الشروريات. موطنه بعض المناطق الشرقية من القارة الاسيوية. ملجئها احيائي زوجي باستثناء زين القطار حيث يجمع الى اسراب وافرة العدد. يألف البراري والحراج. قوته الحشرات الصغيرة والبلور البرية || جسمه صغير القدح، قريب الشبه بالبع، طوله نحو ١٦ سم. ثوبه الى السمرة الزينية المتفاوتة الماجات. رأسه وجناحه اعين من رذاه. زوره احمر. منقاده مخروطي الشكل. ذنبه معتدل الجرم، مقطوم الطرف || يذئن عشه على ارتفاع ٢٥٠ او ٣٠٠ سم. عن سطح الارض. الاثنى تحضن بمنوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات.

٢٣٩٩٣ - كَلْبُوبَة Cléome (F).

هي الذفرة، اطلبها.

٢٣٩٩٤ - كَلْبُوبِم Buttage (F). Raisin, Mounding (E).

الكم ويدي التخييق هو جمع التراب عند سوق النبات. الغاية منه دم الساق وسحبها على انشاش الجذبرات وإبعاد الماء عنها وزيادة تعريض التربة الى اشعة الشمس، الخ.

٢٣٩٩٦ - كَمَّء، كَمَّء Périante (F). Perianth (E).

هو غلاف الزهرة اي جراج الكأس والتويج. وقد سمي كما لانه يستر ما ينشق عنه. ج اكمام وكمام وَاَكَة.

٢٣٩٩٧ - كَمَّء Tuber (S). Truffe (F). Truffe (E).

الواحدة كَمَّاء والمثنى كَمَّاتان والجمع كَمَّ وأكوه وكأت. جنس فطور درنية من الرقيات وفصيلة الكمثيات. تنبت وتتكاثر تحت الارض فتتفصها. غلافها جلدي اللسج ثولولي التركيب يحضن العدة التناسلية البوفية. لبها سردي التركيب جامد المادة || انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاجام والالوان اشهرها ما يتبع.

٢٣٩٩٨ - كَمَّء اَبِيَض Tuber hiemalbum, T. album (S). Truffe blanche (F).

White truffle, False truffle (E). Weiße Trüffel (D). Tartufo bianco, T. del Piemonte (I).
نوع من الكم المأكول المادي الصنف. درنته متوسطة القدح منخفضة الثمول. لبها ابيض اللون مسكي العرف. تدرك في الخريف.

٢٣٩٩٩ - كَمَّء اَحْمَر * مَغْرُود Tuber rufum (S). Truffe rouge (F). Red truffle (E).

Rote Trüffel (D). Tartufo rosso (I).
نوع من الكم المأكول الفاخر الصنف. درنته مستديرة مقطوبة المقامة. ثمولها ناشرة لونها الى الجؤوي الاسمر. لبها احمر اللون مستحب الطعم، تدرك في اواخر الخريف.

٢٣٩٨٠ - كَمَّء اَرْمَد * بَسَات اَوْبَر Tuber magnatum (S). Truffe magnat, T. grise (F).

Gray truffle (E). Lauch Trüffel (D). Tartufo bigio (I).
نوع من الكم المأكول المادي الصنف. درنته بيضوية الشكل مفلطحة، ثمولها مستديرة مبططة رمادية اللون. لبها اخضر. تدرك في الخريف.



كَلْبُوب



كَمَّء احمر



كَمَّء ابره



كَمَّء اسود



كَمَّء شتوي

* ٢٣٩٩٩ - كَمَالِيَّةُ الْبَرِّ *

Alchemilla arvensis (S). *Alchemille des champs*, *Perce-pierre des champs* (F). *Break-stone*, *Colic wort*, *Persley plert* (E). *Feldsinau*, *Steinbrech* (D). *Spacca pidra*, *Petricicolo* (I).
نوع من الكمالية تكثر في المراعي الجبلية .



كاشير

* ٢٤٠٠٠ - كَمَالِيَّةُ الْمُرُوجِ * ، كَمَالِيَّةُ مَبْدُولَة ،

Alchemilla vulgaris (S). *Alchemilla commune*, *Mantelet de dame*, *Pied de lion*, *Porte rosée* (F). *Great sanicle*, *Lady's mantle*, *Lion's foot* (E). *Löwenfuss*, *Mantelsinau*, *Sinau* (D). *Alchemilla comune*, *Ventaglina* (I).
نوع من الكمالية تكثر في المروج . أوراقها طليبة شاذية وموارة .



كالة

* ٢٤٠٠١ - كَمَالِيَّةُ فِضِيَّة *

Alchemilla argentea (S). *Alchemilla argentée*, *Satinée* (F). *Alpine lady's mantle* (E). *Alpensinau*, *Alpen-frauenmantel* (D). *Alchemilla alpina* (I).
نوع من الكمالية الممررة تكثر في أحرار الجبال العالية ، أوراقها خلية البشرة فضية اللون .



كالية البر

* ٢٤٠٠٣ - كِمَامَة ، مِفْطَمِيَّة

Muflière, *Muselière* (F). *Muzzle* (E).
أداة تلتف في الحيوان تنم عن الرضاعة والاكل والعص .



كالية فضية

كالية المروج

* ٢٤٠٠٢ - كِمَام . *Caveçon* (F). *Headstall*, *Curb* (E).
ما يكس به فم الحيوان .

* ٢٤٠٠٤ - كَمْبَرِي

Cambrien (F). *Cambrian* (E).
اسم يطلق على الحفنة الأولى من الإايح القديم . ويقال العصر الكمبري والحفنة الكمبرية ، وهي تتميز بأحواشها على أقدم عظم الكرة الأرضية .

* ٢٤٠٠٥ - كَمْبُود *

Campodea (S). *Campode* (F). *Campodea* (E).

جنس حشرات دامت من فصيلة الكمبوديات ورتبة لاطئات المتك . أنواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || أجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، متعدلة التبيط ، مبدرة الحلب اللينق الناعم ، تطول من ٤ إلى ٦ م . ألوانها أبيض البياض اللينق ، رؤوسها شبه مكورة . مناكها لاططة . قربها الاستشارية خيطية . عيونها شديدة الصغر . صدرها ثلاثية الحلقات . بطونها عشارية السكر ، قصبة ، أي سرية السطب . قوائمها نحلة . أرساغها ثنائية العقل . أسراكها دقيقة مستطيلة || يكثر وجودها تحت الحجارة وفي المواقع الرطبة . قوتها المواد النباتية المتحللة .

* ٢٤٠٠٦ - كَمْبُودِيَات *

Campodeidae (S). *Campodeidés* (F). *Campodeidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة لاطئات المتك . أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة البدن ، منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتعدلة الحرارة || أجسامها صغيرة ، قصبة ، بياض اللون . عيونها شديدة الصغر . قوائمها شاذية الشكل الأولى أصغر من الثانية والثالثة . بطونها عشارية السكر . قوياتها الأولى مجهزة بزوائف حوصليية تنفسية . سكرها الثانية والسابعة مجهزة بمرارد صغيرة . أطرافها الشرجية ثنائية الأسراك || أعرف أجناسها الكمبيو .



كمبود

* ٢٣٩٩٢ - كِمَاسُ غُورَال *

Kemas goral (S). *Céma goral* (F).

نوع من الكماس . موطنه يمتد من كمشير إلى بربانية وأصام . يألف الوعر والمواقع الكثيرة الصخور . يسرح من الصبح إلى نحو الساعة الثامنة ومن العصر إلى فحة الليل || جسمه ربعة بطول نحو ١٣٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه نحو ٨٠ سم . وزنه نحو ٧٥ كيلو . قوته بطول نحو ١٨ سم . عند الذكر ونحو ١٤ سم . عند الأنثى . رأسه صغير الجرم ، ذلق الحطم . عيناه كيرتان مكشلتان ومطوختان بخار اصهر . أذناه صغرتان مستطيلتان الشكل . قوائمها شديدة النشط . ثوبه إلى السرة الحمراء المواج يبق في الرأس والظهر ويتحول تدريجياً إلى الشقعة في الصدر والبطن || أجله يعد ثمة انفار ، ذكر مانع وأربع اثاث وأربعة شواذن .

* ٢٣٩٩٣ - كَمَاسِيَا

Camassia (F).
هي الكش من الزنايق ، اطليه .

* ٢٣٩٩٤ - كَمَاش *

Polycarpaea (S). *Polycarpée* (F).

جنس نباتات عشبية حولية ويسمرة من فصيلة النبنانيات . أنواعه المعروفة عديدة منبتها معظم الاصقاع الحارة من العالم القديم || سوقها مستقلة متعادية القروع . أوراقها متقابلة رحيمة التصال . أزهارها خاسية البتلات والسبال الفصيلة الحادة الأطراف . لونها إلى البياض الاعصر المواج .

* ٢٣٩٩٥ - كَمَاشِير *

Athamanta macedonica (S). *Athamante*, *Ache des rochers*, *Persil de Macédoine* (F). *Macedonian parsley* (E). *Macedonische Petersilie* (D). *Prezemolo di Macedonia* (I).
نبات عشبي بري ممر ميلول من فصيلة الحميات . أوراقه مفروقة ومشرقة نصلها خلى البشرة على صفحتين . أزهاره صيوانية وردية اللون . يقال أنه طلي يستعمل في معالجة الموارض المعوية .

* ٢٣٩٩٦ - كَمَافِطُوس

قال الانطاكي « هو الحامايطس يعني صنوبر الارض ثبت كمي » العالم الصغير في تقتيل أوراقه وامتلائها بالارطوية وزيادتها له زهر أصفر يخلف حياً أصفر من زر الكركس ابيض الاصول مر الطلم يفتح السدد ويدر ويؤزل الرياح ويوجاع الطهر والمفاصل » .

* ٢٣٩٩٧ - كَمَالَة *

Echinus Phillipensis (S). *Kamala* (F).

جنية زراعية معمرة من فصيلة الليتوسيات . مهدها الهند . ساقها فراع . أوراقها منقطة ، متعاقبة ، بضية التصل المذهب الطرف . أزهارها عقودي التجميع تأتي الأريكار . ثمارها بلوطية الشكل تغلفها ثمل دقيقة تتحول إلى غبار يرتقالي اللون حنطي المراج يستعمل في صباغ الالفة الخيرية ويستعمل أيضاً لطرد البودرة الوحيدة . النشمة منه تزوح من غرامين إلى ١٢ غراماً وذلك بالنسبة إلى عمر المرو .

* ٢٣٩٩٨ - كَمَالِيَّة

Alchemilla (S). *Alchemilla*, *Alchimilla* (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الورديات . أنواعه قليلة منها الحولية والممررة تكثر في المراعي والأجراح الجبلية . يحزن إليها بعض الحواس الطليبة ويقولون أنها شاذية وتؤثر اغشية البكرة فتفقد الزوايق فقدت كينهن .

بعض الاصناف الامريكية اخصها كليفورني والمكسيك ||
جسمه كبير القد . طوله نحو ٧٠ سم . ويسطه نحو
١٠٠ سم . ثوبه الى السواد اللامع . جناحاه مبلقان
بالابيض . صدقة عينه الى الصفار الذهبي . منقاده وساقاه
واصابعه الى الزرقه الطحلاء || اخلاقه رضية لكنه يتجنب
الانسان ويبتعد عن الممران . يتسلق جنوع الاشجار
قفراً . طيرانه طويل الشوط كثير التجمعات والسيف ||
قوته الحشرات على اختلاف فصائلها واجناسها ثم الاتحار
البرية والبلوط || يعيش ذكراً وانثى لا يفرقها سوى الموت .
يدثن عشه في تجاويف الاشجار الرقيقة . الانثى تبيض
من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي
يؤن لها الغذاء .

٢٤٠١٩ - كمفيل اميري *

Campephilus principalis (S).
Campephilus princier (F).

نوع من الكمفيل موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية من
فلوريدا الى كاريولينا والتكساس || جسمه كبير القد
طوله نحو ٥٨ سم . ويسطه نحو ٨٢ سم . ثوبه الى السواد
اللامع . جناحاه وعلاطاه عتقه مبلقة بالابيض . صدقة
عينه الى الصفار الذهبي . منقاده عاجي اللون . ساقاه
واصابعه الى الزرقه || اخلاقه خنية لكنه كثير الرجل .
قوته الحشرات والاساريج والنمل والثار البرية والبلور
والبلوط || يتسلق الاشجار قفراً . طيرانه معتدل الشوط
كثير التجمعات || يعيش ذكراً وانثى لا يفرقها سوى
الموت . يدثن عشه في تجاويف الاشجار على ارتفاع بعض
الانتر . الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها
وحدها دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

٢٤٠٢٠ - كمككات *

Kumquat هـ
هي ليمون ككات . شجرة ريفية مشرحة من الحمضيات .
لها ضربان مشهوران هما :

٢٤٠٢١ - كمككات مُستديرة *

Citrus japonica madurensis, *Limonellus madurensis*
(S). *Kumquat à fruits ronds*, «*Marumi*» (F).
ضرب من الكمككات . اسمه الياباني «مارومي» || ثمرته
سرسة متوسطة القد تملو نحو ٤ اثمار . اوراقها معتقة
متعاقبة سنائية . نصلها جامد الصفحة الخضراء اللامعة .
ثمراها كروية صفراء اللون مائلة البشرة . قشرها يراوح
من ٢٠ الى ٣٠ م .

٢٤٠٢٢ - كمككات مُستطيلة *

Citrus japonica margarita, *C. margarita* (S). *Kum-*
quat à fruits oblongs, «*Nagami*» (F).
ضرب من الكمككات اسمه الياباني «ناغامي» || ثمرته
متوسطة القد تملو نحو خمسة اثمار . اوراقها متعاقبة ،
معتقة ، سنائية ؛ نصلها جامد الصفحة المائلة ، شديدة
الخضار اللامع . ثمارها مستطيلة اجاصية الشكل صفراء
اللون طويلاً نحو ٤٠ م . وعرضها ٢٥ م .

٢٤٠٢٣ - كمككام

Essence de la marjolaine (F).
Oil of the sweet marjoram (E).
هو دهن الرو يستعمل في العطارة . يستخرج بتقطير
الازهار والاوراق بعد نقعها بالماء . وهو اصفر اللون
يخضر ويبيض مع مرور الزمن . عرفه ذكي الرائحة ، حار
الطعم ، يغلي عند ١٦٣ شغ . ويذوب بالكافور في
الكحول عيار ٨٥ .

Cambium

٢٤٠٠٧ - كمبيوم
هو القُلب الطليقة المولدة في النبات .

٢٤٠٠٨ - كمّة

هي الارسوة ، اطلها .

٢٤٠٠٩ - كمثرأة

هي الاجاصة ، ثمرة الاجاص .

٢٤٠١٠ - كمثري

هي ثمرة الاجاص .

٢٤٠١١ - كمّج

كج الكرم اذا تحرك للبراق . واكمت الزمة اذا ما
ايضت وظهر عليها خل كالقطن .

٢٤٠١٢ - كمّر

الكسر من البسر : ما لم يربط على نخله ولكنه سقط فارطب
في الارض . اما النخلة كجار .

٢٤٠١٣ - كمثر

٢٤٠١٤ - كمّش * ، كماسيا
Camassia (S). *Camassie*, *Camash*, *Cyanotride* (F).
Camass, *Quamash* (E). *Quamassie* (D). *Camassia* (I).
من الاسم الهندي «كش» . جنس نباتات بصلية من
فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٨ منها البرية
والزراعية . اوراقها قرصية الانتشاب شقيقة مستطيلة .
ضربانها اسطوانية جوفاء . ازهارها عتقود التجميع
يكلل الشاربخ . ازهارها نجمة الشكل فارشة || اعرف
انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٠١٥ - كمّش جرتي

Camassia hyacinthina, *C. fraseri* (S). *Camassie-*
jacinthe, *Camash-jacinthe* (F).
نوع من الكمش السبروتي الزنبقي . شراخه يملو نحو ٣٠
سم . بتلات ازهاره لثالية العروق تغلظ من ٦ الى ١٢ م .
لونها الى الودي يملو موج ليكي || ازهاره يستمر
من نيسان الى ايار .

٢٤٠١٦ - كمّش ليشتلين

Camassia leichlini (S). *Camassie de Leichlin*,
Camash de Leichlin (F).
نوع من الكمش السبروتي الزنبقي . شراخه يملو نحو
٩٠ سم . بتلات ازهاره خاسية او سباعية العروق
تغلظ من ١٥ الى ٢٥ م . ضروبها المشهورة اربعة تختلف
بالوانها منها الابيض والاصفر والازرق والبنفسجي .
ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٤٠١٧ - كمّش مأكول

Camassia esculenta (S). *Camassie comestible*, *Ca-*
mash comestible (F).
نوع من الكمش السبروتي الزراعي المأكول البصل . شراخه
يملو من ٤٠ الى ٨٠ م . ازهاره الى الزرقه اللبنة المولج ،
بتلاتها خاسية او سباعية او تساعية العروق تغلظ من ٢٠
الى ٣٠ م . مما يجعل قطر الزهرة يراوح من ٥ الى ٧ م .
ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٠١٨ - كمفيل امبراطوري *

Campephilus imperialis (S).
Campephilus imperial (F).
طائر من فصيلة التفاريات ورتبة المتسلقات . موطنه



كش



كمفيل امبراطوري



كمفيل اميري

مستديرة
مستطيلة
ككات



كُول



كهة مبدولة



كوكليت اربواني



كون



كون حيشي



كيشي

٢٤٠٣٣ - كُمِين * ، سُنُوت ، سُنُوت

Cuminum cyminum (S). Cumin (F). Cumini (E). Echter Römerkümmel (D). Cumino, C. domestico, Cimino dolce (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة الخيميات . يزود من الافاوية وقد تستعمل في تطهير الحيز والجبن . ويستخرج منها مشروبات صحية نافعة || والكمون منه للعدة ، يحل الرياح والالام ويغفر سوء الحضم ويصر النفس والمغص . كان يستعمل في الطب القديم مقويا جليا بزجه مع السمل والفلفل .

٢٤٠٣٤ - كُمُون اُرْمَتِي * Cumin des prés (F).

هو الكراويا ، اطلبه .

٢٤٠٣٥ - كُمُون حَبَشِي * ، يَانِسُون بَرِي

Carum (S). Ammi, Sison (F). Ammi, Bishop's weed (E). Herrenkümmel (D). Ammi, Sison (I).

جنس نباتات عشبية برية طيبة حولية من فصيلة الخيميات . انواعه المروفة حصة اعطائها حوض وجزر البحر المتوسط ومنها نوع حيشي المنبت . اوراقها تشبه اوراق الجزر . منافعها الطبية كمنافع الكمون .

٢٤٠٣٦ - كُمُون حُلُو Anis (F).

هو الانيسون ، اطلبه .

٢٤٠٣٧ - كُمُنِيَّات Tuberaceae (S).

Tubéracées (F). Tuberaceae (E).

فصيلة الكرم من الفطور الزقية اجناسها وانواعها عديدة اكثرها مستحب العلم مأكول . فوارقها الشكل والحجم والون والرائحة .

٢٤٠٣٨ - كُمُنِيَّات Baj (F). Bay (E).

من الوان اثواب الخيل للذكر والاُنثى ج ك ت . والفرس الكميث اشد حرمة من الاُنثى ويكون عرفه وذنبه اسودين وقوامه كذلك . والكميت قد يكون :

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت احمر وهو الذي يملو حوته سواد

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مدمن وهو الذي تشد حوته

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مذهب وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مذهب وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مذهب وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مذهب وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مذهب وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مذهب وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مذهب وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مذهب وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كُمُنِيَّات Kamechi (F).

كيت مذهب وهو الذي تملوه صفرة

٢٤٠٣٤ - كُمُون اُرْمَتِي * Cyathea (S). Cyathée (F).

جنس نباتات سرخسية من فصيلة الكلوكيات . انواعه عديدة جميعها كثيرة اللد تملو نحو ١٠ اثمار . جذوبها زياء الحاء . اوراقها منتصبه ، مركبة ، ثنائية او ثلاثية الانقسام تطول من ٣ الى ٦ اثمار . فصوصها اهليلجية الشكل ، مفشارية التسنين ؛ نصلها جامد النسيج ، اخضر الصفعة العليا ، قضي السفل || وهو يرغب في الاثر المعينة العور المتوسطة الاندماج الكائنة في المراض الجنبوية الدافئة .

٢٤٠٣٥ - كُمُونِيَّات Cyatheaaceae (S).

Cyatheacées (F). Cyatheaceae (E).

فصيلة من البرانخس الوصائية المستورات الزهر . انواعها نحو ٩٠ نوعا حصة اجناس . اعطائها البلاد الحارة . تصلف للزبين انما يرغب في المواقع الرطبة .

٢٤٠٣٦ - كُمُون اُرْمَتِي * Aveugle de naissance

هو ذو الكمة اي العمى يولد به الانسان او الحيوان .

٢٤٠٣٧ - كُمُون اُرْمَتِي * Tanche (F). Tanch (E).

الواحدة كمة . ولكنه جنس اسماك نهريه من فصيلة الشبوطيات مفتوحات الفم . انواعه قليلة تتميز باجسامها الاهليلجية الشكل ويعدنيتها الفكيتين البقيتين . اعرف انواعه واشهرها الكمة المبدولة .

٢٤٠٣٨ - كُمُون اُرْمَتِي * Tinca vulgaris (S).

Tanche commune (F). Common tanch (E).

نوع من الكمة يعي مكنة نهريه ترغب في المياه الراكنة اغصها مياه الغدران حيث تعيش في اسماها طوطا عند ادراكها التام يراوح من ٢٤ الى ٣٧ سم . وزنها من ٥ الى ٦ كيلو . فلوها صغيرة القد لينة . زعانفها الظهرية والصدرية والبطنية والثرجية مستطيلة ومستديرة الاطراف . ذنبها مستعرض مقطوم . ثوبا الى الحصار الاسفح الموج .

٢٤٠٣٩ - كُمُون اُرْمَتِي * Quamoclit

جنس نباتات عشبية حولية عارشة من فصيلة البليديات . انواعه قليلة جميعها زينة . سوقها عطق . اوراقها متعاقبة . ازهارها لاقياصة التجميع والارتكاز || تتكاثر بالبرز وتجود في جميع الاثر الزراعية || اشهر انواعه التريينية ما يلي .

٢٤٠٣٩ - كُمُون اُرْمَتِي * Quamoclit coccinea, Ipomaea coccinea (S).

Quamoclit coccinea, Ipomaea coccinea (S). Quamoclit écarlate, Jasmin rouge des Indes (F).

نوع من الكموكليت الترييني السبروتي . ساقه تطول من ٣ الى ٥ اثمار . اوراقه قليلة الشكل جملة الحصار الزاهي . ازهاره عنقودية التجميع كبيرة القد . بتلاتها خمسة الزوايا ، ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

٢٤٠٣٩ - كُمُون اُرْمَتِي * Quamoclit pinnata, Ipomaea quamoclit (S).

Quamoclit pinnata, Ipomaea quamoclit (S). Quamoclit penné, Q. cardinal, Liseron à feuilles laciniées (F).

نوع من الكموكليت الترييني السبروتي . ساقه تطول نحو ٣٥٠ سم . اوراقه كبيرة مفرفة متوازنة التشرع المنطش الذي يبدو كالريش . ازهاره فردية التجميع ، كبيرة القد ، وردية اللون ، ارجوانية الموج || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٤٠٣٩ - كُمُون Latence (F). Latency (E).

الكُمُون حالة الشيء الكامن .

Canarium (S). * **كتناريوم**
Canarion, Canari, Canarium (F). Almond, Elemi tree (E). Kanarlenbaum (D). Canario (I).
جنس شجيرات برية من سبط البفوريات وفصيلة البطيئات.
انواعه المعروفة نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية،
تفرز عصارة راتنجية بيضاء اللون بطيئة الاشتعال قوية
الهب فواحة العرف المستحب. اغشائها صلبة بيضاء اللون
لكنها لا تصلح للاستعمال الصناعي.

Gîte (F). Lair (E). * **كتناس**
مأوى الطي في الغاب بين الشجر يستريح فيه. ج. كنوس
واكتناس.

Lignée (F). * **كتناشة**، * **كتنح**
Issue, Progeny (E).
ج. كنتاجات وكناسح. هي الاصول الموصوفة المنتخبة
كأمهات لسلالات نباتية معينة.

Tectonique (F). Tectonic (E). * **كتناهة**
علم يبحث في تكوين الأرض وتوغلها.

Cal (F). Callus (E). * **كتنب**
نسج دامل يغطي الفراغ الذي احدهه الجرح في الشجرة.

Callose, Callous * **كتنّب**
اندمال في الجلد مظهره نقط رافعة متصلة او نتوات
جامدة.

Equisette (F). * **كتنّب الحقل**
٢٤٠٥٤ - هو الأسوخ، اطبله.

Prêle d'hiver (F). * **كتنّب الشتاء**
٢٤٠٥٥ - هو الأسوخ الشتوي، اطبله.

Equisetaceae (S). * **كتنّبيات**
Equisétacées (F). Equisetaceae (E).
هي الأسوخيات، فصيلة نباتية من مستورات الزهر
الوعائية.

Chamaedorea (S). * **كتنبار**
Chamaedorée (F).
جنس اشجار ليفة من فصيلة النخلات. انواعه المعروفة
١٠ اصطلحها الاقاليم الحارة معظمها امريكي المنبت وبمضها
افريقي. تزرع للزينة، جذوعها تملو من متر الى تسعة
امتار، سفها يطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. كواثيرها
عديدة، قنواها لينة، ثمارها كرزوية الشكل والقذ،
نافعة المادة للاستعملة || اشهر انواعه الزينية :
كتنبار النيق *

Ch. elegans (S).
Chamaedorée élégante (F).
Ch. elatior (S). كتنبار شامع
Chamaedorée élevée (F).
Ch. gracilis (S). كتنبار ظرفي
Chamaedorée gracileuse (F).

Chenopus (S). * **كتنبث** *
Chénopée (F). Chenopus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
وفصيلة الكتنبثيات. انواعه المعروفة كثيرة العدد، المعاصر

Caecum (S). * **كتميئة**
Caecum (F). Caecum (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
وفصيلة الكتميئات || انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصداها
صغيرة، انبوية الشكل، محلزنة القنة المقوسة، افواها
دائرية. اسفاطها مدملكة، قرنية الغشاء. لولاسها عادمة
العيون.

Caecidae (S). * **كتميئات** *
Caecidés (F). Caecidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
اماميات الخياشيم وحيادات الاجهزة || اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الياح الثالث
اما الانواع المعاصرة فنحو ١٠٠ تنتمي الى جنس واحد
يدعى كميئة.

Lepadogaster gouanii (S). * **كتميئة**
Barbier, Porte-écuelle (F). Sucker (E).
سمكة من فصيلة الرغشيات يكثر وجودها في المتوسط. تتميز
بكير رأسها وامتطالة زعانفها الصدرية والظهرية. جسمها
متوسط القد، ثوبها جميل الالوان الزاهية يغلب فيها الوردي
المذهب المواجه. بطنها فضي اللون. محسراها ونيج ظهرها
معرضة التجليل الاسمر. لحمها متوسط الصنف.

Callosité (F). * **كتناب**
٢٤٠٤٥ - هو الجبسة، اطبلها.

٢٤٠٤٦ - **كتنار** *، **كتناري**، **حزكار**
Serinus canaria (S). Serin des Canaries, Canari (F).
Canary (E).
نوع من النتر وهو صغفور غريد اصفر اللون، اخضر
المواج يربي في الانقاص. ضروبه وسلالاته الحالية عديدة
تختلف باختلاف الثوب والحجم || موطنه الاصل جزر
كناريه وهو يألف الأماكن القريبة من الماء لانه يقتل
كل يوم. قوته البزور البرية الصغيرة ولواي النبات وبعض
الانمار السكرية اغصها التين الناضج الساكع. وهو في
القفص يعيش نحو ٢٠ سنة على بزر المكس والبسبيبية
والقنيز والشليم المنقوع والخس والثآبر السكرية والخبز
المنقوع بالحليب المنلي وصغار البيض || الانثى تحضن
ثلاث مرات في الحول. حفضتها تراوح من ٣ الى ٥
بيضات صغيرة الحجم غبراء القشور المرقوشة بالجوزوي
رخميها يستعمل ١٣ يوماً || وهي تضاف النتر والحسون
والكمثر والخفيري والتفخيخي والشورور والدوري ...
تفاجها نعل قوي الشكية متراكب الالوان المتداخلة
المرتكة على الاصفر.

٢٤٠٤٧ - **كتنارين** *
Canarina (S). Canarine (F).
جنس نباتات جبنية معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها
قليلة اصطلحها جزر كنارية. جذورها غليظة وشية. سؤها
تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. عصارها حليابية ديقة.
اوراقها متقابلة، معتقة، رعيمة. نصلها مالمس الشبرة،
مسن الحافة، بحري اللون. ازهارها قمية الشكل، كبيرة
القد، مستطيلة الماعليق متدلية. لونها الى الصفرة الذهبية
عروقها الى الحمرة. ثمارها عنبية مأكولة.



كميئة



كنار



كتناريوم



كتنبار انيق

يشار الى ذلك باضافة « ١ » فيصح التعريف اذ ذلك كلاً او كلاً او كلاً الخ .

٢٤٠٦٦ - كُنْجُوْس ، كُنْجُوْس (S). Cajanus

(F). Cajan

جلس نباتات ليفية خشبية معمرة من فصيلة القرنيات القراشية . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي . اصلها البلاد الحارة والاسيائية . سوقها متنبية . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية . ازهارها نورية التجميع . ثمارها قرون مبطلة مخضرة القواصل الحبية || اعرف انواعها واشهرها الكنجوس الهندي .



كنبت

٢٤٠٦٧ - كُنْجُوْس هندي * ، قُرَيْشَاء ، سِيلَه هِنْدِيَّة ، لُوَيْبَاء سُوْدَانِيَّة

Cajanus indicus (S). Ambrevade, Pois d'Angola, Pois d'Angole (F). Doli, Pigeon-pea, Cajan-pea, Congopea (E). Catjang, Angolische Erbsen (D). Cajano dell'Indie, Citsio dell'Indie, Pisello d'Angola (I).

نوع من الكنجوس الزراعي ، فزروه عديدة شائعة الانتشار . ساقه ليفية ، خشبية ، فراء ، زيا ، تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية ، وريقاتها اهليلجية النصل ، خلية البشرة على سطحها . ازهارها نورية التجميع ، صفراء اللون ، موشية بالاحمر . ثمار قرون مبطلة تقوّل من ٤ الى ٧ سم . تغلف من ٣ الى ٥ حبات مستديرة ملفطة قدحها قدر الحصة ، لونها يختلف مع القرب منها الابيض والحلتي والاحمر والاحمر والمقرّوش || قرونه الخضر تطلّح كاللوباء . حبه النافس الجاف صلب المادة يستعمل بعد تحمق وهو غزير العناصر الغذائية يحوي ما قدره :



كنكور الشوك

من ١٩ الى ٢٠ % من المواد الازوتية
من ٦٢ الى ٦٤ % من المواد الهيدروكربونية
من ١٠ الى ١٠,٢ % من المواد المعدنية



كنجوس هندي

٢٤٠٦٨ - كَنْتَب

Anaphalis (S).

Anaphale, Anaphalide (F). Pearly everlasting (E). Weisses Perikörbchen (D). Semprevia blanca (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متعاقبة مضفرة قطعية . وريقاتها الزهرية عناقية التجميع . ازهارها عاجية لولبية . ثنائياتها ضيقة . يزورها مستندة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٠٦٩ - كَنْتَب الثِيَّت

Anaphalis nubigena (S). Anaphalide du Tibet (F).

نوع من الكنكب الثيّي يملو من ١٠ الى ٢٠ سم . ساقه واوراقه مضفرة قطعية . اوراقه سنائية النصل وحيدة العرق . وريقاته الزهرية وحيدة ، ازهارها صغيرة مبعثرة عاجية اللون . ازهارها يستمر طوال شهر تموز .



كنكب ثعمني

٢٤٠٧٠ - كَنْتَب ثُعْمِيَّ *

Anaphalis margaritacea, Antennaria margaritacea (S). Anaphalide nacré, Immortelle blanche (F).

نوع من الكنكب الثيّي يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه ضيقة طولها من ٥ الى ١٢ سم . تعرض نحو ٥ م . نصلها اغصن الصفحة العليا مزهر البزير البياض اللؤلؤ . وريقاته الزهرية كبيرة القذبة ثعمني اللون والصفة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

منها وقد يتجاوز ٤٥ يعيش في بحار شمال المحيط الاطلسي || اصداؤها صغيرة القذبة وضعية محاذية مثقلة اللوية . فواها معتدلة الانفراج ، رباعية الفلق اللامساوية التي تبدو كأربيل التّم شكلاً وحطاً .

٢٤٠٥٩ - كُنْبِيَّات ٥

Chenopodiidae (S). Chenopodiidae (F). Chenopodiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات مُعديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاقحاف الجوروية والطباشيرية وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اعرف اجناسها واشهرها الكنبت والدريّة والحريقد والفضجينة .

٢٤٠٦٠ - كُنْه

Auvent (F).

Pent-roof, Porch roof (E).

سقيفة مسطحة لاقياسة الطول والعرض والاعتدال ترتكز على حائط او بناء .

٢٤٠٦١ - كُنْه

Envelope, Revêtement (F). Covering, Facing, Revêtement (E).

كل مادة حاجزة توضع لوقاء الشيء وسره .

٢٤٠٦٢ - كَنْتَب

Bibelot (F). Curio (E).

ج. كتابت . هي الأشياء الصغيرة الفاخرة الصنع من تماثيل وغيرها توضع لزيّين .

٢٤٠٦٣ - كَنْتَرِيد

Cantharide (F).

هو الزراع ، اطليه .

٢٤٠٦٤ - كَنْشُور الشوك *

Agapanthia cardui (S). Agapanthie des chardons (F). Agapanthia cardui (E).

حشرة وائمة غاصلة من فصيلة القرنيّات وريّة مفدمات الاجنحة . موطنها يشل معظم اقالم حوض البحر الايبي المتوسط . تألف جميع انواع الشوك والفضهاء . غذائها تمش على الازهار . يرقاتها تسردب ارويات النباتات المائلة ولا تمتع من سوقها || جسمها صغير القذبة ، ابيض الشكل ، يطول من ٧ الى ١٢ سم . ثوبا الى الزقة العاقبة يعملوا مواج سبورى وثلاثة خطوط عاجية تغلف الكويل ، وشطان اصفران يكتنفان الدرز الفندي . رأسها معتدل الحجم ينور بمغظه تحت الكويل . عينها صغيرتان . زياتها غطيطان ، مهدبان . ازهارها مهدب الحثار . غذاءها معتدلت الصلابة ، متباختات التحزيز القاطب . ارساها خماسية المقل || الانثى امير قدأ من الذكر وابنت ثوبا منه وتامر زياتا || لها جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملدة في اوائل ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها الكال الجسموري الذي يحصل بعد التقف بنحو ٣٨ اسبوعاً ، تقوّل من ١٨ الى ٢٢ سم . جسمها دقيق الحجم ، مستطال الصدر ، مستدق السكة الشرجية ، سداسي الراجب . ثوبا الى السمرة الحظيئة البزراء الموالج يكتنفها تقطيط اسود يطوه بعض الهلب .

٢٤٠٦٥ - كَنْج ٥

هو حاصل الثيجين انيل كان ام الشيب . يعرف عنه عداقة بحرف « ك » الى السلالة الاول فتريفها ك١ . والسلالة الثانية ك٢ . والثالثة ك٣ . واذا حجن الكنج من جديد من احد طرفيه ، وهو ما يدعي التنايل او الدجلة ،

٢٤٠٨٠ - كُنْدُس أُنُق (S). *Gypsophila elegans*
 Gypsophile élégante (F).
 عشبة حولية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. جنورها، دقيقة ساقها
 قوية منتصبة. أوراقها سنائية ذلقة، نصلها وحيد العرق.
 أزهارها مستطيلة المالمق، بيضاء اللون أو وردية.
 أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨١ - كُنْدُس دَبْحِي الرَّق (S). *Gypsophila scorzonifolia*
 Gypsophile à feuilles de scorzonère (F).
 عشبة سبروتية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها
 كثيرة الفروع المستنقة. أوراقها سنائية، نصلها قلبي
 القاعدة خماسي العروق. أزهارها إلى الحمرة الجليمة،
 كلسها اخضر اللون صغير القلذ يطول نحو ٢ سم. || أزهاره
 يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٢ - كُنْدُس ذَرَب (S). *Gypsophila acutifolia*
 Gypsophile à feuilles aiguës (F).
 عشبة معمرة زباه تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء.
 أوراقها بحرية اللون خلية البشرة حل صفحتها. أزهارها
 وردية، كؤوسها إلى البياض الاشر تملو خمسة خطوط
 حر || أزهاره يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٣ - كُنْدُس كَثِير الزَّهَر (S). *Gypsophila floribunda*
 Gypsophile multiflore (F).
 عشبة حولية سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. ساقها
 دقيقة الفروع. أوراقها صغيرة ذرية. أزهارها كثيرة
 العدد، صغيرة القلذ، وردية اللون، كلسها خماسي الفلق
 المسنة المصنولة بمطيلن ابيضين يتوسطها خط اخضر.
 أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين.

٢٤٠٨٤ - كُنْدُس لَرَج (S). *Gypsophila viscosa*
 Gypsophile visqueuse (F).
 عشبة حولية لزجة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها فراء.
 أوراقها سنائية؛ نصلها خلي البشرة الزرجة، ثلاثي او خماسي
 العروق. أزهارها وردية اللون قصيرة المالمق || أزهاره
 يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٥ - كُنْدُس مَدَاد * (S). *Gypsophila repens*
 Gypsophile rampante (F). Chalk plant, Cloud plant
 (E). Kriechendes Gipskraut (D). Gesso filo (I).
 عشبة سبروتية مبذولة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٤٥ سم.
 ساقها ليفية مدادة. أوراقها سنائية مستطيلة. نصلها
 بحري اللون وحيد العرق. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة
 القلذ، وردية اللون او بيضاء || أزهاره يستمر من
 حزيران إلى ايلول.

٢٤٠٨٦ - كُنْدُس مَصْرِي * (S). *Gypsophila struthium*
 Gypsophile frutueuse, Saponaire d'Egypte (F). Egyptian soap root,
 Struthium gypsophila (E). Spanisches Gipskraut (D). Saponaria vera, Struzio (I).
 عشبة برية مبذولة معمرة تكثر في البلاد المصرية حيث
 تستعمل في الغسيل. ساقها مدادة. جنورها متوسطة
 الخالصة. أوراقها خفيفة؛ نصلها خلي البشرة، بحري اللون.
 أزهارها صغيرة القلذ وردية اللون او بيضاء.

٢٤٠٨٧ - كُنْدُس (F). *Pie*
 هو الملقق، اطليه.

٢٤٠٧١ - كُنْدُسَة ٥ (F). *Pterygode*
 الكندسية جناح زائد صغير القلذ، قلبي الشكل، يلحف
 الرورش عند قاعدته في رتبة حششيات الاجنحة. وهما
 كندسيان، يعني ويرى، تستعملها الفراشة لكسج
 ورشيتها الاماميين.

٢٤٠٧٢ - كُنْدُسَة * (F). *Cantharus*
 Canthère (F). Bream (E).
 جنس اسماء بحرية من الاسبوريات الشاككات الزعانف
 الكشيات الفلوس. انواعها ثلاثة. اجسامها يضيبة الشكل،
 طولها يراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم. زعانفها الظهرية تشبه
 السنام. تألف الفور البعيد ولا تقرب من الشاطئ الا في
 بعض الازمنة.

٢٤٠٧٣ - كُنْدُسَة مَبْذُولَة (F). *Cantharus cantharus*
 Canthère commun, Griset (F). Common sea-bream (E).

نوع من الكندارة. سمكة بحرية بيوض من فصيلة
 الاسبوريات ورتبة شاككات الزعانف. مسرعا المجاهد،
 تألف الشطوط والاخوار وتدخل المواني. اعطاها البحر
 الابيض المتوسط || جسمها اهليجلي الشكل، معتدل
 الطيطط، يطول من ٤٠ إلى ٥٠ سم. ثوبها إلى الشهبة
 الفضية المالح تشتد سميرتها في الظهر. جانبها مشيزان
 مغطوط قاطبة صفراء اللون. رأسها كبير الحجم، قصير
 أنف. فكها متعادلان. شقها متصل بالانفراج.
 اسنابها رباعية الصفوف في الفكين. عيناها صغيرتان،
 نافرتان. زعنفتها الظهرية واحدة سنائية الشكل. زعنفتها
 الدالية قاركة || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٠٧٤ - كُنْدُسَة هو كركدن السند، اطليه.
 ٢٤٠٧٥ - كُنْدُسُ هو البان الذكر، اطليه.

٢٤٠٧٦ - كُنْدُسُورُوم، مِيْتُوكُنْدُرِي (F). *Chondriosomes, Mitochondries*
 Chondriosomes, Mitochondria (E).
 هي مجموعة الكناسج التي تتألف منها الحبيرة الحيوانية
 او الخلية النباتية.

٢٤٠٧٧ - كُنْدُرِيُوم (F). *Chondriome*
 هي الهية، اطليه.

٢٤٠٧٨ - كُنْدُس (S). *Gypsophila*
 جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات. انواعه زهاء
 ٤٠ منها الحولية والمعمرة والبرية والزراعية. سوقها فراء.
 أوراقها صغيرة القلذ متعاقلة. أزهارها خمسة التجميع،
 تاجية الاوتكاك، صغيرة الحجم. جنور بعضها صناعية
 يستخرج منها مادة الصابونين وتستعمل في غسيل الانسجة
 الصوفية والكاتانية والظطنية تنظفها من الاقذار وتكسبها
 بعض الزهراء والورق || أدب انواعه واشهرها ما يلي.

٢٤٠٧٩ - كُنْدُسُ الصُّخُور * (F). *Gypsophila petraea*
 Gypsophile des rochers (F).
 عشبة سبروتية معمرة برية تعيش في الارتفاع والصخور
 الكلسية. تملو من ١٠ إلى ١٥ سم. جنورها غليظة.
 ساقها ليفية مدادة. أوراقها صغيرة القلذ، بحرية اللون،
 بنفسجية القاعدة والسنت. أزهارها متقاربة لونها إلى البياض
 العاجي. قناباتها يضيبة الشكل ثنائية التركيب || أزهاره
 يستمر من حزيران إلى آب.



كندارة



كندارة مبذولة



كندس الصخور



كندس مداد



كندس مصري



كندور



كندية

Astéroïde (F). Asteroid (E). **كُنْدَسْ** ٢٤٠٩٥
نعت تعريفى يطلق عل جميع السيارات الصغرى الدائرة
حول الشمس بين المشتري والمريخ. ج كُنْدَسْ وتدعى ايضاً
الجواري الكنسى.

Organite ٢٤٠٩٦ **كُنْسَجْ**
كل عنصر من العناصر التي تتألف منها الخلية كالجيلة
والسننوزوم ... ج. كنسج.

Lignée (F). ٢٤٠٩٧ **كُنْسَجْ**
هو الكنفشة، اطلبها.

Consoude (F). ٢٤٠٩٨ **كُنْسُودَة**
هي السفلون، جنس اشباب برية طيبة.

Tringiens (F). ٢٤٠٩٩ **كَنْسِيَّات**
عارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها قليلة.
اعرفها الجهلول. جميعها من القواطع الصغريات اللد.
مناقيرها دقيقة خالية من التخذيد. ارساغها نحيلة. اولها
مرفقة وهي صيفية وثتوية تختلف عن بعضها برونق
الالوان واقترب الرقعة او تباعدوا.

Conchite (F). ٢٤١٠٠ **كَنْسِيَّتْ**
مادة متحجرة في داخل صفة.

Germon (F). ٢٤١٠١ **كَنْعَدَ، كَنْعَت**
هو التون الابيض اى الجربون، سمكة بحرية من فصيلة
الاسقمريات. قال جرير:

«قوم اذا جملوا في صيرهم بصلا
ثم اشتروا كنداً من مالح جملوا»

Holacanthus (F). ٢٤١٠٢ **كَنْف**
هو الطبق من الاسماك البحرية، اطلبه.

Biotope ٢٤١٠٣ **كَنْفْ ٥ كَنْفَة**
هو المكان الموصوف المحدود بطبيعته وبناعه.

٢٤١٠٤ **كَنْك** هو البان الذكر، اطلبه.

Terricole (F). Terricolous (E). ٢٤١٠٥ **كَنْكَلِيَّ**
نعت تعريفى يطلق عل الديدان والحيروانات الدنيا التي تعيش
داخل التربة.

Topinambour (F). ٢٤١٠٦ **كَنْكُر**
هو عباد الشمس السقولي، اطلبه.

٢٤١٠٧ **كَنْكَلِيَّة، عَمَرْتَعِي**
Combretum altum, C. micranthum (S).
Combret. élevé, Kinkeliba, Chigomier altier (F).
Vegetable-glace plant (E). Langfaden (D).
نوع من السم وكنكليية هو الاسم الافريقى. نبات
حرجي طبي معمر من فصيلة الالهليجيات. سنننه يمتد
من جمهورية مالي الى سيراليون وشاطئ الملاج ٥ وهي
شجرة قراء تعلو نحو اربعة امتار. ساقها شديدة الصلابة.
قرونها متراكبة، مستطيلة، جذورها اللون ثم طحلاء.
اوراقها متعاقبة، منقطة، اهليلجية، تطول من ٥ الى
٩ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. نعالها ماسة البشرة،
عاقبة الخضار الجزوى الملاج. ازهارها سنبل التجميع،

Pier vagabonde (F). ٢٤٠٨٨ **كُنْدُش جَوَال**
طائر من الجوائم يدعى كطري، اطلبه.

٢٤٠٨٩ **كَنْدَلَاء، كَنْدَلِي**
نبت ينبت بماء البحر ويدعى بالشورة. قشره يمسى
الأيلع يدبغ به (اللسان).

٢٤٠٩٠ **كَنْدَم، جَوَزْ كَنْدَم**
Mangouste (F). Mangosteen (E).
ويدعى الجندم، هو ثمرة جندم منفستان.

٢٤٠٩١ **كُنْدُوج**
Silo
شبه مخزن يشاد في الارض يغمر التراب تخزن فيه الحبوب.

٢٤٠٩٢ **كَنْدُور*، نَسْرْ اَمْرِيكِي، نَسْرْ قَحَاح**

Sarcorampus condor, S. gryphus (S). Condor des Andes (F). Condor (E).
طائر من النسور ينتمي الى فصيلة الزناحيات. جنته كبيرة
القد تطول نحو ١٦٠ سم. اما بسطة سقله فنحو ٣٥٠ سم.
رأسه مستطيل الشكل يحمل عل جبهته عرف احمر. منسره
كبير اللد، حريص الانتشاب، احسن الهرة الحادة.
عنقه اغفر الريش كالرأس، مطوق بالأبيض الاصفر
الملاج. ريشه الملط، مخالبه كبيرة. ثوبه الى الطلبة
المرشحة بالاسود. قوادمه يبيض ٥ اطائه جبال الالند
في امريكا الجنوبية. يألف المناطق العالية من ارتفاع
٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م. عن سطح البحر. نظامه الحياني
جاسي. سره يعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً. يلتصق قوته
في راقعة النبار، يرغب في الجيف وان تذمر عليه ويجودها
اصطاد الايائل والماعز وكل ما استطاع اليه سبيلاً.
يأش وكنه على الحضيض في اوقاب الصخور المُنزفة او
في تنوع الجبال الرقعة. اثناء تضع وفتين كبيرتين تحضنها
يحددها نحو ٤٠ يوماً.

٢٤٠٩٣ **كَنْدِيَّة*، زَهْرَةُ المَرْجَان**
Kennedy (S). Kennédie, Kennédye (F). Coral creeper (E). Kennedie (D). Kennedia (I).
جنس نباتات ليفية عارشة برية وتربينية من فصيلة القرنريات
القرشاية. انواعها ١٢ معظمها تربيى، سوقها زياء تطول
من متر الى عشرة امتار. اوراقها متعاقبة منقطة ثلاثية
القصص. ازهارها كبيرة القد فريدة او عتقودية التجميع،
محورية الارتكاز او طرفية لونها الى الحمرة ومنها الوردي
والاريجاني والقرمزي والياقوتي ... ٥ اشهر انواعها
التربينية:

كندية هبئة
K. splendens (S).
Kennédie splendide (F).
كندية حراء، كندية بالقوية
K. rubicunda (S).
Kennédie rouge, K. à grandes fleurs (F).
كندية سوداء
K. nigricans (S). Kennédie noire (F).
كندية شقارية
K. coccinea (S). Kennédie écarlate (F).
كندية مرداء
K. glabrata (S). Kennédie glabre (F).
كندية مستلقية
K. prostrata (S).
Kennédie couchée (F).

٢٤٠٩٤ **كَنْس** هو الشنقب، اطلبه.

٢٤١١٦ - **كُنْيَاك ، كُونَاك**
Cognac (F).
Cognac brandy (E).
مشروب قنديدي شائع الاستعمال يصنع من كمون العنب .
وقد اشتهرت بصناعته بلاد الكونيك في فرنسا .

٢٤١١٧ - **كُنْيَب**
Arbres desséchés (F).
Dried trees (E).
الكُنْب: اليبس من الشجر .

٢٤١١٨ - **كُنْيِدَة ٥ ، كُونِيدِيَا**
Conidie (F).
Conidium (E).
كل بويضة فطرية نشأت على كائنا لا في زق تدعى كُنْيِدَة .

٢٤١١٩ - **كُنْيَنَة ٥**
Locule (F). Loculus (E).
الكُنْيَنَة ، في علم التاريخ الطبيعي ، هي الحدر الشديد
الصغر .

٢٤١٢٠ - **كُنْيُولِسِيُوم ٥**
Coniothecium (S).
جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلة الطحجيات .
يتميز بخلو من الجرب الكُنْيَدِيَة . كائنا مركبة مستطيلة .
بويضاتها كروية جبرية التجميع || انواعه عديدة جميعها
دمية تركيب لحاء بعض الاجار دون ان تؤذيها ، منها البندك
والحور والوخ والصمصاف .

٢٤١٢١ - **كُنْيُورَاف ، كُونُورَاف**
Gogniographie (F).
ويسمى مرممة الزوايا . آلة المسح تقاس بها زوايا الارض
تقسم مستواها على الفور .

٢٤١٢٢ - **كُهَب**
Buffle âgé (F). Aged buffalo (E).
هو الجاموس المسن لا يزال كائر الحِم .

٢٤١٢٣ - **كُهَبَل**
Detarium (S).
Détar, Détare, Détarium, Ditah (F). Tall-tree
(E). Detaripbaum (D). Detaria, Meli (I).
جنس اشجار افريقية المنبت من فصيلة القرزيات . له
نوعان نوع ثماره مرة العلم ، سحالية المادة ، مؤذية .
ونوع ثماره مأكولة مستحبة العلم يعرف بكهبل السنغال .

٢٤١٢٤ - **كُهَبَلُ السَنَغَال ٥**
Detarium senegalense (S). Détare du Sénégal (F).
Senegal tallow tree (E).
نوع من الكهبل شجرته تملو نحو ١٢ م . ساقها منتصبه
اوراقها متعاقبة مركبة ، وريقاتها شفافة الانتظام .

بوصية
الشكل ، نصلها جامد الصفحة . عابق الخصار . ازهارها
عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز ، ثمارها مشفية
الشكل والقد ، لباب سودقها ناشف المادة ، سكري العلم ،
اخضر اللون .

٢٤١٢٥ - **كَهْدَبُ الْإِجَاص ٥ ، أَكَارُوس**
الإِجَاص
Eriophyes pyri (S).
Phyopte du poirier, Eriophyes des poiriers (F). Pear
leaf blister (E). Birnblatt-Pockenmilbe (D).
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب برام الاجاص
تسبب الارباق الباكور ثم تغلف على الارباق فتفتم النصال
بالبثور السم او الخطيئة بعد ان تقضي على خلايا النسج
الذي يصيح كالاسفنج بين بشرته العليا والسفلى .
يكافح مكافحة العناكب باستعمال الحواشير والمواكين .

محوري الارتكاز . ازهارها صغيرة ، وردية اللون ،
تملوا رشفة نحاسية . ثمارها يزور محرمصة بجنحة صغيرة
تبدو في اول عيدها خضراء اللون ثم يتحرف اللون ، عند
النضج ، الى الوردية الغفيرة العجاجة .

٢٤١٠٨ - **كُنْيَلِيلُوجِيَة**
Conchylologie (F).
Conchology (E).
في علم الاصداق .

٢٤١٠٩ - **كُنْيَنِيَا ٥ ، كُنْيَا ٥ ، سِينْكُونَة**
Cinchona (S). Quinquina (F). Cinchona, Quinlin bark
(E). Chinabum, Fiebertindenbaum (D). China (I).
جنس اشجار ونجيرات برية وزراعية صناعية من فصيلة
الفويات . انواعه المعروفة ٢٠ اعطائها المناطق الحارة
الرطبة . معظمها بري وبعضها زراعي صناعي طبي .
سوقها منتصبه تملو من ٤ الى ٣٠ م . اوراقها متقابلة
معقنة ، نصلها بيضيه او اهلبلجية الشكل . ازهارها
عنقودي او عشكري التجميع . ازهارها خنثوية زباء
البشرة . ثمارها جراء مخروطية الشكل تحضن العديد من
البزور الصغيرة الغشائية الجناح || يستخرج من قشورها
مادة قلوية يفسد اللون شديدة المرارة تعتبر من اهم القلويات
المستخلصة من لحاء النبات وتعرف بالكينا .

٢٤١١٠ - **كُنْيَنِيَا ت**
Cinchonées (F).
سبط من الفويات يشمل نحو ٩٥٠ نوعاً من النبات
تنتمي الى ١٠٠ جنس اشهرها الكُنْيَنِيَا .

٢٤١١١ - **كُنْيَنَان ، لُبِيد**
Alkana orientalis (S). Alkanne, Alcanne, Alcan,
Grénil à fleurs jaunes (F). Yellow bogloss, Yellow
gromwell (E). Orientalische Perlhirse (D). Al-
canna (I).
جنس نبات عشبي بري من فصيلة الحمحميات . اوراقه
ضيقة مستطيلة ، نصلها خلي البشرة . ازهارها صغيرة القد
بيضاء اللون . بزوره مستديرة ، حنطية ، قاسية كالحجر
تدر البول وتفيد الهضم وتنبش اليبلاع وتذيب البلم .
انواعه عديدة اعطائها الجردو واليقاع الداخلية .

٢٤١١٢ - **كُنْيَنَان صِبَاغِي ٥ ، شَنْجَارَ البَر ٥**
عَسَّ الحَمَام ، رَجُلُ الحَمَام
Alkana tinctoria (S). Alkanne tinctoriale (F). Al-
kanet (E). Alkanne (D). Alkanne spuria (I).
نبات عشبي بري من فصيلة الحمحميات يستخرج منه
صباغ احمر اللون شائع الاستعمال .

٢٤١١٣ - **كُنْيَنَل**
الكُنْيَنَلُ : جِر عظام . قال امرؤ القيس :
فاضى يسح الماء من كل فيقة
يكب على الاذقان دوح الكُنْيَنَل .

٢٤١١٤ - **كُنْيَنُور ٥**
Fractocumulus
ضرب من الغيوم الغزيرة المطر ويدي الجلب ، اطلبه .

٢٤١١٥ - **كُنُود**
Terre improductive (F).
Unproductive soil (E).
ارض لا تنبت شيئاً . يقال هذه ارض كنود .



كنكينا



كهان صباغي



كهبل السنغال



كهذب الاجاص

٢٤١٢٦ - كَهْدَبُ الْبُنْدُقِ ٥ ، أَكَارُوسُ الْبُنْدُقِ

Eriophyes avellanæ (S).
Phytopte du noisetier, Eriophye du noisetier (F).
Hazelnut gall mite (E). Hazelnussgallmilbe (D).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب حوافش برام
البندق تقسب قنوطها وأغلاص الازهار .

٢٤١٢٧ - كَهْدَبُ الْبَنْدَوْرَةِ ٥ ، أَكَارُوسُ الْبَنْدَوْرَةِ

Eriophyes cladophthirus (S).
Eriophye des tomates (F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب سوق ولوراق
البندورة فتعطبها وتجعلها وعتمتها عن الأثمار .

٢٤١٢٨ - كَهْدَبُ التَّيْنِ ٥ ، أَكَارُوسُ التَّيْنِ

Eriophyes ficus (S). Eriophye du figulier (F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق التين الطرية
النامية فتؤذيها بفص التي .

٢٤١٢٩ - كَهْدَبُ الرُّمَّانِ ٥ ، أَكَارُوسُ الرُّمَّانِ

Eriophyes granati (S). Eriophye du grenadier (F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الرمان
فتسبب اصفرارها ويهلها البياكر .

٢٤١٣٠ - كَهْدَبُ الزَّيْتُونِ ٥ ، أَكَارُوسُ الزَّيْتُونِ ، فِيلُوكُوتِ ٥

Phyllocoptes (S). Phyllocopte (F). Rust mite (E).
Kräuselmilbe (D).

حشرة من الكهديات تركب اوراق الزيتون اغصانها
وريفات الاناث النابتة فتسببها من اتقاد حجبها الطبيعي
وترفضها بنبور صفر تنسج تدريجيًا الى ان تم النصل
تقتضي عليها .

٢٤١٣١ - كَهْدَبُ الزَّيْتُونِ ٥ ، أَكَارُوسُ الزَّيْتُونِ

Eriophyes tilliae (S).
Eriophye du tilleul, Phytopte du tilleul (F).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الزيتون
فتسببها بالانابيب البشروية التي تقيمها على صفحات
النصل العليا .

٢٤١٣٢ - كَهْدَبُ الْكَرْمَةِ ٥ ، أَكَارُوسُ الْكَرْمَةِ

Eriophyes vitis, Phytoptus vitis (S). Eriophye de la
vigne, Erinose de la vigne, Phytopte de la vigne (F).
Grape bud mite, Grape erineum mite (E). Reben-
blattgallmilbe, Rebenpockenmilbe (D).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الكرمة
فترفضها بالبرير بمد القضاء على خلايا التسبج فيص
النسج بين البشنتين كانه محروق لا رجاء منه .

٢٤١٣٣ - كَهْدَبُ الْكِشْمِشِ ٥ ، أَكَارُوسُ الْكِشْمِشِ

Eriophyes ribis (S).
Eriophye du grosellier, Phytopte du grosellier (F).
Black-currant gall mite (E). Knospengallmilbe (D).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب برام ولوراق
الكشمش فتؤذيها وقد تسبب اغلاص البرام والازهار .

٢٤١٣٤ - كَهْدَبُ الْمُنْعَا ٥ ، أَكَارُوسُ الْمُنْعَا
Eriophyes mangiferae (S). Eriophye du manguier (F).
حشرة من الكهديات المجهرية تركب برام المنفا فتؤذيها
وقد تقتضي عليها .

٢٤١٣٥ - كَهْدَبِيَّات ٥

Eriophyidae (S).
Eriophylids (F). Eriophylidae, Blister mites, Gall
mites (E). Gallmilben, Gallenmilben (D).
فصيلة حشرات صغيرة القد من رتبة القراذيات . اجناسها
وانواعها عديدة جميعها مجهرية . اجسامها اسطوانية .
تطول من خيلين الى اربعة خطوط من المليمتر . جرابيها
رباعية طرفية تحيط باجزاء المنك || جميع حشراتها ضارة
تركب برام ولوراق النبات فتؤذيها اشد الأذى وقد تسبب
تلها .

٢٤١٣٦ - كَهْدَلُ الْقُطْنِ ٥ ، قَافِزَةُ الْقُطْنِ
Lepidocyrtinus incertus (S).
حشرة صغيرة من الكهديات . ذباب الجسم ، سمره اللون ،
مستطيلة الذنب ، تعيش على نباتات الاراضي الرطبة
اغصانها القطن والبرسيم والفسحة .

٢٤١٣٧ - كَهْدَلُ الْمَوْزِ ٥ ، قَافِزَةُ الْمَوْزِ

Drepanura muscatis, Entomobrya muscatis (S).
Drépanure du bananier (F).

حشرة صغيرة من الكهديات فوها الى الصفرة ، تركب
الموز وقصب السكر . اضراؤها زعيدة لا تستوجب
المكافحة .

٢٤١٣٨ - كَهْدَلِيَّات ٥ ، كَلْتَمِبِيَّات ٥

Collemboles (F). Collembola (E).
ومنهم من دعاها « قافزات الذنب » . رتبة حشرات عديمة
الاجنحة ناقصة التطور التي تسكن الاراضي . حشراتها
قارضة قافزة مستطيلة الاذنان تحمل في حلقائها البطنية
الاول جراب صغير القد يفرز مادة لزجة تاصدعها على
تسلق السطح الناعمة المائلة .

٢٤١٣٩ - كَهْرَبِي ٥

Electrogène (F).
Electrogin (E).

نمت تجريبي يطلق على كل جهاز يولد الكهرباء .
٢٤١٤٠ - كَهْرَبَاء ٥
Electricité (F). Electricity (E).
الكهرباء طاقة مُوَلَّدَة ، دأستها تتبع علم الطبيعيات .
وهي تقسم الى فرعين الكهرباء الاحثكاكية والكهرباء
الديناميكية فالاحثكاكية هي التي تستخدم في توليد
الكهرباء . اما الديناميكية فهي المختصة بالتيار الكهربائي
والاجهزة التابعة له .

٢٤١٤١ - كَهْرَبَة ، تَكَهْرَب ٥

Electrisation (F).
Electrification (E).

٢٤١٤٢ - كَهْرَبِي ، كَهْرَبَاتِي ٥

Electrique (F).
Electric (E).

٢٤١٤٣ - كَهْرَبِيَّةٌ غَلْشَايَة

Electrogalvanisme (F). Electro-galvanism (E).

درس القوى الصادرة عن الصفائح المتعددة .

٢٤١٤٤ - كَهْرْمَانُ أَصْفَرِ

Succin

هو المنبر الاصفر مادة راتنجية بحجرة ، صلبة ، شبه
شفافة . لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر . لا تلويظ
في الماء وتنصهر في ٢٨٧ °س . اشتعالها يولد الحامض
النبري وزيت طيار مستحب الرائحة العطرية .



كهذب البندوة



كهذب الزيتون



كهذب الكرمة



كهذب القطن



كهذب الموز

الزعانف . انواعه المعروفة اربعة تتميز برؤوسها المستضخمة وباشداقها الكبيرة الفاغرة وباسنانها الحادة المنقطة كالثياب الاقاعي || اجسامها عريضة ، عادمة السهف ، مبعدة المناخس . عيونها علوية الاوتكار تحتل قمة الرأس حيث يوجد ثلاثة اسلاك او ملاس غضروفية تبدو كخيوط مستطيلة تنتهي ببعض الاسمال المختلفة الاشكال يستعملها الكواكِب لاجتذاب الاسمال الصغيرة ، ذلك لانه كسول قليل الحركة يقضي معظم اوقاته سلقياً على بطنه فاتحاً شفته بانتظار الفريسة || اشهر انواعه كواكِب المحيط وكواكِب المتوسط .

٢٤١٥٤ - كَوَاكِبْ المحيط الأطلسي °

Lophius budegassa (S).
Baudroie de l'Atlantique (F).
سمكة من الكواكِب . اعطائها جناح واطوار وشطوط المحيط الاطلسي . يكثر وجودها في الجبلان المراكشية والاسبانية والبرتغالية والفرنسية || جسمها شبه مخروطي الشكل بطول من ٧٠ الى ٩٠ سم . ثوبها يماثل الموقع الذي تعيش فيه لانها قليلة الحركة || لحمها جيد الصنف ابيض اللون مرغوب فيه .

٢٤١٥٥ - كَوَاكِبْ مَبْدُولَة ° ، كَوَاكِبْ

المَتَوَسِّط ° ، لُطْ بَحْرِي مَبْدُول °
Lophius piscatorius (S). Lophie baudroie, Baudroie commune, Diable de mer, Crapaud pêcheur, C. de mer (F). Toad-fish, Sea-devil, Fishing-frog (E).
نوع من الكواكِب . سمكة بحرية ييوس . اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض اقالم المحيط الاطلسي . مسرحها اضواء المجاذب والشطوط . تألف المواقع المأدبة التي يراوح عقفا من ١٠ الى ٢٠ متراً || جسمها صفي الشكل ، يطول من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم . سمكها عادم السهف . ثوبها الى الخنثي الاسمر يبق في الصفحة العليا ويغير ويبيض في السفلى . رأسها ضخم غليظ . شفتها رجب الانفراج . عينها كبيرتان سطحيتان . ويملؤها في قمة الرأس ثلاثة اسلاك غضروفية دقيقة مستطيلة ، الاول منها ينتهي بمزق صغيرة كالاسمال || زعنفتها الظهريّة الامامية مستطيلة المناخس الشائكة || تتميز باستطالة قواعدهم الزعانف الصدريّة الرقيقة الاوتكار . وتتميز ايضا بالشوكة اي انها تمانن البيئة التي تعيش فيها || لحمها ابيض اللون ، متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤١٥٦ - كَوَاكِبِيَّات °

Lophiids (F).
Lophiidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها المحيط والبحر الابيض المتوسط . تألف المجاذب والشطوط . مسرحها الاطوار التي يراوح عقفا من ١٠ الى ٢٠ متراً . تتميز بالكسل والشوكة اي انها تمانن المواقع التي تعيش فيها || اجسامها صغية الشكل كالشرع ، ضخمة الرؤوس ، مالة القشار اللزج ، مبعدة المناخس الحادة . اعطائها فقس . اشداقها كبيرة وعريضة . اسنانها حادة منقطة || عيونها رقيقة الاوتكار تشرف عليها بعض الاسلاك الغضروفية المنوعة بالاسمال || اشهر اجناسها الكواكِب .

٢٤١٥٧ - كَوَاكِبْ °

Bulla (S).
Bulle (F). Bulla (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبديات الارجل

Hydro-électrique (F).
٢٤١٥٥ - كَهْرْمَانِي
ما يختص بانتاج الطاقة الكهربائية المولدة من دفع الماء .

٢٤١٤٦ - كَهْفِيَّات °

Spéléologue, Spéléologiste (F). Speleologist (E).
من كان اختصاصه الكهفنة .

٢٤١٤٧ - كَهْفِيَّة °

Spéléologie (F).
Spelaeology (E).
علم يبحث في تنقيب الكهوف وفي سبر الاغوار ومجاري المياه الجوفية .

Aubergine (F).
٢٤١٤٨ - كَهْكَب ، كَهْكَم
هو الباذنجان ، اطليه .

٢٤١٤٩ - كَهْفِيَّة °

Chicocca angulifuga, C. brachiata (S).
Cahinga, Cainga (F). Chickoo tree (E). Traubenformige, Kainzawurzel (D).
شجرة حرجية طيبة معمرة من فصيلة الفويات . مهدا بعض مناطق امريكا الاستوائية || ساقها عارضة متسلقة فراء . اوراقها منعقة ، متقابلة ، اهليجية الشكل . نصلها جامد الصلصة ، جميل الخضار العاكس للامع . ازهارها عتقودي التجميع . ازهارها صغيرة وردية اللون ، عادمة الريف . ثمارها لحمية ، مبطة ، عاصفة المذاق ، لا تؤكل || عصارة الاوراق والثمار مقوية وقايزة .

٢٤١٥٠ - كَهْل °
Liobunum rotundum (S).
Phalangide, Fauteur (F). Harvester, Harvest-spider (E).
حشرة قاصصة دابة من فصيلة الكهوليات ورتبة الهرديات . موطنها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبه || جسمه صغير القد ، اهليجي الشكل ، ملحم الصدر والبطن ، عادم المشن ، غيشوي التنفس . ثنائي الجرامز المستطيلة الدقيقة . ثوبه اصهب اللون عند الاثنى وينصرف الى السرة الخنثية يملؤها قتيق اسود عند الذكر . الذكر اصفر قدماً من الاثنى التي يبلغ طولها نحو ٤ م . || يآلف جميع المواقع والمساكن الآهلة . يسرح في الليل . قوته الحشرات الصغيرة واساريعها ويرقاتها والذباب والهامام || يعتبر من الدويبات النافعة لانه يقضي على الخوذية .

٢٤١٥١ - كَهْلِيَّات °
Phalangidae (S).
Phalangides (F). Phalangidae (E).
فصيلة حشرات دابة من رتبة الهرديات وصف التناكب . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اعرف انواعها واشهرها الكهول .

٢٤١٥٢ - كَهْرِب
Electron
جزي . عادم الجرم المملوس يشحن الكهرباء السلبية .
٢٤١٥٣ - كَوَاكِبْ ° ، عُنْجُوم البحر ، لُطْ بَحْرِي °
Lophius (S).
Baudroie, Lotte de mer (F). Angler-fish, Frog-fish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكواكِبيات ورتبة شائكات



كهول



كَوَاكِبْ مَبْدُولَة

الجناوية . تسرح في الصباح الباكر وقرب الغروب . قوتها الاخشاب والجذور والحبوب . اجبرتها انفاق مستطيلة عديدة التعاريج والنهايز المتفرعة اشهر انواعه مايلي .



كُوَاة

٢٤١٦٩ - **كُوَيَايَ الْبِرَاكِيل** *Cavia porcellus* (S).
Cobaye apérée (F).
موطنه البرازيل والغيان وبوليفيه والأوروغواي . طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصبغة الصنائية . بطنه ابيض اللون . يعيش جماعات عدد أفرادها نحو ١٥ . يألف الاماكن الرطبة ويجاري الماء والطراف الاذغال والغابات || اثناء تقص من الدرسين الى الثلاثة مرة واحدة في العام .

٢٤١٧٠ - **كُوَيَايَ الْجَنُوب** *Cavia australis* (S).
Cobaye austral (F).
موطنه امريكة الجنوبية حتى مضيق مجلان . طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه سوي اللون احمر الظهر اغمر البطن . وبره خشن مستطيل || يألف الغضاب والاذغال . اثناء تقص مرتين في العام .



كُوَيَايَة

٢٤١٧١ - **كُوَيَايَ الْهِنْدُ ، حَمِزِيرُ الْهِنْدُ**
Cavia cobaya (S). *Cobaye*, *Cochon d'Inde*, *Lapin d'Amérique*, *Rat d'Amérique* (F).
هو الكوباي الداجن . مهذب امريكة الوسطى . سلالته الرئيسية خمس تختلف عن بعضها باختلاف وبرها بين الطول والقصر والخشونة والنعومة والقلة والكثالة || طوله يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبه عديد الالوان المتراكمة المتباينة || طباعه طبايع الارب وببري مثله . اثناء تلد عدة مرات في العام الواحد .

٢٤١٧٢ - **كُوَيَا** *Cobra* (F).
Cobra, *Hooded-snake* (E).
الكوبرا والتيجا والصل اسماء مختلفة لافئ من الحيات الخيشية الامايات الاخاذيد . اطلب نجا .



كُوَيَاي

٢٤١٧٣ - **كُوَيْبَت** *Cobaite*
معدن ابيض اللون شديد الصلابة صعب الانصهار ثنائي التكافؤ يزنه (كو-Co) وزنه الاتومي ٨٩.٩٤ هـ ثقله التوقي ٨٩.٦ يذوب في الحمض النيتريكي || لا يوجد في الطبيعة حراً بل مركب مع بعض العناصر . اوسه استعماله عديدة اعضها تلون القزاز والحرف .



كُوَيْن

٢٤١٧٤ - **كُوَيْن *** *Galeopithecus* (S).
Galeopithecus (F). *Galeopithecus* (E).
كوين هو الاسم الماليزي . اما الاسم العلمي فيني (فر-قرد) . جنس حيوان لبين حاشر رابل متعلق من فصيلة الكوينيات . له نوعان كوين ماليز وكوين الفيلين . الفارق بين الاثنين حجم ذنوب . الماليزي يطول نحو ٦٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٢ سم . بسطته نحو ٦٧ سم . ثوبه العلوي الى الطحلة السوداء المشايبة الماجات . ثوبه السفلي الى الصبغة السوداء . اطراف قوائم الى السوداء المنمش بالابيض . الفيليني يطول نحو ٥٥ سم . وبسطته نحو ٥٧ سم . ثوبه العلوي الى السوداء السوداء تملوها بقعة بيضاء لامتناهية التوزيع ثوب السفلي اطراف قوائم الى الطحلة السوداء يملوها موج اسمر || ملجته الحياتي جماعي . يسرح في الليل ويبيت في النهار متعلقاً بفاتحيته الخلفيتين كالوطوط . قوته الحشرات والثار ووراق النبات ||

وفصيلة الطايات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداها اهليلجية الشكل ، رجة الفلج المصراعي القاطب رقيقة الصفحة الملونة ، عادمة الخلزنة والاريفة . اجسامها اهليلجية مقطعية الرأس والعقب . رؤوسها قليلة الوضوح عادة اللوامس .

٢٤١٥٨ - **كُوَاة ، كُوَاة ، كُوَاة** *Ruche* (F).
Hive (E).
هي مأوى النحل اي خليته حيثك شباكها بالقص او بالقش .

٢٤١٥٩ - **كُوَاَسِيب** *Rapaces* (F). *Rapacious* (E).
نمت تعريفي توصف به جوارح الطير .

٢٤١٦٠ - **كُوَاَسِر** *Oiseaux de proie*, *Rapaces* (F).
Birds of prey (E).
رتبة من الطير تعرف بالجوارح . فصائلها واجنسها عديدة تقسم الى فئتين كواسر النهار وكواسر الليل .

٢٤١٦١ - **كُوَاَسِر اللَّيْلِ** *Rapaces nocturnes* (F).
Nocturnal birds of prey (E).
هي جوارح الليل تشمل اليوم وسائر اجناس الطير الكواسر التي تسرح في الليل .

٢٤١٦٢ - **كُوَاَسِر النَّهَار** *Rapaces diurnes* (F).
Diurnal birds of prey (E).
هي جوارح النهار وتعدى سباع الطير تشمل الغبان والصقور والنسور الخ ...

٢٤١٦٣ - **كُوَاَكِبَ الْبَحْر** *Asteriadae* (S).
Asteriadae (F). *Asteriadae* (E).
فصيلة من شوكيات البحر . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم .

٢٤١٦٤ - **كُوَيْبَال** *Copal* (F). *Copal-resin* (E).
صمغ راتنجي يستخرج من شجرة الكنتة يستعمل في صناعة الطلاء .

٢٤١٦٥ - **كُوَيْبَالِيَّة** هي الكنتة ، اطلبها .

٢٤١٦٦ - **كُوَيْبَان** *Caparaçon* (F).
Caparlson, *Housings* (E).
سترة فضفاضة توضع على ظهور الخيل لوقايتها .

٢٤١٦٧ - **كُوَيْبَانِيَّة *** *Cupania* (S). *Cupanle* (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السابديات انواعها المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع المناطق الاستوائية || جميعها اشجار وشجيرات فروع . ازهارها متعاقبة مركبة ، شغوية التجميع ، سنابسة النصال . ازهارها محوري الاثنتكاز ، متقوي التجميع . ازهارها غريبة متباينة الالوان ، يكثر فيها الابيض ثم الودي . بزورها مأكولة طعمها شبيه بطعم الكنتانة .

٢٤١٦٨ - **كُوَيْبَاي *** *Cavia* (S).
Cobaye (F). *Guinea-pig* (E).
جنس حيوانات لبنة قاضية من فصيلة الشردفيات . انواعه ثمانية . جميعها ربة ارجة ، صغيرة القد ، متشابة الشكل ، رؤوسها غليظة . راسها لا مغلوقة . اذنانها قصيرة فائضة . قوائمها متساوية الطول . اذنانها جلداج || موطنها امريكة

٢٤١٨٢ - **كوتنل، أطماط**
 Areca (S).
 Arec (F). Arec (E).
 جنس اشجار مشرة من النخليات. أنواعه عديدة منها البلاد الحارة. جذورها رقيقة مستقيمة. جريدها ريشي الصف. ثمارها بيضيه صناعية، لبها شائع الاستعمال الطبي لا سيما الطب البصري || أشهر أنواعه كوتنل الكاشو.

٢٤١٨٣ - **كوتنل الكاشو *، أطماط الكاشو**
 Areca catechu (S). Arec catechu, Aréquier, Noiset de l'Inde (F). Arec-palm, Betel-nut palm (E). Pinangpalme, Arekapalme (D). Arec, Palma arec (I).
 نوع من الكوتنل جذبه مستقيم ريع. ثماره بيضيه الشكل والحجم، يستخرج من لبها مادة الكاشو.

٢٤١٨٤ - **كوتن الحبشة، كوتن إفريقي**
 Brucea antidysenterica, B. salutaris, B. ferruginea (S). Brucée d'Ethiopie, Ko-sam d'Afrique (F).
 نوع من الكوتن. شجيرة برية من فصيلة السمرويات. مهدا الحبشة وبعض مناطق افريقية الوسطى والشمالية || ساقها تحلة فراء تملو من ١٥٠ الى ٢٢٠ سم. أوراقها معتقة متعاقبة، سنانة، أبيضه || تمتد من النباتات الطبية. لحاء ساقها وجذورها تحوي بعض المواد الدوائية والحواض الضوية ومادة الكوتنين || تستعمل في معالجة الزحار ودود الامعاء.

٢٤١٨٥ - **كوتن نحيل**
 Brucea amarissima, B. gracilis, B. sumatrana (S). Brucée grêle, Ko-sam (F). Ko-sam seeds (E).
 نوع من الكوتن. شجيرة برية من فصيلة السمرويات. منها الطوي يمتد من جنوب الصين الى ماليزية والفلبين واستراليا || ساقها تحلة فراء تملو من مترين الى ثلاثة أمتار. أوراقها معتقة متعاقبة اهليلجية، أبيضه || تعتبر بعض المواد الدوائية والحواض الضوية ومادة غلوكوزية تدعى كوتنين. ثمارها كوتن سوداء اللون تغلف عجاات لوزية الشكل دهنية المادة خواصها خواص اللحاء || تستعمل كعصاة للميكروبات وفي معالجة الصفراء والزحار ودود الامعاء.

٢٤١٨٦ - **كوتن**
 Psathyrella (S).
 Psathyrelle (F).
 جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاروقنيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض المناطق الجبلية الممتدة من الشرق الاقصى الى اوروبا. يعيش على التبال وصل اريبات الاشجار الحرة اعصها السندبان ومنه اللك والمكوك والمدر والدرايم. يتميز بسوقه التدقية الجادة ومجمودة لحية الانواع المأكولة || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية.

٢٤١٨٧ - **كوتن أمغر ***
 Psathyrella spadicea (S). Psathyrelle bai brun (F).
 نوع من الكوتن. يعيش مجموعات وافرة العدد على اريبات اللك والمكوك ساقه دقيقة مملوءة اللون. نكته مظلمة الشكل، قطرها نحو ٧ سم. لوها الى المفرقة القائقة او الكمية الاسمر. اطراسها الى الكسني الاحمر المواج || لحية كاتمة الصف، غير مرغوب فيها.

يتسلق الاشجار بخفة وينقل بين اغصانها برشاقة ويقفز من شجرة الى شجرة حلقاً في الفضاء كالظلي، من اعل الى اسفل، مسافة ٦٠ او ٧٠ متراً.

٢٤١٧٥ - **كوتنيات**
 Galeoepithicidae (S).
 Galedéithicidés (F). Galeoepithicidae (E).
 فصيلة حيوانات لبونة، حاشرة، رابطة، متسلقة، مركزها في هرم البوكتا بين اليموريات والوطواطيات || اجسامها مكشوفة بغشاء أشمر، يمتد من قاعدة العنق الى اطراف القوائم والذليل، يقوم مقام المظلة فيمكنها من الانتقال جواً بين الاشجار على مسافات تراوح من ٦٠ الى ٧٠ متراً || اصابع قوائمها مشطية الارتكاز، لا متعاقبة. اظفارها حادة بحجة الاطراف || اناتها ثنائية الاختلاف الصديرة، تضع جرواً واحداً يتعلق بصدرها حتى الغطام || لها جنس واحد يدعى كوتن وله نوعان.

٢٤١٧٦ - **كوتنية** هي الابدانجية، راجعها.
 ٢٤١٧٧ - **كوتة، مظن**
 Jour (F).
 نافذة في جدار البناء لدخول الهواء والنور. فهو قانوني اذا كان يشرف منه على الطريق العام ما دام مطابقاً للانظمة الادارية ولكنه محظور اذا كان يشرف منه على ملك الغير ولم تراعى المسافة القانونية في بده عنه الا ان يكون مرفقاً او مثلاً بماساً.

٢٤١٧٨ - **كوتن منقط البطن، كوتن**
 Cleonus
 punctiventris, Temnorhinus punctiventris (S).
 Cléone piqueté (F).

حشرة مؤذية من فصيلة السوسيات. موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط ومعظم اقالم حوض البحر الاسود. تألف المواق التي توجد فيها السرمقيات. خنافسها تقضم الارواق. يرقاتها تتركب الجذور فتشعبها وتنشعها || جسمها معتدل الحجم، اهليلجي الشكل، يطول من ١٦ الى ١٨ م. ثوبها العلوي الى الكهية يملو موج اشجع. ثوبها السفلي الى الكهية السمره يملوها تنقيط اغبر. رأسها يرمي الشكل ينتهي بغط غروري ناشز الكظر. زباناها مرفقان، وشيا الاطراف. الاثنى اميز قدماً من الذكر واطول غطه منه || لها جيل واحد في الحول. تخرج الحشرة الجملة من استكانتها الشتوي في اواخر نيسان تسرح في النهار. تبشر متع المكن بعد ظهورها بنحو عشرة ايام. قترزه في التربة قرب استاخ النباتات المائلة البريقة مرقاة، بطينة النمو، تبلغ الكال الجسودي بعد الثفت بنحو عشرة اسابيع. جسمها يطول نحو ٢٠ م. وهو اسطواني الجسم، مقوس الشكل، ابيض اللون، تنبي المواج. رأسها مستطيل، مكور، اسمر || طور الاكمال يستمر نحو عشرة ايام وينتهي في التربة.

٢٤١٧٩ - **كوتنوك**
 Caoutchouc (F).
 هو المطاط، اطليه.

٢٤١٨٠ - **كوتنين** هي البشرين، اطلبها.

٢٤١٨١ - **كوتن**
 كوتن الزرع وكل نبات حولي: فاقت الادباس وصار على اربع ورفات او خسا.



كوتن منقط البطن



كوتن الكاشو



كوتن أمغر



كوتن كندول

متشققة تطرح بالحاء ليفتقت ويسقط || وهو عل الحفصيات يقع حنطية لاقامية مستطيلة تركب الحاء تقسب جفاتها وتصلها والتصاقها بالخشب . وبعد ذلك نجسة او ثمانية اسابيع تنطلق الحاء باستطاعتها وتظهر عل الشقوق ثماليل فطرية رمية قهوها نحو المبرتر لونها ابروح من الابيض الى الوردى || يكالغ بالاستتصال وبظلاء الجروح بعد تطهيرها .

٢٤١٩٥ - كُوْدَانَة رولفي * Corticium Rolfii, Sclerotium Rolfii (S).

فطر مجهرى يكثر ويبدو في المناطق الحارة يتطفل عل العديد من النبات كالارز والبادجان والبايه والبشيه والبنفسج والتامول والحفصيات والحطنة والحظفل والحورج والحطبي والنجر والديوسر والذرة والسلق والشيلم والعاتق والفاصوليا والفجل والثاقيلة والفلو السني والقرع والقطن والفلقاس والملفوف والتبجيل والطنش والتبيلج والمخسر وبياد الشمس وفستق الميه وقصب السكر || يصيب النبات في عهد غيه ونشوته السريع فيوشم السيق بنقطة حنطية اللون ، يفيض اغور ، كثيفة التجميع ، تبدو كالبقعة الواحدة ، تعرقل التبادل السني وتسبب اصفرار الاوراق وذبولها || وقد شوه عل التبغ في زراعات الهند التبرلية كما انه ركب اغداد ورق اللوز دون ان يقع بها شديد الاذي || يكالغ باجتنا بكرة الرطوبة وبالأكار من الاسمة الازوية اعصها نيزرات الجير وسلفات الامونيوك .



كوتن غنبل



كوجر

٢٤١٩٦ - كُوْدَانَة سُولاني * ، رِيْزُوْكَوْنُونْ اُسُوْدَه Corticium solani, C. vagum, Hypochinus solani, Rhizoctonia solani, R. rapae, R. betae, R. napi (S), Rhizoctonia noir, Maladie des colerettes, M. des manchettes, Varole des tubercules, Chancr du pied (F), Black speck, Collar rot (E), Wurzelkötter-Krankheit (D).

فطر مجهرى يتطفل عل البطاطا وعلى أكثر من ٢٠٠ نوع من النباتات تنتمي الى فصيلة . يكثر في المساقط المتدلة الحارة . يصيب الشتول في الاكواد فيلونها ويركها في الحقل فيعطلها اعصها القطن والتندرة والبادجان . مظهره عل البطاطا المزروعة وشاح عتكيوي اغبر اللون يكتنف اللون والجذور والسوق حتى سطح التربة فيجتمها ثم يقضي عل صلابتها فترقي ونسود وتذبل اوراقها وتيس . وهو عل درن البطاطا المقفولة وشاح مشيبي ابيض اللون عتكيوي النواس تتسلط قروح لاقامية الشكل والحلم لونها الى السمرة تعطل التسيج البشري || يكالغ باستعمال مركبات سلفات النحاس او املاح الزئبق .



كودانة جلاو



كودانة رولفي

٢٤١٩٧ - كُوْدَانِيَات * Corticaceae (S). Corticiacées (F), Corticiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة العنيمات تتميز بعتبتها الفارش . نكتتها لمساء السطح او زياء ، دقيقة الحلب اغشيتها فوية التركيب او شعية . بوبغياتها شفافة . اجناسها وانواعها قليلة المدد اعرفها الكودانة .



كودانة سولاني

٢٤١٩٨ - كُوْتُنْ كَنْدُول * Psathyrella candolleana (S).

نوع من الكوتن . يكثر وجوده في بعض غابات اوروبية وتركية . يعيش عل الدبال في المراعي الجبلية . ساقه دقيقة ، رفيعة ، غيراه اللون . نكتته مظلمة الشكل ، غيراه اللون ويلها مواج اصفر تشته صفوته وتسر عند القرقص ، قطرها نحو ٧ سم . اطراسها وردية اللون || لحيتها جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٤١٩٩ - كُوْتُنْ مُحْمَكِي * Psathyrella velutina (S), Psathyrella veloutée (F).

نوع من الكوتن . يعيش عل الدبال في المراعي الظليلة . ساقه دقيقة ، عرياء ، سمراء اللون ، خلية الزغب حتى اواسط انزام الرابع . نكتته مظلمة اللبوة ، لامتساوية السطح الخليل الزغب ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الكسني الاصفر المواج || لحيتها جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٤١٩٠ - كُوْجَر * ، بُوْمَاء ، اُسْد اْمُرِيْكي Felis concolor (S), Puma, Puma concolor, Cougar, Concolor, Lion argenté, Lion d'Amérique (F), Puma, Cougar, American lion (E).

حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة السنوريات . اعطاه البلاد الامريكية . شكله يشبه البوق . طوله الكامل نحو ٢٠٠ سم . جسمه ١٤٠ ردينه ٦٠ اما ارتفاعه نحو ٦٥ سم . ثوبه الى الفللة السوية المتأخرة يمتع مع اقترابه من الظهر ويغير عند البطن . زوره ابيض وشفته العليا كذلك || يأنف الاجراح الكثيفة العاتية . يتسلق الاشجار بجمعة وقد يقضي وقت استراسته عليها || قوته ما استطاع اقتراسه من الحيوان والطير . يسرح عند الغروب وفي اوائل الليل ويعد الفجر || اناء تقصع من جبر واحد الى خفة جراء تبصر النور بعد وضعها بستمة ايام وتراقب امانا بعدر ثلاثة اشهر .

٢٤١٩١ - كُوْدُ ، كُوْدَة Planche à semis (F).

هي التربة او المسكية سطح ترابها ودفعت حروفها وحضرت لاقبال البزور . ج اكود .

٢٤١٩٢ - كُوْدُ Entasser (F), To hoard up (E).

كود القراب . جمعه ويجعله كية مسطحة .

٢٤١٩٣ - كُوْدَانَة * Corticium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الكودانيات . انواعه عديدة تتطفل عل مختلف اعضاء النبات وعلى الاشخاب الجافة المصنوعة || مظهره الخارجى اباد مشيبي كثيف التسبيح يلمع الاعضاء الموصومة ثم يوشها بقروصه الحنطية اللون الغليظة النشاء || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤١٩٤ - كُوْدَانَة جَاوَا * Corticium salmonicolor, C. javanicum, Necator decretus (S).

فطر مجهرى يعيش في المناطق الحارة . يتطفل عل عدة نباتات اعصها الحيفية والين والكاكاء والحفصيات والسنت والكتيا والمنشا تركب الافاد عند انتشارها عل الاعضاء والافصان عند انتشارها عل الجذور من الجهة السفلى المعرصة لاشعة الشمس || مظهره الخارجى يور مستترة كثيفة التجميع تتحول الى قروح جافة ملبة



كودر

٢٤١٩٩ - كودر *، كوسان *

Pachyrhizus (S). *Pachyrhize*, *Pachyrhiz* (F).
كودر هو الاسم الهندي وكوسان الاسم الشائع في ملقة .
جنس نباتات جنية عارضة وبمصر من فصيلة القرنيات
الغراشية . أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددا الهند الصينية
وملقة . تزرع كنبات حولي لجناه جلورها || سوقها
عارضة كالوربياء . أوراقها معتقة مركبة من ثلاث وريقات
قلبية الشكل . أزهارها عنقودية التجميع ، أبطي الارتكاز .
أزهارها صغيرة بنفسجية اللون ، مستحبة العرف . سنفاتها
مستطيلة ، معتدلة التبطيط || حبوبها تؤكل خضراء ومطبوخة .
جلورها شبيهة بالكربن وتؤكل طازجة ومطبوخة .

٢٤٢٠٠ - كودس

Codex
مجموعة العقاقير الرسمية وهي تحوي وصف الادوية وتركيبها .

٢٤٢٠١ - كودن

Bardot (F). *Hinny* (E).
هو البغل المتولد من الحصان والآنثان ومنهم من سماه النخل .

٢٤٢٠٢ - كودن *

Croiser (F). *To cross*

٢٤٢٠٣ - كودنة *

Croisement (F).
Cross-breeding (E).

٢٤٢٠٤ - كودو *

Strepsiceros (S).
Strepsicère, *Coudou* (F). *Kudu* (E).

جنس حيوانات لبونة غابية مجترة من فصيلة الايليات .
له نوعان موطنها يمتد من الصومال الى الحبشة والزمبيز .
وبعض اصقاع افريقية الجنوبية || ملجئها الحياتي جحامي .
اجسامها كبيرة اللد تتميز . بقرونها القلبية المستطيلة .
اناثها جاه . ضرورها ثنائية الاخلاف . عجلها يستمر
نحو ستة اشهر تقص في تمامه بفقوروا واحدا .

٢٤٢٠٥ - كودو الحبشة *

Strepsiceros imberbis (S).
Strepsicère imberbe, *Coudou de l'Abyssinie* (F).
نوع من الكودو . موطنه الحبشة والصومال . يألف الاجام
والغابات التي تجتازها بجاري الماء . يسرح في النهار ويبعث
في الليل في مواقع معينة قلا يغيرها || جسمه كبير اللد
يطول نحو ٢٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم .
ارتفاعه نحو ١٢٠ سم . قرنه لولبي الشكل يرتفع نحو
٦٥ سم . ثوبه الى الشقعة السمراء المتفاوتة المواجه بين الرأس
والظهر والصدر والبطن . وهو عادم المفرة والحلال الابيض
في الجبهة انما يعلو من الحاروك الى الكفل خطوط معتمة
بيضاء عددها ١٥ عند الذكر و١١ عند الانثى . قوائمه
شديدة النشط وسرعة عدوه تفوق سرعة كودو الرأس ||
اجله يتألف من اربعة ذكور مائة وثمان اناث وثمانية
شودان .

٢٤٢٠٦ - كودو الرأس *

Strepsiceros capensis (S).
Strepsicère du Cap, *Coudou du Cap* (F).
نوع من الكودو . موطنه يمتد من رأس الرجاء الصالح الى
الحبشة والصومال . يألف الغابات والارحاج . يسرح في
النهار ويبعث في الليل || جسمه كبير اللد يطول نحو
٣٣٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . ارتفاعه
نحو ١٣٥ سم . قرنه لولبي الشكل ، ارتفاعه العمودي
نحو ١١٥ سم . والمسافة بين طرفي القرنين نحو ١١٠ سم .
ثوبه الى الشقعة السمراء . عفرته شديدة السمره تمتد من قة



كودو الحبشة

الرأس الى قاعدة الذنب . ويعلمو من الحاروك الى الكفل
تسمة خطوط معتمة ، بيضاء اللون ، لامشابة الطول .
عيناه لوزيتان ، بارزتان . اذناه كبيرتان . ويحمل في
اعل قصبة الانف هلال ابيض ينتهي عنه المائي . قوائمه
ضليمة . شديدة النشط || اجله يتألف من ذكزين مانين
واربع اناث واربعة شودان .

٢٤٢٠٧ - كور العبيد هو الشيط الحيشي ، اطلبه .

Uranoscopus (S).
Uranoscope (F). *Uranoscopus* (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الترخونيات ورتبة
شائكات الزعانف || انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة اللد
عاز متوسطة . تتميز برووسها المنتصبه الاشدق ، ويعونها
الحامية الارتكاز الاقني وبزعانفها الشائكة المنانص
الحادة || تعيش مغفورة في الرمال والاسمال لا يظهر منها
سوى طرف الزعنفة الظهرية الاول وهي شائكة المنانص
المسمة || اعرف انواعها واشهرها الكورب الاخشن .

٢٤٢٠٩ - كورب اخشن ، اشتررب ابيض ،

Uranoscopus scaber (S).
Uranoscope raboteux, *Rascasse blanche*, *Rat* (F).
Uranoscopus scaber (E).

نوع من الكورب . سمكة بحرية بيوض من فصيلة
الترخونيات . اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها
اهليجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم . رأسها غليظ ، كبير ،
مصقع ، منتصب الفك ، مستعرض الشق ، متراكب
الزوايق العظمية . عيناهما اقنيتا الارتكاز تحتلان قنة
الرأس . زعانفها كبيرة شائكة . زعنفتها الظهرية الاول
ناشرة المنانص الصلبة اللدرة المسمة . منانص اسفله
مسمة ايضا || ثوبها اللولبي الى الريدة السمراء تملوها
رقشة حنطية زاهرة . جانباها الى الريدة الفضية المواجه
بطنها الى البياض الاغبر || لحمها كائن الصنف ، قل
من يربغ فيه .

Courbaril (F).
٢٤٢١٠ - كوربريل
هو الكدو ، اطلبه .

Crû, *Cru* (F).
Growth, *Country* (E).

منطقة معينة تتميز بمجموعة بعض صفات محاصيلها الزراعية .
ج . كور .

٢٤٢١٢ - كورتل

Patrinia (S). *Patrinie* (F).
٢٤٢١٣ - كورس زورقي
جنس نباتات عشبية من فصيلة الناريدييات انواعها المعروفة
١٢ منها البري والزيتي والحوول والمعر . سوقها فروع
تعلو من ٣٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مركبة متعاقبة .
ازهارها نطاطية عشوية عثكوية التجميع . ثمارها بيضية
الشكل ، مستديرة القنابات . اشهر انواعه .

P. rupestris (S). *P. des rocaillies* (F).
P. siberica (S). *P. de Sibérie* (F).
P. scabiosaeifolia (S).
P. à feuilles de scabieuse (F).

Coreus scapha (S).
Coreus esquif (F).

حشرة خاضلة من فصيلة الكورسيات . جسمها متوسط

Coryza (F).

٢٤٢٢١ - كُورِيَّاتَا

هي التَّيَاب غِشَاء الْإِنْتِ .

Chorizema (S).

٢٤٢٢٢ - كُورِيَّاتَا *

Chorizema (F). Tango plant (E). Kōrismapflanze (D). Chorizema (I).

جنس نباتات عشبية وجبئية من البذرليات وفصيلة القرنيات. أنواره قليلة منتبهاً استرالياً، بعضها زراعي تزييني أشبه :

Ch. dicksonii (S).

كوريزمه ديكسونيه

Ch. de Dickson (F).

Ch. cordatum (S).

كوريزمه قلبية

Ch. en cœur (F).

Ch. varium (S). Ch. varié (F).

كوريزمه موشحة

Chorista (S). Choriste (F). ٢٤٢٢٣ - كُورِيَّاتَا

جنس اشجار حرجية من فصيلة الزيفيات. أنوارها المعروفة قليلة المدد، منتبهاً بعض المناطق الاسترالية أخصها أمريكية الوسطى والجنوبية || اشجارها كبيرة، داخلة، تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م. أوراقها زنادية، مركبة، خاسية الورديات البيضاء الشكل، الجالدة التصال. أزهارها غشوية، خاسية البتلات، عديدة الاسدية. ثمارها حقية، مستطيلة، تحوى عدة بزور يشها زغب نام، قصير التيلة، قلماً يصلح للزول. بزورها مأكولة بعد التحميص.

٢٤٢٢٤ - كوريسورف هي الصوب، اطلبه .

Courique (F).

٢٤٢٢٥ - كُورِيَّاتَا

جنس طير من البذرليات مشهور باسم أمانزوة، اطلبه .

٢٤٢٢٦ - كُورِيلُوس، جِلُورِيَّاتَا

Corylopsis (S). Corylopse (F).

جنس جنبات معمرة من فصيلة المشركات. أنواره عديدة. اصطلحها الصين واليابان. دعوها جلوزية لأنها قريبة الشبه من الجلوز. سوقها فراء. أوراقها عابلة. أزهارها سنبلية التجميع يستبق الاوراق. أزهارها صغيرة ملونة عريفة الرائحة. أشهر أنواره ما يلي .

٢٤٢٢٧ - كُورِيلُوس سُنْبِلِيَّاتَا *

Corylopsis spicata (S). Corylopse en épis (F).

جنية سبروتية تزيينية منتبهاً اليابان تملو نحو ١٢٠ سم. ساقها وفروعها زياء اللحاء. أوراقها بيضيه التصال، خلية الصفحة السفلى تملو من ٥ إلى ٨ سم. ساقها سباعية أو تساعية الأزهار تملو نحو ٥ سم. || أزهارها يستمر طول شهر آذار .

٢٤٢٢٨ - كُورِيلُوس صِيْنِيَّاتَا

Corylopsis sinensis (S). Corylopse de Chine (F).

شجيرة سبروتية تزيينية مهدا الصين تملو من ٣ إلى ٦ أمتار. ساقها فراء فناء. أوراقها أحليجية الشكل، نصلها يطول من ٨ إلى ١٠ سم. ساقها سباعية أو تساعية الأزهار تملو نحو ٨ سم. || أزهارها يستمر طول الربيع .

٢٤٢٢٩ - كُورِيلُوس قَلِيل الزَّهَر

Corylopsis pauciflora (S). Corylopse pauciflore (F).

جنية سبروتية تزيينية منتبهاً اليابان تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها تملو من ٣ إلى ٦ سم. وتعرض من

القد والتعطيط، شبه مربع البطن، مزواني الكوسل، يطول نحو ١٣ م. رأسها محرم. عظمها متدل الطول. أزهارها ناثرة. عيناها صغيرتان، بارزتان. زيانها مستطيلتان. كوسلها مزواني الجانبين || ثوبها الى الخنطى الاسمر الجذوي المواج. بطنها ملجذ بالاصفر. الصفحة السفلى من صدرها وبطنها الى الخنطى التبري المواج || مسرحها البراري حيث تكثر الاعشاب والازهار .

٢٤٢٢٤ - كُورِيَّاتَا *

Coraidea (S).

Coraidea (F). Coraidea (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح. اجناسها وأنواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق القطبية || اجسامها متباينة الحجم والاشكال. رؤوسها محرمية أو مربعة. قرونها الاستشعارية رباعية الفصل. صفحات صدرها السفلى لاقبسية التعديده المد لاستيعاب الاخطام || جميعها من الحشرات الخاضعة القليلة الاذى .

٢٤٢٢٥ - كُورِيلُوس

Eurypyga (S). Caurale (F). جنس طير من فصيلة الكورليات. أنواره المعروفة قليلة المدد. موطنها يشمل كامل أمريكا الجنوبية. اجناسها رقيقة. مناقبها جالسة مستعدة الاطراف. اجنحتها مستعرضة ذرية، اذناها مستطيلة القد عريضة الرافل. ارساغها ريفية ودقيقة. ارياشها رملية. أولها متراكبة الألوان الزاهية || اعرف أنواره وأشهرها كورل الشمس.

٢٤٢٢٦ - كُورِيلُوس الشَّمْسِ *

Eurypyga helias (S). Caurale soleil, Héron soleil (F).

طائر من الكورل طوله نحو ٤٤ سم. ثوبه مزرکش الألوان يجمع بين الاحمر والاصفر والاخضر والاسود والابيض والاسمر والخنطى. زوره ويحمره مع عظمها الى البياض الماجي. عنقه مؤذر بالاسمر والاسود. ظهره وسفاه مجعدة بالاصفر والاسود. افيئته وذنبه وقواده وأباهر ومناكه مغطلة بالابيض والاسود. صدره وبطنه الى البياض الخنطى. حدقة عينه حراء اللون، متقادة وساقه صفر || موطنه أمريكا الجنوبية، يألف الاغوار ويجاري المياه. قوته الحشرات على اختلاف أنواعها || يدثر في الاشجار المتشعبة القناء. يحبك مشه بالحنشيط ويبطنه بالسسل والطين. انشاء تحضن من بيضتين الى ثلاث بيضات نحو ٣ اسابيع .

٢٤٢٢٧ - كُورِيلُوسَاتَا *

Eurypygiae

فصيلة طير تجمع بين الخنطى وطول الساق. رؤوسها واعناقها واجنحتها بلشورية الشكل، مناقبها وسفاتها ثققلية. موطنها أمريكا الجنوبية. تألف الاغوار ويجاري الماء. قوتها الحشرات على اختلاف أنواعها .

٢٤٢٢٨ - كُورِيلُوس، كُورِيلُوسَاتَا

Tige souterraine bulbeuse (F). Corm (E).

نعت تعريفي توصف به الساق النوفسية الديماسية .

٢٤٢٢٩ - كُورِيلُوسَاتَا

Corydale (F).

هي التبرية، نبات من الحشائشيات، اطلبه .

٢٤٢٣٠ - كُورِيلُوسَاتَا

Corydaline (F).

مادة قلووية عادمة اللون مؤشورية البلورات تستخرج من جذور الكوريدال وإثراوند. تغلي عند ١٣٤ م.ع. وهي قليلة الذوبان في الماء، تذوب في الكحول الساخن وفي الكلوروفورم ولايتبر .



كورل الشمس



كوريزمه



كوريلوس سنبلية

٢٤٢٣٨ - **كُوسَج** هو القرش، اطليه .

Scyllorhinidae (S). **كُوسَجِيَّات** ٢٤٢٣٩

الكوسجيات فصيلة اسماك بحرية تدمي ايضاً غرائيات ، اطليها .

Corselet, Pronotum ٢٤٢٤٠ - **كُوسَل** ٥
هو في الحشرات الحلقة العليا من مقدم الجشش .

Cucurbita pepo ovesera (S). **كُوسِي** * ٢٤٢٤١
Courgette (F). Vegetable marrow (E). Elerkürbis, Kürbiss (D). Zucca, Z. da mangiare (I).

نبات زراعي من فصيلة القرعيات. ضرابه واصرامه عديدة. زراعتها مروية . ثمارها مستطيلة تؤكل مطبوخة . وتُزار الكوسى تحوي نحو :

٩٥,٠٠ ٪ من الماء
٥,٨٠ ٪ من المواد البروتينية
٥,٢٠ ٪ من المواد الدهنية
١٥,٢٠ ٪ من المواد السكرية
٢,٢٠ ٪ من المواد النشوية
٥,٥٠ ٪ من الالياف

وهي تحوي ايضاً بعض الاملاح المعدنية اعصها الكليسيوم والحديد مع القليل من الفيتامين « ١ » والقليل القليل من الفيتامين « ث » .

Chayote (F). **كُوسِي اِفَرَنْجِي** ٢٤٢٤٢
هو السكيوم ، نبات زراعي من القرعيات ، اطليه .

Apparier (F). To couple (E). **كُوش** ٢٤٢٤٣
كوش الطائر اثناء سفدها والكوش سفاد الطائر .

Conyza dioscoroides (S). **كُوش** * ٢٤٢٤٤
Conyze, Conlase, Conlisa (F). Ploughman's spike-nard (E). Dörrkraut (D). Conliza (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة المركبات . يجله تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . ساقها خشبية فراء . اوراقها منعقة اهليلجية ، نصلها ازغب البشرة على صفحته . ازهارها الى البياض الاخير || يستخرج منه بعض المواد الطبية الصحية وهو يحوي بعض العناصر الجعالية الفعالة التي تفكك بالاحشار اعصها البرابيث .

٢٤٢٤٥ - **كُوشَاد ، جَنْشِيَّات ، جَنْطِيَّات**
Gentiana (S). Gentiane (F). Gentian (E).

جنس نباتات جينية وعشبية من فصيلة الكوشاديات . انواعه نحو ١٢٤ معلها بري وبعضها زراعي وزيتي وبعضها طبي . يستخرج من جذور اكثر الانواع مر الكوشاد ونجاف الكوشاد وسباغ الكوشاد . ويؤثر بعضها تحوي نحو ١٥ ٪ من السكر الذي يستعمل منه بعد التخمير نوع من التقديد الجيد الصفث || اعرف انواعه واشهرها مايتع .

٢٤٢٤٦ - **كُوشَاد اُرْجَوَانِي** *

Gentiana purpurea (S). Gentiane pourpre (F).
نوع من الكوشاد وهو بجلة جبلية مبدولة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لائقة متعاقبة سائفة ، نصلها بطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٥ . ازهارها طريقة الارتكاز ، قصيرة الممايلق ، ارجوانية اللون ، سفاد الملاج . توجعها جبري الشكل سداسي التفصيص المستعرض || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢ الى ٤ . سنايلها ثنائية او ثلاثية الازهار || ازهارها يستمر طوال شهر آذار .

٢٤٢٣٠ - **كُورِيلُوسِ مُسْتَعْرِضِ الْبَتَلَات**

Corylopsis platypetala (S). Corylopse à pétales élargis (F).

جنية ثريينة مهدا الصين تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . سناها ميمرة القروع ، خلية اللحاء . اوراقها يفسية الشكل ، نصلها خلي الصفحة السفلى بطول نحو ١٠ سم . سنايلها خاسية او سبانية الازهار تملو من ٣ الى ٥ سم . بتلات ازهارها فأسية الشكل مستعرضة || ازهاره يستمر طول فصل الربيع .

٢٤٢٣١ - **كُورِيلُوسِ** (S). Coryllis (F).

جنس طير من التسلقات وفصيلة البقاريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها ماليزية وبجزر الزايج . ملجتها الجعاني جماعي الا في زين التساقد والحضانة . تألف الغابات . قوتها الثار على اختلاف اجناسها وانواعها || اجسامها صغيرة القد . اثوابها بجلة الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اذناها المستديرة الاطراف . ومن ميزاتها ايضاً انها تتدلى ككافائيش عند النوم .

٢٤٢٣٢ - **كُوز** ٥

Strobile (F).
Strobile, Pine-cone (E).
نمت تعريفي يطلق على الثار الكرزية المخروطية الشكل ، الورقية او اللبغية القشور .

٢٤٢٣٣ - **كُوز كَنْدَم**

Mangoustancier (F).
هو جوز جنم ، اطليه .

٢٤٢٣٤ - **كُوزَن**

Daine (F). Doe (E).
هي انثى الايل الاسمر او الاريل .

٢٤٢٣٥ - **كُوزُو** ٥

Trichosurus (S).
Trichosure, Kousou (F). Kousu (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات وفصيلة الفلنجريات . موطنه استرالية . تألف الاجراع اعصها احراج الاراكليتيوس . قوته الاوراق والازهار ويبيض العصائير والعصائير والاحشار . يسرح في الليل ويرقد في النهار || جسمه يحيم جسم السور البري . رأسه مخروطي الشكل . اذناه ناشزتان . غوامه خاسية الاصابع متعددة الارتفاع || اثناء رباعية الاختلاف . له نوعان الثعلبي والكلبي .

٢٤٢٣٦ - **كُوزُو تَعْلِي** ٥

Trichosurus vulpecula (S).
Trichosure renard, Kousou renard (F).

نوع من الكوزو شكله شكل الثعلب ، حركاته حركات الثعلب . اذناه كبيرتان قائمتان . ذنبه جمل الصفوف المستطيل . ثوبه الى الصهوة الشهاب يملوها موج صناعي يبق في الظهر ويغير في الاطليل والبلن .

٢٤٢٣٧ - **كُوزُو كَنْبِي** ٥

Trichosurus caninus (S).
Trichosure canin, Kousou canin (F).

نوع من الكوزو لا يختلف عن الثعلبي الا باذنيه المدونين ويشكل الرأس الذي يشبه رأس الكلب وبذنيه جبري الصفوف . ثوبه خال من الموج الصناعي تملو مشعة سمراء .



كوسى



كوش



كوشاد ارجواني

٢٤٢١٧ - كُوشَاد أَصْفَر * ، جَنْشِيَانَا صَفْرَاءُ ،

جَنْشِيَانَا صَفْرَاءُ ، دَوَاءُ الْحَمِيَّةِ

Gentiana lutea (S). *Gentiane jaune*, *Grande gentiane* (F). *Yellow flowered gentian* (E). *Gelber Enzian* (D). *Gentiana gialla*, *G. maggiore* (I).

نوع من الكوشاد وهو جنبة معمرة جصاصة طيبة وصناعية تملو من ٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها لاطئة متقابلة تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٥، فصلها طسي الصفحة جميل الخفصار. أزهارها ضخمة التجميع، أبطية وتاجية الارتكاز، مستطيلة الماعلي، خاسية البتلات التجميعية الشكل والانتشابه، لونها إلى الصفرة || جلورها وافرة المواد الطبية والصباغية والسكرية. أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٤٢١٨ - كُوشَاد رَيْسِي * ، *Gentiana verna* (S).

Gentiane printanière (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية رية مبلولة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها صغيرة اللثة تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ١ سم. أزهارها طرفية فردية سمجونية اللون. تويجها خماسي التفصيص يطول نحو ٣ سم. || أزهارها يستمر من آذار إلى تموز.

٢٤٢١٩ - كُوشَاد صَلِيسِي الْوَرْدِي

Gentiana cruciata (S). *Gentiane croisetie* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية مبلولة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها خمسية رباعية متقابلة تملو كالصلب. فصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض نحو ٢ سم. أزهارها أبطية الارتكاز ضخمة التجميع كثيرة المدد زرقاء اللون. تويجها رباعي التفصيص || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

٢٤٢٢٠ - كُوشَاد لَبْنِي * ، جَنْشِيَانَا لَبْنِيَّةُ ،

جَنْشِيَانَا لَبْنِيَّةُ

Gentiana asclepiadea (S). *Gentiane-asclepiade* (F). *Milkweed gentian*, *Willow gentian* (E). *Würger-enzian* (D). *Gentiana asclepiade* (I).

نوع من الكوشاد وهو جملة معمرة طيبة وصناعية تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها لاطئة متقابلة سنانية الشكل؛ فصلها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٣ إلى ٥ سم. عروقه بارزة ثلاثية أو خماسية المدد. أزهارها سمجونية اللون مرقطة بالبنفسجي. جلورها وسطحها غزيرة العصارة اللبغية المسماة || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول.

٢٤٢٢١ - كُوشَاد مَقِير

Gentiana acaulis (S).

Gentiane acaule (F).

نوع من الكوشاد وهو نجمة ترينينية مقرّة. فروعه تملو نحو ١٠ سم. أوراقها لاطئة متقابلة تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. أزهارها كبيرة اللثة، فردية التجميع، تملو من ٥ إلى ٦ سم. لونها إلى الزرقاء السمجونية || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢٤٢٢٢ - كُوشَاد مَهْدَب * ، *Gentiana ciliata* (S).

Gentiane ciliée (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية سبر رية تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ساقها فرعاء رباعية التفصيص. أوراقها لاطئة متقابلة، فصلها ضيق الصفحة وحيد العروق. أزهارها زرقاء اللون، طرفية الارتكاز، فردية التجميع، تطول من ٤ إلى ٥ سم. تويجها رباعي التفصيص، مهدب الختار والخالطة. أزهارها يستمر من آب إلى تشرين.

٢٤٢٢٣ - كُوشَاد بَيَات ، جَنْشِيَانَا بَيَات ،

جَنْشِيَانَا بَيَات

Gentianaceae (S).

Gentianacées (F). *Gentianaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات الثمالة. أنوعها نحو ٥٠٠ تنتمي إلى ٦٠ جنسًا. جميعها أعشاب ورجينات صغيرة اللثة. أوراقها لاقبسية الشكل والانتظام. أزهارها غشوية لاقبسية التجميع يكثر في ألوانها الأزرق والأرجواني.

٢٤٢٢٤ - كُوشَر * ، *Pluchea* (S).

Pluchée (F).

جنس نباتات رية معمرة من فصيلة المركبات. أنواعه نحو ٢٠ أصلها المناطق الحارة في جميع أصقاع العالم. نباتاته غشبية أو جبلية. أوراقها متعاقبة. أزهارها عذقية التجميع.

٢٤٢٢٥ - كُوشَشَة ٥ ، *Dendrométrie* (F).

Forest mensuration (E).

تقدير أشجار الحرج مع أبعادها وأشكالها وأعمارها ووسائلها الحاضرة والمستقبلية.

٢٤٢٢٦ - كُوشِيل ، *Cochenille* (F).

هي القرمزية، أطلها.

٢٤٢٢٧ - كُوشِيل أَسْتْرَالِيَّةُ

Cochenille australienne (F).

هي القرمزية الأسرالية، أطلها.

٢٤٢٢٨ - كُوشِيل الْبُرْتَقَال الْبَيْضَاءُ

Cochenille blanche des orangers (F).

هي قرمزية البرتقال البيضاء، أطلها.

٢٤٢٢٩ - كُوشِيل الْبُرْتَقَال الْسَوْدَاءُ

Cochenille noire de l'oranger (F).

هي قرمزية البرتقال السوداء، أطلها.

٢٤٢٣٠ - كُوشِيل الْفُتَّاح

Cochenille du pommier (F).

هي قرمزية التفاح، أطلها.

٢٤٢٣١ - كُوشِيل الْتِين

Cochenille du figuier (F).

هي قمية التين، أطلها.

٢٤٢٣٢ - كُوشِيل الصَّبَار

Cochenille du nopal (F).

هي قرمزية الصبار، أطلها.

٢٤٢٣٣ - كُوشِيل الْلَكْ

Cochenille de la laque (F).

هي قرمزية لك، أطلها.

٢٤٢٣٤ - كُوشِيل الْوَرْد

Cochenille de l'amandier (F).

هي قرمزية اللوز، أطلها.

٢٤٢٣٥ - كُوشِيل الْخَيْل

Cochenille du dattier (F).

هي قرمزية الخيل، أطلها.

٢٤٢٣٦ - كُوشِيل الْوَرْد

Cochenille du rosier (F).

هي قرمزية الورد، أطلها.



كُوشَاد أَصْفَر



كُوشَاد رَيْسِي



كُوشَاد لَبْنِي



كُوشَاد مَهْدَب



كُوشَر

٢٤٢٧٧ - كُوفَانِي ٥ Sabulicole (F).

نعت تعريفي يطلق على كل دويبة أو حشرة أو نبات يعيش في كوفان البرمل وكتبانه .

٢٤٢٧٨ - كُوفَة * Cuphaea (S).

Cuphée, Cuphée (F). Cigar flower (E). Höckerkelch (D). Cufea (I).

جنس نباتات عشبية خشبية من فصيلة الخناثيات . أنواعه نحو ٨٠ أصلها البلاد الحارة الأمريكية . أوراقها صفيرة متقابلة . أزهارها محورية الارتكاز ملونة تتميز بأحاديث كؤوسها وبكبر بتلاتها العليا || اعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٤٢٧٩ - كُوفَة بَنَفْسِيَّة Cuphaea cyanea (S). Cuphée violet (F).

نوع من الكوفة التزيينية المعمرة تملو نحو ٢٠٠ سم . ساقها زياء . أوراقها متقابلة بيضية ، نصلها ذات الزام الاخير . كؤوس أزهارها خلية البشرة . أرجوانية الانتساب صفر الجسم . بتلاتها ثنائية ، كبيرة القد بنفسجية اللون . أزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٢٨٠ - كُوفَة سَلْفُونِيَّة Cuphaea miniata (S).

Cuphée à pétales vermillon (F).

نوع من الكوفة التزيينية المعمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها زياء فراء . أوراقها متقابلة قصيرة الاضلاع . نصلها ضيق الصفحة ، خلي البشرة . كؤوسها الزهرية عشارية التستين تطول نحو ٣ سم . بتلاتها سلفونية اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

٢٤٢٨١ - كُوفَة سَنَابِيَّة Cuphaea lanceolata (S).

Cuphée à feuilles lancéolées (F).

نوع من الكوفة التزيينية المحلية تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها وفروها منتصب . أوراقها سنانية ، متقابلة تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها خلي البشرة ناشز العروق . كؤوسها الزهرية كثيرة الاحدياد ، بتلاتها مستديرة متجمعة وريدية أو أرجوانية اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢٤٢٨٢ - كُوفَة نَارِيَّة Cuphaea ignea (S).

Cuphée rouge-feu (F).

نوع من الكوفة التزيينية المعمرة تملو نحو ٣٠ سم . ساقها وفروها مغضلة الزوايا . أوراقها متقابلة ، اهليجية ، مدبية . كؤوس أزهارها نارية اللون ، سداسية التستين ، مستطيلة المعاليق || أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢٤٢٨٣ - كُوفَة * ، كُوفَة Erythroxylon coca (S). Cocaier, Coca (F). Coca, Spadic busch (E). Cocastrauch (D). Coca (I).

نبات بري وزراعي من الزكوايات . مهدد البلاد الحارة الاسيوية وقد عثت زراعتة بعض الاضغاق الحارة الاسيوية اخصها الهند وبرلنديب . غروب عديدة ، جميعها جنباية معمرة تعيش من ٤٠ الى ٦٠ سنة وتملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . سوقها يغيض اللحم . أوراقها متقابلة معتقة اهليجية مدبية . نصلها بارز الضلع والسرور واضح الشرايين ، اخضر الصفحة العليا ، زيتي السفلى . أزهارها محورية الارتكاز ، صفيرة القد صفراء اللون . ثمارها نورية مستطيلة الشكل عابطة الامرار || يستخرج من أوراقها بعد قفلها ويغليها مادة قلووية غندرة طبية تدعى « كوكاين » .

٢٤٢٧٧ - كُوشَنِيل سَان جُوزِيه Cochenille de San José (F).

هي القرمزية الفتاكة ، الطلها .

٢٤٢٦٨ - كُوشَنِيل طُوطِيَّة Cochenille floconneuse de la vigne (F).

هي قوزمية الكرم الحمراء ، الطلها .

٢٤٢٦٩ - كُوشَنِيل عَنَبَاء Cochenille farineuse de la vigne (F).

هي القرمزية الفداء ، الطلها .

٢٤٢٧٠ - كُوشِيَّة ، هَيْثَم Kochia (S).

Kochia, Belvédère (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة السرمقيات . أنواعه نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها تزييني هربي الشكل . سوقها فراء فناء منتصبه تملو من ٤٠ الى ٢٠٠ سم . أوراقها متعاقبة مشتركة غطية يكثر فيها الهديب ، تبو غصراء اللون صفراء الملاج ثم تحمر مع الخريف . أزهارها محورية الارتكاز ، صفيرة القد ، قليلة العدد || وهي تستعمل في صناعة الكانكس ولدود القز كالشع .

٢٤٢٧١ - كُوشِيَّة هَرْمِيَّة Kochia-cypris (F).

هي الهيمس الهربي ، الطلها .

٢٤٢٧٢ - كُوشِيلِيَس Cochylys (F).

هو الغنوط ، الطلها .

٢٤٢٧٣ - كُوشِيلِيَس الكُوفَة Cochylys de la vigne (F).

هو فائلة العنب ، الطلها .

٢٤٢٧٤ - كُوع RADIUS

هو العظم الاسفر من الزند الاصل .

٢٤٢٧٥ - كُوعَر ٥ Colon (S).

Colon (F). Colon (E).

جنس حشرات من فصيلة الكوريات ورثة غدييات الاجنحة . أنواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٤ م . رؤوسها مستعرضة . عيونها صغيرة بارزة . تأثيرها وتوكمها وملابسها نظامية . قرونها الاستشارية قصيرة ، دبوسية الشكل . كواسلها عريضة . امحادها لاحفة . كواسلها وامحادها كثيفة الحمل النائم . قوائمها صغيرة . اثوابها تراوح من السرة الى السواد القاتم || تأت الحفول والذباب . تسرح في الليل . طيراتها خفيف الحركة . تعيش تحت الحجارة والجافة . بعضها قانص والبعض الاخر دامن .

٢٤٢٧٦ - كُوعَرِيَّات ٥ Colonidae (S).

Colonidae (F). Colonidae (E).

فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، اهليجية الشكل ، تطول من ٣ الى ٥ م . رؤوسها مستعرضة . عيونها بارزة . تأثيرها نظامية . قرونها الاستشارية قصيرة ، رباعية الفصل ، دبوسية الشكل . كواسلها عريضة . امحادها لاحفة ، خلية القشار || جميعها مفترمة ودائمة . تعيش تحت الحجارة والجافة . تسرح في الليل . طيراتها خفيف الحركة || اشهر اجناسها الكوير .





كوكال السباح



كوكاليس



كوكال البحر



كوكية كوكية



كوكية



كوكلة الشبحان

صغيرة. سوقها كثيرة الفروع. عراجيدها متشعبة. اوراقها غشائية شبه متصالية يملؤها تحبيب متتابع مستنفل الوسط الاخف، مستنق الاطراف، يبدو كجمجمة من الكوكال.

٢٤٢٩٢ - كوكية

Astrantia (S).
Astrance (F). *Astrantia (E).*
جنس نباتات برية وزراعية معمرة من السنكوليات وفصيلة الخبيثيات. انواعها قليلة جميعها بجيلة وجنبية. اوراقها مقصصة. ازهارها صوانية التجميع، تبدو كالنجوم بيضاء اللون او وردية. جلورها طيبة سهلة. اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢٤٢٩٣ - كوكية خرقية الورق

Astrantia helleborifolia, A. heterophylla, A. pontica, A. trifida (S). *Astrance à feuilles d'Elébore (F).*
نوع من الكوكية وهي بجيلة برية وتزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اروبها مدادة، ساقها منتصب. اوراقها ثلاثية الفصوص السنانية المسنة المحدية. قلاوة صلبها الزهري مؤلفة من ١٢ الى ١٣ قنابة مهدبة الاطراف. ازهارها وردية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٢٩٤ - كوكية صغيرة

Astrantia minor (S). *Petite astrance (F).*
نوع من الكوكية البرية المبولة وهي بجيلة صغيرة القد تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اروبها مدادة، ساقها مستنقة. اوراقها خماسية او سباعية او تساعية الفصوص الضيقة التي تطلو من ٢ الى ٤ سم. وتقرض من ٤ الى ٨. اصوبها الزهرية صغيرة القد قطرها نحو ١ سم. ازهارها الى الياض الاخير. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٤٢٩٥ - كوكية كبيرة

Astrantia major (S). *Astrance majeure, Grande astrance, Sanicle de montagne, S. femelle (F).* *Larger astrantia, Master wort (E).* *Grosse Sternoldole, Meisterwurz (D).* *Astrantia maggiore, Sanicola femina (I).*
نوع من الكوكية الطيبة والتزيينية وهي جنبه صغيرة القد تملو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. جلورها طيبة سهلة. ساقها قوية منتصب. اوراقها كبيرة مستعرضة خماسية او سباعية او تساعية الفصوص الاهليلجية الشكل كهيئة الخار. اصوبها الزهرية كبيرة القد، ازهارها بيضاء اللون، قناباتها وردية. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

Sillquaria (S).
Sillquaire, Ténagode (F). *Sillquaria (E).*
جنس حيوانات بحرية من الرعويات مفديات الارجل وفصيلة المحنوليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة. اصداؤها انبوبية مستطيلة ملوكة. قطر الانبوب ودوره اللولبية واسطاخته تختلف مع الانواع.

٢٤٢٩٦ - كوكية

Cucullia absinthii (S).
Cucullie des armoises (F). *Cucullia absinthii (E).*
حشرة من السفقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية. فراغتها جارية قوتها رقيق الازهار. مرثتها خاملة واشعة تعيش على

٢٤٢٩٧ - كوكلة الشبحان

Cucullia absinthii (S).
Cucullie des armoises (F). *Cucullia absinthii (E).*
حشرة من السفقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية. فراغتها جارية قوتها رقيق الازهار. مرثتها خاملة واشعة تعيش على

٢٤٢٩٨ - كوكال

Centropus (S). *Coucal (F).*
جنس طير من فصيلة البقويات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اصنافها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسترالية. اجسامها متوسطة القد او كبيرة. اطوالها تراوح من ٤٠ الى ١٠٠ سم. جميعها من الطيور المستقلة القليلة الطيران. تتميز بامتدالة اذنانها وبالطوارها السفهاء المراج. اجنتها قصيرة. مناقيده قوية، عنبية الافاك العليا. قوتها يشمل كل ما دب على الارض من اخبث الاناعي الى الغطاء والناكبات والمقارب والديدان. ذكورها واناثها تتناوب على حضان البيض الذي يستمر نحو ١٥ يوما. اشهر انواعه. كوكال السنغال وكوكال السباحات.

٢٤٢٩٥ - كوكال السنغال

Centropus senegalensis (S). *Coucal du Sénégal (F).*
نوع من الكوكال. اصنافه تمتد من السنغال الى السودان. يألت الاذغال والاجام والغياض. ينساب بين الاعشاب ويتسلق الاشجار بشفقة. جسمه يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسه وعقته والقسم الامامي من ظهره الى السواد الدامس يملوه مراح ازرق اسفع. جناحاه والقسم الخلفي من ظهره الى الصخرة الشفراء المراج. افنيكه وذنبه الى السواد المنمش بالاصهب. بطه الى الياض الاخير. قوته الخشرات والجنادب والمقارب والاناعي الصغيرة.

٢٤٢٩٦ - كوكال السباحات

Centropus rufipennis (S). *Coucal des haies (F).*
نوع من الكوكال. اصنافه تمتد من شط العرب الى الهند والهند الصينية. يألت المناطق الرطبة والاجام والغابات. يقترب من المزارع ويحتم على السباحات. يملو بسرعة ويتسلق بشفقة ويغير يده. جسمه يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبه الى السواد الازرق المراج. بطه الى الصخرة الخشنة. افنيكه احمر. ذنبه الى الجوزة. قوته الاناعي والغطاء والوزع والمقارب والجراد. يدخن عشه بالخشيش الاخضر في الاشجار القليلة الارتفاع.

٢٤٢٩٧ - كوكاليس

Caucalis (S).
Caucalide, Caulicler, Caulcaine (F). *Caucalis, Bear parsley, Hedge parsley (E).* *Hafoldole (D).* *Caucalis, Lappolina, Seccia (I).*
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخبيثيات. انواعها المعروفة ١٨ منها البراري والاحراج.

٢٤٢٩٨ - كوكالين

Cocaine (F). *Cocaine (E).*
شبه قلوي نباتي يستخرج من اوراق الكوكال يستعمل في الطب للتخدير الموضعي.

٢٤٢٩٩ - كوكب افريقية

Aster d'Afrique (F).
هو الشبيهة، نبات تزييني، اطلبه.

٢٤٢٩٠ - كوكب البحر، صليب البحر، كلف مرزم

Asterias (S).
Astérie, Etoile de mer (F). *Asterias, Starfish (E).*
جنس حيوانات مائية من فصيلة كوكاب البحر. انواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم.

٢٤٢٩١ - كوكية، لومتاريا

Lomentaria (S). *Lomentaire (F).*
جنس نباتات بحرية من الخبيثات احمر. انواعها المعروفة ١٢ اصنافها بحار البلاد المعتدلة الحارة. كلالها

يتميز بقصر منقاره الاعقف الثلاثي التفريش . اجنحته متوسطة القد منفرجة . ذيله مستدير قصير || انواعه عديدة نحو ٢٠ موطنها البلاد الامريكية . تألف البطائح والسهول قوتها الحبوب والثمار والخضراوات || اناته تبيض من ١٤ الى ٢٠ بيضة تحضنها وحدها في افصوص تدثنه بالخشيش بين الادغال والاشجار || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤٣٠٤ - كُولَانَة عَمِيرِل

Colin de Gambel, Caille à casque (F).
طائر من الكولان يتميز ببقعته المولفة من ٦ ارياش . ثوبه متراكب الالوان فيه الابيض والاصفر والاحمر والاحمر والازرق والاسود || يألف المناطق الوعرة قرب مجاري الماء .

٢٤٣٠٥ - كُولَانَة فِيرَجِينِيَّة

Colin de Virginie (F).
طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . ظهره الى الجوزة المؤذرة بالاسود والاصفر . رأسه عديم القزعة . يألف المراعي والحقول المزروعة وجوانب الرياض .

٢٤٣٠٦ - كُولَانَة كَلِفُورْنِيَّة

Colin de Californie (F).
طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . رأسه متوج بقرعة مستطيلة الريش الاحمر القمعة || يألف الحشبات والادغال والحقول المزروعة .

٢٤٣٠٧ - كُولَانَة مَسِينَا

Colin Masséna (F).
طائر من الكولان . ثوبه اسود اللون يعلو توتيم ابيض . يألف الرياض ومجاري الماء .

٢٤٣٠٨ - كَوَلَب °

Cholæpus (S).
Cholape, Nan (F).
جنس حيوان من فصيلة الدبابات المتسلقة البطيئة الحركة . طوله يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم . قوائمه ثنائية الاظافر المتسلطة المنقطة . ثوبه كثيف الورب لونه الى الصبغة العاقبة . يعيش على الاجنار . قوته البرام والتواشي والتهار . اثناء تضع جروا واحدا ترشعه وتحمله حتى الطعام || له نوعان كولب الامازون وكولب كولوبيو .

٢٤٣٠٩ - كَوَلَبَة °

Calappa (S).
Calappe (F), Calappa (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الكوليبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة قلنسوية الشوزن بحبة الدروع عرصة الانفواء . ارجلها دقيقة . ملاقطها كبيرة مسطحة متائلة || لموها كاعة الصنفت لا تؤكل || اشهر انواعها الكولبية المبحجة .

٢٤٣١٠ - كَوَلَبَة مُحَبَّبَة °

Calappa granulata (S). Calappe granulé (F).
يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط . تعيش على رمال الشواطئ المغمورة بالماء .

٢٤٣١١ - كَوَلَبِيَّات °

Calappidae (S).
Calappidés (F), Calappidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل المخرمات . اجناسها وانواعها المعروفة

اوراق المركبات وازهارها واعمصها الشبان || جسمها متوسط القد يعلو نحو ١٦ م . بسطها نحو ٤٢ م . رأسها حنطلي الثوب . عينها كيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها حنطلي اللون اصفر المخرج . بطنها الى الخنطلي الاشفتح المراج يعلو خط ثجبي اسود يعطى كامل البطن عند الذكر ويضبط نحو ثلثيه عند الانثى || وراشها عند الشقين الى الخنطلي الاصفر تملوه في الزوج الامامي زركسة وصفقة وتزاويق تراوح من الصافي الى الاسود || لها جبل واحد في الحلق . تظهر القراصة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعامل بل ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتع المنك لطفها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الخضار الباهت يعلو تمشيج اريد ويجندع معرض اسود يمتد من السكة الثالثة الى التاسعة . رأسها اسود . مدها الى اربعة الخضراء . وارجبها الى السمرة || طول الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة حيث تنغفن السرعة ملتصقة بجلباب من اللبن .

٢٤٢٩٨ - كَوَكُو مُدَّهَب (F). Coucou doré

طائر مشهور باسم هوهو ، اطلبه .

٢٤٢٩٩ - كَوَكُوْلُس ° (S). Cocculus, Cebatha

Coquecul, Cebathe (F).
جنس نباتات عارشة برية معمرة من فصيلة القريرات . انواعه نحو ٢٠ . جميعها طيبة مهددا المناطق الاستوائية . سوقها متسلقة . اوراقها متعاقبة لاقبسية الشكل . ازهارها عتقودية التجميع ثنائية المسكن . ثمارها نوية لا قيسة لها .

٢٤٢٠٠ - كَوَكَبِيَّات (S). Erythroxylaceae

Erythroxylacées (F). Erythroxylaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكوكا .

٢٤٣٠١ - كُولَا ° ، كُولَة

Seerculia acuminata (S). Colatier, Kolatier (F). Colanut, Kola-nut tree (E). Kolabum, Stinkbaum (D). Cola, Noci del Sudan (I).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة البرازيات . انواعه قليلة اعطانها المناطق الاستوائية الافريقية . اشجارها تملو من ١٠ الى ٢٠ م . سوقها غبراء اللون مشققة القشور . اغصانها متبسطة متدلية . اوراقها معتقة متعاقبة اعليجية ؛ نصلها جامد المسحة ، بارز البروق ، مستطيل المتى ، مدبب الطرف . ازهارها ذكورية او عنثوية ، الخنثوية عتقودية التجميع بحورية الارتكاز ، تكون على الانفاد التي بلغ عمرها ثلاث سنوات او اكثر . ثمارها قرون نولية مبطلة تنفذ من لوزتين الى عشر لوزات كلوية الشكل جامدة المادة البابية التي يراوح لونها من الاحمر الى الابيض الاصفر ، وهي مأكولة مغذية تنشط القلب وتنبه الاعصاب وتدفغ التعب والهرم .

٢٤٣٠٢ - كُولَان

Kaolin, Argile blanche (F).
Kaolin, Porcelain clay (E).
هو الاسم الصيني والبلعي للصلصال الحر الاغبر اللون الذي يستعمل في صناعة الخزف وغيرها .

٢٤٣٠٣ - كُولَان

Colins (F).
American partridges (E).
جنس طير من عماره الحجلبيات وفصيلة العليوبيات .



كوكولس



كولا



كولانة كليفورنية



كولب



كولبة



كولج أرمك

الطول ، اسمر الخطم الاغل ، اصفر الاسفل . ساقه معتدلة الطول سوداء اللون . حلقه عينه الى الحمرة الياقوتية || يألف الاطعام الكثيفة ويقرب من الاماكن الاملة لكنه كثير الوجل والخلد || قوته الحشرات واسارهم والجراد والبراغ والنمل والثمار البرية والزراعية ومنها الكرز والتين || الاثني ثدثن عشاها في الاشجار الرقيقة اللبافة الطل وتبيض من ٢ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٤٠ يوما .

٢٤٣١٨ - كَوَمْ
Sallie, Colt, Monte (F).

زو ذكر الحيوان عل انشاء وقد شاع استعمالها في الحيوان والدواب .

٢٤٣١٩ - كَوُومَرُونَكْ * ، سَرَّابِيَّة *

Coumarouna odorata, Dityerx odorata (S). Fève Tonka, Sarrapia (F). Tonka-bean tree (E).

شجرة برية وزراعية من فصيلة القرنيات . مهدا البلاد الامريكية الحارة تكثر في فنزويلا والغويان . يستخلص من بزورها اللبافة ، يمدقها بالروم ، مادة الكوبرين الشائعة الاستعمال العطري والتبني || وهي كبيرة اللقد فارشة الانفسان اوراقها متعاقبة مركبة . ورفقها برية التجميع اذنيها ؛ فصلها جامد الصفحة يضيي الشكل . ازهارها عمورية الانكاز . ثمارها شامية الشكل لبيفة السوذق تحوي عصية مبطلة طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض نحو ١ سم . ثمرتها قليلة الشائعة ، سريعة التجميع ، لونها الى السمرة البنية اللامعة ؛ لبها جامد المكسر ، اصفر اللون .

٢٤٣٢٠ - كَوُومَرِين *

Coumarine (F).

Coumarin (E).

هي لكتون الحامض الكوبريني ؛ مادة متبلورة يضاء اللون مستحبة العرف العطري تذيب في الماء والكحول . تستخرج من الكوبرينه والهندوق ... وهي شائعة الاستعمال العطري تدخل في صناعة تعطير وتجميل التبوغ الاسريكية .

٢٤٣٢١ - كَوُومَلَكْ * ، كَلْدَمْ
Cumul, Pluralism

الكولة هي الجمع من كويل جمع وكلد كذلك .

٢٤٣٢٢ - كَوُومَنَجَة *

Cumingia (S).

Cumingie (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات فصليات الحياض وفصيلة المتحريات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار امريكية الجنوبية اغصها الشيل واليردر || اصداها شبه بريمية الشوزن ، متساوية المتوازي لا متساوية الاضلاع ، مائلة السطوح البيضاء اللون الموضحة بالجلاوي .

٢٤٣٢٣ - كَوُومَة *

Coumia guianensis (S).

Couma, Coumier (F).

شجرة برية راتنجية دماعه من فصيلة الدفليات . منبتها حراج الغويان || ساقها معتدلة الارتفاع فراء . فروعها متصبية بحمرة اوراقها متعاقبة ، مثلبة ، جامدة النصال المرطاء . ازهارها عمورية الانكاز طرية || يستخرج من ساقها بالغز عصارة راتنجية لها استعمالها الصناعي .

٢٤٣٢٤ - كَوُومِيَتْ *

Cometes (S). Comètes (F). جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة النونيانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نيوت فياني الشرق الاوسط وافريقية الشرقية || ساقها فراء ، شكلها عنقودي

متوسطة العدد . اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة اللند ، لاثياسية الشكل تتميز بافواها المحرمة وبدروعها المهدبة السطوح العلوية ، وبلاقطها الضلعية || اشهر اجناسها الكولة والذبالة والمتشوة .

٢٤٣١٢ - كَوُولَجْ أَرْمَكْ *

Phascolarctus cinereus (S). Phascolarctus cendré, Koala cendré (F). Native bear (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الجرابيات الشجارت وفصيلة الفلنججرات . موطنه بعض مناطق استرالية اغصها الشرقية . يألف الغابات . يسرح في الليل ويبست في النهار . قوته اوراق الاشجار وزعماتها وزعارها وممارها || جسمه بطول نحو ٥٠ سم . ويرتفع نحو ٣٣ سم . رأسه اقلس القدم قريب الشبه من رأس الدب . قوائمه قصيرة ، خاسية الاصابع ، كبيرة الاظافر المهجنة الحادة الاطراف || ثوبه الى الرمكة ، يمتق في الظهر ويتر في البطن . الاثني رباعية الاخلاف || لحمه مأكول وفروته مرغوب فيها .

Coulomb

كُولُوبْ ، كُولُوبْ

هو ما يصرفه بالثانية الجبري الكهربي التي تبلغ قدرته ١ أمبير .

٢٤٣١٤ - كَوُولُوبِيَّة *

Collybia (S). جنس فلور من الفارقيونيات . انواعه عديدة تركيب عرضاً جلور بعض النباتات الحرجية دون ان تؤذيها .

٢٤٣١٥ - كَوِيلَا الدجاج ، كَوِيلَا الطير ، هَيْسَافَ الطير

Pasteurellosis avium (S). Choléra des poules (F).

مرض وبائي يصيب الدجاج فيفسي عليه اذا لم يكالنج وقائيا بالتطعيم الى الاصابة .

٢٤٣١٦ - كَوِيلَزَة *

Colisa (S).

Colisa (F). Colisa (E).

كوليز هو الاسم الهندي البنغالي . جنس اسماك نهريّة من شاكات الزعانف وفصيلة الطيوريات . انواعها المعروفة عشرة اعطائها انهر الهند وجبجرات ومنافقه || اجسامها شبه اهليلجية ، صغيرة ، لا تتجاوز ٢٠ سم . رؤوسها مستدقة الاعظام الصغيرة الاشدق . زعانفها الظهرية والبطينية مستطيلة ، متأثلة . زعانفها الحوضية شبه عيطية . الذيلية كبيرة مقنونة . اثنائها الى الحصار الباهت يعلو تجذع مغرّض اريد اللون ، نحاسي المواج . بطونها الى البياض الاغبر || ذكورها تحضن السري في عشاش شبه جرابية الشكل تحببها بين النباتات المائية || غوبها مأكولة متوسطة الصف .

٢٤٣١٧ - كَوِيلِكُو امريكي *

Coccyz americanus (S). Coulicou américain,

Coucou à bec jaune (F). Yellow-billed cuckoo (E).

طائر من القواطع من فصيلة القيقوبيات . موطنه امريكية الشمالية وكندا . يرسل في اواسط الخريف الى جزر الانتيل ويعود في اوائل الربيع || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٠ سم . بطنه نحو ١٤ سم . ثوبه العلوي الى الكهبة الزرداء تملؤها مهابات تراوح من الشبهة الى الخضرة والزرق . صدره وبطنه الى البياض الاغبر . لواحف الاجنحة الى الشبهة . زكاه بلون الزرد اما ظاهر افيكه مع الزلايل فال السواد التام باستثناء الاطراف البياض . قدته زناجي المستطيل وعريض . منقاده معتدل



كوليز



كوليكو امريكي



كومرونه (عصية)



كومتة

الصقريات. موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى الشرق الاوسط. ظهره واهاليه الى الشهية السوداء. بطنه وخوافيه الى البياض الاخير. هيته كالباقوت. منقاره اسود، ساقه الى الصفرة الخضراء. قوته القواضم والحشرات يصيدها عند الشروق وقرب الغروب || يذئ في الاشجار الرقيقة. اثناء تقصع من فئتين الى اربع تحضنها اربعة اسابيع.

٢٤٣٣٤ - كَيْتُونِيَّات
Cautérisation (F).
Cauterization (E). هو احراق الجلد بجديدة ونحوها.

٢٤٣٣٥ - كَيْتُونِيَّات
Pélican (F). هو البجع، اطلبه.

٢٤٣٣٦ - كَيْتُونِيَّات
Accommodat حالة حيوان أو نبات كَيْتُونِيَّات عوامل البيئة المفروضة دون ان تجعلها وراثية.

٢٤٣٣٧ - كَيْتُونِيَّات * حَارْدُ الْمَتَاعِ
Myopotamus (S). Myopotame coypou, Coypou, Castor des marais (F). Myopotamus, Coypu (E).
حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدافيات. موطنه بعض اصقاع امريكا الجنوبية اغصها الاقاييم المعتدلة الحرارة. يألف المئات وضفاف البحيرات وبحاري الماء. ملجئه الحياتي زوجي || جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٥ سم. رأسه شبه مكور الشكل، مقطوع الخلف. عيناه واذاها صغيرتان، خاسية الاصابع. ذنبه مردي الشكل غليظ القاعدة، مستدق الطرف، هليبي الوبر في الزايم الاول والثاني، حرشفي الحلق في الزايم الاخيرين. وبره لبد، قصير، ناعم. ثوبه في الرأس والظهر الى السمرة الكستنية. وفي البطن الى السمرة الخنطية. خاصرته الى الشقعة || قوته المواد النباتية والاسماك والرخويات || حجرة وجار يتحفرة بالتربة. الاثني تقصع من ٨ الى ٩ ادراس كاسية باصرة تسرح وتقوس في الماء بمراس اسبوع || فروته جيدة الصفت مرغوب فيها ولحمه كذلك.

٢٤٣٣٨ - كَيْتُونِيَّات *
Chitonellus (S).
Chitonelle (F). Chitonellus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم مصصحات القشار وفصيلة الكيتونيات. انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهادي، من ماليزيا الى الاندلس واسرائيل || اصداؤها مستطيلة ثمانية الصفيحات المتراكبة. اجسامها قريبة الشبه باجسام البزاق. طولها تراوح من ٣ الى ١٢ سم. رؤوسها وعيونها صغيرة. لولاسها رباعية، زوج مستطيل وزوج قصير. اوبنها قليلة الانفرج. تتكود عند الخوف فتبدو كالأكرة الصغيرة.

٢٤٣٣٩ - كَيْتُونِيَّات *
Chitonidae (S).
Chitonidés (F). Chitonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل، اماميات الخياشيم مصصحات القشار. اجسامها وانواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها مؤلفة من ثمان صفيحات كلسية المادة، متراكبة، مفصلية، تغلف الظهر ويمكن الدوبية من التكوير كالمدرع، عند الحاجة || اشهر اجناسها الكيتون والحيدبة.

الشوزن. اوراقها متعاقبة، ورعية النصال الصبغة المستعدة الاطراف || ازهارها خاسية البتلات والاصدية، وودية اللون دقيقة الزناد المستطيل. تنويرها ربيعي.

٢٤٣٣٥ - كُونَج *
Hobereau, Falquet (F).
Hobby (E).

جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات. انواعه اربعة جميعها خفيفة الجناح ربعة الجسم طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. اثوابها عمرة ظهورها وسراقلها الى السمرة. بطونها الى البنية || اما انواعه فهي الكونج الديني والكونج الشائع والزمدم واليؤن.

٢٤٣٣٦ - كُونَج الديني
Falco columbarius, Hypotriorchis columbarius (S).
Faucon-pigeon (F).

طائر من الكونج صغير القد طوله نحو ٣٢ سم. خفيف الجناح، ثرس الخلق، حاد المزاج، شديد البطش يصيد الهام والعصافير والقواضم الصغيرة والجذران والحشرات. وهو من القواطع التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي. سربه في رحله يمد بضع مئات. يذئ في الاشجار العالية وفي اوقاب الصخور. اثناء تقصع من ٣ الى ٤ وفئات تحضنها وسدها اربعة اسابيع

٢٤٣٣٧ - كُونَج شائع
Falco subbuteo, Hypotriorchis subbuteo (S).
Hobereau commun (F). Common hobby (E).

طائر من الكونج حاد المزاج، خفيف الجناح، صغير القد، طوله نحو ٣٥ سم. الاثني اكبر حجماً من الذكر. وهو من القواطع يجوب البلاد الاسيوية والافريقية والاروبية. يألف الغابات والاحراج اللينة الاشجار. قوته العصافير والحشرات. يذئ في الاشجار الرقيقة اثناء تقصع من ٣ الى ٥ وفئات تحضنها وسدها نحو اربعة اسابيع

٢٤٣٣٨ - كُونَجِي
Cosmique (F). Cosmic (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض الاشياء المختصة بالكون كالأشعة الكونية.

٢٤٣٣٩ - كُونِيَاك
Cognac (F).
هو الكيياك، اطلبه.

٢٤٣٤٠ - كُونِيَّة *
Cosmogonie (F).
Cosmogony (E).

الكونية نظرية في تكوين العالم، والنظريات في التكوين أو التكوين عديدة ومنها المقدورة الهابة واللامقدورة.

٢٤٣٤١ - كُونِيْدِيَا
Conidie (F).
هي الكنديه، اطلبها.

٢٤٣٤٢ - كُونِيَّة *
Cunila (S). Cunille (F).
Dittang, Stone-mint (E). Kunel (D). Cunilla (I).

جنس نباتات برية نجيبة معمرة من فصيلة الشفويات. انواعها نحو ٢٠. اصطناعها البلاد الامريكية. معظملها طهي. اوراقها معتقة متعاقبة اهلجيلة الشكل. نصلها صغير القد خلى البرشة عطري العرف يشبه النعنع. ازهارها عطري التجميع طرفي الاركاناز. نقيع اوراقها وازهارها يفيد الالام ويقيوي المعدة.

٢٤٣٤٣ - كُونِيَّي *
Elanus caeruleus (S).
Elanion blanc (F). Black-winged kite (E).

طائر من الزراريق ينتهي الى عمارة الحذاء وفصيلة



كونج



كونية



كومي



كيو



كيتون



كَيْبَلِيَّة

بين الصخور. لحمها مستحب الطعم فاخر الصنف.
أشهر أنواعه الثلاثة التالية :

٢٤٣٦ - كَيْبَلِيَّة الْأَطْلَس

Labrus bergylta (S). *Labre neustrien*, Crahotte, Vras (F). *Cockwing wrasse* (E).
نوع من الكيدم. تكثر في المحيط الأطلسي من شواطئ بلجيكا إلى جبل طارق. طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها مراكب الألوان الزاهية المتباينة.

٢٤٣٧ - كَيْبَلِيَّة خَضْرَاء

Labrus viridis (S). *Labre vert* (F). *Cuckoo wrasse* (E).
نوع من الكيدم. تكثر في المتوسط. طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها إلى الخضار. ظهرها اسفع المواج. بطنها وردي اللون محتلي الماجة. الأثني ثلاثية البقع السود الجانبية وهي الأكبر من جنس من الذكر.

٢٤٣٨ - كَيْبَلِيَّة زُرْقَاء *

Labrus merula (S). *Labre merle*, Merle (F). *Labrus merula* (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدميات ورثة شائكات الزعانف. أعطانها معطف أقاميل البحر الأبيض المتوسط. تعتبر من أسماك الهامد والحشاش. لحمها الحياطي شرطي || جسمها اهليلجي الشكل، معتدل التبييط، يطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. ثوبها متباين الخصب بين الشقين. اللون السائد هو الأزرق يطولو في القسم الأعلى من الجانبين والظهر مواج جزوي وأسد عند الذكر ومواج وردي عند الأثني. ويطولو في القسم الأسفل من الجانبين وفي البطن مواج بنفسجي عند الذكر ويليكي عند الأثني. رأسها مخروطي الشكل، منتشر الشعاف. فكاهما متعادلان. شفتها متوسط الانفرج. أسنانها كبيرة، منمقة. عيناها مستديرتان، جاحظتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة. زعنفتها الذيلية مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.



كيدل ثنائي التنقيط



كيدم

٢٤٣٩ - كَيْبَلِيَّة مُلَوَّنة

Labrus mixtus (S). *Labre varié*, Coquette, Connet, Tenca (F). *Sespartridge* (E).
نوع من الكيدم. تكثر في شمال المتوسط طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها متباين الألوان الزاهية فيها الوردى والحنتلي والبي والاحمر والاخضر والاسمر الدايق.

٢٤٣٥ - كَيْبَلِيَّة مِيَّات

Labridae (S). *Labridae* (F). *Labridae* (E).
فصيلة أسماك بحرية من شائكات الزعانف تشمل زهاء ٤٠٠ نوع منتشرة في جميع بحار العالم.

٢٤٣١ - كَيْبَلَج

Terre de bruyère (F). *Heath-soil* (E).
هو التراب الحرجي الخشن، تركيبة الحكيكي يختلف باختلاف مناصره الأساسية أو طرية أو طينية أو جصية لكنه يتميز بوفرة المادة الدبالية المنحلة التي تجعله من أجود الأتربة الصالحة للزراعات التريينية والبيئية.

٢٤٣٢ - كِيرِش

Kirsch (F). *Kirschwasser* (E).
هو خمر الكرز، شراب مسكر يصنع من قنديل الكرز.

٢٤٣٣ - كَيْرُوب *

Cheropus (S). *Chérope* (F). *Cheropus* (E).
حيوان جاس لاصم وحيد الجنس والنوع من فصيلة

٢٤٤٠ - كَيْبَلِيَّة *، مَشْطُورَة

Kigelia (S). *Kigélie*, Arbre à concombres (F). *Cucumber tree*, Sacred tree of Nubia (E). *Kigeliabaum* (D). *Kigelia*, Albero di cetriolo (I).

جلس اشجار برية وزينية من فصيلة البنونية. مهدا البلاد الحارة. أنواعها أربعة. أرواقها متعاقبة مركبة. ازهارها عنقودي التجميع. ازهارها كبيرة القدد جملة الشكل، ملونة. ثمارها تشبه الخيار لكنها حاملة الطعم لا تؤكل.

٢٤٤١ - كَيْبَحَاء

Rhynchonella (S). *Rhynchonelle* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات غصديات الارجل وفصيلة الكبحاليات. أنواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات العصر السيلوري المائدة إلى الأياح الأول، أما المعاصرة منها فتنتشر في بحار الشمال والجنوب || اصداؤها مصراعية، متساوية، مروحية الشكل، تحدد الصفحات الخارجية، لؤلؤية الداخلية. تعيش شبه لاسقة بالصخور رابطها سلك ليفي المادة طولها من ١٥ إلى ٣٥ م.

٢٤٤٢ - كَيْبَحَالِيَّات *

Rhynchonellidae (S). *Rhynchonellides* (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات غصديات الارجل. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الأياح الأول || أشهر اجناسها الكبحاء.

٢٤٤٣ - كَيْبَحَن

Pipit rousseline (F). *Tawny Pipit* (E).
طائر من فصيلة الذعيريات يدعى جشنة الحقل وطرسوم، اطلب جشنة الحقل.

٢٤٤٤ - كَيْدَل ثَنَائِي التَّنْقِيط *

Adalia bipunctata (S). *Adalie à 2 points*, *Coccinelle à 2 points* (F). *Adalia bipunctata* (E).
حشرة خاتلة نافعة من فصيلة الدعسوقيات ورثة مفدمات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واروية. تألف البراري والحدائق والجنان والبياسن والزراعات الصيفية. خنافسها وبقاقتها تعيش على الارق والقرنيز والمغفر والوبف ... || جسمها صغير القدد، بيضي الشكل، يطول من ٥ إلى ٦ م. ثوبها الذي يتميز بدمم الاستقرار يكون غالباً إلى السود تملو في كل غمد من غديه نقطة حمراء. رأسها صغير الحجم، ذلق الحظ، يور بمعلمه تحت الكوسل. عيناها صغيرتان مساحتان، زبابانها صقيتان. فكاهما ذريان. تأثيرها وملاصها صغيرة || الأثني اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقتصر زباباً || ايجالها الحولية ثلاثة. تسرح في النهار وتبيت في الليل. يخفصاء الجليل الثالث تخفي فصل الشتاء مخبئة تحت الحجارة إلى ان تدب الحرارة فتخرج من مكبتها في اوائل فصل الربيع.

٢٤٤٥ - كَيْبَدَم *

Labrus (S). *Labre* (F). *Wrasse* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيدميات أنواعه المعروفة ١٠ تتميز بألوانها المراكبة الألوان الزاهية وبامتلا زعانفها الظهرية والشرية. رؤوسها صغيرة. أعطانها مخروطية الشكل مشدقة الفك || مرتها قرب الشواطئ



كَيْرُوب

حل القلب. وظائفة عديدة اخضها تأمين جريان الماء وادخار المواد الغذائية والمقاومة الميكانيكية.

٢٤٣٦١ - كَيْش * ، أُو مَالِك

Spatula clypeata (S). Canard souchet, Souchet commun, Rouget de rivière (F). Shoveller duck (E). نوع من البط الروشن. طائر من القواطع مشتهر البلاد الأفريقية الحارة وبصيلة البلاد الباردة الأوروبية والاسيوية || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه وبقته الى الخصار الالاس الاسفع. صدره الى البياض الناصع. بطنه واطلاؤه الى الشقطة الصنابية المواج. ظهره اسود اللون تملوه رقشة حنطية. جناحاه مزرقان بالابيض والازرق والاخضر والكسني. عيانه صغرتان عسلتان. متفاده صفيحي الشكل، ملمعي الطرف، اسمر اللون، اخضر المواج. جناحاه مستطيلان، لاحفان. ذنبه مخروطي الشكل، صغير القد، ابيض اللون، يتوسطه الاسود. ساقاه قصيرتان لونهما الى الصفرة البرتقالية || قوته الحشرات اغصها المائية ودعل الصفادوع وبعض النباتات المائية || يدثن افحوصه بين الاسل على صفات البحيرات والمناقع والاوعار في المواق الصمبة المنال. الاثن تحضن من ١٦ الى ٢٠ بيضة. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثن دون الذكر الذي يؤئن لها الحاية والغذاء || تعتبر من الطرائد العزيزة. لحماها فاخر الصنف.

الزيبات. موطنه بعض احراج بلاد استرالية. قوته الديدان والحشرات || جسمه صغير القد يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وذنبه من ١٢ الى ١٤ سم. رأسه مخروطي الشكل، مستند المقطر. قوائمته كقوائم الزيزب. جراب الاثن ثنائي الالباء. فحنته من الوراء.

Mouche de l'olive (F).

٢٤٣٥٤ - كَيْشُون

هو غرشة الزيتون، اطلمها.

Cairina moschata (S).

Cairine, Canard de Barbarie (F). Barbary duck (E). طائر داجين من كفيات القدم صفيحيات المناقير ينتهي الى فصيلة البطيات. موطنه امريكة الجنوبية || جسمها كبير القد. عنقها اطول من عنق البط الاهلي جناحها كبير الحجم، ذلق الطرف، يكاد يلحف الذنب. ذنبها صغير الجرم، مقطوع الطرف. ثوبها الى الخصار الالاس الاسفع يملوه قتيح ابيض || اخلاقتها شرسة تتمدى على غيرها من الطير الداجة. لحما متوسط الصنف لا يخلو من رائحة المسك.

٢٤٣٥٦ - كَيْش البَوْغ ، كَيْش الغُبَيْرَات

Sporange (F). Sporangium (E).

هو الكيس الشري الذي يحضن يوغ مستورات الزهر.

٢٤٣٥٧ - كَيْش الراعي * ، قَرْمَلَة

Capsella Bursa-pastoris (S). Capselle, Bourse à pasteur, B. de Capucin, Boursette (F). Mother's heart, Shepherd's burse (E). Hirtentäschel (D). Bors di pastore (I).

نبات عشبي بري حولي مبدول من فصيلة الصليبيات.

Embryon d'animal (F).

٢٤٣٦٢ - كَيْشَة

Embryo of animal (E).

هي النمرة، ملقحة الحياة التناسلية الكانة في الحيوان.

Caïophora (S).

٢٤٣٦٣ - كَيْفُور

Caïophore (F). *Caïophora* (E).

جنس نباتات عنية برية وتزيينية من فصيلة الموزيات. منتبها بعض مناطق امريكة الجنوبية. هليها حارق كالقراش سوقها مدادة. عارشة. اوراقها لاقباسة الشكل. ازهارها كبيرة القد، حراء اللون || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٢٤٣٦٤ - كَيْفُور أعْوَج الحَقِ

Caïophora contorta (S).

Caïophore à capsule tordue (F).

نوع من الكيفور. عشبة حولية تزيينية. ساقها عارشة تطول نحو ثلاثة امتار. اوراقها بيضبة مستطيلة الزام الاخير. نصلها منشارية الحتار، باهتة الخصار يملؤها بعض الزغب والمطب. ازهارها حراء اللون يملؤها بعض مواج يرتقالي || تنويرها يستمر طوال فصلي الصيف والخريف.

٢٤٣٦٥ - كَيْفُور قُرْمِي

Caïophora coccinea (S). *Caïophore écarlate* (F).

نوع من الكيفور. عشبة تزيينية معمرة. ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار. اوراقها معتقة، السفلى منها ريشية غمرية اما العليا فاهليجية. طولها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها قرمزية اللون. غدة الرحيق فيها مستطيلة الحويط المحببة الاطراف || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

Kyste (F). *Cyst* (E).

٢٤٣٥٨ - كَيْسْت

مدلة لاقباسة الشكل والحجم تتكون تحت الجلد او في بعض الننج.

Quiscalus major (S).

Quiscale majeur (F).

طائر من فصيلة الكاروجيات. موطنه بعض مقاطعات جنوب امريكة الشمالية. يألف المناطق الجبلية وصفات الانهار. سريره وافر العدد || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم. متفاده اطول من رأسه وهو محدد الخظم العلوي البين التقوي. جناحه معتدل الطول. ذنبه مستدير الطرف. حدة عينه جزوية اللون. ثوب الذكر اسود اسم يملوه مواج جزوي في الرأس والذال ومواج اخضر في الذنب. ثوب الاثن الى الكهبة السمرام المابقة في الرأس والرداء والجناحين والذنب والى الكسلة الحمراء المواج في الصدر والبطن || اخلاقه رضية آتسة. قوته الحشرات من الجراد الى القراش والاساربع والصفادوع والروغيات ولا يعف عن الحبوب والثار العنينة || يدثن عشه في الانجار الراتنجية اغصها الصنوبر. الاثن تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمثابة الذكر نحو ١٥ يوما || عشه جرابي الشكل، بالغ الطول، لبد الحيك يملفه بفند الشجرة. طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وقطر قمره من ٢٥ الى ٣٠ سم.

Xylem

٢٤٣٦٠ - كَيْسَم

هو في النباتات الخشبية نسيج الساق والجذور الذي يرتكز



كَيْشَة



كَيْس الراعي



كَيْسكال



كَيْش

صغيرة. اذناها قليلة الانفراج. زعانفها الظهرية مستطيلة، الجزء الأول منها شفاف شائك، الجزء الثاني مغني سرح. الذيلية منفرجة، شبه فارقة. اثنائها الى الرعدة الفضية تعلوها زخارف وتجاويز متباينة الزاوية سمراء اللون خضراء الموالج || طولها مأكولة متوسطة الصنف .



كبكه

٢٤٣٧٣ - كيلوغرام Kilogramme (F).
هو الف غرام يعرف عنه عادة بكلمة كيلو. وهو من المقاييس المترية الفرنسية التي شاع استعمالها، نظراً لسهولة كسورها، في معظم بلدان العالم.

٢٤٣٧٤ - كيلومتر Kilomètre (F). Kilometre (E).
من المقاييس السطحية قدره الف متر.

٢٤٣٧٥ - كيلوات Kilowatt
من المقاييس الكهربائية قدره الف وات. وهو يمثل وحدة كهربائية طاقاتها الف جول بالثانية.

٢٤٣٧٦ - كَيْفِيل Chimaphila (S).
Chimaphile (F). Chimaphila (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى «حبيب الشتاء». جنس نبات معمرة مدادة من فصيلة الاغروسيات. منبتها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستقلة مدادة قليلة الفروع. اوراقها متعاقبة، سانية اتصال، صغيرة الحجم. ازهارها بيضاء اللون او وردية || انواعه المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.



كيلع ألس

٢٤٣٧٧ - كَيْفِيل صِيَوَانِي Chimaphila umbellata (S).
Chimaphile en ombelle (F).
نوع من الكيفيل. ساقه تطلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقه جميلة الخضار تطلو نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهاره صيوانية التجميع، صغيرة القند، وردية اللون || تنويره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٣٧٨ - كَيْفِيل مُلْتَخ Chimaphila maculata (S). Chimaphile maculé (F).
نوع من الكيفيل. ساقه تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه تطلو نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا الملطخة بالابيض، احر الصفحة السفلى. ازهاره كبيرة القند بيضاء اللون، فواحة العرف العطري || تنويره يستمر طوال شهر حزيران.



كيلس

٢٤٣٧٩ - كَيْمَوِي Chimique (F). Chemical (E).

٢٤٣٨٠ - كَيْمَوِي Chimista (F). Chemist (E).

٢٤٣٨١ - كَيْمُوغ Terre arable (F).
Arable soil (E).
هو التراب الزراعي. ويتميز آخر هو طبقة التراب السطحية التي يتسكن منها المهرات او التي تسبر غورها جذور النباتات الزراعية.



كيلودكيل

٢٤٣٨٢ - كَيْمُوغ Chyme
مجموعة المواد الغذائية المائعة في المعدة بعد امتدادها الارلي.

٢٤٣٨٣ - كَيْمُوغ Géophage (F).
هو التاراب، اظليه.

٢٤٣٦٦ - كَيْمِي Empirique (F).
Empiric, Empirical (E).
هو ما ارتكز على المادة او التجربة الشخصية وليس على القواعد العلمية الململة.

٢٤٣٦٧ - كَيْكَة Calca (S).
Calca (F). Calca (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. انواعها المعروفة ستة تنتمي الى عمارة الدّر. موطنها معظم مناطق امريكا الجنوبية. ملجئها الحيائي جماعي باستثناء زين التسافد والحضن || اجسامها ربعة تطلو من ٣٠ الى ٣٦ سم. اثنائها تختلف مع الانواع. الوانها العلوية الى الخضار المتفاوت الماحات. الوانها السفلية تراوح من الزيتية الى الصفاتية والسمراء، اجنتها ذلقة الاطراف، شبه رتاجية التركيب، لا تلحف كامل الذب. اذناها مقطوعة الاطراف. ارسافها قصيرة. اصابعها كبيرة، شديدة السرعة || تألف القنابات القريبة من المعمران. قوتها اثار البرية والزراعية والحجوب.

٢٤٣٦٨ - كَيْل، مُعَايَرَة Jaugeage (F).
Gauging (E).
طريقة الوصول الى تحديد المقدار او الحجم وما اشبه. كقياس المياه الجارية وحجم الدن وقطر الشجرة الخ.

٢٤٣٦٩ - كَيْل المِسَاحَة Levé superficiaire (F).

٢٤٣٧٠ - كَيْلَع أَلْس Obisius lubricum (S).
Obisie lisse (F). Obisius lubricum (E).
دوية ناعمة من فصيلة الكرنيسيات ورتبة العقربيات الكاذبة. جسمها صغير القد بطول نحو ٣ سم. صدرها مجوذي اللون، مبط الصفحة المائلة. مقنيها كيران يتنيان بمقلطين كلائط المقارب يعلموها هلب دقيق اطحل. بطنها مبط عادم الذب اكهب اللون اسمر الموالج. عينها مركبتان، صغيرتان. جرابها معتدلة الطول، حنطية اللون || تألف الاجراج وتعيش تحت الجثالة والحجارة الصغيرة. مسرحها جدوي. قوتها الحشرات الصغيرة ولكنها ومازن النمل ودبابه والديدان ... || تتمر نحو خمس سنوات يباها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر. تبض الاثني من ١٠ الى ١٢ مكنة تطفله كالثوبة يصلجة حريرية النورس سمراء اللون. يتم التفق وتفتلق الصلجة في اوائل تموز وتسمى الصغار طلياً للرزق بعد التفق بنحو ٤٨ ساعة.

٢٤٣٧١ - كَيْلَس Chellinus (S). Chéline (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيديات الشائكات الزعانف. انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطائها المحيط الهندي وجواره. تتميز باستطالة زعانفها الظهرية والشرجية ويتبدس قلوبها المشتابة وبخضر فاحكها الغظفي || جمع انواعه مأكولة اشهرها كيلس ديشل وهي مككة كبيرة القند تطلو نحو ٦٠ سم. لوها الى السمرة بملوها موج اخضر.

٢٤٣٧٢ - كَيْلُود كَيْتِيل Chellodactylus (S).
Chellodactyle (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعها المعروفة عديدة || اعطائها بحار الجنوب || اجسامها شبه اهلبيجية الشوزن تطلو من ٢٥ الى ٣١ سم. رؤوسها

التجميع . ثمارها حبوب صغيرة مستطيلة مأكولة || زراعتها رابحة وجوبه شائعة الاستعمال الغذائي .

٢٤٣٩٥ - كَيْنُونَة °
Phylogénese (F).

تاريخ تكوين ونشوء وتطور الانسال .
Phylogeny (E).

٢٤٣٩٦ - كَيْنَيْت
Kaïnite

ملح بوتاسي طبيعي الحفرة تركيبة مزيج من كلوريد البوتاسيوم مع سلفات المغنيزيوم وبعض التي من كلوريد الصوديوم والمغنيزيوم . وهو من الاسمدة البوتاسية المحمودة الاستعمال بحوي من ١٤ الى ١٥ ٪ من البوتاس لكنه يسمح ذرات التربة السطحية وينشط انكماشها لذلك يحسن استعماله في الاثرية الرليلة الخفيفة دون سواها .

٢٤٣٩٧ - كَيْشِين
Quinine

الكينين اصل فاك يستخرج من لحاء شجر الكينينا ويستعمل في معالجة معظم الحيات .

٢٤٣٩٨ - كَيْهَب °
Prioscélus (S). Prioscèle (F).

جنس حشرات من غديات الاجنحة تختلفت الاجزاء وفضيلة النيشات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من علم افريقية الاستوائية والاقالم المجاورة || اجسامها كبيرة ، مستطيلة ، معتدلة التبطيط . رؤوسها معتدلة الجرم . قرونها الاستعمارية صولجانية . تأثيرها عجيبة . كوالها مجنية الشكل . اغارها لاحقة محزنة . جرائها قصيرة ، مقوسة . شيطنة . انوابها لماعة قليلة الالوان يكثر فيها الاسود والبني الاسمر .

٢٤٣٩٩ - كَيْهَنُ الثِين °
Hypoborus fuscus (S). Hypobore du figuier,

Scolyte du figuier (F). Hypoborus fuscus (E).

Feigenborkenkäfer (D).

حشرة غاضلة غاشية مؤذية من فصيلة الكراشيات ورتبة منعدات الاجنحة . اعطائها اللبانية تمتد امتداد اقلم الثين ، من السواحل الى ارتفاع الف متر عن سطح البحر . تركب الافراد المستضفة ولا تقرب من الريانة او اليابسة || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ سم . ثوبها الى السمرة الكستنية يملوها في ظهرانها مواج اريد . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها صولجانيات فكاهها شبيخان ذربان . ظهرانها ذلق المؤخر اللاص . غدها متابعات التبرزيز القاطب || اجسامها الحولية تراوح من ٢ الى ٤ ، اربعة اجيال في المناطق الساحلية وجبلان في اعالي الوسط || وجود الحشرة الجملانة والبرقة لا ينقطع في مناطق الساحل والوسط ، طوال مدار السنة || والحشرة من اي شق كانت تعمل في سبيل التكاثر وتأخذ على عاتقها علاج السرداب الرئيسي وسجرة التعاطل ثم الانفاق الثانوية من البين واليسار . وقد يراوح عدد الانفاق الثانوية من ٣٠ الى ٤٠ .

٢٤٤٠٠ - كَيْوِي °
Apteryx (S).

Aptéryx, Kiwi (F). Apteryx, Kiwi (E).

طائر راس عداً وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكيويات . موطنه نيوزيلندا . جسمه متوسط القد ، جسمه محجم الدجاجة ، ثوبه الى السمرة السفراء المراج . وهو اجدع الجناح ، عادم الذنب . خيطي الريش اللينق الناعم الذي يشبه الشعر . مقاره مستطيل مخدب . يسرح في الليل . قوته

٢٤٣٨٤ - كَيْمُونْتَسُ * ، زَهْرَة الشِيَاء

Chimonanthus (S). Chimonanthe, Calycaut du Japon (F). Winter flower, Japan allspice (E). Japonische Kelchblume (D). Chimonanto (I).

جنس شجيرات رية ورتبية من فصيلة الكليكتوسيات . انواعه قليلة العدد . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، بسيطة ، نصلها سناني الشكل ، ماس البشرة ، زاهي الخضار || ازهارها متدلية انبوبية جرونية العرف . الوانها تختلف مع انواعها منها الارجواني والاحمر والاصفر والموشع || ازهارها يستمر من كانون الاول الى اذار .

٢٤٣٨٥ - كَيْمِيَاء ، كَيْمَاء
Chimie (F).

Chemistry (E).

علم يبحث في تكوين المادة والتغيرات التي تلحق بها من جراء عوامل مختلفة تفقد الجسم مظهره الخاص وصفاته التي يتميز بها .

٢٤٣٨٦ - كَيْمِيَاء حَيَوَانِيَّة
Zoochimie (F).

Zoochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات الانسجة الحيوانية .

٢٤٣٨٧ - كَيْمِيَاء كَهْرَبَالِيَّة
Electro-chimie (F). Électro-chemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في المناشع الكيماوية التي تسيرها الكهرباء .

٢٤٣٨٨ - كَيْمِيَاء حَيَّة
Biochimie (F).

Biochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

٢٤٣٨٩ - كَيْمِيَاء نَبَاتِيَّة
Phytochimie (F).

Phytochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء خاص بالنبات .

٢٤٣٩٠ - كَيْمِيَت راجع كروز فيلم كينيتو .

٢٤٣٩١ - كَيْنَا هي الكينينا ، اطلها .

٢٤٣٩٢ - كَيْنَة
Clitoris

هي مقر الاحساس المرفع من الفرج وهي جلام مدخل الزردان او حجابها ، مركزها تحت الزردية من داخلها .

٢٤٣٩٣ - كَيْنَا جُو °
Cercoplectes (S).

Kinkajou (F).

حيوان من الرانثيات وحيد الجنس والنوع . موطنه امريكية الوسطى يعيش في غابات مناطقها الاستوائية . جسنة تطول نحو ٤٠ سم . وذيله ٥٠ سم اما ارتفاعه فن ١٦ الى ١٨ سم . وهو يستعمل ذنبه كالفردة للارتفاع من غصن الى غصن ومن شجرة الى اخرى . قوته الثار والدويبات الصغيرة والمصابير والبيض والحشرات والعسل الذي يفتش عنه ويلتهمه بشراهة .

٢٤٣٩٤ - كَيْنُو ° ، أَلِيْنَة كَيْنُو °
Chenopodium quinoa (S). Quinoa, Petit riz (F).

نوع من الالينية وهو نبات عشبي يحل حولي زراعي مهدد بلاد الشيلي والبيرو . ساقه منتصبه قليلة الفروع . اوراقه معتقة متعاقبة سنانية النصل المرفرس . ازهارها سنبلية ليد



كيمونتس



كيتاجو



كينو



كيب



كين الثين



كيوي

Œuf très petit (F).

Little egg (E).

هي البيضة اي البيضة الشديدة الصغر .

٢٤٤٠٢ - كِيِيَكَة

Micro-organisme.

Microorganisme (F). Micro-organism (E).

تعريف يطلق على كل كائن حي شديد الصغر لا يشاهد بالعين المجردة بل تحت المجهر كالميكروبات والبكتيريا والخمائر والاعفان والاولالي .

٢٤٤٠٢ - كِيِيِين °



الحشرات والديدان والحيوب . يعيش ذكراً واثى . اثناء تحضن في الحول من مرتين الى ثلاث مرات . حفتها بيضة واحدة زرعها نحو ٢٤ يوماً .

Apterygidae (S).

Aptérygids (F). Apterygidae (E).

فصيلة طير من العوادي تشمل حالياً بنوع واحد يدعى كيوي موطنه نيوزيلندا .

٢٤٤٠١ - كِيُونَات °



ل

Electrode - ٢٤٤١٢ - **لاحب**
هو القطب الكهربائي أو المنفذ الكهربائي .

Lepismidae - ٢٤٤١٣ - **لاحسَات**
فصيلة حشرات تُعرف بالشحبيّات ، اطلها .

Lepisma (S). - ٢٤٤١٤ - **لاحِسة**
Lépisme (F). Lepisma (E).
جنس حشرات من فصيلة اللاحسات . انواعها عديدة تعيش على المواد العضوية والثبوية . راجع شحمة .

Lepisma saccharina (S). Lépisme du sucre, Petit poisson d'argent (F). Silberfischchen (D). - ٢٤٤١٥ - **لاحِسة السُكّر ***
حشرة صغيرة الّقد اهليجية الشكل فضية اللون من فصيلة اللاحسات مبدولة في البيوت تلتس السكر وتقرص القرطاسية والكتب .

Cœlentérés (F). - ٢٤٤١٦ - **لاحسَوَات**
Cœlenterata (E).
هي الحرفوات ويدعوها في مصر « جوفمويات » . شعبة من الحيوانات الدنيا تتميز بجلوها من الاحشاء والاستعاضة عنها او الاكتفاء بتجويف وحيد الفتحة ويقوم مقام الفم والامتص .

Zoophage (F). - ٢٤٤١٧ - **لاحيم ، واليج**
Zoophagous (E).
ما كان قوته اللحم حيواناً كان ام دويبة ام حشرة .

Carnassiers - ٢٤٤١٨ - **لاحيمات**
هي آكلات اللحوم ، اطلها .

Apétale (F). Apetalous (E). - ٢٤٤٠٤ - **لايتلي**
هو النبات الذي لا لقالة في زهرته . وهي الزهرة العادمة البتلات .

Lactifère (F). Lactiferous (E). - ٢٤٤٠٥ - **لاين**
نعت تعريفي يطلق على الاوعية العضوية التي تنقل اللبن او العصارات اللبنية في الحيوان والنبات .

Nul ne plaide par procureur (F). - ٢٤٤٠٦ - **لايتقاضي بالوكالة**
مبدأ قانوني فرنسي سري مسرى الامثال فحواله انه اذا وكل عمرو زيدا بمقاضاة بكر وجب ان يذكر في صحيفة الدعوى وفي الحكم اسم الوكيل والاصليل .

Grémillet (F). - ٢٤٤٠٧ - **لايتسّتي**
نبات تربيني يدعى آذان الفأر المنقي ، اطليه .

Lathyrine (F). - ٢٤٤٠٨ - **لايتيرين**
هي الجلبانين ، راجعها .

Calcifuge (F). - ٢٤٤٠٩ - **لاجصي**
نعت تعريفي يطلق على النباتات التي لا تنمو في الارربة الكلسية او انها تحشاشها .

Frénateur (F). Brakesman (E). - ٢٤٤١٠ - **لاجيم**
نعت تعريفي يطلق على الاعصاب والمضلات التي تستطيع قمع حركات بعض الاعضاء او اعمالها .

٢٤٤١١ - **لاجيم الضفدع**
نبات يدعى كلوة الماء ، اطلها .



لاحسة السكر

٢٤٤٢٧ - لاذن إكريتني*، قستوس إكريتني،

Cistus creticus (S).

Ciste de Crète (F). Cretan rockrose (E). Kretische Cistrose (D). Cisto di Creta (I).

نوع من اللاذن المعمر المبدول. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فروع فناء. أوراقها قصيرة الاعناق، صغيرة القذبة. نصلها يتقاطع المروق والأعصاب، غشن الملمس، أزغب البشرة على صفحتيه. أزهارها قبيزية اللون، كبيرة القذبة، قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ سم. || أوراقها وفروعها وساقها لزجة تستلقط منها أجود أصناف اللاذن || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.



لاذن أزغب

٢٤٤٢٨ - لاذن طوطي، برعون

Cistus villosus (S). Ciste cotonneux (F).

نوع من اللاذن المعمر. جنبته تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. ساقها وفروعها مزغبة. أوراقها معتقة بيضية. نصلها أخشن الصفحة المتجمعة الزباء. زغبها لبد ستليل يبدو كثيل القطن. أزهارها فردية حراء اللون، قطرها نحو ٥ سم. || ساقها وفروعها وأوراقها لزجة يستلقط منها اللاذن || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٤٤٢٩ - لاذن غاري الورق

Cistus laurifolius (S). Ciste à feuilles de laurier (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جنبه سبروتية تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. ساقها فروع. أوراقها معتقة غارية الشكل. نصلها ثلاثي المروق، مالم الصفحة العليا أزغب السفلى. أزهارها بيضاء اللون، كبيرة القذبة، قطرها يراوح من ٥ إلى ١٠ سم. || أزهاره يستمر طوال شهر حزيران.



لاذن اسباني

٢٤٤٣٠ - لاذن قروسي الورق

Cistus salvicifolius (S). Ciste à feuilles de sauge (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جنبه ميلولة ترغب في الآزبة الربلية، تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها معتقة قويسية الشكل عادمة المروق. نصلها أزغب البشرة على صفحتيه، أبيض الصفحة السفلى المشبهة الخمل والأزغب. أزهاره إلى البياض الاصفر. قطرها نحو ٥ سم. || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٤٤٣١ - لاذنات

Cistaceae (S).

Cistacées (F). Cistaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفعالات، أجناسها أربعة، أما أنواعها فكبيرة العدد. أشهر أجناسها اللاذن والمالهين.

Lar

٢٤٤٣٢ - لار

هو جبون لار، الطله.

٢٤٤٣٣ - لاريس، مَلَزْ

Larix (S).

Larix, Mélèze (F). Common larch (E). Lärche, Lärchenbaum (D). Larice, Abeto larice (I).

جنس اشجار حرجية من التنوبيات وفصيلة الصنوبريات. أنواحه المعروفة نحو ١٢ أشجار كبيرة الحجم، هرمية الشكل، اقية الاغصان والفروع. غرايبها مبرشرة، بناتقها جانبية الانتشاب، قصيرة القذبة. أوراقها خطية، غمية التجميع، عابلة. أزهارها وحيدة المسكن، الاثنية قذبة الشكل. ثمارها أكواز قصيرة. اشغالها جزئية اللون صلبة، قشورها تستعمل في الدباغة ويستخرج من سوطها بالخر مادة راتنجية شائعة الاستعمال الصناعي || أعرف أنواحه وأشهرها ما يلي.



لاذن إكريتني

٢٤٤٣٤ - لاحيوي، Abiotique (F). Abiotic (E).

نقيض الحوي.

٢٤٤٣٥ - لايح، Intensif (F). Intensive (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما يتميز بطابع الانتاج الوافر.

٢٤٤٣٦ - لاخيشوسي،

Abranché (F).

Abranchiate (E).

نمت تعريفي يطلق على الحلقيات العاديات الغياشيم.

٢٤٤٣٧ - لادن، لادن، Ladanum

مادة صمغية راتنجية طيبة قفرها سوق وأوراق بعض النباتات انحصها نبات اللاذن. لوها يراوح من الاشهب الصناعي إلى الجوزي الاسمر المواج، وهي ذكية العرف طيبة الرائحة || كان لا يزال يستعمل في الطب ومنهم من استعمله للفيج وهو شائع الاستعمال المعطري.

٢٤٤٣٨ - لاذن، قستوس، قستوس، قستوس

Cistus (S). Ciste (F). Cistus (E).

جنس نباتات طيبة بوية وتربوية من فصيلة اللاذنيات. أنواحه المعروفة ٢٠ منها الجنبات والبيجات والاعشاب. اصلها حوض البحر المتوسط. سوطها قصيرة منتصبة فروع. أوراقها ابيدة كاملة متقابلة صغيرة النصل. أزهارها لاقبسية التجميع، جملة الشكل، خاسية البتلات. ثمارها حقبة خاسية أو عشارية الاخيشية || أشهر أنواحه ما يتبع.

٢٤٤٣٩ - لاذن أجعد

Cistus crispus (S).

Ciste crépu (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو بجملة سبروتية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها لاطئة ستانية الشكل. نصلها أجعد الصفحة الخشنة الزبام الفواحة العرف المعطري. أزهارها أرجوانية اللون صغيرة الحجم قطرها نحو ٣ سم. || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٤٤٤٠ - لاذن أرغب،

Cistus hirsutus (S).

Ciste hérissé (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جنبه سبروتية تملو من ٥٠ إلى ٨٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة الزغب. أوراقها رهلة. نصلها لبد الخمل على صفحتيه. أزهارها عتوكوية التجميع، متوسطة القذبة، لوها إلى الأبيض المبيج بالأصفر || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٤٤٤١ - لاذن إسباني، قستوس لاذني،

شقران، قستوس

Cistus ladaniferus (S). Ciste ladanifère, C. lédon, C. d'Espagne, Ladanum d'Espagne (F). Gum-cistus, Ladanum-resin tree (E). Spanische Cistrose (D). Cisto ladanifero, C. di Spagna (I).

نوع من اللاذن المعمر، يذكر في مضاف اسبانيه وبيجاها وهو جنبه ميلولة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها فروع. أوراقها لاطئة ثلاثية المروق. نصلها أخضر الصفحة العليا غير السفلى الكثيفة الخمل والأزغب. أزهارها كبيرة القذبة قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٥ سم. لوها إلى الأبيض يملو تنيش وتبيج اجر || أوراقها وفروعها لزجة يستلقط منها اللاذن المشهور. أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران.

صفحته العليا خضراء اللون مخددة، صفحته السفلى خلية البشرية، غبراء اللون. وأوراقها هذه تشفر عند اقترابها من الحريف فتبدو بلون الذهب. اكوازهَا مخروطية الشكل تطول من ٦ الى ٧ م. وتعرض من ٤ الى ٥. جرهاتها جوفوية اللون، هرية الشكل، ناشرة.

٢٤٤٤٠ - لَارُورْدُ ، لَارُورْدُ

Lapis, Lapis-lazuli, Lazulite

حجر كريم مشهور، أجوده الصافي الشفاف الازرق الفساربي الى حرة وخضرة.

٢٤٤٤١ - لَارُورْدِيَّة

Cynanthus (S).

Cynanthe (F). Cynanthus (E).

عشبة معمرة، برية وتربينية من فصيلة الجريسيات. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها الحدائقية والمرتكنية في أكثر من قطر || ساقها قصيرة تطول نحو ٢٠ سم. جذورها دريما مستطيلة. أوراقها متعاقبة، بيضبة النصال، صغيرة الحجم. ازهارها فردية، محورية الارتكاز، لازوردية اللون. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من اواسط آب الى اواسط ايلول.

٢٤٤٤٢ - لَاشِقِي

Agame, Asexuel (F).

Agamous, Asexual (E).

كل ما هو عادم الشق اي عادم الاعضاء التناسلية في الحيوان وفي النبات.

٢٤٤٤٣ - لَاشِقِيَّالِيَّة

Lachenalie (F).

هي زئبق البر، اطلبه.

٢٤٤٤٤ - لَاصِع

Dessev (F).

نمت تمرغني يطلق على التسج النباتية الحالية من المواد الصائنة.

٢٤٤٤٥ - لَاصِف

Plantain (F).

جنس نباتات عشبية كثيرة الانواع اشتهرت باسم لسان الحمل، اطلبه.

٢٤٤٤٦ - لَاطِيس ، قِشَر

Lates (S).

Latés (F). Lates (E).

جنس اسماك نهريه من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات. انواعه قليلة العدد اعطاهما نهر البلاد الاسيوية والافريقية الحارة كالنيل والتيجر والكنج والفرات ... جميعها كبيرة القد مستطيلة الجسم محدودة الظهر. اثوابها الى السمره الفحشية يملؤها موج يختلف باختلاف النوع. طولها مأكولة لكها دون الوسط || اشهر انواعه ما يلي.

٢٤٤٤٧ - لَاطِيس النِيل * ، حِمَارُ الْبَحْرِ ، قِرْخ

Lates nilotica (S).

Latés du Nil (F). Great Nile perch (E).

نوع من اللاطس وهي سمكة كبيرة القد، طولها نحو ١٠٠ سم. تكثر في مياه النيل من منبعه الى مصبه. وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف. وكان المصريون من عهد الفرعانة الى عهد الرومان يقدسونها وبها سميت مدينة لاطولوس اي اسنا في الصعيد.

٢٤٤٤٨ - لَاطِيس الْهِنْد

Lates maxima (S).

Latés des Indes, L. du Gange (F). Great Ganges perch (E).

نوع من اللاطس وهي سمكة كبيرة القد ضخمة، طولها نحو

٢٤٤٤٩ - لَارِيس أُرُوْبَة * ، مَلَزْ أُرُوْبَة

Larix europaea, L. decidua (S). Larix d'Europe, Mélèze d'Europe (F).

نوع من اللاريس منبته جبال اروب. ثمرته تطول من ٣٠ الى ٣٥ م. خراصها صفراء اللون. أوراقها تطول من ١٥ الى ٣٥ م. وتعرض نحو ٥. وهي رجلة، كثافية الشكل، ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي. ازهارها الانثوية ارجوانية اللون. اكوازهَا تطول من ٣ الى ٤ م. وتعرض نحو ٢. جرهاتها سكية الشكل كثيرة العدد.

٢٤٤٣٥ - لَارِيس الصِّين ، مَلَزْ الصِّين

Larix chinensis (S). Larix de Chine, Mélèze de Chine (F).

نوع من اللاريس منبته جبال الصين. ثمرته سبروتية، تطول من ١٥ الى ٢٥ م. خراصها زياه خشبية اللون. بتانقها خلية. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٢ الى ٣ م. لوها الى الخضار الماي يملوه موج ازرق. اكوازهَا مخروطية تطول من ٣ الى ٥ م. جرهاتها بارزة مشنسة الاصغر.

٢٤٤٣٦ - لَارِيس الْيَابَان * ، مَلَزْ الْيَابَان

Larix leptolepis (S). Larix du Japon, Mélèze du Japon (F).

نوع من اللاريس منبته جبال اليابان. ثمرته سبروتية سريعة النمو تطول من ٢٥ الى ٣٠ م. خراصها جوفوية اللون لامة. بتانقها خلية البشرية، بحرية اللون. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ١٥ الى ٣٠ م. لوها الى الخضار الصنابي الموج، اكوازهَا مخروطية صفراء اللون تطول نحو ٤ م. جرهاتها قطنسوية الشكل غائرة الخمار.

٢٤٤٣٧ - لَارِيس أَمْرِيكَة ، مَلَزْ أَمْرِيكَة

Larix americana, L. pendula (S). Larix d'Amérique, Mélèze d'Amérique (F).

نوع من اللاريس منبته امريكة الشمالية. ثمرته سبروتية بطيئة النمو تطول من ٢٥ الى ٣٠ م. خراصها الى الحمرية البفسجية. بتانقها بحرية اللون، وردية الطيلس. أوراقها ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي تطول من ١٥ الى ٢٠ م. اكوازهَا جوفوية اللون تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ٢.

٢٤٤٣٨ - لَارِيس سِيْبَرِيَّة ، مَلَزْ سِيْبَرِيَّة

Larix sibirica (S). Larix de Sibérie, Mélèze de Sibérie (F).

نوع من اللاريس منبته سيري. ثمرته سبروتية تطول من ٣٥ الى ٤٠ م. خراصها سود الخمار. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٤ الى ٥ م. وتعرض نحو ١ م. ازهارها الانثوية الى الخضار الباهت. اكوازهَا مخروطية تطول من ٤ الى ٥ م. جرهاتها بارزة، سدسة الزوايا، قليلة العدد.

٢٤٤٣٩ - لَارِيس كَاذِب ، مَلَزْ كَاذِب

Pseudolarix (S). Faux-larix, Faux-mélèze, Sapin doré, Arbre d'or (F). Golden larch, G. pine (E). Echte Goldlärche (D). Abeto d'oro (I).

شجرة حرجية سبروتية، سريعة النمو، هرية الشكل، وسيدة الجنس والنوع من التنوبيات. مهدا جبال الصين الشمالية. تطول من ٣٠ الى ٤٠ م. اغصانها افقية الانتشاب فارشة. أوراقها عابلة، ضبة التجميع. نصلها خطي الشكل يطول من ٥ الى ٨ سم. ويعرض من ٢ الى ٣ م.



لَارِيس أُرُوْبَة



لَارِيس الْيَابَان



لَاطِيس النِيل

تطول من ٨ إلى ١٠ م. تخلد نصل أوراق التبغ الاخضر وتسرده بين بشرتيه فيبدو شغافاً خالياً من المواد النبتية المهيمنة. راجع عنجول البطاطا.



لاعية

24458 - لاغمة التين *
Mineuse du figuier (F).
هي قوبعة التين ، اطليها .

24459 - لاغمة الزرع *
Agromyza ambigua (S). Mineuse des céréales (F).
حشرة صغيرة من اللاغحات . طولها يراوح من ٣ إلى ٤ م. رأسها وبطنها الى الجؤوة البنفسجية . كوسلها الى السواد الازرق الملوغ . تكثر في اراثل نيسان . تمتع مكها على حذف الزرع فينتف عن رقات تلم التسنج وتسبب ذبوله .



لاغمة الارضي شوكي

24460 - لاغمة الكرنتيم *
Phytomyza atricornis (S). Mouche des chrysanthèmes (F).
حشرة صغيرة من اللاغحات ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. لونها الى الريدة السمر، تعلوها بقع صفر . يرقاتها تركب اوراق الكرنتيم فتلتهمها وتؤذيها اشد اذى .



لاغمة التبغ

24461 - لاغمة اللوبيا *
Agromyza phaseoli (S).
التاصوليها *
Mouche du haricot (F).
حشرة صغيرة من اللاغحات ، طولها نحو ٣ م. ثوبا اسود لامع . تمتع مكها في اوراق اللوبيا قرب الفسلع فينتف عن رقات تعيش بين بشرتي الورقة ثم تنجعه نحو الفسلع ومنها الى الملاق فالساق فالمرقة حيث تبقى الى ان يتم اسلاخها وتتحول الى كزود .



لاغمة الزرع

24462 - لاغمة اوراق الأشجار المثمرة
Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F).
حشرة مؤذية من حرشقيات الاجتحة تدعى رثاعة ملوثة، اطليها .

24463 - لاغمة
Euphorbe officinale (F).
هي الغريون الخزني ، اطليها .

24464 - لاقتاري
Invertébrés (F).
Invertebrata (E).



لاغمة الكرنتيم

24465 - لاقتلي
Acotyélédon (F).
Acotyledon (E).
نعت تمرني يطلق على النبات الدميم القلقة .

24466 - لاغمة بؤغية
Zygospore

24467 - لاقتصيات *
Atracheates (F).
Atracheates (E).



لاغمة اللوبيا

24468 - لاقتيات النمل *
Fourmiliers (F).
Ant-thrush, Ant-catcher (E).

مرتبة من الطير تنسبي الى رتبة الجوارم . فصائلها واجناسها

١٣٠ م. تكثر في مياه الكنج من منبته الى مصبه . ثوبا الى السرة الفحمية يعلوها موج جزوي يبعث عنه الظهر ويخف وزمو عنه البطن .

24469 - لاططات العيون
Edriophthalmes
شعبة من الحيوانات الثريات اللينات الصفد .

24470 - لاططات المتك
Diploures, Eutotrophes
رتبة حشرات مذبذبة من هذيات الاذنان . اجناسها وانواعها نحو ١٥٠ اعطائها جميع المناطق الحارة والمعتدة . تتميز بصغر مكها واحتجابها ، باستاطلة قرونها الاستشعارية العديدة الفواصل وبارسائها الوحيدة المغاسل .

24471 - لاطين
Sessile (F).
نعت تمرني يطلق على الاعضاء النباتية التي لا تقوم على دعائم بل تتركز مباشرة على المحور كقوك ورقة لائلة .

24472 - لاعضوي
Inorganique (F). Inorganic (E).

24473 - لاغية *
Lophospermum (S).
Lophosperme (F).

جنس نباتات عارشة خلية لزجة من فصيلة الخنازريات . انواعها قليلة ، سيقا فراء تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها معتقة قليلة خاسية التغميص . نصلها خلي البثرة مسنن الحافة . اعزارها فردية ، محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، طويلة الزناد ، وريدة اللون موحجة بالابيض والاصفر وهي مغزرة الرقيق يحرسها النحل .

24474 - لاغيات *
Agromyzidae (S).
Agromyzidae, Leaf miners (E).
Minierfliegen (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٥٠٠ جميعها صغيرة القد ، رمادية الكوب او بنية ، ملونة الجناح . تظهر في الربيع . تمتع مكها على اوراق النبات وصاليجه الغضة فينتف عن رقات دقيقة خيطية تدخل النصل فتلتهمه وتقتطع خلاياه ، بين البشريتين ، ثم تتحول بعد اسلاخها الاخير الى كزود تحمك في مكانها او تقيم في التربة كامل فترة بيائها العذري .

24475 - لاغمة الارضي شوكي *
أغروميذا اندلسية *

Agromyza andalusica (S). Mineuse de l'arctichaut (F).
حشرة صغيرة من اللاغحات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. جسمها ازغب الكساء . ثوبا الى السرة العابقة . اجيالها الحولية ثلاثة ، رقاتها تلغم هروق اوراق الارضي شوكي فتلتهمها .

24476 - لاغمة البهشية *
Phytomyza ilicis (S).
البهش *
Mouche du houx (F).

حشرة صغيرة من اللاغحات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. ثوبا اسود اللون . رأسها وجرايزها مجعدة بالاصفر . رقاتها تركب اوراق البهشيات فتلتهمها وتؤذيها .

24477 - لاغمة التبغ *
Pthorimaea operculella (S). Mineuse des feuilles de tabac (F).
فراشة من فصيلة العنجلويات تدعى عنجول البطاطا . دويديتها نخيلة فراء اللون حنطية الرأس حليلة النقط الترجية الجانية.

٢٤٤٧٨ - لَامَة * ، جَمَلْ أَمْرِيكَة

Auchenia, Lama (S). Lama

جنس حيوانات لبونة عاشبة من فصيلة الجمليات . أنواعها أربعة ، موطنها هضاب وجبال أمريكا الجنوبية . أجسامها رشيقة القوام ، طولها يراوح من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ سم . وأرتفاعها من ٨٠ إلى ١٢٥ سم . أعناقها مسطيلة . أوبارها مصنوعة جيدة الصنف تحمي القدر . قوتها الأعشاب . بعض أنواعها داجن يستعمل لدر الحليب ونقل الأثقال .

٢٤٤٧٩ - لَامْتَسَاوِي الْأَوْرَاقِ

راجع غير متساوي الأوراق .

٢٤٤٨٠ - لَامْتَسَاوِي الْبِتَلَاتِ

راجع غير متساوي البتلات .

٢٤٤٨١ - لَامْتَسَاوِيهِ الْأَجْزَاءِ

راجع غير متشابه الأجزاء .

٢٤٤٨٢ - لَامِيَّاتِي

Atypique (F). Atypic (E).

Lamarkia (S). لا مَرْكَبِيَّة ، قَدْ يُنَوِّدْ

Lamarkie, Codion (F). Lamarkia (E).

جنس نباتات عشبية معقودة التعريف على اسم العلامة «لامارك» . وفي بركة ، مرغوة ، حولية أو معمرة من فصيلة النجيليات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، منها جوش البحر الأبيض المتوسط || سوقها شطئية فراء تملو ٢٠ إلى ٥٥ سم . صفها متدل الطول ، قليل الغرض . أزهارها سنبلية التجميع ، شبه غرطوي الشكل ، سنبلاتها متدلية .

٢٤٤٨٤ - لَامِسَة

Tentacle (F). Tentacle, Feeler (E).

ج. لوامس . زوائد لا مفصلية قابلة الانعطاف والانكماش توجد عند بعض الحيوانات تمكئها من القبض على فريستها أو التماس طريقها ...

٢٤٤٨٥ - لَامِشِيَّاتِي

Aplacentales (F). Aplacentalia (E).

شعبة من صف الفرعيات . فصائلها وأجناسها عديدة تجتمع إلى رقتين : الجرابيات ووحيديات المسالك .

٢٤٤٨٦ - لَامِعَاتِ

Ganoïdes (F). Ganoïdes (E).

رتبة أسماك غضروفية تشمل بعض الفصائل أخصها الخفيات .

٢٤٤٨٧ - لَامِعَة

هي الفتوتينية ، نبات من الورديات ، أطبلها .

٢٤٤٨٨ - لَامِصِيَّاتِي

Inarticulé (F). Inarticulate (E).

نمت وصني يطلق على الاعضاء العادة المفاصل .

٢٤٤٨٩ - لَامِي

هو الأمريد ، أطبلها .

٢٤٤٩٠ - لَامِي الْبَلَسَمِ

Amyride gomifère (F). هو الأمريد البلسمي ، أطبلها .

٢٤٤٩١ - لَامِي الْمَكْسِيكِي

Amyride élémiphère (F). هو أمريد المكسيك ، أطبلها .

وأنواعها كثيرة العدد معظمها من طيور إفريقية وأمريكية . تأثت المناطق الحارة والامتوائية || أما فصائلها فهي الجليثيات والفتناجيات والفرناريات والمأنوريات والهنريات والوصريات .

٢٤٤٩٦ - لَأَثُون مُنْقَط

Lacon ponctué (F).

هو السائل المنقط ، أطبلها .

٢٤٤٩٧ - لَأَيَّاسِي ، لَأَيَّاسِي

Asymétrique (F). Asymmetrical (E).

نمت تعريفي توصف به الأشياء الشاذة عن نظم القياسات المألوفة .

٢٤٤٩٨ - لَأَلَا

Renoncule d'Orient (F).

هي الحدوذن الآسيوي ، أطبلها .

٢٤٤٩٩ - لَالَة

Trillium (S). Trillie (F). جنس نباتات عشبية سرطية معمرة من فصيلة الزنبقيات . أنواعها المعروفة عديدة . أعطائها العالم ، معظمها أمريكي المهد . ترطب في المراتق الظليلة . أروماها مدادة . سوقها قصيرة تنتهي بفسمة ثلاثية الأوراق تملوها زهرة ملونة ثلاثية البتلات . أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٤٤٩٣ - لَالَة الْبَلِجِ

Trillium nivale (S). Trillie des neiges (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها منقطة ، بيضبة ، صغيرة القد . فصلها ثلاثي العروق يطول نحو ٥ سم . أزهارها بيض ، قطرها نحو ٤ سم . أزهارها يستمر من آذار إلى نيسان .

٢٤٤٩٤ - لَالَة حَافِيَّة

Trillium sessile (S). Trillie sessile (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراقها حافضة ، فصلها ثلاثي العروق أهليلجي الشكل مذنب الزام الأخير يطول من ٧ إلى ١٥ سم . أزهارها قوزية اللون ، قطرها يراوح من ٥ إلى ٦ سم . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٤٤٩٥ - لَالَة كَبِيرَة الزَّهَر *

Trillium grandiflorum (S). Trillie à grande fleur (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها حافضة . فصلها خماسي العروق أهليلجي الشكل ذلق الزام الأخير يطول من ١٠ إلى ١٤ سم . أزهارها عادمة العروق ، كبيرة القد ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها إلى الأبيض أو الوردي . أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٤٤٩٦ - لَالَة مُنْتَصِبَة

Trillium erectum (S). Trillie dressée (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها حافضة . فصلها خماسي العروق ، سنائي الشكل ، مستنق الزام الأخير يطول نحو ١٢ سم . أزهارها جفر ، كبيرة القد ، منتصبية الارتكاز . يتلاتها إلى الخضار الأصفر يطوقها حنار أحر وتغطيها ثلاثة غطوط جزوية . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٤٤٩٧ - لَامِيَّاتِي ، هَيْبِلِر

Anhydre (F). Anhydrous (E).

نمت تعريفي توصف به الأجسام الخالية من الماء أو العادة الماء .



لالَة كَبِيرَة الزَّهَر



لالَة

٢٤٥٠٠ - **لاهولايَّة ، أنيربيَّة** (F). Anaérobie (F).
 (E). Anaerobe (E).
 صفة الكائنات الحية المجهرية التي تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .



لايون ابيض

٢٤٥٠١ - **لاؤتدہ**
 هي الخواص ، اطلبها . ومنها الاصلية والذكر والغرسية والحسنه .

٢٤٥٠٢ - **لايتحلّ ، لايتدوب** (F). Indissoluble (F).
 (E). Undissolved (E).

٢٤٥٠٣ - **لبّ**
 هو ما في جوف الحبة واللوزة وغيرها من مادة جامدة مأكولة أو غير مأكولة .

٢٤٥٠٤ - **لبّ الثمرة ، ميزوكرتب**
 (F). Mésocarpe (F). Mesocarp (E).
 هو البوق ، الجزء المتوسط من الثمرة ؛ وهو الجزء اللحمي في الثمار المأكولة .



لايون ارجواني

٢٤٥٠٥ - **لبّ النارجيل ، كُبْرَة**
 (F). Coprah, Copra (F). Coco-nut (E).
 لب ثمر النارجيل الذي يستخرج منه بالمصر دهن نباتي يدعى « سمن نباتي » .

٢٤٥٠٦ - **لبّ يَبُي**
 (F). Brunissement interne (F).
 (E). Internal browning (E).
 عارض يصيب ثمار التفاح الخزونة في البراد ، قوامة عروق مستطيلة مستقيمة ومتعرجة تشعب من وسط الثمرة الى سطحها فتعطب الخلايا التي تغطيها وتسبب اختار عصيرها . يقال ان اسبابه تعود الى انخفاض درجة الحرارة قرب وزن ادراك الثمار وإلى هبوطها في البراد حتى درجة الصفر واستمرارها على هذه الدرجة بعض الوقت .



لايون ارط

٢٤٥٠٧ - **لبّا**
 (F). Arroser (F).
 (E). To water, To sprinkle (E).
 لبّ الثمرة : سقاها عند غرسها ، اذا غرست فيسلة يجب ان تلبّأها .

٢٤٥٠٨ - **لبّا**
 (F). Amouille, Colostrum (F).
 (E). Bestings, Colostrum (E).
 اول حليب عقب الوضع تدره البقرة والشاة والنعرة . وهو غني بالمواد الاحية فقير بالزبد والسكر والماء .

٢٤٥٠٩ - **لبّاب**
 (F). Pulpe (F). Pulp (E).
 هو بوجه عام جاع المادة الدفنية النباتية الطبيعية . وهو بوجه خاص ما تبقى من الثورندو بعد استخراج السكر ومن البطاطا بعد استخراج النشا .

٢٤٥١٠ - **لبّابي ، لبّوبي ، لبّوبي ، لحي**
 (F). Pulpeux (F). Pulpous, Pulpy (E).



لايون اسفر

٢٤٥١١ - **لبّادى ، لبّادى**
 قال الجاحظ : « طائر على شكل البنان اذا أسفّ على الارض ليد فلم يكد يطير حتى يطار » .

٢٤٥١٢ - **لبّان ، بستج**
 (F). Boswellia (S).
 (E). Boswellie (F).
 جنس اشجار حرجية من سبط البخوريات وفصيلة البطيبيات انواعه المعروفة قليلة اصنافها جبال المناطق الاستوائية الهندية

٢٤٤٩٢ - **لايمية الصفصاف** (F). Lamie des saules (F).
 هي قزلي الصفصاف ، اطلبها .

٢٤٤٩٣ - **لايميون**
 (F). Lamium (S).
 (E). Lamier (F). Dead-nettle (E).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ٤٠ جميعها اشباب تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، مخززة . ازهارها ضمية الجميع ، ابطية الاوتكار . تكثر في الاماكن الظليلة وفي السياجات وبجاري الماء . وهي من النباتات المرعوية التي تشتهها الماشية . اصف انواعه واضهرها ما يلي .

٢٤٤٩٤ - **لايميون ابيض * ، قراض كذاب**
 (F). Lamium album (S). Lamier blanc, Ortie blanche, O. morte, Fausse ortie (F). White dead-nettle (E).
 نوع من اللايميون الطبي . عشبته تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه الى الخضار الاصفر المواجه ، يملوها زغب مبعثر نحل . ازهاره كبيرة اللد بيضاء اللون || ازهاره ربيعي يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٤٤٩٥ - **لايميون ارجواني * ، قراض احمر**
 (F). Lamium purpureum (S). Lamier pourpre, Ortie rouge, O. fétide (F). Red dead-nettle (E). Rote Taubnessel (D). Lamio purpureo, Ortica fétida (I).
 نوع من اللايميون الطبي . عشبته كرحبة الرائحة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره ارجوانية اللون ، كبيرة اللد ، تطول نحو ٤ سم . ازهاره ربيعي .

٢٤٤٩٦ - **لايميون ارقط * ، لوقاس ، حروف**
 (F). Lamium maculatum (S).
 (E). Spotted dead-nettle (E). Gefleckte Taubnessel (D). Lamio scitro, Dolcimele, Mizardella (I).
 نوع من اللايميون الطبي . عشبته تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره كبيرة اللد تطول نحو ٥ سم . لونها الى البياض المرقط بالاحمر || ازهاره ربيعي .

٢٤٤٩٧ - **لايميون اصفر ***
 (F). Lamium luteum, L. galeobdolon (S). Lamier galéobdolon, Ortie jaune (F). Yellow archangel, Yellow dead-nettle (E). Gelbe Goldnessel, Goldtaubnessel (D). Lamio giallo, Ortica gialla (I).

نوع من اللايميون ، عشبته تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مائلة البثرة على صفحاتها ، ازهاره متوسطة اللد تطول نحو ٣ سم . لونها الى الصفرة الكبريتية . ازهاره ربيعي .

٢٤٤٩٨ - **لاهيبة ، ملهتاب**
 (F). Lance-flammes (F). Flame thrower (E).

جهاز آلي يرسل اللهب ويسده . يستعمل في القضاء على بعض الحشرات وفي تطهير التربة من بعض الاوصام والجراثيم

٢٤٤٩٩ - **لاهواكي ، أنيروبي**
 (F). Anaérobique (F). Anaerobic (E).

نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع الحياة بعيداً عن الهواء .

سوقها عصارة صمغية رائحة شفاقة تستعمل استعمال البخور ، عرفها ليموني الرائحة مستحب .

٢٤٥٢٢ - لَبَبْ

لب الحب : جرى فيه اللدقيق وصار له لب يؤكل .

٢٤٥٢٣ - لَبْتْ ٥*

Tilapia (S).

Tilapia (F). Tilapia (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة المشطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض انهر الشرق الادنى وافريقية الشرقية || اجسامها صغيرة ، شبه اهليجية الشكل ، معتدلة التعليط ، وذية القدم ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . رؤوسها معتدلة الجرم ، قصيرة الاطعام ، صغيرة الاشداني كبيرة العين . زعانفها الظهرية كبيرة ، قليلة المرض . الصدرية والخصوية والشرجية معتدلة الجرم . الذيلية كبيرة ، مقطوعة الطرف . اوتابها تراوح من الزيدة السمر الى الوردية الفضية يملوها ستة او ثمانية او عشرة اطواق معتدلة شديدة السمره || من ميزات هذا الجنس ان الذكور تحضن سره الاناث في تجاويف اعطامها حتى التفك اي نحو سبعة ايام || اعرف انواعه :

Tilapia orontea (S).

٢٤٥٢٤ - لَبْتْ العاصي

Tilapia de l'Oronte (F).

يكثر وجوده في نهري العاصي والاردن .

Tilapia nilotica (S).

٢٤٥٢٥ - لَبْتْ النيل

Tilapia du Nil (F).

يكثر وجوده في النيل حيث يسمونه غرشقي وبشط في حين ان المشط اي الغرشقي ينتمي الى غير هذا الجنس .

٢٤٥٢٦ - لَبْتْ ٥*

Trombidium holosericeum (S). Lepte automnal, Aouat, Mite rouge, Vendangeur (F).

حشرة من الغاشيات ، طولها نحو ٣ مم . ثوبها الى الحمرية تكثر في المراعي والحقول المزروعة وعلى اللوبيا . رقبها نحيلة دقيقة طولها يراوح من ١ الى ٢ مم . تركيب الانساج اذا جلس فوق الشب وتدخل تحت بشرة الجلد تحدث حكاكا مؤلما . يجيبها البزير .

Leptothyrium

٢٤٥٢٧ - لَبْتُونِيُوم ٥

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهديكات . انواعه قليلة ، تتميز ببيكانتها المحجنية الشكل ، السطحية الارتكاز ، السوداء اللون . بوفاته اهليجية او وشعية || اعرف انواعه ما يلي .

٢٤٥٢٨ - لَبْتُونِيُوم التفاح ٥*

Leptothyrium pomi (S). Maladie en crotte de mouche (F). Sooty blotch (E).

فطر مجهرية يعترى ثمار عدة نباتات برية وزراعية انحصا التفاح في بعض انواعه المتشابة || مظهره الخارجي وقش ورشية تشبه وتم الذباب يبلغ متوسط عددها نحو ٤٠ نغمة . تركب بشرة الثمرة قرب ادراكها . تبو حنطية اللون ثم تنحرف الى السمره الفحمية || يشب البار فينبس قيمتها التجارية دون ان يعطها || يكافح باستعمال سائل يورده الخفف قبل ادراك الثمار باسبوعين .

٢٤٥٢٩ - لَبْتُونِيُوم كاروفيلوم ٥

Leptothyrium carpophilum (S). Fly speck (E).

فطر مجهرية يعترى بعض انواع الاجناس المتشابة . مظهره

والايريقية . يستخرج من سوقها بالخز عصارة رائحة سريمة الجفاف فاحرة الصنف تدعى بخور اللبان || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٥١٣ - لَبَن حَبْثِي * ، بَسْتَج حَبْثِي ، طُونَس

Boswellia papyrifera (S).

Boswellie d'Abyssinie, Arbre à l'encens (F). Incense tree (E). Weihrauchbaum (D). Albero Incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته صغيرة القد ، موطنها بلاد الحبشة . يستخرج منها بالخز اخضر بخور واجمته .

٢٤٥١٤ - لَبَن شامي ، صَمْع البُظْم

Poix-résine (F). Shoemakers' wax (E).

مادة راتنجية صمغية تستخرج من سوق البطم .

٢٤٥١٥ - لَبَن هندي ، لَبَن ذَكَر ، بَسْتَج هندي ، كَنْدَار

Boswellia serrata (S). Boswellie des Indes, Oliban (F). Frankincense, Olibanum tree (E). Echter Weihrauchbaum (D). Olibano incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته متوسطة القد ، موطنها بعض مناطق الهند . يستخرج منها بالخز بخور اللبان المشهور .

٢٤٥١٦ - لَبَن

Laitier (F). Milkwoman (E).

من تعاطى بيع الحليب واللبن .

٢٤٥١٧ - لَبَانَة

Andrachnes (S). Andrachné (F). False orpine (E). Echter Burgel (D). Porcellana (I). جنس نباتات برية من فصيلة اليتونيات ، انواعه عديدة منها الاشباب والجنبات والشجيرات . جميعها معمرة ، اعطائها المناطق الحارة والمعتدلة في سائر اقطار العالم . سوقها منتصبة او معرجة ، فروعهها دقيقة ملتوية . اوراقها صغيرة القد معتقة متعاقبة متقاربة . ازهارها ابطية فورية . ثمارها جراء تغلف نحو ٦ بزور آحية المادة || اشهر انواعها الطيبة ما يلي .

٢٤٥١٨ - لَبَانَة المَوسَط *

Andrachnes telephiolides (S). Andrachné téléphiole (F).

نوع من اللبانة الطيبة ، مهددا تمام شرقي المتوسط من فلسطين الى انزير . ساقها نحيلة ، فروعهها دقيقة وملتوية . اوراقها صغيرة ، بيضية النصل ، نعيمها ينقي الدم ويدبر البول .

٢٤٥١٩ - لَبَانَة الهِنْد

Andrachnes cadishawii (S).

Andrachné cadishaw (F).

نوع من اللبانة الطيبة ، مهددا الهند . اوراقها مطورة ناجمة

تقدم الجروح وتشفى القروح الحبيطة .

٢٤٥٢٠ - لَبَانَة مغربية

Euphorbe résinifère

هي العنجد ، اطلبه .

٢٤٥٢١ - لَبَانَة * ، اَمْطِي

Icica icariba, Protium icariba (S). Icaquier (F).

Elemi gum tree (E). Elemibaum (D). Elemi (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البخوريات . انواعها عديدة ، اعطائها المناطق الاستوائية والحارة بعضها يعيش في رمال الشواطئ البحرية والصحريه . اوراقها مركبة متعاقبة . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون . ازهارها عذوكوي او عذوكوي التجميع ، محوري الارتكاز || يستخرج من



لبان حبشي



لبانة المتوسطة



لبانة



كيت



ليبت



ليتونيوم كاروفيلوم

النبات || البرقة عند الادوك الثام تطول نحو ١٦ م .
جسمها شبه اسطواني الشكل اسمر اللون اطحل المراج ،
اسود الرأس ، مبعثر الهلب الثام الاجبر اللون .



ليثورة دسائية
التجذيع



ليثورة مدانية
ليثورة مستقيمة



ليثورة مضطربة



ليثورة ملطحة



ليثورة منقطة
ليثورة مؤذرة



ليثونة

٢٤٥٣٦ - ليثورة ملطحة * (S).

Leptura maculata (S).
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ الى ١٧ م .
جسمها ضيق مستطيل ، رأسها وكوسلها الى السواد الفضي .
عندما الى الصغار اللبني يملوها بخطوط وتبيج وتنش .
اسود . تعيش على مختلف ازهار الورديات والحميات .
يكثرو وجودها من ايار الى ايلول . رقاتها همة مؤذية .

٢٤٥٣٧ - ليثورة منقطة * (S).

Leptura cerambyciformis (S).
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٧ الى ١١ م .
رأسها وكوسلها الى السواد اللامع . عندما الى الصفرة
المغرة تملوها نقط سود طرية || تعيش في الاغلاوالخادائق
الجبلية ، يكثرو وجودها من حزيران الى آب .

٢٤٥٣٨ - ليثورة مؤذرة * (S).

Leptura aurulenta (S).
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ الى ١٨ م .
رأسها وكوسلها الى السواد الباق . عندما الى الصفيرة
الغنية تملوها ثلاثة خطوط سر يملوها حل مذهب اللون .
تعيش على مختلف الاشجار الحرجية اغصانها السنديان ،
يكثرو وجودها من حزيران الى آب . رقاتها مؤذية تسردب
الشكير .

٢٤٥٣٩ - ليثوسيريات * (S).

Leptocercidae (S).
فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة المد منتشرة في بعض اصقاع
البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها
متوسطة القد ، غبراء . اجنحتها غبراء اللون مهدبة الاطراف
الخلفية ، تملوها بعض الزخارف . تزنيها واضح التزيين ،
قائلي الاعصاب المترقة || ملجها الحياني جامي . افواجاها
كثيرة العدد . تحلق فوق مجاري الماء خاصة بعد الظهور ||
اساريها تعيش في المياه الجارية ملموعة بجلابيب مخروطية
منعقة كمد الحسام || اشهر اجناسها :

Leptocercus (S).
Trianaodes (S).
Mystacides (S).

٢٤٥٤٠ - ليثون * (F).

الياف نشطية تحية تظهر في الجبلية عندما تكون في اول
طور الحبوقة .

٢٤٥٤١ - ليثونة * (S).

Lepton (S).
Lepton (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات سفنجيات الحاشيم
وفصيلة اليرسويات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
معظم بحار العالم || جميعها صغيرة القتل طول من ١ الى
٢ م . اصداها شبه بيضيه الشون ، رقيقة الصفا ،
قليلة الاحدياب . يملوها ريس قمي الشكل || تعيش
لاسقة بالصخور . ليثونها غزير المادة .

الخارجي رقة حنطية تركب التار فتصلب البشرة المنحارة
وتشيب التار دون ان تملها || يكالغ باستمال سائل
يوردو الخفف او السائل السلفوكليسي .

٢٤٥٤٠ - ليثورة * (F).

Leptura (S).
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . انواعها عديدة ،
جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الجراميز والزياني ، زاهية
الالوان السوية او المزركشة . تركب ازهارا مختلف
النباتات اغصانها المشبية || رقاتها همة تعيش تحت لحاء
الجروح والاغصان الصلقة وقد تسردب الشكير || اشهر
انواعها ما يتبع .

٢٤٥٣١ - ليثورة ذهبية * (S).

Leptura fulva (S).
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٠ الى ١٤ م .
رأسها ويوشها وجسفتها سود . عندما الى الصفرة الذهبية .
تعيش على ازهار المركبات والحميات . تكثرو في المروج
والمراعي من حزيران الى ايلول .

٢٤٥٣٢ - ليثورة سداسية التجذيع * (S).

Leptura sexguttata (S).
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ م .
نوها اسود اللون . عندما سداسية التجذيع الاصفر .
تعيش على ازهار الحميات . يكثرو وجودها في حزيران .

٢٤٥٣٣ - ليثورة سيدانية * (S).

Leptura cordigera (S).
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ الى ١٦ م .
رأسها ومقدم جوشها وحجفتها بسود . عندما الى الحمرية
الكرزية يملوها عند ملتقاهما بسود الزام الالون
القاعدة بقعة سوداء مستطيلة سدانية الشكل تمتد حتى
طرف القمدين || تعيش على ازهار الشوك والاراضي شوكي .
يكثرو وجودها من حزيران الى ايلول .

٢٤٥٣٤ - ليثورة فسقية * (S).

Leptura virens (S).
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م .
نوها الى السدرة يملوها حل دقيق كثيف اصفر اللون
اغصان المروج تكثرو في احراج الصنوبر . رقاتها همة
تسردب قشور وشكير الاخشاب اليابسة والمقلطومة .

٢٤٥٣٥ - ليثورة مضطربة * (S).

Leptura bifasciata (S).
Leptura bifasciata (F).
Leptura bifasciata (E).

حشرة خاضعة من فصيلة القرنبيات ورتبة سمعات
الاجنحة . تألف الهضاب والبراري . غناها تعيش على
بساتن الازهار . رقاتها خاضعة ناعمة تركب لحاء الاشجار
الغنية وسوق النباتات الحولية خلفها وتسردبها وتعلها ||
جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١٠ م . نوها ثنائي
اللون ، رأسها وكوسلها وزباناها وبرازها الى السواد
المايق اللامع ، بطنها وظهرها الى اللبي الاسمر المراج
يملوها في القمدين تمصيب اسود . رأسها صغير الجرم .
عيناها كبيرتان ناشزتان . زباناها دقيقان ، مستطيلان .
ظهرها فارق المؤشر لا يلحف السكمة الشرجية . عندما
متناخا التميزير القاطب . اسفاها رباعية النقل الظاهرة ||
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانية في اوائل
حزيران وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار .
تسافد عند ظهورها باربة اسابع . تترز المكان في لحاء



ليثين



لبث



لبخ الجبل



لبرة الحمص



لبرة الزيتون



لبرة الكرز

٢٤٥٤٢ - ليثيد *Leptidea brevipennis* (S).

٢٤٥٤٣ - ليثين *Leptine* (F). *Leptinus* (S).

حشرة نصفية الغمد من فصيلة القرنيات. اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثوبها الى السمرة الحطية الشبهاء. زباني ذكورها مستطيلة تلحف كامل الجسم. زباني انثاهما قصيرة تبلغ طرف الانغام || قوتها جمع المواد الصغوية واخصها الاغشاب اللينة التي تنخرها وتردها وتقضي عليها.

٢٤٥٤٤ - ليثين *Leptinus* (S).

جنس حشرات من فصيلة الليثينيات ورتبة عديدات الاجنحة انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صفيرة ، بيضيه الشوزن ، تطول من ٢ الى ٣ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. عينها طامسة. تأثيرها وكوكها وملاصها صغيرة. قرنها الاستشعارية غيطة ، مستطيلة. كواسلها مستعرضة ، خلية القشار. انغامها لاحفة يملؤها خل قصير. قوائمها نشيطة. اولها الى السمرة المختلفة الماحجات ، يكثر فيها الاصفر || تنطفل على مختلف انواع القواضم. تعيش على التوفغات التي يفرزها الجله.

٢٤٥٤٥ - ليثينيات *Leptinidae* (S).

فصيلة حشرات جلدية من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صفيرة ، مبطلة ، شبه بيضيه الشوزن ، تطول من ٢ الى ٤ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. عينها طامسة. تأثيرها وكوكها قياسية. قرنها الاستشعارية صوطانية. كواسلها وانغامها خلية القشار. انغامها متباينة الشكل ، بعضها يلمع كامل الطعن والبيض الآخر نصفه. اوساغها ربابية العقل. اولها عادمة الشقاق || تعيش على فراء القواضم الحية. قوتها التوفغات التي يفرزها الجله || اشهر اجناسها الليثين.

٢٤٥٤٥ - ليث * ، حمض الماء *Lapathum aquaticum* (F).

Patience aquatique (F). *Water dock*, *Water sorrel* (E). *Wasseramper* (D).

Romice aquatico (I). نبات عشبي بري معمر من فصيلة البطاطيات. يكثر في المنائق وعلى مجاري الماء. جذوره درية ، ساقه فضاء تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه منعقة اهليلجية مستطيلة ؛ نصلها باهت المخفار البحري ، متمتع الصفحة.

٢٤٥٤٦ - ليث *Lebbek* (F).

جاء وصفه في البيزيا الليث ، راجعها.

٢٤٥٤٧ - ليث الجبيل *Cocculus laeaba* (S).

Coquecule glabre (F).

نوع من الكوكوس من فصيلة القمريات. وهو نبات عشبي طيب بري معمر. ساقه فضاء. فروعوه رولة متدلية. اوراقه منعقة متعاقبة بيضيه صفيرة اللد. نصلها ماس البيرة على صفحتيه || وهو يستعمل في عدة مستحضرات طبية منها علاجات الحمايات والبرقان والزرقنة والكدب ...

٢٤٥٤٨ - ليثغة ، ليثغة *Cataplasme*, *Charge* (F). *Cataplasme*, *Poultice* (E).

مستحضر قاعل يوضع على مكان الألم من الجسم.

٢٤٥٤٩ - ليثد *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

هو الاصلي من ثبوت البلاد او عظمها اي حيواناتها.

٢٤٥٥١ - ليثد *Lepidurus* (S).

Lépidure (F). *Lepidurus* (E).

دوبية من القشريات خيشويات الاطراف تعيش في المياه العذبة اينما تكاثرت الاغشاب || جسمها صغير القد ، مبسط الشكل ، يملوه لحاف مجي يلفظ الظهر. زباناها شديدا القصر. قوائمها الصدرية كثيرة العدد.

٢٤٥٥٣ - ليثدي ، وثيري *Tomenteux* (F).

Tomenteux, *Downy* (E). نعت تمريني يوصف به كل عضو نباتي خله مستطيل وكثيف كالوبر.

٢٤٥٥٤ - ليثرة ، سيلندروسپوروم *Cylindrosporium* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات. انواعه قليلة العدد والادنى || كئانه غروبية الشكل تشأ منفردة ثم تتجمع. بويضاته مستطيلة وقد تكون غيطة منشفة ، مؤدرة الاطراف || اشهر انواعه ما يتبع.

٢٤٥٥٥ - ليثرة الحمص *Cylindrosporium pisi* (S).

فطر مجهرى يصيب الحمص في سقه واوراقه وحنابله. مظهره الخارجى يقع صفرا او رمادية اللون، مقرنة الزوايا، تركب السوق ثم الازراق والحنابل تقسب الجفاف واليباس.

٢٤٥٥٦ - ليثرة اللدب *Cylindrosporium platanoïdis* (S).

فطر مجهرى يركب اوراق اللدب والقيقب. مظهره الخارجى ينور صفيرة كثيفة شقراء اللون ، تركب النصل بكامله تقسب الذبول والاعبال.

٢٤٥٥٧ - ليثرة الزيتون *Cylindrosporium olivae* (S).

Cylindrosporiose des olives, *Lebbra des olives* (F).

فطر مجهرى يصيب النار يقضي عليها بعد ان يجمعها ويحفظها. مظهره الخارجى يقع فسيحة مستديرة او بيضيه الشكل ، تلبو في تشرين ، تركب الاذن ثم تمتد الى النار ، تظهر بنفسجية اللون ثم تنحرف الى السمرة الباهتة تقسب يباس اللب بعد تمجيحه وتشقيقه || تقلبات الحرارة الجوية وارتفاعها بعض الايام ينشط هذا الوسم. يكثف باستعمال الاملاح النحاسية الخفيفة.

٢٤٥٥٨ - ليثرة الكرز *Cylindrosporium padi* (S).

فطر مجهرى يصيب ويغطي اوراق الكرز || مظهره الخارجى يقع صفيرة مستديرة او مقرنة الزوايا ، قطرها من ٢ الى ٣ سم. لوها الى الصبة الزاوية ، توسلها نقطة بيضاء ، تركب النصل تقسب يباس وانحناات التسج المتحارة || يكثف باستعمال السوائل السلفوكسية بعد تخفيفها نحو ٥٠ ٪. وعملها ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد.

ظهورها مستدير المؤخر الفارق اللامع . غمداء متتابعات
التنقيط الخفيف . أرسافها رباعية المقل الظاهرة || لها
جبل واحد في الحول . تظهر أخشرة الجملانة في أواخر
نيسان وتعيش حتى أواخر حزيران . تشرح في الليل وتضاف
بعد ظهورها بنحو ثلاثة أسابيع . تمتع المكن رؤيا تغلفها
مادة غروية على اتصال الأوراق ولها السوق والتضيقان ||
البرقة عند بلوغها الإدراك تطول نحو ٧ م . جسمها شبه
أسطواني الشكل ، قليل التقويس ، سداسي الرواجب ،
ستطي اللون ، اسمر المولج ، أسود الرأس . ويعلو الجسم
ثلاثة خطوط قاطبة عاجية وهلب دقيق اشبه اللون || طور
الاكمام الذي يستمر نحو أربعة أسابيع يتقضي في التربة
تحت الجلالة والبلبل .



لبوس الوزال

Labeobarbus (S).

٢٤٥٦٦ - كَبَرُوس

Labeobarbe (F).

جنس اسمك نهرية من مفتوحات المائة وفصيلة البطريات.
أنواعه المروفة ثلاثة ، اثنان يعيشان في أنهر الهند وأفغان
وواحد يعيش في النيل || أجسامها شبه اهليلجية ، قليلة
التخطيط ، تطول من ٦٠ الى ٧٥ سم . رؤوسها معتدلة
الجرم . عيونها جاحظة . اشداقها كبيرة ، خاصة اللبانات
الصغيرة . زعانفها الظهرية فردية ، شرعية الشكل .
زعانفها الذيلية فارقة . أوتابها الى الخضار البحري .
زعانفها الى الخضار الاصفر || لحويها متوسطة الصنف ،
مأكولة || اما أنواعها الثلاثة فهي :

Labeobarbus nagdia (S).

لبوس النيل *

Labeobarbus jungha (S).

لبوس أصام

Labeobarbus macrolepis (S).

لبوس كشمير

Labrella (S).

٢٤٥٦٧ - كَبَرِيْلَا

جنس نباتات مجهرية من فصيلة الهذكيات ، أنواعه قليلة
لا مؤذية . يكتنحاته مستديرة ، سداة اللون ، فرجية
لا انفلاق . بويغاته مستطيلة او وشعية او كروية الشكل ،
شفافة .

Sanve (F).

٢٤٥٦٨ - كَبَسَان

هو الخردل البري او خردل الحقل ويدعى الحرشاء . وقد
يصر من الأعشاب الضارة نيا لو كثر في الزرع . إبادته
تتم بإستعمال أحد الموشاب الفعالة الكثيرة الوجود في
هذا العصر .

Lampsane commune (F).

٢٤٥٦٩ - كَبَسَانَة

هي الخفج ، اطليه .

Pralinage (F).

٢٤٥٧٠ - كَبَسَة

علية زراعية تتقدم غرس النصب . قوامها تغليس جنور
الاغراس بروة مائنة من الماء والطين ويخفي القبر وذلك
لتغطية الجذور وجبرسها بنشاء ناعم واق لا يتخلل من الغذاء
يساعدا على مقاربة عوامل البيئة الجديدة ويحضرها ويحياها
على انتاش الجذرات الخيطية وما يتبعها من عدة استصاص
الغذاء ، اود الحياة والنشوء .

Lobostemon (S).

٢٤٥٧١ - كَبَسَمُون

Lobostémone (F). Lobostemon (E).

جنس جنبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الحمصيات .
سوقها منتصبه فراء تعلو من ٧٠ الى ١٥٠ سم . أوراقها

٢٤٥٥٩ - كَبَرَةُ المِيوزُوْتِس

Cylindrosporium myosotidis (S).

فطر مجهرى يركب نصل أوراق الميزوتيس || مظهره
الخارجي يقع نسيجة مستطيلة ، طولها نحو ١٠ م . لوها
الى السرة ، اطرافها اصفر الخصب ، اشقر المولج . تسبب
الذبول والالجاب .

Lapeyrousia (S).

٢٤٥٦٠ - كَبَرُوْتِيَة

Lapeyrousie (F).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات . انواصها
كثيرة العدد معظمها بري وبعضها تزييني . مهدا البلاد
الافريقية . جميعها صغيرة القد وحيدة الساق والشرعية .
أوراقها مردوبة الصنف . أزهارها سنبلية التجميع .
اعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع .

٢٤٥٦١ - كَبَرُوْتِيَة أُسَلِيَة الوَرْق

Lapeyrousia Juncea (S). Lapeyrousie à feuilles junci-
formes (F).

نوع من البروزية . أوراقها اسلية الشكل ، مستطيلة
التصل المهذب الختار . شرانخها الزهري يعلو من ٤٠
الى ٦٠ سم . أزهارها سنبل التجميع . أزهارها متوسطة
القد ، كثيرة العدد ، وردية اللون || تنورها يستمر
طوال شهر أيار .

٢٤٥٦٢ - كَبَرُوْتِيَة عَذِيْقَة

Lapeyrousia corymbosa (S). Lapeyrousie en co-
rymbe (F).

نوع من البروزية ، شرانخها يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم .
أزهارها مظلي الشكل وهو بذلك يشذ عن سائر أنواع الجنس .
أزهارها الى الزرقة الزاهية تنطسها نجمة يفساه اللون
بنفسجية الختار . تنورها يستمر نحو ٣ أسابيع
ابتداء من شهر أيار .

٢٤٥٦٣ - كَبَرُوْتِيَة كَبِيْرَة الزَهْر

Lapeyrousia grandiflora (S). Lapeyrousie à grandes
fleurs (F).

نوع من البروزية ، أوراقها غمية الايتكان . شرانخها
يعلو نحو ٣٠ سم . أزهارها سنبلية التجميع . أزهارها
اريجوانية ، زاهية ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم .
تنورها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

٢٤٥٦٤ - كَبَرُوْتِيَة مُبَطَّطَة السَاق

Lapeyrousia anceps (S). Lapeyrousie à tige aplatie (F).

نوع من البروزية ، شرانخها مبسط الجسم ، ثنائي الزوايا ،
يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . أزهارها سنبلية التجميع . أزهارها
بنفسجية اللون . تنورها يستمر طوال شهر أيلول .

٢٤٥٦٥ - كَبَرُوس الوَزَال

Luperus circumfusus (S). Luperus des genêts (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النصاريات ورتبة مغذات
الاجنحة . تألف اليرم والبراري والاحراج . غناها
ورقاتها تعيش على نباتات القرنيات الفراضية واعضاها
الوزال || جسمها صغير القد يعلو من ٣ الى ٤ م .
ثوبها الى الصفرة النشواء المولج يطوقها في الكويل والفدين
ختار اسود . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان .
زبانها عيطاني . عظمها مخروطي . فكاه ذريان .



لبوس النيل

٢٤٥٧٩ - **لُبْسُ حُنْطِي*** (S). *Elops congicus*
Elops brun (F).
 نوع من اللبص. اعطانه تمتد من مصب النيل الى الجزائر والمغرب. جسده متوسط القد النسبي، يطول نحو ٧٠ سم. ثوبه الى الرعدة الخطية المواج يمتد في الظهر ويبيض في البطن || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٥٨٠ - **لُبْصِيَات**
 Elopidae (S).
 Elopidae (F).
 فصيلة اسماك بحرية من العظميات مفتوحة المشانث. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة. مسرحها الاغواط والتفاف والمحاجد وبعض انواعها تدخل الاغوار والانهار || اجسامها اهليجية الشكل تطول، بالنسبة الى الانواع من ٣٠ الى ٢٠٠ سم. رؤوسها مخروطية كبيرة الاشدق تتميز بوجود نصل عظمي المادة يتوسط الفك السفلي ويرتكز على جانبيه. ظهورها شبه مسطحة. بطونها محدبة. زعانفها الظهرية مقعرة. زعانفها الذيلية فارقة || اشهر اجناسها واعرفها اللبص والمعجاس.

٢٤٥٨١ - **لُبْطُوس*** (S).
 Leptosomus (S).
 Courou, C. bicolor (F).
 طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة القتيويات. اعطانه فسيحة تمتد من تهام البحر الاحمر الى الحبشة ومدغشقر ومعظم مناطق افريقية الجنوبية || الذكر اصفر قدماً من الانثى، طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه متباين الالوان. ظهره مع جناحيه وذنبه الى الخضار النعاسي المواج. يمتد الى الصبهة الغبراء. رأسه الى الصبهة الخطية تملوها قطنسوة سمراء. زنده كمرف الديك ثنائي الانتشاب || الانثى تطول نحو ٥٥ سم. ثوبها الى الرعدة الخطية تملوها نمشة صناعية النتم سمراء الحمار. وثوبها هذا يمتد في الرأس والظهر والذنب ويغير في المتق والصدر والبطن والافنك || يألف الغابات والادغال. قوته الثار والحشرات اخصها الجراد والجنادب والزيرزان || يدق عشه في الانحجار المتراكبة الاغصان والافنان. الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بجناحيه الذكر نحو ٢٤ يوماً.

٢٤٥٨٢ - **كَلْبَاب**
 Convolvulus (S).
 Liseron (F). Convolvulus (E).
 جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اللبليات. انواعه نحو ١٥٠ اعطائها المناطق الحارة والمعتدلة معتمها بري وبعضها طبي وزرعي || اعرف انواعه واشهرها مايلي.

٢٤٥٨٣ - **كَلْبَابِ اَرُضِي** هو الكفة المدادة، اطلبها.

٢٤٥٨٤ - **كَلْبَابِ اَلْحُقُولِ*** ، كَلْبَابِ صَغِيرٍ ، طَرَبُوشِ الْغُرَابِ

Convolvulus arvensis (S). Liseron des champs, Petit Liseron, Liset, Vrillet (F). Corn bind, Corn lily, Lesser bindweed, Bearbine (E). Ackerwinde, Winde (D). Convolvolo arvense, Erba leprina, Vitechio (I).
 نوع من الكلاب المبدول، يكثر في الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الفسرة. ساقه مضلعة مغزيرة تطول من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه رعيحة مجتمعة. ازهاره وردية اللون او بيضاء، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

لاطئة، متعاقبة، كاملة. ازهارها مختلفة الالوان منها الازرق والوردي والبنفسجي والاحمر || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٢٤٥٧٢ - **كَلْبَشْتُمُونْ أُنَيْق***
 Lobostemon formosus (S).
 Lobostémone élégant (F).
 نوع من اللبستمون. ساقها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. افتادها مغزيرة اللحاء. اوراقها سنائية الشكل. نصلها خلية الصفحات العليا، مسنة الحمار. ازهارها وردية اللون متدلية. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٥٧٣ - **كَلْبَشْتُمُونْ بِحَرِّي الْوَرَق***
 Lobostemon glaucophyllum (S).
 Lobostémone à feuilles glauques (F).
 نوع من اللبستمون. ساقها فروع تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها بحرية الخضار، خشنة الحمار. ازهارها معتدلة الحجم، بنفسجية اللون، ناشرة الاسدية || تنويرها يستمر من ايار الى تموز.

٢٤٥٧٤ - **كَلْبَشْتُمُونْ فِيْ***
 Lobostemon argenteum (S).
 Lobostémone argenté (F).
 نوع من اللبستمون. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. افتادها زباب اللحاء. اوراقها كاملة سنائية الشكل، نصلها مغزيرة على الصفحتين، زغبها فني اللون. ازهارها معتدلة القد، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الزرقعة الجميلة || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٥٧٥ - **كَلْبَشَة***
 Radier en béton (F).
 Concrete bed (E).
 تسمي لاسف، شائع الاستعمال في البناء الباطوني.

٢٤٥٧٦ - **لُبْسُ**
 Elops (S).
 Elops (F). Elops (E).
 جنس اسماك بحرية من فصيلة البصيات. انواعها المعروفة خمسة. اعطائها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها اهليجية الشكل، شذاه الحظم، مسطحة الظهر، محدبة البطن. جامدة الحراشف المتباينة الاحجام. اثنائها متراكبة الالوان تكثر فيها الرعدة الرصاصية التي تمتد في الظهر وتغير الى بياض في البطن || اعرف انواعه واشهرها، الثلاثة التالية :

٢٤٥٧٧ - **لُبْسُ اصْغَر***
 Elops saurus (S).
 Elops saurien (F).

نوع من اللبص. اعطانه البحر الاحمر والخليج العربي. جسده كبير القد يطول نحو ١٢٠ سم. ثوبه الى الصبهة || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٥٧٨ - **لُبْسُ حِرْدَوْتِي***
 Elops lacerta (S).
 Elops lézard (F).

نوع من اللبص. اعطانه الشواطئ الافريقية المعتدلة من المغرب الى انكولا. جسده كبير القد يطول نحو ١٥٠ سم. ثوبه الى الرعدة الرصاصية || لحمه متوسط الصنف، مأكول.



لبص حنطي



لبطوس



لباب الحقول

رطة خلية البشرة القفصية المواج. أزهاره ثلاثية التجميع، زرق الحنار، حر القاعدة، صفر الإسدية || أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين.

٢٤٥٩٣ - تِلَاب يَابَانِي ، تِلَاب أُرُغَب

Convolvulus japonicus, Calystegia pubescens (S). Liseron pubescent (F).

نوع من التِلَاب المعمر. ساقه: باه عارضة تطول من مترين إلى أربعة أمتار. أوراقه خلية النصل، صغيرة القد، قصيرة الاعتناق. أزهاره كبيرة الحجم، مستطيلة المالحق، بيضبة الثنايات، حواء اللون || أزهاره يستمر من أيار إلى أيلول.



لبلاب السباحات

٢٤٥٩٤ - تِلَابِي (F). Hédéracé (F). Hederaceae (E).

نمت تمرغبي وصي يطلق على السوق المنطقة التي تشبه التِلَاب.

٢٤٥٩٥ - تِلَابِيَّات، مَحْمُودِيَّات، سَقْمُولِيَّات

Convolvulaceae (S). Convolvulacées (F). Convolvulaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات الغلالة. أجناسها وأنواعها عديدة. جميع نباتاتها مذادة أو متسلقة. سوقها غزيرة العصارة اللبنة. أوراقها متناقبة مغرسة. أزهارها كبيرة القد لا قياسية التجميع والارتكاز. ثمارها حقية تنفلق من مصراعين أو أربعة مصاريع. مصاريعها لا قياسية الاخضية التي يراوح عددها من ١ إلى ٤، وكل غباء يحسن حية أو حبتان قشراهما جامد الماد || أشهر نباتاتها السقمونيا والبطاطا الحلوة والجلباب والرديد.

٢٤٥٩٦ - تِلَابِيَّة (F). Clissoide (F).

اسم يطلق على منحن خاص من المعادلة الثلاثية.

٢٤٥٩٧ - لَبِين، لَبِين، لَبِين (F). Torchis (F). Cob, Loam (E).

المضروب من اللبن لبناء مربعا كان أو مستطيل. واحدته لبنة أو لبنة.

٢٤٥٩٨ - لَبِين (F). Lait (F).

هو الحليب، اطلب. واللبن بالعرف اللبناني هو الحليب الرائب.

٢٤٥٩٩ - لَبِين زَائِب، لَبِين مُرَوَّب

Lait caillé, Yoghort, Yahourt (F). Curdled milk, Yaourt (E).

هو الحليب غثر بالروبة فراب واسبقانة حوامفه.

٢٤٦٠٠ - لَبْنَات، لَكَنَات (F). Lactate

هي ملح الحامض اللبني.

٢٤٦٠١ - لَبَنَات، لَكَنَات (F). Lactase

خيمرة تحول اللبنيوز إلى غلوكوز وغلكتوز.

٢٤٦٠٢ - لَبَنَة

هي اللبن الرائب المقطوع الذي نضج صله.

٢٤٦٠٣ - لَبَنُوز، لَكَنُوز (F). Lactose

هو سكر اللبن. يشبه السكر العادي لكنه أقل حلولة، يذوب في اللبن والماء ولا يذوب في الكحول.

٢٤٦٠٤ - لَبَنِيَّ (F). Lait (F).

هي الاصطرك، اطلب.



لبلاب نصي

٢٤٥٨٥ - تِلَاب السَّيَاحَات *

Convolvulus sepium, Calystegia sepium (S). Liseron des haies, Grand liseron (F). Hooded bindweed (E).

نوع من التِلَاب المعمر المائل ساقه تطول نحو ٥ أمتار. أوراقه كبيرة القد مثلثة الزوايا مستطيلة الاعتناق. أزهاره كبيرة الحجم، بيضاء اللون، وردية المواج || أزهاره يستمر من حزيران إلى تشرين.

٢٤٥٨٦ - تِلَاب المَحْمُوس

هو التيرونيكا الخنزيرية، اطلبها.

٢٤٥٨٧ - تِلَاب زَيْتُونِيَّ الْوَرَق

Convolvulus olecefolius (S). Liseron à feuilles d'olivier (F).

نوع من التِلَاب المعمر. ساقه خشوية منتصبة تعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه زيتونية الشكل، أزهاره نورية التجميع، صغيرة الحجم، وردية اللون || أزهاره يستمر طوال الصيف.

٢٤٥٨٨ - تِلَاب فُضِيَّ *، تِلَاب خَبِيزِيَّ الْوَرَق، حَشِيشَة مَهْبُولَة

Convolvulus althaeoides (S). Liseron à feuilles de guimauve, Volubilis (F). Mallow bindweed (E). Kleine Kornwinde (D). Convolvolo argentino (I).

نوع من التِلَاب البري المبدل. ساقه فراء زيا تطول نحو ١٠٠ سم. أوراقه خبزينة الشكل مفصصة، نصلها خلي البشرة على صفحتي. أزهاره كبيرة القد، ليلكية اللون، بيضبة القصل. جنوده درنية طيبة عديدة المنافع || أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران.

٢٤٥٨٩ - تِلَاب مُثَلَّث الْأَنْوَان

هو شب النبار، اطلبه.

٢٤٥٩٠ - تِلَاب مِصْرِيَّ، لُوبِيَاء تِلَابِيَّة

Dolichos lablab, Lablab vulgaris (S). Dolique d'Egypte, Dolique lablab (F). Egyptian kidney bean, Hyacinth bean, Lablab (E). Agyptische Fasel, Gemeine Lablab (D). Dolico Egiziano, Fagiolo d'Egitto (I).

نبات زراعي حولي من فصيلة القرنيات. ساقه عطقه عارضة. أوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية الذرية. أزهاره عطرية الرائحة، عنقودية التجميع، بنفسجية اللون ومنها الأرجوانية والموعدة بالأبيض. ثماره قرن مغلطة سنية، مقومة. بزورها بيضبة مبطلة بنفسجية اللون أو جزوية || أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

٢٤٥٩١ - تِلَاب مُقَصَّص

Convolvulus cneorum (S). Liseron-camélé, Liseron argenté (F). Silvered bindweed (E).

نوع من التِلَاب الممر. ساقه خشوية منتصبة تعلو من ٧٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه أبيدة نصلها سناني الشكل، ملعن الطرف، خلي البشرة على صفحتي، بحري اللون، فضي المواج. أزهاره عشكولية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون، وردية التوشيح || أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٤٥٩٢ - تِلَاب مُورِيَّانِيَّة

Convolvulus mauritanicus (S). Liseron de Mauritanie (F).

نوع من التِلَاب المعمر وهو جنبة ليفية خشوية. ساقها قصيرة، فرووها دقيقة مذادة، تطول من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها بيضبة الشكل قصيرة الاعتناق. نصلها

بمد متحه ببضعة ايام عن رقات ذرية تنوجه فوراً نحو الصفحات العليا من الاوراق وتقيم في اخاديد العروق حيث يتوفر لها امتصاص الغذاء . ثم تتحول تدريجياً الى لبودة تسرح على التماسك والافغان والسوق .

٢٤٦١٤ - لَبُودَةُ فُلُورِيدَةِ

Ceroplastes floridensis (S). Céropaste de Floride (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها الاصلي فلوريدة وقد انتشرت في جميع الاصقاع الحارة . عوائلها عديدة اصحابها الغار والكاكي . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . ظهرها مخدود بالشكل مقعقل التنوء . ثوبها الى البياض الاغبر ، جيلها الحولي واحد . نفق مكها يتم في اواخر حزيران . تركيب الاوراق على صفحاتها العليا وقد تركيب الاغصان والسوق . تكاثرها بالزيت الشتوي .

٢٤٦١٥ - لَبُونُ ، لَيْتِيَّةُ Laitière (F). Milch (E). صفة الانثى الحلوب .

٢٤٦١٦ - لَبُونَات

Mammifères (F). Mammiferous, Mammalia (E). هي الحيوانات اللبونة المعروفة بالثدييات . واحدها لبون .

٢٤٦١٧ - لَبِيَّاز Lapiaz هو السري دبار طبيعي لا يقاسي العمق والاتساع يخدح سطح التلوث الجصي .

٢٤٦١٨ - لَبِيَّةٌ

Lebia (S). Lébie (F). Lebia (E). جنس حشرات قانصة من فصيلة الليبيات ورتبة عمديات الاجنحة . انواعها المعروفة كثيرة البدن منتشرة في معظم اقطار واقالم العالم || اجسامها صغيرة ، مبطله ، تعطول من ٥ الى ٨ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية . تأثيرها وتكورها ولامسها نفاظية . كاسلها صغيرة ، مخسورة . بطونها مقلطه ، مستعرضة . اعماها تساعية الاخاديد النحيلة القاطية . قوائمها نشيطة . اولها متبانية الالوان الزاهرة ، تكثر . فيها الزفرقة || الحشرة الجلجلة قانصة والبرقة ايضاً .

٢٤٦١٩ - لَبِيَّةٌ Lippia (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة رعي الحمام ، اطلها .

٢٤٦٢٠ - لَبِيَّةُ الْمَيْسِ

Libythea celtis (S). Libythée du micocoutier (F). Libythea celtis (E). حشرة من فصيلة اللشائيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم الحارة المنحرفة نحو المعتدلة . فرائثها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الانجيريات ومنها الميس || جسمها مردني الشكل يطول نحو ١٧ م . بسطها نحو ٤٦ م . رأسها صغير الحجم . جوشها وبطنها الى الجوزي الاشقم المواجه || درواشها عند الشقن الى الجوزي الخفلي المواجه يطوى في الزوج الامامي تجذيع الكلف وبقتان عاجيتان وخمس نقط بيض وسط حشاري اغبر . ويعملون في الزوج الخفلي تجدة قاطية عاجية وتطهر حنطلي بين الجدة والطرف || لها جيلان في الحول . تقطر فراثة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراثة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في النهار . تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمنح المكان ميحادياً على الصفحات

٢٤٦٢٠ - لَبِيَّةُ Lactée (F). Lactéous (E). ما كان يشبه الحليب او كان تركيبه كالحليب .

٢٤٦٢١ - لَبِيَّةٌ

Libitina (S). Libitine (F). Libitina (E). هو نشا البطاطا خاصة واللثا المستخرج من سائر المساقل النشوية المادة .

٢٤٦٢٢ - لَبُونُ

جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطيريات ورتبة الرخويات صفحيات الخياشيم والارجل . انواعها المعروفة عديدة اعطائها بحار البلاد الحارة من العالم القديم . يكثر وجودها في البحر الاحمر والمحيط الهندي || اسدافها شبه كلبية الشكل ، معتدلة الحجم ، متساوية المصارع . مشاهبا صغيرة ، مطليقة ، ثنائية || تعيش لاصقة بالصخور المغورة القليلة العمق . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٦٢٣ - لَبُونَةٌ ، لَبُونَةُ Lienne (F). She lion (E). انثى الاسد ، ويقال لها العرس ايضاً .

٢٤٦٢٤ - لَبُودَةُ التين * ، شَمْعِيَّةُ التين

Ceroplastes rusci, C. nerii (S). Céropaste du figuier (F). حشرة من القرمزيات ، موطنها حوض البحر المتوسط . تركيب التين والاس . جسمها كروي الشكل ، اسمر اللون ، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ م . قرونها الشمعي جامد التند المنحني الشكل ، ثنائي الصخائف الطولية . شمها اومد اللون بنفسجي المواجه . ذكورها بمنحة تطول نحو ٢ م . ثوبها الى الجؤوة . دراشها عاجية اللون مهدية الحنار .

٢٤٦٢٥ - لَبُودَةُ الْحُمْصِيَّاتِ *

Coccus hesperidum, Lecanium hesperidum, Lecanium tessellatum (S). Pou des hespérides, Cochenille plate de l'orange (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي بيضبة الشكل مقلطه . طلبها الحناري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يقلب فيه البني والاسمر || تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق ومن الاوراق اخاديد العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفلى || تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٢٦ - لَبُودَةُ الزَيْتُونِ

هي قرمزية الزيتون المخططة ، اطلها .

٢٤٦٢٧ - لَبُودَةُ صَيْبِيَّةٌ * ، شَمْعِيَّةُ الْحُمْصِيَّاتِ

Ceroplastes sinensis (S). Céropaste ciroux (F). حشرة من القرمزيات تركيب الحمصيات على اختلافها . مهدها الصين وقد انتشرت مع اللبون في جميع مناطق زراعتها . وهي صغيرة القد مكورة الجسم طولها يراوح من ٤ الى ٦ م . وعرضها من ٣ الى ٥ م . لبدتها تكلو نحو ٤ م . وهي مبيضة التاليل الشائكة . قرونها الشمعي جامد التند ، اغبر اللون ، لبيكي المواجه || جيلها الحولي واحد . الانثى تضع من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ مكنة اهليلجية الشكل حقيقية اللون وذلك من اوائل تموز الى اواخر آب . ينتفح المكان



لبودة التين



لبودة الحمصيات



لبودة صينية



لية



ليس النيل

البلبل من نصال النبات المائل || السرة طول نحو ٢٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، خلى القشار، كسني التجميع. نصلها رعي الشكل ثلاثي المروق، ازهاره كبيرة القد، كثيرة العدد، لونها الى الزرق الزاهية. ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٦٣١ - ليبتين ظريف *Anagallis tenella* (S).

Mouron mignon (F).

نوع من اللين البري المعمر، يكثر في المنافع، ساقه منتسجة طول نحو ١٠ سم. اوراقه متعاقبة، نصلها مستدير الشكل صغير القد. ازهاره وردية اللون، مستطيلة المالحق النعيلة || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٦٣٢ - ليبتين مستعرض الورق * *Anagallis latifolia* (S).

Mouron à larges feuilles (F). نوع من اللين المعمر يزرع كحولي. ساقه منتسجة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقه متعاقبة معتقة بيضيه. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ازهاره الى الزرقه الازوردية || ازهاره يستمر من نحو الى آب.

٢٤٦٣٣ - ليبتية * *Lepiota* (S).

في الغرض، اطليه.

٢٤٦٣٤ - ليبيوت * *Lepiota* (S).

Lépiote (F), *Lepiota* (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريفونيات. انواعه المعروفة نحو ١٢. اصطناعها بعض اقالم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تعيش على المواد النباتية المتحللة في الغابات وفي المواقع الرطبة. تتميز بيوها الابيض اللون وباطراسها الحادة الاطراف الطليقة، وطوق يكتنف اعالي الساق، تحت الاسوية. يكثر وجودها في فصل الخريف || بعض انواعها لذيق العلم ماكول والقتل كاعن الصفن غير مريض فيه ومنها نوع جعالي المادة يؤذي وقد يميت.

٢٤٦٣٥ - ليبيوت ركيث * *Lepiota rhacodes* (S).

Lepiota déguenillée (F).

نوع من الليبوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه معتدلة الارتفاع، مستقلة القاعدة. اروسه مظلية الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى البني الاخر يملو مواج اصفر عند التفتح.

٢٤٦٣٦ - ليبيوت رفيع * *Lepiota procera* (S).

Lépiote élevée (F).

نوع من الليبوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه رفيعة، مستفحة القاعدة، اروسه مظلية الشكل، كبيرة القد، قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم. لونها الى البني الباهت العادم الاحرار.

٢٤٦٣٧ - ليبيوت زقي البوع * *Lepiota metulaespora* (S).

Lépiote à spore en outre (F).

نوع من الليبوت الكاعن الصف. يوجد في المواقع الرطبة. ساقه رفيعة، معتدلة الشنكة، حنطية اللون. اروسه مظلية الشكل، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى الغرة، وشاعها اصفر السابغ. بوعها زني الشكل.

٢٤٦٣٨ - ليبيوت عادم النفع * *Lepiota naucina* (S).

Lépiote sans valeur (F).

نوع من الليبوت الكاعن الصف. يكثر وجوده في المراعي.

٢٤٦٣١ - ليبتية * *Lepiota* (S).

هو الكنعان، اطليه.

٢٤٦٣٢ - ليبتية * *Cierge de Notre-Dame* (F).

نبات يدهي بوضر ليد، اطليه.

٢٤٦٣٣ - ليبتية سوداء * *Molène noire* (F).

هي البوصير الاسود، اطليه.

٢٤٦٣٤ - ليبتيس * *Labeo* (S).

Labeon (F), *Labeo* (E). جنس اسماك نهريه من فصيلة الليبليات. انواعه نحو ٢٠ اصطناعها اهر وبجيرات البلاد الحارة من العالم القديم. اجسامها طول نحو ٢٠ الى ٦٠ سم. اثوابها سوية الالوان. يكثر فيها الاسمر والجوي البني. جميعها كبيرة الزعانف. اشهرها ليس النيل.

٢٤٦٣٥ - ليبتيس النيل * *Labeo niloticus* (S).

Labeon du Nil (F).

نوع من الليبيس وهو سمكة نهريه تكثر في النيل. جسمها كبير القد يطول نحو ٦٠ سم. ثوبها الى الخضار الاسمر. زعانفها كبيرة حراء اللون. لحمها ماكول متوسط الصفن.

٢٤٦٣٦ - ليبتين * *Anagallis* (S).

Mouron (F). ويدهي «أناغالس» جنس نباتات برية وثرينية، من فصيلة الريبيات. انواعه اكثر منها العشبية والخشوية والحرولية والمعمرة. اوراقها متعاقبة او ضية. ازهارها جرسية الشكل || اعرف انواعه ما يتبع.

٢٤٦٣٧ - ليبتين الماء * *Samole* (F).

هو السولس، اطليه.

٢٤٦٣٨ - ليبتين المروج * *Lépiote* (F).

حشيشة الحنطة، عشبة العلق

Anagallis arvensis (S), *Mouron des champs*, *M. rouge*, *Morgeline* (F), *Red pimpernel*, *Poorman's weather-glass* (E), *Roter Gauchkel*, *Rote Mäuse-darm* (D), *Anagallide*, *Anagalli* (I).

نوع من اللين البري المأكول. ساقه جالسة مفصلة تملو نحو ١٥ سم. اوراقه لائنة متعاقبة، نصلها بيضي الشكل صغير القد. ازهاره حراء اللون زرقاء المواج. وهو يعتبر من الاعشاب الضارة الواجب تلفها ان في الزروع ام في الحدائق والمبايل || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

٢٤٦٣٩ - ليبتين الحضاب * *Anagallis collina* (S).

Mouron des collines (F).

نوع من اللين التريبي المعمر. ساقه خشوية منتسجة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقه السفلى متعاقبة، اعليجية النصل. اوراقه العليا ضية ثلاثية التجميع، سنانية النصل الضيق. ازهاره كبيرة القد ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٦٣٩ - ليبتين ضمي الورق * *Anagallis verticillata* (S).

Mouron verticillé (F).

نوع من اللين التريبي المعمر. ساقه خشوية منتسجة



ليوت رفيع

ليوت ريث



ليوت زقي البوع

Latania (S). **لَتَانِيَة * ، لَاتَانِيَا**
Latanier (F). Fan-palm (E). Latanie, Fächer
palme (D). Latania (I).

جنس اشجار زراعية من التعلقات التاليات. أنواعه ٦
منها المأكولة البَار والصناعية والأزدينية. جذوعها منتصبة
حلقية. أوراقها هامة مروحية. أزهارها ثنائي المسكن.
طلوها مهبل الشكل. جبابها متبورة. أزهارها الذكورية
منفردة. كؤوس وتواجها أزهارها الانثوية ثلاثية الفصل،
متناكها سهية، اسديتها محيطية تمد من ١٥ الى ٣٢.
جميعها من نباتات المناطق الحارة ترطب في الأتربة الخفيفة
العميقة النور التي لا تتنصها الرطوبة || اعرف انواعها
ما يلي .

لَتَانِيَة أَمْرِيكِيَّة - ٢٤٦٤٦
Latania americana (S). Latanier d'Amérique (F).
نوع من اللتانية، منبتها افريقية الوسطى. تزرع لأتزين
ويستخرج من أوراقها الياف نسجية صناعية لا بأس بها
شائعة الاستعمال المحلي .

لَتَانِيَة بُورْبُونِيَّة - ٢٤٦٤٧
Latania borbonica (S). Latanier de Bourbon (F).
نوع من اللتانية الأتريينية. تزرع في المراكن والحدائق
التي لا تخشى البرد. أوراقها مروحية جميلة الخضار الزاهي،
تطويل وتعرض من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. جريدها شبيحة
الحشف الاخضر اللون || ترطب في الأتربة الدبالية
الحوارة الممكن رجا .

لَتَانِيَة حَمْرَاء - ٢٤٦٤٨
Latania rubra (S). Latanier rouge (F).
نوع من اللتانية الزراعية الصناعية، منبتها البلاد الاسوائية.
أوراقها كبيرة اللد تطويل وتعرض نحو ٢٠٠ سم. جريدها
حنطي اللون بجوي الموج. غوصها احمر الضلع، اخضر
الصفحة || يستخرج من أوراقها الياف صناعية شائعة
الاستعمال .

لَتَانِيَة صِينِيَّة - ٢٤٦٤٩
Latania sinensis (S). Latanier de Chine (F).
نوع من اللتانية الزراعية، منبتها الصين تتميز بكثر
كبابها وكثرة عددها الذي يراوح من ٦ الى ١٠، أما
متوسط وزن الكباسة فنحو ٥٠ كيلو. ثمارها مأكولة وهي
الاصفر أو الجوزة السوداء. رؤوسها كبيرة. تأثيرها
أوراقها متوسطة اللد تستعمل في صناعة الحبال وفي بعض
الانسجة الوطنية .

لِيُثْرُوس * - ٢٤٦٥٠
Lethrus (S). Lèthre (F). Lethrus (E).
جنس حشرات من غديات الاجنحة سفحيات القرون
وفصيلية الجمليات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطائها تمتد
من الشرق الاوسط الى اربوة الشرقية والجنوبية. جميعها
خاسلة راسمة تسرح في الليل || اجسامها شبه بيضيه
الشون، تطويل من ١٨ الى ٢٢ سم. أطواها الى السواد
الاصفر أو الجوزة السوداء. رؤوسها كبيرة. تأثيرها
ضليعة. عيونها صغيرة بارزة. قرونها الاستعمارية
سفحيات الاطراف. كوابلها عريضة مقعرة الماس
الرامي جالسة الماس الفمدي، اعطائها مستديرة الاطراف
اللاحقة. قوائمها شديدة النشط، متكاثفة الحلب .

ساقه معتدلة الارتفاع لونها الى الطلحة. ارسوت قلنسوة
الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الطلحة السوداء.

لِيُثْرُوس مُجَعَّد * - ٢٤٦٣٩
Lepiota cristata (S). Lépiote crêpe (F).
نوع من الليبوت الجحالي المؤذي. يوجد في الغابات كربه
الراحة عند اللبس. ساقه معتدلة الارتفاع، سمراء اللون،
طولها ابيض اللون، اسمر الحافة. ارسوتها بجمة الصفعة،
مقعرة الوسط، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى السمرة يطولها
تتميز امغر .

لِيُثْرُوس مُزْبَر * - ٢٤٦٤٠
Lepiota hystrix (S). Lépiote hérissée (F).
نوع من الليبوت المأكول. يكثر في المواقع الظليلة. ساقه
مستفصمة، قصيرة، عادمة الطول. ارسوتها شبه
غروبية الشكل، مشثلة الصفعة، صفيرة الجرم،
قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الكستنية الموج .

لِيُثْرُوس مُسْتَج * - ٢٤٦٤١
Lepiota excoriata (S). Lépiote excoriée (F).
نوع من الليبوت المأكول. يوجد في بعض المواقع الرطبة.
ساقه مستفصمة القاعدة، مستدقة المتق، غبراء اللون.
ارسوتها شبه مظلية الشكل، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى
الغبرة يطولها تسنج اسمر .

لِيُثْيَات * - ٢٤٦٤٢
Lebilda (S). Lebilid (F).
فصيله حشرات من رتبة غديات الاجنحة. اجناسها
وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم
اجسامها صغيرة، مبطله تطويل من ٤ الى ١٢ سم. رؤوسها
صغيرة. عيونها بارزة. قاشيرها وفكوكها قياسيه، عادمة
الحلب. قرونها الاستعمارية خيطيه، مركبة من ١١
فصله، مهدبة ابتداء من الفصله الرابعه. كوابلها صغيرة،
مخسورة، يكثر فيها الشكل الخذروتي. اعطائها تساعيه
الاعاديد النحيله، جميله الالوان الزاهيه، ارساغ القوائم
الالمانية، عند الذكور، مجهزة بصفين من الاحاجم ||
جميعها مقعرة، تطير بخفة وتنتقل على الارض برشاقة.
تألف المواقع التي يكثر فيها الارق لانه من فرائسها المفضله ||
اشهر اجناسها اللببِيَّة والسيسْتِيدِيَس .

لُتَات * - ٢٤٦٤٣ ما فتت من قشور الشجر .

لَتَاسِيَة * - ٢٤٦٤٤
Latastia (S). Latastie (F).
جنس حيوانات زحافة بيضيه من العظائيات وفصيله
الضبابيات. انواعها المعروفة اربعة موطنها الجزيرة العربية
وبعض المناطق الافريقية. تألف القيساني والبراري
والواحات. قوتها الحشرات والدوبيات والديدان ... ||
اجسامها مستطيله. اطاولها تراوح من ٢٧ الى ٣٢ سم.
رؤوسها مستطيله الشكل. قوائمها خاسيه الاصابع .
اذنانها مستطيله، دقيقة الاطراف. اثوابها الى السمرة
الخيطيه او السهيه الصفراء || ذكورها اصغر قدًا من
اناثها ولم ثوبًا منها. الاناث تعفن شلقها في الرمل على
عق ٤ او ٥ سم. فينتف بعد خسة اسابيع من دوبيات
نحيلة دقيقة تسمى الى القوت بعد التف بيوين .



ليبوت عادم الفتح



ليبوت بجمة



ليبوت مزبر



ليبوت مستج



لُتَاسَة



لَتَانِيَة



لنوس



لنين مداد



لثاء

٢٤٦٦٠ - لثَاء مَعْتَبِيَّةُ الْوَرَقِ (S). *Clethra alnifolia* (S).
Clêthre à feuilles d'aune (F).

نوع من اللثاء وهي جنبة سربوتية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها منفشة الشكل طولها من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. تصلها بمبهر الزغب كثير العروق المتشابكة المتوازية. ازهارها وريدية اللون عطرية الريح عتقودية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٤٦٦١ - لثَاء مُلْتَحَبِيَّة

Clethra canescens, *C. barbinervis* (S). Clêthre barbu (F).

نوع من اللثاء وهي شجيرة سربوتية تعلو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها بيضيه مديبة ملتحة كثيرة العروق المتشابكة الشارفة ؛ تصلها خلي الصفحة السفلى ، بحزري اللون . عتاقيد ازهارها منشبة رعدة ، ازهارها كبيرة القذ يقضاه اللون || ازهارها يستمر من آب الى ايلول .

٢٤٦٦٢ - لثَائِيَّات ٥
Clethraceae (S).
Clêthraceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين ، كانوا يعتبرونها في التصنيف السابق جنساً من فصيلة الخنجنيات || انواعها كثيرة العدد ، معظمها بري وبعضها تزييني . جميعها شجيرات ونباتات . اوراقها متعاقبة ، بسيطة ، مسنة الحافة . ازهارها عتقودية التجميع او سنبل ، طرفي الارزكاز . ازهارها خماسية الفصل والبتلات ، عشارية الاسدية ، مقلوقة المآبر ، مثلفة السبات || اشهر انواعها اللثاء الزباء والمديبة والشجرة والمغشية واللشحية .

٢٤٦٦٣ - لثَاءَة ٥
Macroglossus (S).
Macroglosse, *Roussette kiodote* (F).

جنس حيوان من فصيلة الطواطيات. انواعه المعروفة خسة جميعها يترآه صغيرة القذ ، طولها من ٦ الى ٧ سم. يسطها من ٢٠ الى ٢٢ سم. اثلواها الى الريدة السوداء . فراطيسها ضيقة ، ذلقة ، مديبة . اسنبتها قابلة الانعطاف خارقة الطول || موطنها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. تعيش جماعات قليلة العدد . تألف مجاري الماء والادوية والكهوف والبيوت الخربة . قوتها التار على اختلاف انواعها .

٢٤٦٦٤ - ثَلَاثَةُ زَعْبَاء ٥
Macroglossus minimus (S).
Macroglosse minime, *Roussette kiodote minime* (F).
Small Reed-bunting (E).

نوع من اللثاء . حيوان ليون ثامر من فصيلة الطواطيات || جسمها صغير القذ ، عادم الذنب ، يطول نحو ٦ سم. وتبلغ يسطه نحو ٢٠ سم. ثوبا الى الريدة السوداء الموحج . رأسها مستعرض الثقف ، غرطوي الشكل . فوطوسها ضيقة ، ذلقة . اذنائها صغيرتان ، منتصبتان ، مديبتا الطرف . عينها مستديرتان كيرتان . تقها كبير الشدق يحوي ٣٤ سنًا . لسانها غارقة الطول يعمل في طرفه بعض الحامض الماحصة || تألف جفوع الاجبار والكهوف والمغاور والبيوت المهجورة . تعيش جماعات قليلة العدد من الذكور والاناث || مسرهما دجوي يستمر من الدفوش الى الفجر . نباتها الشوي يستمر نحو ١٢ اسبوعاً . يحبل الاثنى يدوم نحو ٣٨ يوما تقفع في تمامه جرراً واحداً يكثني ويسمع ويبيض بعد الوضع بأسبوع ويتعلق بصدر امه حتى النظام ، اي نحو سبعة أسابيع || قوتها التار اليانة واعصها السكرية . تعتبر من الطواطيات المؤذية الفاضرة .

٢٤٦٥١ - لَتِيس
Drépane (F).

سكة من السحليات مشهورة باسم ترلاس ، اطلبها .

٢٤٦٥٢ - لَتِيسَن .
Ononis (S). *Ononis*, *Bugrane* (F). *Arête*, *Arête-bœuf* (F). *Rest-harrow* (E). *Kriechende Hauhechel* (D). *Bullmacola dei campi*, *Serppeggiante* (I).

٢٤٦٥٣ - لَتِيسَن الْقَدَمَاء
Ononide antique (F).

هو الشبارق ، اطلبه .

٢٤٦٥٤ - لَتِيسَن مَدَاد *
Ononis repens (S).
Ononis des champs, *Bugrane rampante*, *Arête-bœuf* (F). *Rest-harrow* (E). *Kriechende Hauhechel* (D). *Bullmacola dei campi*, *Serppeggiante* (I).

٢٤٦٥٥ - لَثَاء
Suc végétal (F).
Vegetable juice (E).

ما يسيل من الشجر من عصارة مها كان نوعها .

٢٤٦٥٦ - لَثَاء * وَلِثَة
Clethra (S). *Clêthre* (F).

٢٤٦٥٧ - لَثَاء زَبَاء
Clethra tomentosa (S).
Clêthre tomenteux (F).

نوع من اللثاء وهي جنبة سربوتية تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروصها زباء اللحاء . اوراقها اهليلجية ضيقة تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٤ ، تصلها خلي الصفحة السفلى المحللة اللون . ازهارها عطرية كبيرة القذ سفلية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٤٦٥٨ - لَثَاء مُدَبَّبَة
Clethra acuminata (S).
Clêthre acuminé (F).

نوع من اللثاء وهي شجيرة سربوتية تعلو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها اهليلجية مديبة تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٩ ، تصلها مسن الحافة ، اخضر الصفحة العليا ، يحزري السفلى الحولية البشرة . ازهارها كبيرة القذ ، سفلية التجميع ، يقضاه اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٢٤٦٥٩ - لَثَاء مُشَجَّرَة
Clethra arborea (S).
Clêthre arborescent (F).

نوع من اللثاء وهي شجيرة تعلو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها ابيدة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٦ سم. تصلها جامد الصفحة ، خلي البشرة السفلى الصفراء اللون . ازهارها عاجية ، عتاقيدها صغيرة القذ ليدة . ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

٢٤٦٧٢ - لَجْدَة - Chelonia (S).

Chélone (F). Chelone, Sea-tortoise (E).

جنس سلاحف بحرية من فصيلة الجشيات . أنواعها عديدة، جميعها كبيرة القد طول نحو ٢٠٠ سم . وزن نحو ٥٠٠ كيلو . ذيلها قليل الاحديداب . قترها قرني المادة اليابسي الترتيب . قوائمها زعنفية الشكل ثنائية المقاب . قوتها الاغشاب البرية . تبيض على الشواطئ الرملية، لحماها مأكول ويضها أيضاً .

٢٤٦٧٣ - لَجْدَة حَضْرَاء * Chelonia viridis, C. midas (S). Chélone franche, Tortue verte (F). Green tortoise (E).

نوع من اللجاء المأكولة اللحم . تكثر في المحيط الهندي وفي بحر العرب ، طولها نحو المترين ، ذيلها الى الخفصاء الزيتوني .

٢٤٦٧٤ - لَجْدَة سَهْيَّة * Chelonia imbricata (S). Chélone imbriquée, Caret (F).

نوع من اللجاء المأكولة اللحم المنتشرة في جميع البحار . ذيلها اسمر اللون ، قترها سهي التركيب لؤلؤي الماجة .

٢٤٦٧٥ - لَجْبَة

النجمه التي قل لبها وقد يكون ذلك بعد تاجها باربعة اشهر . ج . لاج .

٢٤٦٧٦ - لَجْجَة - Abyss (F). Abyss (E).

المنق البعيد الغور في البحر ، يبتدئ من حدود المنطقة اللجيه اي على عمق ٥٠٠ م . من سطح الماء وما دون ذلك حتى القعر .

٢٤٦٧٧ - لَجْدَة مُلْفُوحَة * Ligdia adustata (S). Ligdie aduste (F).

Ligdia adustata (E).

حشرة من الارفيات حشرغيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا المعتدلة الحارة . فراشها جارسه قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق المضايف والقات ... جسمها صغير قصيف يطول نحو ٩ م . بسطها نحو ٢٨ م . رأسها الى الكسني . عينها ناشزتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشها الى الكسني الاسود المواج . بطنها الى الطحلة السمر المواج || رواشها عند الشقن الى الشهية الوردية المواج تملوها في الزوج الاسامي بقعة قاعدية بلون الجوشن ، وبقعة بيضاء ورقشة الى الطحلة . وتملؤها في الزوج الخلفي رفشة تراوح من الخطني الى الاسمر . اعداها بتبنيه اللون || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح من الصمر الى قسمة الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتمتد المكان مباحداً على الصفحات السفلى من نصال النبات العائل || السرفه تطول نحو ٢٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، مائل القشار . ثوبها الى الطحلة الكدراء تملوها رفشة زرقاء قائمة . رأسها الى الزرقه السوداء . مدنها الى الخطني الاخير . رواجها البطنية الوسطى ماصحة ما يجعلها تنقص عن الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكهما السرفه في كل مكان .

٢٤٦٦٥ - لَنَادَة ° Synanthérie, Syngénésie (F). Syngenesia, Syngenesia (E).

الثاندة حالة الاسدية للثاندة اي للثاندة المأبر .

٢٤٦٦٦ - لَنَادَة الْآفَاقِي ° Astica cracca, Toxocampa cracca (S).

Toxocampe de la vesce craque (F).

Astica cracca (E).

حشرة من النسيقيات حشرغيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق الشرق الادنى واروبة الجنوبية والغربية . فراشها جارسه قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الغريئات الفرائسية واعصها الآفافي والقصداد || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م . بسطها نحو ٣٨ م . رأسها كسني اللون جزوي المواج . عينها كبرتتان . زباناها غشيان . جوشها وبطنها الى الخطني الاكلس المواج || رواشها الاساميان الى الخطني الاكلس تملو جده كسني وبقعة حلالية سوداء ثم جده اخرى غبراء . رواشها الخلفيان الى الخطني الاكلس في الزايمين الاول والثاني والى الكسني الاسمر في الزايمين الثالث والرابع || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان مباحداً على نصال اوراق النبات العائل || السرفه تطول نحو ٢٣ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مائل القشار ، اخضر اللون ، اطحل المواج تملوه خمسة خطوط نارية قاطبة منها خط شجي ينتهي عند السكمة التاسعة . رأسها الى المغرة القائمة . مدنها ورواجها الى الصمره || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكهما السرفه على مغايق الوراق الذاللة القريبة من التربة .



لَنَادَة الْآفَاقِي



لجاء خضراء

٢٤٦٦٧ - لَنَقْ Rosée du matin (S).

Morning dew (E).

هو الندى ونهم من يقول ما سقط آخر الليل ، وأما الذي يسقط اوله فهو السدى . ويقال يوم لثم اذا كان ساكن الريح كثير الندى .



لجاء سهفية

٢٤٦٦٨ - لَنَقْ Recueillir un suc (F).

To gather a juice (E).

لثي ولثي ولثي : استقطر عصارة الانجبار من حليب وصنع وما اشبه .

٢٤٦٦٩ - لَنَقْ ، صَامِعْ Gommeux (F).

Gumous (E).

ما كان صمغي المادة او كانت تملوه مادة صمغية .

٢٤٦٧٠ - لَنِيد ° Synanthérique (F). Syngénétique (E).

اللين من النبات ما كانت مأبر ازهاره ملتصحة . ومن الازهار ما كانت مأبرها ملتصحة .



لجدة ملفوحة

٢٤٦٧١ - لَنِيدِيَّات ° Synanthérées (F). Synanthérées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القاطلة سفلية الاسدية للثاندة المأبر . كانوا ، فيما مضى ، يعتبرونها عمارة من فصيلة المركبات .



لَجَفَةُ الحور



لَجَفَةُ السَّنْدِيَانِ



لَجَفَةُ السَّنْطِ لَجَفَةُ الْمُرْكَشَةِ



لَجَفَةُ الصَّنُورِ



لَجَفَةُ الْعَلِينِ



لَجَفَةُ الْمُلُولِ



لَجَفَةُ النَّجِيلِ



لَجَفَةُ خَطْلَةَ

« Feuille morte du chêne » (F). Common lappet moth (E). Kupferglucke (D).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد، ثوبها إلى البني الداكن، وراشها منشارية الحافة ثلاثية الخطوط السود. يرقاتها تركب الملول والصرور والورخ.

٢٤٦٨٧ - **لَجَفَةُ النَّجِيلِ** *، و **رَاشِفَةُ النَّدَى** Cosmotriche potatoria (S). Cosmotriche, Buveuse (F).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد صفراء اللون. يرقاتها تركب مختلف النباتات النجيلية. هي خصائصها أنها ترشف نقط الندى المتجمعة على زغب الاوراق قبل ان تقرض النصل.

٢٤٦٨٨ - **لَجَفَةُ مُخَطَّلَةٍ** *

Malacosoma neustria (S). Bombyx à livrée, B. à bagues, B. neustrien (F). Common lackey moth (E). Ringelspinner (D).

حشرة من اللجفيات صغيرة القد حنطية اللون حمراء المواجه تمتع مكثها بالتتابع على الاغصان فيبدو كالطوق أو كالحاتم. يرقاتها تركب اوراق الاشجار المشرقة والحرجية من ايار الى حزيران.

٢٤٦٨٩ - **لَجَفِيَّاتٌ** * Lasiocampidés (S). Lasiocampidés (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة. اجناسها وانواعها زهاء ١٢٠٠ جميعها متوسطة القد، كثيفة الخرافش، ضعيفة الراش، عادمة الطعم، مشطية الزباب، اناثها اكبر حجماً ورائحة لونا من ذكورها. يرقاتها تحمل على جانبها خصل من الهلب اللين. خادراتها تتحف بشرائق حريرية المحيط بثقوة النسج.

٢٤٦٩٠ - **لَجَمٌ**

« الجَم دويبة اصفر من الغلاية. وقيل اكبر من شمة الارض ودون الحرباء ».

٢٤٦٩١ - **لَجِينٌ**، **لَجِينٌ** Mash كل خيليط من دقيق او نخالة او قت او غيرها مع الورق او اللبن مرث بالما لتتلفه الماشية.

٢٤٦٩٢ - **لَجَنِيَّاتٌ**، **لَجَنِيَّاتٌ** Cheloniidae (S). Cheloniidae (F). Cheloniidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاف، اجناسها وانواعها عديدة معظمها كبير الجف. ذلها صدى التركيب قليل الاحديداد. زغها يفسد في المادّة، وقوامها مجلطة زغنية الشكل || اشهر اجناسها اللبأة والحفاه والقبض.

٢٤٦٩٣ - **لَجِيٌّ**

Abyssal, Abyssique (F). Abyssal (E). نمت تعريفه يطلق على الكائنات البحرية الموجودة في البحّة اي في المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٥٠٠ م. تحت سطح الماء حتى القعر.

٢٤٦٩٤ - **لَجِيدُ يَوْمٍ** * Lagidium, Lagotis (S). Lagidium (F).

جنس حيوانات لبرنة قاعية من فصيلة الشفليات. موطنها بوليفيا والبرو والتيلي. اجسامها متوسطة القد، قدرها قدر الارنب. سبالها كثيفة الهلب الاسود الطويل. اذانها كبيرة منتصبة. اذانها مستطيلة جثة طولها يعادل طول

٢٤٦٩٥ - **لَجَفَةُ الرَّبْسِمِ** *

Lasiocampa trifolia (S). Bombyx du trèfle, Lasiocampe du trèfle (F).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد ثوبها الى الجوزة الوردية المواجه. يرقاتها تركب الربسم وجميع انواع النفل وبعض القطنيات.

٢٤٦٩٦ - **لَجَفَةُ الْحَوْرِ** *

Gastropacha populifolia (S). Gastropache du peuplier (F).

حشرة من اللجفيات، متوسطة القد. بسطها نحو ٦٠ م. ثوبها الى البني الزاهي. وراشها منشارية الحافة، خاسية الخطوط السود. يرقاتها تركب الحور وتعيش على اوراقه.

٢٤٦٩٧ - **لَجَفَةُ السَّنْدِيَانِ** *

Lasiocampa quercus (S). Bombyx des chênes, Lasiocampe des chênes (F). Oak moth (E). Eichen-spinner (D).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد كبيرة الراش المتداخلة الالوان. ثوبها الى البني الاصفر المواجه. يرقاتها نمة تركب جمع انواع السنديان.

٢٤٦٩٨ - **لَجَفَةُ السَّنْطِ** *

Nadisa obsoleta (S). Bombyx du gommier (F).

حشرة من اللجفيات، متوسطة القد، بسطها نحو ٥٠ م. يرقاتها تحمل في بعض طيات حلقها البنية جيوبا مشبهة بالهلب اللينق الناعم اللادب تقلقه عند الحاجة دفاعا عن الحياة. هي تركب السنط فتمريه من الورق.

٢٤٦٩٩ - **لَجَفَةُ السَّنْطِ الْمُرْكَشَةِ** *

Taragama acaciae (S). الميمُوزَا

Bombyx du mimosa (F). حشرة من اللجفيات تحمل بذات خصائص يرقاتها السابقة الا انها اكبر قدًا واغلظ جثة وابعث ثوبا. وراشها مزرکشة بالاسود والاعطل. يرقها تركب السنط دون سواء.

٢٤٦٩٣ - **لَجَفَةُ الصَّنُورِ** *

Dendrolimus pini (S). Dendrolime du pin, Bombyx du pin (F). Pine lappet, Pine moth (E). Kiefern-spinner (D).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد بسطها نحو ٥٠ م. ثوبها بني اللون اغبر المواجه. وراشها مزرکشة ومخططة. تسرح من تموز الى آب. تمتع مكثها على جنود واغصان واهاد الصنوبر فينتفخ عن يرقات دقيقة تبارش بالهلب الاحداد منه السلاخا الاول. ومن قائل ان اليرقة تأكل في اثناء دورتها الحياتية زهاء ١٠٠٠ هدية. وانها تلهم الهدية بظرف خس دقات.

٢٤٦٩٤ - **لَجَفَةُ الْعَرَعَرِ** *

Pachyose lineaire (F). فراشة مشهورة باسم بكلمة العرعر، اطلبها.

٢٤٦٩٥ - **لَجَفَةُ الْعَلِينِ** *

Macrothylaea rubi (S). Bombyx de la ronce (F). حشرة من اللجفيات متوسطة القد بنية الثوب بسطها نحو ٥٠ م. تسرح من ايار الى حزيران. يرقاتها نمة تركب العليق وبعض النباتات البرية والزراعية اغصانها الوردية.

٢٤٦٩٦ - **لَجَفَةُ الْقُرْبَلِ** *

Gastropacha quercifolia (S). Gastropache du chêne,

٢٤٧٠١ - تحلاح * ، قُصُون الجِمَال

Cnicus acarna, Picnomon acarna (S). Chardon acanthin (F). Cnicus, Thistle, Welte thistle (E). Schöne Distel, Sperrdistel, Stacheldistel (D). Cardo acantino, Scardacione (I).

نبات عشبي بري حولي شائك من فصيلة المركبات يكثر في الاراضي البور وعسل جوانب الطرقات ويصعب من النباتات الضارة اذا كثر في الزروع .

Apogon (S).

٢٤٧٠٢ - تحلح

Apogon (F). Apogon (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرغيات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها اهليلجية الشكل تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . ألوانها مختلفة الالوان . رؤوسها معتدلة الحجم ، قصيرة الخلف . اشدافها واسعة منفردة . عيونها معتدلة القد ، مستديرة ، ماسحة . زعانفها الظهرية اثنتان . زعانفها الذيلية فارقة || اشهر انواعه الحلح الاحمر .

٢٤٧٠٣ - تحلح آخر * ، تحلح مبدول ، بوزباشي

Apogon ruber,

Ap. imberbis (S). Apogon rouge, Ap. commun, Roi des rougets (F). Apogon ruber (E).

نوع من الحلح . سمكة بحرية برون من فصيلة الفرغيات . اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط . مسرحها الكثاف الصخرية والخلخاف || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم . حراشفها كبيرة . ثوبها الى الحمرة يعلوها تنقيط اسود . زعانفها حمراء اللون . رأسها معتدل الحجم ، رفيع المقدم ، قصير الخلف . شدفها واسع الانفرج اسناتها صغيرة ، متراصة ، ذرية . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية فارقة || لها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤٧٠٤ - لحم ، لحم - Viande (F). Meat (E).

هو التسجيع المفسل في الحيوان والطير وهو من الاطعمة الهامة المفيدة لاستوائه على نسبة كبيرة من المواد الغذائية تلخص متوسلها في الجدول التالي :

| نوع اللحم | مساء | مواد | مواد | مواد معدنية |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|
| ايقار عادية | ٧٦,٣٧ | ٢٠,٧١ | ١,٧٤ | ١,١٨ |
| ايقار مسمة | ٥٣,٠٥ | ١٦,٧٥ | ٢٩,٢٨ | ٠,٩٢ |
| صجول عادية | ٧٨,٨٤ | ١٩,٨٦ | ٠,٨٢ | ٠,٥٠ |
| صجول مسمة | ٧٢,٣١ | ١٨,٨٨ | ٧,٤١ | ١,٣٣ |
| غم عادي | ٧٥,٦٨ | ٢٠,٨٢ | ٢,٣٥ | ١,١٥ |
| غم غسم | ٥٣,٣١ | ١٦,٦٢ | ٢٨,٦١ | ٠,٩٣ |
| خنازير مسمة | ٤٧,٤٤ | ١٤,٥٤ | ٣٧,٣٤ | ٠,٧٢ |

أما بيان المواد المعدنية المذكورة في الحانة الاخيرة من هذا الجدول فهو التالي :

| | |
|-------------|--------|
| حامض فسفوري | ٠,٥٠ % |
| كلور | ٠,١٠ % |
| بوتاس | ٠,٥٠ % |
| صودا | ٠,١٠ % |

الجسم . جرانها الامامية قصيرة والخلفية طويلة جميعها رباعية الاصابع . وبر فرامها كثيف التسجيع نام الممس ابيض القاعدة اسهب الجسم صغاني الطرف || قوتها اعشاب والجذور والطحالب . اناتها تقص من ٤ الى ٦ ادراس على ثلاث مرات في السنة || انواعها اثنتان :

Lagidium pallipes (S).

Lagidium à pieds pâles (F).

Lagidium peruanum (S).

Lagidium du Pérou (F).

لجديدوم البرو



لجديدوم

Ecorce (F). Bark, Strip (E).

٢٤٦٩٥ - لحاء

الحاء بوجه عام هو قشر العود والغصن والساق . والحاء من الوجهة النباتية هو احد النسج الثلاثة التي تتكون منها الخزم الوضائية . وهو يتكون من انسجة غرابلية تمر بها المواد الغذائية ومن جيوب خلوية تخزن بعض المواد . والحاء جسموريا يأتي بين القشرة والشكير وهو يغلث النسج القلبية التي تلحف الشكير .

٢٤٦٩٦ - لحاتة دجوتية *

Nomophila noctuella (S). Nomophila noctuella (E). Teigne nocturne (F).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحرارة في جميع اقطار العالم . فراشتها رحالة قوتها رقيق الارعار . سرقتها خاضلة تعيش ضمن غمد حريري التسجيع على الارواق التي تلامس التربة من التيجليات والمركبات والقنريات || جسمها يطول من ١١ الى ١٢ سم . يسطها فراوش من ٣٢ الى ٣٤ سم . رأسها شبه مكور الشكل . عينها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها غيطان . ملاسها صغيرة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها ويطنها الى الكسني || رواشها الى الصغاني تملوها ، في الزوج الامامي ، رشفة وزرا كش كسنية تمتد من القاعدة الى الخثار الحاربي || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في نيسان وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح وتتجول في الليل || طولها القراشي يستمر نحو سبعة اشهر تماثل في غلاله نحو ست مرات . والاثنى تلقي المنك بعد كل طرة زوا شعية العدد تغلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نعال الارواق التي تلامس التربة || الطور الاسروي يستمر من ثمانية اسابيع الى عشرين اسبوعا لانه متوط بموامل البيئة والحرارة والاعتناء . السرة عند الادراك تمام تطول نحو ١٤ سم . جسمها اسطواني الشكل ، حنطي اللون ، اسمر المواج . رأسها كسني اللون . مدنها ورواجها الى الخنطي || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن حلجة تنسجها السرة تحت الجلالة او بين اريوات النباتات .



لحاتة دجوتية



ملحاح

Pointe (F). Tip (E).

٢٤٦٩٧ - لحاظ

لحاف الرشفة : اسفلها الابيض .

Protogénie (F). Protogyny (E). ٥

الحلب هو ادراك اعضاء التناسل الانثوية في الزهرة قبل ادراك الاعضاء الذكورية .

Ecorcer (F).

To strip, To bark (E).

٢٤٦٩٩ - لحت ، لقا

لحت القضيص : قشره .

Chalcide (F).

٢٤٧٠٠ - لحنكاء ، لحنكاء

هي الحلكة ، دويبة تدوس في الرمل ، الحلبا .



لحاح البحر

اسمر ، يطفئ الى الصفار الاخير . عذباته صغيرة دقيقة
اربع منها تحلي الفك الاعلى ولثنتان في الفك الاسفل .
لحمه لذيق الطعم مرغوب فيه .

كلس ٠,٠١ %
مغنيزيا ٠,٠٠٤ %
اكسيد الحديد ٠,٠٠٥ %



لُحْ الغدران

٢٤٧١٩ - **لُحْ شَائِك** *Cobitis taenia* (S).
Loche épineuse, L. de rivière (F). Groundling (E).
نوع من اللُح، يعيش في المياه النهرية الراكدة . جسمه
يطول من ١٠ الى ١٢ سم . وهو مبطط الشكل متراكب
الاوران القائقة والعابقة . عذباته ست تحلي الفك الاعلى
دون سواه . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٢٤٧٠٥ - **لُحْمُ** *Omophage* (F). *Omophagous* (E).
أكل اللحم النيء .

٢٤٧٠٦ - **لُحْمِي** *Ganache* (F). Lower jaw (E).
وهما لحيان اي شبتا فك القفوس والبلبل والحمار...

٢٤٧٠٧ - **لُحْبَةُ التَّيْس** *Salsifis des prés* (F).
هو سلسفيل المَرَج ، اطليه . قال الانطاكي : « هو
الموسطيداس نبت كورق الكركث لكن لا يرتفع حفص
حاد الرائحة يقطع الاسهال والنزف وقروح الرئة والصدور » .

٢٤٧٠٨ - **لُحْبَةُ الحِمَار** هي كزرة الير ، اطلبها .

٢٤٧٠٩ - **لُحْبَةُ الحَيَّة** هي ذق الحية ، اطلبها .

٢٤٧١٠ - **لُحْبَةُ العُتْر** هي للشنداب البحري ، اطلبها .

٢٤٧١١ - **لُحْبَةُ الهَبَل** هي اللوليا ، اطلبها .

٢٤٧١٢ - **لُحْبَةُ** *Volva, Volve* (F). Skin (E).
هي غشاء الفطر ، غشاء شفاف ناعم لا يقياسي الوَلَى

٢٤٧١٣ - **لُحْبِيَّاتُ الأَلْسَنَةِ** *Crassilingues* (F).
زينة من المغالطات تشمل بعض الفصائل . تتميز بالسنتها
للحمية السمكة القصيرة وغير الاخذة .

٢٤٧١٤ - **لُحْبِيَّس** قال الانطاكي : « اللحييس نبت بري وجبل يرتفع نحو
ذراع له حب اسود مر الطعم في حجم العنبر ينفع من
السوم غصصاً بالمغرب ويحلل الرياح الغليظة وينفع
السدد ويزيد الفواق والبرقان وشربته مثقال » .

٢٤٧١٥ - **لُحْ** *Loch* (F). *Log* (E).
مقياس سرعة السفن .

٢٤٧١٦ - **لُحْ، كَبِيَّت** *Cobitis* (S).
Loche (F). *Loach* (E).
جنس اسماك نهري من الشبوطيات اللينات الزعانف . انواعه
المعروفة قليلة . اعطاه مياه البلاد المتدلة اجسامها
ضيقة مستطيلة . تتميز بكثرة عذباتها واسنانها البلعومية ،
يصغر فلولها وضيق خياشيمها مما يجعلها ترادد سطح الماء
كثيراً || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٧١٧ - **لُحْ الغُدرَان** *Cobitis fossilis, Misgurnus fossilis* (S). *Loche d'é-tang, Misgurne* (F).
نوع من اللُح، يعيش في سمل البحيرات والغدران . جسمه
يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ثوبه الى الكهبة القبراء عمل
على جانبيه خطان اسودان قاطبان . عذباته ١٠ ، ست
منها في الفك الاعلى واربع في الفك الاسفل ، لحمه متوسط
الصنف مأكول .

٢٤٧١٨ - **لُحْ حُرْ** *Cobitis barbatula* (S).
Loche franche, Dormille, Moutaille, Motelle (F).
Rock-ling (E).
نوع من اللُح، يعيش في الانهر والبحيرات والغدران . جسمه
يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبه الى الكهبة يعلوها توشيح

٢٤٧٢٠ - **لُحْب** *Livistona* (S).
Livistone, Rondier (F). *Fan-palm* (E). *Echte Schirm-palm* (D). *Palma di cappelli* (I).
جنس اشجار ليفية صناعية وزيتية من فصيلة النخلات .
مهدها المناطق الحارة والاستوائية . انواعها عديدة جميعها
رفيعة الجذع الجالس في اقاليمها الطبيعية ، قصيرته في
الاقلام المتدلة ، اوراقها تستعمل في عدة صناعات اصغرها
صناعة القبعات والسائر . الواحدة لحية || اشهر انواعها
الزيتية ما يلي .

٢٤٧٢١ - **لُحْب** *Intensifier* (F).
To intensify (E).
استعمل اضمن الطرق لاكثر الانتاج .

٢٤٧٢٢ - **لُحْبَةُ أندُونِيْزِيَّة** ، **لُحْبَةُ جَاوَا**
Livistona hoogendorpii (S). *Livistone de Hoogendorp* (F).
نوع من اللُحب الزيتي يزرع في المراكن والحدايق . اوراقه
مستديرة ، جرائدها شائكة تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم .
غوصها مخروطي الشكل ، خاسي او سبامي الانشباب وهو
جامد الصفحة اخضر اللون اصفر المارح .

٢٤٧٢٣ - **لُحْبَةُ زَيْتُونِيَّة التَمَر** *Livistona olivaeformis* (S). *Livistone à fruits en olive* (F).
نوع من اللُحب الزيتي يزرع في المراكن والحدايق .
اوراقه كلولية الشكل تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . جرائدها
شائكة جسمها احمر اللون ، متبادع الاوتكار . غوصها عايق
الاخضرار محبب الاطراف . ثمارها زيتونية الشكل والقعد .

٢٤٧٢٤ - **لُحْبَةُ مُخْتَشِبَةِ** *Livistona humilis* (S). *Livistone bas* (F).
نوع من اللُحب الزيتي يزرع في المراكن والحدايق .
اوراقه قليلة الشكل تطول نحو ٩٠ سم . جرائدها سرسة .
غوصها ضيق الصفحة جبل الحصار الزاهي وهو ذرب الزام
الاخضر ، حاد الحمة .

٢٤٧٢٥ - **لُحْبَةُ مُسْتَدِيرَةِ الْوَرَق** *Livistona rotundifolia* (S). *Livistone Biroo* (F).
نوع من اللُحب الزيتي والصناعي . اوراقه كبيرة القعد
مستديرة الشكل قطرها يراوح من ١٠٠ الى ١٥٠ سم .
جرائدها سرسة تطول نحو ٢٠٠ سم . غوصها شديد الحصار
المابق يطول من ٥٠ الى ٧٥ سم .

٢٤٧٢٦ - **لُحْم، لُحْم** *Requin* (E). *Shark* (E).
هو القرش ، حيوان بحري جسور ، اطليه .



لُحْبَةُ أندُونِيْزِيَّة



لُحْبَةُ زَيْتُونِيَّة التَمَر



لُحْبَةُ مُسْتَدِيرَةِ الْوَرَق

٢٤٧٢٧ - لَحْنٌ أَيْضٌ

Carcharodon carcharias (S). Requin blanc (F).
White shark (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة اللحميات. أعطانها معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة أحصها المحيط الأطلسي. مسرحها العادي يمي لا يتجاوز الأعواط وتمتد سطح الماء وتؤاكل السفن || جسمها كبير القد، وشبي الشكل، يطول نحو ١٢ متراً. ثوبها الى الزرقاء البحرية البيضاء المواج. بطنها أبيض من ظهرها. رأسها مخروطي الشكل. خطمها شارب. لها لاسط || مستعرض الشدق الكبير. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة الحجم مقعرة الشكل. زعنفتها الذيلية حلالية الشكل مستطيلة || تتميز بانهم وبشدة البطش. قربها كل ما استطاعت اليه من الاسماك والجيف || اناثها معتدلة النثار. تضع في كل مرة ٤ بين اوائل حزيران وواخر تموز نحو ٤٠ مجراً.



لَحْنُ الْأَشْجَارِ الْمُسَوِّدَةِ

٢٤٧٢٨ - لَحْنٌ لَحْمِيٌّ

Alopias vulpes (S).
Requin renard, Renard (F). Fox shark, Thresher (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة اللحميات. أعطانها معظم بحار العالم أحصها المحيط الأطلسي || مسرحها يمي ولا تخفى عبور المياه الاقليمية والاقتراب من الجوارح عند مطاردتها اسراب الزنكة والسردين والاسقمري || جسمها وشبي الشكل، كبير القد يطول من ٤ الى ٦ امتار. ثوبها الى المثلثة الزرقاء المواج يبق في الظهر ويبيض في البطن. رأسها مخروطي. خطمها شارب. لها لاسط || مستعرض الشدق. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. تتميز بزعنفتها الذيلية الكبيرة الفضفاضة التي يبلغ طولها طول الجسم والرأس معاً || اناثها معتدلة النثار تضع في كل مرة، بين اوائل ايار وواخر حزيران نحو ٣٥ مجراً.

٢٤٧٢٩ - لَحْمِيَّاتٌ

Lamnidae (S).
Lamnids (F). *Lamnidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية ولودة مفترسة من السنغقيات ورتبة الاشلاق. اجناسها وانواعها المعروفة نحو عشرة. أعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || مسرحها يمي، مخروطي وسطحي || جميعها كبيرة الاجسام الوثنية الشكل. تتميز بشدة بطشها ونهمها وبأسنانها المثلثة الرؤوس الحادة وبالفتحات الحسني الكبير بين زعنفتها الظهريتين || اشهر انواعها اللحم الأبيض واللحم الصلبي والحدال والياح.

٢٤٧٣٠ - لَحْنٌ

Sclerotinia (S).
جنس فطور مجهرية من الزهفيات وفصيلة الخشاريات. يتميز بصدائه اللطيفة الكبيرة التقسية الشكل. تكاته مخروطية متشعبة متشابهة الشة، بوجه ثنائي او شمسي التركيب. يركب مختلف الاجناس النباتية || اشهر انواعها واضربها البائية مشر التالفة.



لَحْنُ الْأَكِيدِيَا

وذبول التواهي وانتشار لحاء الافناد والانفاد وعفن الثآير وتجنيتها || مظهره الخارجي: يبدو على الفتح والاجاص والسفرجل ذبول طارئ يصيب الثمرة او بعض ازهارها فيملصها ثم يركب الوراق القريبة منها وينتقل الى الفتن والغند فيلوي الاول بعد ان يوشم الثاني ببقع عفنية تقضي على النسج المصابة وتسبب انتشار لحائها || ويكون على الفوخ والدراق واللوز والمشمش ذبول فجائي يحل بأوراق التواهي فيذبلها ويصيب اقرب الوراق من الثآير فيقضي عليها ثم ينتقل الى الافناد فيقعروها ويسبب انتشار لحائها. أما الثآير فانه يفتحها على دفعتين الاولى عند الانعقاد، على اثر سقوط البتلات، فيذوبها. والثانية قرب الادراك فيوشها بحرساته الخلية الحطية التي تعطب القشرة وتحميها بعد ان تسبب عفنها وصفن لها || وهو على الكرز ورم يصيب النور قبل انبلاج الزهر فيقضي على البتلات والبيجان والآن والاوراق والافناد، والنسج تلو الآخر. كما وانه يصيب الثآير عند ادراكها فيعطلها ويفعل فيها فعله بآثر الفوخ والمشمش والدراق || يكافح اولاً في فصل الشتاء، من كانون الى شباط، بقطع جميع الاعضاء الموصولة وسرقها وينفخ الاشجار بمذوب ملح الصودا المحلول ١ ٪ والمضاد اليه ١ ٪ من الصابون الخالي من البوتاس. ثم تنضف الاشجار مرة ثانية خلال شهر اذار اي قبل الاكاح بسائل بورود المحلول من ٠.٨ الى ٢ ٪ بالنسبة الى نوع الاشجار وإلى ظروفها الخاصة، ومن الواجب ايضاً تفحصها مرة ثالثة توماً بعد العقد.

٢٤٧٣٢ - لَحْنُ الْأَكِيدِيَا *

Sclerotinia mespili (S). Maladie du dessèchement des pousses de néflier (F).

فطر مجهري يصيب الاكيدنيا في ثولاميا وازهارها واوراقها وثمارها الفتية || مظهره الخارجي عفن اصهب اللون كثيف العرصات يركب التواهي فيلويًا وينخر نموها ويركب الازهار فيسبب سقوطها ويصيب الوراق تنخيف وتسرُّ ابتداء من عتفها بعد ان تكتسب رائحة عطرية مستعجة. واذا سطا على الثآير بقودها الى اليباس بعد جفاف قشورها || يكافح باستعمال سائل بورود المحلول ١ ٪ بعد قطع الاعضاء الموبوءة وسرقها.

٢٤٧٣٣ - لَحْنُ الْبَرْقُوقِ

Sclerotinia pruni-spinosae (S). Rot-brun des prunelles (F).

فطر مجهري يصيب الثآير والانفاد فيمنطقها بعفنه التيبي اللون الذي يسبب اهترامها بكاملها او اجزاء منها. وهو على الانفناد عفن اغبر ثم اسمر يعطب للحساء ويسبب اليباس || يكافح بكثرة من اللخن.

٢٤٧٣٤ - لَحْنُ الْبُقُولِ

Sclerotinia minor (S).
فطر مجهري ينشط ويتكاثر في البيئة الرطبة الباردة التي تراوح حرارتها من ٢ الى ١٠ درجات. يصيب عدة بقول اغصها الحليين والجزر والكرنس واللوبيا والخنس والبنوترة والطرطوف ... || مظهره الخارجي بقع عفنية لينة صغيرة مستديرة تركب مختلف اغصاء النبات تنضفها بشور سودا بعد ان تثل فيها الحركة اللغنية التي تسبب الذبول الذي يعيقه اليباس || لم يكافح حتى الآن. ننصح باحتجاب زراعة البقول المعرضة لهذا الفطر في المواقف الرطبة الباردة.

٢٤٧٣١ - لَحْنُ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ *، لَحْنٌ

لَحْنٌ مُؤَلِّبِيُوزٌ سَلْبِيُونِيَا لَحْنٌ

Sclerotinia laxa, S. cinerea, S. oregonensis, Monilia Laxa, M. cinerea (S). Rot-brun des arbres fruitiers, Moniliose (F). Blossom blight (E). Monilia-spizendürre (D).

فطر مجهري يركب الفتح والاجاص والسفرجل والكرز والفوخ والدراق واللوز والمشمش فيسبب اعلاص الازهار

عفن الطحلح خلي يعلو الثَّار عند ابتداء الاوراق فينتقلها بعمرها ثم يركب الثَّواري والاوراق الفتية والافان فيؤذيها بعد ان يحول دون نموها || يكافح مكانته لحن الثَّار .

٢٤٧٤٢ - لَحْنُ السُّوسَنِ

Sclerotinia convulata, *Botrytis convulata* (S). فطر مجهري يفتك بجذامير السوسن . مظهره الخارجي يقع عنية حطية اللون زغبية ، تركب الجذامير المحفوظة وفي الثَّارة تنمطها وتلفها || يكافح بتطهير الجذامير المحفوظة بالفرمول وبالملاح الزئبق .

٢٤٧٤٣ - لَحْنُ الشَّيْتَمِ

Sclerotinia temulenta, *S. secalicola*, *Stromatinia temulenta*, *Phalea temulenta*, *Endoconidium temulentum* (S). Maladie du seigle envlvrant (F).

فطر مجهري يصيب حب الشيلم وحب بعض النجيليات العلفية والثَّارة || مظهره الخارجي استطالة في الحب وتخفده يعقبها انحلال وتآكل المادة النشوية || اكل الحب الموبوء وديقه يسبب في الانسان والحيوان مسا يسببه الزوان من عوارض اسرعا وسكر || يكافح بانتقاء البذار السليم او بغمر الحب مدة ٣٠ دقيقة بالماء الساخن البالغة حرارته ٥٠ درجة ستينغراد .

٢٤٧٤٤ - لَحْنُ الْعَقْرِ* ، عَقْنُ أَشْهَبَ ، عَقْنُ عَتِكَبِي*

Sclerotinia fuckeliana, *Botrytis cinerea*, *B. vera*, *Polycystis cinerea*, *P. vera*, *Sclerotium durum*, *S. echinatum* (S). Pourriture grise, Pourriture noble, Maladie de la talle (F). Grey mould (E). *Botrytis-faule*, *Graufäule* (D).

فطر مجهري يركب جميع الاعضاء الهوائية النباتية من الساق الى الثَّار كما وانه يركب المواد العضوية الى سطح الثَّارة فيفسدها بعمرها واصانها التي تشبه نواس العنكبوت . مظهره الخارجي يختلف مع النبات المنحدر . يبدو غالباً بشكل ونيمة جامدة طحلاء اللون او حطية تكشف النبات . هو في الكمية يقع عنية زغبية طحلاء اللون تركب السروع القريبة من الثَّارة وتركب حب المتأقية فتنطه وتذبله وهو في الاجاص يقع عنية متتابعة قدية الشكل تركب الافان فتؤذيها ونميتها || ويركب الثين في اغصانه فيسبب يباسها وذبول الثَّار وجفافها || ويصيب النبات في الماشات فيفشي على الشتول الفتية من اي نوع كانت || يكافح بتطهير الثَّارة وباستعمال احسد العلاجات الاقتصادية الزهيدة الثمن .

٢٤٧٤٥ - لَحْنُ الْقَرْنِيَّاتِ

Sclerotinia ciborioides, *S. trifoliorum* (S). Maladie à sclérotis des légumineuses (F). Stem rot, Wilt of clover and alfalfa (E). Kleekrebs (D).

فطر مجهري يركب بعض النباتات القرنية الهولية اخصها الفول والبيقية والبرسيم || مظهره الخارجي يقع حطية مبرمة تركب نصل الاوراق ثم تنتشر فتنطه كامل النصل والمحلل وتنتد الى السوق فتذبلها وتلونها بعد ان تنمطها وبشاح من العفن الابيض الذي يثني النبات والثَّارة || يحسن تحفيض الثَّارة الكيوم لصراف الماء لقصار واجتناب الزرادة في الارربة الرطبة القوية الاندماج .

٢٤٧٤٦ - لَحْنُ الْكَسْتَنَةِ* ، ثَرُوم

Sclerotinia pseudo-tuberosa, *Rhacodiella castaneae*, *Harziella castaneae* (S). Pourriture noire des chélagènes (F).

فطر مجهري يصيب ثمار الكستنة فيفسدها ويغضي عليها . مظهره الخارجي لطحلة طحلاء او سمرار اللون تملو القشرة

٢٤٧٤٥ - لَحْنُ الثَّيْبِ*

Sclerotinia nicotianae (S). Maladie à sclérotis du tabac (F).

فطر مجهري يصيب الثيب في سوقه واوراقه . يبدو على السوق لطح سمر طولها نحو ١٠ مم . يضرها ٦ . وهو على الوراق يقع صغرة لا قياسية الشكل والحجم تبدو كالبثور الحطية اللون الى ان تركبها عمرسات العفن الخليل الاخير || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية لان انتشاره منوط بكثرة الرطوبة الموقعية وبشدة البرد .

٢٤٧٤٦ - لَحْنُ الثَّامَر* ، مَوَلِيَّيَه*

Sclerotinia fructigena, *S. coryli*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructigena* (S). Rot-brun* des arbres fruitiers à pépins (F). Brown rot (E). *Monilia-fruchtfaule*, *Polsterschimmel* (D).

فطر مجهري يصيب اشجار وثمار التفاح والاجاص والسفرجل والاكديا وقد شوه في ظروف خاصة على ثمار الكرز والخوخ والمشمش والدراراق || يصيب في بادئ امره بتلات الازهار وتيجانها وانها ثم يمتد الى الافان فيعطب اللحاء والارعية ويشل الحركة النسجية بعد ان يمتلئ الاعضاء للمصابة بوشاح من عمرسات العفن الخليل الاطحل || وقد يصيب الثَّار في مختلف ادوارها الحياتية فيعطبها بعد ان يكتشف كامل شربتها || يكافح اولاً بقطع وحرق الاعضاء المصابة والارعية الجافة المختلة . ثم باستعمال سائل يورود المحلول ١٪ على اثر سقوط بتلات الزهر . وتنفض الاشجار مرة ثانية بذات السائل وذات المعدل عندما تصبح الثَّار في نصف حجمها او في ثلثيه .

٢٤٧٤٧ - لَحْنُ الثَّوْمِ*

Sclerotinia porri (S). فطر مجهري يركب اوراق الثوم فيؤذيها ويؤخر نموها . مظهره الخارجي يقع بيض ثم سمر صغار مستديرة تركب النصل فتشل نشاطه وتؤخر نموه .

٢٤٧٤٨ - لَحْنُ الْجَوْتَنِ* ، زَعْرُوطُ الْجَوْتَنِ*

Sclerotinia bulborum (S). Morve de la jacinthe (F). فطر مجهري يركب بصل الجون والاشقيل والزعفران . مظهره الخارجي اصفرار وذبول يجلان بالاوراق فور سطوع الشمرخ الزهري . ثم يبور لبدة لا قياسية الحجم والشكل سمر الغلاف بيض الداخلة تركب اسقاط البصل فتعطبها وتبرها || يكافح باقتلاع البصل الموبوء منه ظهور الموسم ويتطهر الثَّارة بالفرمول .

٢٤٧٤٩ - لَحْنُ الدَّكْبُوسِ*

Sclerotinia draytoni (S). فطر مجهري يصيب البصل المحفوظ وينتقل معه الى الثَّارة . مظهره الخارجي يقع عنية حطية زغبية مرامسة تركب اسقاط البصل واقرامه فتعطبها وتبرها || يكافح بتطهير البصل عند حفظه وقلي زهره بالفرمول وبالملاح الزئبق .

٢٤٧٥٠ - لَحْنُ الزُّعْرُور*

Sclerotinia crataegi, *Monilia crataegi* (S). فطر مجهري يركب الوراق فيؤذيها ويصيب الثَّار فيلونها او يحول دون نموها || يكافح بكثرة من اللخن .

٢٤٧٥١ - لَحْنُ السَّقَرْجَل*

Sclerotinia linhartiana, *S. cydoniae*, *Monilia linhartiana*, *Monilia neans* (S). Maladie du dessèchement des jeunes coings (F).

فطر مجهري يركب الثَّار في اول عهدا فيفسد اطلاقها ويركب الوراق والافان فيؤذيها || مظهره الخارجي



لحن الثَّار



لحن العفن

لحمه يحوي بعض المواد السامة المؤذية . وقد يكون السبب مرضي المرجان .

Lychnis (S).

لُحْنَيْسُ

Lychnis, Lychnide (F). Campion, Lampflower, Maltese cross (E). Lichtenke, Marienkreuzlein, Pechnelke (D). Licnide, Croce di Malta (I).

جلس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات . أنواعه نحو ٣٠ ، منها الحولية والمعمرة . أوراقها متعاقبة بيضية أو سنانية النصل . أزهارها كبيرة القد جميلة الشكل لا قياسية التجميع والارتكاز يكثر فيها الاحمر والابيض والموشح . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٧٥٣ - لُحْنَيْسُ أَرْجَوَانِي ، لُحْنَيْسُ سَاطِع

Lychnis fulgens (S). Lychnide éclatante (F).

نوع من اللحنيس وهو عشبة معمرة وريدة الساق تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها لاطئة سنانية ، نصلها مسن الحافة اذغب البشرة . أزهارها عتقولة التجميع ، هامة الارتكاز ، بتلاتها ارجوانية اللون ، رباعية التفصيص . ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٥٤ - لُحْنَيْسُ الْحَدَّاقِ ، لُحْنَيْسُ مَتَشَوُّرِي

Lychnis coronaria (S). Lychnide coronaire, Agrostemma coronaria, Coquelourde des jardins, Œillet de Dieu, Passe-fleur (F).

نوع من اللحنيس الزينبي وهو عشبة معمرة زياه تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . أوراقها بيضية لسنة . نصلها خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها مستطيلة الاذن كثيرة العدد . بتلاتها قليلة التشرع عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الضرب . أزهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٧٥٥ - لُحْنَيْسُ الشَّرْقِ الْأَدْنَى ، لُحْنَيْسُ خَلْقَدُولِيَّة

Lychnis chalconica (S).

Lychnide de Chalcédoine, Croix de Jérusalem, Croix de Malte (F).

نوع من اللحنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . ضروبها الزراعية عديدة . سوقها وأوراقها مزيجية . أوراقها لاطئة بيضية ، نصلها مسن الحافة اصفر الحفار . أزهارها مختلفة الالوان ، ضمية التجميع ، هامة الارتكاز ، منها المكسبة والمعادية ؛ بتلاتها مقعرة تبدو كالصليب مما جعلهم يدعونها صليب القدس أو صليب ماله . أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٧٥٦ - لُحْنَيْسُ الشَّشْرِ

Lychnis flos-jovis (S). Lychnide fleur de Jupiter, Coquelourde fleur de Jupiter, Œil de Dieu, Fleur de Jupiter (F).

نوع من اللحنيس الزينبي وهو عشبة زياه معمرة وريدة الساق تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . أوراقها لسنة ، نصلها خلي البشرة . أزهارها كبيرة القد ، بتلاتها ثنائية التفصيص قرمزية اللون . أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٧٥٧ - لُحْنَيْسُ بَرِّي

Lychnide sylvestre, Campanon rouge (F).

نوع من اللحنيس وهو عشبة برية معمرة تكثر في المراعي والمروج زرعها الماشية بشية .

٢٤٧٥٨ - لُحْنَيْسُ كَبِيرُ الزَّهْرِ

Lychnis grandiflora, L. coronata (S). Lychnide à grande fleur (F).

نوع من اللحنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى

الخارجية قطعها . ثم يمتد الى لباب الثمرة فيسبب اغتلاظه وتحويله الى بؤرة من العفن الناشئ الاسود تتخلله عروق صفير يسقط منها عند انفلاقها غبار كالحباب || تفرز الثمار المغلوبة من السليمة بعد نمدها بالماء لان المغلوبة تطفو والسليمة تغور .

٢٤٧٥٧ - لَحْنُ النَّجَّسِ

Sclerotinia narcissicola, Botrytis narcissicola (S).

فطر مجهري يركب الارراق عند ظهورها فيؤذيها ويهيئها الى نموها وازهارها || مظهره الخارجي عرصات مبعثرة طحلاء اللون تتركب نصل الارواق منه ظهورها ثم تتحول الى وثاق سود تنشو الارواق وتبقى نموها ونمو ازهارها وازهارها .

٢٤٧٥٨ - لَحْنُ نَاهِم

Sclerotinia sclerotium, S. libertiana, Sclerotium compactum, S. varium, S. brassicae (S). Pourriture des racines (F). Collar rot (E). Rapskrebs (D).

فطر مجهري يركب معظم الانواع النباتية في مختلف اصنافها التربة والهلوات || مظهره عرصات كالشور صغيرة لينة تبدو بيشاء اللون ثم تتحول الى الزرقعة وتستقر على السمرة وتوشح سطح الاعضاء المويودة او تصيب السوق في مناطقها المكابية كما يحل في البطاطا والبنندوره والتبغ . وهو على كل حال لا يقرب الاعضاء السليمة بل يركب القشور الخادشة ويصيب النبات في الخلل ولا يفتن في الثمار والدرنات المخزونة || يكاثف بتطهير التربة بواسطة الفرمول او الحامض الخلي او الاملاح الزبقية .

٢٤٧٤٩ - لَحْنَةُ

Chou (F).

هي الملفوف ، اعلمه .

٢٤٧٥٠ - لَحْنَةُ

Lachnea (S).

Lachnée (F). Lachnea (E).

جنس فطور من فصيلة الخشاريات ورتبة الرقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . تعيش مجموعات في الموائل الظليلة على المواد النباتية المتحللة . مجموعتها تمد من زوج الى ثلاثة ازواج . سوقها مجمدة . تكاثرها قصية الشكل او ترسية ، قفصها من ١ الى ٣ سم . قوائها الخارجية مهدبة القشار لونها الى الصفار الاصفر الباهت او الى الحمرة البرتقالية . صفحتها الداخلية بيشاء اللون . راحتها كريمة مستهجنة || اعرف انواعها واشهرها :

لَحْنَةُ تَرْمِيَّة

Lachnea scutellata (S).

Lachnée en écusson (F).

لَحْنَةُ نَصَفِ دَائِرِيَّة

Lachnea hemisphaerica (S).

Lachnée hémisphérique (F).

٢٤٧٥١ - لَحْنُومٌ * لَحْنَلَيْسُ

Lachnolaimus (S). Lachnolème (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكنيديات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك بحار جزر الانتيل || اجسامها شبه اهلبيجية الشكل ، كبيرة القد ، تطول من ٧٠ الى ١١٠ سم . رؤوسها مخروطية . اشداقها معتدلة الرحابة . زعانفها الظهرية والشرجية والذيلية مجزأة بمناعس غشيرية مستطيلة . اولياها متباينة الالوان منها الاحمر والجواري والاخضر والانس والاخضر البحري . ظهورها اعيق لوناً من بطونها || لحمها متوسط الصنف مأكولة باستثناء نوع واحد يدعى لحنوم كليبي (Lachnolaimus caninus) ثوبه الى الخضار الزيني . طوله نحو ١٠٠ سم .



لحن ناهم



لحنة ترسية



لحنة نصف دائرية



لحنم



لحنيس الشرق الادنى



لحنيس الشترى

صغيرة ، محرمة . ظهراتها كامل الحنجية ، شارب ، كسني الشباك . رؤسها غشائيات . بطنها صغير الحجم . قوائمها نشيطة || مسرعا حراج الستديان . قوتها نضع الازراق .



لُحْنِيس لَرَج

٢٤٧١٧ - لَدَائِيَّات ٥ *Ledridae, Scaridae (S).*

Lédridés, Scaridés (F). Ledridae, Scaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وبلقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد أو صغيرة . رؤوسها ضخمة . اعطائها صغيرة . عيونها جانبية صغيرة . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل الامتساوية . كسلها عريضة ، مزودة باطناف متباينة الاشكال . اجنتها كبيرة ، شاربة . رؤسها غشائية ، شفافة . بطونها صغيرة مبعدة . قوائمها نشيطة ، والحلفية منها مستعرة الاطوار المستنة كاللشمار .

٢٤٧٦٨ - لَدَعُخَة ، لَسَعَة . *Piqûre (F). Prick (E).*

هي المرة من اللدغ بالفم ومن اللس بالحقنة .

٢٤٧٦٩ - لَدِيد *Côté (F). Side (E).*

جانب المتق وجانب الوادي . اللديان : جانب الوادي وصفحتا المتق دون الاذنين . ولدنيد الشيء : ناحيته ج الة .

٢٤٧٧٠ - لَدَابَة سَوْدَاء ٥ *Empis nigricans (S).*

Empis noirâtre (F).

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، كثيف الملب ، متوسط القد ، يطول من ٩ الى ١٢ م . ثوبها الى السرة السوداء يطولها في صدرها خمسة عطوط سود . مكرور . خطمها معتدل الطول . عيناها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، مفترقتان عند الانثى . زباناها صغيران ، الاسحاب . قنصها الذباب والحوام .

٢٤٧٧١ - لَدَابَة مِهْدَبَائِيَّة ٥

Empis muscarius (S). Empis gobe-mouches (F).

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، وشي الشكل ، صغير القد ، يطول من ٤ الى ٩ م . ثوبها الى السرة الخطية . رأسها كبير الحجم ، شبه مكرور الشكل . عيناها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، فارتقتان عند الانثى ، لونها الى الحمرة المرجانية . خطمها معتدل الطول ، شديد النشط . زباناها مرتقيان ، اشقران . صدرها اسطواني الشكل ، كثيف الحمل . بطنها خماسي السكم ، مردي الشكل . قوائمها حطية || قوتها الذباب والحوام تقتنصها طائرة .

٢٤٧٧٢ - لَدَائِيَّات ٥ *Empididae (S).*

Empidés, Empididés (F). Empididae (E).

فصيلة حشرات خاتلة من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، خلية القشار أو محرقة ، مبعة الملب . رؤوسها شبه مكرورة . عيونها كبيرة . فارقة عند الاناث ، متلاحة عند الذكور . اعطائها دقيقة متباينة الاجسام والصلابة . اغذاها



لُحْنِيس وَرْدِي

٥٠ م . اوراقها لامطة بيضية الشكل . نصلها متباعدة اللتين جمل الخضار . ازهارها ضمية التجميع محورية وعامية الارتكاز كبيرة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٧ م . لونها الى الحمرة القرميدية ومنها عاجية || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٥٩ - لُحْنِيس لَرَج * *Lychnis viscaria (S).*

Lychnide visqueuse, Trape-mouches (F).

نوع من اللحنيس البري وهو عشبة معمرة تكثر في المراعي . اوراقها لزجة . ازهارها ابيضانية اللون .

٢٤٧٦٠ - لُحْنِيس وَرْد السَاء

Lychnis coelirosa (S). Lychnide rose du ciel, L. facinée, Coquelourde rose du ciel, Rose du ciel, Lamprette (F).

نوع من اللحنيس الزبني وهو عشبة حولية تملو من ٤٠ الى ٥٠ م . ساقها وفروعها عادمة الزغب . اوراقها ضيقة جامدة النصل . ازهارها سحار الى اللون مهدية البتلات الكاملة . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٦١ - لُحْنِيس وَرْدِي *

Lychnis flos-cuculi (S). Lychnide fleur de coucou, Fleur de coucou, Œillet des prés, Véronique des jardins (F).

نوع من اللحنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٩٠ م . اوراقها لامطة ، سنانية النصل ، بحرية اللون . ازهارها مكسية عديدة البتلات الارباعية التشرثم الوردية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٧٦٢ - لُحْنِيسِيَّات *Lychnidées (F).*

سبط من القترقيليات ، اشهر اجناسه اللحنيس .

٢٤٧٦٣ - لُحْنِيَّات *Cobitidae (S).*

Cobitidés (F). Cobitidae (E).

فصيلة اسماك نهرية من رتبة مفتوحات المثانة لينات الزعانف . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، كانت تتبع في التصنيف الماضي ، فصيلة الشبوطيات . اعطائها معتدل انحر ومجمرات البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها ضيقة ، مستطيلة ، متباينة الالوان . فلوها صغيرة ونحيلة . زعانفها الظهرية وحيدة تتوسط الظهر تقابلها الزعانف الخلفية من الجهة السفلى . وتتميز بكثرة عذباتها التي يراوح عددها من ١٠ الى ١٥ . رؤسها البوموية ويضيق خياشيمها بما يجعلها تارود سطح الماء بكثرة لاستنشاق الهواء الطلق || اشهر اجناسها البق .

٢٤٧٦٤ - لَدَاكَة *Rhodopaxille (F).*

هو اليلك ، فطر من فصيلة الفارغيفونيات ، اطلبه .

٢٤٧٦٥ - لَدَاكَة *Malléabilité, Plabilité (F).*

Malleability, Pliability (E).

القابلية الى الاتواء . وهي ايضا القابلية الى التصفيح في بعض المادان .

٢٤٧٦٦ - لَدَرَة بِقِظَة ٥ *Ledra aurita (S).*

Lédre attentive (F).

حشرة من فصيلة الدريات . جسمها يطول من ١٤ الى ١٨ م . ثوبها الى الخطي المنمش بالكسني والاسمر . رأسها مستعرض ضخم . عيناها صغيرتان . زباناها قصيران ، ثلاثيا الفصل . كسلها مزود باطناف شاربة . حجبها

من ٢٠ الى ٢٥ م. يستخرج من جذعها بالحز عصاره صفيقة رائحتها تترفع بالبخور العادي اوراقها عادية العرف المسطح. لونها في الخضر الازرق المالح. ثمارها كروية الشكل جزئية اللون، طمها يراوح من ١٢ الى ١٥ م. وعرضها من ٨ الى ١٠، اشخاصها صناعية جيدة الصنف.

٢٤٧٧٩ - لَرَّان ، لَرَّان ، سَيْسُوس

Cytisus (S), Cytis (F), Broom (E), Kleestrauch (D), Citiso, Avornello (I).

جنس جنبات برية وتربيتية من فصيلة القرنيات الفرشية. انواعه نحو ٣٠ معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. ازهارها عنقودية جالسة او متدلية تغلب فيها اللون الاصفر. ثمارها سفيقة. يزورها عسيدة الشكل تحوي بعض المواد العنصرية المحلية، ذيقها شديد الفعالية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٤٧٨٠ - لَرَّان أَبْيَض

Cytisus albidus (S).

Cytisus blanchâtre (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. بجلته فراء نفاذ متدنية تملو نحو ٥٠ سم. فروصها واقلها شاككة الاطراف. اوراقها مركبة صغيرة الوريقات المنقطة. ازهارها بيضاء اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٧٨١ - لَرَّان أَرْجَوَانِي *

Cytisus purpureus (S).

Cytis à fleurs pourpres (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها منقطة. وريقاتها اهليجية النصل مائلة البشرة. ازهارها ارجوانية اللون فردية التجميع المخوري والطرقي || ازهاره يستمر من ايار الى شب.

٢٤٧٨٢ - لَرَّان عَطِيطِي الرَّقِي

Cytisus linifolius (S), Cytis à feuilles linéaires (F).

نوع من اللزان البري الميزول. بجلته تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. وريقاتها لاطنة عطيفة خلية البشرة تطول نحو ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ م. ازهارها كثيفة التجميع طرفية الارتكاز صغيرة القند صفراء اللون || ازهاره يستمر من آذار الى ايار.

٢٤٧٨٣ - لَرَّان سَلْبِي *

Cytisus nigricans (S).

Cytise en épis (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. جنبته تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فراء زيا، زغبها اصفر اللون. اوراقها منقطة. وريقاتها سنانية النصل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٨ م. ازهارها سفلية متدلية تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الصفرة الزاهية || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران.

٢٤٧٨٤ - لَرَّان كَنْسَارِيَة

Cytisus canariensis (S).

Cytise des Canaries (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. بجلته صغرة القند متدنية. ساقها فراء نفاذ. وريقاتها بيضبة النصل تطول نحو ٧ م. ازهارها طرفية صفراء اللون مستحبة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٧٨٥ - لَرَّان مَدِيرَا

Cytisus maderensis (S).

Cytise de Madère (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها منقطة وريقاتها اهليجية النصل تملو من ٢٠ الى ٣٥ م. وتعرض من ١٠ الى ١٥.

وطايبها منخبة حادة مجهزة للخطف. الجهاز التناسلي عند الذكور خارجي الارتكاز || اناتها اكبر قدماً من ذكورها. تمتص مكثاً في التربة وفي جذوع الاشجار النخرة || اوراقها دودية، شبه اسطوانية، خماسية السكم، شاككة الحيد. رؤوسها صغرة قاسحة. تكثيرها ذرية. جميعها دامتة او واجهة تعيش في التربة او في جلوع الانجار النخرة، وبعضها قازب يسرح في امحال واولاح المناقع ويجاري الماء.

Hématophage (F).

Hematophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يقتذي بالدم او قوته الدم.

Lardizabal

جنس نباتات زراعية ليفية عارشة معمرة من فصيلة اللورديزاليات. مهدها امريكية الجنوبية. لها ثوران لورديزال الشيلي ولورديزال البرو || اوراقها متعاقبة. ازهارها بنفسجية عاقبة. ثمارها لحمية خوخية فسقية اللون مأكولة يدعونها في بلاد الشيلي (كوفيل).

Lardizabaleae (S).

Lardizabaleae (F).

فصيلة نباتات ثنائية الفلقة مستقلة القمالة مرتفعة المبيض، قريبة الشبه من البربريسيات والقمريات || تتميز بجناها الوحيد المسكن والبويضة || اجسامها وانواعها عديدة معظمها من نباتات البلاد الامريكية. اشهرها اللورديزال واللاتي.

٢٤٧٧٦ - لَرْمُوس *، لَرْمُوس

Larimus (S).

Larime (F).

جنس اسماك بحرية من شاككات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها اهليجية الشكل معتدلة التيطيط تطول من ٢٥ الى ٣٥ م. رؤوسها كبيرة، قصيرة الاعظام، رحية الاشداق. عيونها كبيرة جاحظة. زعانفها الظهرية مستطيلة، ثنائية التركيب. زعانفها الذيلية مزوانية. اثوابها الى الرتبة الفضية تعيق في الظهور ويعلمها تسليج اسود يتد الى ما يقارب ثلثي الايائل. يطونها الى الشبهة الفضية الشديدة القمعان || لحومها جيدة الصنف، مرغوب بها.

Larinus (S).

Larin (F).

جنس حشرات خاضعة من مخديات الاجنحة وفصيلة السويات. انواعه المعروفة عديدة اعطائها المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. تألف البراري التي تكثر فيها المهرشات اخصها الاقنوس || اجسامها شبه بيضبة الشكل، صغرة القند، مستندقة المقدم والمؤخر. قرونها الاستشعارية مرفقية، دوسية الاطراف. كاسلها واغادها ملحقة بنفاه من الطيلس الاصهب اللون || اقلها متنبية الاثوان والاشكال الهندسية تكثر فيها السمرة والطلحة.

٢٤٧٧٨ - لَرَّاب *، عَوْعَر رَفِيع

Juniperus excelsa (S). Genvérier de Tauride, G. en arbre (F), Greek juniper (E), Hoher Wacholder (D), Ginepro di Crimes (I).

نوع من الرعر اعطانه تمتد من اليلقان الى حلايا. يكثر وجوده في بعض جرد لبنان. شجرته كبيرة القند تملو



لرموس



لَرَّاب



لَرَّان ارجواني



لَرَّان سفلي

٢٤٨١٧ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الْجَبَلِيِّ

Cérinthe retournée (F). هو السرته المغلوبة ، اطبله .

٢٤٨١٨ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الصَّغِيرِ

Cérinthe petite (F). هو السرته الصَّغِيرَة ، اطبله .

٢٤٨١٩ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الْمُرِّ

يعرف باسم هَلَى ، اطبله .

٢٤٨٢٠ - لِسَانُ الْفَرَّالِ *

Botrychium (S). Botryche, Botrych, Botrychion (F). Moon-fern, Moonwort (E). Echte Mondraute (D). Lunaria del grappolo, Sferra cavallo (I).

جنس نباتات عشبية من السراخس . أنواعه نحو ٢٠ أعطائها البلاد الباردة والمعتدلة . تعيش في المواقع الرطبة . تتميز بأكياس يوفها السبيلية لتجميع الباعدة الفتوح .

٢٤٨٢١ - لِسَانُ الْفَرَسِ

Langue de cheval (F). هو السفدر اللسان ، اطبله .

٢٤٨٢٢ - لِسَانُ الْكَلْبِ * ، آذَانُ الْأَرْتَبِ ، آذَنُ الْفَرَّالِ

Cynoglossum (S). Cynoglosse, Langue de chien (F). Gipsy flower, Hound's tongue (E). Echte Hundszunge (D). Cinoglossa, Lingua di cane, Erba vellutina (I).

بجلة برية معمرة من فصيلة المحميات . ساقها زياء تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها معتقة لسنة . نصلها ذرب الزام الاخير ، حلي البشرة على مسطحين . ازهارها عقودية لتجميع ، متجنوية اللون ، بيض الحمار || يقال ان جميع اجزائها طبية قابضة تنفع الالهاك والمفص . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٨٢٣ - لِسَانُ الْمُرْمَرِ

هو الكلم ، اطبله . هو الكلم ، اطبله .

٢٤٨٢٤ - لِسَانُ الْوَحْلِ

Langue de cerf (F). هو السرخس الخزي من النباتات الطبية ، اطبله .

٢٤٨٢٥ - لِسْتُوسُ أَزْرَقُ *

Leistus caeruleus (S). Léiste bleu (F). Leistus caeruleus (E).

حشرة قافصة من فصيلة التبريديات وربة غدييات الاجنحة تألف الاحراج الغظيلة والمواقع الرطبة والجائتان والحدائق . تخافها ويرقاتها تعيش على ما تقتنصه من حشرات وهوام ||

جسمها صغير اللد يطول نحو ١٠ سم . ثوبها الى الزرقة الجميلة رأسها صغير الجرم . فكاه ذريان . زياتها خيطيان مستطيلان . عينها صغيرتان بارزتان . ظهورها متوسط الاحديدا ، مستدير الطرف اللافت ، ثماني التحزيز الغدي . ارساغها خماسية العقل || الاثنى اسنر

قاد من الذكر واهت ثوباً منه واقتصر زياتاً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار . تسافد في ايلول . تتجمع المكن تحت الجلالة والطالحا والعليل ||

البرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ١٦ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مداسي الروابج . ثوبها الى السمره ، رأسها وشرجها ورواجبها الى السواد الفحمي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يوماً ينقضي في بيث عودوي الغور تحفره البرقة على غق ٥ او ٦ سم .

والطالحا والكل وسرقة البول والنزف شرباً والاورام غلاه والقروح غداً ، وتمنع الصرع وداء الفيل || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤٨١٠ - لِسَانُ الْحَمَلِ السِّيَافِي * ، آذَانُ الْكَبْشِ

Plantago lanceolata (S). Plantain lancéolé, Oreille de lièvre (F). Great ben plant, Rib-grass, Ribwort (E). Spitzwegerich (D). Plantagine lanceolata, Lingua di botta (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبدول . اوراقه سنانية لسنة . ازهاره الى البياض التيبي . منافعه الطبية عديدة كمنافع رفاقه .

٢٤٨١١ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْقَرْنِيِّ ، قَرْنُ الْأَيْلِ

Plantago coronopus (S). Plantain corne de cerf, Coronope (F). Buck's-horn plantain, Star of the earth (E). Hirschwegerich (D). Plantagine corno di cervo, Minutina (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبدول . اوراقه سنانية مستطيلة ملتفة المختار او منمقفة . ازهاره الى الصفرة الباهتة . منافعها الطبية منافع رفاقه الا ان مادته العنصرية اقل فعالية .

٢٤٨١٢ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيرِ * ، لِسَانُ حَمْدِ

لِسَانُ الْكَلْبِ ، مَصَّاصَة

Plantago major (S). Plantain majeur, P. des oiseaux, Grand plantain (F). Greater plantain, Waybread (E). Grosser Wegerich (D). Plantagine maggiore, Arnoglossa, Pentinervi (I).

نوع من لسان الحمل وهو مبدول في المواقع الرطبة . اوراقه بيضية النصل ، مقنونة القاعدة ، مستطيلة اللق ، بحرية الخشار . ازهاره الى الصفار الاخير . بزوره دقيقة ترغب فيها المصافير . وهو من النباتات الطبية ، اوراقه الخضر تنقد في التزيف والحروق والكدمات والحمره . تقطير قه الزهرية ينفع العين . وعصيره خلائص لحرارة ملطف للحموضة مفاد للذغ الهوام والحشرات .

٢٤٨١٣ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْمُتَوَسِّطِ * ، مَصَّاصَة صَغِيرَة

Plantago media (S). Plantain moyen, P. bâtard (F). Lamb's tongue, Hoary plantain (E). Mittlerer Wegerich (D). Plantagine mezzana (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبدول ، ازهاره وردية اللون . اوراقه قابضة مجففة تقصد في الجراح المزمنة والحبيثة . واذا أكلت مطبوخة بخل ويلع أذات في قرصة الامعاء والالهاك المزمن . والمضغفة بملي اوراقه تشفي قروح الفم واللثة الدامية . واحسائل عصيره في صوف يشفي قروح الرسم والروبويا التي تسيل منه (الانطاكاي) .

٢٤٨١٤ - لِسَانُ الْحَبِيبَةِ * ، نَقِيعَة

Ophoglossum (S). Ophoglosse, Herbe sans couture, Langue de serpent (F). Adder's tongue, Adder's spear fern (E). Echte Natterzunge (D). Lingua serpentina, Luccia, Erba senza nervi (I).

نبات عشبي طبي بري معم من السراخس ، صغير اللد يملو نحو ٣٠ سم . اوراقه عادية العروق . يتكرر في المنافع والمواقع الرطبة . جذوره طبية تلم الجروح وتقيد الكسح .

٢٤٨١٥ - لِسَانُ الْقَصَبِ

هو شوك فرياس ، اطبله .

٢٤٨١٦ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ

اسم شائع لا يجوز اعتاده لانه يطلق على عدة نباتات مختلفة انحصها الدردار والمران والعائق والسرته .



لسان الحمل السنياني



لسان الحمل الكبير



لسان الحية



لسان الكلب



لستوس أزرق

الاستوائية || نباتاتها اشجار وشجيرات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة متعقة ، قلبية النصال . ازهارها سبلي الجميع . ازهارها خماسية البتلات ، عديدة الالوان ، جميلة الألوان الزاهية . ثمارها نوية || اشهر اجناسها اللسيتين .

٢٤٨٣٤ - **لُسَيْعَة** هي العلوك الفرنسي ، اطلبه .

٢٤٨٣٥ - **لُسِين** Ligule (F), Ligula (E).

هنا في ورق النجيليات بين فصل العصفه ونحوها .



لنوس

٢٤٨٣٦ - **لُسِين** Actinella (S), Actinelle (F).
جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة جميعها عريفة الرائحة مرة الطعم . اوراقها لا قياسية الترتيب والتجميع منها المتعاقبة والقسيمة والجمعية . ازهارها صفراء اللون رؤيساتها الزهرية عديدة اللسينات ، تحترق عريانة . بذورها مدببة الشذور || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٤٨٣٧ - **لُسَيْعَة** * Lingula (S).

Lingule (F), Lingula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الارجل وفصيلة اللسينات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد تعيش لاصقة بالصخور المغمورة وبالنباتات البحرية || اصداؤها متساوية المصارع ، يبيض الشوزن ، مستطيلة مسطحة ، مقطوعة الرأس ، مدببة العقب . مفصلاتها عادمة اللسيتين . لواقطها كثيفة الحلب الناعم اللدقيق .

٢٤٨٣٨ - **لُسَيْعَة حَطْبَة الزورق** Actinella linearifolia (S), Actinelle à feuilles linéaires (F).

نوع من اللسين المحول . ساقها منتصبة فروعها تحمل من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقها بسيطة غليظة النصل . رؤيساتها الزهرية صغيرة القد تحمل عشر لسينات اهليلجية الشكل . تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٨٣٩ - **لُسَيْعَة كَبِيرَة الزهر** Actinella grandiflora (S), Actinelle à grandes fleurs (F).

نوع من اللسين المعمر . ساقها مزهرة اللحاء منتصبة تحمل من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها ريشية مشرفة . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد ، يراوح قطرها من ٨ الى ٨ سم || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٤٨٤٠ - **لُسَيْعَة تَجْمِيَة** Actinella scaposa (S), Actinelle acule (F).

نوع من اللسين المعمر العادم الساق . اوراقها جذعية الاثكاز ، غصية الجميع ، مساوية النصل . رؤيساتها الزهرية مستطيلة اللسينات المتعقبة الى الخارج || تنورها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٤٨٤١ - **لُسَيْعَات** Linguleae (F).

Lingulés (F), Linguleae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الارجل اللاعضلية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة ، جميعها مسطحة كالسنان ملتحة باصداؤها بسويقات طينية مستطيلة قابلة الانحطاط || اشهر اجناسها واعرفها اللسينة .



لسية

٢٤٨٣٦ - **لُسَيْعِيَّة** Lasthenia (S), Lasthénie (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة . سوقها فروعها تحمل من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة سنائية النصل . ازهارها رؤيسية الجميع . ثقاتب قلافتها ملتحمة تشكل اقفاً احفنا مؤلفة من ١٥ سناً . ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر . تنورها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٤٨٣٧ - **لَسَد** Téter (F), To suck (E).

رضع . يقال لسد الظل امه ولدسها : رضع جميع ما في ضرعها .

٢٤٨٣٨ - **لَسَعَة** راجع لدغة .

٢٤٨٣٩ - **لُسَيْنُون** * Licin (S).

Liciné (F), Licinus (E).
جنس خنافس جاسة مفترسة من غديات الاجنحة وفصيلة اللسنيويات . انواعها المعروفة ١٢ موطنها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها تطول من ١٢ الى ١٨ م . يكثر فيها الشكل الاهليلجي . اغمارها لاحقة ، مخددة ومحببة . اولها الى السواد الفحشي او الكستني الاسمر الاسفع || تعيش تحت الحجارة او في انفاق تحفرها قرب جذوع النباتات . تسرح من اواسط الربيع الى اواسط الخريف . قوتها كل ما تستطيع قتصه من دوبيات ويرقات وديدان .

٢٤٨٤٠ - **لُسَيْنُونِيَّات** Licinidae (S).

Licinidés (F), Licinidae (E).
فصيلة خنافس جاسة مفترسة من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد ، شبه اهليلجية الشكل . رؤوسها بحرية . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فصلة . اغمارها لاحقة . قوتها نشطة . من ميزاتها ان ازهارا لامتدالة وغالباً مشروبة . جواضها ثنائية الفلق المخجعة . تأشيرها قصيرة وشيخة . ملاسها الشفوية جزلة || اشهر اجناسها اللسنوس .

٢٤٨٤١ - **لُسَيْنُونَات** Phaneroglosses (S).

Phanéroglosses (F), Phaneroglossa (E).
مرتبة حيوانات من رتبة البتر ، عديمات الذنب ، تشمل على اثنين وعشر فصائل || جميع حيواناتها من مختلف الفصائل والاجناس تشتمع بوجود الفلق المخجعة . لمتها الحبيبية الحبيبات والوكسيات .

٢٤٨٤٢ - **لُسَيْسِيَم** Lacistema (S), Lacistème (F).

جنس نباتات حرجية من فصيلة اللسيتيمات . انواعها المعروفة ١٥ اعطائها امريكة الاستوائية . جميعها اشجار وشجيرات . سوقها منتصبة فروعها . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقة ، جامدة النصال القلبية الشكل . ازهارها متبلي الجميع ، طرفي الاثكاز ومحوري . ازهارها صغيرة ، يكثر فيها اللون الاصفر . ثمارها نوية لا تؤكل انما يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال الهلي .

٢٤٨٤٣ - **لُسَيْسِيَمِيَّات** Lacistemaceae (S).

Lacistémées (F), Lacistemaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق امريكة

إيلاجيا فتبدو زاهية اللون شغافة ثم خضراء زيتونية وتنتهي باللون الاسمر . أما الثآليل المصابة فتبدو كأنها موشمة بتبول لا قياسية الشكل والحجم تحضنها ألوان مختلفة قبل أن تستقر على الاسمر الذي يَحْتَمُ المظاف مع الإدراك .

٢٤٨٥٣ - لُصْفُ الْعَلَقِيَّ ، لُصْفُ الْعُوسَجِ *

Elsinoe veneta, Plectodiscella veneta, Gloeosporium venetum, G. necator, Phyllosticta rosarum (S). Anthracnose du framboisier, A. des ronces (F).
وصم يصيب العوسج والعلقين في الفروع والأوراق والثآليل فيؤذيها ويوقع بها الأضرار . سببه فطر مجهري من الفطريات . مظهره الخارجي يقع حراء اللون أو بنفسجية ، قطرها من ٣ إلى ٥ م . تركيب الأوراق فتعطلها وتركب الفروع قشورها ، أما الثآليل فيحصنها || يكافح باستعمال سائل بورديو المخلول ١ ٪ في أوائل الربيع .

٢٤٨٥٤ - لُصْفَةُ Cataplasma

هي البليحة توضع على مكان الألم من الجسم .

٢٤٨٥٥ - لُصُوفُ Gloeosporium (S).

جنس تطور مجهري من فصيلة الرغيفيات . أنواعه عديدة معظمها مؤلف || مشجبه ينمو تحت الطبقة الادمية حيث ينتشر في اللون ثم يتجمع ويتحول إلى نيسة تقوم عليها الكائنات . قصباته قرصية أو سرفولية . يورفاته وحيدة الخلية ، شغافة ، مستطيلة ، مستقيمة أو منعققة || وصمه متفاوت الأضرار والأذى يمتري الأوراق والثآليل والانفاد || أعرف أنواعه ما يتبع .

٢٤٨٥٦ - لُصُوفُ الإِسْبَاحِ *

Gloeosporium spinaciae (S).
فطر مجهري تركيب أوراق الإِسْبَاحِ فيؤذيها ببعض البقع المستديرة المتلاصقة السمراء اللون التي تشوهها وتثني في قيسها التجارية || يكافح باستعمال أحد مركبات النحاس .

٢٤٨٥٧ - لُصُوفُ الْيَنْ * Gloeosporium coffeanum (S).

فطر مجهري تركيب أوراق البن فيؤذيها ويصيب الأنفان فيقرحها || مظهره على الأوراق لعلح خطية اللون مستطيلة تركيب حافة النصل فتقضي على خلايا النسج الادمية . وهو على الأنفان قروح مستطيلة سمراء اللون تعطب اللحاء وتحميها || يكافح بالقطع الأعضاء الموصومة وينضخ الأشجار عدة مرات ببعض السوائل المركزة على أملاح النحاس .

٢٤٨٥٨ - لُصُوفُ الْبَنْدُورَةِ * Gloeosporium phomoides (S).

فطر مجهري تركيب ثمار البندورة عند اقترابها من الإدراك . يبدو كالبقع الخطية أو السمراء اللون يسببها مشجج الفطر الذي ينتشر في الطبقة الادمية وتتسع معه البقع السطحية حتى انصدامها الذي يعقبه شيء من الحريان || يكافح باستعمال أحد الفوطاير المركزة على الكبريت والنحاس .

٢٤٨٥٩ - لُصُوفُ الْجُزُرِ * Gloeosporium epicarpi (S).

فطر مجهري يصيب لباب الجوز فيعطيه . مظهره الخارجي يقع مستديرة أو بيضوية الشكل طحلاء اللون سمراء الحالة تركيب لباب الشرة . فان حصلت الإصابة في أثناء النمو اطاحت بالثمرة وان وقعت قرب الإدراك سببت عفن اللباب || أضراره غالباً محدودة لا تستوجب المكافحة لأنها لا تفوق ٣ أو ٥ ٪ .

٢٤٨٤٢ - لُصْفَةُ الزَّهْرِ Liguliflores (F).

نفة من فصيلة المركبات .

٢٤٨٤٣ - لُصْفُ اللش هو السباق أو ثمره .

٢٤٨٤٤ - لُصْفُ Echenels (S).

Echénéide, Rémora (F). Sucking fish, Remora (E).
جنس اسماك بحرية من شالكانات الزعانف وفصيلة الأشكيات . أنواعه نحو ١٠ أجناسها مستديرة ، طولها يراوح من ٢٦ إلى ٣٢ سم . تتميز برووسها المكلفة بمجناح بيضيه الشكل محدودة شافطة تمكثها من الالتصاق بالاسماك والأشياء التي تريد . وهي تلتصق بالحوث والبال والدلفين واللبانة والبلواخر .

٢٤٨٤٥ - لُصْفُ Homochromie (F). Procrapsis (E).

خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات ، تمكثها من الاختضاب بلون الأشياء التي تحيط بها .

٢٤٨٤٦ - لُصْفُ Oxyria (S). Oxyria (E).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الطيلباطيات . منبتها جبال حوض البحر الأبيض المتوسط .

٢٤٨٤٧ - لُصْفُ Lachenalie (F).

هي الزيجيل من الزنابق ، اطليه .

٢٤٨٤٨ - لُصْفَةُ Zygote (F). Zygote (E).

دور التطور الميوزي الذي يتميز بتلاصق النصب المتشابهة .

٢٤٨٤٩ - لُصْفُ Fluorescence (F).

خاصة تمكث بعض الاجسام من تحويل الاشعة الضوئية التي تلتقها الى اشعة ضوئية أطول موجة .

٢٤٨٥٠ - لُصْفُ Câprior commun (F).

هو الكبير الشائك وهو ثمر الكبر .

٢٤٨٥١ - لُصْفُ التَّفَاحِ وَالْإِجَاصِ * Elsinoe piri, Plectodiscella piri, Sphaceloma, Phyllosticta rosarum (S). Anthracnose du pommier et du poirier (F).

وصم يصيب التفاح والإجاص والسفرجل في الأنفان والأوراق والثآليل . سببه فطر مجهري من الفطريات || مظهره الخارجي يقع صغيرة كثيرة العدد منتشرة بدون ترتيب على نصل الأوراق ولحاء الأنفان وبشرة الثآليل . وهذه البقع التي يبلغ قطر الواحدة منها نحو المليمتر الواحد تبدو كاسطوانة مستديرة حراء اللون تتوسطها نقطة بيضاء || يكافح باستعمال أحد الفوطاير النحاسية .

٢٤٨٥٢ - لُصْفُ الْخُضْفِيَّاتِ * ، لُصْفُ الخُضْفِيَّاتِ

Elsinoe fawcetti, Sphaceloma fawcetti, Sporotrichum citri, Cladosporium citri, Sphacelia citri (S). Scab des agrumes, Maladie des verrues (F).
وصم يصيب أكثر أنواع الحمضيات في أغانها وأوراقها وثمارها . سببه فطر مجهري يعيش ويتكاثر على النواحي الفتية عندما يكون معدل الحرارة نحو ٢٠ درجة سنغراد . لذلك فهو نادر الوجود في إقليم حوض البحر المتوسط . مظهره الخارجي يقع صغيرة تملو نصل الأوراق الفتية عند



لشك



لصف التفاح والإجاص



لصف الحمضيات



لصف البندورة

٢٤٨٦٠ - لُصُوفُ الزَّيْتُون * ٥

Glœosporium olivarum (S). Lèpre des olives, Gaffa (F).

فطر مجهرى يظهر في آب ويبلغ أوج انتشاره في أواخر أيلول، تركب الثآليل فيشوها ويغطيها || مظهره الخارجي بقع مستديرة تركب غلاف الثمرة فتسبب انخفاض السطح ثم انصداع البشرة وغمرها بمادة لزجة رتقالية تنحرف إلى السمرة مع الرطوبة || يكافح باستعمال أحد الموائل النحاسية.

٢٤٨٦١ - لُصُوفُ القُرَيْبَاتِ ٥

Glœosporium caulivorum (S). Anthracnose des légumineuses (F).

فطر مجهرى واسع الانتشار يصيب بعض نباتات الفصيلة القرنية إحصاء النفل والبرسيم والقصبة والعرن || تركب السوق ومعاليق الاوراق فيشوها بقع حطية ثم سمراء اللون تصلع البشرة بعد ارتفاع النسج وانفلاته || يكافح بتطهير البذار بمحلول سلفات النحاس المركز ١٪ بعد تغيير موقع الزراعة.

٢٤٨٦٢ - لُصُوفُ الكَرْمَةِ * ٥، سُودِيدُ الكَرْمُونِ

Glœosporium ampelophagum (S). Anthracnose de la vigne (F).

فطر مجهرى يتطفل على الاوراق والسروع والمناقيذ فيغطيها ويوقع بها اشد الاذى || مظهره الخارجي بقع صفيرة، مستديرة، لا قياسية التجميع، تركب نصل الاوراق. تبدو حطية، قطرها من ١ إلى ٤ م. ثم تتسع فينحرف لونها إلى البياض الاغبر تحمقه حالة فحمية السمرة بتفحجية المراج، تقضي على النسج النشارة فتفونها وتغتها || وهو على السروع يقع مستطيلة مبيضة تركب اللحاء فتحرقها وتغور فيها حتى الشكبر والمكالك || وهو في المناقيذ يقع مستديرة منخفصة تركب الحب فتبدو حطية اللون مبيضة تكثر في المنطقة الهامية ثم تتسع فينحرف لونها إلى السمرة يحيطها اطراف ضيق اسود || يكافح باستعمال سائل بورديو المخلو من ٢٪ او السائل البورغوني المخلو ٢٪. ومن الضروري اقتطاع وحرق السروع الموصومة.

٢٤٨٦٣ - لُصُوفُ اللُّوزِ ٥

Glœosporium amygdalinum (S). Anthracnose de l'amandier (F).

فطر مجهرى يصيب اللوز في اثنائه واوراقه وتماره. يبدو على الثآليل فروج لمولوية مستديرة، حطية اللون تلوح بالزئبق ثم تنخفض وتغور إلى الداخل || وهو على الاذنانش شتيج يمرح تحت اللحاء ثم يحفل على حين غرة قبل اكتمال نمو الاوراق || وهو على الاوراق يثور مبيضة سمراء اللون تجف وتنتح بسرعة || يكافح باستعمال سائل بورديو او أحد الموائل السلفوكسية.

٢٤٨٦٤ - لُصُوفُ اللَّيْمُونِ * ٥

Glœosporium limetticolum (S). Anthracnose du citronnier (F).

فطر مجهرى يركب بعض انواع الليمون اخصها الليمون الحلو والنانج || يبدو على نواحي الاذانان بقع حطية مستطيلة يقابلها على نصل الاوراق بقع شديدة الخضار الاسمر تغفن النصل وتقوده إلى الذبول فييبس مع الاذانان. ويركب الاذانان فيطوح بها. ويصيب الثآليل فيشوها ويوقف نموها بعد ان يوثها بنقط حطية اللون تكلف القشرة وتغور فيها || يكافح باستعمال سائل بورديو المركب ٥/٣٪ بفضاء اليه ١٪ من الزيت قبل الاذانان وبمد الانعقاد.

٢٤٨٦٥ - لُصُوفُ المَطَاطِ ٥

Glœosporium alborubrum (S). Anthracnose de l'hévéa (F).

فطر مجهرى يصيب المطاط في اوراقه وجذوعه فيؤذيه اشد الاذى || مظهره على الاوراق الفتية بقع كبيرة لاقياسية الشكل، لونها إلى الكهية يملوحو مروج زيتي. وهو على الاوراق البالغة يقع فحسية صفراء اللون ثم حطية توسعها نقط سود تقضي على الاوراق فتعطيها || وهو على الجذوع اطلع مستطيلة يغطيها بقع غبراء اللون، قطرها ٣ م. تسبب تغضين اللحاء واسوداها ثم انصداع البشرة ووثل النسج مع العصارة || يكافح عند ظهوره باستعمال الاملاح النحاسية كما وانه يحسن استعمال الاسمدة المعدنية التي تنشط النمو الخضرى فتدوّن انتشار الروص.

٢٤٨٦٦ - لُصُوفُ المَوْزِ ٥

Glœosporium musarum (S). Anthracnose de la banane (F).

فطر مجهرى يصيب الموز في ثماره النامية وللدركة فيغطيها مظهره الخارجي بقع مستديرة او مستطيلة سمراء اللون تركب القشرة ثم تغور فيها فتعطب اللب || يكثر في المواتع الرطبة الحارة. يكافح عند ظهوره باستعمال الفوطاير المركزة على الاملاح النحاسية.

٢٤٨٦٧ - لُصُوفُ بَخْخُورِ مَرَمِثَ ٥

Glœosporium cyclaminis (S).

فطر مجهرى يركب الاذانار يركب نواحي فيشوها او يذويها || مظهره الخارجي بقع حطية تركب التوبج فتقبله وتركب زناد الزهرة فتفترقه وتحمته. وهو على الاوراق يقع حطية لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل فتضعجه ووثل فيه حركة التبادل النسجي || يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المركز ١٪.

٢٤٨٦٨ - لُصُوفُ صُفْيَ ٥، هُوَ الدَّالِينُ الْاَيْشَى، اَطْلِبْ.

٢٤٨٦٩ - لُصَامَةٌ

Indehiscence (F).

Indehiscence (E).

صفة الثآليل والبلور التي لا تنفلق تلقائياً عند الادراك

النام.

٢٤٨٧٠ - لُصِيمٌ

Indéhiscant (F). *Indéhiscant* (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة او بذرة لا تنفلق تلقائياً

أي طوعياً عند الادراك النام.

٢٤٨٧١ - لُطْ ٥

Lecythis (S).

Lécythis, Marmite de singe, Quatela (F). *Monkey*

pot tree, Sapauia-nut tree (E). *Topfbaum* (D).

Maudorlo della Colombia (I).

جنس اشجار وشجيرات من اللبليات وفصيلة الآسيات. انواعه

نحو ٥٥. جميعها من نباتات المناطق الاستوائية الافريقية

والامريكية. اوراقها متعاقبة معقنة اهليلجية. ازهارها

تاجية. ثمارها جراء عليها مستطيلة مبيكة الجوانب. سداداتها

قلنسوية تنفتح من فوق تحوى عدة بذرة مزر الطعم تأكلها

القرود وتستعمل في بعض العلاجات الصدرية.

٢٤٨٧٢ - لُطْ ٥


Lota (S).

Lotte (F). *Lotte, Eel-pout* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القادسيات. انواعه قليلة

تألف السمكيات وبياء الانهر الراكدة. اجسامها تطول

من ٣٥ إلى ٧٥ سم. حاشتها صغيرة دقيقة لزجة. اثوابها



لُصُوفُ الزَّيْتُون



لُصُوفُ الكَرْمَةِ



لُصُوفُ اللَّيْمُونِ



"لُطْ"



"لُطْ"

متعاقبة منعقة كاملة اهليلجية تصغر عند تجفيفها ويستخرج منها ومن خلا السوق مادة خضابية صفراء اللون . ازهارها خاسية الفصل والبيلات ، عديدة الاسدية ، ثمارها عنبية ، صغيرة القدة ، ملونة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٨٨٠ - لُطَّر الصَّبَاغِين (S). Symplocos tinctoria
Symplocos des teinturiers, Lotur des teinturiers (F).
 نوع من اللطر السورتي . مهدد البلاد الامريكية . ثمرته تملو من مرتين الى سبعة امتار . افانها وافانها الى الصهبة . اوراقها عابلة ، نصلها شبيك الصفحة سكري الطعم . ازهارها ضمية التجميع ، صفراء اللون ، فواحة العرف العطري . ازهراره يستمر طوال شهر نيسان .

٢٤٨٨١ - لُطَّر اليابَان (S). Symplocos japonica
Symplocos du Japon, Lotur du Japon (F).
 نوع من اللطر الزبني مهدد اليابان . ثمرته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها ابيدة مألسة . ازهارها عقدية التجميع ، لونها الى الصفرة الباهتة . ثمارها حراء اللون . ازهراره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٨٨٢ - لُطَّر عَشْكَوِيّ (S). Symplocos paniculata, S. crataegoides (S). Symplocos paniculé, Lotur paniculé (F).

نوع من اللطر السورتي . مهدد الشرق . ثمرته تملو من ٤ الى ١٢ م . ساقها فراء . افانها زباء . اوراقها عابلة ؛ نصلها مسن الحافة ، خلي البشرة على صفحته السفلى . ازهارها عشكولية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية . لونها الى الالبيش او الاسفر . ثمارها كروية ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى الزرقه || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٨٨٣ - لُطَّر عَشْكَوِيّ (S). Symplocos en grappes
 هو الريمك يستخرج منه مادة قلبية تدعى لطرين .

٢٤٨٨٤ - لُطَّرِيَّات (S). Symplocaceae (F). Symplocacées (F).
 فصيلة نباتية كانت في التصنيف الماضي سبطاً مسن الاصطركيات . اشهر اجناسها اللطر .

٢٤٨٨٥ - لَطِيَّات (F). Lécythidées (F).
 سبط من فصيلة الآسيات ، نباتاته لا قياسية الانتظام الوردي تتميز بخلوها من الجيوب الانفرازية .

٢٤٨٨٦ - لَطِيَّيَّة (S). Lepas (S).
Lépas, Anatifé (F). Lepas (E).

جنس دوبيات بحرية ونهرية من القشريات الدنيا هدايات الارجل وفصيلة اللطيسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار واهر العالم || اجسامها صغيرة . عيونها مزودة . الحفها خاسية القطع . ارجلها الصدرية هداية || جميعها تتعلق بانابيب كلسية المادة تشبه التوازل تشيدها على الصخور المغفورة وعلى وحاف المرجان وعلى الاغشاب العائمة والمراكب .

٢٤٨٨٧ - لَطِيَّيَّات (S). Lepadidae (F). Lepadidae (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من القشريات هدايات الارجل . اجناسها قليلة العدد اما انواعها فكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم || تتميز بمعاليلها التي تنشب في كل شيء . معمر من الصخور الى الاصماك .

الى الصفرة تعلوها زراكلش مخلفة . سماء اللون . تسرا في الشتاء من كانون الاول الى شباط || لحمها جيد الصنف مستحب الطعم مرغوب فيه .

٢٤٨٧٢ - لُطَّ بَحْرِيّ مَبْدُول (F). Lotte de mer vulgaire (F).

سمكة بحرية تدعى كواحة مبدولة ، اطلسيا .

٢٤٨٧٤ - لُطَّاس (F). Molothrus (S). Molothre (F).
 جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ جميعها من طيور القارة الامريكية . تألف السباب والمراعي وضفاف مجاري الماء . نظامها الحياتي جماعي . تجمعاتها لاقامية العدد منها الفوج ونها السرب || اجسامها تعطلون من ١٧ الى ٢١ سم . مناقيدها محروطة ، صغيرة وقوية . اجنتها معتدلة الطول . افانها مستديرة الاطراف . ارساغها معتدلة الارتفاع . اثليلها متباينة التخفيف . لانها اسفر قدأ من ذكورها وابنت خضاب . وهي لا تحسن البيض بل تقصه في اعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضتين . يرجح انها تبيض في موسمها المحلي من ١٢ الى ١٤ بيضة || قوتها الحشرات المختلفة وبعض البذور البرية || اعرف انواعه واشهرها لطاس المشاية .

٢٤٨٧٥ - لُطَّاسُ المَاشِيَةِ (S). Molothrus pecoris (S). Molothre des troupeaux (F). Cowbird (E).

ماطر من اللطاس . موطنه بعض مقاطعات امريكة الشمالية . يآلت المراعي وضفاف مجاري الماء . فوجه يمد من ٥٠ الى ٤٠ زوجا || جسده ريش القوام يطول نحو ١٨ سم . ثوبه اسود اللون يعلو موج ازرق في الظهر والصدر . حافة عينه سوداء . مناقده ورساغ الى السرة السوداء . الاثني عادية الموالج الارزق || اخلاقه مرسة ، هنيئة . قوته الحشرات وبعض البذور البرية . يرافق قطمان البقر والبيسين فيجتم على ظهورها ويقفي على الاساربع والكزود التي تكتنف جلودها || الاثني تضع البيض في اعشاش غيرها من الطير .

٢٤٨٧٦ - لُطَّحَاتِيَّات (F). Dératiées (F).
 عمارة فطور مجهرية من فصيلة الككتيات . تتميز ببوغها الملون الشديد السرة || اجناسها ثلاثة : الحشف والزرمجة والشالطة .

٢٤٨٧٧ - لُطَّحِيَّات (S). Dematiaceae (F). Dematiacées (F).

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الحفانيات ورتبة الزرمجات . تتميز ببوغها وكثافتها السراء اللون ، ببوغها ثنائية الخلية ، شبيها فوعي الدؤل || اجناسها عديدة تجمعها اربع عمارات : الفخيات ، الريدانيات ، الزحاميات والزناخيات .

٢٤٨٧٨ - لُطَّحَة (F). Macule (F).
 Macule, Stain, Spot (E).

٢٤٨٧٩ - لُطَّر (S). Symplocos (S).
Symplocos, Symploque, Lotur (F). Lohd tree (E). Lotbaum (D). Simploco (I).

جنس اشجار ونجيليات برية ويزينية من اللطريات . انواعه نحو ١٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها



لُطَّاسُ المَاشِيَةِ



لُطَّر



لُطِّيَّة

الطول . ميناه صغيران ، ناشترتان . زباناها دقيقان
كوسلها قمي الشكل . حنجرتها صغيرة . حنجرتها ظهورها
ممشتان بالأحر والاسمر . ظهرها رمادي اللون ، اصفر
العروق . روثناها شفافان . بطنها الى الخشن الاسمر .
يطوقه حثار مصدق . قوائمها نبطية ، حنطية ، سمر
المزاج || تألف المروج والحقول والبساتين . قوتها ثلاث
الازهار والاوراق الفتية .



لفتمو

Lagopède (F).

٢٤٩٠٢ - لُغِيد

هو الغد ، اطبله .

٢٤٩٠٣ - لُغِيرِيس الرُّقُوقِ

Lyris du prunellier (F).

فراشة مزودة مشهورة باسم ارقية الخوخ . اطبلها .

Lagostome (S).

٢٤٩٠٤ - لُغُسْتُوم

Lagostome (F).

حيوان لين قاضم سجد الجنس والنوع من فصيلة الششليات.
موطنه فياني امريكة الجنوبية . جسمه ربع القامة يطول
من ٥٠ الى ٦٠ سم . وذنبه نحو ١٨ . ظهره مقوس الشكل .
رأسه عريض القامة . مقضه قصير مقطوم . سباله
كثيفة الملب الجامد . اذناه معتدلتان بارتان . جرمزه
الامامية قصيرة ثلاثية الاصابع والخلفية طويلة رباعية
الاصابع . اطافوه قوية حادة || جحره فصح الجراهم
يتألف من اربع رداء متراكبة فوق بعضها . مدخله ومخارجه
اتفاق عديدة تمررها دهايز متصالية ، تتجمع فيها الاناث
من ١٠ الى ٢٠ يحافظ عليها ويحميها ذكر واحد || قوته
الاعشاب والجذور وجميع المواد النباتية ينقلها الى مدخل
جحره || يعيش جماعات كبيرة العدد . تبلغ مساحة
قوته في بعض مناطق الارغواي نحو ٤ كيلومترات مربعة .



لفوريش

٢٤٩٠٥ - لُغُلُغ

هو اللقلق الاسود ، اطبله .

٢٤٩٠٦ - لُغُو

هو نباح الكلاب .

٢٤٩٠٧ - لُغُوْرِيْش

Lagothrix (S).

Lagothrix (F).

جنس قروم امريكية من فصيلة السيميات موطنها البرازيل
والغويان وكولومبيا والبيرو || اجسامها تطول نحو ٧٥ سم .
واذناها كذلك . التواها الى الكفة السوداء المزاج . شمارها
ناعمة لينة وثيرة || له نعان يألان الغابات والاحراج
الجبلية . قوتها النار .

٢٤٩٠٨ - لُغُوْرِيْا

Lagoecia (S). Lagoecia (F).

نبات عشبي بري طبي من السكيات . يطول نحو ذراع .
اوراقه مركبة ، مشطية ، بحرية اللون . ازهاره خيمية
التجميع لوها الى الزرق . زروره طيبة وهي دقيقة مستطيلة
حنطية اللون مرة الطعم حريفة تغد الصدر وتقي البلغم
وتقضي على الرياح والمفسد .



لفوتيا

٢٤٩٠٩ - لُفَّاح

هو اليربوع ، اطبله . ويدي السابريك . قيل وينسى
المقد . قال الانطاكي : « وهو يسكن غليان الدم والصفراء
وحرق البول والخفقان ويقطع الاسهال والدم شرابا ويسكن
الفرقان مطلقا وكذا الصداع دلاء . ويسبب فيمنع السهر
والقلق » .

٢٤٨٨٨ - لُغَاب ، لُغَم ، لُغَام

Saliva (F).

Saliva, Spit (E).

اللغاب واللغم غليط حاصل من افراز الفم اللعابية
والخاطية للفم . وهو نوعان : اللغاب التكني او المضني
واللغاب اللبني . أما اللغد اللعابية فهي على ثلاثة انواع :
التكنية والفكية واللسانية || أما اللغام فهو زبد الجمل
يقذفه من فيه .

٢٤٨٨٩ - لُغَابَات

Racines de mandragore (F).

Roots of the mandrake (E).

جذور الفلاح غواصها كثيرة النفع تستعمل في الصيدلة .
٢٤٨٩٠ - لُغَادَة

Ethologie (F). Ethology (E).

درس حياة احيوان ونشاطه الجسموري والخلقي في محيطه
الطبيعي .
٢٤٨٩١ - لُغَاعَة

Légume tendre (F).

New green (E).

كل نبات لين من احرار البقول . واللغاعة ايضا ج لغاع .
وفي القول المأثور « انما الدنيا ساعة وبتاعها لغاعة » اي
قليل البقاء كالنبت اللين .

٢٤٨٩٢ - لُغُلُ ، يَأْفُوتِ أَحْمَر

Rubis (F). Ruby (E).

حجر كريم من الالوين المبلور الشفاف ، لونه الى الحمرة
الصنائية الزاهية . اجوده ما جاء من التبت والهند .

٢٤٨٩٣ - لُغُل

Réfringent (F).

Refringent, Refracting (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما تحل بخاصية كسر الاشعة
الضوئية اي تغير اتجاهها .

٢٤٨٩٥ - لُغَلَعَة

Réfringence (F).

Refringency (E).

اللمعة خاصة تتميز بها الاجسام الشفافة بكسرها للامعة
الضوئية .

٢٤٨٩٦ - لُغَم

Saliva des reptiles apodes (F).

Saliva of apodous reptile (E).

اللغم لغاب الزحافات المرقاة أي العادة الدرجل كالحيات .
٢٤٨٩٧ - لُغَوَة

Chienne (F). She dog (E).

هي الكلبة ينسب من خصها بالكلية الخائل . قالت العرب :
اجوع من لوعة واضيع من لوعة .

٢٤٨٩٨ - لُغُوس

Labé (F). Labiate, Lipped (E).

٢٤٨٩٩ - لُغِيْث

Logarithme (F). لُغَارِيْثِمَة

Logarithm (E).

علم انساب الاعداد .
٢٤٩٠١ - لُغَاس المُرُوج

Lygus pratensis (S).

Lygus des prés (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الصمغيات . جسمها صغير القد
يطول نحو ٧ م . ثوبها متراكب الشفحة والصفرة وشمع
ابيض واسمر وأحمر . رأسها صغير محرم . عظمها معتدل

وهو على الدرنات وشاح اسمر اللون يلحف البشرة بكاملها او يجزء منها فيعطها ويتلفها || يكافح باستعمال احد الفواطير الحديثة او محلول بوردو المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو
كلس حراق ٣ كيلو
مساء ١٠٠ لير

وبهم من فصل محلول || يورفينين || المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو
كربونات الصودا ٣ كيلو
مساء ١٠٠ لير

٢٤٩١٨ - لَفَّاشَةُ التَّبَعِ *

Phytophthora nicotianae (S). Black shank (E).

وصم يسببه فطر مجهري يركب التبغ في المثلث وفي الحقل. مظهره الخارجي على شتول المثلث يبدأ باسوداد وقطع السخن والجذور ثم ينتهي بالمريان والاضمحلال || وهو على شتول الحقل، في اول عهده ، بقع تظهر على الاوراق بيضيه الشكل ، لا قياسية الحجم . لونها اشد اخضراراً من النسيج الذي يحوقها ثم يتحول تدريجياً الى الشقرة فالصبغة البسرة ضمن إطارات خفيفة فاصلة قليلة الوضوح . وفي دوره النهائي يذبل الاوراق ويعطب السوق ويسبب اسودادها من السخن وصاعداً على ارتفاع ٢٠ او ٣٠ سم. وعند شق او فلق الشتل المصابة يلو مكاها جافاً متفصلاً متقطعاً اسود اللون || يكافح في المثلث باستعمال الفواطير المركزة على النحاس او الزنك ويكافح في الحقل باجتناوب الزراعة في المواعيد الربطية .

٢٤٩١٩ - لَفَّاشَةُ الشَّمْسِ

Coup de soleil (F). Sun scald (E). عارض يصيب لحاء الاشجار في خلايا نسيجها البشورية والوعائية سببه اشعة الشمس المحرقة التي ترشها وتستوعبها قسراً لحاء السوق الممرضة الى الجنوب ثم يدركها البرد القارس فجأة فيعطها ويسبب يباسها || يكافح بطسلي السوق بالكلس لان اللون الابيض يمنع تخزين الحرارة .

٢٤٩٢٠ - لَفَّاشَةُ الصَّبَارِ ، لَفَّاشَةُ النَّفَمِ

Phytophthora cactorum, Ph. omnivora (S). Pourriture du collet, Maladie des semis du hêtre (F). Crown-rot, Omnivorous phytophthora disease (E). Kragenfäule, Keimlingsfäule (D).

وصم مؤق يسببه فطر مجهري يركب مختلف النباتات اللحمية وشاتل النباتات الحرجية ويمتري النجم بعصفه فيضيمه . مظهره الخارجي بقع شقر ثم سمر ، لا قياسية الشكل والحجم تقلب فيها الأسطالة ، تنعقب بالنسج فتضيق || يكافح كثيره من فطور اللعنة بمركبات النحاس او الزنك .

٢٤٩٢١ - لَفَّاشُ ، نَفَّاشُ *

Distichodus (S). جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيله السلدونيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اجسامها مستطيلة ، ملاحظها عذبة ، اعطامها مقلطحة . سهنها صغير القد مبراش الطرف . اثمار انواعه لفش التيل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ثوبه الى الخضار الغني المواج .

٢٤٩٢٢ - لَفَّالُونَ

Cuscute (F). هو الكشوث . اطلبه .

٢٤٩١٠ - لَفَّاشَةٌ *

Salmo salvelinus (S). Ombie, O. chevalier, Salvelin (F). Char (E).

سمكة نهريه بيوض من السلمونيات ، اعطامها منظم بحجرات اربوية وتركيا || جسمها كبير القد ، يطول نحو ٨٠ سم. ثوبها ، عند اكثال ثوبها ، ثنائي اللون ، ظهرها والقمم الاكبر من جانبيها الى الربعة الخضراء . بطنها وما تبقى من جانبيها الى الصغار البرتقالي يعلو موج ردي يبق عند حافة البطن . اما ثوبها في طور النمو فكثير النقط البيض || لحما فاخر الصنف يعتبر من اجود لحوم اسماك المياه العذبة .

٢٤٩١١ - لَفَّالَةُ الْوَرْدِ *

Blennocampa pusilla (S). Rouleuse des feuilles, Tenthrède des feuilles du rosier (F). Rose leaf sawfly (E). Kleinste Rosenblattwespe (D).

حشرة من الفطريات، جسمها صغير القد اسمر الثوب . ورقاتها مستدقة غبراء اللون تميش على ورق الورد فتلفه وتلتحف به ثم تثروده وتبقى عليه .

٢٤٩١٢ - لَفَّالِيَةٌ

Diplolène (F). جنس نباتات جنبيه من السذابيات تدعى عيتة ، اطلبها .

٢٤٩١٣ - لَفَّتْ *

Brassica rapa (S). Rave, Navet (F). Rape, Turnip (E). Wassertübe, Weisses-Rübe (D). Rapa (I).

بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات . جذرها مستدير الشكل مقطوع ، يؤكل طرياً ومطبوخاً وخلاً ، ومنه ضرب علفية كبيرة تأكلها الحوم والابقار والخنازير || يزود زيتية طيبة تحوي بعض الفسفور والمواد الحريفة المهيجة . وقد شاع استعمالها للانماط منذ زمن القراعة الذين اطلقوا عليها اسم (دمج) اي زر اللفت او زيت زر اللفت.

٢٤٩١٤ - لَفَّتْ بَرِّي

Raponce naine (F). هو قتيونه الزمعية ، اطلبها .

٢٤٩١٥ - لَفَّتِي

Napiforme (F). Napiform (E). تمت تعريفه وصي يعلق على الجذور القصيرة المستطيلة التي تشبه اللفت .

٢٤٩١٦ - لَفَّاشَةٌ

Phytophthora (S). جنس فطور مجهريه من عارة الوصليات وفصيله الصناتيات تتميز بنموها البولية الناجية الارتكاز والتشمب || انواعها عديدة . اشهرها واضرها للاقتصاد الزراعي لفعة البطاطا ولفعة التبغ ولفعة النعم .

٢٤٩١٧ - لَفَّاشَةُ الْبَطَاطَا *

Phytophthora infestans, Botrytis infestans, B. devastatrix (S). Mildiou de la pomme de terre (F). Potato blight (E). Kraut-und knollenfäule der kartoffel (D).

وصم وخم العاذية يسببه فطر مجهري يمتري معظم نباتات الفصيلة الباذنجانية واعصمها البطاطا والبنندوره || يركب الورق والسوق والجذور والدرنات . مظهره الخارجي على الاوراق بقع لا قياسية الشكل والحجم تبدو خطية اللون ثم تنحرف الى السمره يقابلها على صفحة النصل السفلي غبار ابيض فسجالي ، يلو حثار البقع فيحدها ويستقر بعض الوقت الى ان يشمل الذبول كامل النصل فيطوح به .



Pompilus (S). ٢٤٩٢٩ - لِقْ * ، لِقْهٗ

Pompil, Centrolophe (F).

جنس حشرات من فصيلة اللقيات . انواع عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها متوسطة القد هيفاء الجسم تطول نحو ٣ سم . ألوانها الى السواد الامع يعلو تجذيع متعرج احمر اللون او اسفر . تتميز بقتصصها وتغذرها الناكب التي تغذرها في مكائها كغذاء لبنيها الحديث النصف .

Inoculum (F). Inoculum (E). ٢٤٩٣٠ - لِقَاح

المجرومة النقية الصالحة للتلفيح .

Vaccin (F). ٢٤٩٣١ - لِقَاح ، طُعْم

Vaccine matter (E).

قوة محدودة الفاعلية النسبية تحقن في جسم الحيوان لوقايته بعد حدوث الشاعة المقصودة .

Eteules, Glanure (F). ٢٤٩٣٢ - لِقَاط ، لِقَاطَة

Gleanings (E).

ما يقطه الحاصد من السبلل فتلقطه الناس .

Colaptes (S). ٢٤٩٣٣ - لِقَاط

Colaptes (F). Flicker (E).

جنس طير من فصيلة التفاريات ورثية المستقلات . انواعه المعروفة ستة جميعها امريكية المله الى اجسامها معتدلة القد تطول من ٢٧ الى ٣٠ سم . بسطها تراوح من ٤٠ الى ٤٥ سم . ألوانها الى السمره البهجة والمقرقشة بالاصفر والاحمر والاشهب . تتميز بتناقيدها المستعرضة القواعد وباراساغها المستطيلة || قوتها الاسراع والديدان والنمل والحشرات والثمار البرية والبيور والبطول . وهي من الطيور الخازنة التي تجمع البيوط في تجاويف الاشجار ويحيوها فتون بذلك مونة فصل الشتاء || انثاها تدفن في تجاويف الاشجار وفي صدها وتبيض من ٦ الى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الصغار تسرح في طلب القوت بعد التفنن باسبوعين || اشهر انواعه المعروفة :

Colaptes chilensis (S).

Colaptes du Chili (F).

Colaptes mexicanus (S).

Colaptes du Mexique (F).

Colaptes auratus (S).

Colaptes doré, Pic doré (F).

٢٤٩٣٤ - لَقَاعَةُ الْبَقَرِ *

Hypoderma bovis (S). Hypoderme du bœuf, Varron (F).

Ox warble fly, Cattle grubs (E). Dasseliege (D).

حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم .

وهي كبيرة الرأس ، قصيرة الطم ، مستطيلة الجسم . تنحس مكها على ظهور البقر فينتف عن رقات خيطية هليية تنقلها البقرة بلسانها من جلدها الى حلقها فيطها حيث تنسل وترقى حتى التسج الجلدية فتنتف الجلمع عن انتها دورها البرقي وتنسقط على الارض فتنتش في التراب وتنحول الى كزود ثم الى حشرة تميد سيرتها الاول .

٢٤٩٣٥ - لَقَاعَةُ الْعُلْجُومِ *

Lucilia bufonivora (S). Lucille du crapaud (F).

حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ٥ الى ٨ سم . لونها الى الخضار الغامق تكثر في الاكاسير الرطبة . رقاتها طفيلية تركب جمع الصفادع اغصانها العلجوم .

Lophotes (S). Lophote (F). ٢٤٩٢٣ - لَقُوتٌ *

جنس اسماك بحرية من فصيلة المتجليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اشهرها لقوت المتوسط .

٢٤٩٢٤ - لَقُوتُ الْمَتَوَسِّطِ *

Lophotes cepedianus (S). Lophote de la Méditerranée (F).

نوع من اللقوت وهو سمكة بحرية مأكولة لحما متوسط الصنف . جسمها مبسط الشكل يطول نحو ١٥٠ سم . زعنفتها الظهرية تمتد من قة الرأس الى طرف الذنب وتنتهي عند الرأس بقرن محدب مخروطي الجسم عظمي المادة . ثوبها الى الخضار الرصاصي تملو رقشة بيضاء .

٢٤٩٢٥ - لَقِيعْغَة *

Laphygma exigua (S).

فراشة من فصيلة الليليات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٢ الى ١٤ سم . بسطها نحو ٢٥ سم . جسمها وروشنها الاثامين الى الرمادي العايق . ررشتهاا الحلقيان الى البياض الاغبر ، اطارها واعصاها سمر || الاثني اكبر قدأ من الذكر تمتد مكها الذي يد نحو ٥٠٠ كتأ متفرقة لا قياسية الشكل والعدد على صفحات اوراق القطن السفلي فينتف بعد متته بثلاثة او اربعة ايام عن رقات تسليخ خمس مرات . طولها البرقي يدم من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع وقد يطول اكثر من هذا في الشتاء . ثم تنحول في التربة الى عذراء || اجيالها الحولية عديدة . النسي يدوم نحو ٣ اسابيع والشتوي من ٤ الى ٦ اسابيع || رقاتها تدعى دودة القطن الخضراء ، اعطها .

٢٤٩٢٦ - لَقِيزْلُوز ، لَقِيزْلُوز

Lévulose (F).

Levulose (E).

سكر من السكر ينتهي الى فئة الغلوكوز يوزع في معظم ثمار الفاكهة وفي الحسان والصل .

٢٤٩٢٧ - لَقِيمُومٌ * ، هُوتِسَة ، أَمْ هُوس

Lophiomys imhausii (S). Lophiomys d'imhaus (F).

حيوان لبون قاصم من فصيلة القيويميات . موطنه تمتد من حوض البحر الاحمر الى الحبشة . يألف الور والادفال والخراج المتباعدة الاشجار . ملجنه الحيائي جماعي . جماعاته قليلة العدد || جسمه مستطيل الشكل ، يطول نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم . يتميز بكثرة في ألوير المستطيل الخشن تمتد من قعر الرأس الى اواخر الزام الثالث من الذنب . رأسه صغير القد ، مخروطي الشكل ، مبسط الجرم . سباله كثيف مستطيل . عيناه واذناه صغيرة . قوائمها قصيرة ، خاصة الاصابع . ثوبه الى الكلسه السمره مملووا تمشيع اغبر في الرأس والظهر والبطن . طرف ذيله امرط عادم ألوير || مسرعه دجوي . يتسلق الاشجار بقتة السنجاب . قوته الجلود والادراق والحبوب والبيور .

٢٤٩٢٨ - لَقِيمُومِيَّاتٌ *

Lophiomyidae (S). Lophiomyidae (F).

فصيلة حيوانات لبونة من رتبة القرواحم . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها تمتد من حوض البحر الاحمر الى افريقية الشرقية والحبشة والسودان وافريقية الوسطى || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، كثيفة ألوير ، مستطيلة السبال والاذناب الكاسية . قوائمها قصيرة ، خاصة الاصابع . حادة البرائن القليلة التسجين || جميعها شاجرة . قوتها الجلود والادراق والحبوب والامحار وبضف البور .



لقوت المتوسط



لقيفة



لقير



لق



لقاط



لقاعة البقر

Glanage (F). Gleaning (E).

اللقط واللقاط هو جمع السنايل التي يغطسها الحاصد فتبقى في الحقل بعد الرجاء .

٢٤٩٤٧ - لَقَطَة

« بقلة طيبة تبعمها الدواب » ج . لقط .

Défaut apparent (F).

Visible default (E).

٢٤٩٤٨ - لَقَم

العيب الظاهر .

Happer (F). To snatch (E).

٢٤٩٤٩ - لَقَفَ

Parol (F). Coat (E).

٢٤٩٥٠ - لَقَفَ

القف جانب البئر والحوض . ج القاف .

Ciconia (S).

٢٤٩٥١ - لَقَلَقَ ، لَقَلَقَ

Cigogne (F). Ciconia, Stork (E).

للقلق ج . لقالق . جنس طير من فصيلة اللقلقيات ورتبة طوال الساق . صوته لقلقة . انواعه خمسة جميعها من القواطع طويلة السيقان والاعناق والمنقار . قوتها الاناعي والبرذآن والحشرات والجيف والتفانيات || اشهر انواعه .

٢٤٩٥٢ - لَقَلَقَ اَبْيَضَ * ، بَلَارَجَ ، اَبُو حُدَيْج

Ciconia alba (S). Cigogne blanche, C. commune (F). White stork (E).

نوع من اللقلق ابيض الثوب ، اسود القوائم ، اجر الساقين والمنقار . طوله نحو ١١٠ سم . وبسطه نحو ٢٣٠ سم . مسرعه يمتد من ايران الى العراق وآسية الصغرى وأروبة وإفريقية الشمالية والجنوبية والشرقية حيث يمضي فصل الشتاء ثم يعبر البحر الى ايران والعراق .

٢٤٩٥٣ - لَقَلَقَ اَسْوَدَ ، تَلْعَغَ ، عَنَزَ ، اَبُو سَعِيد

Ciconia nigra (S). Cigogne noire (F). Black stork (E). نوع من اللقلق طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢١٠ سم وهو اسود الثوب ، ابيض الكتفين والعنق والصدر والبطن والافنيك ، اجر الساقين والمنقار . مسرعه يشمل الهند ومنشورية وآسية الصغرى وأروبة وإفريقية .

٢٤٩٥٤ - لَقَلَقَ الْاَقَاعِي

هو الكركم المتوج ، اطليه .

٢٤٩٥٥ - لَقَلَقَ حَبَشِي * ، عُنَاز

Ciconia abdimii (S). Cigogne d'Ethiopie (F). Ethiopian stork (E).

نوع من اللقلق ، طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢٠٠ سم . ثوبه الى السواد الابرتواني المواج . بطنه ابيض . رأسه وقوامه سود . عقه ومنقاره وساقاه حر . يكثر في الجبشة ويحجب معظم الاقطار الافريقية .

٢٤٩٥٦ - لَقَلَقَ مَسْرُوجَ الْمِشَار

هو المكثير الافريقي ، اطليه .

٢٤٩٥٧ - لَقَلَقِي

هو البطرء ، اطليه .

Ciconiidae (S).

٢٤٩٥٨ - لَقَلَقِيَّات

Ciconiidae (F). Ciconiidae (E).

فصيلة طير من طوال الساق ورتبة بلشونيات الشكل . انواعها المروفة ١٧ بعضها أبد اعطانه البلاد الاستوائية والحارة والبعض الآخر قاطع يحجب البلاد في طلب المصيف والمشي || ملجئها الحيائي زوجي وجماعي . قوتها الصفاد

٢٤٩٦١ - لَقَاعَة حَمَلِيَّة * Lucilia sericata (S).

Lucille soyeuse (F).

حشرة من الصديديات ، طولها براوح من ٧ الى ١٠ مم . جسمها خمل البشرة يكثر وجودها من اذار الى تشرين الثاني . يرقاتها هواكة وثائلة وقد تكون وانجة وطفيلية .

٢٤٩٦٧ - لَقَاعَة قِصْرِيَّة * ، لَقَاعَة خَضْرَاء * Lucilia caesar (S). Lucille impériale (F).

حشرة من الصديديات ، طولها براوح من ٧ الى ١٢ مم . تظهر من نيسان الى تشرين تكثر على الازهار والاقدار المعرضة لاشعة الشمس ، يرقاتها وانجة وهواكة . تركيب الحيوانات الفقارية .

٢٤٩٦٨ - لَقَاعِيَّات Calliphoridae (F).

هي الصديديات فصيلة حشرات ذبابية من ذوات الجناحين .

٢٤٩٦٩ - لَقَاعَة Freluche (F). Butterfly-net (E).

جيب ، مخروطي الشكل ، من النسيج الناعم المتين ، يستعمل لاقتناص الحشرات والفراشات .

٢٤٩٦٠ - لَقَامَة Phagocytose (F).

Phagocytosis (E).

عمل ارتشاف الهتامات والجراثيم التي تقوم به بعض الحبيريات الحيوانية .

٢٤٩٦١ - لَقَامَة Phagocyte (F). Phagocyte (E).

اللقامة حبيرة في الجسم الحيواني وظيفتها القامة . وتدعى راعية وفاغوسيت وعضامة .

٢٤٩٦٢ - لَقَامِي Phagocytair (F).

Phagocytic (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالقامة .

٢٤٩٦٣ - لَقَمَة سَوْدَاء Centrolophie nègre (F).

سمكة بحرية تدعى رطامة ، اطلبها .

٢٤٩٦٤ - لَقْس Epinephelus (S).

Epinéphèle (F). Epinephelus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات ورتبة شالكاك الزعانف . انواعه المروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم اجسامها اهليجية الشوزن ، متوسطة الحجم ، مستطلة الرؤوس ، مقطوعة الاضطام ، مسنة الزعانف الاسامية في الظهر والبطن . الوابها كستنية اللون تملوها رقشة ملونة وبعض الماجات الزاهية والمابقة || اشهر انواعه اللقس الجبار والصخري والرمل .

٢٤٩٦٥ - لَقْس جَبَّار * ، صُرَّان جَبَّار Epinephelus gigas (S). Epinéphèle géant, Serran géant, Merou (F). Epinephelus gigas (E).

سمكة بحرية يبرض من اللقس . اعطائها البحر الابيض المتوسط . جسمها كبير القد اهليجلي الشكل ، بطول نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الجوزة الخنطية السمراء المواج تملوها رقشة غبراء منسوبة التوزيع تكتنفها من الرأس الى الذنب || رأسها مقنطوم الخطر الافطس . فكها كبيران . شدنها رجب . عيناها كبيرتان ، معتدلتا الشوزن . زعانفها الظهرية والشرقية مستطيلة يملونها في اقسامها الاولى مناعس حادة ، زعنفتها الذيلية منفرجة الطرف المستدير || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .



لقاعة قيصرية



لقس جبّار



لقلق ابيض



لقلق حبيشي

عابقة . تحمل في مؤخر اجنحتها الخلفية زوائد دقيقة . مكها مستدير الشكل . ذري القذ . رقاتها قصيرة لظيفة تستطيع اخفاء رؤوسها تحت حلقاتها الصدرية الأولى . خادراتها عاريات . بيئاتها لا قياسي النمط والشكل يختلف مع الاجناس . فيه المتدنية المائلة بمؤخرها والمطوقة المائلة ببطنها والمنسقة والسليبة . الخ .



لَقْمَةُ الْحِلِّ الْعَفِيَّةِ

٢٤٩٦٧ - **لَقْمَةُ الْبَازِيلَا** * (S). *Lycaena baetica* (F).
Lichén des pots (F).
حشرة من اللقنات كثيرة الانتشار في الجبل الحولي . اقليمها حوض البحر المتوسط . يستطاع نحو ٢٠ م . ثوبها الى الزرقاء الجنبيلة يملوه موج خلي واطار اغبر في الذكور ، اسمر في الاناث . قرونها الاستشعارية دقيقة ، قوية الشكل ، صقبة الطرف || رقاتها عند اكبال تطورها تطلو نحو ٢٠ م . ثوبها الى الخضار المايق يملوه موج بني لا يخلو من الاحمر وسط اسمر قاطب وشطوط جانبية متعززة غيراه اللون || تركيب البالزا والباقية واكثر القرنيات . تعيش داخل السفلات تلثم الحب وتقضي عليه .

٢٤٩٦٨ - **لَقْمَةُ الصَّعْتَرِ** * (S). *Lycaena arion* (F).
Lichén arion (F).
حشرة من اللقنات صغيرة القد ، زرقاء اللون ، مزركشة الرواشن . اناثها اكبر قدماً من ذكورها واهبل لوناً ولق زراکش || رقاتها دقيقة الجسم سمره اللون وودية المواج . تركيب الصعتر حتى السلاخها الرابع ثم تقسم قرى التل فتلثم الرصع .



لَقْمَةُ النَّمْبَةِ

٢٤٩٦٩ - **لَقْمَةُ** (F). *Aigle femelle* (F). She eagle (E).
الغاب الاثني .

٢٤٩٧٠ - **لَقْمُوسِيَّات** * (S). *Leucosilidae* (F).
Léucosilides (F). *Leucosilidae* (F).
فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل محرجحات الافواه || اجناسها وانواعها قليلة العدد ، نحو ٥٠ ، منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة بيضيه الشوزن او مكورة . معدودة الطهر ، مفردة المقدم والمؤخر . ملاقطها دقيقة ، مسطيلة ، سننة الشفار الداخلية .



لَقْمَةُ الْبَازِيلَا

٢٤٩٧١ - **لَقْمُوسَةُ** * (S). *Leucothoe* (F). *Leucothoe* (F).
الاسم العلمي من الميثولوبيا الاغريقية . جنس جنبات برية وزراعية تربيانية من فصيلة اللحنجيات . منها بعض الاصناف الامريكية . سوقها منصبة تملو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها متعاقبة ، سننة الختار . ازهارها خاسية الفصل ، اسطوانية النويجات ، عشارية الاسدية ، يكثر فيها اللون الابيض || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٢٤٩٧٢ - **لَقْمُوسَةُ حَسَفَةِ** * (S). *Leucothoe catesbaci* (F). *Leucothoe spinulose* (F).
نوع من اللقوسية التربيانية . ساقتها فرعا تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها منقطة . اعتناها الى الحمرة . نصلها اهليلجية ذرية سننة الختار ، مسطيلة الانسان الحسفة الشائكة . ازهارها ضمي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ، ناشطة العرف التله || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .



لَقْمَةُ الصَّعْتَرِ

والبطاء والشعابين والاسماك والقشريات والقواضم الصغيرة والحشرات . بعض انواعها ، اخضها الكثير ، يعيش على الجف وقد يتعدى النور التي تحشاها عندما تصيب جيفة || اجسامها عصبليية متباينة الهجوم ، منها الوسلي والكثير . تتميز باستطالة القوائم والمنقبات الكبيرة ، المستقيمة ، الذرية ، الوشبية الشكل . جميعها بكيمية ، عادمة الجهاز الصوت || تدنن اعاشتها في المواقع الرقيقة وفي اعالي الانجار الباسقة . اناثها تنفع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ٢٠ الى ٤٠ يوماً .

٢٤٩٥٩ - **لَقْمَةُ** (F). *Condyle* (F).
نوع المفاصل او حيد مستدير في العظام .

٢٤٩٦٠ - **لَقْمَةُ الْحَمَلِ ، لُوتِي ، تَمُول** (S). *Alternanthera* (F). *Chaff-flower* (E). *Weckelskölbchen* (D). *Alternanthera* (I).
جنس نباتات برية وزراعية بقلية من فصيلة القيقبيات . انواعه نحو ١٠ جميعها اشباح حولية او معمرة . اوراقها كثيرة العدد لا قياسية الشكل والحجم . ازهارها منزورة عادمة العطارة يكثر فيها اللون الابيض . اوراقها صحية تنفع المعدة .

٢٤٩٦١ - **لَقْمَةُ الْحَمَلِ الْعَفِيَّةِ** * ، **لَقْمَةُ الْفَرَكَ ، تَمُول لَاطِي** (S). *Alternanthera sessilis* (F). *Alternanthera sessile*, *Brède-chevette* (F). *Sessile flowered globe amaranth* (E). *Garneleukraut* (D). *Alternanthera di molucca* (I).

نوع من لَقْمَةُ الْحَمَلِ اوراقها كبيرة القد لاطية . توكّل مطبوخة . تنفع المعدة وتفيد النفس .

٢٤٩٦٢ - **لَقْمَةُ الْقَاصِي** (F). *Ottellie* (F).
هي اذن الشيطان ، اطلها .

٢٤٩٦٣ - **لَقْمَةُ النَّمْبَةِ** * ، **كَبَاش ، مِشِيطَةُ** (S). *Plantago ovata* (F). *Plantain triomphe* (F). *Spogel plantain* (E). *Spogel Wegerich* (D). *Lingua d'agnello* (I).

نوع من لسان الحمل وهو نبات عشبي ، مقري ، بري ، طبي ، معمر ، يكثر في المواقع الرطبة .

٢٤٩٦٤ - **لَقْن** (F). *Lutage* (F). *Luting* (E).

٢٤٩٦٥ - **لَقْنَةُ** * (F). *Lagune* (F). *Lagoon* (E).
القننة كل بحر قريب القاع وقد تكثر فيه الحشاش والخورج . ج يرقان .

٢٤٩٦٦ - **لَقْنِيَّات** * ، **هَرَضِيَّات** * (S). *Lycanidae* (S). *Lycanidae*, *Lycénides* (F). *Lycanidae*, *Hainstreaks*, *Gossamer wings* (E). *Bläulinge* (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها متوسطة القد ، قوائمها الانامية ناقصة التركيب . ارساغ ذكورها وحيدة العقلة . قرونها الاستشعارية تفلظ مع ابتعادها عن الرأس . اناؤها

Chêne chevelu (F).

٢٤٩٨٢ - لِكَاع

هو السديان الأشعر ، اطلبه .

٢٤٩٨٣ - لِكَاث ، لِكَانة

داه يأخذ الغنم في اشدتها وشفاها وهو مثل القرص .

٢٤٩٨٤ - لِكَاث

الكاث : الحجر البراق الاملس يوجد في الجص .

Lachesis (S).

٢٤٩٨٥ - لِكَازَة

Lachésis (F). Lachesis (E).

جنس حيات سرلودة سامة من انبويات الارياخيد وفصيلة الافديات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى اغصها المناطق الاستوائية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . رؤوسها غليظة شبيهة ببروس ذوات الاجراس وتحتل مثلها بنقر واضحة بين العين والانوف . اعناقها دقيقة واذنابها كذلك . اذنبها تحمل من ١٠ الى ١٢ صف من الحراشف الشاذكة المنقعة كالكلاليب . اوثابها تختلف مع الانواع معظمها مرقط بالاصفر والاصفر والاشقر والاشهب || اشهر انواعها الكازة الصاعدة والكازة السانية .

٢٤٩٨٦ - لِكَازَة سِنائية * ، سنان الرُومع

Lachesis botrops (S).

Lachésis lancéolé, Fer de lance (F).

نوع من الكازة . موطنها جزر الفيليبين . تألف الغابات والمواقع الرطبة . يكثر وجودها في زراعات المصان والموز . قوتها القتران والجذران والصفاد والظاء والتانير الصغيرة والبطير || جسمها يطول نحو ٢٠٠ سم . ثوبها الى الصفرة النحاسية الموج . سمها ناعم . لدغها تقضي على الانسان باقل من ثلاث ساعات .

Lachesis mutus (S). ٢٤٩٨٧ - لِكَازَة صَامِيَة *

Lachésis muet (F).

نوع من الكازة . موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية . تألف الغابات الرطبة ولا تقترب من الاماكن الآكلة . قوتها كل ما استطاعت اليه من حيوان وطيور || جسمها يطول نحو ثلاثة امتار . ثوبها يراوح بين البرتقالي والاصفراني تملوه تزاويق سود ورقشة شهاب || سمها زافع . لدغها تقضي على الانسان باقل من ساعة .

Odynerus (S).

٢٤٩٨٨ - لِكَاع *

Odyneré (F). Odynerus (E).

الواحدة لكاعة . جنس حشرات قانصة وثابة ناعمة من الحمويات غشائيات الاجنحة المحصورة وفصيلة الغدغيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد ورحاتها كذلك . اوثابها ملونة يكثر فيها الاسود المجلع بالاصفر الالصاني او البرتقالي وبعضها جزوي مجلج بالاصفر الغهبي ونبها الاحمر القرميدي المجلع بالاصفر الكبريتي والاسود || تصفر في التربة والخيطان والاشجار النخرة وفي سلايات القصب . اصفاها رداء راحة غروطية المداخل المستطيلة || قوتها الاساريخ واللامعايش تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصفاها زادا لها ويريقاتها .

Rhaps (S). Rhaps (F). ٢٤٩٨٩ - لِكَاع * ، رَيْسُز

الواحدة لكاعة . جنس نباتات ثريين من فصيلة النخليات .

٢٤٩٧٣ - لَقُوْطَة حَوْرِيَّة الورق *

Leucothoe populifolia (S).

Leucothoë à feuilles de peuplier (F).

نوع من القوطة التريينية . ساقها فروع تملو من مترين الى اربعة امتار . اغناها عادة الخمل والزغب . اوراقها باشرة المروق على الصفحات السفلى ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها مستطيلة الماعليق ، متدلية ، لونها الى البياض الماعلي || توتورها يستمر من حزيران الى آب .



لَقِط

٢٤٩٧٤ - لَقُوْطَة سُنَّيَّة *

Leucothoe racemosa (S). Leucothoë à épis (F).

نوع من القوطة التريينية . ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها عابلة . يصفية النصل ، ذلقة الزام الاخير ، تطول نحو ٧ سم . وتعرض نحو ٣ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة القد ، يصفاء اللون || توتورها يستمر من ايار الى حزيران .

Leucothoe Lobbii (S). ٢٤٩٧٥ - لَقُوْطَة لُبِّي *

Leucothoë de Lobbi (F).

نوع من القوطة التريينية . ساقها تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها ابيدة ، جلدية النصل ، سننة الخمار ، تطول نحو ٧ سم . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الاذنكاز . ازهارها يصفاء اللون || توتورها يستمر طول شهر حزيران .



لِكَازَة سَانِيَة

Pompilidae (S).

٢٤٩٧٦ - لَقِيبَات *

Pompilidés (F). Pompilidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة . اجسامها وانواعها عديدة منتشرة في جميع الاسواق الحارة والمعتدلة . قوتها ما تقترسه من الحشرات والموام . تحفر مكاهي في التربة على اعماق يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تشعب عنها عدة سراديب تنتهي رداء مستطيلة سدسة الاضلع تقنع في كل ردة منها ٤ الى ٨ مكناث تنقف بعد ٩٦ ساعة . اشهر اجناسها القلق اطلبه .

٢٤٩٧٧ - لَقِيس * هو ما طال زين نمو . راجع قصب .



لَكَاع

٢٤٩٧٨ - لَقِط *

Dracunculus muscivorus, Helicodicerus muscivorus (S). Serpenteira attrape-mouches (F).

نبات عشبي اردوي بري وتريين من فصيلة القلقاسيات . ارونه عنقودية مقطعة . اوراقه برتلية مستطيلة الزناد ، وريقاتها وريّة التجميع نصلها ثنائي الصفحة المزركشة والمبقية بالاجر والاصفر . شراخه يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . شرعانه خلي الصفحة الداخلية جزوي اللون يتوسطه ضبة محجة تكسوها الياث شمرة الشكل .

٢٤٩٧٩ - لَقِيبَة ، لَقِيبَة (F).

Ophioglosse (F).

عشبة طيبة تعرف بلسان احية . اطلها .

٢٤٩٨٠ - لَقِيبَات

Ophioglossaceae (S). Ophioglossacées (F).

فصيلة من السرايس تشعل بعض الاجناس والانواع اشهرها القيققة ولسان الغزال .

٢٤٩٨١ - لَكَاع

Laque, Gomme-laque (F).

Lac, Gum-lac (E).

عصاره راتنجية صمغية صناعية تفرزها بعض الاجناس تلقائيا بعد حزها او بواسطة الحشرات .



لَكَاع

٢٤٩٩٧ - لُكْتُارِيُوسٌ حَرِيفٌ *

Lactarius acris, L. sanguifluus (S). Lactaire acré, L. à lait rouge (F).



لُكْتُارِيُوسٌ اشْحَق

من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الإحراج والغابات الظليلة في الصيف والخريف. عصارته حراء اللون حريفة المذاق. ساقه تملو من ٤ إلى ٥ سم. نكهته حنطية يعلوها توشيح طوي أحمر المالح. قطرها يراوح من ٥ إلى ٦ سم.

٢٤٩٩٨ - لُكْتُارِيُوسٌ سَامٌ *

Lactarius torminosus (S). Lactaire vénéneux, L. aux tranchées, L. à toison (F).

من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الإحراج والراعي. عصارته بيضاء اللون حريفة المذاق. نكهته أقية الصفحة المهدبة، طويقة التخديد، زياها اختار والحافة، لوها إلى الوردي يعلو موج أصفر وتوشيح عائب.



لُكْتُارِيُوسٌ رِقْطَالِي

٢٤٩٩٩ - لُكْتُارِيُوسٌ لَذِيذٌ *

Lactarius deliciosus (S). Lactaire délicieux (F).

من الفطور المأكولة الذيدة الطعم. يكثر في ظل الأشجار الصنوبر والسرور. عصارته حراء اللون سكرية المذاق. ساقه تملو من ٤ إلى ٧ سم. نكهته تبدو محمية ثم مسنوية أقية وتنتهي مقمرة. قطرها يراوح من ٥ إلى ١٥ سم. لوها إلى الحمرة البرتقالية تملوها رقة خضراء وأطواق عابطة.



لُكْتُارِيُوسٌ حَرِيفٌ

٢٥٠٠٠ - لُكْتُارٌ

Lactase (F).

هي الليتاز، اطلها.

٢٥٠٠١ - لُكْتُورُزٌ

Lactose (F).

هي اللبوز، اطلها.

٢٥٠٠٢ - لُكْتُوسٌ *

Lycet (S).

Lycet (F). Lycet (E).

جنس حشرات مؤذية من غديات الاجحة وفصلية الككتوسيات. أنواعه المروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم أقطار العالم || اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل، وحيدة اللون السوي || يرقاتها غاشبة لكنها لا تقرب من احشاش الفصيلة الصنوبرية || اعرف أنواعه واشهرها الككتوس الاسمر والخيطي والهند.



لُكْتُارِيُوسٌ سَامٌ

٢٥٠٠٣ - لُكْتُوسٌ أَسْمَرٌ *

Lycet brunneus, Xylotrogus brunneus (S). Lycet brun (F).

حشرة غاشبة من الككتوس. طولها نحو ٣ م. قوفا إلى السمرة الخيطية العابطة || يرقبها تنية اللون، سمراء الرأس، مستعطفة المقدم. تركيب الكتير من الاخشاب ومنها التينة فتتفرها وتطمها. وعندما تستكن من المرقسوس. فلها تفصله عن كل غذاء.



لُكْتُارِيُوسٌ لَذِيذٌ

٢٥٠٠٤ - لُكْتُوسٌ خِيطِيٌّ *

Lycet linearis (S). Lycet linéaire (F).

حشرة غاشبة من الككتوس. تألف الحراج والمنازل المسقوفة بالخشب. طولها نحو ٤ م. قوفا إلى السمرة الكستنية || لها جيل واحد في الحول. يرقبها مقوسة، مستعطفة المقدم، مستعدة المخزر، مالة القشار. سداسية الرواجب، تينية اللون، سوداء الرأس. تسردب مع خنافسها الشكير تحت اللحاء وتنشر الاعمدة والاخشاب المصنوعة لكنها لا تقرب احشاش الصنوبريات.

انواعه قليلة العدد اعطائها المناطق الحارة. جذوعها عند وجودها دقيقة مستقيمة كثيرة اللد ضمية التجميع تكسوها غشاوة من اللبب الاسمر. اوراقها مستديرة الشكل، خوصها جيل الخصار الزاهي، كرها مستطيل الجرم سرح الصفحة أو شالك الجوانب || واللكاء يعيش في اقلم الحفصيات حيث يزرع في المراكب في الحدائق الخاصة التي لا تخشى القر. يتكاثر بالفسل. اشهر انواعه التزيبية ما يلي.

٢٤٩٩٠ - لُكَاةٌ قَرْمَةٌ

Rhaphis humilis, R. sirotski (S). Rhaphis nain (F).

نوع من اللكاء. ساقها جذعة. تتكاثر بالفسل. تعيش في المراكب. اوراقها دقيقة الشكل. كرها منعطف الشكل الاسمر المتباعد الارتكاز.

٢٤٩٩١ - لُكَاةٌ مَرُوحِيَّةٌ

Rhaphis flabelliformis (S). Rhaphis en éventail (F).

نوع من اللكاء. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مروحية الشكل. خوصها جيل الخصار الزاهي. كرها قليل الشكل الحنطي المتباعد. تزرع في المراكب والحدائق. ترطب في الآتربة الدبالية الممتوشة الرطوبة.

٢٤٩٩٢ - لُكَاةٌ نَاشِطَةٌ

Rhaphis major (S).

Rhaphis major (F).

نوع من اللكاء. ساقها مستعدة تملو نحو ١٢٠ سم. اوراقها مستديرة. خوصها فسقي اللون. كرها سرح الصفحة. تزرع في المراكب والحدائق. ترطب في الآتربة الدبالية الخصبية.

٢٤٩٩٣ - لُكَاةٌ

« شويكة تحنط لها سوقية قدر شبر لينة كانه سير ولها فروع مملوءة شوكة وفي خلال الشوك وريقة لا بل بها تنقيش ثم يبقى الشوك فاذا جفت ابيضت » (اللسان).

٢٤٩٩٤ - لُكْتُارِيُوسٌ ، لَبَيَّةٌ

Lactarius (S).

Lactaire (F).

جنس فطور من الفانريقونيات انواعه عديدة منها المأكولة والجحالية جميعها دماعة اذا جرحت. عصارته لينة لزجة حلوة الطعم او حريفة المذاق. لوها يختلف باختلاف الأنواع، منها الابيض والاصفر والاحمر والاردم والبنفسجي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٤٩٩٥ - لُكْتُارِيُوسٌ اشْحَقٌ *

Lactarius rufus (S). Lactaire roux (F).

من الفطور المؤذية يكثر في الصيف والخريف يعيش في ظل الصنوبر والسرور. عصارته بيضاء اللون حريفة. ساقه تملو من ٦ إلى ٨ سم. نكهته أقية صفحة الملوية قطرها يراوح من ٦ إلى ٩ سم. لوها إلى الشفحة.

٢٤٩٩٦ - لُكْتُارِيُوسٌ بُرْنَقَالِيٌّ *

Lactarius volemus, L. lactifluus (S). Lactaire orangé, L. à lait abondant (F).

من الفطور المأكولة الذيدة الطعم. عصارته كالحليب لوها ولزوجة وتديفقا. ساقه تملو من ٦ إلى ٨ سم. نكهته تبو قفلسوية في أول هدهدا ثم أقية وتنتهي مقمرة بتوسطها تملو غليظ. قطرها يراوح من ٨ إلى ٢٠ سم. لوها يستمر على الصفرة البرتقالية حتى التغير فينحرف إلى ذلك إلى الجوزي وهو يوجد في الغابات الظليلة الرطبة من تموز إلى آب.

غبار اللون يملؤها موج ذهبي، قطرها نحو ٤ سم. اطراسها متعائلة الكفاف بنفسجية اللون || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١١ - لِكُعَّةٌ شَحِيحَةٌ *
Laccaria laccata (S).
Laccalre laqué (F).

نوع من اللكة. توجد في المواقع الرطبة. ساقها رفيعة، شعراء اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل، قطرها نحو ٤ سم. لوحتها الى الشقعة الغداء الالامعة. اطراسها بلون الساق || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١٢ - لِكُو بَلَسْتِيد
Leucoplaste (F).
Leucoplast (E).

هي البوصية المادمة اللون اي مواد الحلية المادمة اللون.

٢٥٠١٣ - لِكَيَات
Phytolaccaceae (S).
Phytolaccées (F) Phytolaccaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها ١٧ وانوعها ٢٠. اعطائها المناطق الاستوائية والحارة. معظم انواعها اشجار ونباتات وبعضها جنبات ليفة السوق واعشاب وحولية وعمرة. اوراقها بسيطة. ازهارها خشوية او ثنائية المسكن. لا قياسية التجميع والارتكاز. ثمارها عنبية يتسخر منها صباغات ارجوانية. عصاره جلدها حلابة دقة لكية صناعية.

٢٥٠١٤ - لِكِيَّة *
Phytolacca (S).
Phytolaque (F). Dyer's grapes, Poke (E). Gewöhnliche kermesbeere (D). Fitolacca, Amaranto (I).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الكليات. انواعها قليلة منها الاشجار والجنبات والاعشاب. اوراقها كاملة متعاقبة يضيئة النصل او اهليجية. ازهارها عقنودي التجميع صغيرة القند، ملونة. ثمارها نورية غزيرة العصاره الحمراء تستعمل في صباغ الحمر. جلدها طيبة || اشهر اوجوهها ما يتبع.

٢٥٠١٥ - لِكِيَّة ثُنَائِيَّة الْمَسْكَن

Phytolacca dioica (S). Phytolaque dioïque, Belombr (F).
نوع من اللكية الشائعة. شجرتها تملو من ٦ الى ١٥ م. ساقها فراء فناء، فلسوية القنة وارقة الظل. اوراقها يضيئة زلقة طولها ١٢ سم. وتعرض نحو ٧ سم. نصلها اخضر الصفحة الجامدة ينفض في كانون. ازهارها ثنائية المسكن، مستطيلة المتناقد الاكبرية والاثناوية || تنويرها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٥٠١٦ - لِكِيَّة عَشَارِيَّة الْأَسْدِيَّة

Phytolacca decandra (S). Phytolaque à 10 étamines (F).
نوع من اللكية الزيبية. ساقها متعينة فراء تملو من ١٠٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها اهليجية سائبة، نصلها يطول من ١٠ الى ٤٠ سم. ويعرض من ٣ الى ١٠ سم. وهو يحمل النسيج احمر الصفحة: ازهارها عقنودي التجميع مستطيل الشكل. ازهارها عشارية الاسدية تبدو يبيضاء اللون ثم تتحول الى الارجواني. ثمارها بنفسجية عشارية الاضلع || تنويرها يستمر من حزيران الى اواسط الخريف.

٢٥٠١٧ - لِكَيْس *
Donovania (S). Lachésis (F).
جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات معديبات الارجل وفصيلة المريقبات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة

٢٥٠٠٥ - لِكْتُوسٌ مُخَدَّدٌ *

Lycetus unipunctatus (S). Lycte canaliculé (F).
حشرة غاشية من اللكتوس. طولها نحو ٤ م. ثوبها الى الشبهة الحطية السمراء الموج، تعبق في الرأس والكتويل وتزهر في غمدتها المزدنين || يرقبها غبار اللون، جزوية الرأس. غليظة الصدر، مستدقة المؤخر. تركيب معظم الاغشاب الصلبة ومنها المصنوعة، باستثناء الصنوبريات.

٢٥٠٠٦ - لِكْتُوسِيَّات *
Lycetidae (S).
Lycetids (F). Lycetidae, True powder-post beetles (E). Splintkäfer, Holzmehlkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غفديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطائها جميع مناطق بلاد الشام || حشراتا صغيرة القند، مستطيلة الشكل، ضيقة الانحدار الحطية، صقية الزباني، خاسية الفصم الرسنية || يرقابها غاشية تنخر وتوردب جميع انواع الاغشاب اخصها الصلبة.

٢٥٠٠٧ - لِكْتُوسٌ مُسْتَطِيل *، قُتْعَب

Lixus elongatus (S).
مُسْتَطِيل
Lixe elongé (F). Lixus elongatus (E).

حشرة خاضلة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف زراعات الثوبدر والمواقع التي يكثر فيها السرق. خنافسها تعيش على ما تقتضيه ومتحصنة من عصاره نصل الارراق. يرقابها تلخج الاسناخ وتسدنها فتعطيها الى جسمها متوسط القند يطول من ١٠ الى ١٥ م. ثوبها الى اللكية السمراء يملؤها طيسل جزوي. رأسها صغير الجرم ينهني بمك قافض ثاقب راشق. عينها صغيرتان. زبابها مرفعتي صولجانان ظهرها مستطيل الشكل، مستدير المؤخر الاصح. غداها متناهتا التحزير الدقيق القاطب. ارساقها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى اكبر قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واطول سرماً ومكاً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع. تسرح في البهار. تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وترز المكن ميحادياً في اسناخ الثوبدر وفي سوق السرق || والبرقة عند بلوغها الكمال تطول من ١٤ الى ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستدق المؤخر، عادم الراجوب، مبهر الحلب، حطلي اللون، اسمر الرأس والشرج واللدب || طور الالكامل الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينفضي في التربة قرب النبات العائل.

٢٥٠٠٨ - لِكْع
Piquer (F). To prick (E).
لكع ولدغ ولسب ولسع ونخس ونس.

٢٥٠٠٩ - لِكُعَّة *
Laccaria (S).
Laccaire (F). Laccaria (E).
جنس فطور من فصيلة الفاريقوتيات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بعض غابات وحراج مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها مأكولة لذينة العلم، مستحبة المذاق.

٢٥٠١٠ - لِكُعَّة بَنَفْسَجِيَّة *
Laccaria amethystina (S). Laccalre améthyste (F).
نوع من اللكة توجد في حراج السديان. ساقها رفيعة، عوياء، ليلكية اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل،



لكتوس مخدّد



لكتوس مستطيل



لكمة بنفسجية



لكمة شقحة



لكية



لكيس

25023 - لَمَاجِيَة تَامِيَة *
Clubiona erratica (S).
Clubione erratique (F). Erratic clubiona (E).

دودية من العناكب الساعية القاصصة ثنائية الروايا ، سداسية المشاقق تنتمي الى فصيلة الهاجيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها صغير القد بطول نحو ٨ م. عند التكب ونحو ١٢ م. عند التكب . صندراسها مستطيلة الشكل ، اسمر اللون ، احمر المواج . عينها زيمثيان . شيفسها ضليمان . فكها دقيقان . جزامها مستطيلة ، نحيلة ، كثيفة الحب . بطنها اسمر اللون ، احمر المواج ، عابك التزيم || تألف البراري والمواقع الدغلة . تسرح في النهار . مخدعها سمنة بتدقية الشكل والقد تنسجها حيث تبني لانها جولة لا تستقر في مكان معين || قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان . بيئاتها الشتوي يستمر من ١٨ الى ٢٠ اسبوعا تقريبا في مكعبة جوزية الشكل ، غبراء اللون ، جامدة الحليك تنسجها تحت الهجارة وفي كل مكان امين || ملجئها الحياتي لا يختلف عن ملجئ سائر العناكب || تعتبر من الدوبيات النافعة .



نم

25024 - لَمَاجِيَة رِيْبِيَة *

Clubiona nutrix, Chiracanthium puncturium (S).
Clubione nourrice (F). Nutrix clubiona (E).

نوع من العناكب الساعية القاصصة ثنائية الروايا ، سداسية المشاقق تنتمي الى فصيلة الهاجيات . موطنها المناطق الحارة من حوض البحر الابيض المتوسط || جسمها متوسط القد بطول نحو ٢٠ م. عند التكب ونحو ٢٤ م. عند التكب . صندراسها اثوبي الشكل ، اسمر اللون احمر المواج . عينها زيمثيان . شيفسها نسيط القفاك الدرية . فكها ضليمان . جزامها مستطيلة مهدبة . بطنها وفي الشكل ، حطلي اللون ، جؤوي المواج تملوه ريشة سوداء || تألف الادغال والسياجات حيث تكثر النباتات الشائكة . تسرح في النهار . قوتها الحشرات واساريعها || بيئاتها الشتوي يستمر من ١٨ الى ٢٠ اسبوعا . مأواها مكعبة صليجية الشكل لا تخنوقة الوسط ، وميتة الحليك ، مدخلها من الجهة السفلى || تعيش نحو ثلاث سنوات . الانثى تموت بعد تقف المكان وحضن الصغار ، اما الذكر فيبعد الكوم اذ تقضي عليه الانثى || نشتها مؤيلة . سمها شديد الفاعلية يؤذي الانسان .



لَمَاجِيَة تَامِيَة

25025 - لَمَاجِيَة مُزَكَّشَة *

Clubiona compta (S). Clubione parée (F).

نوع من الهاجة الساعية القاصصة . موطنها بعض المناطق الحارة من العالم القديم || جسمها صغير القد بطول نحو ٥ م. عند الذكر ونحو ٨ م. عند الانثى . صندراسها مستطيل الشكل ، اسمر اللون ، اخضر المواج . عينها زيمثيان . شيفسها مجهزان بمقاف محجة نحو الداخل . فكها صغيران . جزامها نحيلة مستطيلة ، كثيفة الحب . بطنها اهليلجي الشكل ، اسمر اللون . احمر الزراكش . ينتهي برزالتين صغيرتين || تألف المروج والمراعي والرياض تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة . مخدعها مكعبة بلاطية الشكل ، حريرية الثواس ، يضاء اللون ، تحببها تحت قشور الاجار || تعتبر من الدوبيات النافعة .



لَمَاجِيَة مُزَكَّشَة

25026 - لَمَاجِيَات *

Clubionidae (S).
Clubionidés (F). Clubionidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الريتلوات . اجناسها وانواعها

الديدان ، اصطناعا بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداؤها غزوطية محزنة يملؤها تخنيد قاطب وتحزيم مترص مبتدئ من الفروا الى القف . قوتها اهليلجية الانفراج ، جالسة الاريفة العادمة التفضين .

25018 - لَم *
Uria (S). Lumme, Guillemot (F).
Guillemot (E).

جنس طير من عارة اللميات وفصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطاهها المناطق الباردة القطبية ، تزوج عنها في فصل الشتاء والجلد الى المناطق المعتدلة الحرارة . ملجئها الحياتي جامعي اليق . جاعاتها اسراب لا يحصي لها عدد . قوتها الاسماك والقشريات والدعايمص || اجناسها كبيرة مناقبها مستطيلة جالسة مذبذبة الاطراف المفروسة . مناقشها كاسية ، ضيقة ، نافذة من جانب الى جانب . اجنتها معتدلة الحجم ، ذلقة ، اذناها قصيرة ، مستديرة الاطراف الضيقة . ارساغها قصيرة ، سرديّة التشبيك . احطيتها تحيط بكامل الاسباع || وكناتها تقر في الواهز القضاة المشرفة على البحر . الاناث تحضن بمناوبة الذكر . بيضاء اجسامي الشكل والحجم بطول من ٨ الى ١٠ سم . الحضة بيضة واحدة والترقيم يستمر من ٣٠ الى ٣٥ يوما .

25019 - لَم اذَجَل

Uria troile (S).
Lumme à capuchon, Guillemot à capuchon (F).
Common foolish, Common guillemot (E).

نوع من اللم موطنه يمتد من التاروج الى جزر القطب . يتزوج في الشتاء الى بعض المناطق المعتدلة الحرارة اغصها الجزر البريطانية والشطوط الفرنسية والاسبانية والايطالية في المتوسط || جسمه بطول نحو ٤٢ سم . ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر والبطن والركبي . منقاده الى الرعدة السوداء المواج . حذقة عينه الى الشقعة السمر . رساه الى السرة الخنطية .

25020 - لَم اَعْتَس

Uria grylle (S).
Lumme grylle, Guillemot grylle (F).
Black-throated diver (E).

نوع من اللم . موطنه بعض المناطق القطبية . يتزوج في الشتاء نحو مجادح البليتيك . جسمه بطول نحو ٥٠ سم . ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر ، ابيض البطن ويعلمو في مناكب الجناح والاباهر والكلل تجنيد معترض ابيض . حذقة عينه حنطية اللون . منقاده اسود . رساه الى الدهمة .

25021 - لَم عُرْتَنْدَة

Uria Mandell (S).
Lumme de Mandt, Guillemot de Mandt. (F).
Bridled Guillemot (E).

نوع من اللم . موطنه لواهر غرلندة ومجادهها . يتزوج في الشتاء نحو جنوب كندا . جسمه بطول نحو ٤٥ سم . ثوبه الى البياض الناصع تملوه في الظهر ريشة جؤوية ويعلمو في الرأس تيشيق اسود احمر المواج وعطان جؤويان امين وايسر يمتدان من الشدق الى الظهر . حذقة عينه عنابية اللون . منقاده ادهس ورساه كذلك .

25022 - لَمِيَا

Raja limma (S).
سمكة من شفتين البحر اعطاهها جنوب المتوسط تكثر في المناطق الرملية القاع .

٢٥٠٣٧ - لَمُفَا ، لَمُفَا ، لَمُفَا

Lympe (F). Lymph (E).

اخلاط صفراء اللون او عادية تنقلت مصحوبة بالكريات البيض في الاوعية اللمفاوية .

٢٥٠٣٨ - لَمُكْسِيلِيَّات

Lymexyliidae (S). Lymexyliidae (E).

فصيلة حشرات غاشية من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل تتميز بقلة صلابة القشور وباستعراض الرأس وبكبر العين الجاحظة وباستطالة الزنابق المركبة من ١١ فصلة . اغمداء قصيرة لا تلحف كامل البطن . ارباغها خماسية التركيب || يرقاتها تعيش على الاثمار اليابسة او السائرة نحو الياس وعلى الاغصان المصنوعة || اشهر اجناسها الكمكيل .

٢٥٠٣٩ - لَمُنَارِيَّات

Laminariaceae (S). Laminariaceae (E).

فصيلة نباتات بحرية من الخفيات السفى .

٢٥٠٤٠ - لَمُنَارِيَّة

Laminaria (S). Laminaria (F). Laminaria (E).
جنس نباتات غشية من فصيلة المناريات تعيش على الصخور البحرية المغمورة بالماء . اوراقها قدية محززة تطول عدة امتار ، فصلها اصفر اللون اسمر المخرج منها انوار مأكولة واخرى علفية وصناعية يستخرج منها اليود والصودا . جميعها سحادة تغيد التربة والنبات .

٢٥٠٤١ - لَمُنَارِيَّة سُكْرِيَّة

Laminaria saccharina (S). Laminaria saccharina, Baudrier (F). Devil's-apron, Sweet-tangle (E). Zuckerrintang, Zuckertang (D). Cinture di Nettuno (I).
نوع من المنارية المأكولة والعلفية . اوراقها سكرية الطعم تأكلها شعوب البلاد الشالية .

٢٥٠٤٢ - لِمْنَة

Limnaea (S). Limnée (F). Limnaea (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات ممديات الاجرل وفصيلة المنيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم ومنها انواع تعيش في المياه العذبة كالبحيرات والمناقع || اصداؤها غشورية المادة ، شبه غدرورية الشكل ، محلزنة ، مدببة الاقواق ، شدها اللولب . اجسامها مستطيلة . لولبية ، مستعرضة الرؤوس ، مبطلة اللواس السنانة الشكل . عينها قاعدية الارتكاز . ارجلها فردية ، مبططة ، مستديرة الطرف الامامي ، مستدقة الخلفي .

٢٥٠٤٣ - لِمُنُورِيَّة

Limnoria (S). Limnoria (F). Limnoria (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا مساويات الاجرل وفصيلة الدوبيريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، مبططة ، بيضية الشوزن ، نحيلة القوائم المعتدلة الطول || اعرف انواعها واشهرها المنورية ثاقبة الخشب مشهورة بالاضرار التي توفها في اغصان الاسداد واحواض السفن غير المعالجة ضد هذه الافات .

عديدة تناهز المئة ، منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها مقترسة ، صغيرة القد ، ثنائية الروايا ، سداسية المشانق ، شياضها مجهزة بمخاف محججة نحو الداخل || اثارها تراوح بين الصلبة والشققة . تعيش في عكادب بلولوية الشكل ، حريرية النواص ، بيضاء اللون ، تحبها تحت قشور الاشجار او تحت الحجارة وبينها || اشهر اجناسها الياج والكفاسة .

٢٥٠٣٧ - لَمُاس

Tactile

صفة التي الذي يتحسس باللمس .

٢٥٠٣٨ - لَمُاسَات

Palpigrades (F). Palpigrades (E).

فئة من المنكوبيات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، جميعها كهام ، عادمة الجهاز التنفسي ، تطول نحو ١ سم . اجسامها تنتهي بهيئة دقيقة ، قصيرة || تعيش تحت الحجارة وفي المغاور الرطبة .

٢٥٠٣٩ - لَمُاعَة

Lemna (S). Lemna (E).

هي المقاب الذهبية ، اطلمها . عرض تمهدي لآليات قضية .

٢٥٠٣٩ - لَمُام

Lambertia (S). Lambertia (F).

نبات مقنود التعريف على اسم العالم الانكليزي ا.ب. لمبرت (١٧٦١ - ١٨٤٢) وهو جنبة معمرة برية وتريينية من فصيلة القضايات مهدا استرالية . ساقها قرعاء تملو نحو ١٢٠ سم . اوراقها سنانية تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٥ سم . فصلها ملتد الحافية ، شالك المقصصة لامع الصفحة العليا خلي السفل . ازهارها مقنودية التجميع صغيرة القد ارجوانية اللون . ثمارها جرابية الشكل مسلمة بقرنين مستطيلين . تنوره يشمر من ثمرات آآب .

٢٥٠٣٣ - لَمُبرُوش

Lampides boeticus (S).

فراشة من فصيلة اللقنات . اعطائها فصيلة الاجراء تشمل البلاد الاسيوية والافريقية . جسمها اطول اللون ازرق المواج . ذكرها يطول نحو ٣٤ سم . رواشه الى الزرق البنفسجية يعلمها تمشيح سنق عايق وبطونها اطار اسمر || انتاهها تطول نحو ٣٨ سم . رواشه زرق الانتشاب حنطية اللون يعلمها تمشيح اغبر || يرقاتها تركب سف نباتات الفصيلة القرنية وتقرض البور قبل ادراكها .

٢٥٠٣٥ - لَمُة

مجموعة افراد نباتية من صرم واحد تميزت بصفات خاصة ثابتة . والمة لا تأتي الا عن طريق التعقيل والتفصيل . واذا تكاثرت بالبرر فقدت صفاتها المميزت ولم تعد لمة .

٢٥٠٣٦ - لِمُدُور

Limodorum (S). Limodore (F).

جنس نباتات عطفلية من السحلبات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متركبة حرشية الشكل وغلدة ، زرقاء النصل . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها عشيرة بنفسجية اللون || منبتها الادوية والمواقع الظليلة الرطبة .



لميد السنف



لمنارية سكرية



لنة

الشاة. تتميز برؤوسها الجزلة وبقدورها الامامية الشديدة للنشط المجهزة اما الخلف كما في السرعوة او القفص كما في القرب بواسطة اطرافها المثلثية الشكل || جمع اجناسها غائلة تعيش من قنصها . اشهرها البعده .

٢٥٥٥ - لَيْبِيَّة * Gnathopode (F).

Gnathopodite (E).
زائدة متكبة او عضوية تكون عند بعض القشريات .

٢٥٥٦ - لَيْبِيَّة * Limulus (S).

Limule (F). Limulus (E).
جنس حيوانات بحرية من المفصليات وفصيلة العنكبوتيات . انواعها قليلة العدد منتشرة في بعض بجانر البلاد الحارة || اجسامها شبه مستديرة الشكل ، ملحومة الظهر يدورع مجنئة وتعمل في مؤخراتها مراد مستطيلة حادة الاطراف . واجسامها هذه تتكون من جزئين ، جزء امامي ملحوف يحجب نصف دائري يغطي الصدر والعيون والدوائر وستة ازواج من القواس التي تحرق اللحم . زواياها الصدرية تستعمل كجهاز للانتقال والرك . اما الجزء الثاني ففلاحة شبه محرم الشكل ينتهي بمردود حاد الطرف . وهو عند قاعدته يلف خنجر ازواج من الجرايز المعدلة للسياحة || بعض انواعها مأكول . احصها ليمطة اندونيسية وهناك نوع آخر كبير القد يطول نحو ٢٠٠ سم . يكثر وجوده في بجانر شمال الولايات المتحدة .



ليمزة



ليمدة

٢٥٥٢ - لَيْبِيَّة أُلْدُونِيْسِيَّة * Limulus moluccanus (S).

Limule des Moluques (F).
نوع من الليمطة يكثر وجودها في مياه اندونيسية . جسمها كبير القد ، يطول من ٩٠ الى ١١٠ سم . بما فيه المردود || لحمها مأكول ، مرغوب فيه .

٢٥٥٣ - لَيْبِيَّات * Limulidae (S).

Limulidés (F). Limulidae (E).
فصيلة من المفصليات الشبيهة بالمرسوتيات . اجناسها وانواعها الغائرة كانت عديدة وقد انقرضت ولم يبق منها سوى بعض الانواع تنتمي الى جنس واحد يدعى ليمطة .

٢٥٥٤ - لَيْمِين * Lemmus (S).

Lemming (F).
جنس حيوانات ليلية قاضية من الكبريات وفصيلة القاريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد وطولها البلاد الباردة تجوزها من الجنوب الى الشمال || اجسامها ربعة ، طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم . واذنانها من ٢ الى ٣ سم . مقاضها مطقوة . اذنانها صغيرة . جرايزها خامة الاسايغ . اظفارها حادة جاسة . اذواها الى الفردة الصفراء يعطوها تبيج اسمر . يطونها الى الصفار الرلي . جرايزها واذنانها صفر || قوتها الاخشاب والجذور والحزاز .

٢٥٥٥ - لَنْبَارِيَّة Lanaria (S).

Lanarie (F). Lanaria (E). Lanarie (D). Lanaria (I).
جنس نباتات عشبية جسمية مدادة معمرة من فصيلة الربرجيات . انواعها قليلة منها افرقية الجنوبية . تزرع للتربين .

٢٥٥٦ - لَنْجُور Semnophthèque (F).

نوع من القردود المقسة يدعى هبار ، اطلبه .

٢٥٥٧ - لَنْجِيْطُس Lonchitis (F).

هو المنسم ، من النباتات الطبية والثرينية .



لمين

٢٥٥٤ - لَيْبِيَّات * Limnidae (S).

Limnidae (F). Limnidae (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل ورتبة الرخويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بجانر وبحيرات العالم . قوتها البوت المائية والفرع || اصداها لاحقة ، شبه غذروفية الشكل . ملحونة الاطراف ، سدفا الوب || اعرف اجناسها واشهرها السنة والياقم والدوب والانصبل .

٢٥٥٥ - لَيْمُونَة * Lemonia (S).

Lemonia (F). Lemonia (E).
جنس حشرات من فصيلة المويئات ورتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة ٢٠ بعضها يألف الاقاليم الباردة والبعض الآخر يعيش في المناطق المعتدلة الحارة والحارة || اجسامها كبيرة ، عضلية ، يفرها الخمل . بسطها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها مزوانية الشكل . عيونها صغيرة ، بارزة . اخطامها وملاسها قصيرة . قرونها الاستشعارية مشطية . اجنحتها كبيرة ، ملونة ، مجذعة وتنقطع . اذواها قليلة الزخرفة || اسارها مثاقط يملؤها حلب دقيق . تألف البراري جميعها خاضعة تعيش على معظم نباتات فصيلة المركبات واعصها الخندب .

٢٥٥٦ - لَيْمُونِيَّات * Lemoniidae (S).

Lemoniidae (F). Lemoniidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، معظمها شبيهة الاطمان وبعضها يألف المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها كبيرة ، عضلية ، يغلها خمل مستطيل . بسطها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة . اخطامها شديدة القص . ملاسها صغيرة . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة . اجنحتها كبيرة عادمة الزخرف . اذواها زخرف || اسارها مثاقط القشار يعطوها بعض الحلب || اشهر اجناسها اللونة .

٢٥٥٧ - لَيْبِيَّات * Uriens (F).

عارة طير من فصيلة البيرقيات . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها من طيور المناطق القطبية والباردة || تتميز باجسامها الكبيرة ، بريشها البلس ، بارساها السردية ، ويحتويها الماسة الاكلا ، المعتدلة الاحدياب ، القليلة الانضغاط والارتفاع || اما اجناسها فهي الم والمرغول والرخيلان .

٢٥٥٨ - لَيْبِيَّة * Phymata (S).

Phymate (F). Phymate (E).
جنس حشرات قاضية من فصيلة اليميدات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٦ الى ١٠ سم . اشكالها مستغربة لامألوة . رؤوسها جزلة شاذكة . اخطامها قصيرة شديدة النشط . قوتها الامامية مجنزة للخلف || اذواها مبيانية الاوان تكثر فيها الشقة والسرة || جمع انواعها ناعمة لانها تنقي على الحشرات الصارة .

٢٥٥٩ - لَيْبِيَّة يَات * Phymatidae (S).

Phymatidés (F). Phymatidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطيفة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة البد معظمها من علم المناطق الحارة || اجسامها صغيرة غريبة الاشكال

Lennoa

٢٥٠٦٣ - لَنُوَا ٥

جنس نباتات عشبية طفيلية من فصيلة النويات . أنواعها المروقة ثلاثة منبتها بلاد المكسيك .

Lennoaceae (S).

٢٥٠٦٤ - لَنُوَات ٥

Lennoaceae (F). Lennoaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة العقالات . اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد . يعثر وجودها في بعض مناطق المكسيك || جميع نباتاتها عشبية طفيلية . اوراقها سهقية . ازهارها صغيرة ، سننية الارتفاع || اشهر اجناسها اللنو .

٢٥٠٦٥ - لَنِيُود ٥

جنس حشرات خاضعة من عذبات الاجنحة وفصيلة السويات . انواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . يعثر وجودها على المران والبيكس والبام ، خاصة في زمن الازهار || اجسامها صغيرة ، شبه بيضبة الشوزن ، تطول من ٤ الى ٦ سم . اثوابها الى الشقعة السفعاء بعولها ، في بعض الانواع ، تبيض اسود مغناويت الرخابة يكتنف الامداد .

٢٥٠٦٦ - لَنِيُون ٥

جنس طير من الجوامح غروريات المناوير وفصيلة التنغريات لانفون (F). Lanlon (E). انواعها المروقة خسة موطنها المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية . تألف الاجراج . ملجئها الحياتي جماعي باستثناء زمن التماسد والحضانة والتعليل ، جماعتها قليلة العدد . قوتها الحشرات والبلود والثار النباتية البرية والزراعية || اجسامها ردية تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها معتدلة القد . سنانقيدها غرورية . اجنتيسا مستطيلة ، ذلقة . اذنانها مقعرة شبه مفروقة . اثوابها تختلف مع الانواع فيها الاسفر والاحمر والاداس والخضر الانس ، جميعها مبلقة او مبيضة بالاداس || تدين اعشاشها في الادغال القريبة من سطح الارض . الاناث تحضن سعدا من ٥ الى ٧ بيضات بينا الذكور توتن لها الحماية والغذاء .

٢٥٠٦٧ - لَهَاسَة ، لِسَان المِزْمَك ٥

Epiglottis (F). Epiglottis (E). الهامة او لسان المزمار سقاط لبني - غسروني يقع في الجزء العلوي من الحنجرة .

٢٥٠٦٨ - لَهَاسَة الجرود ٥

Xanthorhoe montanata (S). Xanthorhoe des montagnes (S). Xanthorhoe montanata (E).

فراشة من فصيلة الارليات ورنية حرشيات الاجنحة . موطنها بعض جبال حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية الناحية . قوتها رحيق الازهار . سرتها خاضعة تعيش على اوراق النبات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ سم . بسطها نحو ٣٧ سم . رأسها حنطي اللون . عينها صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، عظيمات عند الانثى . جوشها وبطنها الى الخيطي الاشعث المواج || رواشها عند الشقن الى الخيطي الاكثف بعولها في الزوج الامامي تمسح ابيض واغبر وبقعة وسطى شديدة السمرة تنتهي بشفيتين تتوسطها نقطة سمراء . ويملوا في الزوج الخلفي تمسح اسمر وعطان من الزراكش . اهدابها الى الشقعة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في

Landolphia (S).

Landolphia, Vahé (F). African rubber tree (E). Kantschuklane (D). Landolphia (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البفلديات . منبتها افريقية الجبوية ومذغسك . سوقها جالسة ، سالمة سمراء اللون . اوراقها متعاقبة ، نصلها لامع الصفحة الجامدة . ازهارها تاجية || يستخرج من جلونها بالخر عصارة مطاطة صناعية تستعمل استعمال المطاط .

Lenzites

٢٥٠٥٩ - لَنَزِيْت ٥

فطر من السيات يركب الاشخاب المقطوعة من فصيلة الصنوبريات . مظهره الخارجي فطر صغبر القد لونه الى الالوة ، نكتته ملفطة ، قطرها نحو ٣ سم . سطحها الاصل مستدير التخديد ، تملو اخاديد حراشف ورير هيفية متناسبة البعد شبهاء اللون . لبابه قليل السابة ، فني التركيب ، حنطي اللون . بوفياته اسطوانية الشكل قياها نحو ٣٨ ميكرون || مشبيجه يترى الاشخاب المقطوعة فيسب عنها وانحلاها يد ان ينطقها بوشاح كندف القطن لونه الى الصفرة البرتقالية ثم ينحرف الى الحنطي || يكتاف بحرق الاشخاب المصابة ويتطير السلطة بأحد المركبات الفعالة كالفيتول والكرولين .

٢٥٠٦٠ - لَنَسَان ٥

Linsang (S). Linsang (F). Linsang (E). جنس حيوانات لاجمة مفترسة من فصيلة الزباديات . انواعها المروقة ثلاثة موطنها الهنـد الصينية وجزر الزايـج . تألف القنايات والرياض . ملجئها الحياتي فري الذكر يكوم عدة اناث والاثني تخاطط عدة ذكور || اجسامها مستطيلة الشكل هيفاء تطول من ٦٥ الى ٨٥ سم . بما فيه الذنب . رؤوسها صغيرة ، شبه غرورية الشكل . آذانها صغيرة ، كاسية . عينها ماسحة ، حادة البصر . اذنانها مستطيلة ، سداسية او ثمانية الاطواق ، بالنسبة الى النوع . فراؤها قصيرة الوبر اللد الناعم . اثوابها مبيضة ، مرقشة وبدرة || اناثها ثنائية الاثداء والجرأ ، تضع على مرئين في الحول . المرة الاولى في اواخر شباط والثانية في اواسط آب || سرعها دجوي . قوتها الطير والحيوان الصغير || اما انواعها الثلاثة فهي :

Linsang pardicolor (S).

Linsang pardicolore (F).

Linsang gracilis (S).

Linsang gracieux (E).

Linsang maculose (S).

Linsang maculé (F).

٢٥٠٦١ - لَنَصُون ٥

Ammodytes lanceolatus (S). Lancon (F). سمكة بحرية من فصيلة الرماليات . اعطائها معطر شطوط بحار البلاد المعتدلة الحارة || جسمها شبه اسطواني الشكل قليل التبسيط يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . رأسها صغير الجسم مستطيل الخط . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية قاطبة يتقدمها منخس حاد . زعنفتها الشرجية تمتد من اواسط البطن الى الذيل . زعنفتها الذيلية فارقة ، ثوبها الى الرعدة الفضية يسمر ويميق في النصف العلوي || لحمها جيد الصنف مرقوب فيه .

٢٥٠٦٢ - لَنُف ٥

لنف ، هي اللغا ، اهلها .



لندلفيه



لنسان



لنسون



لنيدود



لنيدون

٢٥٠٧٨ - **لَهَيْبَةُ لَاطِئَة** (S). *Uvularia sessilifolia* (S).
Uvulaire à feuilles sessiles (F).
 نوع من الالهوية تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها لاطئة اهلجالية
 نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم. صفته السفل الى الخصار
 الازرق الملاج. ازهارها تولمية الانتشاب صغيرة القد
 تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. لونها الى الصفرة الباحة .
 ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .



لهوة

٢٥٠٧٩ - **لَهَيْبَةُ مَشْقُوبَة** (S). *Uvularia perfoliata* (S).
Uvulaire perfoliée (F).
 نوع من الالهوية تملو من ١٥ الى ٥٠ سم. اوراقها مشقوبة
 تحترقها السوق وهي متعاقبة سنانية الشكل، نصلها يطول
 من ٤ الى ٨ سم. وهو مائل الصفحة، اخضر العليا،
 باعت السفل. ازهارها تطول من ٢ الى ٣ سم. يتلاتها
 مدنية الاطراف لونها الى الصفرة الجلييلة || ازهارها
 يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٠٨٠ - **لَهَيْبَةُ مُهْدَبَة** (S). *Uvularia puberula* (S).
Uvulaire à feuilles ciliées (F).
 نوع من الالهوية السروية تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها
 متعاقبة سنانية. نصلها جامد سنانية الشكل، اخضر اللون،
 مهب الخالقة. يطول نحو ٥ سم. ازهارها مقطوعة البتلات
 تطول نحو ٢٥ سم. لونها الى الصفرة الكبرى || ازهارها
 يستمر من ايار الى حزيران .



لهوية

٢٥٠٨١ - **لَهَيْبَة ، حُمْرَاء** (S). *Ruticilla, Phoenicurus* (S). *Rouge-queue* (F). *Redstart* (E).
 جنس طير من فصيلة الشجوريات. انواعه كثيرة العدد
 اعطاه العالم القديم تكثر في البلاد الاسيوية || جميعها
 صغيرة القد، رشيقة القوام، قصيرة المتقار، مستطيلة
 الجناح، رقيقة الرنح، رطلة الريش، جميلة اللون.
 اوتاب اناتها اقل زركشة وزهده من اوتاب ذكورها.
 قوتها الحشرات على اختلاف انواعها. تنش في شجوايف
 الصخور وتجاوليف الاشجار || اشهر انواعه ما يلي .



لهيب اسود الرأس

٢٥٠٨٢ - **لَهَيْبِ اسْوَد الرّاس** *
Ruticilla tithys, Phoenicurus ochurus (S). *Rouge-queue tithys, Rouge-queue noir* (F). *Black redstart* (E).
 طائر من اللهيب طوله نحو ١٦ سم. ثوبه ثوب اللهيب
 الاسود الزور باستثناء الرأس الذي يمه السود والاواهر
 المبقعة بالابيض. تغريده شبي الاخوان. حصفته تراوح
 من ٥ الى ٦ بيضات تقوم بها الانثى دون الذكر.

٢٥٠٨٣ - **لَهَيْبِ اسْوَد الزَّوَر** *
Ruticilla phoenicurus, Phoenicurus phoenicurus (S). *Rouge-queue à gorge noire, Rouge-queue à front blanc, Rouge-queue de muraille* (F). *Common redstart* (E).
 طائر من اللهيب طوله نحو ١٥ سم. ثوبه جميل الانوان
 المتراكبة، رأسه الى الكهية الزرقاء تتوسطه بقعة بيضاء
 تمتد الى الجبهة. زوره اسود، ظهره الى الكهية الرمادية
 يطعها موج ازرق. جوشه وايلاءه وزمكاه وذنبه الى
 الصهبة الصنابية الزاوية. ريشه عزالانه وقوامه جنسه الى
 السرة الخنطية، اباهره الى الصهبة. حدة عينه غنائية
 اللون. منقاره ويبرله الى السرة السوداء || انشاء تحضن
 مرتين في العام، الاولى في اواسط نيسان والثانية في اوائل
 حزيران. حصفتها تراوح من ٥ الى ٨ بيضات .



لهيب اسود الزور

اوائل حزيران وتبقى حتى اواخر تموز. تشرح من العبر
 الى قسمة الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع
 وتمتد المكن ميحادي على الصفحات السفل من نصال
 الاوراق || السرة تطول نحو ٢٨ سم. جسمها اسطواني
 الشكل، كثيف الملب القصير. ثوبها يمانت البيت التي
 تمشي فيها وهو يراوح من الخصار البحري الى الريدة
 والشهبة الصفراء يملو ثلاثة خطوط قاطبة الى الجفوة.
 رواجها البطنية الوسطى ماسحة بما يحملها تنقوس عند
 الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما
 ينقضي في الجفالة.

٢٥٠٩٦ - **لَهَائِب** (F). *Taureau blanc* (F). *White bull* (E).
 للهايق: الثور الابيض. وكل ايض لاق ولواق. بقرة
 لواق ولفة. شوي، ملهق اللون: ابيضه.

٢٥٠٧٠ - **شَجَة ، نَحْطَة** (F). *Emphysème pulmonaire* (F). *Pulmonary emphysema* (E).
 تعرف ايضا بانتفاخ الرئة، داء يصيب الهازم في صدورها
 لا تكاد تسلم منه، وهو في الخليل من العيوب المبجلة
 للبح.

٢٥٠٧١ - **لَهْم**
 اللحم هو المسن من الحيوان وخصها حيوان القصابة
 كالبقر والضأن والماعز. ج. لوم.

٢٥٠٧٢ - **لَهْم** (F). *Lehm* (F). *Loam* (E).
 عن الامير مصطفى الشهازي. تربة مكونة من غرين ورم
 وصلصال بنسب متعادلة لا يسد فيها عنصر حل آخر.

٢٥٠٧٣ - **لَهَوْب** (F). *Inflammable* (F).
 قابل الالتهاب او سريع الاشتعال او الاحتراق.

٢٥٠٧٤ - **لَهْوِيَّة** (F). *Inflammabilité* (F).
 هي قابلية الالتهاب او الاشتعال.

٢٥٠٧٥ - **لَهْوَة *** (S). *Isothecium* (S).
Isothécion (F). *Isothecium* (E).
 جنس طحالب من جانبيات المياه. انواعه المعروفة نحو

٣٠ منبتها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم. تعيش
 على الصخور في المواقع الرطبة || سوقها دقيقة، خنيلة،
 مدادة. اوراقها متراكبة شديدة الصغر. ضبابها جرابية
 مستطيلة المالحق المنصبة.

٢٥٠٧٦ - **لَهْوِيَّة *** (S). *Uvularia* (S). *Uvulaire* (F).
 جنس نباتات جذمورية عشبية زيبينة معمرة من فصيلة
 الزنبقيات. انواعها المعروفة ستة. سوقها دقيقة، خنيلة
 فرعاء. اوراقها لا قابية الشكل والانتظام. ازهارها
 فردية او تولمية الانتشاب، اطية الارتكاز، سدنية
 البتلات المستطيلة المتدللة، لونها الى الصفرة || اعرف
 انواعها ما يتبع.

٢٥٠٧٧ - **لَهْوِيَّة كَبِيرَة الزَّهَر** (S). *Uvularia grandiflora* (S). *Uvulaire à grande fleur* (F).
 نوع من الالهوية السروية. تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم.
 اوراقها متعاقبة سنانية، نصلها يطول من ٦ الى ١٠ سم.
 وهو مائل الصفه العليا الخصار، خلي السفل البطلاح.
 ازهارها كبيرة القد تطول من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الصفرة
 الجلييلة || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٥٠٨٤ - لهيمة *

Crenilabrus (S).

Crénilabre (F). Crenilabrus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيديات شائكات الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها شبه اهليجية الشكل تقطع من ١٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها اسطوانية. زعانفها الظهرية مستطيلة. زعانفها الذيلية مقطوعة. خراشيفها مائلة. الزوايا جبهة الالوان المراكية الزاهية تتركز على الرتبة القفصية تملؤها خطوط وتجاذيف ومجامير تراوح من الاحمر الى الاصفر والاحمر || اسماك هذا الجنس تسرا في وكثات من الحث وتتفقد السرم وتحافظ عليه حتى التقف || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .



لهيمة طاروسية

٢٥٠٨٥ - لهيمة طاروسية *

Crenilabrus pavo (S). Crénilabre pavo (F).

Crenilabrus pavo (E).

نوع من الهيمة. سمكة بحرية بيوض. اعطائها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك الجاذب وحشاش || جسمها اهليجي الشكل ، متعدل التبطيط يطول نحو ٣٥ سم. ثوبها متراكب الالوان القسطانية الجميلة. الذكر اكبر قدماً من الانثى واكثر تزويجاً ولحم خصباً. رؤسها مخروطي الشكل. فكاهما قويان ، متماثلان شقها متعدل الانفرج. عيناها كبيرتان ، جاحضتان ، باقويتان ، زعنفتها الظهرية مستطيلة ، لامتناهية الارتفاع. زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف والزوايا || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .



لهيمة مدولة

٢٥٠٨٦ - لهيمة مدولة *

Crenilabrus melops (S). Crénilabre commun,

C. mélops (F). Crenilabrus melops (E).

نوع من الهيمة. سمكة بحرية بيوض. اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك الجاذب وحشاش || جسمها اهليجي الشكل متعدل التبطيط ، يطول نحو ١٨ سم. ثوبها متباين الخصب بين الذكر والانثى. اللون الجزوي يسود عند الذكر والاعخر المحطبي عند الانثى. ويملوه عند الشقين هلال اسود وراه كين وبقعة سوداء قرب قاعدة الزعنفة الذيلية. رؤسها مخروطي الشكل ، ذلق الحظير ، متعدل الشدق. عيناها كبيرتان ، جاحضتان. زعانفها ملونة. الظهرية مستطيلة والذيلية مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .



لواب المتوسط

٢٥٠٨٧ - لواء

Torcou (F).

طائر من النقاقيات يعرف بابي لوي ، اطلبه .



لوازة

٢٥٠٨٨ - لواب *

Lupa (S). Lupa (F). Lupa (E).

جنس متوغ من الثقريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الخيليات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي || اجسامها متغايرة القد ، شديدة التباين الجسمي. تتميز بدروعها المصغرة وباستعداداتها الجانية التي تأخذ شكل الاسته او الحرايب. حمار دروعها الامامية منشاري الشكل. ارجلها الخلفية مجاذبية الفصم الطرفية. ملاقطها مسنة ضليعة || اشهر انواعها لواب الهند ولواب المتوسط .



لوبياء

٢٥٠٨٩ - لواب المتوسط *

Lupa hastata (S). Lupa armée (F).

نوع من اللواب. اعطانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط جسمه صغير القد يطول نحو ٣ سم. ويعرض نحو ٦ سم. ثوبه متداخل الالوان فيه الانمر والاديس والاصمر والاشفق والاسمر ويملوه في القسم الخلفي من درعه ثلاث نقط مستديرة جزوية اللون .

٢٥٠٩٠ - لواب الهند *

Lupa tranquebarica (S).

Lupa des Indes (F).

نوع من اللواب. اعطانه شطوط الهند الجنوبية . جسمه كبير القد يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ٣٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الجميلة فيه الازرق والاحمر والبرتقالي والاصفر والاشفق والصنابي .

٢٥٠٩١ - لواح

Carnassiers, Carnivores, Fauves (F). Carnivoros, Fallow-deer (E).

رتبة من الحيوانات اللبونة آكلات اللحوم . فصائلها عديدة اشهرها السنوريات والكلبيات والديبات والضبقيات والسموريات والزباديات ...

٢٥٠٩٢ - لواء *

Loasa (S). Loasa, Loase (F).

Loasa (E). Loasa, Nesselnalie (D). Loasa (I).

جنس نباتات شبيهة حولية ريشة وزبينة من فصيلة اللوزيات. انواعها قليلة جميعها زباء ، زغبها حارق كالفراس. اوراقها متناحية ، مفرضة . ازهارها فردية ، محورية الارتكاز ، تقابل الاوراق وهي خماسية التركيب ، جيلة الشكل ، نارية اللون تتعاقب بعض الوقت . ازهارها يستمر ملول الصيف .

٢٥٠٩٣ - لوازيات *

Loasaceae (S).

Loasacées (F). Loasaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القللات اجناسها . وانواعها قليلة ، معظمها اشباح حولية ومحولة . اعطائها ابريكة الاسوائية .

٢٥٠٩٤ - لوب

Abelles (F).

اللوب هو النحل والارب ايضا .

٢٥٠٩٥ - لوبياء *

Dolichos unguiculatus (S). Dolique, D. asperge (F). Black eyed dolichos, Asparagus bean (E). Riesen Spargelbohne (D). Dolico asparago, Fagiolo dall'occhio (I).

نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية. ضرابه كثيرة العدد تزرع لقرنوها الخضراء القليلة او لبرورها الجافة || وهي تجود في جميع الارابة القليلة الاندماج الممكن ربما . برورها وافرة المادة الغذائية تحوي مسا قدره :

- ٢٣,٢٤ ٪ من المواد الازوتية
- ١,٣٠ ٪ من المواد الدهنية
- ٥٦,٨٠ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٥٠٩٦ - لوبياء بلدية

Dolic de Chine (F).

هي الدر الصبي ، اطلبه .

٢٥٠٩٧ - لوبياء سودانية

Ambrevade (F).

هي البسلة الهندية ، اطلها .

٢٥٠٩٧ - **لُوبِيلِيَّة زَرْقَاء** ، **لُوبِيلِيَّة السُّفْلِس**
Lobelia syphillica (S). *Lobélie syphilitique*, *Cardinale bleue* (F).

بجلة طبية وزينة معمرة تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. ساقها فراء. اوراقها سنانية ذلقة طول نحو ١٥ سم. نصلها مائل الصفحة المسنة الحافة. ازهارها سنانية التجميع تاجية الاركانزك طول نحو ٣ سم. لونها الى الزرقه البنفسجية المواج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين. كانوا ولا يزالون يستعملون ازهارها وزورها وجوهرها في معالجة السفلس.

٢٥١٠٨ - **لُوبِيلِيَّة سَاطِعَة**
Lobelia fulgens (S). *Lobélie éclatante* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم. ساقها قليلة الفروع. اوراقها لاطئة لسنة ملتفة الاطراف ، نصلها جوي اللون خلي البشرة ، ازهارها كبيرة القد ، خلية القنابات الدرية ، برتقالية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٥١٠٩ - **لُوبِيلِيَّة قَاصِرَة**
Lobelia splendens (S). *Lobélie splendide* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها فراء. اوراقها لاطئة لسنة ؛ نصلها مسن الحافة ، اخضر الصفحة، جوي مختار. ازهارها كبيرة القد ، ارجوانية اللون ، برتقالية المواج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني.

٢٥١١٠ - **لُوبِيلِيَّة قَرَحَاء**
Lobelia ramosa (S). *Lobélie ramifiée* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقها اسطوانية زياء. اوراقها السفل ريشية مخمرة. اوراقها العليا سنانية مدنية الزام الاخير. نصلها خلي البشرة احمل اللون. ازهارها كبيرة القد لونها الى الزرقه || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢٥١١١ - **لُوبِيلِيَّة قَرْمِزِيَّة**
Lobelia cardinalis (S). *Lobélie cardinale* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها قليلة الفروع ، اوراقها لسنة سننة. نصلها مائل الصفحة يطول من ٥ الى ١٥ سم. ازهارها قمرزية اللون لا متساوية القنابات || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٥١١٢ - **لُوبِيلِيَّة كَرْلِيَّة**
Lobelia amoena (S). *Lobélie de la Caroline* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٤٠ سم. ساقها فراء. اوراقها اهليلية سنانية تطول من ١٠ الى ١٥ سم. نصلها مائل الصفحة المسنة الحافة. ازهارها سنانية التجميع ، تاجية الاركانزك، لونها الى الزرقه الباهتة. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

٢٥١١٣ - **لُوبِيلِيَّة مُحْرَقَة**
Lobelia urens (S). *Lobélie brûlante* (F).

بجلة طبية معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. تعيش في المناطق والاراضي الرطبة ، مهددا الخد. يقال انها جراحية المادة قلتها تقيد المدة ، كثرها مؤذية. ساقها زياء لهام. اوراقها مزهجرة. زهبها محرق قارس. ازهارها وردية اللون.

٢٥٠٩٨ - **لُوبِيَّاء عُسْقُولِيَّة** (F). *Dolique bulbeux* (F). هي التامر ، اطبله.

٢٥٠٩٩ - **لُوبِيَّاء لَبْلَابِيَّة**
Dolic lablab (F). هي اللباب المصري ، اطبله.

٢٥١٠٠ - **لُوبِيَّاء مِسْكَات** (F). *Dolique à œil noir* (F). هي الدجر ، اطبله.

٢٥١٠١ - **لُوبِيَّاء**
Lopezia (S). *Lopézia* (F). *Lopezia* (E).

جنس نباتات عشبية برية وزينة من فصيلة الاخدریات. مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية والمكسيك || ساقها ترتفع من ٣٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متعاقبة ، مختلفة الاشكال. يكثر فيها السناني. ازهارها عقودي التجميع. ازهارها لانطامية ، متباينة الالوان ، رباعية الفصل والبلات اللامتساوية ، ثنائية الاسدية المستعرضة الاطراف || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٥١٠٢ - **لُوبِيَّاء زُرْجَنْجَرِيَّة**
Lopezia miniata (S). *Lopézia cinabre* (F).

نوع من اللوبيزه. جنبية سبروتية معمرة. مهدا المكسيك. ساقها مخشوشية تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها متعاقبة اهليلية مسنة التصل. ازهارها عقودي طرني. ازهارها الى الحمرة الزنجفريه اللامعة || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الثاني.

٢٥١٠٣ - **لُوبِيَّاء كَثِيرَة الزَّهَر**
Lopezia grandiflora (S). *Lopézia à grandes fleurs* (F).

نوع من اللوبيزه. جنبية سبروتية معمرة. مهدا غواتيمالا. ساقها منتصبه فراء تملو من ١٠٠ الى ١٦٠ سم. اوراقها متعاقبة اهليلية النصال تطول من ٥ الى ٩ سم. نصلها خلية مهدبة الاطراف. ازهارها فردية ، محورية ، قطرها من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الحمرة السفعا المواج || تنويرها يستمر طواك فصل الصيف والخريف.

٢٥١٠٤ - **لُوبِيَّاء مُتَوَجَّهَة**
Lopezia coronata (S). *Lopézia couronnée* (F).

نوع من اللوبيزه. عشبية سبروتية زينة حولية. مهدا المكسيك. ساقها مضطعة مزوانية تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة ، يغبية التصل المسن المختار. ازهارها عقودي طرني. ازهارها الى الودي الارجواني المواج || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول.

٢٥١٠٥ - **لُوبِيلِيَّات**
Lobeliaceae (S). *Lobéliacées* (F). *Lobeliaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين متحدة القعالات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد، اشهرها اللوبيلية.

٢٥١٠٦ - **لُوبِيلِيَّة** *

جنس نباتات عشبية حولية وبمعمرة من فصيلة اللوبيليات. انواعها نحو ٢٠٠ معلها بري وبمعضها طبي وزيني. اوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل. ازهارها لا نظامية التجميع والارتكانزك، جبلة الشكل مختلفة الالوان || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع :



لوبيله

٢٥١٢٣ - **لَوْتُ** Polluer (F). To pollute (E).

وسخ الشيء باضافة الاقذار عليه كتلوث مياه الانهر ببعض المواد الكيماوية .

٢٥١٢٤ - **لَوْلَدِيَّاتٌ** Eupaléodictyoptères (F). Eupaleodictyoptera (E).

رتبة حشرات منقرضة من طبقة المفكيات . احافيرها تعود الى الحقبة الرابعة من الاباج الاولي المعروفة ايضا بالحقبة الكربونية || جمع حشراتا كبيرة القد خاضلة او دامة .

٢٥١٢٥ - **لَوْنِيَّةٌ** Lucina (S). Lucine (F). Lucina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اللوئيئات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ بعضها من متحجرات الحقبة السيلورية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || اصداؤها متباينة الاشكال والاحجام منها التقمعية والبيضية والمالسة والمخددة والمضلة . جميعها ثنائية المثالب الطليقة المستطيلة || تعيش في الرمال المغنورة بالماء قرب الشواطئ والمجاذع .

٢٥١٢٦ - **لَوْنِيَّاتٌ** Lucinidae (S). Lucinidés (F). Lucinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة ، من غابرة ومعاصرة ، عديدة . الغابرة تميز العصر السيلوري اما المعاصرة فتنتشر في معظم ببحار العالم || اصداؤها لاقواسية الشكل والحجم يكثر فيها البيضوي المثلج . اطراف مصاريها مستننة المختار او مائلة || اعرف اجناسها واشهرها اللوئيئة والكربيس .

٢٥١٢٧ - **لَوْنَحَةٌ** Planche à dessin (F). Drawing-board (E).٢٥١٢٨ - **لَوْنَحَسٌ كِبْرِيئِيٌّ** Cosmia fulvago (S). Cosmie jaune soufre, Calymnie jaune (F). Cosmia fulvago (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات حرشفيات الائمة . موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والاندلس واروية . قراشها جارية قوتها رحيق الزهار . سرقها تعيش على اوراق النباتات والاشجار الخرجية || جسمها مردي الشكل يطول نحو ١٢ سم . بسطتها نحو ٣١ سم . رأسها كبريتي اللون . عينها كبرتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الصفار الكبريتي || روشنها الاماميان الى الصفار الكبريتي يطوه بتيجع عنابي وتشبيك بني . روشنها الخلفيان الى الشبهة الصفراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتع المكن لطعاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقه تطول نحو ١٨ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مائل للفسار ، امفر اللون . اسود الملاقي . رأسها اسود . مذهبها ورواجبها الى السمره || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة حيث تنغم السرقه لمتلحة بجلباب من الطين .

٢٥١١٤ - **لَوْنِيَّةٌ هَانِكَةٌ** Lobelia heterophylla (S). Lobélie hétérophylle (F).

عشبة حولية تزيينية تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها مفصلة سرسة قليلة الفروع . اوراقها السفلى ريشية مفردة ، اوراقها العليا اطيبلجية او سنانية النصل . ازهارها عقدوية التجميع ، كبيرة القد ، خلية البشرة . لونها الى الزرقة يعلوها موج وردى او ابيض || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٥١١٥ - **لَوْتُ** Sciaena (S). Sciène (F). Sciaena (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البهاريات . انواعها نحو ٢٥ جميعها مفترسة ، قوتها الزنكة والسردين . معظمها من اسماك المحيط الاطلسي . تتميز بكبر اجسامها وزعانفها الظهرية . اثنوها الى الكهبة السمره يعلوها موج اسفع || اشهر انواعها لوت المتوسط .

٢٥١١٦ - **لَوْتُ الْمَوَسُطُ ، نَسْطَرَاك** Sciaena aquila (S). Sciène aigle, Mègre, Persèque (F). Meagre (E).

نوع من اللوت الميزل في المتوسط . سرسحه غمن المياه الاقليلية ، جسنة كبيرة القد تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ثوبه الى الربدة الطحلاء السفعاء الموج . لحمه لذيق الطعم جيد الصنف .

٢٥١١٧ - **لَوْتُس** Lotus

هو اللوتس ، اطبل .

٢٥١١٨ - **لَوْنِيَّةٌ لَحِيَّةُ الْهَبَلِ** Anthyllis barba jovis (S). Anthyllide barbe de Jupiter, Barbe de Jupiter (F). Jove's beard, Jupiter's beard (E). Jupitersbart, Silberbart (D). Antillide, Barba Giova (I).

عشبة برية مرموعة من القرنيات القراشية تكثر في الاراضي المصحاة ، ساقها فروع مستقلة . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها بيضية متقاربة . ازهارها ابطية وطفرة الارتكاز مستحبة العرف ، مغترية .

٢٥١١٩ - **لَوْنِيَّةٌ نَافَعَةٌ ، حَشِيَّةُ الْجِرْحِ ، حَشِيَّةُ الدَّبِ** Anthyllis vulneraria (S). Anthyllide vulnérinaire, Trèfle jaune (F). Kidney-vetch, Layd's fingers (E). Echter Wundklee, Gelber Hasenklee (D). Vulneraria, Trifoglio giallo delle sabbie (I).

عشبة برية طيبة مرموعة من فصيلة القرنيات القراشية ، تكثر في الاربة الرملية القاحلة . ساقها مستقلة . اوراقها مركبة متعاقبة ، وريقاتها بيضية متباعدة الارتكاز . ازهارها مستطيلة المالحق صفراء اللون وردية الموج . اوراقها طيبة تلثم الجرح بعد ان تقضي على الالتهاب .

٢٥١٢٠ - **لَوْنِيْسِيُوم** Lutécium (F). Lutecium (E).٢٥١٢١ - **لَوْنِيْن** Lutéine (F). Lutein (E).٢٥١٢٢ - **لَوْتُ** Essaim (F). Swarm (E).

هو نول النحل من الهجرة الثانية والثالثة . اما النول من الهجرة الاولى فيسمى ديسماً .




لوت



لوتيا لحة الجبل



لوتيا ناعمة



لوتية



لوحس كبريتي

* ٢٥١٢٩ - لَوْحَسْ مُدَّهَب *

Cosmia aurago (S). Cosmie dorée, Calymnie dorée (F). Cosmia aurago (E).

حشرة من الفسقيات حشرغيات الاجنحة. موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والافاق واروية. قراحتها جارية قوتها رحيق الازهار. سرتها تمشي على اوراق وبشارق الزان والمائل || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م. بسطتها نحو ٢٣ م. رأسها الى الخطفي المذهب المالح. عيناها كبيرتان. زباناها عظيمان. جوشنها ويطنها الى الصغار المذهب المالح || روشاها الاماميان الى الصغار الكبرى يملؤا تنقيط وتبقيع عتاني. روشاها الخلفيان الى الشبهة الثبراء تملؤها مشعة تبارج بين الخطفي والاندس || لها جليل واحد في الحول. تظهر القراشة في آب وتبقى حتى اواخر ايلول. تسرح في الليل. تعامل يمد ظهورها بنحو خمسة اسابيع. وتفتح المكن لطلعا مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة تطول نحو ٢٠ م. جسمها اسطواني الشكل، مالمس القشار غرنوبي اللون، زيتي المالح. رأسها الى الجؤرة. منها الى السمرة. وواجبها الى السمرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي في التربة حيث تنفمن السرعة ملتصقة بجلباب من الطين.

* ٢٥١٣٠ - لَوْحَف *

Parmophorus (S). Parmophore (F). Parmophorus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وحيدات الاجهزة وفضيلة التقبوصات. انواعها المعروفة قليلة البلد اعطائها البحر الاحمر وبعض البحار الاسيوية. تمشي على المديح قرب الشواطئ || جميعها سرقة وتحتوي النور فتنتفن في الحصىا وتفتح الرمال || اصداها شبه اطيلاجية الشكل، مقفولة المقدم، مستديرة المؤخر، نائرة التبع، قليلة الانفعاغ، تلتفت كامل الظهر. رؤوسها تنتهي باخظام اسطوانية. لؤاسها شبه مغروطة الشكل. عيونها جاحظة قاعدية. خياشيمها ظهريه الارتكاز تقوم في تجويد خاص يلامس المتق || اشهر انواعه لؤفة البحر الاحمر.

* ٢٥١٣١ - لَوْح *

Cluytia (S). Clutie, Cluytie (F). Cluytia (E). Clutia (D). Clutia (I).

نبات عشبي ليني زبتي من فصيلة السوسبيات مهده البلاد الاستوائية. ساقه كدنة، اوراقه خلية بجلة اخضر الاحمل. اذغاره زائفة الالوان البنية || يزرع في المراكن والمصارى.

* ٢٥١٣٢ - لَوْحَس *

Claviger (S). Clavigère (F). Claviger (E).

جنس حشرات من فصيلة اللوحيات ورتبة غديات الاجنحة. انواعها المعروفة سبعة اعطائها تمتد من الهند وايوان الى اروبة. تمشي مع بعض انواع التل اصعبها الكبار || اجسامها صغيرة تطول نحو ٣ م. رؤوسها ضيقة، مستطيلة الشكل. عيونها طامسة. قرونها الاستشعارية صوبانية. تأثيرها وفكوكها صغيرة. ملاسها نجيلية. كؤاسها صغيرة، شبه بيضية الشكل. بطونها اجاصية. اغادها قصيرة تلتف ثلث البطن. اثنائها الى الصخرة المساء المتفاوتة الماحات || تمشي مع التل في قراه يغذيها ويلبس ما تنفضه مسام بطونها.

* ٢٥١٣٣ - لَوْرَسِيَّات *

Clavigeridae (S). Clavigeridés (F). Clavigeridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم لانها تعيش في قري التل مع اكثر اجناسها || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ م. رؤوسها صغيرة، ضيقة، مستطيلة الشكل. عيونها طامسة. قرونها الاستشعارية صوبانية، سداسية الفصل. تأثيرها وفكوكها صغيرة. كؤاسها بيضية الشكل، صغيرة الحجم. بطونها اجاصية الشكل. اغادها قصيرة تلتف ثلث البطن || تمشي مع التل الذي يلفها بالقلس والذي يلعب ما تنفضه مسام بطونها من مواد مائلة || اشهر اجناسها اللورس.

* ٢٥١٣٤ - لَوْر *

Coregonus lavaretus (S). Lavaret (F). Gwyniad (E).

سمكة نهريه وبحيرية من فصيلة السلوبيات. جسمها اهلجيلي الشكل يطول نحو ٤٥ سم. ثوبها الى الريدة الزرقاء ويلبها مالح فضي وتكت سود تكتنف الظهر من جانبيه. ترطب في المياه المسقية. تسرا في تشرين الثاني. لحمها لذية الطعم جيد الصنف.

* ٢٥١٣٥ - لَوْرَاسِيَا *

Laurasia (F). Laurasia (E).

اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية على المنطقة القارية التي كانت، قبل تجزئتها، تتألف من آسيا واروية وامريكا الشمالية.

* ٢٥١٣٦ - لَوْرَس *

Mouette (F).

هو زج الماء، اعطيه.

* ٢٥١٣٧ - لَوْرُوس *

Lorocera (S). Lorocérès (F). Lorocera (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة اللوروسيات ورتبة غديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها هيفاء تطول من ٧ الى ١٠ م. رؤوسها كبيرة، نائرة. قرونها الاستشعارية عقدية الفصائل المهززة ببعض الهلب المستطيل. تأثيرها ضلعية. كؤاسها محدودة، منحسورة. اغادها لاحفة، نحلة التخديد القاطب. قوائها نشطة، مبعرة الهلب. اثنائها الى السمرة السوداء المتفاوتة الماحات || الحشرة الجملانة قانصة، تألف المواقع الرطبة اغصها ضغاف المنائع. البرقة وانجة.

* ٢٥١٣٨ - لَوْرُوسِيَّات *

Loroceridae (S). Lorocérídés (F). Loroceridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل، رؤوسها كبيرة. عيونها كبيرة، نائرة. قرونها الاستشعارية وفكوكها مستطيلة الهلب الشالك. تأثيرها بارزة الاطراف الخارجية للمسلكة. برارجدا عادمة الزناد. اغادها نحلة التخديد القاطب الذي يمد ١٢ اخدودا. قوائها معتدلة الطول، مبعرة الهلب || مكها شبه اسطواني الشكل، عجن الطرف الدقيق، تمتصه الاثنى افراديا في التربة. يرقاها سداسية القوام والمقل. حورياتها تنحور في التربة داخلا اوراقه انبوبية الشكل سطوية الرأس والمقل ||



لوحس مذهب



لوحف



لوح



لوروس



لور



لوروس

تعيش على غصان الابر والبيجرات والمناقع . معظم انواعها قاصص وبغضها خاضل || اشهر اجناسها اللورس .

٢٥١٤٤ - لورز البربر Olivier du Maroc (F).
هو الأرقان ، اطلبه .

٢٥١٣٩ - لورنتس Loranthé d'Europe (F).
هي البتوية ، اطلبه .

٢٥١٤٥ - لورز الهند Amandier des Indes (F).
هو الاميليج اللوزي ، اطلبه .



لورسية

٢٥١٤٦ - لورز حلو * Prunus amygdalus communis, Amygdalus communis, A. dulcis (S). Amandier commun (F). Common almond tree (E). Echte Mandel (D). Mandorlo comune (I).

هو اللوز المشهور المأكول الثمار غشوية كبيرة العدد تقسم الى فئتين : فئة الصروب ذات النواة الصلبة ، وفئة الصروب ذات النواة الطرية الممكن قشها بالاصابع .

انجار غليظة السوق تملو من ١٢ الى ١٢ م . ثمارها مأكولة اللوب تحوي ما يراوح قدره :

من ٥٠ الى ٥٥ ٪ من المواد الزيتية
من ٢٣ الى ٢٥ ٪ من المواد الاحية

وهي شائعة الاستعمال في صناعة السكاكر ويستخرج منها زيت اللوز .

٢٥١٤٧ - لورز مر ، مزج Prunus amygdalus amara, Amygdalus amara (S). Amandier amer (F). Bitter almond tree (E). Bittere Mandeln (D). Mandorlo amaro (I).

نوع من اللوز ثمرته سبروتية نشيطة تملو من ٦ الى ١٥ م . زراعتها صعبة لانها تستعمل كطعم لضررب اللوز الحلو . ثمارها صلبة . لوبها مر الطعم يحوي بعض المواد الحامضية

اخصها الاميدالين (Amygdaline) التي ينشأ عنها الحامض السينيديريكي او الحامض البروسي الشديد الفعالية السامة . ثمارها تستعمل في الصناعة فيستخرج منها زيت اللوز المشهور وهو طيب ، عادم الاذى ، خصال من العناصر السامة . أما الكسب الناجم عن عصره فهو سام ميت .

٢٥١٤٨ - لوزة Amande (F). Almond (E).

هي ثمرة اللوز منها الحلوة والمرة .

٢٥١٤٩ - لوزة الوضاب هي اللدة اللامبية ، اطلبه .

٢٥١٥٠ - لوزية * Loeselia (S). Loesélie (F). Loeselia (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وتزيينية من فصيلة القنبيات معقودة التعريف على اسم العلامة « لورل » .

٥٥٠ منها بعض مناطق المكسيك . سوقها منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها بيضيه التصل او ستانية . ازهارها زرقاء اللون او قرمزية . قناباتها مسنة || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٥١٥١ - لوزية زرقاء * Loeselia coerulea (S). Loesélie bleue (F).

نوع من الوزلية . عشبة حولية تزيينية ، ساقها تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم . فروعها نحيلة صلبة ، خلية الحاء . اوراقها بيضيه الشكل ، نصلها مسنة الختار . ازهارها زرقاء اللون . قناباتها صاملة وسردية || تنويرها صيفي .

٢٥١٥٢ - لوز الكاكو * Cacaoyer (F).

هو الكاكو ، اطلبه .

٢٥١٥٣ - لوز الالهة * Cacaoyer (F).

هو الكاكو ، اطلبه .

٢٥١٥٤ - لوز الالهة * Cacaoyer (F).

هو الكاكو ، اطلبه .

٢٥١٤٠ - لورنتسية * Laurencia (S). Laurencia (F). Laurencia (E).

جنس نباتات بحرية من الخثيات الحمر . انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطائها معظم بحار العالم || بغضها غشروي

المادة والبغض الآخر حلاهي . الوناء تراوح من الاصفر الى الاحمر || بغض انواعها الغشروفية حريفية الطعم تستعمل استعمال التوابل في بعض مناطق اوروبا الشمالية .

٢٥١٤١ - لوري * Domicella (S). Lori (F).

جنس طير من الملسقات وفصيلة الببغاوات . انواعها المعروفة ٢٢ موطنها يمتد من الهند الصينية الى ماليزية والفيليبين . ملجنها الحياتي جماعي الا في زين التساند

والخضاة . تألف الثنايات والمروج وصفات مجاري الماء . قوتها حبوب التبجيات والثار || اجسامها مستدلة القد ، قريبة الشبه بالهام . اونها متباينة الالوان المراكبة يكثر فيها الاحمر الازرقوي ثم الاصفر فالاصفر فالازرق

فالناهي . اجنتها ذلقة ، اذناها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف .

٢٥١٤٢ - لوز * Prunus amygdalus (S). Amandier (F). Almond tree (E). Mandel (D). Mandorlo (I).

جنس اشجار مشمرة برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها اثنان : لوز حلو ولوز مر ، فالحلو هو الزراعي وهو كثير الصروب والثر هو البري . وبجربة اللوز من اي نوع كانت تحمل بذات الشؤفة الجلنية . جذورها

وتدية تنفوز في التربة على اعماق بعيدة . ساقها مستقيمة خشنة . اغصانها متفرجة كثيرة الافناد . افنادها فناء . قناتها معتدلة الشموخ ، قصيرة الذروة . اوراقها عابلة ، معتقة ، رحيمة ، ذلقة . نصلها يبدو اخضر اللون في اول

عهده ثم ينحرف الى الفحلة ويستقر عليها حتى الذبول والايصال . ازهارها ثورية التجميع ، بيضاء اللون ، وردية المبراج . تتكون على الافناد الحولية والحولية . وهي تنور في اواسط الشتاء فيليلج زهرها ، في لبنان ، خلال الثيرة الثانية من شباط وذلك قبل الابراق ببض الوقت . ثمارها

لوزية مستطيلة مدببة المقصعة تتكون من غلاف لحمي اخضر اللون اطلل البشرة الكثيفة اللحم يحف مع الادراك وهو يحضن عجمة خشبية النشاء تغلف نواة لوبها ابيض اللون جامد المكسر وافر المادة الزيتية || واللوز يتكاثر بالبذر ومن المستحسن وضع البذور في مستقراها مباشرة دون اللجوء الى المشاتل وذلك لان نقل الفرس من المشتل الى مستقراها يوجب قطع الجذور التودية العمل الذي يتساق مع سويحات هذه الشجرة || وهو يعيش ويزدهر في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة لا يؤذي سوى الصقيع لانه

يسبب اتملاص الزهر او العقد || وهو يحود في جميع الاثربة انما يرجع المنتسطة الانسماج التي لا تفتقر الى الكلس كما وانه لا يعمر كثيرا في الاثربة الطينية المنسجة .

٢٥١٤٣ - لوز الالهة * Cacaoyer (F).

هو الكاكو ، اطلبه .

٢٥١٤٤ - لوز الالهة * Cacaoyer (F).

هو الكاكو ، اطلبه .

٢٥١٤٥ - لوز الالهة * Cacaoyer (F).

هو الكاكو ، اطلبه .

٢٥١٤٦ - لوز الالهة * Cacaoyer (F).

هو الكاكو ، اطلبه .

٢٥١٤٧ - لوز الالهة * Cacaoyer (F).

هو الكاكو ، اطلبه .



لوري



لوز حلو



لوب



لوصة



لوطس ارجواني



لوطس اصفر



لوتس فلسطيني



لوطس قرني

نحو ١٠٠ مغطيا نبات عشبي وبفسها جبني. اوراقها مركبة، ثلاثية، اذنية، ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز جميعها مفترية || اكثر انواعها علفية زرعاما الماشية بينها الطليعية العديدة القوائد، اشهرها.

٢٥١٦١ - لُوطُس اُرْجَوَانِي * ، لُوطُس زُرَاعِي حَمَض سَكْرِي

Lotus tetragonolobus, Tetragonolobus purpurens (S). Lotier cultivé, L. pourpre, L. rouge, Pois café. (F). Garden winged pea (E). Rote Spargelerbs (D). Loto cultivato, L. rosso, Vacca pisella (I).

نوع من اللوطس البري والزراعي، وهو عشبة سرورية حولية تملو من ١٥ الى ٤٠ سم. ساقها مستقيمة فراء. وريقاتها واذايتها بيضيه الشكل. ازهارها فردية او ثنائية التجميع، ابطة الارتكاز، حراء اللون. سنفاتها رباعية الاصلع. ازهارها يستمر من آذار الى ايار.

٢٥١٦٢ - لُوطُس اَصْفَر * Nelumbo lutea (S). Nélombo jaune, Lotus jaune (F).

نبات عشبي مائي جذموري من فصيلة النيلوفرديات. جذاميره صفولية نشوية المسادة المأكولة. اوراقه زنادية كبيرة مستديرة قطرها براوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهاره صفراء اللون عادمة العرف قطرها براوح من ١٥ الى ٢٥ سم. تركز على شمرايح تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٥١٦٣ - لُوطُس النيل ، لُوطُس مِصْرِي ، عَرُوس النيل ، زُرْدَة النيل

Nelumbium speciosum, Nelumbo nucifera (S). Lotus sacré, L. du Nil, Fève d'Egypte, Rose du Nil (F). East Indian lotus, Pythagorean bean, Sacred bean (E). Lotus blume, Agyptische bohne, Nilililie (D). Loto sacro, Fava del Nilo (I).

نبات عشبي مائي جذموري من فصيلة النيلوفرديات. اعطائه مياه البلاد الحارة الهندية والافريقية. اوراقه زنادية كبيرة مستديرة، نصفها يوم على سطح الماء قطره براوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. أما زانداها فيطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ازهاره كبيرة القند وردية اللون قطرها براوح من ٢٠ الى ٣٥ سم. وهي ذكية العرف المطري. ثماره كروية الشكل نشوية المادة المأكولة || ازهاره يستمر طول الصيف.

٢٥١٦٤ - لُوطُس فِلِسْطِينِي * ، عَفِيرَة

Lotus palaestinus (S). Lotier de Palestine (F). Four winged pea (E). Garten Spargelerbs (D). Loto di giardino (I).

نوع من اللوطس البري المرموي المعمر. اعطائه تشبه بلاد شرق البحر المتوسط. ساقه منتصبة فراء. ازهاره ابطة وطرفية الارتكاز صفراء اللون. زوره مأكولة تعتبر من المقويات الماددة المفعول الرجعي.

٢٥١٦٥ - لُوطُس قَرْنِي * ، قَرْن العُزَال ، كُنْيَهَة

Lotus corniculatus (S). Lotier corniculé, L. commun, Trèfle cornu, Corne du diable, Pied-de-poule (F). Bird's foot, Bird's-foot trefol (E). Gemeiner Hornklee, Schotenklee (D). Loto corniculato, Baccellina, Ginestrina salvatica (I).

نوع من اللوطس الطبي البري الطبي المعمر. ساقه منتصبة فراء. ازهاره الى الصفرة الزائفة يعولها تبقيج احمر، وهو

٢٥١٥٢ - لُوزِيَّة قِرْمِزِيَّة *

Loeselia coccinea (S). Loesélia écarlate (F).

نوع من اللوزية. عشبة حولية تزينية. ساقها تملو من ١٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل. نصالها سننة الحمار، بجلة الخصار الاديم. ازهارها قرمزية اللون تطول نحو ٣ سم. قناباتها صاملة || تنورها يستمر طول شهر حزيران.

٢٥١٥٣ - لُوزِيَّات

Arbres à noyaux (F).

Stone-plants (E).

هي الاشجار اللوزية البزور، اغلب عجيبات.

٢٥١٥٤ - لُوزِيْن *

اللوزين غلوكوزيد يوجد في لب عجات اللوز المر والدراق والكرز ... اللوزين تموي في الماء وتتحوّل الى غلوكوز وحامض سيانيدريك والدهيد بنزويك. وهي، في معدة الانسان، تتحوّل كما في الماء فتسبب عارض تسم قد يكون مميتاً.

٢٥١٥٥ - لُوسِيْت

Leucite

جيم يتكون في ودة الخلايا النباتية. ج. لوسيات.

٢٥١٥٦ - لُوتُوب *

Otocyon (S). Otocyon, Chien oreillard (F). Otocyon (E).

حيوان لاح مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكلبيات. موطنه بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية. يألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار. ملجئه الحياتي زوجي || جسمه قريب الشبه بجم اين اوى، طوله نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٨ سم. رأسه متدل الجرم و ذلق الخطم. عيناه صغيرتان حادتا البصر. اذناه عريضتان كيرتان. ذنبه كاذب الثلب. ثوبه الى الكعبة الموضحة بالخطي. قوائمه الى الكعبة السوداء. خاسية الاصابع في القامتين الاماميتين، ورباعيتها في الخلفيتين || يسرح في الليل ويبيت في النهار. قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والحشرات اغصها الجراد.

٢٥١٥٧ - لُوتُوبَة *

Paralepis (S). Paralépis (F).

جنس اسماء بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة اللوسيات. انواعها المرفوعة ثلاثة، اثنتان تيمشان في البحر الابيض المتوسط وواحدة في بحار التبال || اجسامها وشعبة الشكل، مستطيلة. رؤوسها مخروطية، ذلقة، عادمة السهف. عيونها كبيرة جاضطة. اعطاهما ربة الاشدق. زانفتها الظهريّة كبيرة القند، خلفية الارتكاز. زانفتها الذيلية نازقة || الثواب الى الشبهة القفصية تقيم في الظهر ويعولها مواج براوح من الوردي الى اليلكي في البطن || حولها جيدة الصنف، مغروب ثياب.

٢٥١٥٨ - لُوتُوس *

Proscolie (F).

اللوّس قندة مغنية سائلها شديد الزوجة يلسق الطلع عند السحليات.

٢٥١٥٩ - لُوطُس هو الاطلس، اطلبه.

Lotus (S).

Lotier (F). Lotus (E).

جنس نباتات برية وزراعية من القرنيات الفراضية. انواعه

Arum maculé (F).

٢٥١٧٣ - لَوْفُ مُبَعَّع
هو الاروم ، اطبله .نبات طبي يلثم الجرح وينفع من البواسير . ينفع ازهاره
يقضي على التهاب العين .

Luffa acutangula (S).

Louffa anguleux (F).

نوع من اللوف الزراعي . مهدد الهند . ساقه تطول من ٣
الى ٦ امتار . اوراقه شديدة الخضار خاسية او مسباعية
التفصيص القلبي الشكل . ازهاره ثلاثية الاسدية . ثماره
مستطيلة ، عشارية الاصلع البازرة تطول من ١٥ الى
٣٥ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . ليفها شائع الاستعمال .

Lorées (F).

٢٥١٦٦ - لَوْطِيَّات

سبط من فصيلة القرنيات الفراقية ، اشهر اجناسه اللوطس .

٢٥١٦٧ - لَوْطَانِيَّات ، سِينْجِيلِيَّات

Loganiaceae (S), Loganiacées (F), Loganiaceae (E).
فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة متحدة الفعالات . تشمل
٣٠ جنساً و ٣٥٠ نوعاً من النباتات الشبية والجنبيه
والشجرية . اوراقها بسيطة ، كاملة ، اذينية ، متقابلة .
ازهارها صغيرة القد ، لا قياسية الازتكاز . ثمارها كرابل
مزدوجة ، متفلقة . اكثرها من نباتات البلاد الاستوائية
والحارة . معظمها جعالي يحوى بعض النامر السامة
اخصها السركتين والبروسين .

Lophyrus pini (S).

٢٥١٧٥ - لَوْفِير الصَّنَوْبَر *
Lophyre du pin (F). Pine sawfly (E). Gemeine
Kiefernblattwespe (D).

حشرة من المنشاريات ، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ سم .
اجيالها الحولية ثلاثة . ذكرها اسود اللون . انثاها ملطخة
بالاصفر ، تحت مكثها على بناتج الصنوبر يتقنف عن
يرقات دقيقة مهمة تلثم الاهداب النامية وتقضي عليها .

٢٥١٦٨ - لَوْف ، لَيْف ، قَيْلَجُوش

Luffa (S), Louffa, Luffa (F). Towel gourd (E).
Schwammkürbis (D). Luffa (I).

جنس نباتات عشبية حولية عارشة من فصيلة القرعيات .
انواعها ١٠ منها المناطق الحارة ، سوقها مستقلة ، حولتها
منشعبة . اوراقها متعاقبة ، متفقة ، قلبية الشكل ، خاسية
او مسباعية التفصيص . ازهارها وحيدة المسكن ، كبيرة
القد ، صفراء اللون . ثمارها خيارية الشكل مستطيلة .
نسجها خشن الليف الخاوي الاسفنجي التركيب || اشهر
انواعها ما يلي .

٢٥١٧٦ - لَوْقَاس

٢٥١٧٧ - لَوْقَانِيَّات *

Leucaeniidae (S).
Leucanilidés (F). Leucanilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجسامها
وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة القد او صغيرة . اعطائها
العالم . تعيش على الاعشاب البرية والزراعية اخصها
التجليات .

Leucania (S). Leucanie (F).

جنس حشرات حرشفية من فصيلة اللوقيات . انواعها
كثيرة منتشرة في معظم اسواق العالم . اجسامها صغيرة
القد . وراشها قليلة الزراكش والاهداب يكثر فيها الاسر
ومشتقاته || اشهرها واضرها لوقائية التجيل .

٢٥١٦٩ - لَوْفُ اسْفُوطَانِي * ، لَوْفُ مَضْرِي

Luffa cylindrica, L. aegyptiaca, Poppia fabiana (S).
Louffa cylindrique, Eponge végétale, Pétrole, Tor-
chon (F). Egyptian towel gourd, Rag-gourd, Vege-
table sponge (E). Aegyptische Schwammkürbis (D).
Luffa d'Égypte, Petola, Petuola, Spugna vegetale (I).

نوع من اللوف الزراعي الشائع الاستعمال . ساقه تطول من
٣ الى ٧ امتار . اوراقه خاسية التفصيص الكلوي الشكل .
ازهاره خاسية الاسدية . ثمار اسطوانية تطول من ١٥ الى
٣٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ليفها شائع الاستعمال
المزلي .

٢٥١٧٩ - لَوْقَانِيَّة التَّجِيل * (دودة الذرة)

Leucania loreyi (S). Leucanie du maïs (F).

حشرة من اللوقيات ، طولها نحو ١٧ مم . ثوبها حنطي
اللون اسمر الموج . وراشها الى السمرة الوردية . رقبها
دقيقة الجسم تطول نحو ٣ سم . رأسها الى الجؤوة . ثوبها
حنطي اللون وردي الموج يملو تخطيط اسمر قاطب ويمعرض
تخلخله نقط سود نظامية الازتكاز || تركيب التجليات
البرية والزراعية اخصها الذرة والمصان والحنطة فتؤذي
المصنف وقد تقضي عليه عند كثرتها .

٢٥١٧٠ - لَوْفُ الْحَبَّة ، اُذُن الرَّاهِب

Arum dracunculus, Dracunculus vulgaris (S). Ser-
pentaire commune, Gouet serpenteire (F). Com-
mon dragon, Snake plant, Dragon arum (E).
Drackenwurz, Schlangenkraut (D). Aro serpone,
Dragontea, Serpentaria (I).

نبات عشبي ارموي بري وتربسي من فصيلة القلقاسيات .
ارسته عشولية مبطة . اوراقه برتنية مستطيلة الزناد .
وريقاتها ورتية التيجع ، فصلها ستاني الصفحة الخضراء
المزركمة والمبججة بالاسمر والاخر والاصفر . شمراخه
يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ينهي بصرعاف يحوق الفبة
لونه الى الجؤوة المابقة .

٢٥١٧١ - لَوْفُ جَعْد

هو الاروم الايطالي ، اطبله .

٢٥١٨٠ - لَوْقَانِيَّة دَيْسَة *

Leucania impura (S). Leucanie impure (F).

Leucania impura (E).

حشرة من فصيلة اللوقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة .
موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق
الداخلية المشاة . فراشها جارة قوتها رقيق الازهار .
سوقها تعيش على عصف التجليات البرية || جسمها
متوسط القد بطول نحو ١٤ مم . بسطها نحو ٣٣ مم . رأسها
اكلس اللون اسمر الموج . عينها كبرتات . زباناها
خيطيان . جرشها وبعثها الى الكلسه الصهباء المراج ||
وراشها عند الشقين الى الكلسه تملعوا مشعة سمره عند
الذكر . شهابه عند الانثى || لها جيل واحد في الحول .
تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في

٢٥١٧٢ - لَوْفُ عُسْطَرِي

Aristolochie serpenteire (F).
هو الزاروند العباني ، من النباتات الطبية ، اطبله .

لوف اسطواني



لوفير الصنوبر



لوقائية التجيل



لوقائية دسنة

قسين ، القسم المايوي رصاصي الموج ، مبثر الملب
الشعب الشاك ، وقسم سفلي اغبر الموج يملو تجميع
اسود ككتف قواعد الرواجب . رأسها اسود اللون . وراجها
سمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع
ينقضي ضمن جراب تملقه في النبات .

٢٥١٨٨ - **لُوم** هو التدرج المنولي ، اطله .

٢٥١٨٩ - **لُوماسية** Lomatia (S). Lomatie (F).
جنس نباتات جنينية برية وحدائقية من فصيلة الفصيات .
انواعها المعروفة كثيرة مهددة بالاد امريكية واسرائيلية . سيقها
افراء . اوراقها لا قياسية الشكل منها البسيطة والمسنة
والمقرضة . ازهارها عقديرة التجميع ، طرفي ومجوري
الارتكاز . ازهارها جميلة الشكل ثنائية التركيب لونها
الى الصغار الاغبر || اشهر انواعها الحداثيقية ما يتبع .



لؤلؤة البسج

٢٥١٩٠ - **لُوماسية بهشية الورق** Lomatia ilicifolia (S). Lomatie à feuilles de houx (F).
نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين . اوراقها
بيضة واهليجية وسنانية الشكل . نصلها اخضر اللون
على صفحتيه ، مغرض الحلقة او مسنن . عناقيدها الزهرية
مستطيلة رهلة . تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩١ - **لُوماسية حديدية** Lomatia ferruginea (S). Lomatie ferrugineuse (F).
نوع من اللوماسية جنبها تملو من مترين الى ٣ امتار .
اوراقها مستطيلة الاعناق ثلاثية التفريش ، نصلها ماس
الصفحة العليا خلي السفلى خله حديدي الموج عناقيدها
الزهرية متوسطة الحجم والكثافة معظمها طرفي الارتكاز .
تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥١٩٢ - **لُوماسية صباغية** Lomatia tinctoria (S). Lomatie colorante (F).
نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين . اوراقها
متوسطة القد لا قياسية التفريش ، نصلها لامع البشرة
على صفحتيه . عناقيدها الزهرية صغيرة الحجم كثيفة
التجميع . يزورها صباغية تخضب الماء بالاحمر اللودي .
تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩٣ - **لُوهف** Serrasmo (S). Serrasme (F).

الواحدة لوهفة . جنس اسماك نهريه من مفتوحات المئات
وفصيلة القرصانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد يكثر
وجودها في بعض انهر امريكية الاستوائية || اجسامها
مبطلة ، بيضية الشكل ، متباينة الاحجام . رؤوسها
مقطوعة ، واسعة الاشداق ، مرصوقة الانسان الحادة .
اثوابها الى الخضار البحري المتفاوت الماجة تكثر فيه
الرقة . زعانفها الغليظة فاخرة || تتميز بجسامها الفاتقة
اذ انها تقم كل ما تشاهده في الماء وكثيرا ما تترق شاك
الصيادين || لحومها فاخرة الصنف مرغوب فيها .

٢٥١٩٤ - **لُويحقي** هو البازي ، اطله .

٢٥١٩٥ - **لُويكة ، ليسي** Lippia (S). Lippie (F).
جنس نباتات خشوشية برية وزينية من فصيلة ربي الحام .
انواعها زهاء ٩٠ . اعطائها المناطق الاستوائية والحارة . اوراقها
كاملة ، صغرة ، دقيقة السنن . ازهارها لا قياسية
التجميع يكثر فيها السنن والعتكولي || اشهر انواعها
الزراعية ما يلي .



لوهف

الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان
لطخا على الصفحات السفلى من نصال العصف || السرفة
تطول نحو ٤٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، ماس
القشار تملو نقط سود نظامية الارتكاز . رأسها الى الجوزة
قوسا حطلي اللون ، احمر الموج يملو تحطيط احمر قاطب
ومعترض . مدبها الى السرة . رواجها سود || طور
الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة
حيث تنفخ السرفة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٥١٩١ - **لُولاية** Grand Nacré (F).
فراشة تدعى ارجينيس البراري ، اطلها .

٢٥١٩٢ - **لُولب** Vis (F). Screw (E).
قطعة اسطوانية معدنية او خشبية مغرضة حائزونا تستعمل
في اغراض شتى . اشهر اللولب :

لولب ارجيس Vis d'Archimède (F).
لولب لا نهائي Vis sans fin (F).
لولب مضاعف Vis multiple (F).
لولب ماس Vis tangente (F).
لولب هولندي Vis hollandaise (F).

٢٥١٩٣ - **لُولب سلامي** Cycle mérial (F).
هو الدورة السلاية ، اطلها .

٢٥١٩٤ - **لُولبي** Spiral (F).

٢٥١٩٥ - **لُولقة** Perle (F).
هي الدرة . ج لؤلؤ ولؤلؤ.

٢٥١٩٦ - **لُوليئات ، مطبقة الأجحة** Plecoptera (S). Plécoptères (F). Plecoptera, May flies, Ephemeral flies, Shad flies, Lake flies (E). Eintagsfliegen (D).
رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الجناح . انواعها عديدة
زهاء ٧٠٠ تجمعها بعض المفصائل والاجناس . تتميز بعيوناتها
القاهرة الثلاثية التركيب وبناتلياق اجنتها الى الوراء
عند الراحة والحمود || رقاتها مائية تعيش عالقة على الصخور
المنمورة بالماء .

٢٥١٩٧ - **لُولوية البتفسج** Boloria selene (S). Nacré des violettes (F).
Boloria selene (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حشرقيات الاجنحة .
موطنها يشمل الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط
الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها واسعة قوتها رحيق
الازهار . سرفتها تعيش على اوراق البسج البري والزراعي ||
جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ سم . يسقط نحو ٣٨ سم .
رأسها كسني اللون . عينها كبيرتان . زباناها صولجانها
مرشفها دقيق الجرم . جوشنها ويعطها الى الكسني ||
وراشها عند الشقن الى الصخرة الصناعية يملو تجميع
وتقيح وتنقيط وتشفه . جسمها الى الكسني الحطلي الموج ||
لها جيولان في الخيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان
وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر آب . تسرح في النهار .
تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتد المكان
مباحدا على نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطلو
نحو ٣٢ سم . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الطحلة
الخفسراء يملو خيطان جانبيين اسودان يفصلان الجسم الى

٢٥١٩٤ - لوزة سكرتة ، ليبيته سكرتة
Lippia dulcis, *L. asperifolia* (S). Lippie sucré (F).
 نوع من اللوزة وهي عشبة سرئوتية زينة معمرة تملو نحو ٣٠ سم. ساقها فروع. اوراقها سكرية الطعم ، متقابلة ، معتقة . نصلها يضيي الشكل ذلق الزام الاخير يطول من ٣ الى ٤ سم. ازهارها عثكولي التجميع ، ابلي الارنكاز او طري . ازهارها صغيرة القذ يضاء اللون فواحة العرف المعطي || تنورها يستمر طوال الصيف .



لوزة ليونيه

٢٥١٩٧ - لوزة ليونيه ، ليبيته ليونيه
Lippia citriodora (S). Lippie citronnelle, Citronnelle (F). Herb Louisa, Lemon verbena (E). Citronenkraut, Lemonkraut (D). Cedrina, Cetrina, Erba limoncina (I).
 نوع من اللوزة الزينة وهي جنبه سرئوتية معمرة تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها منتصبه فروع. اوراقها معتقة ثلاثية او رباعية القمة. نصلها سناني الصفحة يطول من ٨ الى ١٠ سم. || ازهارها هربي الشكل. ازهارها بنفسجية اللون. اوراقها وازهارها فواحة العرف المعطي القريب الشبه من الليمون وهي تستعمل استعمال الشاي || تنورها يستمر من محز الى آب .



لوزة ثورية العقد

٢٥٢٠٦ - ليكاس
Lias
 طبقة ارضية توبد في اسفل الاراضي الجورية .

٢٥٢٠٧ - ليماط
Mortier (F). Mortar (E).
 خليط من الكلس والرمل او من الاسمنت والرمل يضاف اليه الماء اللازم ويستعمل في البناء لاسك الحجارة فيما بينها.



ليا

٢٥٢٠٨ - ليبرافولا
Libratula (S). Libratule (F). Libratula (E).
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة الغلويات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . موطنها حلجان جزر اقيانيا . تعيش بين رصاف المرجانيات . اصداها شبه بيضيه الشكل ، ثنائية المصاريع تنشب في مدائع المرجان وتستقر عليها .

٢٥٢٠٩ - ليبيتريلالا
Libertella (S).
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفات . انواعه قليلة العدد والاعراض تركيب السوق والاغصان اليابسة || وفتيته لا قياسية الشكل والشكل والحجم . مشبيه عصير هلامي التركيب ، اصفر اللون او وردي . بوفاته خيطية ، هلالية الشكل ، شفافة .

٢٥٢١٠ - ليبرتيه
Libertia (S). Libertia (F). Libertia (E).
 جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوتيات . جلوهها لفييه . سويقها منتصبه معتدلة الارتفاع . اوراقها ضيقة النصال ، ثنائية التصنيف . ازهارها حرضيه التجميع ، رتاجية الترتيب تبدو كالكسابل وهي يضاء اللون او زرقاء || تزرع لتزين في المرائن والحدائق || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٥٢١١ - ليبرتيه جميله
Libertia formosa (S). Libertia belle (F).
 نوع من الليبرتيه . عشبة زينة معمرة . ساقها منتصبه

٢٥١٩٨ - لوزة ثورية العقد ، ليبيته ثورية العقد
Lippia nodiflora, *L. canescens* (S). Lippie fleuri aux noeuds (F).
 نوع من اللوزة وهي عشبة زينة معمرة . منبها الاصقاع الحارة . ساقها مستطبة ممددة . قروصها تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها صغيرة القذ ، اهليجية الشكل ، نصلها سنن الحلفة . ازهارها عثكولي التجميع ، عقدي الارنكاز . ازهارها صغيرة القذ تملو من ٣ الى ٥ سم . وهي عادمة العرف وردية اللون او ليلكية || تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٥١٩٩ - لوتيق
Alcernanthere (F).
 نبات يضي لقمه الحمل ، اطليه .

٢٥٢٠٠ - لثامه
Innocuité (F). Innocuousness (E).
 اللثامه كون الشيء غير مضر او خلوص الشيء من الضرر .

٢٥٢٠١ - لثنه
Hérison (F).
 هو القنفذ ، اطليه .

٢٥٢٠٢ - ليكاه ، قصص ، بلبك
Lamia (S). Lamie, Touille, Nasilarg, Requin-mar-souin (F). Lamia, Porbeagle, White shark (E).
 سمكة بحرية مفترسة وحيدة الجنس والنوع من الصفقيات القرشيات . جسمها مردي الشكل يطول نحو ٨ امتار . غطلها مخروطي يشرف عل الفم . نياها ضيقة مستطبة . ثوبها رصاصي اللون يمتد ويرزق مع اقترابه من شوج الظهر ويغير ويبيض عند البطن || حياتها جاعية سرها براوح من ٥ الى ٢٠٠ زوجا . تألف البعاب الباردة والمعتدلة ، ويوجد منها في المتوسط . قوتها الاسماك من اي نوع كانت . لها مأكول . جنت منها واحدة عل الشاطئ الليباني قرب نهر الكلب ، في ضبيه ، وذلك في اواخر شهر شباط عام ١٩٥٨ .



لياح

٢٥٢٠٣ - ليكاه
 اللياه : الارض البعيدة عن الماء .



لياح أسود

ترتفع نحو ٤٠ سم. أوراقها ثنائية التصفيف ، ضيقة التصل . أزهارها شبه سنبل التجميع . أزهارها بيضاء اللون ، فواحة البرق المطر || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

٢٥٢١٢ - ليبرتيه رشيقة *

Libertia pulchella (S). *Libertia gracieuse* (F).
نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها نحيلة ترتفع من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراقها شبه سنانية الشكل تطول من ٨ إلى ١٥ سم . أزهارها شبه عتكوئي التجميع . أزهارها مستطيلة الاذن ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٥٢١٣ - ليبرتيه زرقاء *

Libertia coerulescens (S). *Libertia bleutée* (F).
نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها مستطيلة ، ضيقة ، جامدة التصل . أزهارها شبه صيرواني التجميع ، سنبل الترتيب . أزهارها صغيرة الجرم زرقاء اللون يعلوها تمشيع اطحل || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٤ - ليبرتيه كبيرة الزهر *

Libertia grandiflora (S).
Libertia à grandes fleurs (F).
نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها كبيرة اللد تطول من ٣٠ إلى ٧٥ سم . أزهارها سنبل التجميع . أزهارها كبيرة الجرم بيضاء اللون || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٥ - ليت

Erythaea (S). *Palmier bleu* (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النخلات. أنواعها قليلة ، أصلها البلاد الحارة والاستوائية . أجدها منتصبه مستقيمة . أوراقها مدورة ثاجية . خوصها ثنائي التفلج جامد التصل المنتصب || اعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٥٢١٦ - ليت سرح

Erythaea edulis, *Brahea edulis* (S). *Palmier bleu inerme* (F).
نوع من اللبت الزراعي . شجرته شجرة تلو من ١٢ إلى ١٥ م . برمتها كثيفة الأوراق . أوراقها مستطيلة الأجرانه كبيرة اللد ، قطرها يراوح من ١٥٠ إلى ١٨٠ سم . خوصها جامد التصل . جيل الخضار البحري الزاهي . ثمارها بلحية التركيب ، بيضيه الشكل ، صغيرة اللد ، سكرية الطعم ، مأكولة .

٢٥٢١٧ - ليت شالك

Erythaea armata (S). *Palmier bleu piquant* (F).
نوع من اللبت الزراعي التريبي . شجرته تلو من ٤ إلى ١٢ م . برمتها معتدلة الكثافة . أوراقها ال الخضار الازررق الغصي المراج . قطرها يراوح من ٥٠ إلى ١٢٠ سم . خوصها جامد التصل ، جرائدها تطول من ٧٠ إلى ١٠٠ سم . وهي شائكة الدرز ، غليظة الحسف الاسود المحة .

٢٥٢١٨ - ليت

Spire (F).
Single turn, *Whoral* (E).
اللة دورة الخط الحلزوني .

٢٥٢١٩ - ليت

Lela (S). *Lela* (F). *Lela* (E).
جنس حشرات من فصيلة المرقصيات وربة ذوات الجنائين . أنواعها المعروفة ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الممتدة الحارة || أجسامها هيفاء تطول من ٤ إلى ٨ م . رؤوسها صغيرة . عينها متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية غيبطة . ملاسها رباعية العقل . مارشها نشيطة . كواسها شبه بيضيه الشكل . بطونها اهليلجية . أوتابها ملونة . رواشها قسطانية التخصيب يعلوها تجمعين وتبيج . قوائها مستطيلة . ظنابها بمهزة بمناس قوة || تألف الحراج والغابات والمروج وصفاف مجاري الماء ، قوتها طلع الأزهار ورحيقها . اساريمها خاضلة او دائمة وبعضها عادر .



ليت نافلة

٢٥٢٢٠ - ليتا ناطلة *

Lytta vesicatoria (S).
Cantharide du frêne (F). *Green cantharide* (E). *Spanische Fliege* (D).
حشرة طليقة نافلة من فصيلة الملويدات ، نوبها ذهبي اللون صناعي المراج . جسمها يطول من ١٥ إلى ٢٥ م . الذكر اصفر قدًا من الانثى . مرتما الاشجار الحرجية انحصا المران وقد تؤذيها بالتهامها أوراق . ريقاتها تميل على بعض النباتات المخرية || كانوا وما زالوا يلتقطونها لتجفيفها وصنعها واستعمال مسحوقها كنشاط ومانع .



ليتي اصفر

٢٥٢٢١ - ليت ، ليت

وحدة المكاييل المئوية وهو عبارة عن ديسيمر مكعب . مضاعفاته الديكاليتر (١٠ ليت) والمكوكليتر (١٠٠ ليت) اما اجزائه فهي الليتير والستيليتير والمليتر .

٢٥٢٢٢ - ليتشي

Litchi (S).
Litchi, *Ponceau* (F). *Litchi* (E).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة النخلات. مهدا البلاد الاستوائية الاسوية . انواعها قليلة . أوراقها متعاقبة منعقة اهليلجية . أزهارها على التجميع ، محوري وتاجي الاوتكاز ، أزهارها صغيرة اللد بيضاء اللون . ثمارها ذكية العرف توكل وتستهمل في استحضار بعض الفساديه والمشروبات الروحية || اعرف انواعها وأشهرها ما يلي .

٢٥٢٢٣ - ليتشي اصفر * ، رسيوطان

Nephelium lappaceum (S). *Néphélion*, *Ramboutan* (F). *Rambutan*, *Rampostan* (E). *Rampostan-Fruchte* (D). *Nefelio* (I).
نوع من الليتشي الزراعي . ثماره قليلة الشكل صفراء اللون مأكولة ويستخرج من عصيرها بعد تخميره وتقطيره قنديد كحول شائع الاستعمال في الشرق .

٢٥٢٢٤ - ليتشي صيني *

Litchi chinensis (S). *Litchi de Chine* (F). *Litchi*, *Lee-chee* (E). *Litschibaum* (D). *Litchi* (I).
نوع من الليتشي الصناعي مهد الصين حيث تكثر زراعت الاستنارية . ثماره بيضيه الشكل والحجم حواء اللين مأكولة ويستخرج من عصيرها بعد تخميره وتقطيره قنديد كحولي لاذع شاعط ناشط شائع الاستعمال .

٢٥٢٢٥ - ليت

هي قوبعة الثورنر ، اطلبها .
Lithobius (S). *Lithobie* (F). *
Lithobius (E). *Brauner Steinkriecher* (D).
جنس دوبيات من فصيلة الليتوبيات . انواعها كثيرة المد



ليتوب

أَبُو عَوْفَيْتْ ، أَمْ عَوْفَيْتْ ، أَمْ قَيْسْ
Fourmi-lion, Myrméleon (F). Ant-lion, Myrmeleon (E).

جنس حشرات من عصبيات الجناح. أنواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحساسة وفي بعض مناطق البلاد المعتدلة. حشراتها مرتقة تعيش على رقيق الازهار ، أما دعاميصها ففترسة تصيد الحشرات الصغيرة اخصها النمل.

Licmetis (S).
Licmetis (F). Licmetis (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استراليا ونيهاية وجزر سليمان. تألف الغايات والمواقع الرطبة. ملجأها الحياتي جماعي. افواجها قليلة العدد. قوتها البذور والتبصل والمساقل وبعض الحشرات والاساريع || اجسامها متندلة القد ، تطول من ٤٥ إلى ٥٥ سم. تتميز بمناقيعها المحجنة الذرية التي تطول من ٦ إلى ١٦ سم. ويقرر اذناها المستديرة الاطراف. انثواها الى البياض المجابي يعاود مولج اصفر او اخضر. يشمل الصفحة السفلى من الجناح ويمتد الى الاطليان والافنيك. رؤوسها وعارسها وكشاتها الى الحمرة التي تختلف مواجها مع اختلاف الانواع.

Lithium
٢٥٢٣٤ - **ليثيوم**
فلزات قلوية توجد في الطبيعة وفي بعض النباتات اخصها التبغ || وهو ابيض اللون فصي الرجعة اصلب من البوتاسيوم والصوديوم. نقله النوعي ٥٩. ينصهر في ١٨٠ درجة مع.

٢٥٢٣٥ - **ليثيجه** (S). Ligie (F). Ligie (E).
جنس دوبيات بحرية من القشريات متساويات الارجل وفصيلة الظرموطيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم. تألف الشطوط البحرية || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، متندلة التبيط. رؤوسها صغيرة. عينوها جاحظة. قوتها الاستمارة مستطيلة ، مركبة. ملامسها الشرجية فارة الاطراف المستدقة المستطيلة.

Liche (F).
٢٥٢٣٦ - **ليشة**
سكة بحرية تدعى سمندو ملساء ، اطلمها .

٢٥٢٣٧ - **ليدة** (S). Lyde (F).
جنس حشرات من المشاريات غشائيات الاجنحة. انواعه نحو ٥٠ اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة ، ملونة. اجنتها شفافه. ريقاتها مستدقة نهمه تركب الاشجار الحرجية والمشمرة اخصها الصنوبر والتوب والدراق والاجاص فلتهم الارواق وتقضي عليها || اشهر انواعها واغرها ما يلي .

٢٥٢٣٨ - **ليدة الإجاص** (S).
Neurotoma flaviventris (S). Lyde du poirier (F). Pear web-spinning sawfly (E). Gesellige Birnblattwespe (D).

نوع من الليدة وحيدة الجبل الحولي ، جسمها يطول من ١٢ الى ١٤ سم. لونه الى السمرة يطولها يتبع اصفر يجتد من الرأس الى الشرج || ريقها برتقالية اللون ، سوداء الرأس ، عديمة الارجل البطينة تظهر في الربيع . تركب اوراق الاشجار المشرة اخصها الاجاص .

منتشرة في معظم اصقاع العالم . اجسامها مركبة من ١٥ حلقة تحمل ١٥ زوجاً من الجرامز منها ثلاثة ازواج صغيرة القد .

٢٥٢٣٧ - **ليثوب مبدول** (S).
Lithobius forcipathus (S). Lithobie à tenailles (F). Lithobius (E).

دوبية مفترسة مبدولة من فصيلة الليثويات ورتبة الدخداخيات شقويات الارجل ، موطنها يشمل معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من المئين القدم والجليد جسمها قريب الشبه بجسم الحريش ، مبسط الشكل ، مستطيل . مركب من ١٥ سكة. الذكر اصغر قدماً من الانثى يطول نحو ٣٥ م. والانثى تطول نحو ٦٠ م. رأسها صغير الحجم ، مستعرض الشكل. عينها زنجيتان. شيفهاا ضليان ، مقواس ينبتان بكاشتين قويتين. زباناها مستطيلون اعوجان. جزامها نشطة. ثوبا الى الشقة الحظية المواجه. مدنها جزامها الى الطلة الثراء. تألف الاراضي الزراعية والملاحة. مسرحها دجوي. قوتها الحشرات والرخويات الصغيرة. عضنها مؤلة لكنها قليلة الاذى.

٢٥٢٣٨ - **ليثوبيات** (S).
Lithobiidae (S). Lithobies (F). Lithobiidae, Lithobius (E). Steinläufer (D).
فصيلة دوبيات من الدخداخيات الشقويات الارجل . اجسامها وانواعها عديدة ، اشهرها الليثوب .

٢٥٢٣٩ - **ليثوفانة سمراء** (S).
Lithophana semibrunnea (S). Lithophane semibrunnea (F). Lithophana semibrunnea (E).

حشرة من القشريات حشرشيات الاجنحة. موطنها بعض احراج الشرق الاذنى . فراشتها جارسه قوتها رقيق الازهار. سرقتها تعيش على اوراق السديان || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م. بسطها نحو ٤١ م. رأسها فاسي الشكل ، اسر اللون. عينها كبرتان. زباناها خيطيات. جوشها اسمر اللون ، حطلي المواجه . بطنها حطلي اللون اسمر الحيد || روشنها الاماميان الى الحطلي الاسمر يطولو تقطيط اسود في الخثار الخارجي . اهدابها حطية || لها جبل واحد في الحيل . تظهر القراشة في ايلول وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تمتع المكان لطعاً للسرقة على الصفحات السفلى من نصال اوراق السديان || السرعة عند ادراكها الكمال الجسوري تطول نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار ، ارمد اللون ، اسمر المواجه يطول نحو ثلثي اغبر وتسعة خطوط جانبية معترسة صفراء اللون. رأسها مخروطي الشكل ، اسود. مدنها ورواجبها الى السمرة || طول الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي في التربة حيث تنفخ السرعة ملتصقة بجلباب من العلين .

٢٥٢٣٠ - **ليث** (F).
الليث هو الاسد . ج. ليوث .

٢٥٢٣١ - **ليث** (الليث : نبات ملتف (اللسان) .

٢٥٢٣٢ - **ليث عفريين** ، **بقرة بيتي إسرائيل** ،



ليثوب مبدول



ليثوفانة سمراء



ليث عفريين



ليث



ليدة الاجاص



ليدة الدراق



ليدرك سوسني العرف



ليدك شتم



ليدك عريان



ليدك مسيك



ليشية

انواعه المعروفة خمسة منها حوض البحر الابيض المتوسط
وجزر كثرية || جميعها نباتات نجمية قرعاء . اوراقها
مركبة ، وقرية ، ثلاثية الوريقات ، وغليلة الشكل .
ازهارها عقنودية طرفي . ازهارها صفراء اللون وارجوانية .
ثمراها قرون مبطلة خلية القشار || اشهر انواعه اللبذ
المشعب واللبذ اليوناني .

٢٠٢٤٦ - لَبَذ مُشْعَب ٥

Adenocarpus divaricatus (S).
Adenocarpe divariqué (F).

نوع من اللبذ . طوي في جبال لبنان . فروعه مزغبة
الساه . وريقاته الغللية بيضيه النصال . اما العليا
فستانية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٠٢٤٧ - لَبَذ يُونَانِي ٥

Adenocarpus graecus (S).
Adenocarpe de Grèce (F).

نوع من اللبذ . طوي في جرد لبنان . فروعه وكزوس
ازهاره مزغبة وخلية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٠٢٤٨ - لَبَزُون ٥

هو الأسليخ ، نبات بري طبي ، اطلبه .

٢٠٢٤٩ - لَبَزُونْدَرُون ٥

Liriodendron (F).

هي شجرة التوليب ، اطلبها .

٢٠٢٥٠ - لَبَزُون ٥

Lys (F). *Lysis* (E).

اسم تعريفي يطلق على الانحلال النسيجي الذي تسببه
بعض العوامل المعنوية المعروفة باللايزين .

٢٠٢٥١ - لَبَزُون ، لَبَزُون ٥

Lysol
سائل دهني كثيف المادة، جوزي اللون، اسمر الماجة، مركب
من الكريوزوت والقطران والشحم والصابون . وهو من
المطهرات الفعالة الشائعة الاستعمال الزراعي .

٢٠٢٥٢ - لَبَزِين ٥

Lysine (F). *Lysin* (E).

اللايزين مادة عضوية مجهولة الطبيعة تحلك عاصية تذيب
الكريات الحمر وحجيرات النسيج والبكتريات .

٢٠٢٥٣ - لَبَسُون ٥

Leycesteria (S).
Leycesterie (F).

جنية معمرة برية وزيينية من فصيلة الجانيات . منها
البالد الاسيوية الحارة . ساقها منتصبة قرعاء جواء تملو
من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها عابطة متعاقبة ، نصلها
بيضي الشكل ذات الزام الاخضر يطول نحو ١٦ سم . ويعرض
نحو ١٠ ازهارها حيلة القالب ، يضاء اللون ، وريضة
التنحيش . ارجوانية القشابات ، عقنودية التجميع . متدلية .
ثمراها عنية ججوية || تنويرها يستمر من آب الى ايلول .

٢٠٢٥٤ - لَبَسُون ٥

Chrysopogon (S).
Chrysopogon (F).

نبات عشبي بري مرموي حولي من النجيليات . يكثر
في الاراضي الجبلية المدحاة . وهو من نباتات لبنان الطوعية .

٢٠٢٥٥ - لَبَشِيَّة ٥

Lichla amia (S). *Liche amie* (F).

سمكة بحرية من الاسقمريات . جسمها اهليجلي الشكل ،

٢٠٢٣٩ - لَبَذَةُ الدَّرَاقِين ٥

Neurotoma nemoralis (S). *Lyde du pêcher* (F).
Apple web-spinning sawfly (E). *Gesellige Pflanz-*
blattwespe, *Steinobet-Gespinnstblattwespe* (D).

نوع من اللبذة وحيدة الجيل الحولي ، جسمها يطول من
٧ الى ٨ سم . لونها الى البعرة السوداء . رأسها مبضع بالاصفر
يعطي جمعد بالابيض . تظهر في اواخر نيسان ، تمتع
مكثها على سلوح الاوراق السفلى فينقث عن ريشات
منطقة نمة لونها الى الخضرة الغامقة تملوها خطوط سمر
قائطة ، تركب بعض الاثمار المصرة اخضرها الدراق
واللوز فتلتهم الاوراق بعد ان تمتلئها بنواصها المنكبوتي
الدقيق .

٢٠٢٤٠ - لَبَذَّة ٥ ، لَبَذَّة ٥

Rhodopaxillus (S). *Rhodopaxille* (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريفقيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الغابات والحراج الجبلية .
تتميز بالوانها الزائفة . جميعها مأكولة مستحبة الطعم
والعرف || اعرف انواعها واشهرها الاربعة التالية :

٢٠٢٤١ - لَبَذَّة سُسُوتِي العَرَف ٥

Rhodopaxillus irinus (S). *Rhodopaxille iris* (F).

نوع من اللبذ . يعيش على الدبال والمواد النباتية المنحلة .
يوجد عند اطراف الغابات وفي منطقاتها . ساقه غليظة ،
مستضخمة القاعدة ، معتدلة الارتفاع ، غبراء اللون .
ذكتة قلنسوية الشكل ، سوسنية العرف ، ليكبي اللون
يطولها موج عناني ، قطرها نحو ٧ سم . اطراسها صفراء
اللون || لحيتها مأكولة ، فاخرة الصنف .

٢٠٢٤٢ - لَبَذَّة شَتِيم ٥

Rhodopaxillus saevus (S). *Rhodopaxille sinistre* (F).

نوع من اللبذ . يعيش على الدبال في المراعي . ساقه
قصيرة ، مستضخمة ، بنفسجية اللون . ذكتة كبيرة القند
قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البني الاسفع يزوه عند
الحافة . اطراسها الى الصفرة البنية الموج || لحيتها جيدة
الصنف ، مأكولة .

٢٠٢٤٣ - لَبَذَّة عَرَبِيَّان ٥

Rhodopaxillus nudus (S). *Rhodopaxille nu* (F).

نوع من اللبذ . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه
معتدلة القلائط والارتفاع ، مستضخمة القاعدة ، ليكبي
اللون . ذكتة صابجية الشكل ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها
الى البنفسجي يطولها موج كسني اسفع . اطراسها ليكبي
اللون || لحيتها مأكولة فاخرة الصنف .

٢٠٢٤٤ - لَبَذَّة مَسِيك ٥

Rhodopaxillus sordidus (S).

Rhodopaxille sordide (F).

نوع من اللبذ . يعيش على الدبال في حواشي الغابات .
ساقه معتدلة الجرم بنفسجية اللون . ذكتة منتشرة الصفحة
المستديرة ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى البنفسجي .
اطراسها الى الغبرة اليليكية الموج || لحيتها جيدة الصنف ،
مأكولة .

٢٠٢٤٥ - لَبَذ ٥

Adenocarpus (S).

Adenocarpe (F). *Adenocarpus* (E).

جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة القرنيات الفرائشية .

من عضوية ومعنية || أنواعها المعروفة كثيرة أشهرها الثلاثة التالية :

٢٥٢٦٧ - ليكوريديس بهي^٥ Lycoris radiata (S).
Lycoride rayonnante (F).

نوع من الليكوريدس . عشية دوفسية سريرية منبتها الصين واليابان . شراخها يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها قدية الشكل تعرض نحو ٢ سم . نصلها الى الخضر البحري . أزهارها قصيرة التكوين منبسة البتلات النجمية الشكل ، قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الحمرة القرمزية بطولها اطار ابيض || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٢٦٨ - ليكوريديس مدني^٥

Lycoris sanguinea (S). Lycoride rouge-sang (F).
نوع من الليكوريدس . عشية دوفسية سريرية . منبتها اليابان . شراخها يعلو من ٣٥ الى ٥٠ سم . أوراقها صغيرة نخيلة ، تظهر بعد الازهار ، لونها الى الخضر الالامس . أزهارها معتدلة الحجم تطلو من ٤ الى ٦ سم . قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الحمرة الدامية اللامعة || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٢٥٢٦٩ - ليكوريديس مدني^٥

Lycoris aurea (S). Lycoride dorée (F).
نوع من الليكوريدس . عشية دوفسية جادة مطلية . منبتها الصين . شراخها يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها قدية الشكل ، نصلها الى الخضر البحري . أزهارها عادية الارتفاع تطلو نحو ٨ سم . لونها الى الصفار الذهبي || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥٢٧٠ - ليكوس^٥

Lycus (S).
Lycus (F). Lycus (E).
جنس حشرات من فصيلة الليكوسيات . وربة مخدات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة ، منتشرة في بعض المناطق الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، هيفاء ، تطلو من ٧ الى ١٢ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشارية غيبية . كواسلها شبه مربعة الشكل . اغمارها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة || الحشرة الجملانة خاضعة وراشعة ، اما البرقة ففترسة .

٢٥٢٧١ - ليكوسيات^٥

Lycidae (S).
Lycidés (F). Lycidae (E).
فصيلة حشرات من مخدات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اصقاع البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبيط ، تطلو من ١ الى ١٥ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها وبلاستها نظامية . قرونها الاستشارية غيبية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها صغيرة . اغمارها لاحفة . رشفة . ارساغها خاسية المعقل || أشهر اجناسها الليكوس .

٢٥٢٧٢ - ليكوفوسيه أرجوانية^٥

Lycophotia porphyrea (S). Lycophotia pourpre (F).
Lycophotia porphyrea (E).
حشرة من الفسقيات حرشفات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية

كثير القد ، يطول نحو ١٠٠ سم . تتميز بمشطها الثاني الانسان الذرية الحادة الذي يتقدم الزعنفة الظهرية . اعطائها شرق البحر المتوسط . يكثر وجودها في العمق . لحمها مأكول متوسط الصنف .

٢٥٢٧٦ - ليقة^٥ Pellicule (F). Pellicle (E).
الليق : قشر القصب اللازم به . الواحدة ليقة .

٢٥٢٧٧ - ليقييات^٥ Lygaeidae
فصيلة حشرات من تصفيات الجناح تدعى ايضاً طثريات .

٢٥٢٧٨ - ليف^٥ هو اللوف ، اطله .

٢٥٢٧٩ - ليفياني ، ليفي^٥ Filamenteux (F).
ما كانت نسجه ليفية التركيب . Filamentous (E).

٢٥٢٨٠ - ليقة ، ليف^٥ Fibre (bot.)
الليف خلايا مستطيلة مريدة الشكل ، خشبية الجدران تجتمع على شكل نسيج ليفي .

٢٥٢٨١ - ليفين^٥ ، بيئسوس^٥ Byssus (F).
Byssus (E).

مادة ليفية شديدة النعومة تعزرها بعض الرخويات للاتصاق بالصخور المغمورة بالماء . وقد يحاك منها نسيج انم من الحرير لوناً الى الخلفي الذهبي المواج .

٢٥٢٨٢ - ليفي^٥ ، بيئسوسي^٥ Byssogène (F).
Byssogenic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالليف كالعدة الليفية وغيرها .

٢٥٢٨٣ - ليفي^٥ Ligneux (F). Ligneous (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات الخشوية السوق والفروع .

٢٥٢٨٤ - ليفين^٥ Fibrine
هي الفبرين ، مادة آحية حيوانية او نباتية تستخرج من الدم في الحيوان على شكل خيوط بيض .

٢٥٢٨٥ - ليكاست^٥ Lycaste (S). Lycaste (F).
جنس نباتات معمرة تارية او امعية من فصيلة السطليات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها امريكية المهد وقد انتشرت زراعتها المربية التزيينية في معظم اقطار المعمورة . سوقها دوفسية تطلو من ٤ الى ٨ سم . أوراقها قليلة العدد معتقة ، كبيرة النصال تطلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . أزهارها وحيدة كبيرة قطرها يراوح من ١٢ الى ٢٠ سم . ترتكز على شاربين دقيقة ليفية تطلو من ٢٥ الى ٤٠ سم . اللون أزهارها عديدة اكثرا الابيض والاحمر والاصفر والابيض المروشن بالجوهر والاصفر المرسط بالكسني ... تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى اواخر اذار .

٢٥٢٨٦ - ليكوريديس^٥ Lycoris (S).
Lycoride (F). Lycoris (E).

جنس نباتات عشية دوفسية من فصيلة الترسجات . منبتها الصين واليابان . شاربها مصمتة . أوراقها ضيقة النصال . أزهارها شبه قمية الشكل صفراء اللون او حمراء || تزهر للذين ضمن البيوت وفي الحلاتق . قروب في الاتربة المنسوبة التركيب التعصري الوافرة المواد الغذائية



ليكاس



ليكوس



ليكوفوسيه ارجوانية

قوتها رقيق الأزهار . سرقتها تعيش على أوراق الخلدنجيات وأغصانها السهم ٣١ م . رأسها فاسي الشكل . عيناها كبيرتان . يسلطها نحو ١٢ م .

زبانها غطيان . مرشها معتدل الجرم والعلول . جوشها

ويطلب إلى الكلفة المشيرة للأرجواني || روشنا الامانيان

إلى الخمرة الاجوانية تملوها زركشة بيضاء وتزاورق سود

ورقطة حنطية . روشنا الخلفيان إلى الكلفة بملوها موج

اشنح وحار اسم يستيق الاهداب التنية || لها جيل

واحد في الحول . تظهر . القراشة في حزيران وتبقى حتى

آب . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة

اسبوع وتمتد المكان محاذيا على الصفحات السفلى من

نصال الارواق || السرعة عند بلوغها الإدراك التام تطول

نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار .

قوتها إلى الخضار الاطحل تملوها ثلاثة عطلوط غبراء اللون

يتوسطها الجوزي الاسود الموج . رأسها إلى الجؤوة .

مدى إلى الطحلة . رواجها سود || طور الاكمال الذي

يستر من اسبوعين إلى ثلاثة اسابيع ينتفي في التربة

ضمن جلباب من الطين يلحف السرعة .

٢٥٢٧٣ - ليكوفوسيه ناهمة*

Lycophotia saucia (S). Lycophotia polyphage (F).
Lycophotia saucia (E).

حشرة من فصيلة الفسيقيات حشرقيات الاجنحة . موطنها

يمتد من الشرق الأوسط إلى اوروبا وافريقية الشمالية والبلاد

الارريقية . فراشتها جارية قوتها رقيق الأزهار . سرقتها

خاضعة ناهمة تعيش على أوراق النباتات المختلفة من البقول

إلى النباتات الزراعية والصناعية والزينة والاشجار المشرة ||

جسمها متوسط القد بطول نحو ١٨ م . يسلطها تراوح من

٤٠ إلى ٥٠ م . رأسها فاسي الشكل . عيناها كبيرتان .

زبانها غطيان . مرشها معتدل الجرم والعلول . جوشها

ويطلب إلى الخنطى الاسمر الموج || روشنا الامانيان

إلى الجؤوة الصنابية الموج تملوها زركشة وتزاورق سمره

اللون . روشنا الخلفيان إلى البياض الاخير يطوق حنار

حنطى || لها ثلاثة اجيال في الحول . تظهر قراشة الجليل

الاول في نيسان وقراشة الجليل الثاني في حزيران وقراشة

الجيل الثالث في ايلول . تسرح في الليل وتماطل بعد ظهورها

بنحو عشرة ايام وتقتد المكان مجموعات متناهية العدد على

الصفحات السفلى من نصال الارواق التي تلتاس التربة ||

الطور الاسروي يستر نحو ستة اسابيع في الجليلين الاول

والثاني ونحو ٢٧ اسبوعا في الجليل الثالث . والسرقة عند

ادراكها الكمال الجسموري تطول من ٤٠ إلى ٤٥ م .

جسمها مستدق المقدم مستطيل المؤخر . قوتها تتداخل

السرقة والكهة يطعوه غط لبيبي اسود تبرزه نقط صفر .

رأسها منقط بالاسود || طور الاكمال الذي يستر من

اسبوعين إلى ثلاثة اسابيع ، في جميع الاجيال ، ينتفي

في التربة ضمن جلباب من الطين .

٢٥٢٧٤ - ليك

Courlison (F). Whimbrel (E).

الليل هو فرخ الكروان . يقال فلان اجبن من ليل .

٢٥٢٧٥ - ليك* ، ليتج ، ليتج

Syringa (S). Lilas (F). Lilac, Pipe tree (E). Lilac,

Flider (D). Lilacco, Siringa lilas, Sereenila (I).

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الزيتونيات . انواعه

عديدة منها الجنبات والاشجار . افنانها واراقها متعاقبة .

ازهارها قنوي التجميع ، ناجي الايزكاز . ازهارها قصيرة

٢٥٢٧٦ - ليك أزرق ، ليك مبدل

هو الأفران ، اطلية .

Lilas commun (F).

Syringa pubescens (S). ليك أزغب

Lilas pubescent (F).

نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ م .

سم . فروعه جؤوية اللون . اوراقها بيضيه ذرية ، نصلها

خلل البشرة على صفحته . ازهارها مستطيلة الشكل ،

ارجوانية اللون ، ياسينية العرف المستحب || ازهاره

يستمر طوال شهر ايار .

٢٥٢٧٨ - ليك حماليا

Syringa emodi (S). Lilas de l'Himalaya (F).

نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ م .

سم . اوراقها اهليجية الشكل نصلها اسم المروق ، خلل

البشرة السفلى . ازهارها مزينة ، غبراء اللون ، كريمة

الرائحة || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٢٧٩ - ليك ريشي

Syringa pinnatifolia (S). Lilas à feuilles pennées (F).

نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ م .

سم . اوراقها مركبة ريشية . وريقاتها سباعية او تساعية

العدد ، نصلها أزغب الصفحة السفلى . ازهارها ودية

اللون خاتبة العرف || ازهاره يستمر من نيسان إلى ايار .

٢٥٢٨٠ - ليك صيني

Syringa chinensis (S). Lilas de Chine (F).

نوع من اليلك التريبي تجرته تملو من ٥ إلى ٦ أمتار .

اوراقها سنائية النصل مستطيلة الاعناق الجؤوية اللون .

ازهارها إلى البياض الثلجي شكل كريمة الرائحة || ازهاره

يستمر من ايار إلى حزيران .

٢٥٢٨١ - ليك عريض الورق

Syringa oblata (S). Lilas à larges feuilles (F).

نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ م .

اوراقها مستعرضة تطول وتعرض نحو ١٢ سم .

نصلها لامع البشرة على صفحته ، شبه الخشخاش الباق .

ازهارها ليكية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره

قصير الادم يدوم نحو ٢٠ يوما ابتداء من النصف الثاني

من نيسان .

٢٥٢٨٢ - ليك فارسي

Syringa persica (S). Lilas de Perse (F).

نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ م .

افنادها وانفانها نخلة . اوراقها سنائية ، نصلها

جامد الصفحة زاهر الخشخاش بطول نحو ٤ سم . ازهاره

بنفسجية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره يستمر

من ايار إلى حزيران .

٢٥٢٨٣ - ليك ياباني

Syringa japonica (S). Lilas japonais (F).

نوع من اليلك التريبي ، تجرته تملو من ٥ إلى ٧ أمتار .

اوراقها سنائية ذرية ، نصلها خلل الصفحة السفلى .

بحري اللون ، ازهارها عادمة العرف ، لونها إلى البياض

الثلجي ، قنوها كبير القد بطول نحو ٣٠ م . ويرض نحو

٢٠ م . تنوره يستمر طوال شهر حزيران .



ليكوفوسيه ناهمة



ليك

الكهباة اللون بين تكون الصفحة اليسرى يضاء اللون غبراء الموج . وهي من الاسماك المأكولة المستحبة الطعم .

٢٥٢٨٤ - تَبَيَّات

هي النسيقات ، فصيلة حشرات ، اطلبها .

٢٥٢٨٥ - تَبَيَّة

هي النسيقة من الحشرات ، اطلبها .

٢٥٢٨٦ - تَبَيَّةُ الْجُنَجُل * هَيْتَالُ الْجُنَجُلْ

Hepialus humuli (S). *Hépiale du houblon*, *Phalène du houblon* (F). *Ghost swift moth* (E). *Hopfenwurzelbohrer* (D).

حشرة من الليليات ، جسمها غليظ الشكل حنظلي اللون ، بسطها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . الاثنى اكبر حجماً من الذكر . رواشها الى الصفرة الوردية يعولها تقيح احر . رواش الذكر فضية اللون جزوية الاهداب . جيلها الحولي واحد . يكثر وجودها من حزيران الى تموز . تعيش يرقها على جنور الينجل لتعضها وتؤذيها .

٢٥٢٨٧ - تَبَيَّةُ قَارَضَةٍ

هي فراشة النودة القارضة ، راجعها .

٢٥٢٨٨ - لَيْلِيَّة

Laelia (S). *Lélie* (F). *Laelia* (E).

جنس نباتات عشبية اُمية من فصيلة السحليات . شاربها لقياسية الارتفاع . اوراقها سمكية النصال القاسية . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة بعضها عطري العرف || انواعها المعروفة قليلة ، اشهرها التالية :

٢٥٢٨٩ - لَيْلِيَّةُ خَرَّاشِيَّةٌ *

Laelia furfuracea (S). *Lélie furfuracée* (F).

نوع من الليلية منبتها المكسيك . ساقها رفيعة تدار نحو ٧٠ سم . اوراقها عديدة اهليلجية النصال الخراشية الصفحات العليا . ازهارها كبيرة القند عطرة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البياض المجاني يعولها في وسطها بقعة مستديرة صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٥٢٩٠ - لَيْلِيَّةُ قَرْمَةٍ *

Laelia pumila (S). *Lélie naine* (F).

نوع من الليلية . ساقها دقة مستطيلة منتصبة تحمل ورقة واحدة اهليلجية النصل . زهرها وحيدة كبيرة القند ، وردية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم . وهي فواحة العرف النمل ، ترتكز على شراخ يرتفع نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر عدة اسابيع بين ايلول وتشرين الاول .

٢٥٢٩١ - لَيْلِيَّةُ مُسْتَطِيلَةُ الْإِهَانِ *

Laelia pedunculata (S). *Lélie à long pedoncule* (F).

نوع من الليلية . منبتها المكسيك . ساقها شراخية قصيرة تحمل ورقة واحدة اهليلجية النصل المقطوم الطرف . ازهارها وردية اللون مبتجة بالبنيجي || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٥٢٩٢ - لَيْمَنْدَةٌ *

Limanda vulgaris (S). *Limande*, *Lime* (F). *Dab* (E).

سمكة بحرية من الملساوات الجانيبات العوم تنتمي الى جنس احساك موسى . جسمها بيضي الشكل مبطط القالب يطول نحو ٣٠ سم . وهي تتميز باختلاف لون صفحي جسمها وبارتكاز عينيها الواحدة فوق الاخرى على الصفحة اليمنى



لَيْلِيَّةُ الْجُنَجُلْ



لَيْلِيَّةُ خَرَّاشِيَّةٌ



لَيْمَنْدَةٌ



لَيْمُون

٢٥٢٩٣ - لَيْمُونُغَالُ عَقَّاسِ *

Limnogaes mergulus (S). *Limnogaie plongeur* (F). حيوان لبون حاشر من فصيلة المذاليات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف ضفاف مجاري الماء . قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القند مكرهم يطول نحو ٢٦ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٣ سم . رأسه فيه مخروفي الشكل مستطيل الخطم . عيناه واذناه صغيرتان . جوارزه قصيرة . جميع اصابعه مخفية مما يساعده على السباحة والغوص ثوبه الى الشقعة السمراء . وبره دقيق ناعم || الاثنى ثور تقص في كل رص من ٨ الى ١٠ جراه .

٢٥٢٩٤ - لَيْمُونُفِيلِيَّاتِ *

Limnophiliidae (S). *Limnophiliidés* (F). *Limnophiliidae* (E). فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متباينة الحجم . اثارها تراوح من الطلحة الى السمرة . ملاسها الفكية ثلاثية الاجزاء عند الذكور ، خماسية عند الاناث . رثامها موجودة . اجنحتها الامامية رفيعة يعولها بعض الخمل المبتر . قوائمها الامامية مجعزة بمنخس ظنبوي الارتكاز . قوائمها الوسطى ثلاثية المناخس || اساريمها تعيش في الماء ملحوقة بمجلايب مختلفة الاشكال منها الاسطوانية والمخروطية والمهرمسة والمبططة . اشهر اجناسها :

Limnophilus (S). **الليمونيل**
Anabolia (S). **الانابوليا**
Grammotaulius (S). **الغراموتولوس**
Colpotaulius (S). **الكولتولوس**
Mesophylax (S). **الميزوفيلاكس**
Halesus (S). **الهلسوس**
Drusus (S). **الدروسوس**
Enicocyla (S). **العتيل**

٢٥٢٩٥ - لَيْمُونُ *

Lemur (S). *Lémur* (F). *Lemur* (E). جنس حيوانات لاحة صغيرة من الليموريات . انواعها المعروفة اربعة . مهداة فضاب وبرنقات جزيرة مدغشقر . جميعها مستسلمة الشكل ، مستطيلة الاجسام الرشقة والاذنان الجلفة || تألف الغابات . تسرح في الليل او في النهار . قوتها الحشرات والغطاء وتختلف الزخافات والطير والبار .

٢٥٢٩٦ - لَيْمُونُورِيَّاتِ *

Lémuriens, *Prosimiens* (F). **لَيْمُونُورِيَّاتِ** رتبة حيوانات لبونة من القرصيات المشيمات تشمل ا فصائل تضم بعض الاجناس والعديد من الانواع . جميعها صغيرة القند ، رشقة القوام ، مستطيلة الاذنان .

٢٥٢٩٧ - لَيْمُونُ *

Citrus (S). جنس اشجار وتجويرات مشمرة رية وزارعية من الحمضيات . انواعها عديدة اعطائها البلاد الحارة . سويتها منتصبة فراءه ، فناء ، حسقة . اوراقها معنقة ، نصالها مستطيلة لامعة الخضار . ازهارها خنثوية متفرقة عطرة . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . يغلب فيها الاخضر الاصفر

منها الحلوة المأكولة ومنها الحامضة ومنها الحامضة المرة . أشهر أنواعها ما يلي .

٢٥٢٩٨ - **لَيْمُونُ أَصَالِيَا *** ، **بَرْغَمُوت** ، **زُبُونُ**
Citrus bergamota, C. bergamia (S). Bergamotier, Bergamottier (F). Bergamot orange (E). Bergamot-tensitrone (D). Bergamotta (I).

نوع من الليمون الزراعي المجهول المهد . تذكر زراعته الصناعية في بعض سواحل المتوسط اخصها السواحل الإيطالية حيث يستخرجون من قشور ثماره عطر الربوحت . ثمرته صغيرة القد ، اغصانها منفرجة . اثمارها ولبها خضراء اللون . اوراقها مستطيلة الاضلاع . ازهارها بيضاء اللون ، فواحة العرف المطري . ثمارها برمية الشكل مقطوعة الرأس . قشورها كثيفة الجيوب العطرية غزيرة المادة . عصارة حمضها حامضة .

٢٥٢٩٩ - **لَيْمُونُ أَقْنَدِي *** ، **يُوسُفُ أَقْنَدِي *** ، **يُوسُفِي** ، **مَنْدَارِين**

Citrus nobilis, C. nobilis deliciosa, C. delictiosa (S). Mandarinier (F). Mandarin orange (E). Mandarine, Jericho Orangenbaum (D). Mandarina (I).

نوع من الليمون الزراعي المشتر . فروبه واصرامه عديدة ، مهدا الصين وقد عمت زراعتها معظم المناطق الحارة اخصها البحرية . اثماره صغيرة القد تملو من مَرْنٍ الى سبعة اثمار . سوقها منتصبة ، اغصانها منفرجة ، اثمارها فناء . اثمارها دقيقة مستطيلة ، اوراقها متعاقبة ، معتقة ، بسيطة . نصلها اهلجيلي الشكل ، ذلق الزام الاخير ، لونه الى الخضرة الباقية . ازهارها بيضاء اللون خافتة العرف . ثمارها مستديرة منتفخة القطنين تلمس من ه الى ٧ سم . قشورها متعللة رافعة تفيض لا ترضع بالخصوص . وهي غيرة المسود العطرية الذكية العرف . لونها عند الادراك براوح من الاصفر الاخضر المالح الى الاصفر الصناعي الاجر التويج . لباب حمضها مستحب النكهة ، سكري الطعم غني ببعض الحولص الصحية النافعة . (راجع جدول التسومة (Satsuma) ثمارها زاهية اللون الاصفر الصناعي ، حامدة البذر ، معتدة العرف والنكهة . ثمرتها متوسطة القد تتحمل الصقرب خاصة اذا كان طعمها ليمون بري || واليوسفي رقيق في الارربة العميقة النور ، الحضية والقليلة الاندماج . متطلباته الغذائية لا تقل عن متطلبات البرتقال لانه شره يستدرف العناصر العضوية والمعدنية بسرعة .

٢٥٣٠٠ - **لَيْمُونُ الْبَحْرِ ***

Ximenia americana (S). Ximénie, Prune de mer (F). جنية مشمرة من فصيلة ال زيتونيات . مهدا المناطق الاستوائية الافريقية والامريكية . ساقها فروع . فروصها اقية الاثنا عشر قصيرة القاب . اوراقها متعاقبة ، سنانية النصل الجامد ثمارها خضوية الشكل والقد ، حامدة الطعم ، مأكولة .

٢٥٣٠١ - **لَيْمُونُ الْجَنَّةِ *** ، **كُورْبُفُوت** ، **كُورْبُفُون**
Citrus decumana paradisi, C. paradisi (S). Grapefruit (F). Grape-fruit (E). Lederorangenbaum (D). Pomeli (I).

ضرب من الليمون الهندي الزراعي . ثمرته تملو من ٨ الى ٨ اثمار . ساقها واثانها قليلة الحسب القصير ، اغصانها فارقة . اثمارها قليلة الكثافة . اوراقها كبيرة القد بيضوية الشكل . ثمارها كثار الليمون الهندي شكله وحجمه ولونها الا انها اجد عصارة واقل مرارة وحوضه وهي توكل مع السكر .

Oranger

٢٥٣٠٢ - **لَيْمُونُ بَرْتَقَال**
هو البرتقال ، اطلبه .

٢٥٣٠٣ - **لَيْمُونُ بَرِّي**

Citrus trifoliata, C. triptera, Poncirus trifoliatus (S). Citronnier à 3 folioles (F).

نوع من الليمون مهد الصين واليابان . ثمرته سبروتية صغيرة القد تملو نحو ٣ اثمار . ساقها منتصبة حسة فروعها . فروصها قليلة الانفرج متوسطة الاتناد والاثان . اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . وريقاتها اهلجيلية النصل المسن المقطوم الطرف . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون خافتة العرف . ثمارها بحجم التفاحة الصغيرة وهي حامدة مرة لا توكل . قشورها رقيقة لونها الى الصفار الباهت . وهو شائع الاستعمال كالتارنج لانه يبرز لتطعيم نظراً لنشاطه ومناعته وسرعة اثماره وقوة احماله الصقرب .

٢٥٣٠٤ - **لَيْمُونُ حَامِص ***

Citrus medica (S). Citronnier, Limonier (F). Lemon tree, Common lemon (E). Limonenitrone (D). Citreno, Limone (I).

نوع من الليمون الزراعي السبروتي . مهد المشرق الهندي الصينية وجوارها . فروبه واصرامه عديدة . اثمارها تملو من ٣ الى ٦ اثمار . سوقها وفروعها حسة . حسفها حاد الحمة يطول نحو ٣ سم . اغصانها فارقة . اثمارها ونوابها موشحة بالبنفسجي . اوراقها متعاقبة معتقة . اثمارها عادمة الجناح ، نصلها بيضبة الصفحة المستطيلة المشارة الحافة . ازهارها خماسية الفصل ، فواحة العرف المطري ، لونها الى البياض تشوبه ماجة أرجوانية . ثمارها بيضبة مستطيلة تنتهي بنذلة صغيرة عادمة الطوق . عصارة حمضها حامضة الطعم عادمة المرارة .

٢٥٣٠٥ - **لَيْمُونُ حُلُو ***

Citrus aurantium foliola, C. limetta, C. limonium dulcis (S). Limettier doux, Limonier doux (F). Sweet lemon tree (E). Süsse Limone (D). Limone douce (I).

نوع من الليمون الزراعي المأكول الثار . ثمرته تملو من ٥ الى ٧ اثمار . ساقها وفروعها حسة . اغصانها متوسطة الانفرج . اثمارها ونوابها فسقية اللون . اوراقها متعاقبة الاضلاع . نصلها بيضبة المنتفخة ، مسنة الاضلاع . ازهارها عطرية ، بيضاء اللون ، صفراء المالح . ثمارها مستديرة تنتهي بحلينة مقطوعة . قشورها ماسة ، باهة الصفار . حمضها غزيرة العصارة الحالية من الحامض الليموني .

٢٥٣٠٦ - **لَيْمُونُ كُمُكَات *** ، **كُمُكَات ٥**

Citrus japonica (S). Kumquat (F).

نوع من الليمون الزراعي المشتر ، مهد اليابان وفروصا ثمرته تشبه ثمره اليوسفي ، اوراقها سنانية النصل العباقي الحفصار . ثمارها توكل بكاملها عند الادراك وهي صغيرة الحجم كروية الشكل او مستطيلة . قشورها مالة سيكة اللباب ، حمضها دقيقة لا تخلو من الحموضة || اقليمه اقليم ويني وقد يستزله مناعة واتساعاً اذا طعم على الليمون البري . فروبه المشهورة اثنان المستدبر والمستطيل . راجع ككات .



ليمون اضاياي



ليمون اقندي



ليمون البحر



ليمون الجنة



ليمون حامض



ليمون حلو



ليمون ككات

٢٥٣٠٧ - **لِيمُون مَالِح * ، لِيمُون مِصْرِي ،**

بَشْزَهِير
Citrus limonum pusilla (S).
Limon d'Egypte, Petit limon d'Egypte (F). Egyptian small lime (E). Ägyptische kleine Limonenzitronen (D). Limone piccolo, Limoncello calabrese (I).

نوع من الليمون الحامض . أصله البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر والهند وبعض المناطق الأمريكية . ثمرته صغيرة القذ تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . اغصانها متعرجة . اثمارها خضراء . أوراقها بحرية اللون ، مجنحة الأضلاع ، بيضيه النصل . أزهارها صغيرة القذ بيضاء اللون ، ثمارها صغيرة شبه كروية . قشورها مألسة رقيقة ، حصوصها غزيرة الصلابة الخشوية .



ليمون مالح

٢٥٣٠٨ - **لِيمُون هِنْدِي * ، قَرَاكِين**

Citrus decumana, C. maxima (S). Pamplemoussier, Chaddèq tree, Schaddock tree (E). Pampelmusorangenbaum (D). Pompa di Genova, Pampelmo (I).

نوع من الليمون الزراعي ، مهدد المقدر جزر الزايج . ثمرته تملو من ٥ إلى ١٠ أمتار . ساقها واغصانها خضراء . اثمارها زباد اللحم . أوراقها كبيرة القذ تملو نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٥ اضلاعها مجنحة ، نصلها بيضيه جامدة لامعة المخضار . ازهارها عشقودي التجميع يغم من ٦ إلى ١٠ انوار كبيرة القذ ، يضاء اللون ، مستحبة العرف الطعري . ثمارها مستديرة ، منخفضة الرأس والعقب . قشرها براوح من ١٠ إلى ١٥ سم . قشورها مميكة خشنة لونها الى الصفرة . حصوصها كبيرة الحجم ، متوسطة الصلابة الحامزة المرة المأكولة مع السكر .

٢٥٣٠٩ - **لِيمُونَات ، سِيْتَرَات**

Citrate
٢٥٣١٠ - **لِيمُونَة**
Citron (F). Citron, Lemon (E).
هي ثمرة الليمون الحامض .

٢٥٣١١ - **لِيمُونَة حَنُوزَة**

Limette, Lime (F).
Lime (E).
هي ثمرة الليمون الحلو .

٢٥٣١٢ - **لِيمُونَة هِنْدِيَة**

Pompoléon, Pométo, Pamplemousse, Chaddock (F).
هي ثمرة الليمون الهندي اي القراسكين . Shaddock (E).
٢٥٣١٣ - **لِيمُونِيْت ٥ ، هِيْمَاتِيْت أَسْمَر ٥**

Limonite, Hématite brune (F). Limonite, Brown haematite (E).
مدن حديدية اسمر اللون يعرف كياويو بأكسيد الحديد الهيدراتي الطبيعي . وزنه براوح من ٣٦ إلى ٤ وصلابته من ٥ إلى ٥٫٥ وهو تسري عدم التبلور والانتظام . اشكاله عديدة اخصها الليمونيت التي اللون والليمونيت الفلزي المعروف بالمرق الصفراء والليمونيت الشبكي والليمونيت المصحب .



ليمون هندي

٢٥٣١٤ - **لِيمُون الجِلْد**

Malacoderme (F).
Malacodermatous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان لين الجلد ان من الرغويات او غيرها .

٢٥٣١٥ - **لِيمُون العَظْم**

Ostéomalacie (F).
Osteomalacia (E).
شائية تصيب البشر الحلوب سبها نقص في الفسفور يعمد الى قلة نسبه في الاعشاب والاعلاف التي تتجتها الابقار .

٢٥٣١٦ - **لِيمُونَا الحَنُوز** هي نصارية الحور ، اطلبها .

٢٥٣١٧ - **لِيمُونَات الزَعَانِف**
Malacoctérygiens (F).
Malacoctérygii (E).
رتبه من الاسماك .

٢٥٣١٨ - **لِيمُونَات الصَدَف**
Malacostracées (F).
Malacostraca (E).
صفيغ حيوانات من القشريات .

٢٥٣١٩ - **لِيمُونَات الغِمد**
Malacodermes (F).
Malacoderma (E).
لمسة من الحشرات الغمدية الاجنحة شلت عن ريقاتها لكنونها لينة الأحماد . نصلها عديدة اشهرها البراريات .

٢٥٣٢٠ - **لِيمُونَارِيَة ، حَبَابِيْب**
Linaria (S).
Linaire (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخنازيريات .

انواعه نحو ١٢٠ منها الاشباب والجنبات الحولية والمعمره .
أوراقها واغصانها لا قياسية الشكل والتجميع والانتظام والارتكاز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٥٣٢١ - **لِيمُونَارِيَة أَرْجَوَانِيَة**

Linaria purpurea (S). Linaire pourpre (F).
نوع من الليناريه المعمره وهي بجملة جاسده تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها خفيقه خطيه . السفلى منها غميه التجميع والعليا متعاقبه . ازهارها عشقودي ارجوانيه اللون صغيره القذ || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٣٢٢ - **لِيمُونَارِيَة أَسَلِيَّة**
Linaria spartea (S).
Linaire jonciforme (F).
نوع من الليناريه الحولية وهي عشبه سريويه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها خفيقه مستطيله اسليه الشكل ، السفلى منها غميه التجميع ، أما العليا فتعاقبه وهي بحرية اللون قليله المدد . ازهارها الى الصفار الباهت ، قواعدها برتقاليه الموج . يزورها نمخده عاده المناح || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٥٣٢٣ - **لِيمُونَارِيَة بَاهِيَة**
Linaria pallida (S).
Linaire pâle (F).
نوع من الليناريه المعمره . ساقها مداده تملو نحو ٨٠ سم . أوراقها متعاقبه منعقه كبيرة القذ . نصلها مستدير الصفحه ، سباعي الفصوص . ازهارها عطريه العرف تملو نحو ٢ سم . لونها الى الزرقه الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٥٣٢٤ - **لِيمُونَارِيَة حَرَشَاء ، حَبَابِيْب أَحْرَش**

Linaria elatine (S). Linaire élatine, Muflier élatine, Velvete, Véronique femelle (F). Cancerwort, Pointed leaved toad-flax (E). Spiessleinkraut (D). Elatine, Linaria veronica, Veronica femmina (I).
نوع من الليناريه المعمره وهي بجملة خضراء حشراء تملو نحو ٦٠ سم . ترطب في الأرضه الطينيه . أوراقها ستانيه ، خفيقه ، متعاقبه . ازهارها صفراء اللون صغيره القذ . ازهارها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٥٣٢٥ - **لِيمُونَارِيَة خَمَلِيَّة**

Linaria pilosa (S).
Linaire velue (F).
نوع من الليناريه المعمره . ساقها مداده تملو نحو ١٢٠ سم . أوراقها كبيرة القذ كثيره التفصيص . نصلها خطي البشره الحبل اللون . ازهارها متوسطه القذ لونها الى الزرقه اللينسيجه || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٥٣٢١ - لينارية دلماسية

Linaria dalmatica (S). Linaire de Dalmatie (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. أوراقها لاطئة متعاقبة. نصلها سائي الشكل، مستعرض القاعدة، مجري اللون. أزهارها كبيرة القذ تطلو من ٣ إلى ٤ سم. لونها إلى الصفرة الزاهية || أزهارها يستمر من تموز إلى آب .

٢٥٣٢٧ - لينارية صناعية ، حجاب الشقوق

Linaria cymbalaria (S). Linaire cymbalaire, Cymbalaire, Ruines de Rome, Lierre des murailles (F). Cymbalaria, Ivy leaved toad-flax, Kenilworth-ivy (E). Zimbelkraut, Gemeines Zimbelkraut (D). Linaria cimbalaria, Rovine di Roma (I).

نوع من اللينارية للمعمرة، تعيش بين الصخور وعلى الجدران القديمة. ساقها مستقيمة تطلو نحو ٨٠ سم. أوراقها متعاقبة مستعرضة خاسية الفصوص. نصلها احر الصفرة السفل. أزهارها ليلية اللون صغيرة القذ || أزهارها يستمر من ايار إلى تشرين .

٢٥٣٢٨ - لينارية عادية * ، حجاب مبدل

جوز أرماتيس ، مخلص

Linaria vulgaris (S). Linaire commune, L. vulgaire, Muffler bâtard, Lin sauvage (F). Butter and eggs, Dragon-bushes, Toad-flax (E). Flackskraut, Frauenflachsleinkraut, Leinkraut (D). Linaria comune, Abrotano salvatico, Urinaria (I).

نوع من اللينارية البرية الطيبة المبدولة المعمرة ، تكثر في البور وعلى حافة الطرقات . يمتلأ تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها متعاقبة ، نصلها ضيق الصفرة ثلاثي الورق مجري اللون . أزهارها إلى الصفار الباهت يعلوها عند قواعدها مواج اسفح || أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول . أوراقها وأزهارها كريمة الرائحة تستعمل ضد البواسير .

٢٥٣٢٩ - لينارية كبيرة الزهر

Linaria grandiflora (S). Linaire à grandes fleurs (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٧٠ إلى ١٤٠ سم. أوراقها غنية التجميع ، نصلها خطي الشكل مجري اللون . أزهارها نورية ، كبيرة القذ تطلو نحو ٤ سم. لونها إلى البنفسجي يعلو بتجميع ارجواني وبشحة صفراء . أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول .

٢٥٣٣٠ - لينارية كركهانية

Linaria amethystea (S). Linaire améthyste (F).

نوع من اللينارية الحولية وهي عشية مثولة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها خطية لا قياسية التجميع والانتظام لونها إلى الخضار البحري . أزهارها كركهانية اللون يعلوها عند قواعدها مواج بنفسجي || أزهارها يستمر من تموز إلى آب .

٢٥٣٣١ - لينارية مراكشية

Linaria maroccana (S). Linaire marocaine (F).

نوع من اللينارية الحولية وهي عشية سريرية تملو من ٢٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها مدنية لا قياسية التجميع والارتكاز. نصلها خلي البشرة اطلل اللون . أزهارها كبيرة القذ بنفسجية اللون ارجوانية المواج || أزهارها يستمر طولا فصل الصيف .

٢٥٣٣٢ - لينارية مقدونية

Linaria macedonica (S). Linaire de Macédoine (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سريرية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. أوراقها لاطئة، نصلها يفضي الشكل ذات الزوايا الأخير . أزهارها مستطيلة الاذن، متوسطة الحجم، لونها إلى الصفرة الزاهية . أزهارها يستمر طولا فصل الصيف .

٢٥٣٣٣ - لينارية ورقية

Linaria genistefolia (S). Linaire à feuilles de genêt (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سريرية صغيرة القذ تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها لاطئة ، متعاقبة ، نصلها كالزوايا وهو جامد الصفرة مجري اللون . أزهارها متوسطة القذ ، قصيرة الاذن باهتة الصفار || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب .

٢٥٣٣٤ - لينيت ٥ ، لجنت

Lignite هو الخشب المتفحم والقحم الاذكن . نوع من الفحم الحجري الحديث العهد المتوسط الصلابة .

٢٥٣٣٥ - لينين

Lignine هي اللينين ، المواد الكيماوية الطبيعية ، التي تطلل الصلابة والقوة في النج النباتية الخشبية .

٢٥٣٣٦ - ليوت ٥ *

Alstroemeria ligata (S).

Liuto (F).

نبات عشبي زراعي من فصيلة الترجسيات . أصلاته البلاد الامريكية . تكثر زراعته في البيرو والشيلى . درناؤه مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم يستخرج منها لبوب يدعى « شونو » لذية الطعم شائع الاستعمال يقيد المرعى واصحاب المدة والامناء الضعيفة لانه سريع الحضم عادم الانفعال مع اي طعام كان .

٢٥٣٣٧ - ليوت عفرين

Myrmelionides (F).

Myrmelionides, Ant-lions (E).

هي المويفيات ، فصيلة حشرات من عصبيات الجناح .

٢٥٣٣٨ - ليود ٥ *

Liods (S).

Liods (F). Liods (E).

جنس حشرات من فصيلة الليوديات ورقية غمديات الاجنحة انواعه المعروفة قليلة ، نحو ١٢ ، أعطائها تشعل معظم اقاليم النصف الشمالي من الكرة الارضية || اجسامها صغيرة ، محدبة ، اهليجية الشكل ، تطلو من ٤ إلى ٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . ملاسها قصيرة . قربها الاستشعارية صولجانية . كواسلها مستعرضة . اغداها لاحقة ، تحلة التخديد القاطب . قوائمها نشيطة مهدبة . اثوابها ملونة لامة || تعيش على الفطور الدالية وفي الاعشاب النخرة .

٢٥٣٣٩ - ليودييات ٥

Liodidae (S).

Liodidae (F). Liodidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، محدبة ، تطلو من ٢ إلى ٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها قياسية . ملاسها قصيرة . قربها الاستشعارية صولجانية . كواسلها



لينارية عادية



ليوت



ليود

فرعاء تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ايّدة بقسيّة الشكل ،
تطول من ٥ الى ٦ سم. نصلها جامدة ، مألّة الصفحات
اللامعة . ازهارها علقى التجميع ، طرفي الارتكاز .
ازهارها بيضاء اللون ، متاكمها ارجوانية ، كمابرها ثلاثية
المصاريع || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .


مستعرضة . اغمارها لاحقة . اثلواها ملوئة لماعة || تميش
عل القطور الذابلة والمنحلة وفي الاخشاب النخوة والدردي
وتحت اللحاء || اشهر اجناسها اللّسود والليفيل .

٢٥٣٤٠ - لبوفيل بقسيّ الورق °

Leiophyllum buxifolium (S).

Leiophyllum à feuilles de buis (F).

جنبه برية وتزيينية معمرة من فصيلة الخلنجيات . ساقها



٢٥٣٤٨ - مَات - Diluer (F). To dilute (E).

مات الشيء اذا به . مات الملح في الماء . مات الكلس في الماء .

٢٥٣٤٩ - مَالِيَّة * Candélabre (F). Pyramidal fruit-tree (E).

شكل من اشكال التشذيب خاص بالشجر المسند ويسمى شمعدان .

٢٥٣٥٠ - مَاجَة، مَوَاج - Reflet (F). Reflection (E).

٢٥٣٥١ - مَاجِدَة ٥ ، زَهْرَة المَجْد

Cilanthus (S). Cilanthe (F). Glory-pea, Parrot's-bill (E). Prachtwicke, Ruhmesblume (D). Cilanto (I). جنس نباتات زرقية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها المعروفة قليلة . اعطانها جزر المحيط الهادي . سوقها مخشوشة ، اوراقها وزرة التركيب مشطية . ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل . سميت زهرة المجد لان جهالها يمجّد الخالق || اعرف انواعها ما يلي :

٢٥٣٥٢ - مَاجِدَة بَهِيَّة * Cilanthus speciosus (S). Cilanthe de Dampier (F).

نوع من الماجدة وهي جملة سرولية تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فروع . وريقاتها سنانية الشكل . نصلها نام للمس ، ففي البشرة . ازهارها خاسية او سداسية التجميع ، كبيرة القد ، تطول من ٨ الى ١٠ سم . لونها الى الاخمر الابرجواني يطولها عند قاعدة الزهرة بقعة جزوية لامة . ازهارها يستمر طولك الصيف .

٢٥٣٥٣ - مَاجِدَة عَاشَة ٥ Cilanthus punicens (S). Cilanthe ponceau (F).

نوع من الماجدة وهي جنبة سرولية عارضة تسلو نحو ١٢٠ سم . ساقها مشوكة الفروع . وريقاتها اعليجية .

٢٥٣٤١ - مَاء - Eau (F). Water (E).

جسم سائل عادم اللون والطعم والرائحة ، ثقله النسبي ١ وزنه الانبسي ١٨ يجمد عند بلوغه درجة الصفر وما دونها من المقياس الستيفرادي وينغل عند بلوغه نحو ١٠٠ مسغ في الضغط الجوي العادي || وهو من اكثر مواد الكون انتشاراً . يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات : حالة بخار في الجو . وحالة جاد في المواقع الباردة فيكون جليداً عند القطبين وتليجا في الجبال العالية . وحالة سائل في البحار والانهار والينابيع || والماء كايواً هو نتيجة تآلف حبيبي يتم بين الاكسجين والهيدروجين بنسبة ١ الى ٢ .

٢٥٣٤٢ - مَاء التَجِير Eau résiduaire (F).

Residuum water (E). هو الماء الناتج من معاليل السكر والنشا والتقطير .

٢٥٣٤٣ - مَاء الجَنِين Eau fontales (F).

سائل لزج خاص بغير الجنين في الرحم .

٢٥٣٤٤ - مَاء الرُغْس Eau aux jambes (F).

وصم يصيب الخليل في رصنها وحشيتها فيحدث فيها تشققات تسيل منه مادة مائعة كبرية الرائحة .

٢٥٣٤٥ - مَاء التَّعَابِي مَاء التَّجَارِي Eau d'égoûts (F). Sewage, Sullage (E).

هو ماء المنازل والشوارع .

٢٥٣٤٦ - مَاء التَّحَايِي مَاء الكُف Eau-vannes (F). Sewage (E).

هو خليط من الماء والبول والبرجيج الصادر عن الكف .

٢٥٣٤٧ - مَاء التَّزَال Purin (F). Dung-water (E).

سائل مركب من بول الحيوانات والماء المستعمل من الزيل .



مائلة



ماجدية

Substance (matière) (F). **مَادَّةٌ** - ٢٥٣٦٣
Matter (E).

Article (jur.) **مَادَّةٌ** - ٢٥٣٦٤
تقسم القوانين والمراسم والقرارات والعقود الى مواد. والمادة هي النص الواضح الشيء المقصود.

Corpus delicti (F). **مَادَّةُ الْجَرِيْمَةِ** - ٢٥٣٦٥
Corpus delicti (E).
هي الوقائع المادية التي تدل على الجريمة وصفتها.

Adjuvant **مَادَخ** - ٢٥٣٦٦
المواد المادخة، مواد قليلة تصاف الى بعض الادوية او الشحنت الغذائية فزيد نفعا الغذائي.

Nématocide (F). **مَادُوْد** - ٢٥٣٦٧
Nematocide (E).
كل مادة تستعمل في القضاء على الديدان الثعبانية.

Matérialisme (F). **مَادِيَّةٌ** - ٢٥٣٦٨
Materialism (E).
المادية مذهب القائلين بان لا يوجد في هذا الكون سوى مادة وحركة، وان الجيلة والحياة والضمير ما هي الا مناشع يفسرها تحطيل المادة والحركة.

Madi (S). Madi, Madie (F). **مَادِيَّةٌ** * - ٢٥٣٦٩
Madi, Tarweed (E). Olmadie (D). Madia (I).
نبات عشبي ينجم صناعي من فصيلة المركبات، مهدد الاصيل بلاد الشيلي زرع لبزوره التي يستخرج منها مادة دھنية تستعمل في صناعة الصابون. وقد زرع ايضا لاستعمال كسجاد خضري.

مَادِي - ٢٥٣٧٠
المادي: السِّلْ لايبس او الجديد او خالصة.

Capra falconeri (S). **مَارْحُورٌ** * - ٢٥٣٧١
Bouquetin markhor, Markhor, Chèvre de Falconer (F). Markhor (E).

اسم فارسي بمعنى آكل الحيات لانهم زعموا انه يأكلها. وهو نوع من الوعل ضروبه المعروفة اربعة اعطائها اسراج ومقرعات التبت والافغان وكشمير... يتميز باستطالة وانتصاب قرونه الخلزونية الضخمة. جسمه يطول نحو ١٣٥ سم. ويعمل نحو ١٠٠م. الاثنى اصفر جنة وقربا من الكرك. خلفها ثنائي الفرج وهي تقنع من جدي الى جبينين || والمارخور يعيش جماعات اجلها يد من ٢٠ الى ٥٠ و ٧٠ نفراً وهو يتصالب مع الماعز وتناجه تحسب السليلة.

Canna des Indes (F). **مَارْزُونَان** - ٢٥٣٧٢
هو قننا الهند، اطلبه.

مَارْزُونَانِيَّاتٌ، قَنُونِيَّاتٌ - ٢٥٣٧٣
Cannaceae (S). Cannaceae (F). Cannaceae (E).
فصيلة نباتية من رحيذات الفلقة عديدة الاجناس والانواع اشهرها المارزوان.

Enrymère (F). **مَارِغ** - ٢٥٣٧٤
مارغ او مارغة نمت تمرين يطلق على كل حشرة تركيب النباتات في جميع اعضاءها اخصها الهوائية من الساق الى الورقة والثمرة.

نصلها خلي البشرة، حريري الملمس، فضي اللون. ازهارها خماسية او سداسية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ سم. لوها الى الارضواني، قاعدة رايها بيضاء || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

Majidae (S). **مَاجِيَّاتٌ** - ٢٥٣٥٤
Majidés (F). Majidae (E).

فصيلة من القشريات عشاريات الارجل. قشريات الذيل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها بحرية اعطائها مجار البلاد المعروفة الحرارة || اجسامها متباينة القد، تطول من ١٢ الى ٢٤ سم. تتميز بدروعها المثنية الشائكة الاطراف وملاقطها الكبيرة الضخمة || بعض انواعها مأكول، مستحب الطعم.

Jaune d'œuf (F). **مَاح** - ٢٥٣٥٥
Yolk of an egg (E).
المح: صفرة البيض.

Improductif (F). **مِمْحَالٌ** - ٢٥٣٥٦
Unproductive, Idle (E).
ماحل ومحال كل ارض لا تحسب قط.

Manettia (S). Manettie (F). **مَاحُوزٌ** * - ٢٥٣٥٧
جنس نباتات جنينية عارضة معمرة من فصيلة القويبات. انواعه قليلة معظمها بري وبعضها زريبي. سوقها دقيقة متشعبة. اوراقها ابيدة متعاقبة متعقبة. ازهارها قمية الشكل محورية الارتكاز او تاجية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

Manettia ignita (S). **مَاحُوزٌ قِرْمِزِي** - ٢٥٣٥٨
Manettie rouge feu, M. à fleurs vermillon (F).
نوع من الماحوز الزريبي. ساقه دقيقة لولبية تطول نحو اربعة امتار. اوراقه اهليجية الشكل، نصلها مقطوم القاعدة ذلق الزام الاخضر. ازهاره محورية وتاجية الارتكاز، قمرزية اللون، لامة الملاج. قطر قمعها نحو ٤ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

مَاحُوزٌ قَلْبِيّ الْوَرَق - ٢٥٣٥٩
Manettia cordifolia (S). Manettie à feuilles en cœur (F).

نوع من الماحوز الزريبي. ساقه دقيقة تطول نحو خمسة امتار. اوراقه قلبية القاعدة مستطيلة النصل الذروب في زامه الاخضر. ازهاره كبيرة القد، ارجوانية اللون السوي، قطر قمعها نحو ٥ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

مَاحُوزٌ مُرْدُوجِ اللَّيْن - ٢٥٣٦٠
Manettia bicolor (S). Manettie bicolore (F).

نوع من الماحوز الزريبي. ساقه دقيقة نحيلة تطول نحو اربعة امتار. اوراقه سنائية مستطيلة الاضناق، نصلها ذروب القاعدة والطرف. ازهاره قمرزية الانبوب، ارجوانية القسم، صفر الحنار والحافة. قطر اقاعها براوح من ٢ الى ٣ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

Makaire (F). **مَاحِرَّةٌ** - ٢٥٣٦١
سكة بحرية تدعى سارية، اطلبها.

Amouillante (F). **مَاحِيضٌ** - ٢٥٣٦٢
About to calf (E).

الائمن من الحيوان ان حجير او بقره او ناقة او نجة او عن حان وضعها.



ماحوز



مادي



مارخور



ماره



ماروت



مارش



مازيون



مازيون هندي

Bois Joli, B. gentil (F). Mezereon, Dwarf laurel, Spurge olive (E). Echter Seidelbast, Kellershals (D). Laureola gentile, Blondella, Mezereon (I).

نوع من الدفنة عديد القروب يعلو من ٧٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه متعاقبة مستطيلة، نصلها مالمس البشرة يطول نحو ٨ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. ازهاره عطرية، خمية التجميع عوروية الارتكاز، تسبق الاوراق. الباثا تختلط مع القروب منها الابيض والآخر والوردي || ثماره عنب لونها الى الحمرة. يستخرج منها ومن الاوراق مادة فعالة سامة يقال ان القليل منها ينفع من الاستسقاء واليرقان وضغط الكل.

Daphné alpestris (F). ماززيون جبلي
اطلب دفنة ابية.

Daphné camellée (F). ماززيون مكبس
نبات من الدفنة، اطلب دفنة سفيرة.

٢٥٣٨٩ - ماززيون هندي * ، هرج ، بطريرة
ترنات

Clitoria ternatea (S). Clitoria de Ternate (F). Blue clitoria, Butterfly-pea (E). Blau Clitorisblume (D). Fagiolo indiano, Fior celeste (I).

نوع من البطرية من فصيلة القرنيات القرشية. وهو نبات عشبي زراعي متسلق يعلو نحو ٩٠ سم. اوراقه مركبة ثلاثية، وريقاتها بيضيه لسنة ازهاره كبيرة اللد زرقاء اللون تميز بعدم انتظام بتلاتها. وفي تستعمل في الهند لتدوين الرز المطبوخ وبعض الحلويات. اما ثماره فسنية دقيقة مستطيلة، بزورها صغيرة مستديرة سمراء اللون.

٢٥٣٩٠ - ماززيونيات
Thymelaeaceae (S). Thymelaeaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة العتلات. اجناسها وادواها كثيرة العدد معظمها عشبي وبعضها جبني منه الطبي والصيافي والراتنجي.

٢٥٣٩١ - مازون
Œufs de fourmis (F). Egs of the ants (E).
بيض النمل.

٢٥٣٩٢ - مازوت
Mazout (F). Oil fuel (E).
سائل وقود تجم من تقطير النفط الخام.

٢٥٣٩٣ - مازور. Martin-chasseur (F). Dacelo (S).
جنس طير من المازوريات. انواعه عديدة اعطائها فسيحة الاجزاء تشل معظم شطوط المحيط الهادي. جميعها مستعرة المتاثر الكبرية المتدلية الصفحة السفلى. اجسامها ربة. اجنتها متندلة الطول، اذناها مستعرة، اصرافها قصيرة وقوية || يالئ الحياة الجاهية. اسرايه تعد من ١٠ الى ١٠٠ || اعرف انواعه واشهرها المازور الجبار.

٢٥٣٩٤ - مازور جبار *
Dacelo gigantea (S). Martin-chasseur géant (F). Laughing jackass (E).

طائر من المازور، قال في الجاهظ: « طائر مبارك يتنام به اصحاب السفن » طوله يراوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. بسطه نحو ٦٥ سم. ثوبه عايق اللون. رأسه مستطيل الريش اللدب الاسمر. محصره مستعرة الخط الاسود. ظهره الى السمرة. بطنه الى الصهبة يعلوها مزاج اسود. جناحها الى الزرق العابقة. قوادمه الى السواد اللامع. ذنبه الى الجوزة

Dolichotis patagonica (S).

٢٥٣٩٥ - مازو *
Mara, Lièvre de Patagonie (F).

حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الثردفيات. موطنه الهول والمراي الايركية القائمة بين مندوزا ومضيق مچان || جسمه متوسط اللد طوله نحو ٥٠ سم. ارتفاعه ٤٠ سم. رأسه صغير اللد. عيناه مستطيلتان اذناه كبيرتان. عنقه طويل. كفله غليظ مستدير. قوائمه رفيعة دقيقة. برائه قوية حادة. ثوبه الى الصهبة الريداء يعلوها توشم ابيض. بطنه عاجي. وبره دقيق وكثيف، تشيد اللعنة، نام الملس || يعيش جاعات يراوح عدد افرادها من ١٠ الى ٣٠ يسرح في النهار. قوته الاعشاب البرية اعصها النمل || اثناء تقصم مرتين في العام وتنتج كل مرة جرورين. جبره ردهة كبيرة يحفرها عل عمق ١٠٠ سم. مدخلها ويخرجها نفق واحد طوله نحو ٥ امتار.

٢٥٣٩٦ - مازوت * ، شمر الكتب ، بابوتج
تسن

Maruta (S). Maroute, Camomille puante (F). Mayweed, Dog-fennel (E). Stinkhunds-kamille (D). Maruta (I).

نبات عشبي بري حولي من المركبات وهو نوع من الاقحوان يكثر بين الزروع فيصبح من الاعشاب الضارة وهو كرية الرائحة عند اللمس. ازهاره صفراء اللون.

٢٥٣٩٧ - مازوم ، مازون
Marum (F).
هو صمغ الحر، اطلبه.

٢٥٣٩٨ - مازيرة
Oryx (F).
هي الارخ، اطلبه.

٢٥٣٩٩ - مازيرة افريقية
Oryx beisa (F).
هي الارخ الافريقي، اطلبه.

٢٥٣٨٠ - مازيرة البادية
Oryx callotides (F).
هي ارخ البادية، اطلبه.

٢٥٣٨١ - مازيرة الجزيرة
Oryx beatrix (F).
هي ارخ الجزيرة، اطلبه.

٢٥٣٨٢ - مازيرة الصحراء
Oryx gazelle, Pagan (F).
هي ارخ الصحراء، اطلبه.

٢٥٣٨٣ - مازيرة سودانية
Oryx de Nubie (F).
هي الارخ السوداني، اطلبه.

٢٥٣٨٤ - مازيش *
Bryopsis (S). Bryopsis (F). Bryopsis (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضرة. انواعه المعروفة نحو ٢٥. اعطائها تشل معظم بحار العالم || كلالها صغيرة. سوقها دقيقة، شبه اسطوانية الشكل متتامة الافئدة المتراكبة الرقيقة النصل.

٢٥٣٨٥ - مازكة
Nitrière (F). Nitrebed (E).

المكان الذي يصنع فيه الازوت او يتحول فيه الى نترات والماتة قد تكون طبيعية كما في شيلي او اصطناعية كما في مصانع الازوت.

٢٥٣٨٦ - ماززيون * ، دفنة سامة، أم
Daphné mezereum, Thymelaea mezereum, Meze-reum officinal (S). Daphné mézéréon, D. jolibois,

٢٥٤٠٤ - مَاشِيَّة ، بُهْم ، قَتَم ، مَال
Bétail, Bestiaux (F). Cattle, Livestock (E).
الابل والبقر والغنم والماعز . اخصها ما كان منها للسل
والقنية . سميت ماشية لرعيها وهي تحمي وقيل لكثرة نسائها ،
ج. موشي .

٢٥٤٠٥ - مَاصَّات
Cyclostomes, Siphonophores (F). Siphonophores (E).
هي الحفليات الانواع رتبة من الاسماك .

٢٥٤٠٦ - مَاصَّة
Pipette (F). Pipet (E).
اداة مخبرية تستعمل لشفط السوائل . راجع شفاعة .

٢٥٤٠٧ - مَاصِر
Enclos (F). Enclosure, Close (E).
الماصر هو الحاجز تؤصر به الخيل والبقر والمواشي لحصرها
في مكان معين ومنعها عن ارتياد غيره .

٢٥٤٠٨ - مَاصِعة
البقرة التي ولي لبها .

٢٥٤٠٩ - مَاصُوع
Cephalosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الماصوعات وفصيلة الوطيطات .
انواعه عديدة معظمها ربي يعيش ويتكاثر على المواد
النباتية المنحلة . امشاجها حزيلة مادة تركب سطوح
عواثلها .

٢٥٤١٠ - مَاصُوعِيَّات
Céphasporiées (F).
Cephalosporieae (E).
عارة فطور مجهرية من فصيلة الوطيطات . اجناسها ثلاثة
وهي التريكوذيه والطلوسية والمناشوع .

٢٥٤١١ - مَاصِر
Acescent
لعت تمريني يطلق على جميع المواد الممكن ان تحبس .
فالبقول والثمار والحليب تعتبر من المواد الماصرة لأنها قابلة
للتحمض .

٢٥٤١٢ - مَاصِر
Piqué (F). Sour (E).
يدعى ماصراً كل مشروب يصير نحو التخليل او الفساد .

٢٥٤١٣ - مَاطِر ، مُمَطِر ، شات
Pluvieux (F).
Rainy, Wet, Pluvius (E).

٢٥٤١٤ - مَاعِز
Ovis capra (S).
Chèvre (F). Goat (E).
الماعر للذكر والانثى ج. معز ومعز ومعزى . ويقال
للذكر تيس والانثى مَعر . والماعز حيوان مجتر داجن من
فصيلة التفتيات . انواعه عديدة تمت بذوات الشعر تميزاً
لها عن ذوات الصوف وهي الغنم . وهي تميز ايضاً بقصر
اذنانها وقوة قوائمها وصلابة اظفارها التي تمكها من تسلق
الصخور . اناثها اصفر قدماً من ذكورها . ضرورها ثنائية
الخلف . يحلبها بدوم ١٥٤ يوماً تضع عند تمامه من جدي
الى ثلاثة جداء . والماعز يربي لحليبهِ وشره . اشهر
انواعه ما يتبع .

٢٥٤١٥ - مَاعِزِ التَّيْت
Chèvre de Thibet (F).
Tibetan goat (E).
نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم اللب له لكنه يأتي
بهد الكثير من حيث الجودة .

الحيدة بالاسود . أما طرف الريش فأبيض || يألف
الشطوط ومجاري الماء والادغال ، قوته الاسماك والنظام
والوروز والغار والحشرات والحيات || انشاء تضع من
٣ الى ٤ بيضات تحضنها ومنحها نحو ٣ اسابيع .

٢٥٣٩٥ - مَازُونِيَّات
Dacéloniens (F).
عارة طير من القرلايات تشمل المازور والقيش والقيون
والهليل . اصطناعها البلاد الاسبوية والافريقية وجزر
اقيانية || طيورها تتميز بمناقيرها المستعرضة القاعدة ،
الحقوة الصفحة السفلى ، اللدبة الملقط . ريشها متوسط
الكثافة ، اثوابها متدلة الزعاج والللمة || تألف الاجراع
والمناقع والشطوط البحرية ومجاري الماء . قوتها الديدان
والخشرات والقشريات والاسماك . تدفن في تجاويف جلوع
واغصان الاشجار اليابسة .

٢٥٣٩٦ - مَاس
Diamant (F). Diamond (E).
هو السامور المشقول حررت صفحاته بالنتح .

٢٥٣٩٧ - مَاسِج
Arpenteur (F). Land-surveyor (E).
الماسح والمساح والأرقي هو الذي يمسح الارض فيرسمها
ويقسم طولها وعرضها الخ .

٢٥٣٩٨ - مَاسِكَة
Jonchale, Jonchère, Joncherate (F).
Bed or plantation of rushes (E).
منقع وما اشبه كثر في الأصل .

٢٥٣٩٩ - مَاش
ماش المطر الارض : سمحا فهو مطر مثير .

٢٥٤٠٠ - مَاش * كُشْرِي
Phaseolus mungo, Ph. radiatus (S). Haricot d'Angola,
H. mungo (F). Green gram, Black gram (E). Mungo-
bohne, Schwarzebohne (D). Fagolo a zigzag (I).
نبات عشبي زراعي حولي من الفاصوليات وفصيلة القرنيات
الفراشية . زراعته منتشرة في جميع بلاد الشرق . ساقه فراء
قائمة . اوراقه متعقبة مركبة ثلاثية . وريقاتها بيضيه
النصل المتجمع المذهب المعقصة . ازهاره ضمية التجميع ،
زنادية الارتكاز ، صفر اللون ، غضر المواج . ثماره
قرون اسطوانية ضيقة مستطيلة . بزوره كروية الشكل
سمراء اللون او غضراء ملطخة بالاسود . تحوي من العناصر
الغذائية مسا قدره :

٢٣,٨٠ ٪ من المواد الازوتية
١,٤٦ ٪ من المواد الدهنية
٦٢,١٥ ٪ من المواد النشوية

زراعته مروية بيلز عارة على عقير الحنفلة بعد تريض
المزدود وسحره . يذار الغنم يراوح من ١٣ الى ١٥ كيلو
وانتاجه من ٩٠ الى ١٢٠ كيلو .

٢٥٤٠١ - مَاشِ شَرِي
Dolic de Chine (F).
هو الدجر الصيني ، اطلبه .

٢٥٤٠٢ - مَاشُونِيَّات
Mandibulates (F).
نفة من المفصليات تشمل الحيوانات المجهرية يتأثير وزباني .
اشهر صفاتها القشريات والذغذخايات والحشرات .

٢٥٤٠٣ - مَاشُوط
Cheimatable (F).
حشرة مؤذية تدمي ارجية الشتاء ، اطلبها .



مازور جبار



ماش



ماعز النوية



ماعز انقره



ماعز سوري



ماعز كشمير



مأكلا الغات



مأكلا بونون



مأكلا ريس

وربة التجميع . وريفاتها لا قياسية العدد الذي يراوح من ٥ الى ١٩ ، نضلها ايليحي الشكل ، مالب الصفحة العليا خلي السفل . ازهرارها عتقودي التجميع . ازهرارها صفيرة لبد يبيض اللون خضراء الموج || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٥٤٢٦ - مأكلا Macacus (S). Macaque (F), Macacos, Macaques (E). Makaken (D). جنس قرد ذئالة من فصيلة المبرسات . انواعه ١٩ ، موطنها تختلف المناطق الاسيوية . اجسامها متوسطة او صغيرة القد . اعظامها بارزة اظهرارها وسية . قوائمها قوية . اياها طويلة . ذناها لا قياسية . اثارها تختلف مع الانواع || تعيش جهاات متوسطة او كبيرة العدد . تألف الاجراج والحضاب الصخرية والشطوط . قوتها الثار والحبوب والخشرات والمنع والنعاء والصفاد || انماها جبرا واحدا يبلغ كامل نشاطه بمره سنوات .

٢٥٤٢٧ - مأكلا التبت Macacus thibetanus (S). Macaque du Thibet (F). موطنه احرال التبت الشرقية وبنشورية . جسمه متوسط القد ، رقيق القوام بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ١٥ سم . ثوبه جمل الشعر المستطيل ، لونه الى الكهية السوداء زرع عند البطن وتبعق عند الظهر || يعيش جماعات كبيرة تعد من ٦٠ الى ١٢٠ .

٢٥٤٢٨ - مأكلا الغات Macacus silenus (S). Ouanderou (F). Wanderoo (E). موطنه تهاام مليبار والغات . جسمه بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ٢٧ سم . ثوبه اسود اللون ، جمل الشعر المستطيل . حمار وجهه افرق الجبهة ، ابيض اللون || يألف الغابات الكثيفة النائية ، جماعته تتألف من ذكر وخمس او ست اناث وبعض الصفار .

٢٥٤٢٩ - مأكلا بونون Macacus cynomolgus (S). Macaque de Buffon, M. crabier (F). موطنه مناطق وادغال الهند الصينية . يكثر قرب مصبات الانهر . يتسلق الاجنار ويسبح ويفوص || جسمه بطول نحو ٥٦ سم . وذنبه ٤٨ سم . ثوبه ينحرف من الخطي المنحرف الى الالكهية الاسمر . حمار وجهه اغير البياض . جماعته قليلة العدد تتألف من ذكر وخمس اناث وبعض الصفار .

٢٥٤٣٠ - مأكلا ريسيس Macacus rhesus (S). Macaque rhesus, Rhesus (F). Rhesus (E). موطنه فسح الاربعاء يمتد من الهند الى الانام والصين ، جسمه متوسط القد ، صمغوي الشكل ، كثيف الشعر ، بطول نحو ٥٦ سم . ويرتفع نحو ٤٤ سم . ثوبه الى الكهية الصفراء ينحرف الى الجؤوة مع اقترابه من ثيج الظهر . وجهه واذناه الى السرة السفاء . ذنبه بطول نحو ٢٥ سم . قوته الثار والحبوب والحشرات يتسلق الاجنار ويسبح ويفوص || يعيش جماعات كبيرة العدد .

٢٥٤٣١ - مأكلا شائع Macacus sinicus (S). Macaque commun, Bonnet chinols (F). Bonnet macaque (E). موطنه مناطق الهند الجنوبية حتى يمي . تألف الغابات الكثيفة ويغزو الحقول والمزارع والساكر . طوله نحو

٢٥٤٣٢ - ماعز النوبة ، ماعز الحبشة Chèvre de Nubie (F). Nubian goat (E). نوع من الماعز الافريقي . اجسامه كبيرة اللد تملو من ٦٠ الى ٦٥ سم . يتميز بروثو العجل المفلطحة العادة للحي وبقضية افة الخدود وبقر شعره . الاثني جيدة اللد ، خضرها متوسط الحجم . مجموع درها الحولي يراوح من ٢٥٠ الى ٤٥٠ ليتر .

٢٥٤٣٧ - ماعز انقرة ، ماعز Chèvre d'Angora (F). Angora goat (E). نوع من الماعز المشهور باستمالة شعره الابيض الناعم . منه ضرب اسود الرأس والعتق ، غث اللحية موصوف بؤرة شعره الناعم .

٢٥٤٣٨ - ماعز سوري Chèvre de Syrie, Ch. mambrine (F). Syrian goat (E). نوع من الماعز موطنه جبال لبنان وسورية . جسمه يعلى من ٦٠ الى ٧٠ سم . وهو اقلع الرأس ، اكث اللحية ، كثير الاذن للتدلية الفارشة . الاثني جاد الرأس كبيرة الصرع . متوسط مجموع درها الحولي يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ ليتر .

٢٥٤٣٩ - ماعز كشمير Chèvre de Cachemire (F). Cashmirian goat (E). نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم الحريري الموج . يكثر في بلاد كشمير حيث يستثمرن شعره .

٢٥٤٤٠ - ماعز Miauler (F). To mew (E). ماع السنور : ما ، ومغا .

٢٥٤٤١ - ماعز Polycarpique (F). Polycarpic (E). ماعل م . ماعلة نعت تريفني يطلق على كل نبات معمر يزهر ويثمر اكثر من مرة في الحول .

٢٥٤٤٢ - ماعفوط Vermicide (F). هو كل مادة تستعمل لقتضاء على الديدان .

٢٥٤٤٣ - ماقبل الحيوان Protérozoïque (F). Proterozoic (E). اسم يطلق على الحقبة الثالثة من اياج ما قبل الكمبري ؛ ذلك لان آثار المتحجرات والاحافير المكتشفة حتى الآن ، بلاضافة الى المادراج الجيولوجية المعروفة ، تنفي وجود حياة حيوانية حتى اواخر هذه الحقبة .

٢٥٤٤٤ - ماقبل الكمبري Précambrien (F). Precambrian (E). اسم يطلق على الاياج البدائي من تاريخ تكوين صفور الارض . وهذا الاياج الطويل الامد ، الذي تم فيه تنسيد الصخور ، والذي يمثل خسة اسداس عمر الارض ، يقسم الى ثلاث حقب : حقبة التكوين ثم الحقبة الصحيحة ثم حقبة ما قبل الحيوان . راجع حياة .

٢٥٤٤٥ - ماقية Masckia (S). Masckie (F). نبات معقود التبريف على اسم اليوناني الرومي « ماق » والنوع من فصيلة القرنيات . ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م . خشبها صلب العود اسر اللون . اوراقها عابلة ، مركبة ،

Rouleau (F). Roll (E).

الماتى والملقعة: محدة اسطوانية تستعمل في حذل التربة او تحليتها. راجع ملاءة.

Propriétaire (F).

Proprietor, Owner, Holder (E).

٢٥٤٣٣ - مالك

هو الذي له حق الملكية.

Héron (F). Heron (E).

٢٥٤٤٤ - مالك الحزين

هو البيلشون، اطليه.

Courtillière (F). Mole-cricket (E).

٢٥٤٤٥ - مألوش

حشرة مؤذية تدعى الحالوش والعنجوس، اطليها.

Mammoth

٢٥٤٤٦ - ماموث

هو الصناجة، اطليها.

Glaucium (S).

٢٥٤٤٧ - ماميشنا، ماميشنا

Glaucie, Glaucière (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخشخاشيات. انواعه قليلة منها الحولية والممره، اوراقها حاشنة، متعاقبة، كبيرة القد مقرصة. ازهارها كبيرة الحجم، فردية التجميع. ثمارها حقية. يزورها دهنية يستخرج منها مادة زيتية عادمة الحامض تستعمل في الطب كزيت الخشخاش. وهو ينفع من السمة والرطوبات واسترخاء الجفن وضعف البصر كحلا، والاورام والمفاصل الحادة طلاء ويقطع الدم والاسهال مطلقا. وجهه يسمن جدا وهو يضر للطحال ويصلحه للوز.

٢٥٤٤٨ - ماميشنا حمره، * خشخاش فينيقي

Glaucium corniculatum (S). Glaucie corne, G. à fleurs rouges, Glaucienne (F). Red horned poppy (E). Roter Hornmohn (D). Papavero cornuto piccolo (I).

نوع من الماميشا الحولية ساقها هليية للحاء تملحو نحو ٥٠ سم. ازهارها حمراء اللون، كبيرة القد، قطرها نحو ٥ سم. ثمارها مبعة الحنف، حقية الشكل، تطلو من ١٠ الى ٢٠ سم. || تزرع للزيت وللاستخراج الزيت من زورها. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٥٤٤٩ - ماميشنا صفراء، * خشخاش مقربن

Glaucium flavum (S). Glaucie jaune, G. à fleurs jaunes, Pavot cornu (F). Sea poppy, Yellow horned poppy (E). Gelber hornmohn (D). Papavero cornuto giallo, P. marino, Parallo (I).

نوع من الماميشا الحولية. ساقها مرطاه تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها الى الصفراء الذهب. قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. سقاها مقوس الشكل يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. || ترغب في السواحل الرملية. تزرع للزيت وللاستخراج الزيت من زورها || ازهارها يستمر من حزيران الى آب || والماميشا الصفراء شديدة الرائحة والمرارة، قابضة، كانت تستعمل في الاكحال. وتصير زهرا قطرة لليرين.

Curcuma (F).

٢٥٤٥٠ - ماميركان

اطلب كركم صباغي.

Renoncule ficaroides (F).

٢٥٤٥١ - ماميركان صغير

هو الخوذان النبي، اطليه.

٢٥٤٥٢ - ممان

هو القردمان، اطليه.

٥٠٠ سم. وذنبه ٥٥٠ سم. ثوبه الى الكهبة الخضراء يملوها موج اسمر. وجهه واذناه ويده الى السمرة العابقة || جماعته تعد من ١٢ الى ٥٠.

٢٥٤٣٢ - مأكك متوج * Macacus pileatus (S). Macaque couronné (F).

موطنه جزيرة سرنديب. يألف الغابات الكثيفة وينزو الحقل والحدائق. جسمه ربع الاجنة. طولو نحو ٥٠ سم. وذنبه ٥٠ سم. ثوبه الى الصبغة الصفانية. بطنه وباطن قوائم الى البياض الاخير. حمار جبهته منتصب الشعر، تاجي الشكل. جماعته تعد من ١٠ الى ٢٥.

٢٥٤٣٣ - مأكك ميمون * سعيمر

Macacus nemestrinus (S). Macaque maimon, Singe-cochon (F). Pig tailed macaque (E).

موطنه برمانيه وبلق وجزر الزايج. جسمه يطول نحو ٤٦ سم. ويرتفع ٤٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، مستطيل الخلم. قوائم قوية وعظيمة، ذنبه مقوس يطول نحو ١٨ سم. ثوبه الى السمرة يعقب مع اقترابه من ثوب الظهر.

Comestible (F).

٢٥٤٣٤ - مأكول

Edible, Eatable (E).

هو الصالح للأكل.

Ovicide

٢٥٤٣٥ - مأكون

المأكون هو كل دواء يقضي عسل مكن الحشرات، ج. مواكين.

Aristotelia macqui (S).

٢٥٤٣٦ - مأكبي

Maqui de Chili (F).

نوع من الاريتوتيلية، جنسية زراعية من فصيلة اليزونوفيات. ساقها منتصبة تملو نحو ثلاثة امتار. اقتناها حر السحاب. اوراقها ابيدة، متعاقبة، بيضيه النصال الالامه المسنة الخفاف، تطلو من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٦ سم. ازهارها عنقودي التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها عنبية ارجوانية اللون مأكولة تعتبر من المرطبات النافعة.

Machine (F).

٢٥٤٣٧ - مأكينة

Machine, Engine (E).

كل جهاز آلي هذه الاقتصاد يدعى مأكينة. لذلك فالماكينات كثيرة العدد اشهرها الصناعية والكهربية والزراعية والتجارية.

Biens (F). Weals (E).

٢٥٤٣٨ - مال

المال مال ملكته من جميع الاشياء. يقال هو المال وبهي المال. قال الشاعر:

« المال تلدي باقوام ذوي حسب »

Malate

٢٥٤٣٩ - مالات

ملح حمض التفلح.

Maltine (F).

٢٥٤٤٠ - مالتين

هي الملتين، اطليها.

٢٥٤٤١ - مأكسة

Blocénose (F). Biocénosis (E). منج مسلكي تتبمه بعض الحشرات في كامل دورتها الحياتية او في جزء منها.



ماكك شائع



ماكك متوج



ماكك ميمون



ماميشا حمراء



ماميشا صفراء

ورقاياتها || تتميز بجبال رسال اذنان الذكور وبقلة الطيران وبسرعة العدو . سوقها معتدلة الارتفاع . اسبابها نشيطة . غالبا جالسة || اعرف اجناسها واشهرها المانور والعرطون .

Mahogon (F).

٢٥٤٦٠ - **مَاهُون**

هو الأكاجو ، اطلبه .

Mahonia (S).

Mahonia, Mahonie (F). Mahonia (E).

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة البرباريسيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي وتربتي . اوراقها ابيدة مركبة . وريقاتها زرية العدد ، مشاربة الحافة . ازهارها عتقودة التجميع ، صفراء اللون ، مستحبة العرف . ثمارها نووية الشكل ، باذنجانية اللون ، مأكولة وترب || اعرف انواعها واشهرها ما لي .

٢٥٤٦٢ - **مَاهُونِيَّةُ بَهْشِيَّةُ الْوَرَقِ**

Mahonia aquifolium (S). Mahonia à feuilles de houx (F).

جنبة سبروتية تملو من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . وريقات اوراقها بشية الشكل تمد من ٣ الى ٩ ، نصلها شيق الصفحة الالامية المستطيلة . ازهارها الى الصفرة الموشة بالاحمر . عتاقدها الزهرية تطول من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طوال شهر اذار .

٢٥٤٦٣ - **مَاهُونِيَّةُ حَزْمِيَّةُ**

Mahonia pinnata, M. fascicularis (S). Mahonia fasciculé (F).

جنبة سبروتية فراء تملو من ٢٠٠ الى ٣٥٠ سم . وريقات التسنين الثالث . عتاقدها الزهرية كيفية التجميع تطول نحو ٨ سم . ازهارها صفيرة اللد صفراء اللون || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

٢٥٤٦٤ - **مَاهُونِيَّةُ رُبَاعِيَّةُ الْعُرُقِ**

Mahonia nervosa (S). Mahonia nervé (F).

مجلة سبروتية مثبونة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٩ الى ١٧ ، نصلها باعت الخصار رباي العروق البارزة . عتاقدها الزهرية تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهارها الى الصغار الكبرى || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٦٥ - **مَاهُونِيَّةُ مَدَادَكَة**

Mahonia repens (S). Mahonia rampant (F).

مجلة ركوبية مدادة تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٣ الى ٧ ، نصلها بيني الشكل ، مقطوم القاعدة ، بحري الصفحة المدادة اللمة . ازهارها الى الصفرة السوية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٦٦ - **مَاهُونِيَّةُ نَبَالِيَّةُ**

Mahonia nepalensis (S). Mahonia du Népal (F).

جنبة سبروتية شاذغة تملو من ٣ الى ٥ امتار . وريقات اوراقها تمد من ١١ الى ٢٥ ، نصلها ضيق الصفحة ، جبل الخصار اللامع . عتاقدها الزهرية تطول نحو ٣٠ سم . ازهارها كبيرة اللد مجلة الصغار المذهب || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

Pangolin (F).

٢٥٤٥٣ - **مَانَس**
جنس حيوانات لبونة من الدرد . اسمها الشائع ام قرة . اما مانس فهو ترجمة الاسم العلمي .

Fort (F).

٢٥٤٥٤ - **مَانَع**
نمت تعريبي يطلق على كل تبغ يتحل بسورة مانمة مركزها التصنفي دون العالسة وفوق الناشطة .

٢٥٤٥٥ - **مَانَع** Empêchement (F). Hindrance (E).

مائق يحول دون اتمام عمل ما كالأزواج مثلاً وذلك لانعدام احدى الشرائط القانونية المطلوبة . ولمانع قد يكون :

مائع حافظ Empêchement prohibitif (F).
Prohibitive hindrance (E).

مائع معطل ، مانع فاسخ Empêchement dirimant (F).
Invalidating impediment (E).

٢٥٤٥٦ - **مَانُور**، **طَائِرُ الْقَيْشَارَةِ** Menura (S).

Menure, Oiseau-lyre (F). Menura, lyre-bird (E).

جنس طير من فصيلة المانوريات . انواعها المعروفة ثلاثة ، اعطائها بلاد استرالية حيث تألف المراج والغابات || اجسامها متوسطة القد . مناقيدها قوية ، قليلة الاحديداب . التسنين . اجنتها قصيرة . ارساها متوسطة الطول حبيفة البشرة . انقادها جرداء || ذكورها كبيرة الاذنان القيشارية الشكل . انثاها ماعمة الزينة . اما انواعها الثلاثة المعروفة فهي :

Menura Alberti (S).

مانور ألبرتي

Menura Victoriae (S).

مانور فيكتوريا

Menura superba (S).

مانور ميبول

نخص منها بالوصف المانور المبول ، اطلبه .

٢٥٤٥٧ - **مَانُورُ مَبْدُول** ، **مَانُورُ أَيْق** ،

طَائِرُ الْقَيْشَارَةِ الْأَيْق

Menura superba (S). Ménure commun, M. superbe, Oiseau-lyre superbe (F).

نوع من المانور . مهد ارجح استرالية . جسم الذكر يطول نحو ٤٥ سم . وذنبه ٦٠ سم . جسم الانثى ، بما فيه اللدب ، لا يتجاوز ٦٠ سم . || ثوبه الى الابد الحطية العابقة . افنيكه جويو المراج . زور احمر . بطنه الى الربة الربادية . قوادمه واباره ومناكه الى السمرة الحطية الحمراء المراج . ذنبه قيثاري الشكل لونه الى السمرة الحطية المبيضة بالربة الفضية . ثوب الانثى داكن الالوان القليلة الزهاء || يألف الاراح التي تتخللها الصغور والاراضي المنخاسة . يردد جميع اصوات الطير والحيوان ونها العواء والتباج || قوته الحشرية والدبدان يلتفتلها ابنا كانت وفي الجفلة التراكمة || يدن عشه في الادغال او في الاجار المخذونة الشاركة على اسنق الادوية . حصنته بيضة واحدة ترجها الانثى دين الذكر الذي يؤن لها القداء .

Blade (F).

٢٥٤٥٨ - **مَانُورِي**

سمكة بحرية تدعى حنجلة ، اطلها .

٢٥٤٥٩ - **مَانُورِيَّات** Menuridae (S).

Ménuridés (F). Menuridae (E).

فصيلة طير من الجرائم لاقتلت النمل وريقاتها المتناثر . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها جبال استرالية



مانور مبول



ماهونيه

- Râperie (F). **مَبْرَشَة** ٢٥٤٨٤
معمل لبرش الجذور وتقطيعها او سحقها .
- Orangerie (F). **مَبْرَكَة** ٢٥٤٨٥
Orangery (E). هي بستان البرتقال .
- Sardine (petite) (F). **مَبْرُوم** ٢٥٤٨٦
Pilchard (small) (E). المبروم السردين الصغير لا يتجاوز طوله ٥ سم .
- Porte-graines (F). **مَبْرَزَة ، مَبْرَزَة** ٢٥٤٨٧
هي البزرة ما يزرع من البقول ويختلف النباتات العشبية للحصول على بزورها . ج. مبرزات و بزاري .
- ٢٥٤٨٨ - **مَبْسُوطَة**
المبسطة او القدم المبسوطة نجم ثير من كوكبة برج التولمين مركزة على الركبة اليسرى من التولم المتقدم .
- Omnivore (F). **مَبْشَار** ٢٥٤٨٩
Omnivorous (E). نعمت تعريفي يطلق على كل حيوان قوته اللحم والنبات .
- Racle (F). Scraper (E). **مَبْشَرَة** ٢٥٤٩٠
Oignonière (F). Onionbed (E). **مَبْشَلَة** ٢٥٤٩١
هي حقل البصل .
- Canardière (F). **مَبْطَرِي** ٢٥٤٩٢
Duck-pond (E). غدير خص بالبط او غدير حضير لصيد البط البري .
- Melonnière (F). **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٣
المبطحة حقل الشمام .
- Culture de pastèque (F). **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٤
هي حقل البطيخ .
- Jardin potager (F). **مَبْطَلَة** ٢٥٤٩٥
Kitchen-garden (E). هي البستان الممد لزراعة الخضار .
- ٢٥٤٩٦ - **مَبْكَار ، مَبْكَال ، مَبْكَور ، مَبْكَر**
Hatif, Précoce (F). Early, Precocious, Forward (E). صفة النبات السريع النمو والقريب الادراك .
- Drosomètre (F). **مَبْلَال** ٢٥٤٩٧
Drosometer (E). المبلال جهاز يستعمل في قياس ما يسقط من سدى وندى في وقت معين ؛ غالباً من الغروب الى الشروق .
- Accrescent ٢٥٤٩٨ - **مَبْتَق**
نعت تعريفي توصف به يختلف اعضاء الزهرة ، دون المبيض ، التي تتابع نموها بعد الانحصاب .
- Houssale (F). **مَبْهَنْة ، مَبْهَنْة** ٢٥٤٩٩
Holly-grove (E). منبت البهية .
- Mabouya ponctué ٢٥٥٠٠ - **مَبُونِيَّة مَقْطَعَة**
هي الحكاة المنشقة ، اطلبا .
- Mahonia japonica (S). **مَاهُونِيَّة يَابَانِيَّة** ٢٥٤٩٧
Mahonia du Japon (F). جنبه سروتيّة فراءه تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . وريقات أوراقها تعد من ٩ الى ١٩ ؛ تصلها خسيق الصفحة ، ذرب الزام الاخير ، يطول نحو ١٢ سم . عناقيدها الزهرية معتدلة الكثافة تطول نحو ١٥ سم . أزهارها متوسطة القد جميلة الصفار الزاهي || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .
- Métaphysique (F). **مَاهُورَاكِيَّة** ٢٥٤٩٨
Metaphysics (E). هي الميتافيزيك ، اطلبا .
- Liquide (F). Liquid (E). **مَالَع** ٢٥٤٩٩
Hydraulique (F). Hydraulic (E). **مَالِي** ٢٥٤٧٠
- Ruche (F). Hive (E). **مَبَاة** ٢٥٤٧١
لللباة والكوارة والقفير هي مأوى النحل .
- Guâpier (F). **مَبَاة الرُكَايِر** ٢٥٤٧٢
Wasps' nest (E). هي خلية الزنايبر .
- ٢٥٤٧٣ - **مَبَادِل ، مَبَايِض**
Coéchangiste, Copermutant (F). Permuteur (E). هو احد الطرفين في عقد البدل او المقايضة .
- Réciprocité (F). Reciprocity (E). **مَبَادِلَة** ٢٥٤٧٤
هي الاتفاق على موضوع معين .
- Concours (F). Concourse (E). **مَبَارَاة** ٢٥٤٧٥
هو الاشتراك في عقد قانوني .
- ٢٥٤٧٦ - **مَبَارِيَاَت زَرْاعِيَّة**
Concours agricoles (F). Cattle show (E). مسابقات تقييمية الحكومة والجمعيات والزراعية توزع فيها الجوائز المالية والشهادات . وهي تتناول الحيوانات والانتاج والمصنوعات والآلات الخ... الغاية منها تشجيع الزراعة بسائر فروعها وتنشيط الجودة والاتقان .
- ٢٥٤٧٧ - **مَبْشَر ، مَقْصُ الخَضِير**
Cisailles (F). Shears, Clipper (E). مقص كبير يستعمل في جز الخضير وبتر الافنان الزائدة في جنبات واجمار التزيين .
- ٢٥٤٧٨ - **مَبْشَرَا**
Evaporimètre (F). Evaporimeter (E). مقياس القوة البخرية في الجو .
- ٢٥٤٧٩ - **مَبْشَل**
Convertible
- ٢٥٤٨٠ - **مَبْشَر**
Semoir (F). Seed-bag, Sowing-machine, Drill (E). آلة تستعمل في نثر البذار او الاسمدة .
- ٢٥٤٨١ - **مَبْشَرَا* ، مَبْشَرَا**
Cténioïde (F). Ctenoïde (E). نعت تعريفي يطلق على الاجسام التي تملو اطرافها الطليقة بعض الاحداط الدرية الشائكة كما في بعض الاسماك .
- ٢٥٤٨٢ - **مَبْشَرَا ، مَبْشَرَا**
Fulgurimètre (F). ومَبْشَرَا
Fulgurimeter (E). مقياس قوة الكهرباء الجوية .
- ٢٥٤٨٣ - **مَبْشَرَا**
Râpe (F). Grater, Rasp (E). آلة تبرش الجذور المسقوليّة كالشوندر والجندر...



مَبْرَشَة حَرْشَقَة الفَرْخ



مناع

Divergent ٢٥٥١٥ - مُتَبَاعِد ، مُتَبَاعِدِي قَبَاعِدِي
ما كان مختلف الاتجاه .

Dissemblable (F). ٢٥٥١٦ - مُتَبَايِن
Dissimlar (E).

Volatil (F), Volatile (E). ٢٥٥١٧ - مُتَبَقِّر

Fissuré (F), Cracked (E). ٢٥٥١٨ - مُتَبَدِّح

Dispersé (F), Scattered (E). ٢٥٥١٩ - مُتَبَعَثَر

Touatière (F). ٢٥٥٢٠ - مُتَبَعِثَة
كل تربة تزرع تبعا عدة سنوات متتابعة . ج متابع .
والذي يتماثل زراعة التبغ يدعى تبعا .

Fenil (F), Hayloft (E). ٢٥٥٢١ - مُتَبَعِثَة ، مُتَبَعِثَة
مقبة لحفظ الحشيش والتبن .

٢٥٥٢٢ - مُتَبَعِثَة الأجنحة

Homoptera (S), Homoptères (F), Homopters (E).
رتبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصائلها وأنواعها
عديدة معظمها صغير القدر بمنح وبمفها عدم الجناح .
تطورها تدريجي . أجناسها ثاقبة مامة تمكها من ارتفاع
النسج . أشهر فصائلها الأرقيات والحماطيات والمغريات
والزيريات ...

Pondre (F). ٢٥٥٢٣ - مُتَبَع ، مُتَبَع ، مُتَبَع
To lay (E).
يقال باض الطير ورأ السلك ومنح الحشرات .

Endosmètre (F). ٢٥٥٢٤ - مُتَبَعَل
Endosmeter (E).
مقياس التحال أو التناقد .

Fossiles (F), Fossils (E). ٢٥٥٢٥ - مُتَبَعَجَرَات
هي الاحافير ، اطباها .

Homofocal ٢٥٥٢٦ - مُتَبَعَد البؤرة

Monadelph (F). ٢٥٥٢٧ - مُتَبَعَد الخويطات
Monadelphous (E).

٢٥٥٢٨ - مُتَبَعَد المراكز ، مُتَبَعَد المراكز
Concentrique (F), Concentric (E).

٢٥٥٢٩ - مُتَبَعَد الفصلات ، مُتَبَعَد الكاسيات
Gamosepale (F), Gamosepalous (E).
صفة الزهرة الملتصقة الفصلات الكاسية .

٢٥٥٣٠ - مُتَبَعَد التعلالات ، مُتَبَعَد
التوتجات ، مُتَبَعَد التلات
Gamopétale (F), Gamopetalous (E).
صفة الزهرة الملتصقة التعلالات أي التوتجات والتلات .

Réductible (F), Reducible (E). ٢٥٥٣١ - مُتَبَعَل
مكن تحليلة .

Acidifiable (F). ٢٥٥٣٢ - مُتَبَعَص
نمت تعريفه يطلق على كل مادة قابلة التميض .

Focometre (F), Focometer (E). ٢٥٥٣٠ - مُتَبَعَر
جهاز يستعمل لتحديد المسافة البؤرية .

Ceiller (F). ٢٥٥٣٢ - مُتَبَعَرَة
Cellar, Store-room (E).

Diagramme (F), Diagram (E). ٢٥٥٣٣ - مُتَبَعَان
هو البيلال ، اطباها .

Léthifère (F). ٢٥٥٣٤ - مُتَبَع ، مُتَبَع
Lethiferous, Deadly (E).

نمت تعريفه يطلق على المعبارات النباتية والادوية الحاشورية
التي تقتضي على الحياة .

Ovaire (F), Ovary (E). ٢٥٥٣٥ - مُتَبَعِش
المبيض في الحيوان هو العضو الذي يتكون فيه البيض
أو البويضات || والمبيض في النبات هو الجزء الاسفل
المتفتح من المدة ، يحوى من بويضة الى عدة بويضات
ويصير ثمرة بعد الانغاص .

Mûrâle, Mûrerale (F). ٢٥٥٣٦ - مُتَبَعَة
Mulberry plantation (E).
بستان التوت .

Odometre (F), Odometer (E). ٢٥٥٣٧ - مُتَبَعَر
آلة تقاس بها المسافة .

Gynécée (F). ٢٥٥٣٨ - مُتَبَع * ، وَرِيم
Gynaeceum (E).
هو مجموع اعضاء التأنيث في الزهرة وهو مؤلف من المبيض
يملوه قلم انبوي ينتهي بالمدة .

Métaldéhyde (F). ٢٥٥٣٩ - مُتَبَعَد هيد
Metaldehyde (E).

مادة كهاوية فعالة تستعمل في القضاء على جميع انواع
الرغويات التي تركب المزروعات . تحفر بمعدل ٥ %
وليس اكثر زوجة بالنفالة او بفشاراة الخشب وتنتشر على
التربة حيث الحزرون والبراق وغيرها تقتضي عليها جميعها .

٢٥٥٤٠ - مُتَبَع ما بين كل عمودين .

٢٥٥٤١ - مُتَبَع ، مُتَبَعَان
Méthane (F), Marsh gas (E).
غاز ملتب عديم اللون .

٢٥٥٤٢ - مُتَبَع *
Phaneroptera fascata (S).
Phanéropère (F).

حشرة من الجنادب وقصيلة القربوطيات . جسمها صغير
القد ، اخضر اللون ، اسمر النسفة والمشفة ، يطول عند
الذكور من ١٢ الى ١٥ سم . ويطول عند الاناث من ١٦
الى ١٨ سم . جناحها بطولان من ٢٠ الى ٢٣ سم . وسانها
من ١٨ الى ٢٢ . مرز الاثنى غليظ الحجم احسن الشكل
يميل الطرف المستند يطول من ٥ الى ٦ سم . || اناتها
تحت السرة في حمار الورااق والمصنف داخل اللون فينفق
عن بد نمة ثرود حافة التصل قبل ان تمسكن من السير
والنط .

٢٥٥٤٣ - مُتَبَعَة
Consistance (F), Consistence (E).

٢٥٥٤٤ - مُتَبَعَة
Figuier (F).
المثانة كرم التين او المكان الذي تكثر فيه اشجار التين .



منان

انواعها المرفوعة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهادي. تعيش على الصخور المنمورة قرب الشواطئ || اصداؤها شبه هرية الشكل وحيدة المصارع. سقاط اصداؤها يتطور مع العمر ويصبح كالنفسوة. اجسامها مخروطية. رؤوسها شبه اسطوانية. عيونها قاعدية. لواسها انبوبية قليلة الاستطالة. خياشيمها نظامية. ارجلها وحيدة مبطلطة.

Isométrique (F). **مُتَسَاوِي الأبعاد** ٢٥٥٤٨
Isometric (E).

Isotrope (F). **مُتَسَاوِي الاتجاه** ٢٥٥٤٩
Isotropic (E).

Equilatéral (F). **مُتَسَاوِي الأضلاع** ٢٥٥٥٠
Equilateral (E).

Equidistant **مُتَسَاوِي البُعد** ٢٥٥٥١

Equiangle, Isogonex (F). **مُتَسَاوِي الزوايا** ٢٥٥٥٢
Equiangular (E).

Isomorphe (F). **مُتَسَاوِي الشكل** ٢٥٥٥٣
Isomorphic (E).

Isobare (F). **مُتَسَاوِي الضغط** ٢٥٥٥٤
Isobaric (E).

Isocèle (F). **مُتَسَاوِي الضلعين** ٢٥٥٥٥
Isosceles (E).

Isodynamique (F). **مُتَسَاوِي القوة** ٢٥٥٥٦
Isodynamic (E).

Isopoda (S). **مُتَسَاوِيات الأرجل** ٢٥٥٥٧
Isopods (F). Isopods (E). Asellin (D).

رتبة حيوانات من القشريات.

Grimpeurs (F). **مُتَسَلِّقات** ٢٥٥٥٨
Climbers (E).

رتبة من الجوزحيات طيورها صغيرة القد أو متوسطة تتميز بتسلقها الاشجار. فصائلها عديدة اشهرها البينساوات والبقاقيات والطروغويات والطوقايات والقهقريبات والنقاريات.

Grimpante (F). **مُتَسَلِّقَة** ٢٥٥٥٩
Climbing, Twining (E).

النباتات المتسلقة والمارجة هي التي تتميز سوقها عن الانتصاب بدون عائل.

Accipiens **مُتَسَلِّم** ٢٥٥٦٠
المتسلم أو القايض هو من يقبض المقود عليه أو الملكية.

Homologue (F). Homologous (E). **مُتَسَاوِي، مُتَنَاسِب، مُتَنَاطِر** ٢٥٥٦١

Isomère (F). **مُتَسَاوِي الأجزاء** ٢٥٥٦٢
Isomeric (E).

Isotope (F). **مُتَسَاوِي الخواص** ٢٥٥٦٣
Isotopic (E).

Démagogue (F). **مُتَشَرِّع** ٢٥٥٦٤
Demagogue (E).

المُتَشَرِّع من يتظاهر بخدمة الشعب لامتلائه اليه.

Lézardé (F). **مُتَشَقِّق، مُنْصَدِع** ٢٥٥٦٥
Cracked (E).

Converti (F). Converted (E). **مُتَحَوِّل** ٢٥٥٣٣

٢٥٥٣٤ **مُتَنَج**
متن الجراد : اذا رز ذنبه وغرزه ليبيض.

Hibernant (F). Hibernating (E). **مُتَحَدِّر** ٢٥٥٣٥
صفة الحيوان الذي يبيت زمن الشتاء متخدراً باستمرار النوم.

Catométopes (F). **مُتَحَفِّيات** ٢٥٥٣٦
Catometopa (E).

لغة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى مرتبة قصار الذيل || اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد أو متوسطة. تتميز بدروعها شبه المربعة والقليلة الأحدياب.

Intercalaire (F). Intercalary (E). **مُتَحَدِّل** ٢٥٥٣٧
صفة الاشياء المتخلطة. راجع بيني.

Interlobaire (F). **مُتَحَدِّل الفصوص** ٢٥٥٣٨
Interlobular (E).

Adaptation **مُتَّحِد** ٢٥٥٣٩
هو الالاب والالزاب.

Mètre (F). Metre (E). **مِثَر** ٢٥٥٤٠
وحدة قياسية وضعتها الثورة الفرنسية وقد شاع استعمالها الآن في جميع اقطار العالم باستثناء البلاد الانكليزية والامريكية || يعتبر طول المتر مساوياً لجزء واحد من

المشرة ملايين جزء التي تولدت زام الحاضرة بين القطب ونقط الاستواء || اجزاء المتر هي الدسيمتر اي عشر المتر، والسنتيمتر اي جزء من مئة، والمليمتر اي جزء من الف. اما مضاعفات المتر فهي الديكاسمتر اي عشرة امتار والميكسومتر اي مائة متر والكيلومتر اي الف متر.

Métrier (F). To measure (E). **مِثَر** ٢٥٥٤١
قاس بالمتر.

Centiare, Mètre carré (F). **مِثَر مَرَبَع** ٢٥٥٤٢
Hundreth part of an are (E).

وحدة مساحة يقاسها الطولي والعرضي متر واحد.

Mètre cube (F). **مِثَر مَكْعَب** ٢٥٥٤٣
Cubic meter (E).

وحدة حجمية يقاسها الطولي والعرضي والارتفاعي متر واحد.

٢٥٥٤٤ **مِثَرَاخ**
نعت تعريفي يطلق على كل حلوب من بقرة ونعجة ومُز وناقة ينقطع درها بسرعة. تقول بقرة مُثَرَاخ. ج متاربخ.

Conjugué (F). **مُتَرَاقِب، مُتَوَافِق** ٢٥٥٤٥
Conjugate (E).

٢٥٥٤٦ **مُتَوَرِّحات الأسنان**
Opotérodontes, Typhlopidae (F). Typhlopidae (E).

مرتبة من الحيات تكون أسنانها إما في الفك الاعلى أو في الفك الاسفل.

٢٥٥٤٧ **مُتَوَرِّلة ***
Mitrularia (S).

Mitrulaire (F). Mitrularia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وحيادات الاجهزة وعضيلة الهينيسيات.



متولة

٢٥٥٦٦ - مُتَصَرَّف (F). Settlor (E). ٢٥٥٨٢ - مُتَنَاسِب

هو من يملك الغير تبرعاً سواء بجهة في حياته ام بوصية بعد مماته .
المثلث كوكبية نجوم جنوبية الموضع مشهورة باسم باطية ، اطلبها .

٢٥٥٦٧ - مُتَصَلَّب ، عَيْن ٥ Sclérrophyte (F). Multicolore (F). Multicolour (E). ٢٥٥٨٣ - مُتَوَلَّوَن

Sclerophyte (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات اوراقه عروية جامدة تصلب اللغنين .
كثير الالوان المختلفة .

٢٥٥٦٨ - مُتَصَلِّبَات ٥ Amétobole, Homomorphe (F). Rudistes (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات فصليجات الخياشيم عادات الرؤوس || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، جميعها من متحجرات الاباج الثاني . من ميزاتها سماكة الاسدان والتفارت البين في مصاريها واحجامها || اعرف اجناسها واشهرها الثلاثة .
نمت تعريفي يطلق في علمي الحيوان والنبات على الاعضاء او الاجزاء المتشابهة الشكل .

٢٥٥٨٥ - مُتَوَالِل الاجزاء Métamérisé (F).

نمت تعريفي توصف به الاجزاء المتألفة في كامل الجسم او في قسم منه .

٢٥٥٨٦ - مُتَوَالِل الاصابع Homopode (F).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان اصابعه متألفة العدد في قوائم الاربع .

٢٥٥٨٧ - مُتَمَاسِكَات الاسنان ٥ Denticètes, Odontocètes (F).

مرتبة حيوانات بحرية لبونة من رتبة الحويثيات تشمل الحيتان من ذوات الاسنان المتألفة غير قابلة التجديد || اجناسها المعروفة ٢٤ تبجسمها اربع فصائل : الجبعليات والدلفينيات والتمريبات والققيبات .
مرفقة حيوانات بحرية لبونة من رتبة الحويثيات تشمل الحيتان من ذوات الاسنان المتألفة غير قابلة التجديد || اجناسها المعروفة ٢٤ تبجسمها اربع فصائل : الجبعليات والدلفينيات والتمريبات والققيبات .

٢٥٥٨٨ - مُتَمَاسِك ، مُنَدِمَج Compact

Spirille (F). ٢٥٥٨٩ - مُتَمَعَّجَة ، حَلَزُونِيَّة

Spirillum (E).
نمت تعريفي شامل يطلق على البكتيريات والميكروبات الحيطية الشكل من اي نوع كانت .

٢٥٥٩٠ - مُتَمَقْلِب ٥ Tropicalisé (F).

نمت تعريفي يطلق على كل مادة صار اخضاعها الى المقلبة .

٢٥٥٩١ - مُقَنَّ Châtrer (F).

To castrate, To geld (E).
من الحصان والثور والكبش والتميس ... شق صفناً واستخرج خصاهما .

٢٥٥٩٢ - مُقَنَّ المئن ، ما ارتفع من الارض واستوى . والمئن نبات يعرف بالارقيس . ومن اللغة اصولها والفاظها ومفرداتها . ومن الكتاب ما جاء فيه دون الشرح والحواشي . ومن الطريق جادتها . ويقال اليوم ركب من طائرة او باخرة .

٢٥٥٩٣ - مُقَنَّ الفرس ٥

من الفرس نجم ثير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

٢٥٥٩٤ - مُتَنَاسِب طَرْدًا Directement proportionnel (F). Proportional directly (E).

٢٥٥٩٥ - مُتَنَاسِب عَكْسًا Inversement proportionnel (F). Proportional inversely (E).

٢٥٥٨٠ - مُتَنَاسِب المَنَار Gymnocarpe (F). Gymnocarpus (E).

٢٥٥٨١ - مُتَنَاسِب * Billonneur (F). Ridger (E).

معرث ذو مقلبين يقلبان التراب بمئة ويساراً فنصح اتلاماً .



متك



متلام

دون سواها. تلتد في تجاوير الاشجار. اناتها تبيض مرتين في العام، المرة الاولى في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران. ذكورتها تتناوب مع اناتها في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين.

٢٥٦١١ - مَتَوَقِّلُ الْغَابِ * (S). Certhia familiaris
Grimpeur des bois (F). Tree-Creeper (E).

ماتر من المتوقلات. اعطانه تشمل الشرق الادنى واروبى. يأنف المناطق الجبلية واخصها ارجاع التنبو والشربين || جسمه صغير القد يطول نحو ١٤ سم. يسقطه نحو ١٦ سم. ثوبه متداخل الالوان. راسه ورداؤه وظهوره وصغره الى الشقعة السمراء تعلوها رقشة بيضاء. جناحاه جذعان بالابيض. زوره وصدره وبعته الى البياض العاجي تشوبه مشعة فراء. ذنبه متوسط الطول رتاجي الريش، اسمر اللون، اشجع المواج. متفاده بين الاحديداد اسمر اللون. رساء قصيرتان صخيتان. خالبه صبيحة، حادة الاطراف، سوداء اللون || يأنف منظر ارجاع الجريد. يتسلق ساق الشجرة حتى القنة ويرتبي منها الى الارض ثم يتسلق غيرها متقبيا عن الحشرات ويرقاتها ومكبها. طيرانه قصير الشوط وانتقاله على الارض رقصة خرقاء || يدن عشه في تجاوير الاشجار. الانثى تبيض مرتين في الدم الاولى في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران. الذكر يتناوب الانثى في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين. يبضها عاجي اللون تملوه رقشة جوية تتكاثف عند العقب || قوته الحشرات ويرقاتها ومكبها لذلك فهو من الطيور الجزئية النفع.

٢٥٦١٢ - مَتَوَقِّلَات (S). Certhidae
Certhidés (F). Certhidae (E).

فصيلة طير من الجواثم رقيات المناقير. اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور النافعة. قوتها الحشرات.

٢٥٦١٣ - مَتَوْنِي * (F). Métou (F). Metonic (E).
من متون (Métou) اسم علم. نعت تعريفي يطلق على دورة فلكية مدتها ١٩ سنة، تدعى الدورة المتونية، يقع بعدها كل من ايام الاسابيع في التاريخ ذاته من الاشهر. والدورة المتونية تشمل ٢٣٥ هلة او شهر قري او ٦٩٣٩٧ يوما و ٧٠٪ من اليوم.

٢٥٦١٤ - مَتَبَّاسِر (F). Lévygyre (F). Levogyrate (E).
ما كان سطح استقطابه متجها الى اليسار.

٢٥٦١٥ - مَتَبَّاسِم (F). Dextrogyre (F). Dextrogyrate (E).
ما كان سطح استقطابه متجها الى اليمين.

٢٥٦١٦ - مَتَبَّزَّة * (F). Mutisia (F). Mutisie (F).
جنس نباتات جنينية عمرة عارشة من فصيلة المركبات. انواعها المعروفة ٣٠ اعطائها بلاد امريكا الجنوبية. اوراقها متعاقبة لا قياسية التركيب منها البسيطة ومنها المركبة التي تلتبي بمخاوي دقيقة مستطيلة. وريقاتها شائعة متعاقبة. ازهارها كبيرة القد متراكبة اللبسات الثلاثية التسنين. بزورها مخروطية مستطيلة تلتبي بقنازع ريشية || اشهر انواعها التزيينية ما يتبع.

٢٥٥٩٦ - مَتَبَّزَّة (F). Sapinière (F).
Fir wood, Fir-grove (E).

مغرس تنوب او حرجية تنوب.

٢٥٥٩٧ - مَتَبَّزَّج (F). Récessif (F). Recessive (E).
نعت تعريفي يطلق على الصفات الوراثية المسودة.

٢٥٥٩٨ - مَتَبَّه (F). Oryx beisa (F).
هي الاربع الافريقي، اعطيه.

٢٥٥٩٩ - مَتَبَّهْدُوج (F). Hydrogéné (F). مَتَبَّهْدُوج (F). Hydrogenated (E).
مركب مع الهيدروجين او يحوي بعض الهيدروجين.

٢٥٦٠٠ - مَتَبَّه (F). Inculpé (F).
هو من وقع عليه الاتهام.

٢٥٦٠١ - مَتَوَازٍ، مَتَوَازٍ، مَتَوَازٍ (F). Parallèle (F). Parallel (E).

٢٥٦٠٢ - مَتَوَازِي الْحَرَارَةِ (F). Isotherme (F).
مطابقة درجة الحرارة في اماكن مختلفة.

٢٥٦٠٣ - مَتَوَازِي السُّطُوح (F). Parallélépipède, Parallélépipède (F). Parallelepiped (E).

٢٥٦٠٤ - مَتَوَازِي الْمُسْتَطِيلَات (F). Parallélépipède rectangulaire (F). Rectangular parallelepiped (E).

٢٥٦٠٥ - مَتَوَالِيَّة، مِرْقَاة (F). Progression
وقد تكون متوالية حسابية.

٢٥٦٠٦ - مَتَوَالِيَّة حَسَابِيَّة (F). Progression arithmétique (F). Arithmetical progression (E).

٢٥٦٠٧ - مَتَوَالِيَّة هندسية (F). Progression géométrique (F). Geometrical progression (E).

٢٥٦٠٨ - مَتَوَالِيَّة (F). Matuta (S). Matute (F). Matuta (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل الاحمرحات وفصيلة الكوكليات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اعصها شواطئ البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة القد رافضة الدروع الحمودية المجهرية بسنتين جانبيين كبيرين. ارجلها الخلفية والاسامية ملقية الاطراف. ملاقطها كبيرة ونشطة || عوبها كاعنة الصنف لا تؤكل.

٢٥٦٠٩ - مَتَوَجَّج، وَاجِب (F). Doit (F). Debit (E).
هو المطلوب من صاحب الحساب.

٢٥٦٠٨ - مَتَوَسَّط الطول (F). Médoligne (F).
نعت تعريفي توصف به بعض سلالات الحيوان والطير كالخيل والابغار والاعظام والمنازع واللجاج المعتدلة الطول.

٢٥٦٠٩ - مَتَوَسَّط نسبتي (F). Moyenne proportionnelle (F). Geometrical mean (E).

المتوسط النسبي والمتوسط المناسب والمتوسط التناسبي واحد.

٢٥٦١٠ - مَتَوَقِّل (F). Certhia (S). Grimpeur (F). Tree creeper (E).
جنس طير من فصيلة المتوقلات. انواعه عديدة جميعها نافعة. تألف المناطق الجبلية اعصها الحرجية. قوتها الحشرات



متوة



متوقل



متوقل الغاب



متبزة

levkoje Matthiole (D). Violacclocco (I).

نوع من المتيولا الرّيبينية. ضرورها عديدة، جميعها حولية أو محولة تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. سوقها فراءه. أوراقها بحرية اللون عنايقدها الزهرية كبيرة القند. أزهارها مكبسة مختلفة الألوان يكثر فيها الأحمر والبني. جميعها فواحة العرف المستحب || أزهارها يستمر طول فصل الربيع.

٢٥٦٢٦ - مَكْبَا المَشَا، هو القراش.

Emblavement, Emblavage (F). مَنَارَة

Wheat-sowing (E).

هو الحقل وكل مزروع سمه وكرب وبذر وأثير.

Prototype

٢٥٦٢٨ - مَيْثَال هو السب، اطلبه.

Vessie (F). Bladder (E). مَكْنَاة، مَيْوَلَة

عضو رئيسي في الجهاز البولي. والثانة تتكون من جراب عضلي يستلوي البول ويجمعه بعض الوقت.

Fixateur (F).

Fixing solution (E).

٢٥٦٢٠ - مَيْثَات ٥ نمت تعريف يطلق على كل مادة تتميز بخاصة الثبيت. ج مثابت.

٢٥٦٣١ - مَيْثَاب ٥، مَيْثَاب ٥

Limnimètre, Limnomètre (F). Limnimeter (E).

جهاز يستعمل في تقدير اوضاع مستوى البحيرات والاهوار.

Mixtion

٢٥٦٣٢ - مَيْثَج مَيْثَج الي: خلطه.

٢٥٦٣٣ - مَيْثَعَب، مَيْثَعَب، مَيْثَعَب، مَيْثَعَب

Siphon مَيْثَعَبَات، مَيْثَعَبَات

Siphoneae (S). Siphonées (F). Siphoneae (E).

فصيلة من الخفيات الحفر.

Tarière (F). Auger, Drill (E).

٢٥٦٣٥ - مَيْثَقَب هي البريمة، أداة تستعمل للثقب.

٢٥٦٣٦ - مَيْثَقَبَات

Trematoda (S). Trématodes (F). Trematoda (E).

صف من الديدان العريضة.

Trypanosoma (S).

Trypanosomes (F). Trypanosoma (E).

٢٥٦٣٧ - مَيْثَقَبَات حيوانات دنيا طفيلية من الاوالي السوطيات.

Orbicole (F). Orbicol (E).

٢٥٦٣٨ - مَيْثَكَام ٥ نمت تعريف يطلق على كل حيوان او نبات يستطيع

الايراد في مختلف اقاليم المعمورة.

Perversité (F). Perversity (E).

٢٥٦٣٩ - مَيْثَلَبَة المَلَبَة عيب خلقي او فساد في الاخلاق. مثاب الحكم والقضاء.

٢٥٦١٧ - مَيْزَةُ خَطْبَةِ الْوَرَقِ

Mutisia linearifolia (S). Mutisie à feuilles linéaires (F).

نوع من الميزة. ساقها قصيرة تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها خطية الشكل. نصالها منتشرة الاطراف تنتهي بجوارق مستطيلة. أزهارها ثنائية السينات، كبيرة القند، قمرية اللون || أزهارها يستمر طول فصل الصيف.

Mutisia decurrens (S).

Mutisie décurrente (F).

نوع من الميزة، ساقها دقيقة فراءه تملو من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها ساعدة كاملة، نصلها سناني الشكل بحري اللون ينتهي بطفة فراءه || أزهارها برتقالية اللون تملو من ١٠ إلى ١٢ سم. أزهارها يستمر طول فصل الصيف.

٢٥٦١٩ - مَيْزَةُ مُسْتَعْرِضَةِ الْوَرَقِ

Mutisia latifolia (S). Mutisie à feuilles larges (F).

نوع من الميزة، ساقها تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها ساعدة لائفة قلبية الشكل، نصلها مسن الحافة ثلاثي الأذينات. أزهارها وردية السينات، صفر الاقراص، مزينة القلائد، حافة القنايات الفارشة || أزهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

٢٥٦٢٠ - مَيْزَةُ مَلْعُونَةِ

Mutisia clematicis (S).

Mutisie clématite (F).

نوع من الميزة، ساقها دقيقة نحيلة تملو من ٦ الى ١٠ امار. أوراقها مركبة، وريقاتها شغوية التجميع ثمانية او عشارية الازواج. نصالها اهليجية الشكل، خلية البشر. حولها ثلاثية الانشعاب. أزهارها كبيرة القند، حراء اللون، مستطيلة الانعاق، متدلية || أزهارها يستمر من الصيف الى الخريف.

٢٥٦٢١ - مَيْزِيَّة ٥

Matisia (S). Matisie (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة النجايات مهددا بعض مناطق امريكا الاستوائية || اشجارها كبيرة داحجة. سوقها منتصبه تملو من ١٢ الى ١٥ م. أوراقها متعاقبة، معقة. نصالها سنانية الشكل، جامدة الوثل، ناشرة العروق السباعية الازواج. أزهارها فسي التجميع. أزهارها مستطيلة الانعاق، بيضاء اللون، وردية المواج. ثمارها نووية، بيضية الشكل، خماسية الخلود، مأكولة مستحبة الطعم القريب من طعم المشمش.

٢٥٦٢٢ - مَيْثَكُو

Matico (F).

هو التامول الضيق الورق.

٢٥٦٢٣ - مَيْثِيلِين

Méthylène (F). Methylene (E).

كحول مستطير من الخشب.

٢٥٦٢٤ - مَيْثِيْلَا

Matthiola (S). Matthiole (F).

جنس نباتات عشبية وجنية من فصيلة الصليبيات. انواعها عديدة، معظمها بري منه العسر والجول والحولي. جميعها قريبة الشبه من الخيري، سوقها وأوراقها زياء. أزهارها عقودية، طرية، عطرية. ثمارها غردلية ثنائية الخلد. زورها دقيقة مبطلة حنطية اللون.

٢٥٦٢٥ - مَيْثِيْلَا مَكْبَسَة *

Matthiola bicornis (S). Matthiole à 2 cornes, Giroflée des jardins (F). Night scented stock (E). Garten-



مَيْزَة



مَيْثِيْلَا مَكْبَة

Fruiterie (F). Fruit-loft (E). **مُتَمَرَّة** - ٢٥٦٥٤
المكان المد لحفظ الثمار.

Jardin fruitier (F). **مُتَمَرَّة** - ٢٥٦٥٥
Orchard, Fruit-garden (E).
هي بستان الاشجار المثمرة الفاكة .

Octogone (F). Octogon (E). **مُتَمَسِّن الزَوَايَا** - ٢٥٦٥٦

Cystite (F). Cystitis (E). **مُتَن** - ٢٥٦٥٧
التهاب المثانة او وجعها .

مُتَنَان * ، **كُرْمَدَاكَة** ، **دَفْنَة لاحِفَة** - ٢٥٦٥٨
Daphne gnidium, Thymelaea hirsuta (S). Daphné gnidium, Garou, Thymelée, Salnbos (F). Gnidium, Spurge flax (E). Purgierstrauch, Rispenblütiger Seidelbast (D). Barbosa, Dittineira, Laureola lupina (I).
نوع من الدفنة تملو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. فروعها مستقيمة عديدة. اوراقها منتصبه لاحفة الفرع والقند. تصلها جلدي التسيج، جامد التركيب، مستطيل القد. ازهارها عنقودية التجميع، هامة الازتكاز، بيضاء اللون، فواحة العرف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول. يستخرج من لحائها وجذورها واوراقها بعض المواد الفعالة الشائعة الاستعمال الصمي والطبي.

Periculture (F). **مُتَنَسِّكَة** - ٢٥٦٥٩
المثنية هي تربية الشمع وغيره من الحمار المغول في احواض خاصة وبناحيات معينة لاستخراج القز الذي يتكون في اجوافها بعد سبع او ثمان سنوات .

مُتَج ، **مُتَجَّج** - ٢٥٦٦٠
حب الماش .

Pigeonneau (F). **مُتَج** - ٢٥٦٦١
Young pigeon (E).
المج : فرخ الحمام .

Suc (F). Juice (E). **مُتَجَاة** - ٢٥٦٦٢
مجانة الشيء : عصارتها .

Culture de noyers (F). **مُتَجَاة** - ٢٥٦٦٣
الحجازة : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز.

Champ (F). Field (E). **مُتَجَال** - ٢٥٦٦٤

مُتَجَال مَغْنَطِيسِي - ٢٥٦٦٥
Champ magnétique (F). Magnetic field (E).

Vesicaria (S). **مُتَجَال** * - ٢٥٦٦٦
Vésicaire (F). Bladder-pod, Bladder-seed (E). Blasenschötchen (D). Vescicaria (I).
جنس نباتات عشبية برية وتربيتين من فصيلة الصليبيات. انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطانها حوض البحر المتوسط. وبعض مناطق اسريكة الشالية. سوطها منتصبه وغالباً فردية. اوراقها كاملة متناقة اهلبيجية، تصلها لزع البشرة. ازهارها عنقودية التجميع، طرفية الازتكاز، صفراء اللون او ارشوانية.

Exhibitionniste (F). **مُتَجَالِج** - ٢٥٦٦٧
Exhibitionist (E).
نمت ترميني يطلق على كل امرء به علة تتسلط على جهازه المبني فتحة وتدفعه على عرض شواره .

Terné (F). Ternate (E). **مُتَلَت** - ٢٥٦٤٠
نمت ترميني توصف به الاعضاء النباتية الثلاثية الاجزاء او التركيب .

Triangle **مُتَلَت** - ٢٥٦٤١
شكل هندسي ثلاثي الاضلاع والزوايا .

Tribasique (F). **مُتَلَت الاساس** - ٢٥٦٤٢
Tribasic (E).
مثلث الاساس او مثلث القاعدة كل حافض فيه ثلاث ذرات هيدروجينية تستبدل بذرات قاعدية .

Trilatéral (F). **مُتَلَت الاضلاع** - ٢٥٦٤٣
Trilateral (E).

Triangle austral (F). **مُتَلَت الجنوبي** - ٢٥٦٤٤
Triangulum australe (E).
مثلث الجنوب كوكبة نجوم تمتد بين المذبح المربع والحل ومطائر الفردوس والملاوس || نجم الزاوية العليا من المرتبة الثالثة والنجمان الاخران من المرتبة الرابعة .

Triangulaire (F). **مُتَلَت الزوايا** - ٢٥٦٤٥
Triangular (E).

Triangle boréal (F). **مُتَلَت الشمال** - ٢٥٦٤٦
Triangulum borealis (E).
مثلث الشمال كوكبة نجوم تمتد بين ساويس والمرأة المسلسلة والحبل || اجمل نجومها تشكل مثلثاً قائم الزاوية لامتناهوي الاضلاع .

مُتَلَت قائم الزوايا - ٢٥٦٤٧

Triangle rectangle (F). Right-angled triangle (E).

مُتَلَت مُتَسَاوِي الضلعين - ٢٥٦٤٨
Triangle isocèle (F). Isosceles triangle (E).

Glacière (F). **مُتَلَخِجَة ، مَجَلَدَة** - ٢٥٦٤٩
Ice-house, Freezing-machine, Ice-cave (E).
المكان المخصص لحفظ الديك . والمكان الجبل المد لحفظ اللحوم والوسائل السريعة الاختيار. وآلة المدة لاصطناع الصقيع .

Sphaerulites (S). **مُتَلَخِجَة** * - ٢٥٦٥٠
Sphérulite (F). Sphaerulites (E)
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المتصلبات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصدانها حلزونية الشكل ، مخددة ، متلعة ، تركز على قواعد اسطوانية مجوفة تغلف مع اقترابها من القمة واطراف الجملون .

Fongible (F). Fungible (E). **مُتَلِي** - ٢٥٦٥١
المتليات او الاشياء المتلية هي كل موزون او مقيس او مكيل يصلح بعضه بديل من البعض الاخر . وان لم تكن كذلك فهي قيمة (Non Fongibles).

Fructifère (F). Fructiferous (E). **مُتَمِر** - ٢٥٦٥٢

Fruiter (F). Fruit-bearing (E). **مُتَمِر** - ٢٥٦٥٣
ذو ثمر .



مثلث



مُتَنَان



مُتَجَال

تنتهي إلى عدة فصائل، منها الإلييات والبقريات والجمليات والزرايات والنفثيات الخ.

Extirpateur (F). **مِجْتَه**، **مِجْتَه** ٢٥٦٧٦
Weeder, Weeding-tool, Spud (E).
محراث خاص يستعمل لقتلاع الأعشاب الرديئة.

Essoucheur (F). Grubbing (E). **مِجْتَات** ٢٥٦٧٧
جهاز آلي يستخدم في اقتلاع أرويات الاجار.

Juchoir, Perchoir (F). **مِجْتَم** ٢٥٦٧٨
Roosting-place, Roost (E).
خشبات معترفات في الخيم يحط عليها الدجاج. ومن الخيام الطينية المشهورة:

Héronnière (F). Heronry (E). **مِجْم البشون**
Corbeautière (F). Rookery (E). **مِجْم الغربان**

٢٥٦٧٩ - **مِجَج** الجمع: ادراك العنب ونضجه.

٢٥٦٨٠ - **مِجْدَاب**، **مِجْدَال**، **جَدْء**،
جَدْءَة، **مَاحِل**، **مَاحِل**، **مَحَلَة**

Terrain improductif (F). Unproductive ground (E).
هي التربة التي لا تنحب قط.

Littoral, Rivage (F). **مِجْدَاح** ٢٥٦٨١
Sea-coast, Sea-board (E).
المِجْدَاح هو ساحل البحر. ج مجاح.

Régénérateur (F). **مِجْدَاد** ٢٥٦٨٢
Regenerator (E).

Epouvantail (F). **مِجْدَاك**، **نُطَار** ٢٥٦٨٣
Scarecrow (E).
ما ينصب في الحدائق والزرورع مزينة للقطير والوشش.

Alle (F). Wing (E). **مِجْدَاف** ٢٥٦٨٤
هو الجناح أو السقط. مجداف الطائر: جنسאה.
يقال غفق الطائر بمجدافيه.

٢٥٦٨٥ - **مِجْدَج**
المِجْدَج نجم صغير يدعى أيضاً حادي النجم، اطلبه.

٢٥٦٨٦ - **مِجْدَع**
المِجْدَع من الحبر: للمقطوع الأذن والمِجْدَع من الثبات ما قطع اعلاه.

Bec droit (F). Straight bill (E). **مِجْدَاف** ٢٥٦٨٧
المِجْدَاف المنقاد الجالس المامد التحبين والبرية.

Radicant (F). **مِجْدَاك** ٢٥٦٨٨
Radicant, Radicating (E).
نمت تعريفي نباتي توصف به السور التي تخرج جنوداً هوائية تتدل حتى التربة.

Aviron, Rame (F). **مِجْدَاف**، **مِجْدَاف** ٢٥٦٨٩
Oar, Scull (E).

٢٥٦٩٠ - **مِجْدَالِيَّاتُ الأَرَجُلِ**
Copepoda (S). Copépodes (F). Copepoda (E).
رَبَّة حيوانات صغار من صف القشريات تتميز بأرجلها

Exhibitionnisme (F). **مِجْدَالِيَّة** ٢٥٦٩٨
في الجلعة، اطلها.

٢٥٦٩٩ - **مِجْدَان سَاحِر** ٥، **سَتِيرُس سَاحِر** ٥
Satyrus circe (S). Satyre circé, Silène (F).
Satyrus circe (S).

حشرة من فصيلة المِجْدَانِيَّات ورَبَّة حشرقيات الاجنحة.
موطنها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الأوسط إلى
أروبة وإفريقية الشمالية. فراشها واسعة قوتها مفتر الانزهار.
سوقها تعيش على صنف النجيليات || جسمها كبير القدر.
يعول نحو ٢٣ م. بسطها نحو ٦٦ م. رأسها كسني
اللون الداكن. عيناها كبيرتان. زباناها صرلانيان.
مرشها معتدل الحجم والطول. جوشها ويطنها إلى الخنطي ||
رواشها كسنية اللون يعلوها عند الذكر سمرة لامة وسبع
ينع بيض وسبع نقط حنطية هامشية الانتكاز. ويعلوا
عند الانثى خمس ينع بيض تحرق الصفحة بكامل عرضها ||
لها جيل واحد في الخول. تظهر القراشة في تموز. تسرح
في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو سبعة أسابيع وتتمتع
المكن لطفاً جل الصفحات السفلى من نصال المصنف ||
السوقة طول نحو ٣٦ م. جسمها شبه أسطواني الشكل،
مالس اللشار. نوبها إلى السمرة الكسنية يعلوها خطان
جائليان صنابيان ويكتنفها خمسة خطوط سود قاطبة وثلاثة
اطواق صدرية جوية وتسعة اطواق بطنية سود. شربها
ذلك الطرف المفلوق. مدها ورواجها إلى السمرة || طور
الاكتمال الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع ينتفضي في التربة
تحت الجلعة.

٢٥٦٩٠ - **مِجْدَالِيَّات** ٥
Satyridae (S).
Satyridés (F). Satyridae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رَبَّة حشرقيات الاجنحة.
اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد. معظمها متوسط
القدر أو صغير. تتميز بالنباتين اللوني بين الشقين ||
اجناسها قليلة الصلاة. رواشها كاملة، الخلفية منها
قليلة التفريغ أو عادته. ملامسها منتصبة. قرونها
الاستثمارية تحمله صرلانية الشكل || طيراتها مزيج من
الحوم والرقصة والسيفيت السريع القصير الشوط ||
اساريمها تعيش على النجيليات وهي مجهزة بزوائد شرجية
صغيرة فرقة || اشهر اجناسها المِجْدَان والرغالة والشوق.

٢٥٦٩١ - **مِجْدَانَة**
Champignonnière (F).
Mushroom bed (E). المكان الممد لزراعة الفطور.

٢٥٦٩٢ - **مِجْدِيل** ٥
Formatif (F). Formative (E).
نمت تعريفي يدل على وجود الجيلة. كفوك القطب
المِجْدِيل للدلالة على القطب الذي تتكون فيه النمرة في البيفة
المركوبة.

٢٥٦٩٣ - **مِجْدِيَّة**
Présure (F). Rennet (E).
هي السوة، اطلها.

٢٥٦٩٤ - **مِجْدِيَّة**
Fromagerie (F).
Cheese farm, Cheese-trade (E).
المعمل المختص بصناعة الجبن.

٢٥٦٩٥ - **مِجْدَرَات**
Ruminants (F).
Ruminants, Ruminating (E).
الحويوانات التي تجتر اكلمها وهي من مزدوجات الاصابع



مِجْدَان

Aloyau (F). Sirloln (E). مَجَسَّةُ الْحَقْوَيْنِ ٢٥٧٠٧

Travers (F). مَجَسَّةُ الْخِصَارَةِ ٢٥٧٠٨

Breadth (E).

Maniement des abords مَجَسَّةُ الْعَجَزَيْنِ ٢٥٧٠٩

Avant-cœur, Paleron (F). Shoulder-blade, Chuck (E). مَجَسَّةُ رَأْسِ الْكَتِفِ ٢٥٧١٠

Bord (F). Edge (E). مَجَسَّةُ رَأْسِ الْوَرَكِ ٢٥٧١١

Tétraèdre (F). مَجَسَّمُ مُرَبَّعِ الْوُجُوهِ ٢٥٧١٢

Tetrahedron (E).

Ellipsoids (F). مَجَسَّمُ نَاقِصٍ ٢٥٧١٣

Ellipsoid (E).

Ellipsoids (F). مَجَسُّوسِيَّةٌ ، مَلْمُوسِيَّةٌ ٢٥٧١٤

Palpabilité (F). Palpability (E).

Gypsomètre (F). مَجْصَاصٌ ٢٥٧١٥

Gypsumeter (E).

لهقفة مقياس الجبس، جهاز يستخدم في قياس الجبس

لهقفة مقداره ونسبته.

Exoaceae (S). مَجْعَدَاتٌ ٢٥٧١٦

Exoacées (F). Exoaceae (E).

فصيلة فطور طفيلية من الزقيات. اجناسها وانواعها عديدة

جميعها عسارة؛ بعضها يركب اوراق الاتجار المشمرة فيؤذيها.

Exoascus (S). مَجْعَدَةٌ ٢٥٧١٧

Exoascus (F).

جلس فطور مؤذية من فصيلة المجدبات يطلق عليه اسم

تفرينه، اطلها.

Four à dessécher, مَجْفَافٌ ٢٥٧١٨

Séchoir au feu (F). Bake house, Drying-house (E).

بناء خاص تجفف في داخله بواسطة الحرارة بعض المحاصيل

الزراعية اخصها تبوغ السيكار وتبوغ فوريجينية.

Etuve (F). مَجْفَافَةٌ * ، مِجْمٌ ٢٥٧١٩

Stove (E).

جهاز يحكم السد، اختياري الحرارة، يستخدم في شئ

الاعمال الانشائية والتلهيرية والتعقيمية.

Arillé (F). Arillate (E). مَجْفَتَةٌ ٢٥٧٢٠

نعت تعريفي يطلق على كل بذرة مجهزة باريل اي جنت.

مَجْلٌ ٢٥٧٢١

المجل : انشقاق من العضبة في اسفل عروق الفرس، وهو

من عيوب الخيل.

Ovoscope مَجَلَّةٌ * ٢٥٧٢٢

جهاز خاص يستعمل في استبعاد بيض الترخيم لانقضاء

المزكوم الصالح وترك الجديب.

Sérimètre (F). مَجَلَّةُ الْحَرِيرِ ٢٥٧٢٣

Serimeter (E).

جهاز يبين وزن خيط الحرير وصلابته ومرونته.

المجدافية الشكل. فصائلها واجناسها واتواعها كثيرة العدد.

اصطناعها جميع البحار والمياه العذبة تعيش متقلة على الاسماك.

Multiple مَجْدُور ٢٥٦٩١

المجدور : الحاصل من ضرب عدد في نفسه.

Foetus (F). Foetus (E). مَجْرٌ ٢٥٦٩٢

الجر : ما في بطون الحوامل من الغنم وغيرها من ذوات

الظلف.

Bief (F). Reach, Level (E). مَجَرٌ ٢٥٦٩٣

قناة مصطنعة لجر الماء.

Héliomètre (F). Heliometer (E). مِجْرَامٌ * ، هِلِيُومِتْرٌ ٢٥٦٩٤

جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الاجرام السماوية.

Voie lactée (F). مَجْرَّةٌ ، شَرْجُ السَّمَاءِ ٢٥٦٩٥

Galaxy, Milky way (E).

بياض يرى في السماء يتكون من ألوف النجوم المتقاربة

التي طمس نور بعضها بعضاً فصارت كأنها سحب ابيض.

وفي ترى في الشتاء اول الليل في ناحية من السماء. ورى

في الصيف اول الليل في وسط السماء. وفي تنور دورة

رحوية فتراها نصف الليل ممتدة من المشرق الى المغرب وفي

آخر الليل من الجنوب الى الشمال.

Houe cintrée (F). Hoc (E). مِجْرَقَةٌ ٢٥٦٩٦

اداة زراعية تستعمل لرفع التراب وترتيبه.

Courant d'eau (F). مَجْرَى مَاءٍ ٢٥٦٩٧

Current, Stream (E).

Tondeuse (F). Shearer, Clipper (E). مِجْرٌ ٢٥٦٩٨

اداة يذوية أو آلية تستعمل لجز صوف الدواجن.

Balsamine des jardins (F). مِجْرَاعَةٌ ٢٥٦٩٩

هي البسما من النباتات التريينية، اطلها.

٢٥٧٠٠ مِجْرَاعِيَّاتٌ هي البسمينيات، اطلها.

Contre-espallier (F). مِجْرَعَاتٌ ٢٥٧٠١

Espallier facing another (E).

هي الاشجار المثمرة القائمة على الاسلاك وقد صارت تشذيبها

وفقاً لقناعة.

Filet (F). Dash (E). مِجْرَقَةٌ ، شَبَكَةٌ ٢٥٧٠٢

الشبكة يصاد بها السمك.

Manet, Maniement (F). Handling (E). مَجَسٌ ، مَجَسَّةٌ ٢٥٧٠٣

ما يجتس باليد من جسم الحيوان لهقفة سمته أو هزاله.

Stéréoscope (F). مِجْسَادٌ * ٢٥٧٠٤

Stereoscope (E).

منظار جسم. جهاز بصري يمكن من مشاهدة الرسوم

بقشاشها بفعل التنفيد الذي تولته النظارتان.

Stéréoscopique (F). مِجْسَادِيٌّ ٢٥٧٠٥


Stereoscopic (E).

Oreillette, Oreillon (F). مَجَسَّةُ الْأَذْنِ ٢٥٧٠٦

Auricle, Earlet (E).



مِجَاد



مِجَانَةٌ



مِجَلَّةٌ

٢٥٧٢٧ - **مِجَنَّاخِي** ° Pterygoidien (F).

Pterygoidien (E).

نعت تعريفي يطلق على بعض عظام الفك الجناحية الشكل.

٢٥٧٢٨ - **مُجَنِّح** Alifère (F).

Aliferous, Aligerous (E).

نعت تعريفي يطلق على الحشرات التي تحمل اجنحة .

٢٥٧٢٩ - **مُجَنَّنَاتُ أُمْلَى** Pterygotes,

Pterygogénés, Ptilotes (F). Pterygotes (E).

مطابقة من الحشرات تشمل معظم شرب ورتب الحشرات المعروفة وقدها ٤ شرب ١٤ وطبق ٣٦ رتبة . أما فصائلها واجناسها فعدة آلاف .

٢٥٧٣٠ - **مُجَنَّنَاتُ الْأَرْجُل** Pteropoda (S).

Pteropodes (F). Pteropoda (E).

رتبة من الرخويات المعدي التي تتميز بأرجلها المنحنية .

٢٥٧٤١ - **مُجَنَّنَاتُ الْأَيْدِي** Cheiroptera (S).

Cheiroptères, chauves-souris (F). Cheiropters (E).

رتبة حيوانات ليلية راسمة تتميز بجناح جلدي يكتنف قوائمها فيمكنها عند انتشاره ، من الطيران || اجسامها كروية ، صغيرة القد ، رؤوسها بيضاء . اذنتها متباينة الاشكال والاحجام . تسليها كامل الانظام ، مفترقات العدد الذي يختلف مع الاجناس . اعتناقها قصيرة . ارجلها خاسية الاصابع ، دقيقة المالحب الشديدة الانعكاف . ايها فردية الاصابع || انثاها اكبر قدماً من ذكورها ، وهي ثنائية الثدي ، حولية الحمل ، يحملها يدم من ٣٨ الى ٤٠ يوماً تضع في تمامه جرراً واحداً يكتسي ويوسع بعد الوضع ستة ايام ، ويبيض بعد اليوم العاشر . ترضعه الام ويتعلق بصدرها حتى الفطام اي نحو سبعة اصابع || انواعها المعروفة نحو ٩٠٠ تنقسمها عشرات الاجناس تنقسم الى ست فصائل تنتمي الى مرتبتين ، مرتبة الطوايط ومرتبة الخفافيش كما هو موضح في الجدول التالي للاسفل .

٢٥٧٤٢ - **مُجَنَّنَف** ° Talus (F). Slope (E).

المنحدر الارض المنحدرة على شكل جلود .

٢٥٧٤٣ - **مُجَهَّر** * Microscope

جهاز بصري يستخدم لتكبير وتوضيح المراتب الصغيرة الدقيقة . وهو على انواع البسيط، والمركب والالكتروني والوحيد النظارة والثنائي النظارات .

٢٥٧٤٤ - **مِجَهَر** Microscope (F).

Microscopium (E).

المهر كوكبية نجوم جنوبية الملقح كركوها تحت برج الجدي || يجوبها قليلة العدد جميعها من المرتبة السادسة والسابعة .

٢٥٧٤٥ - **مِجَهَرِيَّات** ° Microzoaires (F).

Microzoarian, Microzoön (E).

المهر يات حويينات دنيا لا تشاهد الا بواسطة المهر .

٢٥٧٤٦ - **مَجْهَرَد** Effort, Tension (F).

Stress, Strain (E).

هو ما تستطيع حله الوحدة السطحية من الباطن دون ان تتأذى . يعبر عن الحمل بالكيلو غرام ومن الوحدة السطحية

٢٥٧٢٤ - **مِجَلَّةُ الْحَلِيب** Lactoscope (F).

Lactometer (E).

جهاز يستخدم لمعرفة مقدار المواد السنية الموجودة في الحليب .

٢٥٧٢٥ - **مِجَلَّةُ السَّحَاب** ، **مِشْحَاب** °

Néphoscope (F). Nephoscope (E).

آلة تستخدم لمعرفة اتجاه السحب وسرعها .

٢٥٧٢٦ - **مِجَلَّةُ الْوُلُوْث** ° Lucidoscope (F).

Lucidoscope (E).

جهاز يستعمل في التمييز بين الالوان الطبيعية والمزودة او الصنية .

٢٥٧٢٧ - **مِجَلَّاح** * ، **دِكَوَيْل** Dicotyles (S). Pécarl (F). Peccary, Mexican hog (E).

جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات موطنه امريكا الوسطى والجنوبية ، طوله نحو ١٠٠ سم . علوه ٤٠ وذنيه ٢ سم . نظيفته مستطيلة اذناه صغيرتان منتصبان . جسمه كثيف الحلب الفيلظ . قوائمها مخيلة || يعيش جماعات كبيرة تفردا الفصول المأمنة . يألف الاحراج والادغال الرطبة وصفات الانهر . قوته الجلود والثمار والحبوب . مسرحه من الغروب الى الفجر ، لا يقرب الاماكن الآهلة || انثاه تضع جروين مرة واحدة في السنة || اعرف انواعه واشهرها :

Dicotyles labiatus (S). **مِجَلَّاحُ ابْيَضُ الْبَرَامِط** Pécarl à lèvres blanches (F).

Dicotyles angulatus (S). **مِجَلَّاحُ الْمَكْسِك**

Pécarl du Mexique (F).

Dicotyles tajacu (S). **مِجَلَّاحُ تَجَاكُو** ، **مِجَلَّاحُ مَطْوَك**

Pécarl Tajacou (F).

٢٥٧٢٨ - **مِجَلَّاد** Pagoscope

هو الخدار ، مكشاف الجلد ، اعلمه .

٢٥٧٢٩ - **مِجَلَّة** ، **نَقَّاطَة** ، **بَيْلَة** Ampoule (F). Ampulla (E).

Glacière

٢٥٧٣٠ - **مِجَلَّةُ دَة** ° راجع مئجلة .

٢٥٧٣١ - **مِجَلَّةُ زَة** ° Coudrale (F). Hazel-copse (E).

مفرس اشجار البندق .

٢٥٧٣٢ - **مِجَلَّسُ وَصَايَة** Conseil de tutelle (F).

مجلس قانوني مؤلف من بعض اقرباء القاصر او المجهور عليه، مهمته حاية القاصر ومراقبة اعمال الوصي او القيم .

٢٥٧٣٣ - **مِجْتَمَع** Académie (F). Academy (E).

تعبير يطلق على مجتمع من العلماء يجتمعون لاجل النظر في المسائل العلمية العائدة الى اختصاصهم .

٢٥٧٣٤ - **مِجْتَمُوع** Total

٢٥٧٣٥ - **مِجْتَمُوعَة** ، **رَكْمَة** ° Agrégat (F).

Aggregate (E). مجموعة مواد مختلفة متراكمة .

٢٥٧٣٦ - **مِجَنَّاخ** ° Pterygoide (F).

Pterygoid (E).

ماكان شكله كالمجناح .



مِجَلَّاح



مِجَهَر

مُجَنَّحات الأيدي Cheiroptères

| Genre | جنس | Sous-Famille | عائلة | Famille | فصيلة | Sous-ordre | مرتبة |
|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|------------|------------------|--------|
| Roussettes | شُفَّاحة | | | Pteropodidés | وطوايطات | Mégachiroptères | وطاويط |
| Cynonycteris | رداسة | | | | | | |
| Epomophores | حيثر | | | | | | |
| Cynoptères | سَقَطُوم | | | | | | |
| Harpie (Céphalote) | مَسَانَة | | | | | | |
| Macroglosse | لُثَّاثَة | | | | | | |
| Eonycteris des cavernes | سرحاب | | | | | | |
| Nésonycteris | حيثوش | | | | | | |
| Rhinolophes | عمَّاش | | | Rhinolophidés | عمَّاشيات | Microchiroptères | عطافيش |
| Trienops | خناطيل | | | | | | |
| Phyllorhines | دُبَّاش | | | | | | |
| Authops orné | دملوح | | | | | | |
| Cælops | ذُنَّاب | | | | | | |
| Mégadermes | منطاب | | | Nyctéridés | وحرَّيات | | |
| Nyctères | وحرّة | | | | | | |
| Oreillards | طمروق | | | Vespertilionidés | خَفَّاشيات | | |
| Synotes, Barbastelles | سحاة | | | | | | |
| Vespérugos | خَشَّاف | | | | | | |
| Scotophiles | ذُعَاط | | | | | | |
| Vespertiliions | خَفَّاش | | | | | | |
| Minioptères | زُنَّاب | | | | | | |
| Furies | دومس | رَمَّاسات | Emballonuriné | Emballonuridés | رَمَّاسيات | | |
| Saccoptéryx | غَضُوف | | | | | | |
| Diclidures | دَمَّاس | | | | | | |
| Noctilions | نَكِيل | | | | | | |
| Emballonures | رَمَّاس | | | | | | |
| Taphiens | شُقْدَان | | | | | | |
| Rhinopomes | عِينُوم | | | | | | |
| Chiromèles | زَغْدَاب | Molossinés | هيمرات | | | | |
| Molosses | هيمرة | | | | | | |
| Nyctinomes | ضَفُوع | | | | | | |
| Mystacops | غُوبِر | | | | | | |
| Vampires | نَزَّاف | | | Phyllostomidés | ورَّيَّات | | |
| Phyllostomes | ورَّيَّة ، فِلِسْتِم | | | | | | |
| Glossophages | مَضَّاص | | | | | | |
| Desmodes | عَلُوق | | | | | | |
| Diphyllies | عولق | | | | | | |

بالمتغير المربع . ويختلف الجهد باختلاف العرض المطلوب لذلك فهو قد يكون :

جهد أمن Effort de sécurité (F).
Safe stress or strain (E).

جهد التواء Effort de torsion (F).
Torsional stress (E).

جهد ضغط Effort de compression (F).
Compressive stress (E).

جهد شد Effort de traction (F).
Tensile stress (E).

جهد كسر Effort de rupture (F).
Ultimate stress (E).

٢٥٧٤٧ - **مجنوء** ، **مستحاح** ، **مسكك** o
Aéromètre (F). Aerometer (E).

جهاز خاص يستعمل في تحديد كثافة الهواء .

٢٥٧٤٨ - **مجنوقات** ، **لاحشريات**
Coelentérés (F). Coelenterata (E).

شعبة من الحيوانات لا اعضاء لها فيها تجويف واحد له فتحة واحدة الى الخارج تقوم مقام الفم والامتصاص .

٢٥٧٤٩ - **مجنوقات القرون**
Cavicornes (F).
Cavicornes (E).

قسم من المجترات ذوات القرون الحيفة كالبقرة والغنم والظباء .

٢٥٧٥٠ - **مجنيل** *
Magilus (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفضيلة المجليلات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها البحر الاحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . تعيش في تجاويف مدافع الرخايا || اسديانها كلسية المادة ، بيضاء اللون ، نجيلية التحزير ، صفيرة ، مكورة ، ثلاثية الوباب او رباعية في اول عيدها ثم تطول مع مرور الزمن فتصبح كالقشر الاسطوانية الشكل .

٢٥٧٥١ - **مجنيليات** o
Magilidae (S).

فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة || اعرف اجناسها واشهرها المجل .

٢٥٧٥٢ - **مجن** ، **مجن** ، **مجن**
Vitelus

صفرة البيض ، وهو العرقل .

٢٥٧٥٣ - **مجنات** هي الخلطي القرمزي ، اعليه .

٢٥٧٥٤ - **مجناجة** o
Phytotomie (F).

Phytotomy (E).

الحاجة او القيترومي علم يبحث في تشرح النبات .

٢٥٧٥٥ - **مجنح** o
Pauciflore (F). Pauciflorous (E).

نمت ترميز يدل على قلة الزهر في اي شكل كان من اشكال الانزهار . تفوق منالها ومناقيدها وشاكلها ونورها محاج .

٢٥٧٥٦ - **مجنار** ، **استردية** ، **استرداؤن**
Ostrea (S). Huitre (F). Oyster (E).

جنس حيوانات من الرخويات وفضيلة المحاريات . انواعه

كثيرة العدد تقسم الى فئتين الاولى تشمل محار المياه البحرية وهي منتشرة في معظم بحار العالم . والثانية تشمل محار المياه العذبة التي تعيش في الانهار والبحيرات || وهو من الرخويات الضعيفة الاحساس ، القليلة الحركة ، يتغذى بالكائنات الدنيا الحيوانية والنباتية التي تدخل قه مع الماء .

٢٥٧٥٧ - **مجنار مائوف** * ، **تراق**
Ostrea edulis (S). Huitre ordinaire (F). Edible oyster (E).

نوع من المحار المينول المأكول . يكثر على الصخور المغمورة بالماء على طول الشاطئ اللبناني . وهو يربى في احواض خاصة مؤهبة فيتكاثر بسرعة .

٢٥٧٥٨ - **مجنارة**
الحاربان هما رأسا الورك المشفران اللذان تدور فيها رؤوس القنذلين .

٢٥٧٥٩ - **مجنارة** ، **قوف** ، **صيون**
Pavillon de l'oreille (F). Pavillon, Auricle (E).

راجع قوف وصيون .

٢٥٧٦٠ - **مجناري**
Ostréicole (F).

٢٥٧٦١ - **مجناريات** ، **استرداؤنيات**
Ostréides (F). Ostreidae (E).

فضيلة من الرخويات ذوات الصدفتين .

٢٥٧٦٢ - **مجناس** *
Vinago (S).

Vinago (F). Vinago (E).

جنس طير من الجواثم حاميات الشكل وفضيلة الزنوفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع افريقية الاستوائية والحارة . ملجئها الحياتي جامعي . افواجاها متوسطة العدد . تجوب البلاد في طلب الرزق . قوتها الزور والحبوب وبعض الثمار البرية والحشرات والدوديات || ارساها شبيهة بالحمام الزايل . مناقيدها مستغلفة . ارساها كاسية . افواجاها تختلف من الانواع جميعها حادة الالوان السفء اللمعة .

٢٥٧٦٣ - **مجناسب**
Comptable (F).

Accountable, Responsible (E).

الوكيل المؤتمن على الحساب .

٢٥٧٦٤ - **مجناسبة** ، **مسك** ، **الدكاتير**
Comptabilité (F). Accounts, Book-keeping (E).

٢٥٧٦٥ - **مجناق** ، **مجناق** ، **مجناق**
الحاق او الاقتان وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضيء متجها نحو الشمس فتستحيل رؤيته . والحاق يتسبق حرف الحلال بيو .

٢٥٧٦٦ - **مجناكيات** o
Anelytropidae (S).

Anelytropidés (F). Anelytropidae (E).

فضيلة حيوانات زساعة من رتبة العظاء فصيرات الاسنة . اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها سبعة . موطنها افريقية الاستوائية والجنوبية وبعض مناطق المكسيك . جميعها حادة تسرح في الليل وتبيت في النهار || اجسامها دودية الشكل ، عادمة القوائم ، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم .



مجل



محار مائوف



مجناس


| الاسم الفرنسي | التاج | الحيل باليوم | الحيلان | Transmission (F). Transmission, Transmittal (E). | مَحَالَة ٢٥٧٧٧ جهاز ميكانيكي . | | |
|------------------|-------|--------------|------------|--|---|-----|-----------|
| Guenon | ١ | ٢١٠ | دحية | Pouille de transmission (F). Pulley (E). | ٢٥٧٦٨ مَحَالَة هي البكرة المديلة السفات التي تستعمل في رفع الاثقال . | | |
| Lièvre | ٥-٣ | ٣٣ | دِرَامَة | Egrappoir (F). | ٢٥٧٦٩ مَحَبَّاب آلة تفصل حب العنب عن التفروق اي العلوئش . | | |
| Fouline | ٧-٢ | ٥٦ | دلق | Terre fertile (F). Fruitful soil (E). | ٢٥٧٧٠ مَحَبَّار الحيار : الارض اللدقة السريعة النبات . « لنا جبال وحي محبار » ج. محابر . | | |
| Louve | ٦-٣ | ٦٨ | ذقة | Granulaire, Granuleux (F). Granular, Granulous (E). | ٢٥٧٧١ مَحَبَّاب ذو حبوب . | | |
| Lale | ٨-٥ | ١٣٠ | رث | Jus de grenade (F). Juice of pomegranate (E). | ٢٥٧٧٢ مَحَبَّار الحجرم : ماء حب الريحان . | | |
| Renne | ١ | ٢٤٦ | رثة | Stalle, Box (F). Stall, Box (E). | ٢٥٧٧٣ مَحَبَّاب * بَكْس الحبس واليكس : مرقد الفرس الواحد في الاصطبل . | | |
| Civetie | ٤-٣ | ٧٢ | زيادة | Désoperculeur (F). | ٢٥٧٧٤ مَحَبَّاب اداة خاصة يشتر بها العسل . | | |
| Rat des moissons | ٩-٣ | ٢٢ | زبانة | Gestation (F). Gestation, Pregnancy (E). | ٢٥٧٧٥ مَحَبَّاب الحيل هو دة الحمل ، اي زمن تكوين الجنين ، يستمر من الانصاب الى الوضع مدته تختلف مع نوع الحيوان ، اقصرها ١٣ يومًا وأطولها نحو ٧٦٠ وقد ذكرنا في الجلد التاسع اشهر انواع الحيوان ومدة حملها باليوم ومدد نتائجها : | | |
| Girafe | ١ | ٤٥٠ | زرافة | Chacal | ٩-٥ | ٦٣ | ابن آوى |
| Muscardin | ٧-٢ | ٢٨ | زغبة | Putois | ٦-٣ | ٦٣ | ابن عرس |
| Belette | ٨-٣ | ٣٥ | سرعويرة | Furet | ٤-٢ | ٤٠ | ابن مقرض |
| Marte | ٦-٢ | ٥٦ | سَمُور | Opusum | ٥-٣ | ١٣ | ابوسوم |
| Ecureuil | ٤-٣ | ٢٨ | سحاب | Anesse | ١ | ٣٦٤ | آتان |
| Chamois | ٢-١ | ١٦٥ | شواءة | Moufflon | ١ | ١٥٠ | أروية |
| Chat sauvage | ٤-٣ | ٥٦ | ضيون | Elan | ٢-١ | ٢٧٠ | ألكة |
| Taupe | ٥-٣ | ٢٨ | طوبين | Baleine | ٢-١ | ٣٦٥ | بال |
| Biche | ١ | ١٨٥ | ظبية | Vache | ١ | ٢٨٦ | بقرة |
| Campagnol | ٧-٤ | ٢٢ | عكبر الحقل | Renarde | ٧-٤ | ٦٣ | ثرملة |
| Chèvre | ٣-١ | ١٥٤ | عنز | Lapine | ٨-٢ | ٣١ | جسمش |
| Eléphant | ١ | ٧٦٠ | عنثوم | Rat | ١٠-٥ | ٢٢ | جرذ |
| Blaireau | ٥-٣ | ٦٥ | غريواء | Castor | ٢-١ | ١٢٠ | حارود |
| Gazelle | ١ | ١٥٤ | غزاله | Zèbre | ١ | ٣٧٥ | حار الزرد |
| Souris | ٨-٥ | ٢١ | فأرة | Chauve-souris | ٢-١ | ٣٥ | خفاش |
| Jument | ١ | ٣٤٥ | فارس ، حجر | Truie | ١٢-٤ | ١١٥ | خنزيرة |
| Lérot | ٦-٤ | ٢٨ | فرب | Ours | ٢-١ | ٢١٥ | دبة |
| Tigresse | ٥-٣ | ١٠٠ | فرازة | Mulot. | ٨-٣ | ٢٦ | ذئبة |
| Morse | ١ | ٢٦٠ | فظ | | | | |
| Phoque | ١ | ٢٧٦ | قنصة | | | | |
| Léoparde | ٥-٣ | ٩٦ | فهدة | | | | |
| Hermine | ٨-٥ | ٦٠ | قاق ، هرمن | | | | |
| Hamster | ٧-٣ | ١٦ | قداد هستر | | | | |
| Loir | ٦-٢ | ٢٨ | قرقدن | | | | |
| Loutre | ٣-٢ | ٦٣ | قشاعة | | | | |
| Hérissone | ٦-٤ | ٤٨ | قنفذة | | | | |
| Rhinocéros | ١ | ٥٥٠ | كركدن | | | | |
| Chienne | ١٠-٣ | ٦٣ | كلبة | | | | |
| Cobaye | ٥-٢ | ٦٨ | كوباي | | | | |
| Lama | ١ | ١٦٨ | لاما | | | | |
| Lionne | ٣-٢ | ١١٠ | لبوة | | | | |
| Mara | ٢ | ٦٠ | مارة | | | | |
| Maïmotte | ٦-٢ | ٣٥ | مرموط | | | | |
| Mandrill | ١ | ٢٧٠ | ميمون | | | | |
| Chamelle | ١ | ٣٢٠ | ناقة | | | | |
| Brebis | ١ | ١٤٧ | نمجة | | | | |
| Panthère | ٥-٣ | ٩٦ | نمرة | | | | |
| Chatte | ٧-٥ | ٦٠ | هرة | | | | |
| Lynx | ٤-٢ | ٦٣ | وشق | | | | |
| Bouquetin | ١ | ١٦٧ | وعل | | | | |
| Chevreuil | ٢-١ | ٢٧٠ | يامور | | | | |



مجلس



محبرين



محدار



محرات الفلج



محرات اللقب



محرات برابان



محرات ذو مقطين



محرات عادي



محرات كثير المقاطع

Calorifère (F). Heat-conveying (E). **محبر** - ٢٥٧٩٠

يحمل الحرارة وينقلها. جهاز ينقل التدفئة.

Bolomètre (F). **محبر طيفي** - ٢٥٧٩١

Bolometer (E).

ميزان حرارة ينقل بالمقاومة الكهربائية.

Charrue (F). Plough (E). **محبرات** - ٢٥٧٩٢

أغرات أداة الحراثة. ج محاربت. وأغاريت عديدة الأشكال تختلف باختلاف الأعمال المطلوبة.

Charrue déboiseuse (F). Clearing plough (E). **محبرات الجثث** - ٢٥٧٩٣

هو المحرات المدة لاختراع أرومات الانجار.

Charrue rigoleuse, Ch. fossoyeuse (F). Ditching plough (E). **محبرات الفلج** ، **محرات الجدول** ، - ٢٥٧٩٤

محرات تفلج به جداول الاسقاء.

Charrue défonceuse (F). Trenching plough (E). **محرات التقب** * ، **نقاب** - ٢٥٧٩٥

محرات يستعمل في تقب التربة الزراعية على أعماق تراوح من ٥٠ إلى ٨٠ سم.

Fouilleuse, Sous-soleuse (F). Subsoil-plough (E). **محرات الهوم** - ٢٥٧٩٦

محرات فيه اصابع تحرك الهوم مع استبقائه تربة في مكانه.

Charrue brabant (F). **محرات برابان** * - ٢٥٧٩٧

محرات يقلب التربة رأساً على عقب. (E). Belgian plough

Charrue bise (F). Bi-share plough (E). **محرات ذو مقطين** * - ٢٥٧٩٨

محرات مركب من باسنتين.

Araire (F). Swing-plough (E). **محرات عادي** * ، **ميكمة** - ٢٥٧٩٩

هو المحرات الذي يشق التربة.

Charrue polysoc (F). Polyshare plough (E). **محرات كثير المقاطع** * - ٢٥٨٠٠

هو اغرات العديد اليواسن وهو يستعمل لزق التربة.

Thermomètre enregistreur (F). **محراز** - ٢٥٨٠١

Self-registering thermometer (E).

هو الأبات ، اطلية.

Thermomètre maxima-minima **محراز القصوى والدنيا** * - ٢٥٨٠٢

نوع من ميزان الحرارة الثنائية الجيوب العازلة والاعمة الزئبقية التي يدل كل واحد منها على حرارة.

Brûleur (F). House-burner (E). **محراقي** - ٢٥٨٠٣

جهاز يسهل وينفط احتراق المواد الملتهبة.

Graine de coton (F). **محزان** - ٢٥٨٠٤

Cotton seed (E). هي حبة القطن. ج محارين.

Amérir, Amerir (F). **محز** - ٢٥٨٨٨

To alight (E). حط بطائرته المائية على سطح الماء.

Amérissage, Amerissage (F). **محز** - ٢٥٨٨٩

Allighting (E). الحز وصول الطائرة المائية الى سطح الماء.

Graine de coton (F). **محزان** - ٢٥٨٠٤

Cotton seed (E). هي حبة القطن. ج محارين.

Amérir, Amerir (F). **محز** - ٢٥٨٨٨

To alight (E). حط بطائرته المائية على سطح الماء.

٢٥٧ **محبرين**

بن نجهان من برج الجدي مركزها على الذنب واحد الاثنين انور من الآخر ويدعى اخفى المحبرين.

Grésière, Grésier (F). **محشة** - ٢٥٧٢٢

Sandstone quarry (E). لغ الحجر الرملي

Grésière, Grésier (F). **محش** - ٢٥٧٢٣

Sandstone quarry (E). محج المود : قشره.

Lithophage (F). **محشجار** - ٢٥٧٢٤

Lithophagous (E). رفس الحجاره.

Lithoxyle (F). Lithoxyle (E). **محشجر** - ٢٥٧٢٥

ل نبات تحوَّرت مايعته الخشبية الى مادة حجرية دون يتر في الشكل يدعى محجرًا.

Parc (F). Park (E). **محشجر** - ٢٥٧٢٦

لحجر هو الحديقة عدا ما قاله لبيد. وفي التذويب: الحجر: لمعى المنخفض، ج محاجر.

Lazaret (F). **محشجر صحي** - ٢٥٧٢٧

Lazaretto (E). منزل مخصص لايواء الحيوانات القادمة من بلاد وبه.

Bec (F). Beak, Bill (E). **محشجن** - ٢٥٧٢٨

محجن الطائر : منقاره ومنقاده ومنسره.

Streptopus (S). **محشجن** * - ٢٥٧٢٩

Streptope (F).

عشب نباتات تر يبيته جذمورية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه المعروفة قليلة. سوقها فزاع موققة. اوراقها متعاقبة

ثنائية النصل الساعد الانتشاب. ازهارها فردية التجميع، ابطية الانكاز، جرسية الشكل، مستطيلة الزنناد، متدلية.

لونها يختلف باختلاف النوع، منها الابيض الاخضر المواج والاخر والارجواني. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

Busqué, Convexilinear (F). Convexilinear (E). **محشذب الأطراف** - ٢٥٧٣٠

نمت وصفي تعريفي يستعمل في تصنيف الدواجن اصحصها الخيل.

Demi-sang (F). Half-bred (E). **محشذب** - ٢٥٧٣١

الغوث ج. محاديت هو كل حيوان ناتج عن سلالة عتيقة صريحة هجنت بسلالة لا رسن لها.

Demi-sang (F). Half-bred (E). **محشذب** - ٢٥٧٣٢

الغوث ج. محاديت هو كل حيوان ناتج عن سلالة عتيقة صريحة هجنت بسلالة لا رسن لها.

Pagoscope **محشذب** * ، **ميكشاف الجلكد، ميجلاد** - ٢٥٧٣٣

جهاز مؤلف من ميزاني حرارة ، ناشف ورطب . يستعمل للدلالة على حالة الرطاب الجوي وبالتالي على امكانية حصول الصبر والملاح الاسود . وقد يثنى من الحدث قبل وقوعه بيشع ساعات .

Amérir, Amerir (F). **محز** - ٢٥٨٨٨

To alight (E). حط بطائرته المائية على سطح الماء.

Amérissage, Amerissage (F). **محز** - ٢٥٨٨٩

Allighting (E). الحز وصول الطائرة المائية الى سطح الماء.

Amérir, Amerir (F). **محز** - ٢٥٨٨٨

To alight (E). حط بطائرته المائية على سطح الماء.

Amérissage, Amerissage (F). **محز** - ٢٥٨٨٩

Allighting (E). الحز وصول الطائرة المائية الى سطح الماء.

٢٥٨٢٣ - مَحَشَّش محش الجلد : قشره من اللحم .

25824 - مَحَشَّش Broussure, Brûlure (F). Blight, Frost-nip (E).

المحش الاحتراق في البشرة . الصقيع يحمش البشرة والنصل اي يحرقها .

25825 - مَحَشَّش * ، مَحَشَّة Fauchuse, Tondeuse de gazon (F). Lawn-mower, Mowing-machine (E).

آلة ميكانيكية تستعمل لحش كلاً المروج .

25826 - مَحَشَّش مَائِي Faucardeur (F). آلة ميكانيكية تستعمل لحش النباتات المائية في الانهار .

25827 - مَحَشَّش * Râtelier (F). Rack (E). رصاء خاص بركن فوق المعلق العادي يوضع فيه الكلاله والثن لتخلده البهائم شيئاً شيئاً دون ان تبعده .

25828 - مَحْصَّة Grève (F). Strand (E).

المحصية شط مسطح بحري او نهري تغمره الحصى والزمال الحصى ج محاسب .

25829 - مَحْصَد ، مَحْصَدَة ، حَصَادَة . Moissonneuse (F). Reaper (E).

راجع حصاده ونها الحماصة والرابطة الخ .

25830 - مَحْصُول ، حَبْتِي ، حَبْتِي ، حَلَّة ، نَزَل Récolte (F). Harvest, Crop, Vintage (E).

ما يحش من زراعة الارض .

25831 - مَحْضَر Procès-verbal (F). Official report (E).

عقد يدون فيه المأمور الواقع المادية والاعمال التي قام بها .

25832 - مَحْضَن ، مِرْخَم Incubateur, Couvoir (F). Incubator (E).

هو المرث ، اطلبه .

25833 - مَحْطَب * ، مَعْضَد Serpe (F). Bill-hook, Hedge-bill (E).

اداة حادة منقعة الطرف تستعمل في تشذيب الاشجار وقطع الاشخاب .

25834 - مَحْطَب Assiette (F). اشجار الحرج المعدة للقطع .

25835 - مَحْطَّة جَوَائِيَّة Station météorologique (F). Meteorological station (E).

مركز مجهز بما يلزم لتتوّن الاحوال الجوية ودرسها .

25836 - مَحْطَّة زَرَاعِيَّة Station agronomique (F). Agronomic station (E).

مركز علمي وعمل يبحث في مختلف النباتات والتوتون الزراعية والاقتصادية لاستخلاص نتائجها .

25837 - مَحْطَار Sirax جنس حشرات من فصيلة الحظاريات . انواعه المعروفة ١٢ اجسامها اسطوانية الشكل طويلاً يراوح من ٣٠ الى ٤٠ مم .

Triangulaire (F). Triangular (E).

٢٥٨٢٧ - مُحَرَّم * °

ما كان شكله مثلث الزوايا .

Oxystomes (F). Oxystoma (E).

٢٥٨٢٨ - مُحَرَّمَات * °

لثة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى رتيبة قصار الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد جميعها من عظم بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة . تتميز بدرورها المستديرة وبانواعها الخرسية الشكل || اشهر فصائلها الكوليبيات .

25809 - مُحَرَّك Moteur (F). Motive, Motor (E). كل كائن حي او جهاز آلي يقوم بعمل ميكانيكي . لذلك

فالحرركات تقسم الى حية وجمادة . الحركات الحية كالرجل والفرس والورود... والحركات الجمادة هي الآلية التي تديرها إحدى القوى المتغيرة كالمياه والرياح والكهرباء والحرارة ، الخ .

25810 - مُحَرَّك جَسَادِي Moteur inanimé (F). Inanimate motor (E).

25811 - مُحَرَّك حَرَوِي Moteur thermique (F). Thermic motor (E).

25812 - مُحَرَّك حَيّ Moteur animé (F). Animated motor (E).

25813 - مُحَرَّك كَهْرَبَائِي Moteur électrique (F). Electric motor (E).

25814 - مُحَرَّك مَائِي Moteur hydraulique (F). Hydraulic motor (E).

25815 - مُحَرَّك هَوَائِي Moteur aérien (F). Aerial motor (E).

25816 - مُحَرَّوْنَة الحرونة واحدة الحرونة ، بحرة يفساء تعمل في الملح لا تتخالط شيئاً الاً غلب ريحها عليه وتثبت في البادية وهي ذكية الريع جداً . (عن ابن شبل ، اللسان) .

25817 - مِجَر * Inciseur, Coupe-sève, Pince-sève (F). Ringing-knife (E).

اداة تستعمل لحز الاشجار المطلوب استغلال عصارها .

25818 - مِجَزْمَة Botteloir, Botteleuse (F). Binder, Sheaf-binding machine (E).

اداة تستعمل في ضم صالغ الحليون وتجزئها .

25819 - مِجَسَّة Estrille (F). Curry-comb (E).

25820 - مَحْشَر ، مَحْشَر Cheek (E). Ioue (F).

هو الجزء الجانبي من الرأس في الحيوان والطير ومن البخنق في الحشرات ، وما عمران .


25821 - مَحْشَرِي ، حَدَّي Jugal

25822 - مِجْشَك Ebarbeur (F). Paring machine (E).


آلة ينزع بها شعاع الشمر بعد المدرس .



عمران القصوى والدنيا



عز



عش



مخشد



مخشد



مخطب

٢٥٨٥٠ - مَحْكَمَةٌ
Cour, Tribunal (F).
Court, Tribunal (E). هي المحكمة التي تلي القضاء.

٢٥٨٥١ - مَحْكَمَةُ الاسْتِثْنَاءِ

Cour d'appel (F). Appel court (E).
هي المحكمة التي تنظر في جميع القضايا التي حكم فيها ابتدائياً.

٢٥٨٥٢ - مَحْكَمَةُ الْبِدَايَةِ

Cour de première Instance (F). قضاء أول درجة.

٢٥٨٥٣ - مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ

Cour internationale d'arbitrage (F).
انضمت هذه المحكمة بمقتضى اتفاق لاهاي عام ١٨٩٩ لكي تفصل بطريق التحكيم في جميع المنازعات الدولية التي لم تفلح الطرق السياسية في حلها. مركزها مدينة لاهاي.

٢٥٨٥٤ - مَحْكَمَةُ التَّمْيِيزِ ، مَحْكَمَةُ التَّقْضِ

Cour de cassation (F). Highest court (E).
هي أعلى المحاكم درجة لأنه يطلب منها النظر في الأحكام التي صدرت عن محاكم الدرجة النهائية فهي تنقض منها ما ترى فيه مغايرة للقانون أو تفسيراً خاطئاً له.

٢٥٨٥٥ - مَحْكَمَةُ الْجَنَائِيَّاتِ

Cour d'assises (F). Assize court (E).
هي المحكمة التي تنظر في المسائل الجنائية وهي تتلّف من ثلاثة أعضاء تعيّنهم محكمة الاستئناف من المستشارين يكون أحدهم رئيساً.

٢٥٨٥٦ - مَحْكَمَةُ الْعَدَلِ الدَّوْلِيَّةِ

Cour Internationale de Justice (F). International Justice court (E).
هي الإدارة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة لايتها تشتمل كل ما هو منصوص عليه في الميثاق والمعاهدات والاتفاقات المملوكة بها.

٢٥٨٥٧ - مَحَلّ الْإِقَامَةِ

Domicile de fait, Résidence (F). Dwelling, Ordinary residence (E).
هو المكان الذي يقيم فيه المرء دون أن يكون لزماً موطنه القانوني.

٢٥٨٥٨ - مِحْلَاب

Galactophore (F).
Galactophorous (E).
نمت تمريني يطلق على كل وعاء ينقل الحليب أو يقوده الى الخارج.

٢٥٨٥٩ - مِحْلَال

Bordereau (F).
Memorandum, Schedule, Account (E).
هو البيان التفصيلي الذي يوضح الاعمال والحسابات.

٢٥٨٦٠ - مَحَلَب *

Cerasus mahaleb, Prunus mahaleb (S). Mahaleb, Cerisier mahaleb, C. Ste Lucie (F). Perfumed cherry, Ste Lucie cherry (E). Lucienholz, Stein-Weichsel, Weichselkirsche (D). Cillegio mahaleb, C. odoroso, Pruno odoroso, C. canino, C. S. Lucia, Legno di S. Lucia (I).

نوع من الكرز البري، شجيرة كبيرة اللد منتصب الساق تملأ نحو ١٠ امتار. فروعها وأغصانها منفردة. أوراقها صغيرة النصل. أزهارها نورية التجميع. ثمارها حمضية صغيرة النصل.

الولها مخلفة، قرونها الاستشعارية خيطية، مرزاتها منتطيلة || رقاتها خاشية تركب الصنوبريات تقسردب الشكير والخشب.

٢٥٨٦٨ - مِخْطَارُ أُسُودٍ *
Sirex juvenex (S). Sirex noir, Sirex commun, Bouvillon (F). Polished horntail (E). Kiefernholzwespe (D).

مِخْطَارٌ كبير القد، طوله نحو ٣٠ سم. لونه الى السواد الاعم. جرازمه الى الحمرة. مرزه مخززي الشكل. يمتد مكنه داخل قشور الصنوبريات فوق الشكير فينبث عن رقات تسردب الشكير والخشب بانفاق مستطيلة ومنعرجة.

٢٥٨٦٩ - مِخْطَارُ جَبَّار *

Sirex gigas, Urocetus gigas (S). Sirex géant (F). Giant horntail (E). Riesenholzwespe (D).
نوع من المِخْطَارِ، طوله نحو ٤٠ سم. رأسه وجوشته وحلقات بطنه الوسطى سود. سائر جسمه مع جرازمه الى الصفار الناري. مرزه ينتهي بشبكة حادة || رقاتها خاشية تركب جمع الصنوبريات تقسردب الاخشاب وتعطبها.

٢٥٨٦٠ - مِخْطَارِيَّات *
Siricidae (S).
Siricidés (F). Siricidae, Horntails (E). Holz-wespen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها قليلة العدد. اعطائها البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها اسطوانية الشكل، كبيرة القد، طول اجسامها راوح من ٢٠ الى ٤٠ سم. || رقاتها خاشية مؤذية تعيش على الصنوبر والتنوب.

٢٥٨٦١ - مِخْلَافَة ، قِلَاعَة

Arracheuse, Arrachoir (F). Grubbing plough (E).
آلة تستعمل لقلع الباطا والشوندر والجزر.

٢٥٨٦٢ - مِخْطَار

Sablère (F).
Sand-pit, Gravel-pit (E).
هو المرملة، منجم يستخرج منه الرمل.

٢٥٨٦٣ - مَحْفُوظَات ، كُنْسِرَوَات

Conserves (F). Preserves (E).

٢٥٨٦٤ - مَحْنِ

الحق: الشجر المقارب بينه في الغرس.

٢٥٨٦٥ - مَحْفَلَة

Ferme (F). Farming, Farm (E).
الحقله هي المزرعة. ج محال. وفي الحديث «ما تصنعون بمحافلكم».

٢٥٨٦٦ - مِحْنَتْن

Injecteur (F).

٢٥٨٦٧ - مِحْنَتَة *

Seringue (F).
Syringe, Squir (E).
اداة تحقن بها السوائل في جسم الحيوان وفي جوفه.

٢٥٨٦٨ - مِحْكَة ، مِشْعَب

Raclette, Raclor (F). Scraper (E).

٢٥٨٦٩ - مِحْكَاكَة

Tribomètre (F).
Tribometer (E).
الحكاك جهاز يستعمل في قياس قوة الاحتكاك.



مِخْطَارُ أُسُود



مِخْطَارُ أُسُود



مِحْنَة



مَحَلَب

25880 - مَحْوَرِيّ Axile, Axillaire (F).
Axial, Axillary (E).

25881 - مَحْوُوط Herbe d'inde (F).
نبات بري طبي يعرف باسم اخيرايتوس ، اطلبه .

25882 - مُحَوِّف ، مُشْتَمَل Fascié (F).
Fasciated (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مسوم بمصائب ،
وعلى النباتات المصاب بالشملة اي الاغراب .

25883 - مُحَوِّل Biennal, Bisannuel (F).
Biennial (E).

25884 - مُحَوِّل Transformateur (F).
Transformer (E).

جهاز يغير درجة توتر التيار الكهربائي .

25885 - مَحْوِيّ Teneur (F).
Tenor, Percentage (E).
هو ما تحواه كل مسادة معينة من العنصر المطلوب او
الناصر المطلوبة ، ج . محوي .

25886 - مُحِيط Cercle (F). Circle (E).
هو الدائرة ، اطلبه .

25887 - مُحِيط Océan (F). Ocean, High sea (E).
ال المحيط هو قسم شاسع المساحة من سطح ماء الكرة الارضية.
ال محيطات المحدودة اربعة : (١) المحيط الهادي الذي تبلغ
مساحته نحو ٨٨ مليون كيلومتر مربع اي ما يقارب
مساحة اليابسة بكاملها . (٢) المحيط الاطلسي الذي تبلغ
مساحته نحو ٥٣ مليون كيلومتر مربع . (٣) المحيط
الجنوبي ومساحته نحو ٤٨ مليون كيلومتر مربع .
(٤) المحيط الهندي ومساحته نحو ٢٧ مليون كيلومتر مربع .

25888 - مُحِيط الدائرة ، مُحِيط دَائِرَة Cercle de la circonférence, Périmètre, Périphérie,
Pourtour (F). Circle of circumference, Periphery,
Perimeter (E).

25889 - مُحِيل Petites fourmis (F).
Small ants (E).

الحيل : اصغر الذر . قال الاخطل :

« ولو بات يسري الذر فوق جلودها
لاثر في ابقارهن محيلها »

25890 - مُحِيطَة Méliot à petites fleurs (F).
هي الخندقوق الصغير ، اطلبه .

25891 - مُخ Moelle (F).
هو النخاع وهو المكك ، اطلبه .

25892 - مُحْتَارَج Tenants (F). Adjacent lands (E).
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهة العرض .

25893 - مُحْتَازَن عُمُومِيَة Docks,
Magasins généraux (F). Docks, Ware house (E).

25894 - مَخَّاس الزُّعُرُور ، مَخَّاس نَسَائِيّ Cryptocéphalus
النقطة

octopunctatus (S). Cryptocéphale octopunctuë (F).
Cryptocéphalus octopunctatus (E).
شجرة غاضلة من النضاريات مفدمات الاجنحة . تألف

القد ، سوداء اللون ، حريقة اللحم . اخشاها صلبة
معروفة طيبة الرائحة مرغوب فيها || والهلبل يستعمل خاصة
كعظم لبعض انواع الكرز لانه نبات سروتي يعيش في
معظم الارربة || « ثماره مفرحة مغوية الحواس
مطلقاً ، تفتح الخفقان والبر وريق النفس والبلغم ، وتفتي
العدة واوجاع الكبد والكل والطحال والخصى وعسر البول
شرباً . ويطلق به فيقلع الكلف والجرب . »

25891 - مَحَلَّة Escargotière (F). Snailery (E).
هي المكان المدة لتربية الحلزون .

25892 - مُحْتَلِّل Réducteur (F). Reducer (E).

25893 - مُحْتَلِّل Solution

25894 - مُحْتَلِّل ، سَائِل Bouillie (F). Wash (E).

25895 - مُحَلِّيّ Vernaculaire (F). Vernacular (E).
ما هو خاص بالبلد كقولك الاسماء المحلية او اللغة المحلية .

25896 - مَخَّاص Pâte-acide (F).
Acetometer (E).
مقياس او ميزان الحوامض .

25897 - مُحَمَّات Edulcoré (F). Sweetened (E).
نعت تعريفي يطلق على كل دواء تافه العلم او مرّ أخفيف
اليه بعض السكر تحسناً للمذاق .

25898 - مُحَمِّص Acidifiant (F). Acidifying (E).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة تقود الى التحميص .

25899 - مَحْمُود Mammouth (F).
هو الصناجة ، اطلبه .

25900 - مَحْمُودَة Scammonée d'Alep (F).
هي السقمونيا ، اطلبه .

25901 - مَحْمُودِيَّات Convolvulaceae
فصيلة نباتية مشهورة باسم اللباليات ، اطلبه .

25902 - مَحْمُومِيّ Cumulo-nimbus
هو الركام ، نوع من الغيوم ، اطلبه .

25903 - مَحْن ، قَحْص Test

25904 - مَحْوَرَة 25894
كثيرة الحيات . يقال ارض محورة .

25905 - مَحْوَر Axe (F). Axis, Axon (E).
هو نقطة الارتكاز .

25906 - مَحْوَر أَقْصِيّ ، مَحْوَر سِنِيّ Abscisse (F). Abscissa (E).

25907 - مَحْوَر النَّهْر Thawleg
اعرق خط في قاعه . واذا كان النهر بين دولتين عد
محوره حداً بينهما .

25908 - مَحْوَر صَادِيّ Ordonnée (F).
Ordinate (E).

25909 - مَحْوَرَة Peupleraie (F).
Plantation of poplar trees (E).
مغرس الحور وكل مكان فيه حور .



مَخَّاس الزُّعُرُور

٢٥٨٩٧ - مَخَاسِ لَمَاسِي النُقَط

Cryptocéphale octoponctué (F).

هو مخاس الزعرور ، اطلبه .

٢٥٨٩٨ - مَخَاسِ حَبِيب

Cryptocéphale distingué (F).

هو مخاس العشب ، اطلبه .



مخاس العشب

Dentelure du limbe (F).

٢٥٨٩٩ - مَخَاسِ

Indenting of limb (E).

اسنان حافة فصل الورقة .

Prise à partie (F).

٢٥٩٠٠ - مَخَاصِمَةُ الْقَاضِي

وسيلة طعن غير عادية مؤداها رفع دعوى على القاضي امام محكمة الاستئناف او التقصير والارام يطالب فيها بتعويض عن ضرر وقع من عمل صدر منه يتصل بوظيفته ويمقاب عليه القانون .



مخاس السرير

Gué (F). Ford (E).

٢٥٩٠١ - مَخَاضَة

كل مكان من النهر قليل العمق والماء يمكن اجتيازه على الاقدام .

Ecrémuse (F).

٢٥٩٠٢ - مَخَاضَة * ، قَرَاة

آلة تستعمل لفرض الكتأء من الحليب .

٢٥٩٠٣ - مَخَاضَرَة

بيع الثأر وبخر في خضر لم يبد صلاحها .

Sébastien (F).

٢٥٩٠٤ - مَخَاطَة

هي شجرة السبستان وتسمى اطباء الكلية .

Mucilagineux (F).

٢٥٩٠٥ - مَخَاطِي ، لُعَابِي

Mucilagineus (E).

الاجسام المخاطية اجسام لزجة مركبة من الكربون والاكسجين والكليدروجين توجد في عدة نباتات .

Myxinidae (S).

٢٥٩٠٦ - مَخَاطِيَات

Myxinidés (F). Myxinidae (E).

فصيلة السمك المخاطي من قسم الماصات .



مخاضة

Quittance (F). Receipt (E).

٢٥٩٠٧ - مَخَاضَة

هي البراء .

Contravention

٢٥٩٠٨ - مَخَاضَة

العمل الذي يقوم به المرء خلافاً لاحكام القانون او النظام .

Braconnage (F).

٢٥٩٠٩ - مَخَاضَة الصَّيْد

Poaching (E). عدم التقيد بأنظمة الصيد المرعية الاجراء .

Tube à essai (F).

٢٥٩١٠ - مَخْبَر

Tube of trial, Pipe of essay (E).

Laboratoire (F).

٢٥٩١١ - مَخْبَر

هو المختبر ، اطلبه .

Fournil (F). Bake house (E).

٢٥٩١٢ - مَخْبَز

بناء الفرن وادوات الخبازة .

Boulangerie (F).

٢٥٩١٣ - مَخْبَزَة ، خَبَاكَة

Baking (E).

صناعة الخبز ومكانها .

مخابر

البراري والاحراج المبعثرة الاشجار . خنافسها ويرقاتها تعيش على اوراق الزعرور والبقوق والبنق والنباتات النملية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الالوان ، كوسلها الى السرة السوداء طولها تزاريق عاجية . ظهرها الى الحمرة البرتقالية يعلوها تنقيط اسود ثنائي العدد . بطنها وبرازها سود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتنتج المكن مبيحداً على الصفحات السفلى من نصال الالوراق || والبرقة عند ادراكها الكال الجسوري تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجرم ، سداسي الارباب ، حنطي اللون ، اصفر الموج ، اسمر الرأس والارباب .

٢٥٨٩٥ - مَخَاسِ الْعُشْبِ * ، مَخَاسِ حَبِيب

Cryptocéphale primarius (S). Cryptocéphale distingué (F). Cryptocéphalus primarius (E).

حشرة غاضلة من النضاريات مغذات الاجنحة . تألف البراري والاراضي الملحاة . خنافسها ويرقاتها تعيش على النباتات الشبية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الالوان . رأسها وكوسلها وبطنها وبرازها الى السوداء الاخضر الموج . ظهرها الى الحمرة الاربانية يعلوها عشر نقط سود . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زياتاها خيطيان . ظهرها متشدد الاحدياب مقطوم الطرف اللاحف . غذاءها تنمناجب التحريز الخفيف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتنتج المكن على الصفحات السفلى من نصال المعصف والالوراق || والبرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل سداسي الارباب ، اغبر اللون ، اصفر الموج ، اسود الرأس ، يملوء من جانبيه غط من النقط السمر المتوزعة بزواج من الحلب القصير || طور الاكمال ينقضي في التربة ضمن حبيرة جرابية الشكل .

٢٥٨٩٦ - مَخَاسِ الدَّسْرِين *

Cryptocéphalus Mariae (S). Cryptocéphale de Marie, C. des églantiers (F). Cryptocéphalus Mariae (E).

حشرة واشعة غاضلة من النضاريات مغذات الاجنحة . تألف البراري والاحراج . خنافسها تعيش على ازهار الدسرين والعصر والابل والدرام ... يرقاتها تعيش على الالواق فتقتطع الخنصيب بين الثروق ثم تلتف النصل وتعيش في داخله || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى الشقعة الصفراء البرتقالية الموج . كوسلها ثلاثي التزاريق السود . ظهرها مخدع بالاسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتنتج المكن على الصفحات السفلى من نصال الالوراق || والبرقة عند ادراكها الكال الجسوري تطول نحو ٧ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ثني اللون ، اسمر الرأس والارباب تملوء ثلاثة خطوط قاطبة سمر اللون || طور الاكمال الذي يعيش نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جراب من المواد النباتية المجفوة بالبراز والرياح .

Rayonneur (F). مِخْبُطٌ * مِخْدَادٌ * مِخْبُطٌ
Drill (E).

جهاز ثنائي أو ثلاثي أو خماسي الاسنان يستعمل في تخديد التربة خطوطاً مستقيمة متساوية الابعاد البينية .

Canaliculé (F). مِخْدَادٌ
Channelled, Furrowed (E).

نمت وصنى يطلق على بعض اعضاء الحشرات كالكواسل والاعواد الميزابية التخديد .

Narcotique (F). مِخْدَارٌ * مِثْمُومٌ
Narcotic (E).

كل نبات يحوي اشياء قلبية مخدرة كالتيغ والحشاش وما اشبه .

Dominant (F). مِثْمُومٌ * مِثْمُومٌ
Dominating, Ruling (E).

هو العفار الذي ينتفع من الارتفاع .

Employeur (F). Employeur (E). مِثْمُومٌ
الخدم او المستخدم هورب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستخدمهم .

2٥٩٣٠ - مِثْمُومٌ * مِثْمُومٌ * مِثْمُومٌ
Hachoir (F). Chopping-board, Chopping-knife, Chaff-cutter (E).

آلة لا لقياسة الشكل والحجم تستعمل في اغراض مختلفة اخصها تقطيع اللحم وفرم ورق التبغ وفرم الجذور الخ .

2٥٩٣١ - مِثْمُومٌ
غمر الارضين : شها للزراعة . او ارسل فيها الماء لتجمد .

2٥٩٣٢ - مِثْمُومٌ * مِثْمُومٌ
Stylée, Stylaire (F). Stylar (E). مِثْمُومٌ
شكل من زياتي الحشرات ونصال الاوراق يشبه الخرز .

2٥٩٣٣ - مِثْمُومٌ * مِثْمُومٌ
Cueille-fruits (F). مِثْمُومٌ
Gathering-fruits (E). اداة تستعمل لقفط الثمار .

2٥٩٣٤ - مِثْمُومٌ
Cône (F). Cone (E).

2٥٩٣٥ - مِثْمُومٌ
Conique (F). Conical (E).

2٥٩٣٦ - مِثْمُومٌ * مِثْمُومٌ
Conoide, Cunéiforme (F). Conoid, Cuneiform (E).
نمت تعريفي توصف به الاشياء المخروطية الشكل .

2٥٩٣٧ - مِثْمُومٌ
Conifères (F). مِثْمُومٌ
Coniferae (E). فصيلة نباتية مشهورة باسم صنوبريات .

2٥٩٣٨ - مِثْمُومٌ * مِثْمُومٌ
Conirostres (F). مِثْمُومٌ
رؤية من الطيور الجوارح تشمل عدة فصائل ، اشهرها الششوريات والقريبات والقرقيفات .

2٥٩٣٩ - مِثْمُومٌ
Conicité (F). Conicalness (E).

2٥٩٤٠ - مِثْمُومٌ
Clapier (F). Hutch (E).
مكان تربية الارانب ان يقفص او رديعة .

2٥٩٤١ - مِثْمُومٌ
Official مِثْمُومٌ
نمت تعريفي يطلق على كل نبات يستعمل في تركيب الادوية .

2٥٩٤٤ - مِثْمُومٌ * مِثْمُومٌ
Malaxeur (F). مِثْمُومٌ
Kneader (E).

2٥٩١٥ - مِثْمُومٌ
Laboratoire (F). Laboratory (E). مِثْمُومٌ
مكان التجربات والفحوصات والتحليل المختلفة .

2٥٩١٦ - مِثْمُومٌ
Mixtiligne (F). مِثْمُومٌ
Mixtilineal, Mixtilinear (E).

كل رسم يختلف الخطوط بين المستقيمة والمستديرة .

2٥٩١٧ - مِثْمُومٌ
Hétéromères (F). مِثْمُومٌ
Heteromera (E).

رتيبة حشرات من مفندات الاجنحة .

2٥٩١٨ - مِثْمُومٌ
Hétérocardes (F). مِثْمُومٌ
Heterocarda (E).

رتيبة حيوانات من الرخويات المدعية الامانيات الخياطين .

2٥٩١٩ - مِثْمُومٌ
Hétéropodes (F). Heteropoda (E).

رتيبة حيوانات بحرية من الرخويات مدعيات الارجل .
فصائلها واجناسها وانواعها عديدة جميعها شقية ، صممة ، مفترسة . ملجئها الحيواني جماعي . تعيش في عرش البحر ولا تقرب الشقوق . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تسبح وتعمل على ظهورها ، بطونها موهبة نحو سطح الماء . اجسامها حلالية . رؤوسها تنتهي باخطام متفانية الطول . ارجلها زعنافية الشكل تناسب الحياة البنية لا اشهر فصائلها الاصلطيات والعريانات .

2٥٩٢٠ - مِثْمُومٌ
Hétérocères (F). مِثْمُومٌ
Heterocera (E).

رتيبة حشرات من حرشفيات الاجنحة تشمل عدة فصائل . اشهرها القزليات والتارايات والنسقيات والحوليات والارقيات والفنقيات والقناتلات الخ... تتميز بالوانها المتراكبة العادية الزعاج وبقرنها الاستنعارية اللاقياسية . غادراتها مجلبة بشرفة .

2٥٩٢١ - مِثْمُومٌ
Hétérotriches (F). مِثْمُومٌ
Heterotriches (E).

رتيبة حيوانات دنيا من المدهيات او النقيبات الهديبة .

2٥٩٢٢ - مِثْمُومٌ
Hétéroptères (F). مِثْمُومٌ
Heteroptera (E).


رتيبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها تدريجية التطور . منظمها متوسط القد او صغير . ضبا الهجنة والعامة الجناح . قرونها الاستنعارية قصيرة . اخطامها ثقافة ماصة تمسكها من ثقب الانسجة النباتية وانصصاص النسج . من ميزات بعض فصائلها ما تنقلده ، عند الدفاع عن النفس ، من سرائل كريمة الرائحة تخزنه في غدد خاصة || اشهر فصائلها : النسمجيات والبقيات والطرثريات والفايساليات .

2٥٩٢٣ - مِثْمُومٌ
Hétérocarpe (F). مِثْمُومٌ
Heterocarpous (E).

نمت تعريفي يطلق على الاشجار اللاقياسية الثمار .

2٥٩٢٤ - مِثْمُومٌ
Fosse à fumier (F). مِثْمُومٌ
Midden-pit (E).

حفرة تصطنع لجمع الزبل على اختلاف مصادره .



مِخْبُطٌ



مِثْمُومٌ



مِثْمُومٌ

وفي عرم السباد المدد لتكاثر الفطور المأكولة كالغاريقون المرئي وغيره || مظهره الخارجي كتل ندية الشكل يضاه اللون او صفراء تركب طبقة العرمة السطحية حيث تتشب غيوطها المشابكة التي تحول دون نشوء الغاريقون وغيره || يكافح باجتناح الاسمدة التي يملؤها اللغن والاسمدة العضوية الكثيرة المواد المنحلة التي قمل فيها التحخير .



مخضل

Rayonneur (F). Drill (E).
آلة تستعمل لتخطيط صفوف الفرس ، راجع مخداف .

Mégamètre (F).
Megameter (E).
جهاز آلي يستعمل في تحديد خطوط الطول وهو شائع الاستعمال في الملاحة وفي الرصد .

Lolipes (S). Lolipède (F). *
مِخْطَاف *
طائر وحيد الجأش والنوع من عمارة العماليات وفضيلة دجاجيات الارض . طوله نحو ٢٠ سم . ثوبه اسم الظهر يعلو تنسيق ورقيط . بطنه وصدره واثنيكه بيض . رأسه اسود القمة ابيض الحاسر . عيناه مكشطان بالاسود . منقاره مقطوع الطرف . ارساغه قصيرة وقوية . اصابعه مفصصة الحظاب || يرتاد البحار والبحيرات يسبح ويعوم كطيور كفتيات القدم . قوته الحشرات والشرافيف والقشريات والرخويات والاسماك الصغيرة || الانثى تدثن في البر ، قرب الماء ، بين الاشباب . تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوماً .



غضير لوتيا

Graphique (F). Graphic (E).
مِخْطَاط
هو الخط البياني .

Zébré (F).
Striped like the zebra (E).
مِخْطَاط ، زَرْبِي
نعت تعريبي توصف به الاثواب الحيوانية المخططة بخطوط معترضة كما في سمار الزرد .

Mandibule (F). Mandible, Jaw (E).
مِخْطَاف
هو الفك أي فك منقار الطائر وما يشابه . ج مخاطم .

Mandibule (F). Mandible, Jaw (E).
مِخْطَافَات الرُّؤُوس *
Rhynchocéphales (F).

رتبة من الزحافات يعود ظهورها الى الاباح الثاني وقد افترضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالمخبريه الذي يعتبر اقدم الزحافات المعاصرة لانه مثال المسب الاول .

Levier (F). Lever (E).
مِخْلَب
هو الرافعة والمثلة ، اعطابها .

Musette (F). Nose bag (E).
مِخْلَاة
كيس صغير يوضع فيه العلف ويعلق برأس الدابة .

Acétomètre (F).
Acetometer (E).
مِخْلَال
المخلال جهاز يستعمل في قياس حموضة الخل . ويدعى ايضاً قياس التحليل .

Griffe, Serre (F).
Claw, Talon (E).
مِخْلَب
ظفر سباع الطير كالبرئ من سباع الوحش .

Xylomètre (F).
Xylometer (E).

مِخْشَاب *
الحشاب جهاز يستعمل في تعيين حجم قطعة من خشب غير مستقيمة . وذلك بقياس كمية الماء التي ترهلها تلك القطعة .

Glacière (F).
مِخْشَف
راجع مثلبة .

Tamis (F). Sieve, Sifter (E).
مِخْشَلَة
أداة تستعمل لفرز الحبوب والأتار والاجرام المختلفة بالنسبة الى الحجم .

Ligneux (F).
Ligneus, Woody (E).
مِخْشَوْشَب ، لِيْنِي
يكون النبات خشبياً عندما تجمد اليافه فتكثر فيها المادة الخشبية الصلبة القاسية ، ومكسكه النبات العشي . وما بين الفئتين يسمى النبات امخشوب أي الليني .

Éliminé (F). Eliminate (E).
مِخْشُول *
كل حين من الحيوان صار النبات صار ابعاده لنقص في صفاته المطلوبة او المرغوب فيها .

Fertile (F). Fat, Rich (E).
مِخْشَاب
هي التربة الجيدة الاتارة العامدة الجلب .

Fécondateur (F).
Fecunder (E).
مِخْشَب ، مَزْكِم
الحشوب والمزكم من الحيوان من كان يحمل طاعة الاخصاب .

Barattage (F). Churning (E).
مِخْشَف
فرز الكتانة بعد مزجها لاجتماع واندمام الكريات الزبدية وانفصالها عن الحشيف .

Gazonnant (F).
Grassy, Turfy (E).
مِخْشَوْفِر ، مِخْشَوْر
ارض كثيفة العشب الاخضر المعمر . راجع خضير ونحضور .

Gazon (F).
Grass, Turf, Sward (E).
مِخْشَوْرَة
ارض كثيفة العشب الاخضر المعمر . راجع خضير ونحضور .

Psychromètre (F).
Psychrometer (E).
مِخْشَل *
أداة تقاس بها رطوبة الهواء وذلك لمرفة مقدار بخار الماء الموجود في الجو .

Eburné (F). Dentine (E).
مِخْشُون *
الحشون الشبيه بالاج .

Myceliophthora (S).
مِخْشَوْر *
جلس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . يتميز بكتانده القصيرة الشعب ، الصغيرة القد ، البيضيه الشكل ، للانقباضية التجميع اذ انها تحوي الفردية والفصية || انواعه قليلة ، امرفها مخضير لوتيا .

مِخْشَوْر لُوتِيَا * ، مِخْشَوْر أَصْفَر *
Myceliophthora lutea (S). Ver-de-gris du champignon de couche (F).
نوع من المخضير وهو فطر مجهرى يعيش على المواد العضوية



مخطاف

ازهارها نورية التجميع . ثمارها تفحة لونها الى الحمرة البرتقالية .

٢٥٩٧٦ - **مُخَلَّصَة**
Linaire commune (F).
عشبة مشهورة باسم لينارية عادية ، اطباها .

٢٥٩٧٧ - **مَخْلُوق** (F). Creature (E).
كل كائن حي يدعى مخلوقاً . والمخلوقات الحية تقسم الى ملكيتين مملكة الحيوان وملكة النبات || مملكة النبات تقسم الى نحو ٢٠٠ مليون نوعاً تنتمي الى مئات الفصائل والرتب والصقوف || اما العدد التقريبي يختلف انواع الحيوان المعروفة فهو نحو مليون ومائتي عشر ألفاً كما هو مبين في الجدول التالي .

العدد التقريبي لاختلاف أنواع الحيوان المعروفة

Nombre approximatif d'espèces animales connues

| صنف | صيف | عدد الانواع | Sub-Class | Classe |
|--------------|---|-------------|------------------------|-------------|
| فقاريات | ٦.٠٠٠ | | | Vertébrés |
| مفصليات | حشرات متكويبات قنريات دعماحيات | ٧٥.٠٠٠ | Insectes | Anthrôpodes |
| | | ٣.٠٠٠ | Arachnides | |
| | | ٢.٥٠٠ | Crustacées | |
| | | ٨.٠٠٠ | Myriapodes | |
| رغويات | ١.٠٠٠ | | Mollusques | |
| حليقات | ٨.٠٠ | | Annélides | |
| حويئات عظمية | ٤.٠٠ | | Bryozoaires | |
| شوكيات | ٥٧.٠٠ | | Echinodermes | |
| سليكات | ١.٠٠٠ | | Nématodes (vers ronds) | |
| حريقات | ١٤.٥٠ | | Vers plats | |
| مجموعات | ١.٠٠٠ | | Coelentrés | |
| إسفنجيات | ٤٣.٠٠ | | Spongiaires | |
| أركبات | ٣.٠٠٠ | | Protozoaires | |
| دورات | ١٥.٠٠ | | Rotifères | |
| مخلف | ٢.٠٠ | | Divers | |
| | | ١٠٨.٠٠٠ | | |

٢٥٩٧٨ - **مِخْمَار** * (F). Zymosimètre, Zymoscope (F).
Zymosimeter (E).

المِخْمَار جهاز تقاس بواسطة درجة اختار السوائل .

٢٥٩٧٩ - **مُخَمَّس**، **مُخَمَّس الزُّوْيَا**، **مُخَمَّس الأضلاع** (F). Pentagone (E).
Pentagone (F).
من الاشكال الهندسية وغيرها ما هو مركب من خمس زوايا او خمس اضلاع .

٢٥٩٨٠ - **مُخَمَّسِي**
Pentagonal
ما كان شكله شكل الخمس .

٢٥٩٨١ - **مُخَمَّلِيَة** * (F). Tagetes (S). Tagète (F).
Marigold (E). Samtblume, Studentenblume (D).
Tagete, Puzzoloni (I).
جنس نباتات من الشرنقيات وفصيلة المركبات . انواعها عديدة معظمها بري . اوراقها لا قياسية الشكل والارتكاز . ازهارها صفراء اللون او برتقالية . بتلاتها خلية الملس يفرح منها عند اللس رائحة مسهجة || اشهر انواعها الازينية ما يلي .

٢٥٩٨٢ - **مُخَمَّلِيَّة جَسِيلَة**، **قَرْتَنُفُل الهِنْد**
Tagetes patulus (S). Tagète touffue, Cillet d'Inde, Veloutine, Passe-velours (F).
نوع من الحمليّة الازينية المشهورة . غروبها عديدة

٢٥٩٦٧ - **مِخْلَب**
Griffe (Hort.) (F). Root (E).
كلمة تطلق على جذور وقصوص وبجذامير بعض النباتات لقرب شبهها بالخلص .

٢٥٩٦٨ - **مِخْلَب التَّنِين**
Pterospora (S).
Pterospora (F). Dragon-root (E). Drachenroot-baur (D). Pterospora (I).
عشبة طفيلية ممرية في فصيلة الخنجنيات . اصطلحها انبلاد الباردة . تتميز بازهارها المتعددة التجميع الطرية الشكل .

٢٥٩٦٩ - **مِخْلَب المِقْبَاب**
Astragale (F).
هو الاسطراغالوس ، من نباتات الفصيلة القرنية ، اطباها .

٢٥٩٧٠ - **مُخَلَّلَات**
Crassulaceae (S).
Crassulacées (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠ معظمها نبات عشبي وبعضها جنبي . اوراقها متعاقبة لحمية صميّة . ازهارها ، في الغالب ، عشوية وهي ابليّة او هامة الارتكاز ، جيلة الشكل ، زاحية الالوان . نباتاتها رضية تمشي في جميع الارربة وقد تفضل القليلة الخشب .

٢٥٩٧١ - **مُخَلَّلَة** *، **دَم العَاشِق**، **زَر حَبَنِي**
Gomphrena (S). Gomphrène, Amarantoïde (F).
Globe amarant (E). Gemeiner Kugelamarant (D).
Amaranto, Amarantoïde (I).
جنس نباتات عشبية مزينة من فصيلة القطيفيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها ترابي . اوراقها لاطئة متعاقبة . ازهارها نورية التجميع ، ابليّة الارتكاز او طرية || اشهر انواعها الازينية ما يلي .

٢٥٩٧٢ - **مُخَلَّلَة بَرْتَقَالِيَّة**
Gomphrena haageana, G. aurantiaca (S). Gomphrène orange, Amarantoïde de Haage (F).
عشبة حولية جادسة فراء تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها بيضية النصل . ازهارها برتقالية اللون ، نوربها ثلاثية الازهار الكبيرة القد || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٥٩٧٣ - **مُخَلَّلَة كَرَوِيَّة**
Gomphrena globosa (S). Gomphrène globe, Amarantoïde globe, Amarantine, Immortelle violette (F).
وتسمى (عاشق ومعمشوق) عشبة حولية فراء مثنوية تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها سنانية النصل . ازهارها بتفسيجية اللون ، نوربها ثلاثية الازهار || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٥٩٧٤ - **مُخَلَّلَة لَطِيْفَة**
Gomphrena pulchella (S). Gomphrène gracieuse, Amarantoïde gracieuse (F).
عشبة حولية مبروتية فراء تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها سنانية ضيقة تطول نحو ٥ سم . ازهارها وريدية اللون ، نوربها ثلاثية او خماسية الازهار ، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || ازهارها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٥٩٧٥ - **مُخَلِّص** *
Sorbus aria (S). Alouchier (F). Chequer tree, Maple service, Wild service tree (E). Wilder Elsebeerbaum (D). Bacarello, Mangiolo (I).
نوع من الصربة وهي شجرة برية فراء رميحية الشكل تملو من ٣ الى ١٥ م . اوراقها منعقة ، متعاقبة ، عابطة . نصلها يطول من ٦ الى ١٤ م . ويعرض من ٤ الى ٩ سم .



مخلدة



مخلص



مخار



مخلية

٢٥٩٩٥ - **مَخَيَّرَة** Culture de concombre (F).
زراعة الخيار وموضع هذه الزراعة .

٢٥٩٩٦ - **مَخِيض** Babeurre, Lait écrémé (F).
Whey, Buttermilk (E).
الحليب الباقى بعد فرز قشده ، ويعرف أيضاً بالمخوض .

٢٥٩٩٧ - **مَخِيضُ الْمَاءِ *** Ceyx
جنس طير من القريبات. أنواعه ثمانية موطنها البلاد الآسيوية.
تتميز بمنقارها الكبيرة القند اللطيفة القاعدة الحمراء اللون .
اجنحتها طويلة . أذناها وراسها قصيرة . لوهاها الى
الصهوة البرتقالية . رؤوسها واجنحتها سود ملوها بحشة
بيضاء || تألف الشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها
الاسماك والقرشريات والحشرات على اختلاف فصائلها .
انها تألف في صدور الصخور تبيض من ٧ الى ٩ بيضات
تحضنها نحو الاسبوين .

٢٥٩٩٨ - **مَخِيْطَة** Sébeste (F). Sebesten (E).
ثمرة الخاطبة اى اللبغ . كانت ولا تزال تستعمل في الطب
لتلين الصدر . كما تستعمل في صناعة ديق الطير .

٢٥٩٩٩ - **مَخِيْطَات** Cordiaceae (S).
Cordiaceae (F). Cordiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها كثيرة
العدد ، اعطانها البلاد الحارة والاستوائية . اشهر اجناسها
الحاطة المعروفة بالسبستان .

٢٦٠٠٠ - **مَخِيْلَة** Nimbus
هي الدججة ، نوع من الغيوم ، اطلسها .

٢٦٠٠١ - **مُدَّ**
المد ، مكيال لا يقاسي الحجم يختلف من بلاد الى بلاد
ومن منطقة الى منطقة في ذات البلاد . ج امداد وبعدة
وبداد .

٢٦٠٠٢ - **مُدَّاخِل** Aboutissants (F).
Bordering upon (E).
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهة الطول .

٢٦٠٠٣ - **مُدَّاد** Plagiotrope (F).
نعت وصفي يطلق على كل نبات نوعة فطره اقلية
الانتساب .

٢٦٠٠٤ - **مُدَّاد *** Hemidactylus turcicus (S).
Hemidactylus verruculeux, Margouillat (F).
حيوان بيوض من الغطاء وفصيلة الزفريات . جسمه صغير
القند يطول نحو ١٠ سم . رأسه بيضي اللون . عيناها
مستحاثان . اجفانه شفافة ثابتة . اذناه رافعتا الفشل
الصواني المكفوف . لسانه نغلق الطرف . ظهرو مثقل .
بطنه كثير الحراشف الصيقة . ذنبه سريع الانقسام .
قوائم صغيرة . اصابعه نصفية الخطاب مجزأة بلواقط
عززة تمكنها من السير على السقف || ثوبه الى الصهوة
الخطية المرقشة بالانمز والاعبر ، لكنه يمان الخيط
المجود فيه || يألف المواقع الكثيرة الجارية والمساكن
الارضية . يسرح في النهار وفي الليل . قوته اللذاب والبومض
والنكاب والديدان || يعتبر من الزحافات النافعة .

٢٦٠٠٥ - **مُدَّاد** Traçant (F). Running (E).
نعت تعريفي يطلق على الجلود الاقلية الانتساب وتل
الوق التي تفرش التربة .

فلوقها قند النبات ولون الازهار . جميعها حولية تملو من
٢٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها لا قياسية الارتكاز ، خلية
التصل . ازهارها عطرية التجميع ، تاجية . لوها الى الصفرة
للتفاوتة التوشج والمواج || تنورها يستمر من تموز
الى ايلول .

٢٥٩٨٣ - **مُخَيِّلِيَة لَامِيَة** Tagetes lucidus (S).
Tagète luisante (F).
عشبة سريرية معمرة ، طرخونية الرائحة والطعم ، تملو من
٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها كاملة متقابلة . نصلها ساني
الشكل ، مسن الحافة ، لامع الصفرة الشديدة الخضار .
ازهارها احداق متتابعة كالعنقود . ازهارها لينة نارية
اللون || تنورها يستمر من آب الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٤ - **مُخَيِّلِيَة مَرْقِطَة** Tagetes signatus (S). Tagète mouchetée (F).
عشبة سريرية معمرة تملو من ٦٠ الى ٧٠ سم . اوراقها
متعاقبة مفردة وسننة . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها
ذهبية اللون مرقطة بالجلوي || تنورها يستمر من تموز
الى تشرين .

٢٥٩٨٥ - **مُخَيِّلِيَة مُنْتَصِيَة ، وَرْدَة الهند** Tagetes erectus (S). Tagète dressée, Rose d'Inde (F).
عشبة سريرية حولية تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها
لا قياسية الارتكاز ، كثيرة التشرم القدي المسن . ازهارها
عطرية التجميع ، كبيرة القند ، لوها الى الصفار الكبيرتي
اللامع || تنورها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٦ - **مَخْن** غن العود : قشره .

٢٥٩٨٧ - **مَخِيْثَات ٥** Androgyne (F).
Androgynous (E).
نعت تعريفي يوصف به كل نبات يحمل الازهار الذكرية
والانثوية معاً كالجوز مثلاً .

٢٥٩٨٨ - **مَخِيْط** Etouffer (F). Extinguisher (E).

٢٥٩٨٩ - **مَخِيْثَات ٥** Hyalostilbacées (F).
Hyalostilbaceae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الكميبيات . تتميز باعضائها
المهوائية الشفافة . اجناسها وانواعها عديدة اما المؤذي منها
قليل . اشهر اجناسها المؤذية الازارية والكحية .

٢٥٩٩٠ - **مَخِيْ ، مَخِيْثِي** Sensorial (F).
Sensorial (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى الخبيخ .

٢٥٩٩١ - **مَخِيْثَاف** Hétérogame (F).
Heterogamous (E).
نعت تعريفي يطلق على النباتات المزواجية التي تحمل زهوراً
ذكوراً واناثاً في تزوير واحد . راجع مبيزن .

٢٥٩٩٢ - **مَخِيْثَال** Epidiascope

٢٥٩٩٣ - **مَخِيْثَخ** Sensorium (F). Sensorium (E).
الخبيخ مركز الحواس في الدماغ اي انه المركز الذي يتلقى
الاحساس وينظمه .

٢٥٩٩٤ - **مَخِيْثَر ، مَدِيْثِي ، مَهْر** Lait mouillé (F). Milk and water (E).
هو الحليب المعرب بالماء .



خيط الماء



مداد

٢٦٠١٧ - مَدَاهِين صَفْصَافِي الرَّقَى *

Helianthemum salicifolium (S). Héllanthème à feuilles de saule (F). Willow leaved rock-rose (E). Sonnenröschen, Citröschén (D). Elantemo (I).
بجلة سبروتية تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعها منفردة مسترسلة. اوراقها معقوفة صفصافية الشكل. ازهارها عكوكلية التجميع، محورية الارتكاز، لونها الى الصفار الذهبي اللامع تملو رقة ارجوانية || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

Traitement (F). Treatment (E). مَدَاوَة ٢٦٠١٨
هي المالجة، اطلبها.

Acuminé (F). مَدَّيَب ، مَوْتَف ٢٦٠١٩
Acuminate (E).

تعت تعريفي توصف به اعضاء النبات والحشرات التي تنبت على شكل الحمة وبنقها.

Tannerie (F). مَدَّيَبَة ، مَدَّيَبَة ٢٦٠٢٠
Tannery (E).

Délai (F). Delay, Time (E). مِدَة ٢٦٠٢١

Entélégyes (F). مَدَّكَرَات ٢٦٠٢٢
Entelegyna (E).

فتة من العناكب تتميز بوضوح المركبة من ثمان زلثم وپالنسات الشَّوْرَاية المذشرة عند الذكور والانات.

Notacanth (F). مَدَّج ، مَشَق ٢٦٠٢٣
Notacanthus (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة المدجيات. انواعه المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار العالم. اجسامها مستطيلة الشكل مدنية، تطلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها مقبوضة. اخطاها منقبضة صغيرة. عيونها مستديرة بارزة. زعانفها الظهرية مؤلفة من ٦ اشواك حادة. انفاها الى السمرة الرصاصية يملوها موج اسفح. لحومها مأكولة متوسطة الصنف.

٢٦٠٢٤ - مَدَّج مَبْدُول * ، مَشَق مَبْدُول
Notacanthus vulgaris (S). Notacanth commun (F).
Common Notacanthus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة المدجيات ورتبة شاككات الزوائف. اعطائها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط. تتميز من اسماك الثنات المتوسطة الغور || جسمها سطوي الشكل ، مستطيل الذنب، معتدل التبطيط، يطول نحو ٤٠ سم. ثوبها الى اللحملة الرصاصية السفاه الموج. ظهرها شديد السمرة. بطنها باهت الخفصاف. رأسها شارف الجبهة. منقبض الخطر، صغير الفم، قصير الشق العريض. اسنانيا صغيرة، ذرية. عيناها صغيرتان، بارزتان. حذقة عيناها سوداء لامعة. زعنفتها الظهرية كثاية عن ستة مناسخ متتابعة منقبضة، شاككة. الصدرية تساعية الشع السرحة. الخوضية بطنية الارتكاز، سباعية الشع. الشرجية مستطيلة، خفيفة، تمتد حتى طرف الذيل ويتقدمها تسعة مناسخ حادة الاطراف. ذيلها عادم الزعقة، دقيق الطرف || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

Poulailler (F). مَدَّجَجَة ٢٦٠٢٥
Hen-house, Hen-roost (E).

هي زريبة الدجاج المشيدة وفقاً لقواعد الفن والمغتصيات الصحية.

Verminière (F). مَدَادَة ٢٦٠٠٦
حفرة يرقي فيها البود الذي يعمل طعاماً للسك.

Orbite (F). Orbit (E). فُتْلُك ٢٦٠٠٧
طريق الكوكب السيار.

Orbitale (F). Orbital (E). وَتَبَة ، مَدَارَة ٢٦٠٠٨
المدارة خط سير اجرم المتحرك.

٢٦٠٠٩ - مَدَارِي ، فُتْلُكِي ، وَتَبِي
Orbital (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بخط سير الاجرام المتحركة.

٢٦٠١٠ - مَدَاقَة
كل سمكة تعيش بين الصخور لا تبعد عنها تدعى مَدَاقَة.

Vin ٢٦٠١١ - مَدَام
هو الخمر والتبذد وابن الحاة وابن اللذ.

Oenologie (F). Oenology (E). مَدَاهِمَة ٢٦٠١٢
هي علم الخمر، علم يبحث في صنع الخمر وسففلها.

Eau salée, Eau de mer (F). مَدَان ٢٦٠١٣
الماء الملح، ماء البحر.

Plectranthus (S). مَدَان * ٢٦٠١٤

Plectranthe, Germaine (F). Plectranth, Chinese basil (E). Hahnensporn (D). Plectranco (I).
جنس نباتات جينية معمرة عطرية من فصيلة الشفويات. انواعه زهاء ٤٠ معظمها بري وبعضها تربي. سوقها فروعها تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. فروعها خفيفة الانفراف زياة اللحم. اوراقها كاملة متقابلة معتقة. نصلها قلبي الشكل، مسن الحافة، خلي البشرة صلي صفحتيه. ازهارها صغيرة القند زرقاء اللون عكوكلية التجميع فواعة العرف المستحب الذي ينفر منه العث.

٢٦٠١٥ - مَدَاهِين ، زَهْرَة الشَّمْس
Helianthemum (S). Héllanthème (F).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الاديديات. انواعه عديدة، معظمها بري منبته الجبال والخصاف وبعضها تربي. زرع بين الصخور. سوق فروعها. فروعها مستطيلة. اوراقها لا قياسية الارتكاز والشكل. ازهاره صغيرة القند متعددة الالوان. وهو يرغب في الموامع الجافة وفي المراض الجنوبية الكثيرة الفصح || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٦٠١٦ - مَدَاهِين شَالَع *
Helianthemum vulgare (S). Héllanthème commun (F).
Herbe d'or (F). Sun-rose, Common rock-rose (E). Echtes Sonnenröschen (D). Panacea, Chironia, Erbo d'oro (I).

نوع من المدايين، ضروبه الزراعية عديدة، تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. فروعها مستطيلة. اوراقها متقابلة اذنية. نصلها بيضي الشكل يطول من ١٠ الى ٤٠ م. ويعرض ٥ الى ١٥، ازهارها بسيطة او مكسية تعرض من ٢ الى ٤ سم. الوانها عديدة تختلف باختلاف الفروم منها الاصفر والابيض والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من ايار الى آب.



مدان



مدايين شائع



مدايين صفصافي الرق



مدج مبدول

تنقيض وتكثور عند الطاب . بغض اجناسها أدر والبغض الآخر جزئي التسين || اشهر اجناسها التاتو والتاتوزيه والعبار .

Ferme d'élevage (F).

٢٦٠٢٦ - مَدْعَة ٥

Rearing farm (E).

هي المزرعة المخصصة لتربية الدواجن من أي جنس كانت . وهي تشمل الأرض وما عليها من ابنية ومعدات .

٢٦٠٤٢ - مَدْرَوَان * Crocethia alba (S).

Cocoril des sables (F). Sanderling (E).

طائر من طوال الساق القواطع وفصيلة الزرقاقيات . مشاه بعض شطوط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . صيفه شطوط البحار الشمالية . قوته البديدان والقشريات والرخويات التي تلتفها الأمواج || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم . ثوبه الصيفي إلى السواد تملو رقشة صناعية يتخللها الأبيض في الرأس والرداء والجناح والذنب ، صدره إلى الشقعة ، بطنه أبيض . منقاده وساقه إلى السمرة السوداء . ثوبه الشتوي إلى الزبداء في الرأس والرداء والجناح والذنب وإلى البياض الناصع في الصدر والبطن . الأني تتحل بنفس الثوب || يذئن انغموسه في الرمال . الأني تحضن وحدها من ٣ إلى ٤ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٧ يوماً .



مدخه

٢٦٠٤٣ - مَدْسُج دويبة تلجج كالمكبوت (اللسان) .

Tropisme (F). Tropism (E).

شذوذ عرضي في نحو بعض اعضاء الاجسام الحيوانية والنباتية تؤثر فيه وتوجهه بعض العوامل الخارجية كالنور والحرارة والصقيع والاختفاء .



مدروان

Déversoir (F).

Overfall, Waste-Weir (E).

المدرق المكان الذي يفيض منه الماء المجهوز .

٢٦٠٤٦ - مَدَشَاشَة زَبَاء * Henicopus pilosus (S). Henicope poilu (F).

Henicopus pilosus (E).

حشرة واسعة قانصة من فصيلة الممخيات ورثية معدقات الإجنسة . تألف البراري والمخولق المزدرة . خنافسها تعيش على رقيق الازهار وبلاستها . يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاخشاب النخرة ساعية وراء اساريع الحشرات الخائبة لاقتناصها || جسمها صغير القد ، كثيف الزغب والهلج ، يطول من ٧ إلى ٨ سم . لونها صفيرتان بارزتان . زباناها غيبطيان مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف اللائح ، تحيل التحزيز الغمدية . ارساغها خاسية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز . ترحس في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتح المكن مباحداً تحت لحاء الاشجار وشورها وتحت الانفاض وفي الجملانة والعلب || البرقة عند بلوغها الادراك التام تعطل من ١٢ إلى ١٤ م . جسمها شطواني الشكل ، مستطيل الرأس ، اسمر اللون الكادمي ، سداسي البرواجب التنحيلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في آخر سرداب دخلته البرقة .



مدشاشة زباء

٢٦٠٤٧ - مَدْعَر ، طَالِب Requéant, Demandeur (F). Plaintiff, Petitioner (E).

٢٦٠٤٨ - مَدْعَة

جوزة التارجيل المفرقة من لها يغرف بها .

Notacanthidae (S).

Notacanthidés (F). Notacanthidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكتات الزعانف . اجناسها المعروفة اربعة اشهرها المدج .

Pondol d'autruche (F).

Nest of ostrich (E).

انحوص تحفره القارص أي النعامة الأني في الرمل . قطره نحو ١٠٠ سم . وعقه نحو ٣٠ سم . تضع فيه من ١٢ إلى ١٨ بيضة تحضنها بمتابوة الظلم .

Rechaussement (F).

عملية زراعية قوامها حفر جذع الشجرة أو ساق الشتيلة الفتية بقليل من التراب للحماية .

Fumivore (F).

Smoke-consuming (E).

نعت تعريفي يطلق على كل جهاز يمتص الدخان فيحرقه .

Polypler (F). Polyp (E).

مجموعة من المديج تعيش على قاعدة كلسية واحدة .

Provision (F).

Provision, Store (E).

المدرس هو الذخيرة ، اطلها .

Apport (F).

٢٦٠٣٣ - مَدَدَة

Lactigène (F).

Lactigenous (E).

كل ما ينشط اللبن ويزيد من قدره .

Tubérigène (F).

نعت تعريفي يطلق على الجين المدرة الشكل .

Glèbe, Motte de boue (F). Glebe, Sod, Clod (E).

الكثلة من التراب المماسك .

Galéa (F).

هي المكنانة ، اطلها .

Processus (F). Process (E).

التطور التدريجي للنتيق المتتابع .

Bateuse (F).

Threshing-machine (E).

آلة ميكانيكية تستعمل لدس الحنطة والشعير .

Armardille (F).

هو التاتو ، حيوان صفن الجلد المدرع ، اطلها .

Dasypodidae (S).

Dasypodidés (F). Dasypodidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها ملحوفة بدروع عظمية وغضروفية حزامية التركيب

Dopé (F). Doping (E). ٢٦٠٦٤ - **مُدْوَش** *

من اجترع الدمشة ان كان انساناً او جرّع الدمشة ان كان حيواناً .

Cuverie, Cuvier (F). ٢٦٠٦٥ - **مُدْكَة**
السرداب او البتاء الذي تحفظ فيه دنان الخمر .

Pommelé (F). Dappled (E). ٢٦٠٦٦ - **مُدْكُر**
شبه من شيات الخليل وهو ان يكون في شعر الفرس نكت
تخالط سائر لونه .

Oléomètre (F). ٢٦٠٦٧ - **مِدْهَكَان** * ، **مِزْيَات** *
Oleometer (E).
جهاز تقاس به كثافة الادعان والزيت .

٢٦٠٦٨ - **مُدْهَوْب** *
Nécrosique, Nécrotique (F). Necrotic (E).
المدهوب من النبات ما كان مصاباً بالذهب ابي النخر .

Orbiculaire (F). Orbicular (E). ٢٦٠٦٩ - **مِدْوُكَار**

Spatule rose (F). ٢٦٠٧٠ - **مِدْوَالَس**
هو الملاحقي آلوردي، طائر من طول الساق ، اطلبه .

Trochanter (F). ٢٦٠٧١ - **مَدْوَر** ، **مِدْوَر**
عضو يجمع الحرقنة الى الفخذ .

٢٦٠٧٢ - **مِدْوَر** *
Cyclomètre (F). Cyclometer (E).
جهاز يستعمل لقياس الدوائر .

٢٦٠٧٣ - **مُدْوَس** * ، **مَدْوَر** ، **قَرَجَ الْبَحْر**
Medusa (S). Méduse (F). Medusa, Jelly-fish (E).

الواحدة مدوسة ومدورة . جنس حيوانات هلامية بحرية .
انواع واشكاله عديدة تغلب فيها الاستدارة .
الوانها تراوح من الاصفر الباهت الى الازرق الساجوني .
وهي تضيء في الليل وتبدو من بعض الظروف والحالات
شفافة كالزجاج . واذا ذرعت من شيء قلفته برشاش نالط
يلدغ كثرش النار . اشهر انواعه قنديل البحر وربة البحر .

٢٦٠٧٤ - **مُدْوَسِيَّات** *
Méduses (F). Medusae (E).
حيوانات هلامية بحرية صغيرة القند تتنهي الى عدة فصائل
واحدتها مدوسة .

٢٦٠٧٥ - **مَدْوُكَة** *

Madoqua (F).
جنس طياء افريقية متوسطة القد ، ربعة الجسم ، جميلة
الشكل ، حنطية الثوب ، مستطيلة الاذن ، قصيرة الذنب .
انثاها جهاء . قرون ذكورها صغيرة القد ، مبطلة القواعد
المتتابعة المحسدة ، مائلة الاطراف المستديرة المدببة .
انواعها المعروفة ستة . اعطائها شاسعة الاطراف تمتد من
تمام البحر الاحمر الى السودان والحيشة والصومال وكنيا .

٢٦٠٧٦ - **مَدْوُل** *
Médulle (F). Medulla, Pith (E).
اسم يطلق على كامل المكك النباتي ، الداخلي والخارجي .

٢٦٠٧٧ - **مُدْوَلَم** * ، **دَوْلَمِي** *
Dolomitique (F). ٢٦٠٧٧ - **دَوْلَمِي** *
Dolomitic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان تركيبه الدولوم .

Plaignant (F). ٢٦٠٧٩ - **مُدْعِي**
Plaintiff, Complainant (E).
هو من رفع ظلامته او دعواه امام المحكمة .

٢٦٠٨٠ - **مُدْعَى عَلَيْهِ**
Défendeur (F).
هو الذي ترفع عليه الدعوى .

٢٦٠٨١ - **مُدْعَمَات**
Conjugues (F).
Conjugate (E).
فصيلة نباتية من رتبة اخشيات الخضر . اجناسها وانواعها
عديدة ، جميعها من نباتات المياه العذبة ، تتميز باشكالها
الطيطية الماعدة الفروع .

٢٦٠٨٢ - **مُدْعُوش** *
Allélomorphe (F).
نعت تعريفي يطلق على الصفات المتباينة المتناقضة المختلطة .

٢٦٠٨٣ - **مُدْقُق** *
Amont (F).
Up-stream, Up-river (E).
المدقق او عالية النهر هي الجهة التي تصدر عنها المياه
الجارية . يقابلها المسيب .

٢٦٠٨٤ - **مِدْقَنَة**
Enfouisseur (F). Burier (E).
هي المطرقة ، أداة تصاف الى المخرات فتوجه الزبل في التلم
ليطمره مقلب المخرات .

٢٦٠٨٥ - **مِدْقَال** *
Légende (F). Legend (E).
تفسير ما في رسم او خارطة من حروف وعلامات وتصاوير
والأوان الخ .

٢٦٠٨٦ - **مِدْقَة** *
Pistil
هي طرف المتاع اي عضو التأنيث في الزهرة . وهي عند
ادراكها تفرز مواد لزجة تمكن جدورات الطلع من
الالتصاق للاخصاب .

٢٦٠٨٧ - **مِدْقِي** *
Pistillé (F). Pistillate (E).
صفة الاثمار الرسيمة الشق المهزجة بمذقات اي اعضاء
انثوية .

٢٦٠٨٨ - **مِدْدَال** ، **أندريس** *
Indice (F). Index (E).

٢٦٠٨٩ - **مَدْبَلَة**
Platanale (F).
Plantation of plane-trees (E).
غابة الدلب والارض الكثيرة الدلب .

٢٦٠٩٠ - **مِدْبَلَج**
Hérissou (F).
هو القنفذ ، اطلبه .

٢٦٠٩١ - **مِدْمَاك**
Cordon du maçon,
C. du charpentier (F). String, Strand (E).
المدماك هو خيط البناء والتجار . وقد شاع استعماله للدلالة
على ساف الحجارة البنية .

٢٦٠٩٢ - **مِدْمَكَة**
Râteau (F). Rake (E).
اداة تنهي تجمش ممتزعة تتخللها اسنان من حديد تدم
بها التربة اي تسوي .

٢٦٠٩٣ - **مُدْمَدِي** *
Fluviatile (F). Fluvatile (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يعيش في المياه العذبة .
وعلى كل نبات يعيش فيها او ينبت على ضفافها ويربها .



مدقة



مدوس



مدوكه

Dichogamie (F).

Dichogamy (E).

تفاوت زمن الإدراك التناسلي الذي يحصل بين الإغصاء الذكورية والانثوية في تنور بعض النباتات.

Coursier très rapide (F).

٢٦٠٨٩ - مَدَاقِي

الفرس السريعة جداً .

٢٦٠٩٠ - مَدَال * ، مَشَرَق مَبْدُول

Centetes ecaudatus (S). Tanrec commun (F).

Tanrec, Tenrec (E).

حيوان ليون حاشر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المذليات. موطنه جزيرة مدغسكير . يألف المناطق الجبلية حيث تكثر السراخس . مسرعه دجوي . قوته البندان والحشرات وبعض جلود النبات || جسمه مكرهم صمغوي يطول نحو ٤٠ سم . رأسه شبه مخروطي الشكل ، مستطيل الخطم . فكه الاعلى يتقدم الاسفل . عيناه صغيرتان . اذناه مستعرضتان . ذنبه ماسح لا وجود له . جرابه قمصية . اصابعه قوية . اطافرها مخبئة ، حادة الاطراف . هليبه لبد قصير تتخلله مسال ذرية الاطراف متباعدة الطول والشحانة تكثف الرأس والعتق ويخرج الظهر حتى الكفل || بياضه الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . جمره نفق مستطيل يحفره في التربة || الاثنى ثلث ثلث ثلث ثلث في كل رصص من ١٥ الى ٢٠ جرأ .



مَدِيد

Centetidae (S).

٢٦٠٩١ - مَدَالِيَّات *

Centetidae (F). Centetidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعطائها جزيرة مدغسكير || اجسامها صغيرة ، مكرمة ، منقبضة ، اخطامها مستطيلة جرابها قمصية . اطافرها قوية ، ذرية . بعضها كثيف الوبر الناعم ، قصير الذنب او مستطيلة والبعض الآخر ماسح الذنب او عادمه ، هليبه الوبر وتطو سلال متباعدة الشحانة والظليل اعرف اجناسها المذال واليهسل والبرقولي والميكروغال واليسنغال .



مَدِيدَة

Gobe-mouches (F).

٢٦٠٩٢ - مَدَبَاب *

هو أكتال الذباب ، اطليه .

Muscipidae (S).

٢٦٠٩٣ - مَدَبَابِيَّات *

Muscipidae (F). Muscipidae (E).

فصيلة طير من الجواثم السليان المتأثير . انواعها نحو ٣٧٥ جميعها من المصافير الصغيرة البند . اعطائها تشمل مختلف مناطق السلال القديم . تألف اللغابات والحدائق والجائن . قربنا الحشرات اغصها الذباب .



مَدَال

Autel, Vesta (F). Ara (E).

٢٦٠٩٤ - مَدَبَح مَرِيح

المذبح المريح كوكبة نجوم جنوبية المقيع مركزها تحت ذنب العقرب || عدد نجومها ثمانية منها ثلاثة من المرتبة الثالثة .

Terre nue (F). Naked land (E).

٢٦٠٩٥ - مَدَحَاقَة

الارض البور لا شجر فيها .

Gäter (F).

٢٦٠٩٦ - مَدَوَر

To spoil, To damage (E).

مذرت البيضة : فسدت فهي مَذَرَة . والجوزة كذلك .

Polype (F). Polyp (E).

٢٦٠٩٨ - مَدِيخ *

جنس حيوانات بحرية من المحفوات . انواعه عديدة . اشكالها كالبات ، افرازها كلسي المادة سريع التحجير تعيش عليه وفي داخله .

Barbotage (F). Mess, Mash (E).

٢٦٠٩٩ - مَدِيد

شراوب مرطب للدواجن يرتكز على اللقيح وبعض النخالة.

Cynanchum (S).

Cynanche, Cynanque (F). Scamony plant (E). Roter Hundswürger (D). Scamonea (I).

جنس نباتات مدادة من فصيلة الصقلابيات . انواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها مدادة عطفة يستخرج منها عصارة لبينة طيبة . اوراقها معقفة متقابلة مزاوية التصل . ازهارها خاسية التركيب ، صيوانية التجميع ، محورية الارتكاز . اعرف انواعه واشهرها المديخ المعطر .

Cynanchum indicum (S).

٢٦٠٩١ - مَدِيد عَطِير

Cynanche odorant (F).

جنبه معمرة متسلقة تطول نحو ٣٠٠ سم . ساقها وفروعها عפרية اللحاء الخلفية . اوراقها مستطيلة الاضلاع . نصلها خلي الصفحة يطول نحو ١٤ سم . ويعرض نحو ٨ . ازهارها جرسية الشكل ، صفراء اللون ، عطرية الرائحة اللبينة البالياسين || ازهارها يستمر من اواسط تموز الى اواسط آب .

٢٦٠٩٢ - مَدِيدَة *

Turbo (S). Turbo, Sabot (F). Turbo, Turban-shell (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل وفصيلة المدييات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اصداؤها كبيرة القد ، متساقمة ، محزنة الاغقاب ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، فسيحة الفوهات شبه المستديرة || لحومها مأكولة واصداؤها صناعية .

٢٦٠٩٣ - مَدِيدِيَّات *

Turbinidae (S). Turbinidae (F). Turbinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل امانيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصداؤها غليظة متساقمة لؤلؤية الصفحات الداخلية بعضها يشبه المدعة والبعض الآخر يشبه المداس || اعرف اجناسها واشهرها المديعة والدرعوسية والنبخفة .

Débiteur (F). Debtor (E).

٢٦٠٩٤ - مَدِين

هو في الشؤون من يجب عليه تنفيذ الالتزام وفي التخصيص من كان عليه الدين .

Débit (F). مَدِيدِيَّة ، مَطْلُوب

Débit (E).

هو ما على المرء من حساب ودين أو ما هو مطلوب منه .

٢٦٠٩٦ - مَدَاحِير

Intestins (F). Intestine, Bowel, Gut (E).

هي الامعاء . يقال ملأت الدابة مذاحيرها .

٢٦٠٩٧ - مَدَاح

Porc-épic à queue blanche (F).

هو الشحم الابيض الذنب ، اطليه .

الى الصفرة يعلوها تجذيع معترض لا قياسي الشكل اسود اللون. روشنها الخلفيان مذنبان وميتجان بالاحمر والاطمحل. تظهر في اوائل الربيع ، تمتع مكها على اوراق اللوز والدرناق والحوخ والكرز فينبف عن رقات خاضلة تلثم بعض اجزاء الاوراق .

٢٦١٠٧ - مِذْرَاب مَقُون * ، مَقُون *

Papilio machaon (S). Machaon, Grand porte-queue (F).

فراشة كبيرة القد من عارة المذانيات . جسمها اسمر اللون . بسطها لا تقل عن ٧٥ م . روشنها الى الصفرة يعلوها تجذيع وتنبق وتنبق وتسجيل متراكبة الاالوان يكتر فيها الاسود والاطمحل والاحمر . روشنهاا الخلفيان مذنبان. تظهر في اوائل الربيع . تمتع مكها على اوراق الجزر والشمار فينبف عن رقات تعيش على الاوراق فتلثمها .

٢٦١٠٨ - مِذْرَابِيَّات *

Papilioninae
عمارة حشرات من فصيلة الفراشات ورتبة حشرجات الاجنحة صولجانيات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . منتشرة في جميع بلاد العالم . فراشاتها متوسطة القد وكبيرة . االوانها متباينة الالوان الفاقمة . اشهر اجناسها المذنب والمخدأب والميضام .

٢٦١٠٩ - مِذْرَب *

Comète (F). Comet (E).
كوكب طالع منتقل تتبعه سحابة مضيئة . حركة دورانه حول الشمس مستطيلة المدار || مذ المذنبات المعروفة حتى الآن يتنازع ١٥٠٠ اشهرها « مذنب هالي » الذي يظهر كل ٧٦ سنة وقد ظهر عام ١٩١٠ وظهر ايضاً عام ١٩٨٦ .

٢٦١١٠ - مِذْرَب *

Urodèle (F). Urodele (E).
نعت تعريفي يطلق ، في علم الحيوان ، على كل دوية او يرقعة او اسروع مجهزة بذنب او بزايدة تشبه الذنب .

٢٦١١١ - مِذْرَبِي

Sperme (F). Sperm (E).
هو مني الحيوان عامة ، راجع مني .

٢٦١١٢ - مِذْرَبِيَّاب ، حَال *

Solvant (F). Solvent (E).
٢٦١١٣ - مِذْرَب

Dissolvant (F). Dissolvent (E).
٢٦١١٤ - مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي

Lait mouillé (F). Whey (E).
اللبن والمخير والمهز ، مزيج من اللبن والماء .

٢٦١١٥ - مِر * ، شُوْكَة

Croc, Trident (F).
Hook, Trident (E).

اداة تستعمل في الزراعة لقلب التراب .

٢٦١١٦ - مِر *

Amer (F). Bitter (E).
نعت يطلق على ما كان طعمه ضد الحلو .

٢٦١١٧ - مِر *

Myrrhe (F). Myrrh (E).
صنع راتنجي يستخرج من سوق نجر المير . قال الدكتور

برزي مفتاح في احياء المذكرة عن الانطاكي ما حريفه :

« هو السري في المقالات وهو معروف يسيل من شجرة

بالغرب فيجعد قطعاً الى حرة صافية ، منه ما يريد على

ساق الشجرة وقد جد كالجواهر وهذا هو المير المعروف

بالبطارخ لانه يحسكي يبيض السمك في دسوته وصغره

٢٦١١٧ - مِذْرَاة * ، مِذْرَبِي

Fourche (F).
Fork, Pitchfork (E).
اداة من خشب او حديد تلدى بها الحنطة ويرفع بها الكلا والزبل وغيرها .

٢٦١١٨ - مِذْرَبَة

Semoir (F).
هي المبدر .

٢٦١١٩ - مِذْرَب

المذرع من الخيل والبقر وسائر الدواجن من كانت امه اشهر سلاله او عرقاً واجود اصلاً من ابيه .

٢٦١٢٠ - مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي

Mouillage (F). Soaking, Wetting (E).
هو المزج بالماء كخسل اللبن بالماء فهو مذيقي وغير .

٢٦١٢١ - مِذْرَبَة . Frenching (F). Polyphyllie

علية جمسورية قليلة الاذى شائعة في جميع بلاد العالم تترى التبع تشبه نصال اوراقه وتقفي على صفه || مظهرها الخارجى اصفرار في الاوراق يبدأ من حافة النصل وينتشر تدريجياً نحو الداخل الى ان يتناغم الضلع فنيو الورقة صفراء النسيج ، خضراء الضلع والعروق ، رافعة الوثن النخين || وفي حال اشتداد العلة فانها تسبب وباط الشتل وتراكب الاوراق التي تصعب مذكرة ، مستطيلة النصل الضيقة ، متعصبه الاطراف ، ملتوية الرؤوس || اسبابها الرئيسية عديدة ومتباينة اخصها قلبية التربة وطرط رطوبتها وضعت بمحوها الازوتي وقلة موادها الصفوية وصعزها الجربوي || يقول العالم « ستينبرج » ان المذرة علة جذها قديان خاص بفرزه نقطور تري ينسى بايلوس سروس . وان هذا الدلفان الذي يسبب اختلال الايض الازوتي في النبات ينشط تكوّن الحوامض الامينية اللطيفة التي تحدد هذه الشرايب او تفرد بها .

٢٦١٢٢ - مِذْرَب ، مِذْرَب

Adulte (F). Adult (E).
من دخل في الدور الثاني من حياته وهو الدور القام بين الفتوة والشيوخة .

٢٦١٢٣ - مِذْرَبَة

Mémoire (F).
Memorandum, Bill (E).
عريضة تفصيلية تسرد وقائع القضية واسبابها وما آلت اليه .

٢٦١٢٤ - مِذْرَبَة

Travail (F). Trave (E).
آلة تربط بها احيوانات الكبيرة لتذل فتسهل مداواتها .

٢٦١٢٥ - مِذْرَاب الحَبِيَّات *

Papilio alexanor (S).

فراشة متوسطة القد من عارة المذانيات . جسمها اصفر اللون يعلو غط مستعرض قاطب اسود . بسطها نحو ٦٥ م . روشنها الى الصفرة يعلوها تجذيع اسود اللون مختلف الاشكال والاحجام . روشنهاا الخلفيان مذنبان وميتجان بالاحمر || تظهر في اواخر الربيع ، تمتع مكها على معط نباتات الفصيلة الصبوانية فينبف عن رقات خاضلة تعيش على الاوراق تلثمها .

٢٦١٢٦ - مِذْرَاب اللُّوز *

Papilio podalirius, P. sinon (S). Flambé (F).

فراشة متوسطة القد من عارة المذانيات ، جسمها حنطى اللون يعلو غط قاطب اسود يتقطع عند مؤخر الظهر ثم يعود فيملو البطن الى الشرج . بسطها نحو ٦٥ م . روشنها



مِذْرَاة



مِذْنَاب الحَبِيَّات



مِذْنَاب اللُّوز



مِذْنَاب مَقُون



مِر

وسهوكته وليس بالريء. ومنه ما يصغر فيسيل ماء ثم يجمد مثلاً إلى السواد ويحكي الميعة السائلة ويسمى المر الحظي وهو دهن الثاني || وهو دهن عظيم في المراهم والاكحال على اختلاف أنواعها. وهو ينفع سائر التلذات والصداع...

يكتسل به فيحل المدة وغلظ الجفن، ويزيل الرمد بلين النساء. والقرحة بماء الورد الحلي. ويدمل سائر القروح إذا نثر فيها وقد غسقت قبله بماء لسان الحمل. ويشد اللثة ويزيل قروحها ووجعها الأسنان بالخمر والزيت مضغمة. والسعال ووجع الظهر. وخشونة القصبة استحباً في الفم. ووجع الكبد والكل، والمثانة والبدانة ثروباً خصوصاً مع الترس والافستين. وامراض الارحام خصوصاً الصلبة والكتن حتى يحاله ولو بماء الأس. ويلجم الفتق اذا تمودي عليه ويعل عرق النساء والمفاصل والقرص مطلقاً. ويزيل نثر الجمل بالشب وضعف الشعر. وانتاره بالخمر والاددن ودهن الأس، والقولنج بالصل، والتآليل والأكار كلها. دخانه ينبت شعر الجفان وينوم بنفسه شاماً ويحفظ المرق طلاء مع دهن اللوز المر ينفع في امراض الأذن، ومع التنعم امراض الأنف، وهو يفسر المثانة ويسقط الأجنة ويصلحه السمل وشرته الى ثلاثة ويده فلفل او قسط او جذبادستر.

٢٦١١٨ - مَر * Commiphora myrrha (S). Commiphore, Arbre à myrrhe (F). Myrrh tree, Myrrha (E). Myrrhenbaum (D). Albero del mirra (I). نوع من البلسان من فصيلة البخوريات. شجيرة صغيرة القذ شائكة، يقطر الصمغ من ساقها على شكل دموع حراء اللون شاحبة مغبية. اوراقها معتقة مركبة ثلاثية الورقيات. اغشائها بخارها عطرية الرائحة القاذة. صمغها جيد الصنف شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١١٩ - مَر إفريقي Commiphora schimperi (S). Commiphore d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Echter Myrrhenbaum (D). Albero del mirra d'Africa (I). نوع آخر من المر، اعطانه البلاد الإفريقية يكثر في الجزائر ومراكش. شجيرة صغيرة القذ شائكة. يستخرج من صمغ صمغ راتنجي المادة جيد الصنف عنابي اللون، شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١٢٠ - مَر حَبَشِي، مَر حِجَاي Commiphora abyssinica (S). Commiphore d'Abyssinie (F). Coarse myrrha (E). Afrikanischer Myrrhenbaum (D). Commifora (I). نوع من المر، اعطانه الحبشة وسائر افريقية الشرقية وجزيرة العرب. شجيرة صغيرة القذ شائكة. ثمارها مجع الجوز كانت ولا تزال تستعمل في بعض المستحضرات الطبية. صمغ راتنجي المادة جيد الصنف يأتي بعد المر الإفريقي جودة.

٢٦١٢١ - مَرَايَ Metayer (F). Metayer (E). هو من استعمل الأرض بالمزارعة، الطب مزراع.

٢٦١٢٢ - مَرَاة مُسَلْسَلَة Andromède (F). Andromeda (E).

المرأة المسلسلة كوكبة نجوم موقعها قرب القطب النجالي. عدد نجومها ٥٩ أشهرها تير الرأس والسر والقدم وورد بالقرب من هذه الكوكبة صدم لولبي اكتشف عام ١٩١٢ يبعد عن الأرض نحو ٨٠٠.٠٠٠ سنة ضوئية وقطره نحو ١٠٠.٠٠٠ سنة ضوئية.

٢٦١٢٣ - مَرَاة Enflourage (F). طريقة صناعية لاستخراج العطر ترتكز على مرث الازهار في الدهن او الشحم.

٢٦١٢٤ - مَرَاة Etable (F). Scable (E). هو مأوى البقر والغنم ولعز وسائر الدواب، اي موضع راحتها في الليل.

٢٦١٢٥ - مَرَار Centaurée étoilée (F). هو القنطريون النجمي، اطبه.

٢٦١٢٦ - مَرَاة Vésicule biliaire (F). Gall-bladder (E).

٢٦١٢٧ - مَرَاة Amertume (F). Acerbity (E). وصف ميكروبي يمتري أخمر فيفسدها بعد ان يعيب طعما اذ يجعله مر المذاق.

٢٦١٢٨ - مَرَاة الْحَتَش *، قُنْطَرِين صَغِير، قَصَّة الْحَيَّة، طَوْرَق

Erythra centaurium (S). Erythrée centaurée, Petite centauree, Herbe à la fièvre (F). Earch-gall, Centaury, Fever wort (E). Eches Tausendgülden-kraut (D). Centaurea minore, Blondella, Caccia-febbre (I).

نوع من الار يتربا وهو نبات عشبي بري حولي طلي صغير القد. ساقه فراء مستدقة. اوراقه متقابلة صغيرة. تفصلها ضيق الصفعة، خلي البثرة، اطحل اللون، شديد المرارة || يستعمل منه في الطب القوم الزهرية والاوراق. وفي مقوية المعدة دافعة الحصىات. ويجضر منه متوقع هاضم يستعمل في حالات زيادة الحموضة والقرحه المعديه او المعوية ذلك لان هذا النبات يحوي بعض الاملاح القلوية بنسب كبيرة لها منافعها الطبية.

٢٦١٢٩ - مَرَاة الصَّحَاي Chicotin (F). هي الحنظل، اطبه.

٢٦١٣٠ - مَرَّاس * Ophonus sabulicola (S) حشرة من فصيلة الهربصيات. طولها يراوح من ١٤ الى ١٧ مم. رأسها وكوسلها الى السمره السوداء. عمداها الى الزرقه السفاه يعلوها مواج اخضر || تكثر في الارربة الكلسية. تركب ازهار نباتات الفصيلة الصبوانية وتلتهم البذور منذ تكوينها || يرقانها خاضعة قليلة الاذى.

٢٦١٣١ - مَرَّاس Chiroteuthis (S). Chiroteuthis (F). Chiroteuthis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الاجل وفصيلة المراسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشعية الشكل. زعانفها مستديرة طرفية الارتكاز. رؤسها اسطوانية. عيونها كبيرة صامعة. ثمانية من جرائنها طليقة معجبة متقاربة الطول واثنان شديدا الطول عادتا الهاجم تنهيان برحى سنانية الشكل.

٢٦١٣٢ - مَرَّاسِيَّات Chiroteuthidae (S). Chiroteuthidae (F). Chiroteuthidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الاجل، ثنائيات الخياشيم، عشاريات الجرامز. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي



مَر



مرارة الحنظل



مراس



مراس

تينة اللون صناعية. اوراقها طيبة وعلقية || كانت قشور المران تستعمل استعمال الكينا قبل معرفتها وهي مرققة خافضة للحرارة. أما الارواق فتفيد التوسمة والنقرس. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٦١٤١ - مرّان أبيض Fraxinus alba (S).
Frêne blanc, F. d'Amérique (F). American white ash (E). Amerikanische Weissesche (D).
شجرة سبروتية باسقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ م. مهدا امريكة الشالية. اوراقها تطول نحو ٣٠ سم. وريقاتها تعد من ٧ الى ٩، نصلها سناني الصلصة يطول ١٥ سم. ويعرض ٥ سم. وهو احمل اللون مدبب المقصه سنن الحافة. ازهارها عشكولي، طرفي وبحوري الارتكاز، يطول نحو ١٠ سم. ازهارها بيضاء اللون.

٢٦١٤٢ - مرّان احمر * Fraxinus pubescens (S).
Frêne rouge (F). American ash, Red ash (E). Amerikanische Rotesche (D). Frassinio rosso americano (I).
شجرة سبروتية تملو من ١٢ الى ١٨ م. وريقاتها تعد من ٧ الى ٩، نصلها اخضر اللون يحمر في الخريف وهو سناني الشكل مدبب المقصه، سنن الحافة يطول نحو ١٢ سم. صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها عشكولي، طرفي وبحوري الارتكاز، يطول نحو ١٥ سم. ازهارها فستقية اللون.

٢٦١٤٣ - مرّان أسود Fraxinus nigra (S).
Frêne noir, F. à feuilles de bureau (F). American black ash (E). Amerikanische Schwarzesche (D). Frassinio nero (I).
شجرة سبروتية جميلة الشكل، تملو من ١٠ الى ٢٠ م. براعمها الى غرايمها خضر نمشة بالاسود. وريقاتها تعد من ٩ الى ١١، نصلها بيضي الشكل، لاملي الانتشابه، حابق الخضار. ازهارها عشكولي التجميع، كبير القد. ازهارها فستقية اللون.

٢٦١٤٤ - مرّان ذرب الورق Fraxinus oxyphylla (S). Frêne oxyphylle (F).
شجرة متوسطة القد تملو من ١٠ الى ١٥ م. براعمها الى الشقة السفعاء المواج. وريقاتها تعد من ٧ الى ١٣ نصلها سناني الشكل ذرب الزام الاخير، صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها عشكولي التجميع طرفي الارتكاز. ازهارها بيض.

٢٦١٤٥ - مرّان شامخ * Fraxinus excelsior (S).
Frêne élevé (F).
اكبر انواع المران واشمخا واسرعها نموًا واعمرها. ثمرته سبروتية تملو من ٣٠ الى ٤٥ م. غرايمها استوائية، براعمها سود. وريقاتها تعد من ٩ الى ١٥، نصلها سناني الشكل، سنن الحافة. ازهارها عشكولي التجميع، طرفي الارتكاز وبحوري. ازهارها بيض يطولها مواج اخضر. يستخرج من سيقانها بالخر من لا بأس به سكري الطعم يحوى نحو ٧٠٪ من الميت.

٢٦١٤٦ - مرّان شائع * مرّان زهرّي، مرّان متقي Fraxinus ornus (S).
Frêne à fleurs, F. à manne, Orne commun (F). Manna-ash, Flowering-ash (E). Blumen Esche, Manna Esche (D).
شجرة سبروتية مبدولة تملو نحو ١٥ م. فروعه حر

والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشعية الشكل او جرابية. زعانفها مستديرة طرفية. رؤوسها مستطيلة. عيونها كبيرة ماحمة. جرابها لامتناهية الطول والشكل || اعرف اجناسها واشهرها المران والمراس والمريس.

٢٦١٣٣ - مرّاش * Spinax (S).
Spinax (F). Spinax (E).
جنس اسماك بحرية مفترسة من فصيلة المراسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || اجسامها مستطيلة، شبه وشعية الشكل. اعطائها ذلقة شارفة. اسنانها منشارية، حادة تقطع كل شيء. جلودها مبيحة. زعانفها كبيرة. الذيلية لامتناهية الشطرين || اشهر انواعه واعرفها المرّاش الاسود (S. niger) الذي يجوب البحر الابيض المتوسط.

٢٦١٣٤ - مرّاشة * Mulch
مواد عضوية مختلفة اخصها الورق والقص تقش على التربة لحفظ رطوبتها ولتغنى تكتار اعشائها الطوعية ولوقايتها من قسوة البرد.

٢٦١٣٥ - مرّاشيات * Spinaciaceae (S).
Spinaciaceae (F). Spinaciaceae (E).
فصيلة اسماك بحرية مفترسة من الاشلاق. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها يحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || جميعها وشعية الشكل، متباينة القد والحجم، منها الصغير والوسط والكبير || اخلاقتها شرسة ماحكة، لا تمر بسكة الا قمصتها الى شطرين.

٢٦١٣٦ - مرّافعة * Plaidoirie, Plaidoyer (F).
Pleading, Speech for the defence (E).
المرافعة هي عرض وقائع الدوى ومطالب المتقاضين شفهيا امام القضاة. وهي حق يحضه القانون لكل متقاض.

٢٦١٣٧ - مرّاق * المراق نجم نير من كوكبة الدب الاكبر.
٢٦١٣٨ - مرّاكزة * Dosimétrie, Titrage (F).
Dosimetry, Titration (E).
فن قياس التركيز والاخلاط.

٢٦١٣٩ - مرّامري * Kobus (S). Cobe, Kob (F).
جنس حيوانات لبونة من الغنم الكبيرة القد. انواعه خمسة اعطائها البلاد الافريقية. اجسامها منسجمة القوام طرفية الشكل تطول من ١٧٠ سم. وتعلو من ٢١٠ سم. وريقاتها تعد من ١٥٠ الى ١٥٠ م. ألوانها الى الخطي الاحمر المواج ومنها البلقا. للذكر منها قرنان كبيران لولبيان. أما الانثى فليما وفي رباعية الاخلاف، اصغر قدًا من الذكر || يألّف السبب والفايات ويجاري الماء. -جله يراوح من ١٥ الى ٢٥ نفراً.

٢٦١٤٠ - مرّان، لسان المصفور Fraxinus (S). Frêne (F). Ash-tree (E). Esche (D). Frascio, Frassinio (I).
جنس اشجار حرجية ورّيقية من المرائيات وفصيلة الزيتونيات. انواعه عديدة منها الجنيات والشجيرات والاشجار الباسقة. اوراقها مركبة وزرية متعاقبة عابلة. ازهارها عشكولي. ازهارها بيضاء اللون او فستقية. ثمارها جناحية. براعمها لحاء سويها وغاصها الى الريدة السرماء. اغصانها



مرّاش



مرامري



مران احمر



مران شامخ

٢٦١٥٥ - مرَبَّائِي (F). Epigé (F). Epigenous (E).
نمت تمريني يطلق على البزور التي ترتفع زياراتها عند
الانتاش فوق سطح التربة.

٢٦١٥٦ - مرَبَّاة (F). Lais (F). Staddle (E).
المرباة. ج. مرابي. هي الشجرة الباقية عند قطع الغابة.



مران شائع

٢٦١٥٧ - مرَبَّاح (F).
طائر من طير الماء قبيح الهيئة (الجاحظ).

٢٦١٥٨ - مرَبَّد (F).
المربد هو حبس المواشي. وفي الحديث «انه تيمم بمربه
النم». وهو الفضاء وراء البيوت يرتفع به. وهو الموضع
الصالح لتجفيف الثمر.

٢٦١٥٩ - مرَبِّض، صَبْرَة (F). Paddock (E).
Enclos pour caprins et ovins (F).
حظيرة الغنم والماعز.

٢٦١٦٠ - مرَبِّع (F). Carré (F). Square (E).
شكل هنسي قائم الزوايا المتساوية الاضلاع.

٢٦١٦١ - مرَبِّع الزَوَايَا (F). Quadrangulaire (F).
Quadrangular (E).

٢٦١٦٢ - مرَبِّع الزَوَايَا والفُلُوع (F). Tétragone (F).
Tetragon (E).

٢٦١٦٣ - مرَبِّع مُنَحَرَف (F). Trapèze (F).
Trapezium (E).
مربع متوازي القاعدتين الكبرى والصغرى.

٢٦١٦٤ - مرَبِّيات (F). Confitures (F). Preserve (E).
المربيات هي الثمار المبطونة بالسكر.

٢٦١٦٥ - مرَبَّة (F).
«بقلة تنفرض على الارض لها ورق مثل ورق الهندباء
او اعرض ولها نورة صفراء وارومة يبيض وتقطع عن اروعها
فنسل ثم تؤكل بالخل والحلزون فيها عليقة سيمة» (عن ابي
حنيفة)، ج. مر وأمرار.

٢٦١٦٦ - مرَبَّة (F). Heron gollath (F).
هو البشون الجبار، الحلبه.

٢٦١٦٧ - مرَبَّاج (F). Lithophage (F).
هو الحجار، الحلبه.

٢٦١٦٨ - مرَبُّوت (F). Vivarium (F). Vivarium (E).
المرتق قفص لاقايي الطول والعرض والارتفاع، غالباً
مزيج أو مغلف بشريط شقيق التواط، يستعمل لتربية
الدويبات والحشرات.

٢٦١٦٩ - مرَبُّوع (F). Fastigie (F). Fastigiate (E).
نمت تمريني يطلق على الفروع النباتية المرتفعة الاطراف
نحو العلاد.

٢٦١٧٠ - مرَبُّوع جَوِّي (F). Anticyclone (F).
Anticyclone (E).

٢٦١٧١ - مرَبُّوعَة المَبِيض (F). Superovariée (F).
Superior ovary (E).
نمت تمريني يطلق على ازهار النباتات المرتفعة المبيض
من فئة المتحدات القملات.

الحلاد، صفر التضيح. وريفاتها تعد من ٥ الى ٩،
نصلها اهليلجي الشكل يطول نحو ٩ سم. ويمرض نحو ٥
تسنيه مستدير الاطراف، ازهارها عكولي، طري،
لبد التجيج، يطول نحو ١٥ سم. ازهارها يبيض اللون.
يستخرج من سوقها باخر من لا بأس به يحوى ٧٢ %
من الميت.

٢٦١٤٧ - مرَّان صِينِي (F). Fraxinus chinensis (S).
Frêne de Chine, Orne de Chine (F).

شجرة سبروتية تريينية مهددا الصين تملو من ١٢ الى
١٥ م. براعها سودي في الشتاء حمري الربيع. وريفاتها
تعد من ٥ الى ٧، نصلها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٣
سم. ويمرض نحو ٦ سم. عروق بارزة، تسنيه منشاري.
ازهارها عكولي طري يطول نحو ١٨ سم. ازهارها يبيض
اللون. ثمارها جلوية.

٢٦١٤٨ - مرَّان كثير الزهر (F). Fraxinus floribunda (S). Frêne floribond, Orne florifère (F). Bitter-ash (E).

شجرة سبروتية مهددا الهند تملو من ١٠ الى ١٢ م.
وريفاتها تعد من ٧ الى ١٣، نصلها سناني الصفحة يطول
نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٥ وهو مالم البشرة، دقيق
التسني الحاد. ازهارها عكولي طري يطول نحو ٢٥ سم.
ازهارها يبيض اللون غبراء الملاج.

٢٦١٤٩ - مرَّان مُعِينِي الْوَرَق (F). Fraxinus parvifolia (S). Frêne rhomboidale, Orne de Bunge (F).

جنية تريينية سبروتية مهددا الصين تملو نحو ٢٠٠ سم.
وريفاتها تعد من ٣ الى ٧ وهي معينية الشكل تطول نحو
٤ سم. وتعرض نحو ٢، نصلها سنن الحافة، عتقا
مزغير الحلاد. مثاكلها الزهرية طرفية الاوتكان تطول من
٥ الى ٧ سم. ازهارها يبيض اللون.

٢٦١٥٠ - مرَّان مَشْشُورِيه (F). Fraxinus mandshurica (S). Frêne de Mandchourie, F. du Japon, Tamo (F). Japanese ash, Tamo (E).
Japanese Esche, Tamo (D). Fraxino giapponese, Tamo (I).

شجرة شائعة تملو من ٢٥ الى ٣٠ م. مهددا منشوريا.
فروعها رباعية التضيح. وريفاتها تعد من ٧ الى ١١،
نصلها شقيق الصفحة، مذيب العنقة، مستطيل النقت،
ياعد الحصار البحري. ازهارها عكولي التجميع مستطيل
الشكل. ازهارها يبيض، خضر الملاج.

٢٦١٥١ - مرَّانَة (F). Frénale (F).
Ash-grove or plantation (E).
منرس المران أو حجرة المران.

٢٦١٥٢ - مرَّانِيَّات (F). Fraxinées (F).
سبط من فصيلة الزيتونيات اشهر اجناسه المران.

٢٦١٥٣ - مرَّانِيْن (F). Fraxétine, Fraxine (F).
خلوكوزيد يكثر ربهده في غام المران. ويوجد أيضاً في
غام القندل الهندي. يستخرج من الحلاد بعد نغتها بالماء
وغليانها. يلبور ايزي الشكل ابيض اللون. طعمه مرّ
حريف. يلوب في الماء وفي الكحول.

٢٦١٥٤ - مرَّابَة (F). المرَب: الارض الكثيرة النبات.



مران كثير الزهر

٢٦١٨٢ - **مَرْتِينِيَّة** * Martynia (S), Martynie (F).
جنس نباتات عشبية من المرتينيات. أنواعها قليلة، جميعها أمريكية المنبت منها البرية ومنها الزينية. أوراقها معنقة لا قياسية الشكل والارتفاع. أزهارها جملة القالب، زاهية الألوان، لا نظامية التجميع والارتفاع. ثمارها جواء مقررة الاطراف. اعرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٦١٨٣ - **مَرْتِينِيَّة حَوَلِيَّة** Martynia annua,
M. diandra (S), Martynie annuelle (F).
عشبة حولية زياه غدية لزجة تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها معنقة متقابلة قلبية الشكل، نصلها خلي البشرة لخامسي التنسبن. أزهارها بيض القنأة أرجوانية الاطراف. ثمارها بيضيه ماله قنطري ثلاثة متقادية الشكل قصيرة. أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين.

٢٦١٨٤ - **مَرْتِينِيَّة خَرْطُونِيَّة** Martynia proboscidea (S), Martynie à trompe, Bicornie trompe d'éléphant, Cornaret, Ongles du diable (F).
عشبة حولية زياه لزجة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها معنقة متقابلة قلبية الشكل، نصلها مستطيل الزناد خلي الصفحة المتصعجة المستعرضة التنسبن. أزهارها كبيرة القد، معوجة القنأة، فائضة الاطراف الخامسية التفريخ. قناتها إلى البياض الاصفر المولج يملو تنمش اخضر واجر، اطرافها مويجة بالبنفسجي يملو موالج ارجواني. ثمارها غرطونية الشكل تطول نحو ١٥ سم. || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٦١٨٥ - **مَرْتِينِيَّة صَفَرَاءَ الزَّهَر** Martynia lutea (S), Martynie à fleurs jaunes, Bicornie jaune (F).
عشبة حولية زياه لزجة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها متقابلة، معنقة، قلبية الشكل، مستديرة الطرف. نصلها خلي البشرة مسن الخافه. أزهارها عبقودية التجميع مذهية اللون يملوها عند انتشاهها موالج احر || أزهارها يستمر طوال شهر آب.

٢٦١٨٦ - **مَرْتِينِيَّة عَطْرَة** Martynia fragrans (S), Martynie odorante, Bicornie odorante (F).
عشبة حولية زياه لزجة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها معنقة متقابلة ثلاثية القصوص. نصلها خلي الصفحة المتقاربة التنسبن. أزهارها عطرية، بنفسجية اللون، ارجوانية المشع، سنطلية التجميع. ثمارها تطول نحو ١٢ سم. أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٦١٨٧ - **مَرْتِينِيَّة كَفِيَّة** Martynia craniolaria (S), Martynie craniolaire, Craniolaire (F).
عشبة زراعية حولية زياه غدية تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها معنقة متقابلة كفية الشكل مسننة الحافة. أزهارها بياض اللون كبيرة القد تطول نحو ٨ سم. ثمارها كبيرة كرويس المصافير، غرطوية الزائدة. جدورها حنزابية الشكل، مأكولة ورتب.

٢٦١٨٨ - **مَرْت، مَرَس** Macération (F),
Maceration (E).
نقع جسم صلب في الماء او في سائل آخر ليلىن او لازابة بعض اجزائه الكيماوية.

٢٦١٧٢ - **مَرْتَقَق، حَمَادِم** Dominé, Servant (F).
المرتقق والمرتقق به. هو الذي عليه حق ارتفاق لعقار آخر.

٢٦١٧٣ - **مَرْتَقَق** Dominant (F).
العقار المرتقق او المخدوم هو الذي ينتفع من الارتفاق.

٢٦١٧٤ - **مَرْتَك، مَرْتَك، مَرْدَاسَنَج** Litharge, Protoxyde de plomb cristallisé (F), Li-charge (E).
هو بروكسيد الرصاص المنصهر المتبلور البرتقالي اللون.

٢٦١٧٥ - **مَرْتَكِبُ الْجُنَحَة، مَجْرَم** Délinquant (F), Delinquent, Offender (E).
هو الذي يرتكب فعلة يعتبرها القانون الجنائي جنحة يعاقب عليها.

٢٦١٧٦ - **مَرْتَنْسِيَّة *** Mertensia (S), Mertensie (F), Blue-bells (E), Lun-genwurz (D), Mertensia (I).
جنس نبات من فصيلة الحمحميات معقود التعريف باسم العليبيب مرتس (١٧٦٤-١٨٣١). أنواعها المعروفة ١٥، جميعها عشبية معمرة. اعطائها البلاد المتدلة الحرارة. أوراقها كاملة متقابلة. نصلها موشة بنده شفافة. أزهارها عبقودية التجميع. تويجات أزهارها انبوبية الشكل. اشهر انواعها الزينية ما يلي.

٢٦١٧٧ - **مَرْتَنْسِيَّة لُجْبَانِيَّة** Mertensia echinoides (S), Mertensie vipérine (F).
عشبة من المرتنسية تملو نحو ٤٠ سم. ساقها وفروعها مزقية للحاء. أوراقها سنائية الشكل، نصلها خلي البشرة حل سفحيت. أزهارها كثيفة التجميع متوسطة القد لونها إلى الزرق العابقة || أزهارها يستمر من ايار إلى حزيران.

٢٦١٧٨ - **مَرْتَنْسِيَّة سِيْبِيرِيَّة** Mertensia sibirica (S), Mertensie de Sibérie (F).
عشبة عشوشية من المرتنسية تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها سرسة. أوراقها قلبية الشكل معنقة، نصلها ناعم النسيج المتجمع. أزهارها بنفسجية اللون منتصبة. أزهارها يستمر من ايار إلى تموز.

٢٦١٧٩ - **مَرْتَنْسِيَّة عُنْكَوَلِيَّة** Mertensia paniculata (S), Mertensie paniculée (F).
عشبة من المرتنسية تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. ساقها وفروعها مهدبة للحاء. أوراقها سنائية النصل المستطيل الضيق. تنويرها عكوكلي التجميع بخلاف سائر أنواع جنسها. أزهارها إلى الزرقه الليلية. تويجها خلي الصفحة، مسن الخافه. أزهارها يستمر من ايار إلى حزيران.

٢٦١٨٠ - **مَرْتَنْسِيَّة فِيرْجِينِيَّة** Mertensia virginica (S), Mertensie de Virginie (F).
عشبة من المرتنسية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها وفروعها عريضة. أوراقها اهليلجية منطوية تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٥ إلى ٨ سم. أزهارها كبيرة القد متدلية، لونها إلى الزرقه الجميلة. أزهارها يستمر من اذار إلى حزيران.


٢٦١٨١ - **مَرْتَنْسِيَّات** Martyniaceae (S),
Martyniacées (F), Martyniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات. اجناسها وانواعها قليلة العدد، اشهرها المرتينيتية.



مرتنية



مرتنية



مرآة

Pageau, Pagel (F).

٢٦٢٠٠ - مرآة

هو الفريدي، جنس سمك من فصيلة الاسبوريات .

Zoanthaires (F).

٢٦٢٠١ - مرآة زهرية

Zoantharia (E).

رنية حيوانات بحرية عديدة الفصائل والاجناس . جميعها
جسدية الافراز كالمرجان، مداخلها فسيحة الاجزاء تتكون
منها الشعاب والمستمرات والجزر .

Coralliaires (F).

٢٦٢٠٢ - مرآة ليايات

شعبة حيوانات بحرية من صف المحرقات .

Berberidopsis corallina (S).

٢٦٢٠٣ - مرآة ليايات

Berberidopsis coral (F).

جنية ترينية معمرة من فصيلة النضيات . ساقها سريعة
الفروع متسلقة تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها
ايدة، متعاقبة، متعق، قلبي الشكل . نصلها جامد
الصفحة الالامه ، مدبب التسنين الشالك . انزهارها عنقودي
التجميع ، طرفي الارتكاز . انزهارها تساعية البتلات والفصل ،
سباعية الاسدية ، مرجانية اللون ، كروية الشكل ،
متدلية || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

Coralline (F).

٢٦٢٠٤ - مرآة ليايات

عشبة تدعى ثور الماء ، اطبله .

Chaudière, Cuisleur,

٢٦٢٠٥ - مرآة ليايات

Ebullanteur (F). Copper, Boiler (E).

قدر كبير من النحاس او الحديد يغل في الماء .

Fronde (F). Sling (E).

٢٦٢٠٦ - مرآة ليايات *

هي الصفحة السفلى من نصل ورقة السرخس حيث توجد
الحفاق . وقد تستعمل بصيغة الجمع فتدل على مجموعة
الصفحات السفلى من اوراق السرخس الواحدة .

Praticulture (F).

٢٦٢٠٧ - مرآة ليايات *

المروجة علم يبيث في زراعة المروج والمراعي .

Praticole (F).

٢٦٢٠٨ - مرآة ليايات *

نعت تعريفية يطلق على كل حشرة او طائر او حيوان
مأواه المروج .

Emerginula (S).

٢٦٢٠٩ - مرآة ليايات *

Emerginule (F). Emerginula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الاجرل
امانيات الخياشيم الحلقية وقصيلة الصديديات . انواعها
المعروفة نحو ١٠٠ منها ٤٠ منتشرة في بحار البلاد المعتدلة
الحرارة . تعيش على الصخور قرب الشطوط || اصداها
شبه مخروطية الشكل ، مضلفة السطح الهززة اقلية ،
شبه بيضية الشكل ، قطرها من ١ الى ٣ سم . || اجسامها
رسمية الاربدة القضاضة ، صغيرة
الرؤوس ، كبيرة العين الجاحضة القائمة على قواعد اللواس
الخارجية . لواسها قصيرة ، مخروطية . ارجلها وحيدة
مستعرضة ، ملوكة بزوائد انبوبية الشكل .

Epler (F). To ear (E).

٢٦٢١٠ - مرآة

مرح الزرع : خرج سنبله .

Etagère (F). Whatnot (E).

٢٦١٨٩ - مرآة

رف مستقل لا يستند الى حائط ، ج مرآة .

Couvolo (F).

٢٦١٩٠ - مرآة ، محضن

Incubator (E).

عش في سلة او في صندوق وما اشبه ترخم فيه الدجاجة
الرفقاء حضنها . وهو ايضا يتجمع فيه الحواضن والحضنات .

Nex (F). Nose (E).

٢٦١٩١ - مرآة

المترن والمترنم الانف وقد كثر اسناده الى الحيوان .
ج مرآة .

Faire paltre (F).

٢٦١٩٢ - مرآة

To graze, to feed, to tend (E).

مرج الدابة : ارسلها رعى في المرح .

Prairie (F).

٢٦١٩٣ - مرآة

Meadow, Grass-land (E).

ارض نسبية معشوبة ينبت فيها العشب طويلا او يزار
وتمرج فيه الماشية او يحش ويغلف . نباتاته مختلفة
وعديدة اشيعها من القطنيات والنجيليات . والمرج قد
يكون :

Prairie artificielle (F).

مرآة صناعية

Artificial meadow (E).

ترتكز اعشابه على القطنيات كالبرسيم والفصة والباقية . . .

Prairie naturelle, Pré (F). Meadow (E).

مرآة طبيعية

وهو المرج المعروف بالرعى او المنتجع .

Prairie temporaire (F).

مرآة وقتية

Temporary meadow (E).

هو الذي لا يبقى اكثر من بضع سنوات وتكون اعشابه
من النجيليات والقطنيات .

Pré-verger (F).

٢٦١٩٤ - مرآة ليايات

Orchard-meadow (E).

مرج طبيعي غرس فيه شجر مشمر كالاجاص والتفاح
للاستفادة من العشب والثمار معاً .

Piézographe (F).

٢٦١٩٥ - مرآة ليايات

Piezograph (E).

المراجا جهاز يستعمل في قياس القوى الاهتزازية وضغطها .

Faneuse (F). Hay-making (E).

٢٦١٩٦ - مرآة ليايات

اداة تستعمل في تقليب الاعشاب المحشوة اجتناباً لملها
وتجفيفها في جفافها .

Sonde (F).

٢٦١٩٧ - مرآة ليايات

هو السبار ، اطبله .

٢٦١٩٨ - مرآة ليايات *

Séismographe, Sismographe, Trommètre (F).

Seismograph, Tromometer (E).

آلة تسجل الهزات الارضية بما في ذلك مدة الزلزال وصفه .

Corail (F). Coral (E).

٢٦١٩٩ - مرآة ليايات *

حيوان بحري من المنح المحرقات وهو من الحيوانات الركية
التي تعيش راحة على صخور واعشاب القاع . افرازها جمعي
عديدة الالوان يكثر فيه الاحمر الوردى (المرجاني)
من عايق وباهت . والاسود والابيض . اما الابيض
فنادر الوجود .

مرآة

2٦٦٣٢ - مِرْدُون Mouche des narcisses (F).

حشرة من الذباب مشهورة باسم سرفيد التبرجس .

2٦٦٣٣ - مِرْدَر Vanne (F). Sluice, Water-gate (E).

2٦٦٣٤ - مِرْدَر Oviscapte (F). Oviscapt (E).

جهاز متع السرة أو الممكن في بعض الحشرات، ويصنع أفرته، أطليها .

2٦٦٣٥ - مِرْدَر حَاقِن Pal Injecteur (F).

Injecting tube (E).

أداة تحقق بها التربة لافراش شئ اغصنها التطهير والتسميد للملحي المائع .

2٦٦٣٦ - مِرْدَرَاغ * ، مِرْطَاب ، مِرْطَب ،

مِقْيَاس الرُّطوبَة Hygromètre (F).

Hygrometer (E).

أداة تستعمل في معرفة الرطوبة الجوية أي كمية بخار الماء الموجودة في الجو بالنسبة إلى درجة الحرارة .

2٦٦٣٧ - مِرْدَرَاغ شَعْرِي ، مِرْطَاب شَعْرِي

Hygromètre à cheveux (F).

مِرْدَرَاغ يرتكز على تمدد وانكماش الشعر الذي يتأثر بالرطوبة

2٦٦٣٨ - مِرْدَرَاك * Balance de précision (F).

هو ما يدعونه ميزان الدقة لانه دقيق التركيب يتأثر بكسور المليمترام .

2٦٦٣٩ - مِرْدَرَة Circus (S).

Busard (F). Buzzard (E).

جنس طير من عمارة المِرْزَات وفصيلة الصقريات، أنواعه عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم، جميعها من الكواسر التي تقتنص القوافض والجذران والعصافير والمظاء والحشرات. أجسامها متوسطة الحجم، طولها يراوح من ٤٠ إلى ٦٠ سم. اجنحتها وأرجلها وأذناها طويلة. أنوفها إلى البعثة المرقطة. تدنث في الأشجار الحرجية الباسقة أو على الحضيض وفي أوقاب الصخور. أناتها تحضن من ٣ إلى ٤ فرائد مدة ٤ أسابيع || أشهر أنواعها الأربعة التالية .

2٦٦٤٠ - مِرْدَرَة البَطَاح * Circus strigiceps (S).

Busard blafard, B. des steppes (F). Pallid harrier (E).

طائر من المِرْدَرَة صغير الجثة، أحمر اللون المرقط بالأسمر، أسود المنسر، أحمر العينين والرجلين. وهو من القواطع يألف السبب والبطاح، قوته الزحافات من مظاء ومحيات ودويبات وبعض الحشرات .

2٦٦٤١ - مِرْدَرَة الدَجَاج * ، صَقْر الفِرَاق

Circus cyaneus (S). Busard Saint-Martin (F). Hen harrier (E).

طائر من المِرْدَرَة، متوسط القد طويل الجناحين والرجلين والذنب. ثوبه إلى البعثة المرقطة بالأسمر، وهو أسود المنسر، أصفر العينين والرجلين. يصيد القوافض والعصافير والفسفاد والمظاء والحشرات وفراخ الدجاج. يدنث وكته على الحضيض بين القصب والفرار .

2٦٦٤٢ - مِرْدَرَة المَنَافِع * ، دَرَاغ

Circus ceruginosus (S). Busard des marais, B. har-

paye, B. des roseaux (F). Marsh harrier (E).

طائر من المِرْدَرَة، كبير الجثة طوله يراوح من ٥٥ إلى ٦٠ سم. ثوبه إلى الصبغة المرقطة. وهو من القواطع يألف

كيرتزان. زباناها غطيان. ظهراتها لا يلحف كامل البطن. يعلتها مستطيل السمكة الشرجية المدنية الطرف || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملة في أواخر نيسان وتعيش حتى أواخر آب. تشرج في النهار. تسلف في تموز || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموري طولها نحو ١٢ سم. جسمها مبطل الشكل، مستطيل المقدم، سداسي الرواجب، ضخم الرأس، ضلع التأثير الفكية، أحمر اللون، يسود في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينتهي تحت اللحاء طليقاً من كل غلاف .

2٦٦٢٩ - مِرْدَلِيَّات * Mordellidae (S).

Mordellidés (F). Mordellidae (E).

فصيلة حشرات واسعة من رتبة غدييات الاجنحة || اجناتها وأنواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الحارة. غشائها تألف نباتات الفصيلة الخيمية . يرقها دائمة تعيش على المواد النباتية السائرة نحو الانحلال || جميع حشرات صغيرة القد قلما يتجاوز طولها ١٠ م. أجسامها لاقياسية الشكل . اغمادها لا تلحف بطونها الزناطرة المستطيلة المدنية الاطراف الشرجية . زباناتها عيطة، مستطيلة، مركبة من ١١ فصلة . ارساغ جرابها الخلفية رباعية المقل اما ارساغ الجراب الوسطى والامامية فغاسية || أشهر اجناتها المردلة والزحلوقة والبريشة .

2٦٦٣٠ - مِرْدَن ، مِرْدَن * Quenouille (F).

Distaff (E).

شكل من اشكال الهيكلية المتبعة في تشذيب بعض الاجنار الشجرة والثرينية || والشكل المردني يكون اضيق قاعدة وجسماً من الوشي وأكثر ارتفاعاً .

2٦٦٣١ - مِرْدَرَة البَرَقُوق * Odonestis pruni, Gastropache pruni (S).

Odonestis du prunellier, Bombyx du prunellier (F).

Odonestis pruni (E).

حشرة من فصيلة اللجفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اربوة . فراشتها صيغة تميش على غزونها الامدائي . سرقها تعيش على اوراق البرقوق والزعرور والاجاص ... || جسمها مستطيل مكرن يطول نحو ٢١ م. بعلتها من ٤٤ م. رأسها حنطي اللون . عيناها كيرتزان . زباناها مشطيان . مرقها جعدة . جوشها وبعثها الى الحنطي الاكلث || روضها الاماميان الى الحنطي الاكلث ملوحة حارة وغض مرقص اسمر ونقطة وسطى بيضاء . روضها الخلفيان الى الحنطي الافتح . ادهابا الى الشقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرائد في تموز . تشرج من الغروب الى الفجر في اليالي المقمرة . تماثل بد ظهورها بنحو اربعة ايام وتتحس المنك لعلها على لحد الجذور والانصاف || السرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٤ م. جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الحنطي الاسمر المواج يعلون في الرأس الى الشرج خط عريض من الملب القصير تتخلله منه كل مفصل حديي غمة من الملب المستطيل . مدنها وشرجها ورواجبها كاسية . شرجها ينتهي بزايدة صغيرة مثلولية الشكل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي تحت القشور وبين اللحاء ضمن صلجة يعلها غشاء كالنخاعة اغبر اللون .



مردولة البرقوق



مِرْدَرَاغ



مِرْدَرَاك



مِرْدَرَة البَطَاح



مِرْدَرَة الدَجَاج

٢٦٢٥٤ - مرسوم Décret (F). Decree, Order (E).
هو كل قرار يوقمه رئيس الجمهورية. وتختلف اسماء
المراسم باختلاف موضوعاتها فتكون جمهورية وحكومية
وعامة وتنظيمية وخاصة.

٢٦٢٥٥ - مرسوم قانون Décret-loi (F).
Order in council (E).
هو كل نص تشريعي يصدره رئيس الدولة في أثناء غياب
المجلس النيابي ويكون نافذاً كالقانون بشرط موافقة المجلس،
عند انعقاده، عليه.

٢٦٢٥٦ - مرسونية Marssonina, Marsonia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرففيات. يتميز بكتائله
الشفاة الثنائية الخلية البيضية الشكل أو المستطيلة المنعقفة.
يركب الاوراق فيلطحها. قصاته ادمية الارتكاز تصدع
البشرة || انواعه عديدة لكنها قليلة الاذى. اعرفها مايلي.

٢٦٢٥٧ - مرسونية البرسيم *
Marssonina medicaginis (S).
فطر مجهرى من المرسونية يصيب البرسيم والقصة والتفل
في سوقها واوراقها. مظهره الخارجى بثور صغيرة لا قياسية
الشكل، حنطية اللون، سمراء الاطار، تركيب السوق
والاوراق فتؤذيها || يكافح بالخش عند ظهور الوصم
ومنهم من سرح الماشية في المقاضب لترعاها.

٢٦٢٥٨ - مرسونية التامول *
Marssonina betulae (S).
فطر مجهرى من المرسونية يصيب التامول في اوراقه.
مظهره الخارجى بثور صغيرة مستديرة شقراء اللون حنطية
الاطار لا قياسية الترتيب تركيب نصل الاوراق عسل
صفحاتها العليا || اغصانه زهيدة لا تستوجب المكافحة.

٢٦٢٥٩ - مرسونية الحور *
Marssonina populi (S).
فطر مجهرى من المرسونية يصيب اوراق الحور ويعملها.
مظهره الخارجى بثور متتابعة طحلاء اللون جزئية الاطار
تركيب نصل الاوراق وقد تشاهد برمتة قشيب الذبول
والاحبال.

٢٦٢٦٠ - مرسونية الخس *
Marssonina panattoniana, M. perforans (S).
فطر مجهرى من المرسونية يصيب الخس فيؤذي. مظهره
الخارجى يقع مستديرة لوها الى السمرة قطرها من ٢ الى
٣ سم. ثلثو مبرئة على صفحات نصل الاوراق الخارجى
ثم تمتد وتتلاقى وتركيب الاوراق الواحدة تلو الاخرى
حتى الساق || يكافح بقتلح النباتات الموصومة وينفخ
النباتات الباقية بحلول كبريتات النحاس او سائل بورود
الحديد المركز ٠.٨ % || ومن الواجب تطهير البذار قبل
استعماله بواسطة الاغصن المكنكى (Vert malachite)
المركز ١ %.

٢٦٢٦١ - مرسونية الصفصاف *
Marssonina salicicola (S).
فطر مجهرى من المرسونية يصيب اوراق بعض انواع
الصفصاف. مظهره الخارجى يقع لا قياسية الشكل والحجم،
مسنة الاطار، حنطية اللون، تركيب نصل الاوراق
فتبدو كالبيثور الراضعة || اغصانه زهيدة لا تستوجب
المكافحة.

المنافع والبحيرات ويجاري الماء. قوته القواضم والطيور
المائية والصفاف.

٢٦٢٤٣ - مرزة زمداء، عقيب
Circus cinereus (S). Busard cendré, B. de montagne
(F). Montagn's harrier (E).
طائر من المرزة، متوسط القد، اريد الثوب المتباد الرقطة،
اسود المنسر، اصفر العينين والرجلين. وهو من القواطع،
يألف الجبال والمنافع والبحيرات وشطوط الانهار. قوته
العطاء والصفاف والحشرات.

٢٦٢٤٤ - مرزة Rizière (F). Rice-plantation (E).
هي محملة الارز او الارض المغروسة رزاً.

٢٦٢٤٥ - مرزح، مسالك، مشحط
Charasson, Echalas, Etaçon de vigne, Pisseau (F).
Vine-prop, Vine-stick, Stay, Shore (E).
مستد يستعمل لدم الكرمية او لرفعها عن التربة.

٢٦٢٤٦ - مرزوم، مرزوم
Flamant (F).
Flamingo (E).
هو النحام من طير الماء، طويل الرجلين والمتق، اعوج
المنقار، في اطراف جناحيه سواد، اطلب نحام.

٢٦٢٤٧ - مرزوم
الميرزسان نجمان مع الشعيرين.

٢٦٢٤٨ - مرزوم الذراع
مرزوم الذراع نجم تير يعرف ايضاً بالذراع المبسوطة، اطلبه.

٢٦٢٤٩ - مرزويات
Busards, Circlens, Circlins
عار طير من فصيلة الصقريات. انواعها عديدة تتميز
بقدها الرشيق الاهيف. مناسرها قصيرة عجبة. سواطيلها
مستطيلة. اذناها صيقة. ارساغها مستدقة معتدلة الطول.
غالبها عامرة || اعطائها الماء. تألف الاماكن الرطبة.
قوتها القواضم والزحافات والحشرات.

٢٦٢٥٠ - مرستب
Précipité (F).
Precipitate (E).
المرسب والراسب واحد.

٢٦٢٥١ - مرستوميات
Mérostomes (F).
Merostoma (E).

صف من المفصليات المتحجرات ورتبة ممدبات الاجنحة.
بين القشريات والعنكبوتيات || من هذا الصف يوجد
رتبة واحدة ماصرة تدعى مروديات الاذناب.

٢٦٢٥٢ - مرستج *
Amphicoma (S).
Amphicome (F).
جنس خنافس من فصيلة العمليات ورتبة ممدبات الاجنحة.
انواعه عديدة، اعطائها الفرق الاسط. اجسامها متوسطة
القد زياء. رؤوسها قصيرة. قرونها الاستشعارية صفيحية
التركيب. ارساغها خاسية الفصل. اناثها اكبر قدماً من
ذكورها || تعيش على بتلات الانهار والاوراق الغنية.
رقاقها مقوية الشكل، سداسية الارجل تعيش في التربة
على المواد العضوية والنباتية السائرة الى الانحلال.

٢٦٢٥٣ - مرستن
Nex des solipèdes (F).
Nose of soliped (E).
المرستن هو انف ذوات الحافر.



مرزة المنافع



مرج



مرسونية البرسيم

Robot (F). Robot (E). ٢٦٢٧٤ - مَرُؤِنَةُ ٥

جهاز آلي يقوم مقام الانسان في اجاز بعض الاعمال .

Parasité ٢٦٢٧٥ - مَرُؤِنُونَ ٥

٢٦٢٧٦ - مَرُؤِنَةُ الْجَوَائِثِ

Observatoire météorologique (F). Meteorological observatory (E).

مكان مجهز بالعدة اللازمة لرصد العوامل الجوية .

Adhérent (F). ٢٦٢٧٧ - مَرُصِقُ ٥

يقال جوز مَرُصِقٌ ومَرُصِقٌ اذا تمدد خروج له .

Maladie (F). ٢٦٢٧٨ - مَرَضٌ ، وَصَمُ ٥

Illness, Diseases (E).

انحراف صحي سببه تقاوس الضوء عن القيام بوظيفته على الوجه الاكل || الاوصام التي تصيب الحيوان والنبات عديدة منها داخلية وخارجية وطفيلية وميكروبية . الخ .

٢٦٢٧٩ - مَرَضُ الْبُطُورِ السَّارِي ، دَرْمِيتُ

Dermite (F). Poli-evil (E).

وصم سار يصيب الخيل والبقرة .

Lépidorhose (F). ٢٦٢٨٠ - مَرَضُ الْحَرَاثِفِ ٥

Lepidorrhosis (E).

وصم جرثومي يصيب الاسماك بجراحها .

٢٦٢٨١ - مَرَضُ الْخُرْبِزَاتِ

Coccidiose, Maladie du gros ventre (F).

وصم جرثومي يصيب الارنب خاصة والطيور الداجنة صفة .

Bleime (F). ٢٦٢٨٢ - مَرَضُ الصَّحْنِ ٥

Sand-crack (E).

وصم يصيب باطن حافر الخيل .

٢٦٢٨٣ - مَرَضُ الظِّلْفِ ، تَعَقُّنُ الظِّلْفِ

Necrosis bacillaris (S). Piétin (F). Foot-rot (E).

مرض معد يصيب اطراف الضأن .

٢٦٢٨٤ - مَرَضُ الْفُطْرِ الشَّعَاعِيِّ

Actinomycose (F). Actinomycosis (E).

هو الحاروش وصم يصيب المواشي وينتقل الى الانسان . سببه الفطر الشعاعي . مظهره قباب في الفك واللسان . عوارضه هزال وضعف وحى وانخفاض في الوزن . وقد يمتد الى اشحاء الحيوان وظلمة بجلده .

٢٦٢٨٥ - مَرَضُ الْقُمَّلِ ٥

Phtiriase (F).

Pthiriasis (E).

كل مرض جلدي سببه الحشرات من قمل وقراد...

٢٦٢٨٦ - مَرَضُ الْمُتَمَتِّعَاتِ

Spirilliose (F).

Spirillosis (E).

وصم ينشأ عن وجود المتتمعات في الدم .

٢٦٢٨٧ - مَرَضُ بَكْتِيرِي ٥

Maladie bactérienne (F). Bacterial illness (E).

كل مرض سببه البكتيريا .

٢٦٢٨٨ - مَرَضُ جِلْدِي ، دَرْمَتُوزُ

Dermatose (F). Skin disease (E).

تعبير شامل يطلق على جميع الاوصام الجلدية مما كان سببها .

٢٦٢٩٢ - مَرُؤِنِيَّةُ الْقَيْبِ ٥

Marssonina acarina (S).

فطر مجهري من المرسونية يصيب اوراق القيقب وقد يمتد الى الافنان والافناد . مظهره الخارجي بقع صغيرة مقرنة الزوايا تبدو سمراء اللون ثم تتحول نحو الصبغة البيضاء . تركب نصل الوراق ولحاء الافنان والافناد . اغراضه زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٦٢٩٣ - مَرُؤِنِيَّاتُ

Merciérées (F).

سبط من فصيلة الجربسيات يشمل الكثير من الاجناس والانواع معظمها بري وبعضها زراعي زينة .

٢٦٢٩٤ - مَرُؤِسِيَسُ

Peuplier de l'Euphrate (F).

هو الخور الفراتي الجميل الشكل ، اطلبه .

٢٦٢٩٥ - مَرُؤِيلَةُ ٥

Marsilea (S).

Marsilée, Marsille (F). Marsilea, Nardoo (E).

Marsille, Kleoforn (D). Marsilea (I).

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة المرسيليات ، انواعها قليلة العدد . سوقها جذمورية مدادة تنسج في الماء . جذورها نخيلة تنمو في السيل تقابلها اوراق مستطيلة الزناد رباعية الوريقات المتقابلة الطافية على سطح الماء . اشهر انواعها :

مرسيلة السنغال ٥

Marsiles senegali (S).

Marsilée pygmée (F).

Marsiles aegyptiaca (S).

Marsilée d'Egypte (F).

٢٦٢٩٦ - مَرُؤِيلِيَّاتُ ٥

Marsileaceae (S).

Marsiliacées, Marsiliacées (F). Marsileaceae (E).

فصيلة نباتية من المتغيرات . اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها اشباح جذمورية مدادة تعيش في اسماح المياه للقليلة النور .

٢٦٢٩٧ - مَرُؤِسِيَنُ ، مَرُؤِسِيَنُ ٥

Myrte commun (F).

هو الآس الجوي ، اطلبه .

٢٦٢٩٨ - مَرُؤِسُ ٥

Terre Imperméable (F).

Impervious earth (E).

هي الارض المسكبة التي اذا امطرت سالت سريعا ،

ج مروض وامراض .

٢٦٢٩٩ - مَرُؤَسَاءُ ٥

Stérile (femelle) (F).

Sterile (female) (E).

المقور من كل حيوان .

٢٦٣٠٠ - مَرُؤَسَادُ ٥

Robotologue (F).

Robotologist (E).

من تعامل المرشدة .

٢٦٣٠١ - مَرُؤَسَةٌ * ٥

Arrosoir (F). Watering-pot (E).

وعاء لاسقاء بالرش .

٢٦٣٠٢ - مَرُؤَسَدَةٌ ٥

Robotologie (F).

Robotology (E).

المرشدة علم يبحث في تطوير الاجهزة الآلية وتمكينها من

اجاز ما يقوم به الانسان من اعمال .

٢٦٣٠٣ - مَرُؤَسَتٌ ، مَرُؤَسَتٌ ٥

Suoir, Trompe d'insecte (F). Sucker (E).

جهاز ابروي ثاقب يمكن الحشرات من ارتشاف السوائل .



مرسيلة



مرشة

٢٦٣٠٣ - مِرْعَاوِيلَا شَرِيفِيَّة

Echinops tournefortii (S). Boulette de Tournefort, Echinope de Tournefort (F).

عشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. سوقها هليبية اللحاء، حلها خيطي مستطيل أكثره أبيض اللون وبضه احمر. اوراقها جامدة النصل الخامسي التفريش، الشائك الحافة. ازهارها وردية وبض، ورؤسائها متوسطة القد.

٢٦٣٠٤ - مِرْعَاوِيلَا لَرَجِيَّة

Echinops viscosus (S). Boulette visqueux, Echinope visqueux (F).

عشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع الغدية اللزجة. اوراقها كثيرة القد، قلبية التفريش، زغبية النصل الغدي اللزج، شائكة الحافة. ازهارها غبراء اللون، ورؤسائها صغيرة الحجم.

٢٦٣٠٥ - مِرْعَاوِيلَا وَضِيْعِيَّة

Echinops humilis (S). Boulette humble, Echinope humble (F).

عشبة معمرة قليلة الفروع تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها قطنية البشرة على صفحتها. ازهارها زائفة الزرقة، قطر الرؤسية نحو ٤ سم.

٢٦٣٠٦ - مِرْعَاة

Porzana (S).

Porzane (F). Porzana (E).

المرعة. ج. مرع. جنس طير من دجاجيات الماء وفصيلة التفلقيات، أنواعه المعروفة ١٦ جميعها من طيور العالم القديم. اجسامها متوسطة القد وصغيرة. اثوابها الى الصهبة الخطئية يعلوها رتقن ابيض وتبيح اسود || اعطائها تمتد من الحند الى اربعة الى الصوائل الى مراكز. معظمها من القواطع يحوب مناطق البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي. أحرف أنواعها وأشهرها المرعة الشائعة.

٢٦٣٠٧ - مِرْعَاة شَالِيْعَة * ، مِرْعَاة مِرْوُطَة

Porzana maruette (S). Porzane marouette, Marouette (F).

طائر من المرع، قدره قدر السباقي، ثوبه الى الصهبة الخطئية السمر المواج، رأسه منمش بالابيض. زوره ويطنه الى البياض الناصع. صدره الى الطحلة الخطئية المواج. ظهره اسود التبيح ابيض الحثار. جناحه مجذع بالاعبر. منقاره جالس الازتكاز، اسمر القاعدة، احمر الطرف. ساقه الى الخضار الاسفر || يألف المناطق وضفاف البحيرات والانهار. قوته الحشرات والبراغ وبزور النباتات المائية. مرتع من الغروب الى الظلمة ومن الضحى الى الفجر. يدن شته وسط جم السعادي. اثناء تحضن نحو ١٢ بيضة.

Chèvre d'Angora (F).

٢٦٣٠٨ - مِرْعِز

هو ماعز انقره، اطلبه.

Prairial (F). Meadow (E).

٢٦٣٠٩ - مِرْعَوِي ٥

Embouche, Gagnage, Herbage (F). مِرْعَوِي

Pasture-land, Rich meadow, Grass-land (E). مرج طبيعي تسوم الماشية اعشابه.

Clio (F).

٢٦٣١١ - مِرْعَوِي الحُوت

جنس حيوانات بحرية من الرخويات تدعى عروسة، اطلبها.

Hygrophyte (F).

٢٦٣١٢ - مِرْعَاهَد ٥

نمت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو في المواقع الرطبة.

٢٦٢٨٩ - مِرْعَض دُودُ الْأَمْعَاء Helminthiasis (F).

Helminthiasis (E).

هو الملمستياز، وصم تسببه الديدان في الأمعاء.

٢٦٢٩٠ - مِرْعَض سَابِي، مِرْعَض وَيْسَل، وَيَاء

Maladie Infectieuse (F). Infectious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدوى من حيوان الى آخر.

٢٦٢٩١ - مِرْعَض فَطْرِي

Maladie cryptogamique (F). Cryptogamic disease (E).

كل مرض تسببه الفطور، مجهرية كانت او غير مجهرية.

٢٦٢٩٢ - مِرْعَض مُعْدِي Maladie contagieuse (F).

Contagious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدوى من فرد الى فرد.

٢٦٢٩٣ - مِرْعَضِي ٥ Sialagogue (F). Sialogogic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تسبب افراز الرضاب.

٢٦٢٩٤ - مِرْعَضَاخ، مِرْعَضَخَة Concasseur (F).

هو الجاروش، اطلبه.

٢٦٢٩٥ - مِرْعَطَاب، مِرْعَطَب Hygromètre (F).

هو المرزاق، اطلبه.

٢٦٢٩٦ - مِرْعَطَاب شَعْرِي Hygromètre à cheveux (F).

هو المرزاق الشعري، اطلبه.

٢٦٢٩٧ - مِرْعَطِيش، مِرْعَطُوشَة Améthyste (F).

هو الكركمان، اطلبه.

٢٦٢٩٨ - مِرْع

مرع ومرع المكان : اخصب بكثرة الكلا.

٢٦٢٩٩ - مِرْعَان Clématite toujours verte (F).

هو الملحى المنمي، اطلبه.

٢٦٣٠٠ - مِرْعَاوِيلَا * ، شَوْك الْجِمَال

Echinops (S). Echinope, Boulette (F).

جنس نباتات برية عشبية من فصيلة المركبات الانبوية الزهر. انواعه عديدة منها الحولية والحولة والمعمرة. سوقها قرماء. اوراقها كثيرة القد شائكة النصل. ازهارها رؤسية كروية الشكل || اعرف انواعها وأشهرها ما يلي:

٢٦٣٠١ - مِرْعَاوِيلَا زَرْقَاء Echinops ritro (S).

Boulette azurée, Echinope azuré (F).

عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها كثيرة القد فلقية التفريش. نصلها اخضر الصفحة العليا المائلة، ابيض السفل الحليية، شائك الحافة. ازهارها زرق. قطر الرؤسية براوح من ٣ الى ٤ سم.

٢٦٣٠٢ - مِرْعَاوِيلَا شَالِيْعَة ، شَوْك الْجِمَال

الشائع، رعي الإبل، سَكَاثِي

Echinope commun (F).

نوع من المرعاويلا، مشهور باسم رعي الإبل، اطلبه.



مرعاويلا



مرعة شائعة

٢٦٣١٣ - مرغفة

المرغفة والمرغ : الروضة الكثيرة النبات .

٢٦٣١٤ - مرغوفد الياسمين

Margarode du jasmin, Pyrale du jasmin (F).

فرشة من المرغوفيات وفصيلة الناريات مشهورة باسم نارية الياسمين ، يرتقا مؤذية .

٢٦٣١٥ - مرغوفيت

Reine Marguerite (F).
Queen Margaret (E).

نبت تزيني حولي يعرف بالخنكار ، اطلبه .

٢٦٣١٦ - مرغوفين

Margarine
زبدة صناعية مركبة من ادهان نباتية مع شحم البقر .

٢٦٣١٧ - مرغوف

Marcgravia (F).

جنس نباتات برية وتزينية عارشة من فصيلة المرغوفيات . منبتها اللطوي بعض مناطق امريكا الاستوائية || انواعه المعروفة قليلة العدد منها السريعة ومنها المتسلقة المزهر اوراقها مزدوجة الشكل ، ابيدة ، متعاقبة . ازهارها عتودي التجميع . ثمارها كروية ، جامدة ، حراء اللون .

٢٦٣١٨ - مرغوفيات

Marcgraviaceae (S).
Marcgraviacées (F). Marcgraviaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها متوسطة العدد . اعطائها بعض اصناف امريكا الاستوائية || نباتاتها متباينة الاشكال ، منها الاجبار والشجيرات والمتسلقات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، جامدة النصال المسنة الاطراف . ازهارها لاقياي التجميع منه الصيواني والعتودي والسنبلي ، جميعها مستطيلة المالحق . ازهارها لاقياية الحجم . كؤوسها لانظامية التركيب منها الثنائية الفصيل والثلاثية والحادية . عدد بتلات توجيها بمائل عدد الفصيل . جميعها ملونة . ثمارها كروية ، دواء ، جامدة القشور || اشهر اجناسها المرغف .

٢٦٣١٩ - مرغفة

Mérogonie (F). Merogony (E).
المرغفة اخصاب بويضة متشعبة بمحوي منوي .

٢٦٣٢٠ - مرغفي

Mérogonique (F).
Merogonic (E).

نعت تعريفية يطلق على كل ما له صلة بالمرغفة كقوك اخصاب مرغفي .

٢٦٣٢١ - مرغوفة

Prolifique (F). Prolific (E).
نعت تعريفية توصف به الانثى الكثيرة النتاج .

٢٦٣٢٢ - مرغول

Mergulus (S).
Mergule (F). Mergulus (E).

جنس طيور بحرية من فصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطائها مناطق الدائرة القطبية . لا تترك اللحم الا اليابسة الا في زمن الترخيم والعيالة . الرحالة القطبية تلحقها بطير الجليد || ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها وافرة العدد . قوتها الهوام والخشرات والدعابين والقشريات والاسماك الصغيرة || اشهر انواعه واعرفها واعما انتشارا المرغول القترم او المرغولة .

٢٦٣٢٣ - مرغول قترم ، مرغولة

Mergulus alle (S).

جسمها صغير القد ، يطول من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها معتدلا لجرم ، قصير المنقاد الاسود . حذقة منها كسنتية اللون . ذنبها مخروطي الشكل . قصير . رسغها الى السرة الصفراء المواج . ثوبها الصفي اسود الرأس والرداء والذنب والصفحة العليا من الجناح ، ابيض الصدر والبطن والصفحة السفلى من الجناح . اباهرها يبيض الاطراف . ثوبها الشتوي يتقلص فيه الاسود ليحل محله الاكعب || الانثى امير قدام الذكر وتحتل بنفس الثوب . موكلها نقرة بين حضور المحاجد . الانثى تخضع بمناوبة الذكر بيضة واحدة شبه اجاصية الشكل ، اصفر من بيضة الدجاجة . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع والصغير يمو على سطح الميم بعد التفق ياسبور .

٢٦٣٢٣ - مرغوي

Casarca (F).

هو الشهران ، طائر من الدجل مشهور باسم ابو فرقة .

٢٦٣٢٤ - مرغفي ، سينو بيري

Felis tigrina (S).
Margay, Chat tigré (F). Margay (E).

حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه بعض اصناف امريكا الوسطى والبرازيل . يألف الاحراج ولا يبتعد عن الماء حيث يكثر قتصه . ملجئه الحياتي غربي اي ان الذكر يكوم عدة اناث || جسمه اهيف القوام وشعرها يطول نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٨ سم . رأسه معتدل الجرم . اذنان صغيرتان ، مستديرتان كاسيتان . عيناه صغيرتان مكملتان . ثوبه الى الصهبة الصفراء يعلوها بتيجع وتندبر اسود . صدره الى الصهبة الغراء المشيرة بالاسود . بطنه الى الصهبة الخطية المرقشة بالاسر . ذنبه متتابع الاطراف السود || سرعه دجوي . يتسلق الاشجار بفعه ويعدو على الارض بسرعة . قوته الطير والجردان والفار والزحافات والفضاد .

٢٦٣٢٥ - مرغيط

Erodium à feuilles de bryone

هو الجراب الفاشري الورق ، اطلبه .

٢٦٣٢٦ - مرغاق

Gruie (F). Crane (E).

آلة رافعة ، تنهض الانتقال وتنقلها .

٢٦٣٢٧ - مرغاق

Élévateur (F). Elevator, Lift (E).

جهاز ثابت او نقال يستعمل في رفع وتنشيط البراميل والصناديق والبالات الخ .

٢٦٣٢٨ - مرغقي ، مرغقي

Coude (F). Elbow (E).

موصل الذراع من العنق . ج مرغقي .

٢٦٣٢٩ - مرغقي

المرقق نجم ثير من كوكبة سيوس .

٢٦٣٣٠ - مرغقي الثريا

مرغقي الثريا نجم من كوكبة الجبار .

٢٦٣٣١ - مرغقي

Coudé (F). Elbowed (E).

شكل من الزباني ، قائم الزاوية ، يشبه المرقق .

٢٦٣٣٢ - مرغفين ، مورفين

Morphine (F).
Morphia (E).

مادة شبه قلووية حذرة ومسكنة تستخرج من الافيون .



مرغول



مرغفي

Composante (F). **مُرْكَبَة** - ٢٦٣٤٩
Component (E). وهي قد تكون افقية أو رأسية .

Centre, Point central (F). **مُرْكَز** - ٢٦٣٥٠
Centre, Middle (E). هي نقطة الدائرة .

Centre de gravité (F). **مُرْكَز النِّقْل** - ٢٦٣٥١
Centre of gravity (E).

مُرْكَز الدَّائِرَة ، نُقْطَة الدَّائِرَة - ٢٦٣٥٢
Centre d'un cercle (F). Centre of circle (E).

Centre astatique (F). **مُرْكَز مُطْلَق** - ٢٦٣٥٣
Astatic centre (E).

Accumulateur (F). **مُرْكَم** - ٢٦٣٥٤
Accumulator (storage cell or battery) (E).

Pot (F). **مُرْكَن ، قَارُورَة** - ٢٦٣٥٥
وعاء من فخار تزرع فيه النباتات أو تستنبط ريشاً تنقل إلى مستقرها . ج مراكن وقوارير .

Investi (F). Invest (E). **مُرْمُكُون** - ٢٦٣٥٦
نعت تعريفى يطلق على الاموال ، اخصها غير التقديرة ، المملوطة لعمل ما أو لمشروع معين .

Merlus, Merluccius (S). **مُرْمُوش** - ٢٦٣٥٧
Merluche (F). Hake (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الفادسيات . اعطائها بحار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || اجسامها اهليجية . رؤوسها كبيرة . اشدافها مسلحة باسنان قوية هربية الشكل . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة الشكل ، خالية من المناسخ الشائكة || انواعها المعروفة اثنان المرلوش المبلول الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط والمرلوش الامريكى المعروف أيضاً بمرلوش الشيلي .

مُرْمُوش مَبْدُول * - ٢٦٣٥٨
Merluccius merluccius (S).

Merluche commune, Merlu (F). Common Hake (E).
نوع من المرلوش . سمكة بحرية بيوض مقررة نهمة يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط || سرها وافر العدد . مسرحها عرض البحر خارج المياه الاقليمية ، لا تقرب من المحاذي إلا في زمن التسرنة || جسمها شبه اهليجي الشكل ، يطول من ١٠٠ الى ١٣٠ سم . رأسها كبير الجرم . ثوبها الى الطحلة الغبراء السفءاء المواجه . غطها الجانبى اسود . بطنها الى الغيرة البهفاء || زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الشرجية واحدة || لحمها جيد الصنف . كبدوها وافر المادّة الزيتية الجيدة .

مُرْمَحُور - ٢٦٣٥٩
Amaraque (F). هو المروء ، اعطيه .

Germandrée ambrée (F). **مُرْمَحُور** - ٢٦٣٦٠
هو الطوريون الكوريون ، نبات عطري مدي مقو للأعصاب ومفيد لها . وهو منه وقابض ومضاد للتشنج .

Babine, Babouine (F). **مُرْمَة** - ٢٦٣٦١
Lip (pendulous) (E).
المرة والمرة : شفة البقرة وكل ذات ظلف لانها ترتم بها .

Barbe du blé (F). Beard (E). **مُرْق** - ٢٦٣٣٣
هي حسكة السنبله وتسمى سفا وشعاع . ج أمراق .

Puccinia **مُرْق** - ٢٦٣٣٤
وصم فطري يمتري النبات ويؤذيه ، اعطى سحام .

Progression (F). **مُرْقَاة** - ٢٦٣٣٥
هي التوالية وقد وضعها لانها تؤدي معنى التوالي والمزيد وهو المطلوب .

Uranomètre (F). **مُرْقَاع** - ٢٦٣٣٦
Uranometer (E).
جهاز يستعمل في تقدير المساحات الفضائية ان بين الكواكب او بينها وبين الارض .

Aplatisseur (F). **مُرْقَقَة** * ، **مُرْقَقَة** - ٢٦٣٣٧
Grain-crushing mill (E).
آلة لتريق الحبوب العلفية ، مركبة من اسطوانتين تدوران في اتجاهين معاكسين تسحق الحبوب التي تمر بينهما دون ان تكسرها .

Apode (F). Apod (E). **مُرْقَال** - ٢٦٣٣٨
هي الحشرة العديمة الارجل . ج مرقاليل .

Télescope (F). **مُرْقَب** * ، **رَاصِدَة** - ٢٦٣٣٩
Telescope (E).
آلة مجهزة لرصد كواكب الفلك وسياراته ونجومه .

Stalle (F). Stall (E). **مُرْقَد** - ٢٦٣٤٠
شفة الفرس الواحد في الاصطبل .

Pyrite (F). Pyrites (E). **مُرْقَشِيَّتا** - ٢٦٣٤١
هو كبريتور الحديد ويكون اصفر اللون او ابيض . راجع بيريت .

مُرْقَى عَشْرِي ، مَقْبَس عَشْرِي - ٢٦٣٤٢
Echelle décimale (F). Decimal scale (E).

Doseur (F). **مُرْمَكَاة** * ، **مُنْشَاع** - ٢٦٣٤٣
Doslmeter (E). جهاز المراكزة أو قياس التركيز .

Sarcloir (F). Spud (E). **مُرْمَكاش** - ٢٦٣٤٤
اداة لركش التربة ، يستعمل باليد .

مُرْمَكَب الفَرَس - ٢٦٣٤٥
مركب الفرس نيم ثير من كوكبة السفينة .

Composé (F). Composed (E). **مُرْمَكَب** - ٢٦٣٤٦

Multiple (F). **مُرْمَكَب** - ٢٦٣٤٧

Compositae (S) **مُرْمَكَبَات** - ٢٦٣٤٨
Composées (F). Compositae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة الغلظة سفلية الاسدية . تتميز من اكبر الفصائل النباتية ؛ انواعها عدة آلاف تجمعها ثلاثة اسباط : الشعاعية وانوبية الزهر . ولسينية الزهر . منها الاثمار والشجيرات والجنات والاعشاب . عصاريتها مألعة أو لينة . اوراقها متعاقبة أو متعاقبة .



مرقا



مرقب



مرلوش مبدول

٢٦٣٧٣ - مَرْمَرُوطُ الْقُطْب ، مَرْمَرُوطُ كَنْدَا

Arctomys monax, A. empetra (S). Marmotte monax, M. de Québec, Monax (F). Canadian marmot, Monax (E).

نوع من المرموط، موطنه يمتد من كندا إلى كليفورنيا. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ١٧ سم. وبره كثيف التجميع، متوسط الطول. ثوبه الى اللوحة السوداء، بطنه اصفر المراح.



مرموزة

٢٦٣٧٤ - مَرْمَرُوطُ بُولُونِيَّة

Arctomys bobac (S). Marmotte bobac, M. de Pologne, Bobac (F). Polish marmot, Bobac (E).

نوع من المرموط موطنه يشمل بلاد بولونية وغاليسيه وروسيا الجنوبية. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ٩ سم. ثوبه الى الصبغة. حنار عينيه الى السرة. طرف ذنبه الى السواد. وبره ليد التجميع متوسط الطول.

٢٦٣٧٥ - مَرْمَرُوطُ حِمَالِيَا

Arctomys himalyanus (S). Marmotte de l'Himalaya (F). Himalayan marmot (E).

نوع من المرموط، صغير القد، كثيف الوبر الناعم المتوسط الطول. موطنه جبالا حتى ارتفاع ٤٠٠٠ م. عن سطح البحر.

٢٦٣٧٦ - مَرْمَرُوطُ شَالَع *

Arctomys marmotta (S). Marmotte commune (F). Common marmot (E).

نوع من المرموط يعيش من ٩ الى ١٠ سنوات. موطنه جبال اوروبية. جسمه يطول من ٢٨ الى ٤٥ سم. وذنبه من ١٦ الى ١٨ سم. وزنه في الخريف قبل بيانه الشتوي يراوح من ٧ الى ٨ كيلو. ثوبه الى الصبغة الخفيفة يملؤها مراح صناعي يتنحرف الى الاجر العتيق مع استطالة العمر. رأسه وأطراف قوائم ذنبه الى السرة. اناء نضع جروين في اواسط شهر حزيران.

٢٦٣٧٧ - مَرْمَرُوطُ مَذْهَب

Arctomys aureus (S). Marmotte dorée (F). Golden marmot (E).

نوع من المرموط صغير القد كثيف الوبر الناعم. ثوبه الى الصبغة الصفائبة اللامعة. موطنه بعض جبال الهند والباير.

٢٦٣٧٨ - مَرْمَرِيَّة *

Meromyza (S). Meromyza (F). Meromyza (E).

جنس حشرات من فصيلة الخرباقيات ودية ذوات الجناحين. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة، هياها، تقوّل من ٣ الى ٦ سم. رؤوسها مكورة، عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشارية قصيرة، تنتهي بنسيلة دقيقة. ملاسها صفيرة. اعطائها معتدلة الجرم. كواسلها مستطيلة، مرقوشة. بطونها انسائية الشكل. رواشها كبيرة، قسطانية التخفيف. انعقادها الخلفية ضخمة تمكّنها من القفز || الحشرة الجملانة واشعة رمتها البراري والمروج. البرقة تميش على سوق التجليات وقد تركب القمع والأرز قسب اعلاص زهر السابل.

٢٦٣٧٩ - مَرْمِيْس

Rhinoceros (F). هو الكركدن، اطلبه.

٢٦٣٨٠ - مَرْمَب

Surmulot (F). هو جرد الماشاب، اطلبه.

Marbre (F).

٢٦٣٨٢ - مَرْمَر

هو الرغام، اطلبه.

٢٦٣٨٣ - مَرْمَرِيّ

Marbré (F). Marbled (E). نعت تعريف يطلق على ما كان يشبه المرم.

٢٦٣٨٤ - مَرْمِيْسِيَّات

Myrmicidae (S). Myrmicidae (F). Myrmicidae (E).

فصيلة حشرات من شثايات الاجنحة المحصورة وثقة الحمويات. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع البلاد الباردة والقطبية || اجسامها شبيهة بالجنس النمل. انوثاها الى الجؤوة المتفاوتة المجات. جميعها مجتحة. حاما دقيقة. ذرية، معتدلة الطول || اشهر اجناسها المرمس (Myrmique).

٢٦٣٨٥ - مَرْمِيْلَة

Arénacé (F). Sandy (E). نعت تعريف يطلق على كل ثربة خرواة كثرت فيها نسبة العنصر الرمي.

٢٦٣٨٦ - مَرْمَلَّة ، مَحْفَار

Sablère, Carrière de sable (F). Sand-pit, Gravel-pit (E). منجم يستخرج منه الرمل.

٢٦٣٨٧ - مَرْمَلَّة

Jardin de grenadiers (F). هي بستان الرمان.

٢٦٣٨٨ - مَرْمَرُورَة

Pagel marbré (F). المرمورة سمكة بحرية تدعى فرديدي مسج، اطلها.

٢٦٣٨٩ - مَرْمَرُورَة

Marmoset (F). هو اقبال من القردة اللبية.

٢٦٣٩٠ - مَرْمَرُورَة * ، زَمْرُورَة ، دَمَشْقِيَّة ، حَافِرِيَّة

Calceolaria (S). Calceolaria (F). Slipperwort (E). Pantoffelblume, Schuhblume (D). Calceolaria (I).

جنس نباتات عشبية ليفية ومخوشية من فصيلة الخنازريات. انواعها عديدة، منها الحولية والمهولة والمعمرة، معظمها يري وبعضها تربوي كثير الضروب والاصرام. سوقها زبه. اوراقها متقابلية كاملة. ازهارها غريبة الشكل تشبه الخف. الوانها متباينة عديدة تراوح من الالبيص الى الاحمر الغام.

٢٦٣٩١ - مَرْمَرُوط

Arctomys (S). Marmotte (F). Marmot (E). Murmeltier (D).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجايات. انواعها المعروفة ١٥، جميعها متوسطة القد بطيئة الحركة. رؤوسها مستديرة. اذانها صغيرة مستديرة. اذانها قصيرة جللة. صوفها متوسط النعومة || اعطائها الجبال العالية. بيئاتها الشتوي يدوم نحو اربعة اشهر. تعيش جماعات في اجمار تحفرها في الهوم على اعماق تراوح من ٩٠ الى ١٢٠ سم. جحرها نفق قطره نحو ١٥٠ سم. وطوله من ٨ الى ١٠ امتار ينتهي بردهه هزها ٢٠٠ سم. اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٢٦٣٩٢ - مَرْمَرُوطُ الثَبَت

Arctomys robustus (S). Marmotte robuste (F). Tibetan marmot (E).

اكبر انواع المرموط، موطنه جبال التبت. ثوبه الى السرة الخفيفة. وبره كثيف، لين، مستطيل.



مرموط شائع

2٦٣٨٩ - مَرْهَاءُ *
Hypsomètre (F).
Hypsometer (E).
جهاز آلّي يمكن المراء من تحديد ارتفاع المكان أو الشيء .

2٦٣٩١ - مَرْهَاءُ
نعت وصيّ يطلق على الامكنة القليلة الشجر كقولك حديقة مرهءاء أو غابة مرهءاء أو ارض مرهءاء .

2٦٣٩٢ - مَرْهَبِلٌ ٥
Impondéré (F).
Unweighed (E).
المربهل ما كان عادم الوزن أو القياس .

2٦٣٩٣ - مَرْهَةٌ
Etang artificiel (F).
Artificial mere, A. pond (E).
هور صناعي تخزن فيه مياه الشتاء .

2٦٣٩٤ - مَرْهَمٌ
Liniment, Onguent, Pommade (F). Liniment, Unguent, Ointment, Pomade (E).
مركب طبي دهني يختلف العناصر والالوان، استعماله خارجي.

2٦٣٩٥ - مَرْوٌ
Quartz
ضرب من الصوان يختلف الاشكال البلورية والاحجام المتباينة .

2٦٣٩٦ - مَرْوٌ * ، حَبِيقُ الشَّيْخُ ، حَرْبَتَشَّاشٌ ، مَرْمَاحُوزٌ ، بَرْدُ قُوشٍ مُعَقَّدٌ ، زَعْبِيرٌ

Origianum maru, O. amaracus, Majorana maru (S).
Amaraque, Marjolaine vrale (F). Amaracus (E).
Amarakuschtblume (D). Amaraco (I).
بجلة معمرة عطرية وزراعية من فصيلة الفقيوات .
تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها وفروعها جوية اللون .
فروعها متفرعة مسترسلة . اوراقها لائقة كاملة اهليلجية ،
نصلها خالي البشرة على صفحتيه . ازهارها سنبلية التجميع .
ازهارها قليلة العدد وردية اللون || ينبت من التوابل
وهو معقود للعددة ، منه ، طارد الرياح . يستخرج منه
بالتقطير زيت طيار كافوري الرائحة له استعماله الطبي .

2٦٣٩٧ - مَرْوَةٌ
Maerua (S).
Maerua (F). Maerua (E).

جنس نباتات مجلّة وجبلية معمرة من فصيلة الكريبات .
انواعها المعروفة نحو ٢٠ منبتها بعض المناطق الافريقية
اخصها المشرقة على البحر الابيض المتوسط || سيقانها فروعاء .
اوراقها بيضيه النصال الجامدة ، صغيرة الريباجات .
ازهارها عشودني التجميع . ازهارها معتدلة الاحجام ملونة
من الابيض الى الاصفر والاحمر والابرجاني . ثمارها
عنية وثوية البذور او شتعية || تنويرها ربيعي .

2٦٣٩٨ - مَرْوَّازٌ ٥ * ، بَارَوْسِتَرٌ
Baromètre (F).
Barometer (E).

جهاز خاص وضع لقياس الضغط الجوي وهو يتكون
عادة من وعاء للزئبق وانبوبة شمعية تنغس في الوعاء وسام
دقيقة تنفذ منها الهواء وسواق مدرج يدل على ارتفاع
الضغط او انخفاضه .

2٦٣٩٩ - مَرْوَّازٌ مُسَجَّلٌ ٥ *
Baromètre enregistreur (F). Registrar barometer,
Self-registering barometer (E).
مرّواز جهاز بالعدة اللازمة لتكوين انفعالات الضغط الجوي .

2٦٣٨١ - مَرْبِئَةٌ
Clapier (F). Hutch (E).
اقفاص الارانب وكل مكان خصص لتربية الارانب
وتكاثرها .

2٦٣٨٢ - مَرْبِئَةٌ *
Coregonus maraena (S).
Corégone, Marène (F).

سمكة نهريّة من مفتوحات المائنة وفصيلة السلمونيات .
اعطانها معظم بحيرات الشرق الاوسط واروية الوسطى ||
جسمها متوسط القد ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٣٠ سم .
ثوبها الى الرينة الفضية المواج يبق في الرأس والظهر وينير
في البطن . زعنفتها الذيلية فارقة ، شبه هلالية الشكل ||
لحمها ان مدخن او ملح رائع السوق في اردوية الوسطى .

2٦٣٨٣ - مَرْبِئِجِيَّةٌ
Mœhringia (S). Méringie (F).

عشبة معمرة من فصيلة القرزنفليات . مهدها فضاب وهّام
بعض اقالم البحر الابيض المتوسط . ساقها نحيلة فروعاء .
اوراقها سنائية تطول من ٢ الى ٣ سم . نصلها مقعرة
السلوك ، بحرية الخضار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة
القد . ترغب في المواقع البويرة والارتبة الكلسية || تنويرها
يستمر من حزيران الى آب .

2٦٣٨٤ - مَرْبِدَةٌ
Laurière (F).
كل موقع تكثر فيه اشجار الرند اي الغار يدعى مربدة .

2٦٣٨٥ - مَرْبِئَةٌ
Maranta (S).
Marante (F). Arrow-root plant (E). Arrowroot-
pflanze (D). Cannacoro, Erba da freccle (I).

جنس نباتات جذمورية برية وزراعية من المرنطيات
وفصيلة الزنجبيليات . انواعها المعروفة خمسة ، منبتها المناطق
الحارة . اوراقها كبيرة القد مستطيلة الزنيد الحامسة . نصلها
سنائي الشكل بارز العروق . ازهارها سنبلية او عشودنية
التجميع بيضاء اللون || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة
التالية .

2٦٣٨٦ - مَرْبِئَةٌ أُسْلِيَّةٌ
Maranta Juncea (S).
Marante élanée (F).

نوع من المرنة الزراعية ترغب في الاربة الرطبة . اوراقها
سنائية كبيرة منتقصة . شامخاتها الزهرية تعلو من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . ازهارها سنبلية التجميع || جذاميرها
دقيقة مستطيلة قليلة المادة الشتوية .

2٦٣٨٧ - مَرْبِئَةٌ قَصِيصَةٌ ٥ ، أَرَوْتَةٌ
Maranta arundinacea (S). Marante arundinacée (F).

نوع من المرنة الصناعية الشائعة الاستعمال ، تزرع من
اجل جذاميرها الشتوية الشباب التي يستخرج منها الارروت
وهو نوع من النشا الغذائي ، دقيقه يحوي :

١٢,٥ ٪ من المواد الازوتية
٥,٢٠ ٪ من المواد الدهنية
٨٥,٧٥ ٪ من المواد الشتوية والسكرية

2٦٣٨٨ - مَرْبِئَةٌ هِنْدِيَّةٌ *
Maranta indica (S).
Marante de l'Inde (F).

نوع من المرنة الزراعية ترغب في الاربة البدالية الخصبة .
يستخرج من جذاميرها الارزوت الهندي الجيد الصنف
والانتاج الذي يحتل المركز الثاني بعد الارزوت القصبي .

2٦٣٨٩ - مَرْبِئِيَّاتٌ
Marantacées (F).
Marantaceae (E).
سبط من فصيلة الزنجبيليات ، اشهر اجناسه المرنة .



مرنة



مرنة قصية



مرنة هندية



مرهءاء



مرو



مرّواز



مرّواز مسجل

Palimpsestis or, * مَرُوش الحَوَر *
Cymatophore or (S). Cymatophore or, l'Or (F).
Palimpsestis or (E).

حشرة من فصيلة الشروقيات ورثة حشرقيات الاجنحة .
موطنها بين من الشرق الاسط الى اروب . فراشها واسعة
قوتها رقيق الازهار . سرتها تميش على اوراق الحور
والصفصاف . جسمها وبني الشكل يطول نحو ١١ م .
بسطها نحو ٣٤ م . رأسها خطي اللون . عيناها كيرتان .
زباناها غطيانا . مرشها مستدل الطول . جوشنها وبطنها
الى الخنطلي المذهب المراج || روشنا الاميان الى الخنطلي
الاثير تملو رقة الى الصخرة وخطوط معتزة الى السمرة .
روشناها الخلفيان الى الخنطلي الكلف المذهب المراج
تعلو حدة وسطى هلالية سمره || لها جيلان في الحول .
تظهر فرائة الجبل الاول في نيسان وتظهر فرائة الجبل
الثاني في تموز . تسرح من العصر الى فحة الليل . تعاظم
بد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتنتع المكن لطعا على
الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة عند بلوغها
الكامل تطول نحو ٢٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ،
مالس القشار . ثوبا الى الخضار البحري الجرع بالايف
والاصفر . رأسها جوزي اللون . مذهبها ورواجها الى
السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما
ينقضي ضمن صلبة تحميها السرعة تحت القشور او بين
شقوق الحاء .



مَرُوش التبع



مَرُوش الحور

Laité (F). Soft-roed (E). * مَرُوش *
كل سمكة ذكر لا يزال جرابها الشلغي مليء بالورول
تمت بالورول . كقولك طرسوج مريول .

Irriguée (F). مَرُوي ، مَسْقُوي *
Irrigated (E). هو النبات أو الزرع الذي يسقى .

Œsophage (F). مَرِيء *
Œsophagus, Gullet (E). جزء من انبوب الهضم مركزه بين البلعوم والمعدة .


Anémomètre (F). مَرِيح * ، مَكْرَار *
Anémomètre (E). جهاز يحدد مهب الريح وسرعته وشغلها .

Rentable (F). مَرِيح ، مِفْعَال *
Profit-earning (E). كل استثمار يعود على صاحبه بإيراد سنوي يغطي الاكلاف
ويؤتي بعض الدعل الصافي .

Prolifère (F). مَرِيخ ، مُخْلِف *
Proliferous (E). صفة الشيء الذي يتكاثر . ونعت تعريفي توصف به الازهار
والثآليل التي تنبت باهر مورة .

Mars (F). مَرِيخ ، بَهْرَام ، بَهْرَمَج *
Mars (F). Mars (E).

كوكب سيار من الخلف ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي .
بعده عن الشمس يأتي بعد الارض . لونه الى الصفار الاحمر .
جره يقل عن جرم الارض نحو ٧ مرات وكتلته نحو
عشر مرات . سرعة دورته الانقلابية في الفضاء نحو
٨٦٧٩٦ كيلومتر بالساعة . دوره الفلكية حول الشمس
تستغرق نحو ٦٨٧ يوما . دوره المحورية الذاتية تستمر



مَرِيخ

Ballota (S). مَرُوب *
Ballote, Marrube (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات .
انواعه المعروفة متوسطة المدد . اعطانها تشمل بعض مناطق
الشرق الاسط والاذى واروبه وافريقية الشالية || سورها
عقائية فراء تملر من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
اهليلجية النصال الخشنة المسنة الختار . ازهارها محوري
الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ومنها الالبيص الاصفر
المراج . ازهارها واوراقها فواحة العرف للاستسحب ||
تؤبرها صيفي .

Eventail (F). مَرُوشَة *
شكل من اشكال تقليم الشجر ، يشبه المروحة .

Palmier éventail (F). مَرُوشَة *
هي القبل نوع من النخل التريسي .

Flabellé, Flabelliforme (F). مَرُوشِي *
Flabelliform (E). نعمت وصفي يطلق على ما كان شكله كالمروحة .

Stylot (F). مَرُود *
كل انبوب من مجموعة الانابيب التي تشكل قلم المدقة
في الزهرة . وهو محور البكرة والحديدة التي تدور في اللجام
وكل نصل دقيق مثلوث . ج مرود .

Xiphosures (F). مَرُودِيَّات الازناب *
رتبة من المفصليات الشيفيات المرسويات . نصالها
واجناسها وانواعها كثيرة المدد . معظمها الساحق من
متحجرات الاحقاب الاول || المعاصر منها الآن فصيلة
واحدة تدعى لميطيات .

Epithrix parvula (S). مَرُوس التبع *
Flea beetle (E).

حشرة من مفصليات الاجنحة وفصيلة النضاريات . جسمها
صغير القد يطول نحو ٢ م . ثوبا الى السمرة العابقة .
وفي من الحشرات التي تطير وتقفز حسب تقضي الحاجة .
اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٣ . اناثها تمتع المكن
على الاعشاب البرية تفتن عن رقات دقيقة تحبل غبراء
اللون يبلغ طولا عند كمال تطورها نحو ٤ م . || اغزرها
تدود الى الحفرة والبرقة . الحشرة تقضم نصال التبع على
صفحاتها العليا في المشتل وتعل وتط من قبتها . اما البرقة التي تميش
فتتو الاوراق وتطم من قبتها . التربة فانها لا تتأخر عن قرض
جذور الشتلات الناشئة || مكافحتها نظرا لسرعة حركتها
واختائها في التربة وبين الاعشاب تبدأ بتنظيف المشتل
او الحقل من جميع الاعشاب البرية واذا كان لا بد من
دواء فيجب ان يكون شديد الفعالية . كاخضر باريس
وزرنيخات الرصاص والروتينون .

Rejet, Rejeton (F). مَرُوش *
Shoot, Sprout (E). هو الرشد والفسيلا والنبلة والفرخ وقد يحسن تخصيصه
برك النبات المخشوب .

سرعية في المسانف ، عارشة في الغابات حيث يبلغ طولها نحو ٥٠ مترًا . ثمارها وشعبة الجراب الذي يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم . ويعرض نحو ٤ سم . بزورها كثيرة العدد ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، لونها الى السرة الصنائية يعلوها تيجيق ذهبي . رائحتها سريعة ، مقسة . طعمها يبدو كطعم البندي ثم يتحول فورًا الى مرارة العظم . يستخرج منها نحو ٣٢٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

٢٦٤٢١ - مَرِيخَة الْغَابُون ، مَرِيخَة لَطِيفَة

Strophantus gratus (S). *Strophante agréable* (F).
نوع من المربية . مهدا الغابون وبعض مناطق نيجيريا الجنوبية والكونغو . جنبها داسية او سرعية في المسانف ، عارشة في الغابات . ثمارها متوسطة الحجم . بزورها اهليلجية الشكل ، تطول من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . لونها الى السرة الكستنية الزيتية المواج . رائحتها سريعة ، مقسة ، لا تقبل الاتئاس . طعمها شديد المرارة منذ الاول || يستخرج من بزورها نحو ٣٤٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

٢٦٤٢٢ - مَرِيخَة تَشَاد ، مَرِيخَة كُومْب

Strophantus Kombe (S). *Strophante de Kombe* (F).
نوع من المربية ، مهدا مناطق تشاد وبحيرات افريقية الوسطى . جنبها داسية في المسانف ، عارشة في الغابات . ثمارها اصفر قدًا من ثمار مريرة السودان اما بزورها فاجسم وقد يبلغ طولها نحو ٣٠ سم . لونها الى السرة الخضراء المواج . رائحتها قليلة الصرامة النوية . طعمها شديد المرارة || يستخرج من بزورها نحو ٣٠٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

٢٦٤٢٣ - مَرِيخَس * *Histioteuthis* (S). *Histioteuthis* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات رأسيات الارجل وقصيلة المراسيات . انواعها المعروفة قليلة اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اجسامها جرابية الشكل مستقلة الاعقاب . عيونها كبيرة ماصحة . زعانفها طرفية نصف دائرية الشكل . رؤوسها اسطوانية كبيرة مندرجة مع الاجسام . جرابها متبانية الاشكال منها ستة محظة مصحبة متساوية الطول والثلاثان طليقتان محجبتان والثلاثان مستطيلتان تتهبان برسي ستانية الشكل عادمة الحاجم .

٢٦٤٢٤ - مَرِيخَس *Myrris* (F).

هو السرفل العطري ، اطلبه .

٢٦٤٢٥ - مَرِيخ *Fertile* (F). *Fertile, Fruitful, Rich, Fat* (E).

صفة الخصب في التاج والانتاج والثمار والواتا .

٢٦٤٢٦ - مَرِيخَة * *Laemargus* (S). *Laimargue* (F).

جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة السمندويات . انواعها المعروفة اربعة ، منها نواص بحويان بحار الشمال ونوع يحوي المحيط الهندي والاربع يحوي البحر الابيض المتوسط وهو اصفرها قدًا لانه لا يطول اكثر من متر بيتا الانواع الاخرى تطول من ٤ الى ٦ امار || وتتميز مريفة

نحو ٢٤ ساعة و٣٠ دقيقة || والمريخ كالارض له بحار وجو ويور في فلكه قران « مَرِيخَس » و« مَرِيخَس » ، دورة الاول تستمر نحو ٧ ساعات و٣٠ دقيقة . ودورة الثاني نحو ٣٠ ساعة و٢١ دقيقة || والمتجمدون يسمونه النحس الاصفر لانه دون زحل في النحوة . واضافوا اليه البطش والقتل والتهور .

٢٦٤٢٦ - مَرِيخ *المادة الصلبة البيضاء الكاثية في جوف القرن .*

٢٦٤٢٧ - مَرِيخَس * *Picris* (S). *Picride* (F). *Yellow succory* (E). *Bitterich* (D). *Picride* (I).

جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات اللبينية الزهر . انواعها عديدة جميعا برية . سوقها فروع غزيرة العصارة اللينة المرّة الطعم . اوراقها متعاقبة ، لاطفة ، ستانية الشكل صغيرة القد . نصلها منشاري الحافة ، خلي البشرة على سطحه ، بحري اللون . ازهارها ورؤية جميلة الصفار || والمريز يزيل الجرب والحكة ويدير البول وينفع من ضعف الكبد والقنصة واذا اخذ مع التبوالة فتت الحصى وتطلق البول وهو يصنع وتصلحه الكثيراء .

٢٦٤٢٨ - مَرِيخَة *Chondrilla* (F). *Chondrilla* (E).

هي الخنثويل ، نبات طبي ، اطلبه .

٢٦٤٢٩ - مَرِيخَة * *Strophantus* (S). *جَيْفَلَكَة* * *Strophante* (F).

جنس نباتات برية ، طيبة ، معمرة ، من فصيلة الدفليات . انواعها المعروفة ٥٥ مهدا المناطق الاستوائية والاقاليم المتاخمة من البلاد الافريقية والهندية . تحوي انواعها ونباتها الطوية هو التالي :

| | |
|-------------------------|---------------|
| افريقية الشرقية والوسطى | تثبت ١٥ نوعاً |
| افريقية الشالية | تثبت ١١ نوعاً |
| افريقية الجنوبية | تثبت ١١ انواع |
| مدفسكر | تثبت ٣ انواع |
| اخذت وباليزية | تثبت ١٢ نوعاً |

سوقها رها كلها متبانية الاشكال ، منها الشجيرات والجنبات والعواش والسرعية الفروع والداسية . يبدو ان شكلاتها الرئيسية تعود الى بعض العوامل التنوعية ، اخصها الضح . اوراقها اهليلجية ، معتقة ، لاقياسية الانتظام ، منها المتعاقبة والمتعاقبة والقنصة ومنها المائلة النصال والمزجية . ازهارها عذقية التجميع ، طرفية الارتكاز ، مخلفة الالوان . كبرها قمية ، حامية الانفلاق . بتلاتها قدية مستطيلة . ثمارها سهمة ، مدببة الاطراف . ثمارها مركبة من جرابين متقابلين . بزورها مستطيلة ، متكية الطرف ، تنتهي بقزعة من الهلب المستطيل الدقيق الناعم || يستخرج من بزورها ، باستثناء القزعة ، مادة جمالية طيبة . شديدة المرارة تدعى ستروفنتين (*Strophantine*) كانت ولا تزال تستعمل من قبل بعض قبائل جاهل افريقية في علاج التيسال السامة . وتستعمل طبياً في علاجات القلب وانقباضه وفي تحسين الدورة الدموية واستقرار النبض والقضاء على ضيق التنفس || أشهر انواعها الطوية الثلاثة التالية .

٢٦٤٢٠ - مَرِيخَة السُّودَان ، مَرِيخَة مَرِيخَة *Strophantus hispidus* (S). *Strophante hérissé* (F).

نوع من المربية . مهدا السودان ومغيبه ونيجيريا . جنبها



مَرِيخ



مَرِيخَة



مَرِيخَس



مَرِيخَة

المتوسط باستعانة غطها ويحبها الاطحل الارزق المواج الذي يقع مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن || مسوكها فاخرة الصنف مرغوب فيها . غوبها مأكولة متوسطة الصنف ، ويستخرج من اكبادها الصلصة مادة زيتية شائعة الاستعمال .



مرقة

٢٦٤٣٥ - مَرْقَة صَفْرَاءُ الزَّهَر

Morina culteriana (S). Morine de Coulter (F). بجلة تزيينية تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم . ساقها فراءه فناء . اوراقها خيطية، نصلها يطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٢ سم . ازهارها صفراء اللون، ثنائية التجميع ، ابطية وتاجية الارنكاز || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

Morina bulleyana (S). مَرْقَة صِينِيَّة Morine de Chine (F).

بجلة سرىوتية تزيينية تعلو نحو ٦٠ سم . ساقها فراءه تملوها خطوط مستطيلة من الزغب الاطحل . اوراقها سنانية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . ازهارها بيضاء اللون ، ثورية التجميع ، طرفية الارنكاز || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .



مَرْق

Morina persica (S). مَرْقَة عَجَمِيَّة Morine de Perse (F).

جنية سرىوتية تزيينية تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فراءه . اوراقها مقابلة خبيقة ، نصلها يطول نحو ١٥ سم . ويعرض نحو ٣ سم . صفحته خلية البشرة متباعدة اللتين على الحشف . ازهارها ابطية وطرفية الارنكاز ، وردية اللون ، خلية الصلصة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٤٣٨ - مَرْقَة مُسْتَقْطِلَة الزَّرَق

Morina longifolia (S). Morine à longues feuilles (F). جنية تزيينية تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ساقها فراءه . اوراقها خبيقة ، نصلها يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . حثاره مبالغ الحافة ، دقيق الحشف . ازهارها متوسطة القد، ابطية وطرفية الارنكاز ، تلبو بيضاء اللون ثم تنحرف الى الوردي وتستقر على الحمرة القاننة . ازهارها يستمر من تموز الى آب .



مرقة

Mérinos (F). مَرْقَة نَبَسُوس * Merino sheep (E).

ضأن بني مرين ، سلالة من الضأن المشهور بغزارة صوفه ونعومته وجودة صنفه .

Murenidae (F). مَرْقِيَّات * هي فصيلة الشقيبات ، اطلمها .

Mérione (F). مَرْقِيُون * هو الزيد ، اطلمه .

Alibite (F). Nutritive (E). مَرْقِيَّي * المادة او المواد الغذائية القابلة للتشثيل المباشر في الجسم .

Vin de bon goût (F). مَرْقَة مَرْز * الحمر اللذيذة الطعم .



مريون

٢٦٤٤٤ - مَرَادُ الْإِيْتِمَارِ

Adjudication au revidage, A. à la revision (F). هو المزاو الذي يخضع لانتافق قوم تآمروا على ان لا يتنافسوا في المزايدة العلنية وذلك ليسو المطروح بضمن

Margaritana (S). مَرْقِيَّة * Margaritana (F). Margaritana (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات فضفحات الخياشيم وفصيلة التبادات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر وبحيرات افريقية واروپية وآسية وامريكة || اصداها شبه بيضية الشكل ، محدبة ، مستطيلة ، لامتناهوية المساريم والاضلع . بعض انواعها ينتج اللؤلؤ الفاخرة تعيش بين الصخور او في الرمال والاسمال . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

Carthame (F). مَرْقِيَّ * مَرْقِيَّ هو القرم ، نبات من فصيلة المركبات ، اطلمه .

Murex مَرْقِيَّ * جنس حيوانات بحرية مجرسة من الرخويات المعديات ذات الاصداق . انواعه عديدة اشهرها المريق الفينيقي (ابو ديتار) والمريق اليوناني || اصداها مدنية شالكة . كانوا يستخرجون منه في الزمان الغابر خضابا ارجوانيا ثابثا يستعمل في صبغ انفس الثياب .

Muricidae (S). مَرْقِيَّات * Muricidae (F). Muricidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفرسة من الرخويات معديات الاجرل وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمتحدة الحارة . كان لها شهرة في الزمان الغابر ايام الفينيقيين اذ كانوا يستخرجون من بعض انواعها الصباغ الابيض المشهور || اعرف اجناسها واشهرها المَرْقِيَّ والفرفورة والسكيس .

Marica (S). مَرْقِيَّة * Marique (F). Marica (E).

جنس نباتات عشبية جذمورية سرىوتية من فصيلة السوسنيات . منتهى البرازيل . شجارها منتصب ، رفيعة . اوراقها خبيقة النصل ، بجلة الخضار الزاهي . ازهارها زرقاء اللون او بيضاء || تزرع للزئين في الحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الزرقاء .

Marica coerules (S). مَرْقِيَّة زَرْقَاء * Marique bleue (F).

نوع من المريكة . منتهى البرازيل . شجارها مستظلل الجرم يرتفع من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها صغيرة الحجم ، خبيقة النصل ، بجلة الخضار الزاهي . ازهارها كبيرة القد ، قتلها نحو ١٠ سم . لونها الازرق اليلكي المواج || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

Sauge officinale (F). مَرْقِيَّة * نبات طبي ، يعرف بالقوسية الحزنية ، اطلمها .

Morina (S). مَرْقِيَّة * مَرْقِيَّ Morine (F). Whorl flower (E). Quirkarde (D). Morina (I). جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة الدبسياسيات . انواعها

٢٦٤٥٧ - **مُزَايِدَة** (Enchère (F). Auction (E)).
هي عرض مبلغ اعل من الثمن الاساسي او من المبالغ التي سبق عرضها في أثناء المزاد .

٢٦٤٥٨ - **مُزَايِدَة** (Beurrerie (F). Butter factory (E)).
هي معمل الزبدة ، بناء خصص لصنع الزبدة ويبيعها .

٢٦٤٥٩ - **مُزَايِدَة** هي الخفاة ، اطلبها .

٢٦٤٦٠ - **مُزَة** (Mazus (S). Maze (F). Mazus (E)).
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخنازيريات . انواعها المعروفة قليلة العدد بعضها من نباتات الهند والبيض الآخر من استراليا وتسانية || سوقها قصيرة او جعدة او مدادة . اوراقها اهليلجية ملوقة . ازهارها عنقودي التجميع ، شراخي الارتكاز || اعرف انواعها واشهرها النوعان التاليان .

٢٦٤٦١ - **مُزَة خَضِينَة** (Mazus rugosus (S). Maze rude (F)).
نوع من المزة . ساقها فروع قصيرة تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها مشرمة غشنة . عناقيدها الزهرية تطلو من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها الى الزرقة الباهتة الجميلة || تنويرها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٦٤٦٢ - **مُزَة قَرْمَة** (Mazus pumilio (S). Maze pygmée (F)).
نوع من المزة . ساقها جعدة . اوراقها غشمية مستتنة النصال . شاربتيها الزهرية قصيرة . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٦٤٦٣ - **مُزَجَة** (Amandier amer (F)).
هي شجرة اللوز المر . ج مزج ، اطلبها .

٢٦٤٦٤ - **مُزَجِّل** (Métayer (F). Metayer (E)).
المزجل : الموضع الذي يرسل منه الحمام الزاجل الهادي .

٢٦٤٦٥ - **مُزْحَامِي** (Concurrentiel (F). Competitive (E)).
نعت تعريفي يطلق على ما هو قابل للمزاحة .

٢٦٤٦٦ - **مُزْحَف** (Sep (F). Frame of plough (E)).
قطعة من المحراث ترصف في قمر التلم عند الحراث .

٢٦٤٦٧ - **مُزْدَوِع** (Terroir (F). Soil (E)).
هو الميعص ، اطلبه .

٢٦٤٦٨ - **مُزْدَوِج** (Binaire (F). Binary (E)).
هو كل مركب من عنصرين .

٢٦٤٦٩ - **مُزْدَوِج الْأَطْرَاف** (Bilatéral (F). Bilateral (E)).
هو كل اتفاق او عقد ملزم للجانبين المتعاقبين .

٢٦٤٧٠ - **مُزْدَوِجَاتُ الْأَذْيَن** (Diotocardes (F)).
قسم من الرنويات المدية .

٢٦٤٧١ - **مُزْدَوِجَاتُ الْأَرْجُلِ** (Amphipodes (F). Amphipoda (E)).
رتبة من القشريات .

جنس على اقدم فيبيونه ويقسمون الفرق بين الثنتين وهو من الاعمال غير المشروعة التي يعاقبها القانون .

٢٦٤٤٥ - **مُزَادُ التَّنْهَوْر** ، **مُزَادُ الْأَسْتِرْسَال** (Adjudication sur folle enchère (F)).
هو ما يعرف بإعادة المزاد على ذمة الملتزم .

٢٦٤٤٦ - **مُزَادُ النِّاقِصَة** ، **مُنَاقِصَة** (Adjudication au rabais (F)).
هو ان يرسو الالتزام او المبيع على من يعرض أدنى ثمن يلتزم به القيام بالمعمل على الوجه المفصل والمشروح في دفتر الشروط وفي البيان التفصيلي المعروض لتنافس المتنافسين .

٢٦٤٤٧ - **مُزَادُ جَبْرِي** (Adjudication sur saisie immobilière (F)).
هو المزاد الذي يتم عقب الحجز العقاري بعد الاجراءات القانونية المعروفة من تسجيل ونشر .

٢٦٤٤٨ - **مُزَادُ قَضَائِي** (Adjudication judiciaire (F)).
هو الذي يجري في المحكمة وفقاً لنص قانوني او امر رسمي بعد استكمال الاجراءات القانونية .

٢٦٤٤٩ - **مُزَادُ تَعَدُّرِ الْقِسْمَة** (Adjudication sur licitation, Licitation (F)).
هو مزاد يقع على عقار شائع بين ملاك كانوا اشتروه او ورثوه ولا يمكن قسمته شيئاً .

٢٦٤٥٠ - **مُزَارَاة** (Bletissement, Bletissure (F). Becoming over-ripe or sleepy (E)).
المزاراة كالقوب والقفل هو زيادة نضج الثمر او ابتداء ذبوله بعد تمام نضجه .

٢٦٤٥١ - **مُزَارَع** ، **مُزَارِع** ، **مُزَاكِر** ، **مُخَايِر** (Métayer (F). Metayer (E)).
هو من استعمل الارض بالمزارعة .

٢٦٤٥٢ - **مُزَارَعَة** ، **مُزَاكِرَة** (Métayage, Colonage (F). Metayage (E)).
هي اجارة مزرعة الى اجل ما يدفع المستأجر بمقتضاها الى المؤجر قسماً من حاصلاتها بنسبة يتفقان عليها . ويقال للمستأجر مزارع . وهذه المزارعة قد تكون :

مزارعة المحاصة (Colonage partiaire (F)).
مزارعة مستديمة (Colonage perpétuel (F)).

٢٦٤٥٣ - **مُزَارَعَة بِالتَّوَكُّيل** (Absentéisme (F). Absenteeism (E)).
استغلال الارض بالمزارعة على ان يشغل صاحب الارض بوكيل .

٢٦٤٥٤ - **مُزَارَع** (Hérisson (F)).
هو القنفذ ، اطلبه .

٢٦٤٥٥ - **مُزَاوَلَة الْعَمَل** (Vacation)
هو الوقت الذي يقضيه بعض الاشخاص المنوط بهم عمل معين في القيام بأعباء هذا العمل او المهمة .

٢٦٤٥٦ - **مُزَايِد حَقِيقِي** (Command (F)).
هو الذي يستمر يوم المزايدة حتى يرسو المزاد على سواه ظاهراً في حين انه صاحب الصفقة .

٢٦٤٨٣ - مَزْرَقَة

المزقة. ج. مزارق. هي الحياصات في التربة وقد ساحت بها الدرة يحبس فيها الماء حتى تمتلئ ثم يساق الماء إلى غيرها.



مزقة

Cloaque (F). Cloaca (E).

٢٦٤٨٤ - مَزْرَق

فوعة المسالك البولية والمعوية والتناسلية عند بعض الفقاريات وأخصها الطير.

Boinés (F).

٢٦٤٨٥ - مِزْعَامِيَّات ٥

عمارة من فصيلة البوليئات. اجناسها وانواعها عديدة. معظمها من علم المناطق الاستوائية الامريكية ويجزر المحيط الهادي، اخصها مدغشكر. وبعضها اسبوي وافريقي || اجسامها متباينة الاطوال التي تراوح من متر الى عشرة امتار || اشهر انواعها :

Anacunda (F).

أناكندة

Boa constrictor (F).

بواء مقلصة

Boa arc-en-ciel (F).

بواء لسطانية

Boa de Cook (F).

بواء كوك

Boa javelot (F).

دسامة

Epinette (F).

٢٦٤٨٦ - مَزَقَّ *

Spinet, Box for fattening poultry (E).

قفس يرب فيه الدجاج الممد للتسمين.

Luscinia succia (S).

٢٦٤٨٧ - مَزَقَّة * ، مُسْهِر

Gorge-bleue à miroir roux (F).

طائر من الحزاز وفصيلة الدعليات. صغير الجثة طوله نحو ١٥ سم. ثوبه متركب الالوان الجميلة التنسيق والزخرفة. صفه مقلد بالازرق || وهو من القواطع محبوب البلاد في طلب الرزق. قوته الحشرات والديدان وبعض الحار العنينة التي تدرك في الحريف. يألف المتاع ويجاري الماء ووضافت البحيرات. يفتن انعمومه بين الادغال وفي المقاصب. انثاء تحضن من ٤ الى ٦ بيضات نحو ١٥ يوماً.



مزقة

Gaveuse (F).

٢٦٤٨٨ - مَزَقَّة

Cramming apparatus (E).

أداة لرق الطير.

Hybride (F).

٢٦٤٨٩ - مَزَكُوب ٥

Hybrid, Mongrel (E).

المزكوب كالمساج، نمت تعريتي يطلق على كل حيوان او نبات جبين.

Fécondé, Imprégné (F).

٢٦٤٩٠ - مَزَكُوم ٥

Imprégner (E).

نمت تعريتي يوصف به البيض المكوش الصالح للترسيم.

Glissière (F). Slide (E).

٢٦٤٩١ - مِزْلَاق

Glotte (F). Glottis (E).

٢٦٤٩٢ - مِزْمَار

هو فم الحجرة او فم قصب الرنة.



مِزْمَار الراعي

Alisma (S). Alisme, Flûteau (F). Water plantain (E).

Froschlöffel, Wasserliesch (D). Alismo (I).

جنس نباتات جلمودرية مائية معمرة من فصيلة الزمباريات. انواعها عديدة معظمها يعيش في الازهار والمناقع المغمورة

٢٦٤٩٢ - مُزْدَوِجَات الأصابع

Artiodactyles (F). Artiodactyla (E).

رتبة من البوليئات منها الخنازير والجلديات.

٢٦٤٩٣ - مُزْدَوِجَات التَنَفُّس

Dipnés, Dipneustes (F). Dipnoi (E).

طائفة من الاسماك تعتبر حلقة الانتقال بين الاسماك والقرائيب.

٢٦٤٩٤ - مُزْدَوِجَات الخَيْشُوم

Dibranches (F).

رتبة حيوانات من الرخويات الرأسيات الاربيل.

٢٦٤٩٥ - مُزْدَوِجَة التَقْطِيع

Décussée (F).

Decussate (E).

هي الاوراق المتقاطعة اثنتين اثنتين تقاطعاً عمودياً.

٢٦٤٩٦ - مُزْدَوِجَة التَنَفُّسَة

Dicotylédone (F).

Dicotyledon (E).

احد قسمي مستورات البزور من النباتات. راجع ثنائية الفلقة.

٢٦٤٩٧ - مُزْدَوِجَة القَلَم

Distyle (F).

Distyle (E).

نمت تعريتي يطلق على كل نبات ازهاره مزدوجة اقلام

٢٦٤٩٨ - مُزْدَوِجَة المِيسَم

Distigmate (F).

Distigmat (E).

نمت تعريتي يطلق على كل نبات ازهاره مزدوجة المياس.

٢٦٤٩٩ - مِزْرُ

Bière (F). Beer (E).

هو الجعة تحضيماً وهو القنديد المستخلص من سائر الحبوب النشوية كالشعير والحنطة والذرة ...

٢٦٤٩٠ - مَزْرَبَ الخَنَازِير

Porcherie (F).

راجع زريبة الخنازير.

٢٦٤٩١ - مُزْرَد * ، مُدْرَع جَبَّار

Priodontes giganteus (S).

Priodonte, Tatou géant (F).

حيوان لبون ادر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المدرعات.

موطنه معظم غابات امريكا الجنوبية. يألف المواق القريبة من الماء. مسرعه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر.

ملجته الحياطي فردي الا في زين التساقد والحفانة التي تستمر نحو ستة اشهر. وجاره نفق نسيج مستطيل يتحفر بين

جذور الاشجار. قوته المضاء والحيات والوزغ والفئران

وبعض المواد النباتية || جسمه شبه اطيالجي الشكل،

قليل الفلطح، بطول نحو ١٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي

يبلغ ٥٠ سم. رأسه مخروطي الشكل. اذناه بوقيتان قصيرتان.

جرامزه قصيرة خاسية الاصابع الامتساوية الطول المسلحة

باطرافر حادة اخصها اطراف الاصابع الثالثة والرابعة من

الجرامز الامامية. رأسه وجسمه وذنبه ملطوفة بدرع من

الزرد العظمي المادة. ثوبه اسود اللون باستثناء الرأس

والبطن والذنب فإنها الى البياض الاخير.

٢٦٤٩٢ - مُزْرَعَة ، مُشَارَة ، جِرْبَة ، كُرْد ، عَزْبَة

Ferme, Métairie (F).

Lease, Farming, Land, Small farm (E).

٢٦٥٠٢ - مَزُونَاة Parallax (F). Parallax (E).
المزواء زاوية عند كل نجم أو كوكب يقابلها قطر الفلك الأرضي أو نصفه .

٢٦٥٠٣ - مَزُونَاة Pantomètre (F).
Pantometer (E).
جهاز يستعمل في قياس جميع الزوايا والأبعاد .

٢٦٥٠٤ - مَزُونَاة Clinomètre (F).
Clinometer, Inclinator (E).
المزوان جهاز يستعمل في قياس الميل الحاصل بين خط مستقيم وخطاً أفقي .

٢٦٥٠٥ - مَزُونَاة Gonliomètre (F).
Goniometer (E).
هو المنقل، جهاز يستعمل في قياس زوايا الأرض عند مسحتها .

٢٦٥٠٦ - مَزُونَاة Anguleux (F). Angulus (E).
نمت تعريفي وصفي يطلق على ما كان شكله كائزواوية .

٢٦٥٠٧ - مَزُونَاة Crèche (F). Manger (E).
هو وعاء الزاد .

٢٦٥٠٨ - مَزُونَاة
المزود والملطف والثرة ثلاثة أسماء لنجم ثير واحد من كوكبة برج السرطان .

٢٦٥٠٩ - مَزُونَاة Masoreus (S).
Masorée (F). Masoreus (E).

جنس حشرات من فصيلة المزوريات ورتبة غحديات الاجنحة . انواعها المعروفة عشرة اصطلحها بعض مناطق افريقية والمهند واروپية . بعض انواعها اصبح عكاشي للانتفاخ مع الفسقت السوداني الى جميع مراقي العالم الى اجسامها صغيرة ، معتدلة التبسيط ، تقوّل من ٤ الى ٦ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل . تأشيرها وفكوكها وملامسها قياسية . كواسلها ضيقة القواعد . بطونها مقلطحة . اغادها لاحقة ، سباعية الاخاديد النحيلة القاطية ، يملعوا بعض الهلب . غلظايا قوائمها مجهزة بمنخاس متشارية التسنين الى الحشرة الجلجلة مقرسة ودائمة والبرقة ايضاً .

٢٦٥١٠ - مَزُونِيَّات Masoreidae (S).
Masoreidae (F). Masoreidae (E).

فصيلة حشرات من مجديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة الى اجسامها صغيرة تقوّل من ٤ الى ١٠ مم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القفن . عيونها ناشرة . تأشيرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة ، ضيقة القواعد المحصورة . اغادها سباعية الاخاديد النحيلة القاطية ، يملعوا في حنارها بعض الهلب . قوائمها نشيطة . متشارية التسنين . تألّف الحقول المزدرة وريال السواحل . جميعها دائمة ومقرسة . اشهر اجناسها المزور الذي يكثر وجوده في زراعات الفسقت السوداني .

وبعضها يكثر على ضفاف البحيرات والانهر . اوراقها اروبية الانتشاب ، لا قياسية الشكل والحجم . انزعارها ضمية التجميع صغيرة القد سريعة السط . قال الانطاكي : « نباتات طيبة الرائحة يزورها تحلل الاروام والسوم مطلقاً وارجاع الارحام وتدر البول وتفتت الحصى وتخلل الانتفاخ والمغص مع بذر الحزر والصل . واذا غسل به الشعر طوله وعليق رائحة الرأس . »

٢٦٤٩٤ - مَزِمَار الراعي المائي* ، اذان العنّز Alisma plantago (S). Flûteau plantain, Plantain d'eau (F). Mad-dog weed (E). Echter Froschlöffel (D). Plantaggine acquatica, Barba silvana (I).
نوع من مزمار الراعي تكثر زراعته في احواس الماء للترزين . عشبتة تقوّل من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها كبيرة القد بيضية الشكل ، نصلها قلبي القاعدة ذلق الزام الاخير . انزعارها كثيرة العدد صغيرة الحجم لوّسها الى البياض الموشج بالوردي . وهو نبات طلي عصبه مرطب خافض للحرارة ويدر البول .

٢٦٤٩٥ - مَزِمَارِيَّات Alismaceae (S).
Alismacées (F). Alismaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها نباتات جلمهورية متغية او مائية . اوراقها اروبية الانتشاب معتقة . انزعارها عنقودية التجميع مستطيلة الزناد المختص .

٢٦٤٩٦ - مَزِمَاج Luxuriant (F). Luxuriant (E).
نمت وصفي يطلق على النباتات الريان النضر الرخم .

٢٦٤٩٧ - مَزِمُون Alismaceae (S).
Myzomèle, Misomèle (F).

جنس طير من الجوارث وقيقات المناقير وفصيلة المغتريات . انواعها المعروفة نحو ١٥ مولد من استرالية الى ماليزية . ملجنها الحيواني جامعي . جاعاتها قليلة العدد . تألف البراري والادغال . قوتها الحشرات المجنحة والديدان وريق الانزعار اجسامها صغيرة القد تقوّل من ١٢ الى ١٥ سم . مناقيرها محدة الاطراف المدببة . اجنحتها معتدلة الجرم . اذانها مقلطحة . اقواها متباينة الالوان جميعها زاهية الغضاب . اناتها ابنت غضاباً من ذكورها . تدثن اعشاشها في الادغال . اناتها تحضن بتباوية الذكور ، على مرتين في الحول ، من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

٢٦٤٩٨ - مَزِمَم Intrusif (F). Intrusive (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان له صفة التزيم .

٢٦٤٩٩ - مَزِمَهَارَة Multiflore (F). Multiflorous (E).
نمت تعريفي يوصف به كل نبات كثير الازهار .

٢٦٥٠٠ - مَزِمَهَارِيَّات Anthozaires (F).
Anthozoa (E).

فئة حورينات بحرية من المغزوات تتميز بمدانجها المشفاة بالانزعار البحرية .

٢٦٥٠١ - مَزِمَهَر Florifère (F). Floriferous (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات مزهر او كثير الزهر .



مزمار الراعي المائي



مَزُون



مَزُون



مَزُون

يسطها من ٤٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها مستديرة، خناباتها انبوتية الشكل فارقة || تعيش جماعات قليلة العدد. تألفت الانجبار الحرجية الطليقة. مسرحها من الفسق الى الفجر. قوتها الجار على اختلاف انواعها.

Pot (F).

٢٦٥٢١ - مَسَاد

نحي السنن أو العسل.

٢٦٥٢٢ - مَسَادِع مَسَاعِيَة

Paramètres climatiques (F).
Climatic parameters (E).

المساعد المناخية مجموعة العوامل الواجب معرفتها في تحديد اقليم معين أو كورة أو بقعة || اهمها ملجن الاطوار وكثيها وقوزيها. التبخر. الاشعاع الشمسي. الحرارة القصوى والدنيا والرياح. الرطوبة الجوية النسبية. الرؤية. الرياح. الضغط الجوي.

Electrode

٢٦٥٢٣ - مَسَار

هو اللابح، اطلبه.

Mésentré (F).

٢٦٥٢٤ - مَسَارِيح ، مَسَارِيَقَة

Mesentery (E).

هي طيات الصفاق.

Mesorchium

٢٦٥٢٥ - مَسَارِيح الْخَصِيَة

Mesovarium

٢٦٥٢٦ - مَسَارِيح الْمَبِيض

Allisme (F).

٢٦٥٢٧ - مَسَاس

نبات طبي جذموري مائي يعرف بجمدار الراعي، اطلبه.

Anredra (S). Anrédère (F).

٢٦٥٢٨ - مَسَاسَة

جنس نباتات معمرة عارضة من فصيلة السرمقيات. انواعه قليلة منها البرية والزراعية التريينية. اطلانها البلاد الحارة. ازهارها جميلة الشكل ملونة.

Assistance (F).

٢٦٥٢٩ - مُسَاعَدَة

هي الاسعاف ، راحه.

Ball à complant

٢٦٥٣٠ - مُسَاعَاة ، مُسَاعَاة

هي ان يؤجر المالك مزرعة مغروساً أو غير مغروس فيلزم المستأجر أما بتمه اغراسه أو بغيره مقابل مقدار معين من الثار. ويشترط فيه وجوب قيام المستأجر بالتزامه على اكل ربه والاّ تغصب الاجارة حتماً بدون مقاضاة.

Passéiste (F).

٢٦٥٣١ - مُسَالِف

المسالف المشايخ المنجب بالمعالي.

Conduits génitaux (F). Genital ducts (E).

٢٦٥٣٢ - مَسَالِيك تَنَسُّلِيَة

هي الموادر التناسلية.

Poreux (F). Porous (E).

٢٦٥٣٣ - مَسَامِي

ذو مسام.

Porosité (F). Porosity (E).

٢٦٥٣٤ - مَسَامِيَة

كون الشيء ذا مسام.

Actionnaire (F).

٢٦٥٣٥ - مُسَاهِم

Shareholder (E).

هو كل من يملك سهماً في شركة سامية.

٢٦٥٣٦ - مَرْوَزَقَة * ، كَبْدَمَة مَرْوَزَقَة

Labrus turdus (S). Labre tourd, Tourd (F).
Labrus turdus, Wrasse (E).

نوع من الكيتم. سمكة بحرية بيوض. اطلانها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المهاج والخاصات || جسمها اهليجي الشكل، يطول من ٢٢ الى ٣٠ سم. ثوبها قليل التباين بين الشقين. اللون السائد هو الاخضر يحن وتشتد لونه عند الظهر ويغير عند البطن. غصاب الذكر اعين ولحم من غصاب الانثى || رأسها مخروطي الشوذن. فكاهما متعادلان. شفتيها متوسط الانفراج. اسنانها كبيرة، حادة. عيناها كبيرتان جاحظتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة، ارجوانية اللون يعلوها تبيج ازرق واخضر. زعانفها الصدرية والشرجية تتحلل بخضاب الظاهرية. الحوضية جزئية اللون اما الذيلية فسنانية الشكل، جزئية اللون يعلوها كالظهرية تبيج ازرق واخضر || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

Gnomon, Cadran solaire (F).

٢٦٥٣٧ - مِرْوَلَة *

Sun-dial, Gnomon (E).
هي الساعة الشمسية، قوامها قضيب عمودي ميل ظله يحدد الوقت.

Goniométrie (F).

٢٦٥٣٨ - مَرْوَلَة °

Goniometry (E).
هي علم قياس الزوايا.

Dasyphyllé (F).

٢٦٥٣٩ - مَرْوَلَة

من الارياك ما كانت نصالها كثيفة الزوبر.

٢٦٥٤٠ - مِرْوَات °

هو المدحان أو مقياس الادحان.

Oléagineux (F).

٢٦٥٤١ - مِرْوَات °

Oléaginous, Oily (E).
هي الاعضاء النباتية، اغصنها البزور والثار، الغنية بالمواد الزيتية.

٢٦٥٤٢ - مَسَاح ، مَسَاح

Arpenteur, Géomètre (F). Surveyor, Geometer (E).
الذي يمسح الارض يقين طويلاً ويعرضها لمعرفة مساحتها. راجع ارني.

Superficie (F).

٢٦٥٤٣ - مَسَاحَة

Superficies, Area (E).
قياس سطح الشيء.

Cadastre (F).

٢٦٥٤٤ - مَسَاحَة

Cadastral survey, Survey (E).
المساحة هي مجموعة القفاط والرسوم والخرائط التي تدل على مساحة الاراضي الزراعية وغير الزراعية وبيان الابنية والمعارات وتخطيطها وتحديد على وجه التفصيل في البلاد.

ويراد بها ايضاً الاعمال نفسها التي يقوم بها الاختصاصيون الذين تنوط بهم الادارة هذه المهمة. الغرض الرئيسي من هذه الاعمال هو تحديد الملكية المقاربة بالذقة الواجبة ثم تقدير الضرائب التي يقوى الملاك على دفعها منظراً فيها الى ثمن الابلالك ودخلها.

٢٦٥٤٥ - مَسَاحَة °

Harpyia (S).
Harpie céphalote
جنس حيوان من فصيلة الطوطيات. انواعه المعروفة ثلاثة، موطنها الشرق ويبرز المحيط الهادي حتى استراليا. اجسامها صغيرة اللد، طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم.



مَرْوَزَقَة



مَرْوَلَة



مَسَاحَة

Intimé (F). **مُستأنف عليه**
Respondent, Defendant (E).
هو المتداعي الذي استأنف الحكم الصادر بحقه .

Néophyte (F). **مُستجيد** °
Neophyte (E).
التحق حديثاً .

Mire à œufs (F). **مُستجلي** *
أداة خاصة بفحص البيض على الضوء الصناعي تمييزاً
للمزكوم من غير المزكوم .

Creux (F). **مُستجوف**
نمت تمرني يطلق على التبروغ العادية الطعم المألوف أو
التي يتميز طعمها ببعب فاضح يجبه اللوق .

Lapidifique (F). Lapidific (E). **مُستحجر**
صالح للتحجر .

Bénéficiaire (F). Beneficiary (E). **مُستفيد**
Bénéficiaire (F). Beneficiary (E).

Emulsion **مُستحلب**
سائل مائع يعمل رذاذاً من المواد الدهنية أو الراتنجية
المعلقة .

Sensitive (F). **مُستحسبة**
عشب تزيينية مركنية تدعى حساسة ، اطلبها .

Employeur (F). Employer (E). **مُستخدِم ، مَخْدُوم**
رب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستخدمهم .

Employé (F). **مُستخدِم**
Employed, Servant (E). كل من أدى الخدمة الممنولة به .

Extrait (F). Extract (E). **مُستخرج ، مُخلص ، عَصَاة**
هو جزء من عقد رسمي أو حكم يُلغى بحرفه ويسلم إلى
طالبه ويكون له قوة الاتبات التي لسنه الأصلي .

Polygalées (F). **مُستدَرَات**
هي البولوغالنيات ، اطلبها .

Latier (F). **مُستدَرَة**
هي البولوغالان ، اطلبها .

Echauffant (F). Heating (E). **مُستشيط**
نمت تمرني يطلق على الاعلاف والحبوب التي تنشط حرارة
الجسم وتسبب الادفاه .

Commodataire (F). **مُستعير**
هو الذي يأخذ المين المارة من المير في عقد العارية .

Firme (F). Firm (E). **مُستقل** °
Firme agricole, **مُستقل زراعي** °
Exploitation agricole (F). Farming (E).

Futurisme (F). **مُستقبلية** °
Futurism (E).

المستقبلية نظرية حديثة في فلسفة الفن قولها مزيج من

2٦٥٣٦ - **مُساهمة ، مُحصاة المُرماء**
Contribution
هو ان يسام كل واحد من الرما دفع دين مشترك في
دفع حصة من هذا الدين عن الجميع .

2٦٥٣٧ - **مُساي ، مُكافئ**
Equivalent
2٦٥٣٨ - **مُسَاوَة** (F). Equality, Parity (E).
Egalité (F).

2٦٥٣٩ - **مِسْبَاح** °
Limnomètre (F).
Limnimeter (E).
هو المثاق جهاز يستعمل في تقدير أرواخط مستوى
البحيرات .

2٦٥٤٠ - **مِسْبَار** * ، **مِرْجَاس**
Sounding-line, Lead (E).
أداة السبر ، تقع على اشكال مختلفة . تستعمل في الطب
والزراعة والارض .

2٦٥٤١ - **مِسْبَال** ° ، **أَبُو سِبَال** ° ، **قُرْقُف**
المقاصب °
Panurus (S).
Panure, Mésange des roseaux (F).

جنس طير من فصيلة القرقفيات . انواعه المعروفة قليلة
العدد ، اعطائها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والشرقية .
اجسامها واذاها مستطيلة . اجنحتها معتدلة القد ،
منقربة الاطراف . منقارها قصيرة مستعرجة القواعد ،
مستقيمة اطراف الخاطم العليا البيضة التيجين || اعرف
انواعه واشهرها المسبال الفضي .

2٦٥٤٢ - **مِسْبَال فُحِي** °
Panurus blairmici (S). Panure à moustaches (F).
Bearded titmouse (E).

طائر من المسبال . طوله نحو ١٧ سم . سباله لطفة سوداء
خلية تمتد من الزند وقاعدة الجفن الى طرف العنق . رأسه
الى الزقعة الرمادية الموج . عنقه ووجهه الى البياض
الفضي . ظهره الى الصهبة الصنابية . جناياه الى السرة
الخطية الجذعة بالابيض . بطنه الى الصهبة الفاتحة . ذنبه
زنجبي الريش المتراكب ، اسمر اللون ، حنطلي الموج .
منقاره وحيدة عنقه الى الصفار المايق . رصاه واصابعه الى
الردة الرصاصية || اعطائه الشرق الاوسط واروبة الجنوبية
والشرقية بألف المناطق والمقاصب وجراري الماء || قوته
الحشرات ونبور النباتات المتفتحة والمالية || يدفن في
الادغال والاسل . عشه كالجواب تقع فيه الانثى من ٦
الى ٨ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوماً .

2٦٥٤٣ - **مَسْبَلِك ، مَصْهَر**
Fonderie (F).
Foundry (E).
المعمل المصنوع لتلويب المعادن وصباها .

2٦٥٤٤ - **مَسْبِل ، عَمَلُ**
Organe mâle des insectes (F). Manly organ of in-
sects (E).
المسود الذكر في الحشرات .

2٦٥٤٥ - **مُسْتَأْجِر**
Locataire (F).
Tenant, Lodger (E).
هو الذي يتنقذ الاجارة من مالك المين باسمه .

2٦٥٤٦ - **مُسْتَأْثَف** (F). Appealing (E).
هو المتداعي الذي يستأنف الحكم الصادر .



مِسْبَار (١)



مِسْبَار (٢)



مِسْبَال فُحِي



مَسْبِل

٢٦٥٧٧ - مُسْتَكْتَفُ الْحَلِيبِ *

Lacto-densimètre (F). Lacto-densimeter (E).
ميزان خاص يقيس كثافة الحليب .

٢٦٥٧٨ - مُسْتَكْتَفُ الزُبْدَةِ

Lacto-butyromètre (F). Lacto-butyrometer (E).
ميزان خاص يقيس زبدة اللبن أي مقدار المواد السنية في الحليب أي اللبن .

٢٦٥٧٩ - مُسْتَقْلَقُ

Décombant (F). Decumbent (E).
نمت تعريفى وصنى يطلق على غثث الجذوع والقروص النباتية المسترخية التي لا تستطيع الانتصاب .

٢٦٥٨٠ - مُسْتَصِفَّةُ

Absorptiomètre (F).
Absorptiometer (E).
جهاز يستعمل في قياس مسمى الخمور القوارة للفساز الكربوليكى .

٢٦٥٨١ - مُسْتَنْبَتُ

Pépinière (F). Nursery (E).
هو المشتل ، اطلبه .

٢٦٥٨٢ - مُسْتَدُّ

Document, Titre (F).
Document, Titre (E).
هو السند ، اطلبه .

٢٦٥٨٣ - مُسْتَقْفِي

Héliode (F).
نمت تعريفى يطلق على كل ما له صلة بالمستقعات كالثباتات المستقيمة والحيمات المستقيمة .

٢٦٥٨٤ - مُسْتَوْبَةُ *

Mycetobia (S).
Mycétobie (F). Mycetobia (E).

جنس حشرات من فصيلة المستويات ورقية ذوات الجناحين . أنواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || أجسامها صغيرة ، نحيلة ، تطول من ٢ الى ٤ م . رؤوسها مكورة . عيونها متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . قرونها الاستشعارية خيطية . ملاسها مستطيلة . اعطائها صغيرة وقصيرة . كواسلها وبطنها شبه اسطوانية . رواشلتها ملونة . قوائمها مستطيلة ، مهدبة للظانيب || اسرارها عارضة ، تمش على الفطور .

٢٦٥٨٥ - مُسْتَوْبِيَّاتُ

Mycetobiidae (S).
Mycétobiidés (F). Mycetobiidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، تطول ٢ الى ٦ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها متباعدة عند الاناث ، متقاربة عند الذكور . رزقاتها ثلاثية عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، مركبة من ١٧ فصلة . ملاسها ملونة . قوائمها مستطيلة || رزقاتها سلكية تمش على العصاراة النباتية التي ترشع من الجروح || اشهر اجناسها المستوية .

٢٦٥٨٦ - مُسْتَوْدَعُ ، مَخْزَنُ ، حَاصِلُ

Dépôt (F). Depot, Warehouse (E).

٢٦٥٨٧ - مُسْتَوْدَعُ عَقَاقِيرِ

Officine (F).
Dispensary (E).

الاكثار الخالية التضاربة . ركيزتها مادة مديرة مستمرة التجديد . وعمل الكلمة ان تستحث الشعور وإلا فلا لزوم لها .

٢٦٥٩٥ - مُسْتَقَرَّاتُ الْحَيَاثِيمِ

Pérennibranches (F).

فئة من السرفويات تتميز باستمرار وجود جهازها الخيشوي في مختلف اطوارها الحياتية ، من الطور البلوطي الى الطور البائي .

٢٦٥٩٦ - مُسْتَقْطَبُ

Polarimètre (F).
Polarimeter (E).
مقياس الاستقطاب .

٢٦٥٩٧ - مُسْتَقْطَبُ

Polarisant (F).
Polarizant (E).

٢٦٥٩٨ - مُسْتَقْلِقَةُ الْقِيَعَالَاتِ

Dialypétales (F).
Dialypetalous (E).

نمت تعريفى يطلق على النباتات ذات الازهار المستقلة البتلات .

٢٦٥٩٩ - مُسْتَقِيمُ الْأَطْرَافِ

Rectiligne (F).
Rectilinear (E).

الحويان الذي تشكل اطرافه خطوطاً مستقيمة لا احديداً فيها ولا تقعر .

٢٦٥٩٠ - مُسْتَقِيمُ الرُّبَّانِ

Recticorne (F).
نمت تعريفى يطلق على كل حشرة مستقيمة الزبان .

٢٦٥٩١ - مُسْتَقِيمُ الْمُنْقَادِ

Rectirostre (F).
نمت تعريفى يطلق على كل طائر متقاده مستقيم الشكل .

٢٦٥٩٢ - مُسْتَقِيمَاتُ الْجَنَاحِ

Orthoptéroïdes (F). Orthopteroids (E).

طبقة حشرات تنتمي الى شعبة اليرقانيات وطائفة المحجمات اصلاً . تشمل حالياً خمس رتب يبي اللؤلؤيات والاشيانيات والفصصيات ومستقيمة الانجمة والجلفقيات . جميعها كبيرة الفخذ مستقيمة الساق . ارساغها مفصليّة تتكون من ثلاث عقل او اربع . اناثها تتميز بأجهزتها التناسلية المسلحة بمرزات قوية .

٢٦٥٩٣ - مُسْتَقِيمَاتُ مَقْلَافِيَةٍ

Lignes droites concourantes (F).

٢٦٥٩٤ - مُسْتَقِيمَةُ الْأَجْنَحَةِ

Orthoptera (S). Orthoptères (F). Orthoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيّات الاجنح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تشمل اكبر مجموعة من الحشرات الكبيرة القد . اجسامها واشكالها والوانها عديدة || من اشهر فصائلها الجندجديات والجراديات والقبوطيات .

٢٦٥٩٥ - مُسْتَقِيمَةُ الْعُرْوَى

Rectinerve, Rectinerviée (F).

نمت تعريفى يطلق على كل ورقة متوازية العروق المتجهة من القاعدة الى القمة .

٢٦٥٩٦ - مُسْتَكْتَفِ

Aréomètre, Densimètre (F).
Aréometer, Densimeter (E).
مقياس الكثافة .



مستكثف



مستكثف الحليب

Triangulation ٢٦٦٠٣ - مَسْحَقَةٌ ٥
عملية تأريخ ورسم بواسطة المثلثات تمهيداً لكليل المساحة.

Oserale (F), Osler-bed (E). ٢٦٦٠٤ - مَسْحَرَةٌ ٥
منبت السحر أي الصفصاف .

Broyeur (F). ٢٦٦٠٥ - مَسْحَق ٥
Breaking machine (E).
آلة تستعمل لسحق المساقط والكسب وما أشبه .

Broyeur-effibreux (F). ٢٦٦٠٦ - مَسْحَق مِسْحَق ٥
آلة للسحق والمُشَقّ أَكَل من المسحق العادي .

Brole (F), Brake (E). ٢٦٦٠٧ - مَسْحَقَةٌ ٥
آلة تسحق بها سوق القنب والكتان قبل مشقها .

Gourmette (F). ٢٦٦٠٨ - مَسْحَل ٥
Curb, Curb-chain (E).
سلسلة صغيرة متصلة بطرفي الشكيمة تكون تحت جحفة
الفرس السفلى .

Catalyse (F), Catalysis (E). ٢٦٦٠٩ - مَسْحَلَةٌ ٥
هي التحليل بالاملاسة أو الإختلال بمجرد ملامسة مادة
أخرى لا تتغير .

Catalytique (F). ٢٦٦١٠ - مَسْحَلِي ٥
Catalytic (E).
هو ما يتميز بالإختلال اللسي .

Poudre de sang (F). ٢٦٦١١ - مَسْحُوقِ الدَّم ٥
مركب عضوي تجدد فيه السج النباتية والحيوانية مغلف
المواد الغذائية اللازمة لجسمها . وهو يستفجر من الدم
بعد تجفيفه ومعالجته للقضاء على رائحته الكريهة . مظهره
الخارجي حبيبات دقيقة سمره اللون سواء المواجه للامع .
يستعمل في أعلاف الدواجن على اختلاف أنواعها ويستعمل
في الزراعة كمهاد أزوتي عضوي لأنه يحوي من ١٠ إلى
١٤ ٪ من الأزوت . وهو من أنشط الاسمدة الطبيعية
لكنه يبطئ الانفعال والتأدية .

Poudre d'os (F). ٢٦٦١٢ - مَسْحُوقِ الْعَظْمِ ٥
سماد فسفوري عضوي يصنع من العظم الذي يحوي
الكثير من فسفات الكلس وكميات الكلس || أشكاله
التجارية المستعملة ثلاثة : الخام واللاشحي واللاهلامي .

Poudre d'os brut (F). ٢٦٦١٣ - مَسْحُوقِ الْعَظْمِ الْخام ٥
هو المتأخر من سحق العظام كما هي دون معالجتها وهو يحوي :

من ١٥ إلى ٢٥ ٪ من الجافس الفسفوري
ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت

غير أن ما يحوي من شحم ، يؤثر فاعلية الحسب وينشط
بعض الأوصام البكتيرية المؤذية ، يجعله محدود الاستعمال .

Poudre d'os dégraissée (F). ٢٦٦١٤ - مَسْحُوقِ الْعَظْمِ اللَّاشِحِي ٥
هو المتأخر من سحق النظام بعد استخلاص ما فيها من شحم .
وهو يحوي :

من ١٥ إلى ٢٠ ٪ من الجافس الفسفوري
ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت

وهو قليل الاستعمال كسحق العظم الخام .

٢٦٥٨٨ - مَسْتَوَاتِ الْبُرُور ، وَعَالِيَاتِ الْبُرُور
Angiospermes (F), Angiosperms (E).

أحد قسمي باديات الزهر وهو يشغل النباتات التي تكون
ببيضها في مبيض وبزرتها في ثمرة || تقسم مستورات
البرور إلى قسمين : وحيدات الفلقة وذوات الفلقتين .

٢٦٥٨٩ - مَسْتَوَاتِ الزَّهَر ، خَفِيَّاتِ الْوَلَعِ
Cryptogames (F), Cryptogames (E).

قسم من المملكة النباتية ، نباتاته مستورة أعضاء التناسل
تجتمع إلى ثلاثة صفوف : مستورات الزهر الوعائية ،
الطحلبيات والمشريات .

٢٦٥٩٠ - مَسْتَوَاتِ الزَّهَرِ الْوَعَائِيَّةِ
Cryptogames vasculaires, Pteridophytes (F). Vas-
cular cryptogams, Pteridophyta (E).

صف من النباتات الخفيات الأعضاء التناسلية . أشهر
نباتاتها السراخس والكنبانيات التي تحمل ثلاثة أعضاء فقط
وهي الجنذور والسوق والأوراق .

٢٦٥٩١ - مَسْتِيك ، مَعْتَجُونِ التَّطْعِمِ
Mastic à greffer (F), Mastic for graft (E).

مادة مركبة عازلة يستعملها البستاني في ستر جروح التطعيم
أو التقليل لوقايتها من الهواء والحرارة .

٢٦٥٩٢ - مَسْتِجَالَةٌ ٥
Marrière (F), Marl-pit (E).
المسجالة هي مقلع السجيل .

٢٦٥٩٣ - مَسْتِجَلَةٌ ٥
Marrière (F).
هي المسجالة

٢٦٥٩٤ - مَسِج ٥
Arpentage (F).
Land-measuring (E).
قياس مساحة الأرض .

٢٦٥٩٥ - مَسْحَاء ٥
Terre plate (F), Flat land (E).
أرض مستوية ذات حصى صفار . ج. مساح وساحي .

٢٦٥٩٦ - مَسْحَاب ٥
Néphoscope (F).
Nephoscope (E).

جهاز يستعمل لدرس تحركات السحب .

٢٦٥٩٧ - مَسْحَاة ٥
Niveleur (F), Leveller (E).
أداة يستعملها البستاني لتبسيط الأكواد وصنع أعضاده .

٢٦٥٩٨ - مَسْحَاة آليَّة ٥
Ravale (F).
آلة زراعية مجرورة تستعمل لبسط التراب وتسويته .

٢٦٥٩٩ - مَسْحَاة ٥
Anémographe (F).
Anemograph (E).


جهاز يسجل سرعة الريح واتجاهها ومقدارها .

٢٦٦٠٠ - مَسْحَاة ٥
هو المجراد ، اعطيه .

٢٦٦٠١ - مَسْحَاة ٥
Aérifère (F).
Aeriferous (E).

نمت تعريفية يطلق على ما هو غنص ينقل الهواء اللازم
تنفس عند النبات والحيوان . نسيج مسحاحي ، فموات
مسحاحية ...

٢٦٦٠٢ - مَسْحَال ٥ ، وَسِيط ٥
Catalyseur
جسم يحدث التحليل بالاملاسة .



مسحاج

٢٦٦١٥ - مَسْحُوقُ الْعَظْمِ اللَّاهُتَامِي

Frayère (F). مَسْرَا

Spawning place or season (E).

المكان حيث يبيض السمك .

Oviducte (F). Oviduct (E). مِسْرَاة

الممرأة قناة المبيض .

Poi glanduleux (F). مَسْرَبَة

Glandulous down (E).

عضو ليفاني خفي ادب ينشأ على مختلف اجناس النبات .
ج مسارب .

Esophage (F). مَسْرَط ، مِسْرَط

Esophagus (E).

هو مجرى الطعام في الحلق ويدعى البلعم والرءى .

Balzane haut-chaussée (F). مَسْرُوك

الفرس مسرك اذا بلغ التجيب الركبتين او المرقوبين .

Régime (F) Rule (E). مَسْرَى

هو مجموعة القواعد المفروضة او المنية .

Planimètre (F). مَسْطَاح *٥

Planimeter (E). جهاز يستعمل في قياس السطح .

Moût (F). Must (E). مَسْطَارة ، مِسْطَار

عصير العنب الجديد قبل أن يستحيل الى خمر .

Banquette (F). مَسْطَبَة

Bench terrace (E).

سطح من الارض كفافه من التراب او الحجارة يصنع في المواقع المنحدرة منحا لانجراف التربة .

Palier (F). مَسْطَاح ، صَفْرَة

Landing, Stair-head (E).

٢٦٦٣٨ - مَسْطَاح مَسْرَازِي الْأَصْلَاع

Parallélogramme (F). Parallelogram (E).

٢٦٦٣٩ - مَسْطَاح مَسْطِيل

Parallélogramme rectangle (F). Rectangular parallelogram (E).

٢٦٦٤٠ - مَسْطَاح مَعِين

Parallélogramme oblique (F). Oblique parallelogram (E).

٢٦٦٤١ - مَسْطَرَّة ، أَنْمُودَج

Echantillon (F).

Sample, Pattern (E).

٢٦٦٤٢ - مَسْطَرَّة الْإِرْتِفَاع

Mire (F). Slight (E).

هي المير ، جهاز يمكن من تحديد الارتفاع النسبي .

٢٦٦٤٣ - مِسْعَار *٥

Calorimètre (F).

Calorimeter (E).

جهاز يستعمل في قياس كيات الحرارة الناتجة والصادرة والواردة .

٢٦٦٤٤ - مِسْعِرِي ، حَرَكَرِي

Calorifique (F).

Calorific (E).

نمت تمريني توصف به الاشياء التي تولد الحرارة .

٢٦٦٤٥ - مِسْعِرِيَّات

Calorimétrie (F).

Calorimetry (E). درس طبيعي يبحث في قياسات الحرارة .

Poudre d'os déglutiné (F).

هو المتأني عن سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم وعلام . مظهره الخارجى مسحوق ناعم اريد اللون يحوي :
من ٢٦ الى ٣٤ ٪ من الحامض الفسفوري
ومن ١٥ الى ١٢ ٪ من الازوت
وهو جزيل الفائدة شائع الاستعمال .

٢٦٦١٦ - مَسْحُوقُ الْقَرْنِ

Poudre de corne (F).

Horn meal (E).

سماد عضوي ينتج من سحق القرون والظلوف بعد تحميمها او معالجتها بالخيار . وهو يحوي :

من ١٠ الى ١٥ ٪ من الازوت

من ٤ الى ٦ ٪ من الحامض الفسفوري

من ٦ الى ٧ ٪ من الكلس

يعتبر من الاسمدة الجزيلة النفع الطويلة الاجل لانه يخدم في التربة اكثر من حولين .

٢٦٦١٧ - مَسْخ

Monstruosité (F).

Monstrosity (E).

ج. مسوخ . شاذ عارضة او وراثية تشوه الشكل المألوف .

٢٦٦١٨ - مِسْخَقَة *

Cultivateur (F).

Cultivator (E).

آلة تستعمل للحرث السطحي تنشق التربة دون ان تقلبها وتيعثر ذراتها .

٢٦٦١٩ - مَسْخُود *٥

Sympode (F). Sympode (E).

نعت تمريني يوصف به كل حيوان او نبات شذت بعض اعضاءه عن قاعدة الانفراد الذاتي كما في خروف البحر الذي تنحمت رجلاه . وكما هي حال القاعية في النبات .

٢٦٦٢٠ - مَسَد

Fibre

ج ساد وأساد .

٢٦٦٢١ - مَسَدَاس *٥

Sextant

جهاز يمكن من قياس الابعاد المزاوية وتحديد ارتفاع الكواكب عن الأفق .

٢٦٦٢٢ - مَسَدَاس

Sextant, Sextant d'Uranie (F). Sextans (E).

السداس كوكبة نجوم جنوبية الموقع شكلها يشبه السداس || نجوما قليلة العدد جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها .

٢٦٦٢٣ - مَسَدَاس *٥

Nébulouse (F). Cloudy (E).

اداة آلة تستخدم في ذر المساحيق فتفترها كالحباب .

٢٦٦٢٤ - مَسَدَاس

Hexagone (F). Hexagon (E).

شكل هندسي سداس الزوايا والاضلاع .

٢٦٦٢٥ - مَسَدَاسُ السُّطُوح

Hexaèdre (F).

Hexahedron (E).

٢٦٦٢٦ - مَسَدُوم

Obnubilé (F).

نعت تمريني يطلق على الاشياء التي ينشأها الغياب او الغمام او الدخان ...

٢٦٦٢٧ - مَسَدِي

Fibreux (F). Fibrous (E).



مسفة



مساس



مسطح



مساس

Arrhes (F). **مُسْكَنَة** ٢٦٦٦٣
Earnest, Deposit (E).
هو المبرين الذي يدفعه احد طرفي العقد الى الآخر
ساعة التعاقد .

٢٦٦٦٤ - **مِسْكَبَة ، كَوْدَة**
Planche à semis, Planche surélevée, Plate-bande (F).
Border, Bed, Seed-bed (E).
مستطيل من التراب ارفع من سطح التربة مستقيم الاضواء
محاط بممر ضيق .

Bouillon blanc (F). **مُسْكِر الحَوْت** ٢٦٦٦٥
هو البوصير ، اطليه .

Local d'habitation (F). **مَسْكَن** ٢٦٦٦٦
Dwelling-local (E).
المسكن او محل السكن هو المكان الذي يختصه المروء
لسكنائه .

Habitation rurale (F). **مَسْكَن زُرَاعِي** ٢٦٦٦٧
Rural residence (E).
كل بناء او بيت ريفي يسكنه من اقام في الريف او
تدود حل الريف مها كانت طبقة الاجتماعية . راجع
بيت زراعي .

Massicot **مَسْكُوت** ٢٦٦٦٨
هو بروكسيد الزئبق الاصفر اللون .

Moschifère (F). **مِسْكِي** ٢٦٦٦٩
Moschiferous (E).
نعت تعريفي يطلق على الاجهزة الخاصة التي تفرز مادة
المسك ويجمعها عند الحيوان .

Muscat (F). **مُسْكَاة ، مُسْكَاك** ٢٦٦٧٠
صفة العنب المسكي العرف وفي الكرومة غروب عديدة
مشهورة بهذا العرف المذاني .

Moschins (F). **مِسْكِيَات** ٢٦٦٧١
نفة من فصيلة الأليات تشمل جنساً واحداً يدعى أيل
المسك .

٢٦٦٧٢ - **مِسْلَاح**
النخلة التي يكثر بصرها وهو اخضر . وفي حديث مسا
يشترطه المشتري على البائع انه ليس له مسلاح ولا مخضار .

Erode (F). **مِسْلَة** ٢٦٦٧٣
نوع من الجراب ، مشهور باسم ابو مشقة ، اطليه .

٢٦٦٧٤ - **مَسْلَح ، مَهْيَس**
المكان الذي يكثر فيه سلح الطير .

Abattoir (F). **مَسْلَح** ٢٦٦٧٥
Slaughter-house (E).
المكان المخصص لسلخ وفضاء الحيوانات ويدهى المخزير .

٢٦٦٧٦ - **مِسْلَقَة ، مِسْلَق**
Scarificateur (F). Scarificator, Hoeling-machine (E).
اداة تيمر ذرات التراب وتسوي سطح التربة وتقلع
الاعشاب .

Malcolmia (S). Malcolmie (F). **مِسْمَاح** ٢٦٦٧٧
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات .

Pal injecteur (F). **مِسْقَطَة** ٢٦٦٤٦
Soil injector, Root injector (E).
أداة زراعية تستعمل في حقن التربة لمكافحة بعض الحشرات
والاصنام النباتية .

Homéotherme (F). **مِسْقُور** ٢٦٦٤٧
Hom:othermal (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان ثابت الحرارة المستقرة .

Courbine (F). **مِسْقَار** ٢٦٦٤٨
سمكة بحرية تدعى مصقار ، اطلها .

Masca (F). **مِسْقَة** ٢٦٦٤٩
سمكة بحرية تدعى أيضاً غليود ، اطلها .

Projection **مِسْقَط** ٢٦٦٥٠

٢٦٦٥١ - **مِسْقَط أفقي**
Projection horizontale (F). Horizontal projection (E).

٢٦٦٥٢ - **مِسْقَط رأسي**
Projection verticale, Élévation (F). Vertical projection, Elevation (E).

Projection **مِسْقَط عمودي** ٢٦٦٥٣
orthogonale (F). Orthogonal projection (E).

Cypres (S). **مِسْقَلَة ، وَدَعَة** ٢٦٦٥٤
Porcelaine (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات المذليات . انواعها
عديدة . اسديانها صغيرة القد ، شبه بيضية ، مبطلة .
تكثر في بحار البلاد الحارة . تستعمل لتزيين الدواب .

Irrigué (F). Irrigate (E). **مِسْقُوي** ٢٦٦٥٥
المسقوي او المروي هو كل زرع يسقى .

Peau de poisson (F). **مِسْك** ٢٦٦٥٦
Fish skin (E).

المسك هو جلده المسك . ج مَسُوك .

Musc (F). Musk (E). **مِسْك** ٢٦٦٥٧
مادة دهنية عطرية سمره اللون يفرزها أيل المسك .

٢٦٦٥٨ - **مِسْك الجن**
اسم يطلق على عدة نباتات اغصنها حشيشة الريح
والقيصوم .

٢٦٦٥٩ - **مِسْك الدَّقَاتِر** هي الحماصة .

٢٦٦٦٠ - **مِسْك زُوْمِي**
Tubéreuse (F).
هو الزنبق نبات تزييني من النرجسيات .

٢٦٦٦١ - **مِسْكَار** *
Saccharimètre (F).
Saccharimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس مقادير السكر الموجودة في
السوائل . ويدعى أيضاً مقياس السكر ومسقار .

٢٦٦٦٢ - **مِسْكَاك** هو المجرأ ، اطليه .



مسقة



مسكار



مسلفة

Brousse (F). Bush (E). ٢٦٦٨٨ - مُسْتَف ٥

المست كل فلاة أو فيفاء أو سهب تعلوها بعض الاشجار
المبشرة التجميع . ج سائف .

Odontoglosses (F). ٢٦٦٨٩ - مُسْتَنَات الأَسِنَّة

فئة من الرغويات تحمل في أطراف السنبها بعض الانسان
الصغيرة الذرية .

Courant d'air (F). ٢٦٦٩٠ - مُسْتَح ٥

Wind current (E).
مر الريح وبجراها في اي مكان او موقع كان .

Gorge-bleue (F). ٢٦٦٩١ - مُسِير

هو المزقة ، طائر من الدغليات ، اطلسا .

Aristolochie siphon (F). ٢٦٦٩٢ - مُسَهَوْرَة

هو زراوند سيفو ، اطلسا .

Courant d'air (F). ٢٦٦٩٣ - مُسَهَك

Air current (E).
هو المسح اي مر الريح او مجرى الهواء .

Purgatif (F). ٢٦٦٩٤ - مُسَهِل

Purgative, Purging (E).
دواء يطلق البطن . اشهر مسهلات الحيوان : سلفات السودا
وسلفات المغنيزا وزيت الخروع .

Cheval demi-sang (F). ٢٦٦٩٥ - مُسَهْم ، مُسَهَب

Half-bred horse (E).
الفرس الهجين .

Spatule (F). ٢٦٦٩٦ - مُسَوَاط

Spatula, Palette-knife (E).
أداة من خشب تستعمل لطيح الزبدة وسمات المعجونات .

Cadran (F). Dial-plate, Dial (E). ٢٦٦٩٧ - مُسَوَاق

Oldenlandia (S). ٢٦٦٩٨ - مُسَوَاك *

Oldenlandia (F). Indian madder (E). Oldenlandia (D). Oldenlandia (I).
جلس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القويات . أنواعه
نحو ٢٠٠ ، اعطائها البلاد الحارة . معظمها بري وبعضها
زراعي صناعي يستخرج من جذوره مادة صيفية حمراء
اللون .

Passorage (F). ٢٦٦٩٩ - مُسَوَاك الزراعي

هو العصاب ، نبات من فصيلة السليبيات ، اطلسا .

٢٦٧٠٠ - مُسَوَا ، مُجَبَّنة ، مُنْقَحَة

Présure (F). Rannet (E).

خيرة قابلة للذوبان تستخرج من منقعة الجدي الرقيق .
تستعمل في تجميد الحليب .

Dominé (F). ٢٦٧٠١ - مُسَوَد ، مُسَوَدَة

Dominated (E).
نمت تمرني يطلق على كل شجرة لا يزيد ارتفاع سنبها
عقب قمة الشجرة السائدة .

Eau saumâtre (F). Briny (E). ٢٦٧٠٢ - مُسَوَس

المسوس الماء بين العذب والملح . قال الرازي :
ولو كنت ماء كنت لا عذب للمذاق ولا مسوا



مسنة



مسوك

انواعها عديدة منبها حوض البحر المتوسط . سفيها فرماء
تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . أوراقها متعاقبة اهليلجية مقطوعة .
نصلها خلي البثرة سمن الحافة . ازهارها طرفي الاوتكاز ،
عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد يكثر فيها الابيض
والاحمر والقرنزي || اشهر انواعه الزينية ما يتبع .

Malcolmia maritima (S).

Malcolmia bicolor (S).

Malcolmia littorea (S).

سلاح بحري

سلاح ثنائي اللون

سلاح مجاهشي

٢٦٦٩٨ - مُسَاك

Palisseau (F). Vine-stick (E).

هو المرزح ، مسند يستعمل لدم الكرمة او لرفعها عن التربة .

٢٦٦٩٩ - مُسَس

Acanthe-ursine (F).

نبات يدعى اقنثا رهلة ، اطلسا .

٢٦٦٨٠ - مُسْتَقَار ، مُسْتَقَرَان

Aristolochie cotonneuse (F).

هو الزراوند الازغب ، اطلسا .

٢٦٦٨١ - مُسْمَكَة

Piscine, Vivier (F).

Fish-pond, Fish-well, Stew (E).

حوض كبير تربى فيه الاسماك .

٢٦٦٨٢ - مُسْتَا

Digue (F). Dike, Embankment (E).

حاجز يقام في وجه المياه لتحويل جزء منها او لتخفيف
سرعة انسيابها .

٢٦٦٨٣ - مُسَج

Bigarré, Rayé (F).

Motley, Streaked, Striped (E).

صفقة الشيء المجهج .

٢٦٦٨٤ - مُسْتَجِل

Anergic (F).

نمت تعريفي يطلق على من اضمحلت فيه عوارض الاندفاع .

٢٦٦٨٥ - مُسْتَد

Tuteur (F). Prop (E).

هو كل عود يوضع بجانب الفرسة او الشجيرة لتسند اليه .
لذلك يحسن ان يكون مستقيماً وان لا يقل متوسط قطره
عن ٤ سم . افضلها اصليها كالسنديان والبلول... تقطع
المساند في اواخر الربيع فتخلق وتنشر اطرافها العليا
بالمخارص وتثبت اطرافها السفلى التي تستغل التربة بالمنجل
او بالقدوم ثم تقطع بمحلول سلفات النحاس وتثبت
كذلك حتى ينضج المحلول من قة المسند . والمحلول يتركب
من كيلو سلفات النحاس في عشرة لترات ماء . وهو يحفظ
المساند من النخر نحو سبعة ايام . ويحميها من المهرقان
الذي ان اسبابها تقتضي الى جميع الاغراس والاشجار .

٢٦٦٨٦ - مُسْتَد

Espalier (F).

الخط من الاشجار المشرفة القائمة على جدار . ج مسندات .

٢٦٦٨٧ - مُسْتَدَة *

Mussaenda (S). Mussende (F).

جلس نباتات جنينية من فصيلة القويات . انواعه المعروفة
زهاء ٥٠ . جميعها من نباتات العالم القديم . اعطائها البلاد
الاستوائية والحارة . سفيها فرماء . أوراقها متعاقبة اهليلجية .
ازهارها عذقي التجميع ، تاجي الاوتكاز . ازهارها خماسية
التركيب ، مسطيلة الانابيب . لحاء سفيها واقلها حامضة .
اوراقها تدمل القروح . ازهارها تنفع الصدر وتذهب بالسعال
وتقلل الجروح .

٢٦٧١٢ - مَسْبَس * ، شَجَرَة الجِرْح ، تَبِغ
Nicotiana glauca (S).

نوع من تبغ رستيقا وهو جنية برية معمرة في المناطق الحارة ، حولية في المعتدلة . يعيش على السواحل اللبنانية . ساقه خشبية منتصبة فراء تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه متعاقبة ، متبادلة الارتكاز ، معققة ، مستطيلة الزناد . نصلها رمعي الشكل ، جامد الصلابة ، بحري اللون . ازهاره خماسية التركيب ، طرفية الارتكاز ، صفراء اللون . ثماره جراء رباعية الفلق تلتف بعض الزهور الدقيقة ، الكروية ، الكستنية اللون || يقال ان اوراقه طبية تقيد الجراح وتلأها .

٢٦٧١٣ - مَسْبَكَة
Terre imperméable (F).
Impermeable soil (E).

المسكة من الارضين التي تمسك الماء وتمنع انصرافه .
٢٦٧١٤ - مَسْبَكَة
Armoise dorée (F).

هي القيصوم الكافوري ، اطليه .
٢٦٧١٥ - مَسْبَكَة
Erodium moschatum (F).

هي الجذاب المسكي ، اطليه .
٢٦٧١٦ - مَسْبَل
Hydromètre (F).

مقياس كثافة السوائل وقوة اندفاعها .
Hydrometer (E).

٢٦٧١٧ - مَسْبَل
Baradine (F).

هو الخندق الذي يصنع في الارض الجبلية المتحدرة لبيع الاطمار وتوجيهها نحواً من اضراسها .
٢٦٧١٨ - مَسْأَة
Périlpédicé (F).

المشاء من اتبع فلسفة ارسطو .
Perilpatic (E).

٢٦٧٢٠ - مَسْأَلِي ، تَرْمَدَ كَافِي
Pépinieriste (F).

هو من تعاطى استئثار المشاتل .
Nurseryman (E).

٢٦٧٢١ - مَسْأَرَة
Apomixie (F).

هو التكاثر أبتل العادم الاخصاب .
٢٦٧٢٢ - مَسْأَرَة
Ferme, Métairie (F).

ارض زراعية يديرها صاحبها بعقد .
Farm, Small farm (E).

٢٦٧٢٣ - مَسْأَرَة ، إِشْتِرَاط
Stipulation (F).

هي كل شرط او اتفاق او قيد ينص عليه في العقد .
٢٦٧٢٤ - مَسْأَرَة التَحْكِيم
Clause compromissoire (F).

Stipulating arbitration of clause (E).

شرط الزامي منصوب يقضي على المتعاقدين بان يطرحوا المنازعات التي تنشأ فيما بينهم من هذا العقد على محكمين يعينهم .

Solarium (S).

Solarium, Cadran (F). Solarium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وقصيلة المسقيات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداها مدورة محززة الخمار والصلابة ، ملونة ومرتقة اجسامها مستطيلة . رؤوسها قصيرة عادمة الاطلام ثنائية اللواس المعروفة . اسقاطها قرينة المادة .

٢٦٧٠٤ - مَسْأَلِيَّات
Solarilidae (S).

Solarilidae (F). Solarilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل امابيات الخياشيم . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اصداها مدورة ، صاجية السطح ، محززة الخمار ، ملونة ، مرتوقة ، متساوية الزخوة والرفشة || اعرف اجناسها واشهرها المسوقة .

٢٦٧٠٥ - مَسْأَلِيَّة
Responsabilité (F).

Responsability (E).

هي الالتزام بازالة الضرر الواقع على الغير بفعل المرم او سببه او بفعل غيره . وتستعمل في الصيغ التالية :

مسؤولية الاعسار (F).
مسؤولية المرم عن فعل غيره

Responsabilité du fait d'autrui (F).

مسؤولية المرم عن فعل حيوانه
Responsabilité du fait des animaux (F).

مسؤولية المرم عن الاجادات
Responsabilité du fait des choses inanimées (F).

مسؤولية المرم عن مبانیه
Responsabilité du fait des bâtiments (F).

مسؤولية تعاقدية
Responsabilité contractuelle (F).

مسؤولية قانونية
Responsabilité légale (F).

مسؤولية مخففة
Responsabilité atténuée (F).

مسؤولية مدنية
Responsabilité civile (F).

مسؤولية مشتركة
Responsabilité partagée (F).

٢٦٧٠٦ - مَسْبَاح
Capacimètre (F).

Capacimeter (E).

جهاز يستعمل في قياس السعة الكهربائية .



مسوقة



مسيس

٢٦٧٠٧ - مَسْبَل
Fluximètre (F).

Fluximeter (E).

جهاز يستعمل في قياس سيولة الدفع المغناطيسي واستدلالة .

٢٦٧٠٨ - مَسْبَب
Aval (F). Down-stream (E).

المنصب او ساقطة النهر هي الجهة التي تستلقي المياه الجارية .

٢٦٧٠٩ - مَسْبِيج ، مَدْيَب
Dissolvant (F).

Dissolvent (E).

٢٦٧١٠ - مَسْبَد
Codominant

نعت تعريفي مرجعي يطلق على الانجبار المشتركة في السيادة .

فالشجرة المهيمنة هي التي تكون قمتها او جزء منها تحت مستوى قن الانجبار السائدة .

٢٦٧١١ - مَسْبِير
Trajectoire (F). Trajectory (E).

خط سير الاجرام المتحركة . ج مسائر .

Haras (F).

Breeding-stud, Stud (E).

مُوسَة تَعْنِي بِكَرَامِ الْخَيْل الْمُدَّة لَزَو.

Caniveau, Emissaire (F).

Channel stone, Gutter, Overflow channel (E).

قَنَاة لَصْرَف الْمِيَاء، وَهِيَ قَنَاة الصَّرَف الْإِسْأَسِيَّة الَّتِي تَنْتَهِي إِلَيْهَا مِيَاء الْإِسْرَابِ وَمَا شَب.

Amentifère (F).

مُشَبَّرَق ٥

مِن النَّبَات مَا كَانَ أَزْهَارُهُ قَدْ ذِي الشَّكْل كَالشَّجَرَةِ.

Rassasiat (F).

مُشْبِع

نَمَت تَعْرَبِي يُطْلَق عَلَى كُلِّ تَبْغ مُنْجِم الصِّفَات الْمَذَاقِيَّة الَّتِي تَتَمَرَّكُ دُونَ الْقَاعَةِ وَفَوْقِ الْمَوْزُونَةِ.

Imprégné (F). Impregnated (E).

مُشْبِع، مُشْرَب، مُغَمَّر

Prévenu (F).

Accused (E).

مُشْبُو، فَطِين

هُوَ الَّذِي تَلْقَى عَلَيْهِ شَبَّة أَقْرَافِ الْجَرِيمَةِ.

Dispersif (F). Dispersive (E).

مُشْتَات

Extracteur (F). Extractor (E).

مُشْتَارَك ٥

جِهَاز آَلِي يَسْتَعْمَل لِاسْتِخْرَاج الْعَسَل مِنَ التَّخَارِيبِ وَذَلِكَ بِتَأْتِيرِ الْقُوَّةِ الْتَائِبَةِ.

Indivisaire (F). Co-parcener (E).

مُشْتَاع، مَالِك عَلَى الشُّبُوع

هُوَ مَا يَمْلِكُ مَعَ غَيْرِهِ مَالًا عَلَى الشُّبُوع.

Collectif (F). Collective (E).

مُشْتَرَك

Hamamelidaceae (S).

Hamamélidacées (F). Hamamelidaceae (E).

فَصِيلَةٌ نَبَاتِيَّةٌ مِنْ ذَوَاتِ الْفَلَقَتَيْنِ. نَبَاتَاتُهَا الْأَجَارُ وَشَجِيرَاتُهَا. أَوْرَاقُهَا مَدْنَقَةٌ أَذْنِيَّةٌ. أَزْهَارُهَا خَشْوِيَّةٌ. ثَمَرُهَا جَرَاهُ صَغِيرَةٌ. مَعْظَمُ أَنْوَاعِهَا بَرِّي وَبَعْضُهَا طَبِيعِي وَزَيْتِي.

Hamamelis (S). Hamamèle, Hamamélis, Noisetier sorcier (F). Witch hazel (E). Zanbernuis (D). Amamelide, Trilopo (I).

جَنْسُ شَجِيرَاتٍ وَجَنْبَاتٍ بَرِّيَّةٍ وَزَيْتِيَّةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْمُشْتَرَكَاتِ. أَنْوَاعُهَا قَلِيلَةٌ الْبَدَدُ. أَوْرَاقُهَا مُتَمَاقِيَّةٌ مَدْنَقَةٌ عَابِلَةٌ. نَعْلَمُهَا بِبَعْضِ الصَّفْحَةِ سَمَّنِ الْخَلْفَةِ. أَزْهَارُهَا مَحْجُورَةٌ (الْإِنْكَازُ)، جِلَّةُ الشَّكْلِ، وَبِأَيِّهِ أَوْ خَاسِيَةِ الْبِتَلَاتِ || أَوْرَاقُهَا وَطَاءُ سَوْفَهَا طَبِيعِيَّةٌ تَسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الْمَلَاغِاتِ الصَّدْرِيَّةِ.. أَشْهُرُ أَنْوَاعِهَا الْزَيْتِيَّةُ مَا عَلَى.

Hamamelis mollis (S). Hamamélis veloucé (F).

شَجَرَةٌ مُتَوَسِّطَةُ الْقَدِّ فَارِشَةٌ تَعْلُو نَحْوَ ١٠ أَسَار. مَهْدُهَا الْعَمِين. أَوْرَاقُهَا خَلِيَّةُ الْبُشْرَةِ عَلَى صَفْحَاتِهَا السُّفْلَى، أَزْهَارُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ، خَافَتِ الْمَرْفُ، لَوْنُهَا إِلَى الصُّفْرِ الزَّاهِي، كُؤُوسُهَا خَرَبِيَّةٌ عَابِلَةٌ || أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنَ الْوَسْعِ كَانُونِ إِلَى الْوَسْعِ إِذَا ر.

مُشْبَاة ٢٦٧٣٨

٢٦٧٣٧ - مُشَاش هُوَ الْعَظْمُ الطَوِيلُ، أَعْلَاهُ.

٢٦٧٣٨ - مُشَاشَة ل'extrémité des os

Notopterus (S).

Notoptère (F). Notopterus (E).

جَنْسُ إِسْمَاكٍ بَحْرِيَّةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْمَشَاطِيَّاتِ. أَنْوَاعُ الْمَرْفُوقَةِ قَلِيلَةٌ الْبَدَدُ مُنْتَشِرَةٌ فِي بَعْضِ الْإِنْدِيَّةِ الْأَسْيُورِيَّةِ أَخْصَصًا أَنْهَرُ وَأَخْوَارُ الْعِرَاقِ وَادْنَه. جَمِيعُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ تَطُولُ مِنْ ٦٠ إِلَى ١٠٠ سَم. زَعَانِفُهَا الظَّهْرِيَّةُ صَغِيرَةٌ ضَعِيفَةٌ. زَعَانِفُهَا الْبَطْنِيَّةُ وَالشَّرْبِيَّةُ مُتَمَاقِمَةٌ كَالْمَشَطِ. لَحْيُوهَا مَأْكِرَةٌ مُتَوَسِّطَةُ الصَّنْفَتِ || أَشْهُرُ أَنْوَاعِهَا مُشَاشٌ، شِيلَاتَا (Notopus chilata) الَّتِي لَا يَقِلُّ طَوْلُهُ عَنْ ١٠٠ سَم. وَالَّذِي يَكْثُرُ وُجُودُهُ فِي أَخْوَارِ الْهِنْدِ وَمَلِيزِيَا.

Notopteridae (S).

Notoptéridés (F). Notopteridae (E).

فَصِيلَةُ إِسْمَاكٍ بَحْرِيَّةٍ وَزَيْتِيَّةٍ مِنْ مَفْتُوحَاتِ الْمَتَانَةِ. أَجْنَاسُهَا وَأَنْوَاعُهَا الْمَرْفُوقَةُ قَلِيلَةٌ الْبَدَدُ جَمِيعُهَا مِنْ إِسْمَاكٍ مَاطِلٍ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ || أَشْهُرُ أَجْنَاسُهَا الْمَشَاطِ.

Indivis (F). Undivided (E).

مُشَاق

الْمَلِكِيَّةُ الشَّائِعَةُ غَيْرُ الْمُنْقَسَةِ.

Pecten (S).

Peigne (F). Pecten (E).

جَنْسُ حَيَوَانَاتٍ بَحْرِيَّةٍ مِنَ الرِّخَوِيَّاتِ صَفِيحِيَّاتِ الْخَيْشَمِ وَفَصِيلَةُ الْمَشَاقَاتِ. أَنْوَاعُ الْمَرْفُوقَةِ عَدِيدَةٌ مُنْتَشِرَةٌ فِي مَعْظَمِ دَوَارِ الْعَالَمِ وَأَخْصَصًا الْبِلَادُ الْمُتَمَدِّلَةُ الْحَارَّةُ || أَصْدَانُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ، شَبَّهِ رَمْسِيَّةِ الشَّكْلِ، شَعَاعِيَّةُ التَّخْذِيدِ، لَا تَسْتَوِي الْمَصَارِيحَ، الْإِيْمَنُ مِنْهَا شَدِيدُ التَّخْذِيدِ قَلِيلُ التَّخْذِيدِ || تَعْمِشُ طَلِيْقَةً عَلَى الرِّمَالِ وَتَتَقَلَّبُ بِسَرْعَةٍ. لَحْيُوهَا مَأْكِرَةٌ جَيِّدَةُ الصَّنْفَتِ.

٢٦٧٣٣ - مُشَاقَّة، مُشَقَّة، هُبُر

Filasse (F). Filasse, Hari, Tow (E).

مَا خَلَّصَ بِالْمَقْطَعِ مِنَ لُحَاةِ النَّبَاتَاتِ اللَّيْجِيَّةِ كَالْكَنْكَانِ وَالْقَنْبِ قَبْلَ غَزْلِهِ.

٢٦٧٣٤ - مُشَاقَّة (F). Hemp-herb (E).

هِيَ قَشُورُ الْقَنْبِ وَالزَّرَبُونِ.

Pectinidae (S).

Pectinidés (F). Pectinidae (E).

فَصِيلَةُ حَيَوَانَاتٍ بَحْرِيَّةٍ مِنَ الرِّخَوِيَّاتِ صَفِيحِيَّاتِ الْخَيْشَمِ الرَّبَاعِيَّةِ عَادَمَاتِ الْمَتَابَعِ. أَجْنَاسُهَا وَأَنْوَاعُهَا الْمَرْفُوقَةُ عَدِيدَةٌ مَعْظَمُهَا مِنْ مَحْجَرَاتِ الْأَرَاكِسِ الثَّلَاثِيَّةِ. أَنْوَاعُهَا الْمَاعِزَةُ مُنْتَشِرَةٌ فِي مَعْظَمِ بَحَارِ الْبِلَادِ الْمُتَمَدِّلَةِ الْحَارَّةِ || أَصْدَانُهَا مُتَمَاقِمَةٌ الْإِشْكَالِ وَالْإِحْجَامِ، بَالِغَةُ التَّخْذِيدِ، لَا تَسْتَوِي الْمَصَارِيحَ || أَعْرَفُ أَجْنَاسُهَا الْمَاعِزَةُ الْمَشَاقِ.

Narthécie (F).

مُشَان

هُوَ الْكِرْمَدَانُ، أَعْلَاهُ.

Péripatétisme (F).

Peripateticism (E).


الْمُشَاقَّةُ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى فِلَسْفَةِ أَرِسْطُو لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَلْقَى دُرُوسَهُ إِلَّا مَاثِيًّا بِصَحْبَةِ تَلَامِيذِهِ.



مَشَاط



مَشَاق



مَشَار



مَشَرَكَة

217٥٩ - **مِشْجَارٌ** °
Dendromètre (F).
Dendrometer (E).
أداة تستعمل في قياس الانحجار لتقدير علو والحجم .

217٦٠ - **مَشَجَرٌ**
Bois (F). Wood, Forest (E).
موضع الشجر ونبتته الطبيعي .

217٦١ - **مِشْحَارَةٌ** °
Nigrospora (S).
جنس فطور مجهرية من الدغيات وفصيلة اللطحيات. تتميز
بهيئتها الثنائي التكوين والشكل . الخصب منها بسيط
التركيب ، فردي التجميع ، منتصب الارتفاع ، عايق
اللون . أما الماقر ففسي التجميع مداد . كئاشدا
كروية ، متتامة ، كثيرة العدد || أعرف أنواعه مشحارة
الذرة ومشحارة الموز .

217٦٢ - **مِشْحَارَةُ الذُّرَّةِ** °
Nigrospora oryzae (S).
فطر مجهرى يركب عرائس الذرة قرب ادراك حبا فيفسد
بهيئتها بعد ان يسبب انحلالها واسودادها مما يؤدي الى
تساقط الحب قبل الانعاش والقفاف || يدارك باجتنب
المواقع الرطبة ويكافح باستعمال مسحوق شيرلان تمغياً
على النبات .

217٦٣ - **مِشْحَارَةُ المَوْزِ** °
Nigrospora musae (S).
فطر مجهرى يركب ثمار الموز المخفوفة فيسبب اللبالب
ويقوده الى الانحلال دون ان يبدو على القشرة ما يتم من
الاصابة || يكافح عند ظهور اول اصابة بنفض الكيانات
المخفوفة بسائل شيرلان المركز من ١ الى ٢٪ .

217٦٤ - **مِشْحَبٌ**
Racloir (F). Scraper (E).

217٦٥ - **مِشْحَةٌ**
Teinte (F).
Tint, Shade, Hue (E).

217٦٦ - **مِشْحَرَةٌ ، مِشْحَمَةٌ**
Faulde (F).

217٦٧ - **مِشْحَطٌ**
Charasson, Pisseau
هو المرنجح اي المسوك، عويد يوضع تحت قضيب الكر
يرفعه عن التربة .

217٦٨ - **مِشْحَابٌ** °
Lactomètre, Pèse-lait (F).
Lactometer (E).
هو ميزان الحليب، جهاز يستعمل لتقدير نسبة المواد
السمية الموجودة في الحليب .

217٦٩ - **مِشْحَلٌ ، مِشْحَلٌ**
Baliveau (F).
Staddle (E).
كل فرع او شجرة من الخيس تركت بدون قطع لتكبر
وتصير عجة . ج. اعجاز .

217٧٠ - **مِشْحَلْبٌ** °
Serpette (F).
Pruning-knif, Serpette (F).
سكين خاص يستعمل في قطع الفروع والقضبان المرضية
وفي التطعيم .

217٧١ - **مَشَرٌ ، مَشَرٌ**
مشر ومشر الشجر: خرج ورقة واكتسى خضرة .

217٥١ - **مُشْتَرَكَةٌ رِبْعِيَّةٌ**
Hamamelis vernalis (S). Hamamelis prinatensis (F).
جنية سرورية تملحو نحو ٢٠٠ سم. مهدا البلاد الامريكية.
ساقها فضاء . فروصها منتصبه . اوراقها تطول نحو ٦ سم.
نصلها مائل الصفحة . ازهارها عطرية الرائحة ، حر
الكؤوس ، صفر البتلات || ازهارها يستمر من
كانون الثاني الى اواخر اذار .

217٥٢ - **مُشْتَرَكَةٌ فِيرْجِينِيَّةٌ**
Hamamelis virginiana (S). Hamamelis de Virginie (F).
جنية سرورية تملحو من ٣ الى ٤ امتار . مهدا امريكية
الشالية . اوراقها مائلة الصفحة تطول من ٥ الى ٨ سم.
ازهارها صفراء اللون . ازهارها ينتنؤ عند اعيال الورق
ويستمر من اواسط ايلول الى اواسط كانون .

217٥٣ - **مُشْتَرَكَةٌ يَابَانِيَّةٌ**
Hamamelis japonica (S). Hamamelis japonais (E).
شجرة سرورية صغيرة القد فائزة تملحو من ٤ الى ٧ امتار .
مهدا اليابان . ضروبها الاربعة . الوان ازهارها
تختلف باختلاف ضروبها منها الاصفر الذهبي والكبريتي
والبيروني والبرتقالي . جميعها عطرية مستحبة العرف .
ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

217٥٤ - **مُشْتَرِيٌ ، بِرْجِيسٌ**
Jupiter (F).
Jupiter (E).

المشتري او البرجيس اكبر كوكب في مجموعة النظام
الشمسي . يمتد الى كوكب بعد الزهرة . موقعه بين المريخ
وزحل . جرم كتله يفوق جرم الارض نحو ١٢٩٥ مرة
وقطره يفوق قطر الارض نحو ١١ مرة . سرعة دورته
الانقلابية في الفضاء نحو ٤٦٩٨٠ كيلومتر بالساعة .
دورته المحورية حول الشمس تستمر نحو ١٢ سنة . مدة
اليوم البرجيسي نحو عشر ساعات . ويدور في فلكه اربعة
اقار كبيرة وثمانية صغيرة . اسماء الكبيرة : ايو ، اروب ،
غانيد ، كليتيو . اما الصغيرة فاراقها من ٥ الى ١٢
لانها لا تحمل اسماء || والمشتري يسمن المشتري السعد
الاكبر لانه فوق الزهرة في السعادة واضافوا اليه الخيرات
الكثيرة والسعادات العظيمة .

217٥٥ - **مُشْتَقٌ**
Dérivé (F).
Derivative, Drifted (E).

217٥٦ - **مِشْخَلٌ ، مُسْتَنْبَتٌ ، دُلْدَالَةٌ**
Pépinière (F). Nursery (E).
مكان تستنبت فيه الفراس والنباتات المختلفة فنشأ فيه
وتكثرت فترة من الزمن الى ان تنقل وتزرع في مستقرا .

217٥٧ - **مِشْخَلُونٌ ، شَاوِلٌ**
Plantoir (F).
Dibble (E).
أداة من حديد او خشب تستعمل في التشثيل اي غرس
الشثول .

217٥٨ - **مِشْشَنٌ** °
Filière (F). Spinneret (E).
المشش القوقعة التي يخرج منها الخيط عند بعض الحشرات
كخيط الحرير عند دودة القز وكالتواس عند الرقيا ||
وهو ايضاً جهاز من الفولاذ يستعمل في جذب المعادن
ومدها وتحويلها الى اسلاك .



مشثلون



مشحارة الموز



مشخاب



مشذب



مشط



مشط الراعي



مشط الراعي البري



مشط الزهراء

غشب فيها انسان تسوى بها القصاب ويغلى بها الحب .
وللمشط اشكال ، اعلمها استعمال :

Herse en bois (F). مشط خشبي
Herse rotative (F). مشط دوار
Herse tralante (F). مشط زاحف
Herse canadienne (F). مشط كندي
Herse émotteuse (F). مشط مدري
Herse souple (F). مشط مرن
Herse articulée (F). مشط مفصل
Herse norvégienne (F). مشط زروحي

26789 - مُشَط ، تَمَشِيط

Hersage (F).
Harrowing (E). حراثة سطحية بالمشط، القصد منها تنعيم التربة وتنظيفها من الاعشاب .

Chromis (F). مُشَط ٢٦٧٩٠
هو البلطي، جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة المشطيات.

26791 - مُشَط الدَّيْب

« نبات صغير طيب الرائحة يقارب الكزبرة » .

26792 - مُشَط الرَّاعِي * ، شَوْك الدَّرَاج

Dipsacus fullonum (S). Chardon à foulon (F). Bonnetier, Cardère à foulon (F). Draper's teasel, Fuller's teasel, Teazle (E). Weberkarde, Kardendistel (D). Cardo del lanajoli, Dissaco, Lattugoni (I).
نبات عشبي زراعي صناعي من فصيلة الدياسيات .
رؤوساته الزهرية حوافث شائكة متراكبة متراصة منبسطة الاطراف تؤلف كإكازاً اسطوانية تستعمل في تهذيب الصوف.

26793 - مُشَط الرَّاعِي الْبَرِّي *

Dipsacus sylvestris (S). Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux, Baignoire de Venus (F). Wild teasel, Shepherd's rod, Barber's brushes (E). Schuttkarde (D). Dissaco salvatico, Erba messella, Verga da pastore (I).
نبات عشبي بري شائك من فصيلة الدياسيات . يزوره مأكّل للمصافير اغصنها احسن واشباهه . يستعمل في النباتات الضارة لانه يطغى على سائر النباتات التي تعيش بقربه .

26794 - مُشَط الرَّجُل

Métatarse (F).
Metatarsus (E).

26795 - مُشَط الزَهْرَاء * ، مُشَطِيَّة

Scandix جنس نباتات عشبية من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة ١٠ ، جميعها برية . اوراقها متعاقبة مركبة طويلة الزناد . ازهارها غيبية التجميع يبعث اللين . تكثر بين الزروع وتوجد في جميع البلاد . اشهرها واعمها مشط الزهراء الطويل.

26796 - مُشَط الزَهْرَاء الطَوِيل

Scandix pecten-venensis (S). Scandix peigne de Venus, Aiguille de berge (F). Shepherd's needle, Venus' comb (E). Echter Nadelkerbel, Venus-kamm (D). Scandice, Forsasacco, Pettine di venere (I).
نوع من مشط الزهراء يكثر في الارض البور وبين الزروع فيعيقها ويؤذيها .

Liquomètre (F).

٢٦٧٧٢ - مُشْرَاب °

Liquometer (E).

المشرب هو ميزان المشروبات، جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في المشروبات الروحية .

Thalle (F). Thallus (E).

٢٦٧٧٣ - مُشْرَكَة

هي جهاز شجاع خفيات الزهر كالفلطور والالاع .

٢٦٧٧٤ - مُشْرَكَة

طائر صغير مديح كانه ثوب وشي (اللسان) .

26775 - مُشْرَطَة

Couleuvre à échelons (F).

هي الخفت الاشقر ، اطلبه .

26776 - مُشْرِف على الوَصِي

Subrogatuteur (F). Deputy-guardian (E).

هو الذي يقوم مقام الوصي على القاصر اذا تضاربت مصالحها، أما مهمته الاصلية فهي مراقبة اعمال الوصي .

Ecimeuse (F).

٢٦٧٧٧ - مُشْرِفَة

هي المصفة، آلة تحش الزرع عالياً غشية من الصمغان .

Boisson (F).

٢٦٧٧٨ - مُشْرُوب

Drink, Beverage (E).

Agame (F).

٢٦٧٧٩ - مُشْرُوج ، لاشِقِي

Agamous (E).

Projet (F).

٢٦٧٨٠ - مُشْرُوع ، تَصْنِيع

Project (E).

26781 - مُشْرُوعُ اسْتِيبَاقِي

Projet préalable (F). Previous project (E).

26782 - مُشْرُوعُ إِعْدَادِي

Avant-projet (F). Advance project (E).

26783 - مُشْرُوعُ الْعَقْد

Avant-contrat (F). Advance contract (E).

راجع عقد الوند .

Projet de loi (F).

٢٦٧٨٤ - مُشْرُوعُ قَانُون

Draft bill (E).

هو المشروع الذي تضعه الحكومة وتقدمه الى المجلس النيابي باسم رئيس الجمهورية ليقره ويصبح قانوناً .

26785 - مُشْرُوباتُ الْمَنَافِيعِ ، سَنِيَّاتُ الْمَنَافِيعِ

Dentirostres (F). Sicklebill (E).

رتيبة من الطيور الجارم تشمل بعض الفصائل ، اشهرها الدغليات والذغريات والشحوريات والصدريات .

26786 - مُشْرِيَّات ، نَبَاتَاتُ عَكَلِيَّة

Thallophytes (F). Thallophyta (E).

صف من المملكة النباتية . نباتاته تتكون من جرم بدني فطراً أو تلاً . وهي عادمة الجذور والسوق والأوراق والازهار . اجناسها وانواعها تمد بضعة الاف جمعها ثلاث شعب : البكتريات والخفيات والفطريات .

26787 - مُشَش

Suros (F). Splint, Tumour (E).


علة تترى الخيل وهي تريدات في الرطيف .

Herse (F). Harrow (E).

٢٦٧٨٨ - مُشَط

اداة تستعمل لتمشيط التربة . وهي « شعبة من حديد أو

- Actinales ٢٦٨١١ - مُشَعَّات
رتبة من المرجانيات تشمل العديد من الفصائل والجناس
والأنواع.
- Indicateur (F). ٢٦٨١٢ - مِشَعَار °
Indicator, Indicatory (E).
- Radiomètre (F). ٢٦٨١٣ - مِشَعَّاع
Radiometer (E).
المشاع جهاز يستعمل في قياس شدة اشعة النور.
- Compte-gouttes (F). ٢٦٨١٤ - مِشَعَّاف
Dropper, Drop-tube (E).
- Terebellum (S). ٢٦٨١٥ - مِشَعَّبَة *
Térébelle, Tarière (F). Terebellum (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل
وفصيلة الدلاعيات. أنواعها المعروفة عديدة، بعضها من
متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر معاصر
منتشر في بعض بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي ||
اصداؤها صاروخية الشكل، مستطيلة الفرعة القليلة
الانفراج. اجسامها صغيرة القد، مخروطية الاغظام
المستطيلة.
- Fané (F). Faded (E). ٢٦٨١٦ - مِشَعُون
نمت تمرني توصف به الاعضاء النباتية الذابلة.
- Atelier, Local de travail (F). ٢٦٨١٧ - مِشَعَل
Work shop (E).
هو المكان المد للشفل.
- Ænanthe (F). ٢٦٨١٨ - مِشَعِيل
هو الرازيانة، نبات من الصبوانيات، اطلها.
- Phellandre (F). ٢٦٨١٩ - مِشَعِيل مَالِي
اطلب رازيانة مالية.
- Pneumatique (F). ٢٦٨٢٠ - مِشَعَّاط °
Pneumatic (E).
- Diaphanomètre (F). ٢٦٨٢١ - مِشَعَّاف °
Diaphanometer (E).
جهاز يمكن من درس وتحديد شفاف الاجسام والسوائل.
- Babine du chameau (F). ٢٦٨٢٢ - مِشَقَر، مِشَقَر
المشقر من البعير كالجملغة من الفرس. ج. مشافر.
- ٢٦٨٢٣ - مِشَقْ سمكة بحرية مشهورة باسم مدج.
٢٦٨٢٤ - مِشَقْ مَبْدُول
- Notacanthus commun (F).
سمكة بحرية تدعى مدج مبدول، اطلها.
- ٢٦٨٢٥ - مِشَقْ، مِشَقِير
Teillage (F). Stripping (E).
فصل المشاقة اي القشرة من سوق القنب والكتان وما
اشبه.
- Ebroutage ٢٦٨٢٦ - مِشَقْ، مِشَقْ، مِشَقْ هَت
فصل ورق التوت عن الصالح قبل تقديمه الى دود القز.
- Dérayure (F). Water-furrow (E). ٢٦٨٢٧ - مِشَقْ
منخفض يترك بين السكتين في الحراثة لتسهيل لصرف
المياه.
- Métacarpe (F). ٢٦٦٩٧ - مُشَطَّ الِيَد
Metacarpus (E).
- Fissifolié (F). ٢٦٦٩٨ - مُشَطَّر التَصَل
Fissifoliat (E).
نمت تعريف يطلق على كل نبات يحمل أوراقا نصالها
مشطورة الأطراف.
- Diatomaceae (S). ٢٦٦٩٩ - مُشَطَّرَات
Diatomacées (F). Diatomaceae (E).
فصيلة من الحث السمر. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد
جميعها نباتات مجهرية من وحيدات الخلية. تعيش في
المياه المالحة والمليحة.
- Kigélie (F). ٢٦٨٠٠ - مُشَطَّرَة
هي الكيجلية، اطلها.
- Pinnal, Pinné (F). Pinnate (E). ٢٦٨٠١ - مُشَطَّي
شكل من اشكال أوراق النبات يشبه المشط.
- Pectiné (F). Pectinate (E). ٢٦٨٠٢ - مُشَطَّي
شكل من الزباني يشبه المشط.
- Ctenodonte (F). ٢٦٨٠٣ - مُشَطَّي الأسنان
Ctenodonte (E).
من الحيوان والاسماك من كانت اسنانه كالشط.
- Bipectiné (F). ٢٦٨٠٤ - مُشَطَّي مَزْدُوج
Bipectinate (E).
شكل من الزباني يشبه المشط المزدوج من جهتي الطول.
- Chromidae (S). ٢٦٨٠٥ - مُشَطَّيَات
Chromidés (F). Chromidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة شالكاك الزعانف.
- Ctenophores (F). ٢٦٨٠٦ - مِشَطَّيَات
Ctenophora (E).
رتبة حيوانات دنيا من شعبة مجوفات البطن.
- ٢٦٨٠٧ - مِشَطَّيَات الخِيَّاشِيم
Ctenobranches (F). Ctenobranches (E).
رتبة من الرخويات مديات الاربيل امانيات الخياشيم.
فصائلها واجناسها وأنواعها عديدة. جميعها وحيدة المشط
الخيشوي والاذين والحقن. وجميعها ايضا يميَّنة الاعضاء
لأن الاعضاء اليسارية المقابلة غامرة لا عمل لها.
- Rétribution (F). ٢٦٨٠٨ - مِشَع °
Remuneration, Reward (E).
المشع عجالة تدفع اجرا او مكافأة لمن يقوم بعمل.
فالمدام والراتب والجزاء والشكر والانتداب والبللة والمالة
والتعويض جميعها تعتبر من الامشاع.
- Radiomètre (F). ٢٦٨٠٩ - مِشَع، مِشَعَّاع
Radiometer (E).
مقياس شدة اشعة النور.
- Flustra (S). ٢٦٨١٠ - مِشَعَّاب °
Flustrelle (F). Flustra (E).
جنس حيوانات طحلبية بحرية ثولية التجميع متشعبة تعيش
على الفوقس.



مشعة

البصرة ، من الحافة . ازهارها خشوية كبيرة القد ، يضاف اللون ، وريدة المواج . ثمارها لحمية السوط ، لا قياسية الشكل ، خلية البصرة ، قصيرة الامن ، لذينة العلم ، مستحبة العرف والتكفة . عجمتها بيضيه خشية مطبقة وبفلطحة تخضن رزرة جامدة للساب الابيض . وثمره المشمش لؤلؤ طازية ورطب وتجفف ويصنع من صعيبرها رب ناشف لدن مأكلا اجزاء صفيحي الشكل يدعى قر اللين يكثر استهلاكه في البلاد العربية .

مهدد :

قبل انه من نبوت العجم او ارمينيا وقد انتفخ اخيراً على انه من نبوت الصين لانهم عرفوه واستثمروه منذ زهاء ٢٠٠ سنة قبل الميلاد ، وقد أدخل من الصين بالتتالي الى الهند فالعجم فالعراق فارمينا فتركيا فاليونان فايطاليا .

الليمه :

لو لم يكن المشمش من النباتات البكره الاغزرار ولو لم يكن ازهاره يستحق الاوراق ويتأثر من صقيع الربيع لكانت سائر النباتات المتدلة توافقه . لذلك فهو رطب في الاماكن الدافئة والمعارض الجنوبية والمواقع التي لا تكثر فيها الرياح الموسما .

تربسه :

ينمو ويجود في جميع الارربة ولا يأنف من كثرة الحمى اما يحض شدة الالتصاق والرطوبة المستحكة || وهو من الاجنار المسقوية التي تتطلب الري المنتظم وقد تنضر من الجفاف .

تكاثره :

يتكاثر بالبذر والتعلم . والتعلم يتم عادة بالرقعة ، معلوم وفي . اما الاجنار التي يحسن تغذيتها كاملها فهي اللوزي في الارربة الكلسية والخوخ في الارربة المنجبة والدرافق في الارربة العميقة القليلة الرطوبة والمشمش الكلافي في سائر الارربة .

فروبه :

فروبه عديدة تقسم الى فئتين : فئة المشمش الكلافي وهو ما كانت بلوره مرة العلم غنية بالحامض السيانيدريكي وفئة المشمش اللوزي (المشوز) وهو ما كانت بلوره مأكولة عادمة الحامض السيانيدريكي || اشتهر فروبه الوطنية ما يتبع :

- السوسي : ثمرته متوسطة القد قارشة . ساقها جوية اللون قليل التشقق . اوراقها عابقة الخضار صغيرة القد . ثمارها كبيرة الحجم غاربة الى الحمرة وهي لذينة العلم خافتة العرف والتكفة . بزورها حلوة مأكولة .

- البجلي : احرامه عديدة ، اشهرها المارودي والخشاني . ثمرته متوسطة القد كروية الشكل . ساقها جوية اللون عريقة الشقوق . فروعه منبسطة متراسة . اوراقها كبيرة القد زاهية الاخضرار . ثمارها كبيرة الحجم رتقالية اللون لذينة العلم يكثر استهلاكها في النفر . بزورها حلوة مأكولة .

- الحموي : له صرمان « البكير » و « اللقيس » ثمرته كبيرة القد ساقها مرء كثيرة الشقوق . اعصابها منبسطة متراسة . اوراقها زاهية الاخضرار . ثمارها متوسطة الحجم لذينة العلم ذكية العرف والتكفة لونها الى الصفرة الذهبية . بزورها حلوة العلم مأكولة .

- السنهالي : ثمرته كبيرة القد شائعة . ساقها كهام اللون مرء المواج . اوراقها صغيرة الصفحة مستطيلة المتق

٢٦٨٢٨ - مُشَقَّاسِي ° Commensurable
نمت تعريفه يطلق على ما يمكن قياسه هو وغيره بقياس واحد مشترك .

٢٦٨٢٩ - مُشَقَّاسِيَّة ° Commensurabilité (F).
Commensurability (E).
امكان قياس كيتين او اكثر بقياس واحد .

٢٦٨٣٠ - مُشَقَّة Filasse (F). Tow (E).
هي الشاقة أي ما خلص بالمشق من لحاء النباتات اللينة كالقنب والكتان .

٢٦٨٣١ - مُشَقَّن Scarificateur (F).
المسلفة تسوي بها التربة المبلورة .

٢٦٨٣٢ - مُشَقَّقُ الْجَنَاح Fissipenne (F).
Fissipinna (E).
نمت تعريفه يطلق على كل طائر مشقوق الجناح .

٢٦٨٣٣ - مُشَقَّقَاتُ الْأَرْجُلِ Schizopodes, Fissipèdes (E).
رتبة حيوانات من الفشريات .

٢٦٨٣٤ - مُشَقَّقَاتُ الْأُنْسَةِ Fissilingues
رتبة من الطغليات تشمل بعض الفصائل . تتميز بالسنب المستطيلة المشققة الفارقة الاعادة .

٢٦٨٣٥ - مُشَقَّقَاتُ الْمَتَافِرِ Fissirostres (F).
Fissirostrous (E).
رتبة من الطيور الجواثم .

٢٦٨٣٦ - مُشَكَاة Guirlande (F).
Garland, Wreath (E).

٢٦٨٣٧ - مُشَكَاة Allotropique (F).
Allotropic (E).

صفة بعض الاجسام كالكاربون والفسفور وغيرها التي تتصل بأشكال حكيمة مختلفة دون ان يتبدل شيئاً من تركيبها الجكاري .

٢٦٨٣٨ - مُشَكَطَا Menthe aquatique (F).
هو الفوتنج المائي ، اطلبه .

٢٦٨٣٩ - مُشَكَاة Fraisière (F).
Strawberry-bed (E).
قطعة ارض مفروسة شجلاً . ج مشاك .

٢٦٨٤٠ - مُشَلُوز
هو المشمش اللوزي الحلو المخ . الواحدة مشلوزة .

٢٦٨٤١ - مُشْمَاس Hélioscope (F). Helioscope (E).
منظار الشمس .

٢٦٨٤٢ - مُشْمَاسِي Hélioscopique (F).
Helioscopic (E).

٢٦٨٤٣ - مُشْمِش *
Prunus armeniaca, Armeniaca vulgaris (S). Abricotier (F). Apricot tree (E). Aprikosen, Echte Aprikose (D). Albicocco, Armeilini, Melico (I).
شجرة صمرة من فصيلة الورديات . تلثم من ٧ الى ١٥ م . ساقها قصيرة . اعصابها وفروعه منبسطة . ثمرورها تكون في اول صيفها سلاء ثم تتلفق مع مرور الزمن . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، منقطة ، قلبية الشكل . لصلها مالم



مشمش

٢٦٨٥٣ - مِشْشِشِي
Hypogée (F).
Hypogaeal, Hypogean (E).
نمت تعريفي يطلق على البزور التي تستقر زباراتها ، عند الانتاش ، تحت سطح التربة وهي تماكس بذلك البزور المربابية التي ترتفع زباراتها فوق سطح التربة .

٢٦٨٥٤ - مَشْطُوط * ، مَشْطُوط الغُرَاب
Achrostichum (S). Acrostic, Acrostique (F). Full-fern, Horn-fern (E). Fullfern (D). Acrostico (I).
جنس نباتات برية وزيينية من المرشخيات البسباجيات . انواعه المعروفة قليلة ، تربي في المنائق والمواقع الرطبة الظليلة . اوراقها قرصية الانتشاب تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم . تحجبها لا يتعدى حدود الزايم الثالث . تشريحها مشاري الشكل ، مستدير السن .

٢٦٨٥٥ - مِشْشِش
Etrape, Etrapoire (F).
Small sickle (E).
منجل خاص يستعمل في تشويل الجلامد .

٢٦٨٥٦ - مَشْبِطَة
Hétérosis (F). Heterosis (E).
المشبات هو هجلا السب الاول اي السلالة الاول عندما يكون عظم القدر . وحيث ان صفات المشبات صفات اتفاقيه لا مستقرة ولا وراثيه فهجلا السب الثاني لا يكون مشباطا لانه يرتد الى صفات دحه وعده . ج. مشاييط .

٢٦٨٥٧ - مِشْبِطَة
Hétérotique (F).
Heterotic (E).
نمت تعريفي يطلق على بعض العوامل او الصفات الميزية التي تقود الهجن الى الشباطة او التفوق الشياطي .

٢٦٨٥٨ - مَشْبِطَاع
Diagmètre (F).
Diagmeter (E).
جهاز يستعمل في قياس الاصلية اي قابلية النقل الحراري في الاجسام .

٢٦٨٥٩ - مَشْبِطَة
Allure (F). Carriage (E).
طريقة سير أثيل وسائر الدواب كالخطوط والمطبعة والمجلب والعدو .

٢٦٨٦٠ - مَشْبِطَة
Musschia (S). Musschie (F).
جنس نباتات زيبينية عشبية عشوشية معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، مهدا حوض البحر المتوسط . سوقها متضبة فضاء . اوراقها كبيرة ، فارشة ، مسنة الاطراف . نصلها رهلة مسترخية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها عثكولي التجميع ، هري الشكل . ازهارها صفراء اللون او حراء تطول من ٤ الى ٥ سم . || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٨٦١ - مَشْبِطَة الفُطُر
Mycélium (F).
Mycellum (E).
خيوط دقيقة متشابكة كثيفة التجميع نامية تعمل البوغ في الفطور . ج. امشاج .

٢٦٨٦٢ - مَشْبِطَة
Plantain triomphe (F).
هي لقمة النجمة ، اطلبا .

٢٦٨٦٣ - مَشْبِطَة
Scandix (F).
هي مشط الزهراء ، اطلبه .

باعتة الحصار . ثمارها الى الصفرة اللامعة وفي قرية الشبه من الحوي لكها دونه لذة وذكاء . بزورها حلوة مأكولة .
العصبي : شجرته كبيرة القد شاخه . ساقها جزوية سره كليله التشقيق . اغصانها فارشة منبسطة . اوراقها بيضيه الصفحة ، كليله القاعدة ، حيلة الحصار القائم . ثمارها كبيرة القد حيلة الشكل صفراء اللون خضراء الموانج لابلها جامد المكسر سكري العلم غالت العرف والتكهة .
- الكلاي ، الكلبسي : اصناما عديدة . اثماره شاخه ، سوقها جزوية اللون متوسطة الخشونة والتشقيق . اغصانه منفردة . اوراقه كليله مدببة المقصه . نصلها قليل الاخضرار والزهرة . ثماره كروية الشكل صغيرة القد غزيرة المعصرة تستعمل في صناعة قر الدين . بزوره مرة العلم .
- اللوزي ، المشلوز ، القيسي : شجرته متوسطة القد فارشة ، اوراقها شديدة الحصار . ثمارها كروية الشكل متوسطة القد حيلة اللون الابيض تشوبه حرة وريدة . لابلها غزير المعصرة لذيد العلم ذكي العرف والتكهة . بزورها حلوة مأكولة .



مشطلة مبدولة

٢٦٨٤٤ - مِشْشِش اليابان
Kaki (F).
هو الكاكي ، اطلبه .

٢٦٨٤٥ - مِشْشِش اَمْرِيكَة
Mammée d'Amérique
شجرة مشمرة مشهورة باسم جيباس امريكة ، اطلبا .

٢٦٨٤٦ - مِشْشِشَة
Abricot (F). Apricot (E).
هي ثمرة المشش . راجع جدول الفيتاينات .

٢٦٨٤٧ - مِشْشِشَة
Mespilus (S). Néflier (F).
جنس شجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها قليلة العدد ، البرية منها شائكة والزراعية سرحة . اوراقها عابلة متفكة اهليجية ، نصلها يارز العروق عثنالمس خلي البثرة . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون . ثمارها كيار الاكيدنيا لكها اصفر حجما واقل سذقا ، لوها الى السرة الكستنية || اشهر انواعها المشطلة المبدولة .

٢٦٨٤٨ - مِشْشِشَة مَبْدُولَة * ، زُغُرُور جِرْمَانِي
Mespilus germanica (S). Néflier commun, N. germanique, Merlier, Nêle (F). Medlar tree, Dutch medlar (E). Deutsche Mispel (D). Nespolo (I).
نوع من المشطلة في شجيرة زراعية تملو من ٢٥٠ الى ٤٠٠ سم . ساقها سرحة . اوراقها اهليجية مستطيلة ، نصلها يارز العروق ، خلي البثرة ، اطحل اللون . ازهارها كبيرة القد تطول نحو ٤ سم . ثمارها كستنية اللون شديدة الحموضة الحامزة تؤكل بعد تمام قبورها .

٢٦٨٤٩ - مِشْشِشَة يَابَانِيَة
Néflier du Japon (F).
هي الاكيدنيا ، اطلبا .

٢٦٨٥٠ - مَشْن
المشن هي الجلدوش او الخمشوش التي ينسبها البرد في الثار والاوراق || الثار المششونة هي الثار التي عليها البرد .

٢٦٨٥١ - مَشْن
مشن البقرة والناقة : حلب ما في ضرعها .

٢٦٨٥٢ - مَشْنَق *
Local de pente (F).
هو المشنوق الممد لتشنيك مشاكيك التبغ او خيوطه ريبا يعين وقت التصفيط والرزوم .



مشتن



مشطوط

٢٦٨٧٥ - **مُصَاعَة**
Plantain majeur (F).
هي لسان الحمل الكبير . ج. مصاص .

٢٦٨٧٦ - **مُصَاعَة صَغِيرَة**
Plantain moyen (F).
هي لسان الحمل المتوسط ، اطبله .

٢٦٨٧٧ - **مُصَاع ٥**
Pleospora (S).
جنس فطور مجهرية من السخايات وفصيلة السخايات . تتميز بأصنافها البسيطة التي تبتدئ غائرة في نسيج النبات المتحار ثم تظهر منتصبة ملطاة . يوهنا يبيض الشكل ملون تفصله الوأثر المستمرعة السطحية || أنواعه عديدة أعرفها ساً يتبع .

٢٦٨٧٨ - **مُصَاع البُرْتُقَال ٥**
Pleospora hesperidearum, Macrosporium hesperidearum, Sporodensium piriforme (S). Noir de l'orange, Nebbia (F).

فطر مجهرى يصيب ثمار البرتقال فيعطيلها || مظهره الخارجي يقع خلية تيلو باعثة اللان ثم تملأ الى السرة والسوار تركب الثمار فتجفئ قشورها وتصلب كالسفن . وهو على نمل الاوراق نكت سمر كالنمش || يكافح باستعمال احد القواطير الفعالة .

٢٦٨٧٩ - **مُصَاع البُقُول ٥**

Pleospora herbarum, Stemphylium botryosum, Macrosporium commune, M. parasiticum, M. allorum (S).

فطر مجهرى يؤذي العديد من البقول ، نحو : ه . لوباً ، منها بعض النباتات القرنية والصلبية والسيوانية ، تركب يصيب البندورة وورق الشاي وثمار الحمضيات الخضرية || مظهره الخارجي نكت سمر كثيفة تملأ نمل الاوراق فتؤذيها وتؤثم الثمار المخنوقة تسبب الحفن الاسود الذي يقضي عليها || يكافح باستعمال القواطير المايده .

٢٦٨٨٠ - **مُصَاع التفاح ٥**

Pleospora mali, Hendersonia mali (S).
فطر مجهرى يصيب اوراق التفاح يؤذيها || مظهره الخارجي يقع سمر مهدبة الاطراف البنفسجية تركب نمل اوراق التفاح فتعطيل وتحمه عن القيام بعمله الحيوي على الوجه الاكل || يكافح ان طلى ، غروباً من تقاتم شره ، باستعمال احد القواطير وانحاصها سائل يوردر .

٢٦٨٨١ - **مُصَاع الجوزين ٥**

Pleospora hyacinthi, Cladosporium fasciculare (S).
فطر مجهرى يصيب الجوزين على اختلاف انواعه فيعطيل وقد يصيب جفافه || مظهره الخارجي يقع مستديرة لونها الى الجوزية يطولوا وشاح من الخمل الاسمر تركب اسفاد البصل الخارجية || أضراره فادحة اذا لامته العوامل الجوية ورطوبة التربة لانه يسبب اتحاد الخلايا ومغنيا . يكافح باقتلاع البصل عند ادراكه وبصره فلتس مده من الزين ، خارج المكان الموبوء ، قبل جمعه وغزوه .

٢٦٨٨٢ - **مُصَاع الحشاش ٥**

Pleospora papaveracea, Helminthosporium papaveris, Dendryphium penicillatum (S). Helminthosporiose de Poëillette (F).

فطر مجهرى يصيب الحشاش يؤذي وقد يسبب يلمه . مظهره الخارجي يكون على الشتول الحديثة العهد يقع سمر تركب سنج السوق فتذبلها وتقضي على النبات . ويكون على الشتول البالغة يقع حنطية تركب نمل الاوراق تسبب

٢٦٨٦٤ - **مُشَيْك ٥** Brunia (S). Brunnie (F).

الواحدة مشيكة ، جنس نباتات جنينية برية وتزيينية من فصيلة المشيكيات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اما ضروبه التزيينية فعديدة . سورها منتصبة معتدلة التفتيد . اوراقها متعاقبة ، صفيرة النصال . ازهارها خاصة التركيب ، عديدة الالوان ، يكثر فيها الازرق والاصفر والوردي .

٢٦٨٦٥ - **مُشَيْكِيَّات ٥** Bruniaceae (S).

Bruniaceae (F). Bruniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلتين عديدة الثملات . اجناسها واثوعها المعروفة متوسطة العدد ، منها بعض اصقاع افريقية الجنوبية || جميعها جنبات ممره . سورها فراء . اوراقها متعاقبة شكلية . نصالها خلية البشرة . ازهارها خاصة التركيب . بزورها صغيرة تكثر فيها الاستدارة || اشهر اجناسها المشك .

٢٦٨٦٦ - **مُشَيْمِيَّات ٥** Placentaires (F).

Placentalia (E).
شعبة من صف الفرصيات . فصائلها واثوعها كثيرة العدد تجتمع الى ١٢ رتبة : الدرد والطحيات ومفردات الاصابع وبزودجات الاصابع والخرطوبيات والقوقام والخريرات والتمشقيات الاقدام واللوامح ومجنحات الايدي والليموريات والزليسات .

٢٦٨٦٧ - **مُشَيْمَة** Placenta, Arrière-faix (F).

Placenta (E).
الجيب الغشائي الذي يتكون فيه الجنين داخل الرحم ويخرج معه عند الوضع .

٢٦٨٦٨ - **مُشَيْمَة** Choroid (F). Choroid (E).

غشاء العين القائم بين الصلبة والشبكية .

٢٦٨٦٩ - **مُص ٥** Exsuction, Exsuction (F).

Sucking up or out (E).

٢٦٨٧٠ - **مُصَاع**

نبت له قشور كالبصل فيها فوق بعض كلما قشرت امصوخة ظهرت اخرى (اللسان) .

٢٦٨٧١ - **مُصَادَرَة** Confiscation

مقوينة موضعها استعفاء مال المحكوم واستيلاء الحكومة عليه .

٢٦٨٧٢ - **مُصَارِف كَبْدِيَة**

Frais frustratoires (F). Frustratory expenses (E).
هي التي تنفق دون وجه في الدعوى فتبقى على عاتق متفقها .

٢٦٨٧٣ - **مُصَاص ٥** Glossophaga (S).

Glossophaga, Mange-langue (F).
جنس خفافيش من فصيلة اللورقيات . انواعه عديدة ، موطنها البلاد الحارة . انوثها الى السرة الفاحه . اجناسها صغيرة اللد . فراطها مستطيلة ، ضيقة ، ذلقة . ألبنها فائقة الطول منتفخة سلسلة عجليات خيطية منتفخة الى الزوا || تميش منفردة . ذكورها تقرب اناتها عند الكرم . تألت تجاريد الاجار واوقاب الصخور . مسرجها يدوم طوال الليل . قوتها الحشرات والحلازين .

٢٦٨٧٤ - **مُصَاصَة ٥** Absorptivité (F).

Absorptiveness, Absorptivity (E).

هي قوة الانصصاص .



مصاص



مصاع البرتقال



مصاع البقول



مصاع التفاح



مصاع الجوزين

٢٦٨٩٣ - **مَصَّت**
المصت هو ادخال اليد في رحم الانثى لمصته واستخراج ما فيه .

٢٦٨٩٤ - **مَصْح ، مَصُوح** ، Virescence (F).
هو التبدل الطارئ في لون الزهر .

٢٦٨٩٥ - **مَصْحَقَاتُ القَشَار** ، Placophores (F).
رتبة من الرخويات اصدانها مصقفة القشار . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة معظمها من المتحجرات والمعاصر منها منتشر في جميع بحار العالم .

٢٦٨٩٦ - **مَصْحَر** ، Saxatile
نمت تعريتي يطلق على كل نبات يعيش وينمو على الصخور وفي الحاجر .

٢٦٨٩٧ - **مَصْد**
المصد والمصاد : الحفصة العالية ، وقيل اهل الجبال .

٢٦٨٩٨ - **مَصْدَر ، مَصْنَع ، مَصْنَأ**
Origine, Source (F). Origin, Spring (E).

٢٦٨٩٩ - **مَصْرَاب** ، Lacto-fermentateur (F).
جهاز يستعمل في قياس حموضة اللبن الرائب .

٢٦٩٠٠ - **مَصْرَاد** ، Frileux (F).
لا يصبر على البرد .

٢٦٩٠١ - **مَصْرَاع** ، Valve (F). Valve, Clack (E).
احد اجزاء الغلاف الثري في الثآليل المفتحة .

٢٦٩٠٢ - **مَصْرَاعِي** ، Valvulaire (F). Valvular (E).
٢٦٩٠٣ - **مَصْرَد**

Claie à gravier, C. à sable, Tamis (F). Wattle, Screen, Sieve, Sifter, Strainer (E).
غربال يفصل الرمل عن الحصى والحجارة .

٢٦٩٠٤ - **مَصْرِف** ، Drain, Bardeau (F).
Drain, Drain-pipe, Shingle (E).
مسيل ماء تنصرف فيه المياه التي ترشح من الارض الزراعية عقب ردها ، وقد شاع استعمال انابيب الأجر لهذه الغاية . والمصارف تنتهي بالبرب . والمصارب تنتهي بالمشيرة .

٢٦٩٠٥ - **مَصْرَف ، مَصْرَف** ، Banque (F). Bank (E).
هو كل محل انشئ للتجارة بالنقد او الأوراق ذات البدل المالي .

٢٦٩٠٦ - **مَصْرَف الإصدار**
Banque d'émission (F). Issuing house (E).
هو المصرف الممنوح له امتياز اصدار أوراق النقد من الحكومة .

٢٦٩٠٧ - **مَصْرَف زراعي ، مَصْرَف زراعي**
Banque agricole (F). Agricultural bank (E).
مصرف يختص بامداد ارباب المزارع الزراعية بالمال على سبيل القروض الطويلة الاجل .

٢٦٩٠٨ - **مَصْرَف عَقَارِي ، مَصْرَف عَقَارِي**
Crédit foncier (F). Loan society (E).
مصرف يقرض المال لاجال طويلة لقاء رهن العقار .

جفاف التسج || يكافح بتطهير البذار بمادة الفورمول المركز ٢٥ .. ١ / او تعقيراً بأحدى المركبات الزئبقية .

٢٦٨٨٣ - **مَصَاعُ الشُّونْدَر** *
Pleospora betae, Phoma betae, Ph. tabifica, Ph. sphaerosperma, Phyllosticta tabifica (S).
فطر مجهري يصيب أوراق الشوندر فيؤذيها ويسبب ذبولاً .

مظهره الخارجي يقع سفيرة مستديرة حنطية اللون ، تركب الاوراق فتسبب جفاف التسج يعقبه الذبول ثم العطب . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفوطاير المعتدلة المنصر للفعالة .

٢٦٨٨٤ - **مَصَاعُ العَفَن**
Pleospora putrefaciens, Clasterosporium putrefaciens, Sporodesmium putrefaciens (S).
فطر مجهري يركب أوراق الشوندر في اواخر عهدها اي قبيل الاتلاع بمدة وجيزة || مظهره الخارجي يقع مهدبة لا قياسية يملؤها خل اسمر تركب القسم الاكبر من النصل لا يفوتها منه الا العنق والزمار الاول || اغزاره زعيدة الا اذا استحكم في كامل الزراعة وهذا لا يكون الا في مواقع خاصة || يكافح باستعمال احد الفوطاير العادية المتوسطة المادة الفعالة .

٢٦٨٨٥ - **مَصَاعُ الهَنْدِيَاء**
Pleospora albicans, Phoma albicans (S).
فطر مجهري يركب هياز الهندباء فيؤذيها ويسبب انحلاص اغزارها وقتدها || مظهره الخارجي يقع مهدبة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى الصهبة ، اطرافها المهذب ينحرف من الحنطى الى الاسود وعند وصولها الى هذا الطور يذولها في وسطها شحمة خلية بيضاء . تركب نصل الاوراق وسويقات الازهار || يكافح عند ظهوره على الاوراق باستعمال احد الفوطاير العادية المعتدلة المنصر للفعالة .

٢٦٨٨٦ - **مِصَاعَة** ، Botryomycose (F).
Botryomycosis (E).

المصاعة مرض جلدي يمتري الحيوان . مظهره الخارجي دمل صفيرة ممتقة شبيهة بالمصع تسببها بعض الميكروبات اخصها الكروية .

٢٦٨٨٧ - **مِصَالَة** ، Sérologie (F). Serologie (E).
هي درس الامصال وغواصها المختلفة وانفعالاتها ونتائجها .

٢٦٨٨٨ - **مِصَالَة ، مِصَل** ، Petit lait (F). Whey (E).
الماء الذي يخرج من الحليب المجبن عند اصطناع الجبن .

٢٦٨٨٩ - **مِصَالَة ، مِصَالَة** ، Transaction
هو الاتفاق الذي يقدّمه المتنازعون ليفسروا به نزاعاً قائماً او متوقفاً بظول كل منهم من شيء من مطالبه .

٢٦٨٩٠ - **مِصَالِي** ، Sérologique (F). Serologic (E).
منوط بالمصل او مختص به .

٢٦٨٩١ - **مِصَان** ، Canne à sucre (F).
هو قصب السكر ، اطلبه .

٢٦٨٩٢ - **مِصْبَة ، مِصْبَة** ، Embouchure (F).
Embouchure, Mouth (E).
ملقى مياه الانهر بالبحر .



مَصَاعُ الشُّونْدَر

Laminoir (F). ٢٦٩٢٦ - مُصَفَّاح

Flattening-mill, Rolling-mill (E).
الآلة الخاصة بتصفيح المعادن .

Dolichocephale (F). ٢٦٩٢٧ - مُصَفَّح الرَّأْس

Dolichocephalic (E).
نمت تصنيفي يميز يوصف به الرأس المستطيل عند بعض الحيوانات الأهلية كالإبقار والأغنام .

Conchacé (F). ٢٦٩٢٨ - مُصَفَّد

نمت تعريفي يطلق على الإصداف الثنائية المصراع .

Courbine (F). ٢٦٩٢٩ - مُصَفَّار ، مُصَفَّار

سكة بحرية تدعى لوت المتوسط ، أطلها .

Sérum (F). Serum (E). ٢٦٩٣٠ - مُصَلِّ

Petit lait (F). ٢٦٩٣١ - مُصَلِّ

هو المصالة ، أطلها .

٢٦٩٣٢ - مُصَلِّ السِّلِّ ، لَتَفَاكُوش

Tuberculin (F). Tuberculin (E).
مصل كاشف تحقن به الإبقار للتيفن من أنها مصابة أو غير مصابة بالسل البقري .

Bec-croisé (F). ٢٦٩٣٣ - مُصَلَّب

هو الصيق ، طائر من الشرشوريات ، أطله .

٢٦٩٣٤ - مُصَلِّحات زراعية

Amendements agricoles (F). Improvement, Manuring of ground (E).
هي التي تصلح التربة بزيادة غصبا . والمصلحات عديدة منها التسميد العضوي والغضري والمعدني والإسقاء والعصر والتربيل والتدليل الخ .

Intérêt (F). Interest (E). ٢٦٩٣٥ - مُصَلَّحة

هو كل ما يصلح به المرء من شأنه بمنفعة تأتيه إذا هو زائل حقا أو أقام دعوى .

٢٦٩٣٦ - مُصَلَّحة المشايخ ، مُصَلَّحة خَيْلِ

Service des haras, S. de remonte التزوي
دائرة حكومية تابعة للبطاية البيطرية في وزارة الزراعة تعني بشؤون خيل التزو .

Plein (F). Full (E). ٢٦٩٣٧ - مُصَنَّت ، مُثَلَّتْ

نمت وصفي يطلق على ما لا جوف له كالقرن مثلا .

Cervicornes (F). ٢٦٩٣٨ - مُصَنَّات القرون

فئة من الحيوانات ، قرونها مصنعة غير مجوفة كالأيل .

Gummifère (F). ٢٦٩٣٩ - مُصَنَّع

Gummiferous (E).
ينتج الصمغ أو يحوي الصمغ ويصطنعه .

Réservoir (F). Reservoir (E). ٢٦٩٤٠ - مُصَنِّع

خوض تجمع فيه المياه للاستعمال الصناعي ويعرف أيضاً باسم حاووز .

Cynomoir (F). ٢٦٩٤١ - مُصَرَّر

هو الطروث ، أطله .

Cynomoriées (F). ٢٦٩٤٠ - مُصَرَّرَات

سبط من الطروثيات يشل بعض الاجناس والانواع .

Dépense (F). Expenditure (E). ٢٦٩٤١ - مُصَرَّرَف

هو المال المنفق .

٢٦٩٤٢ - مُصَرَّرَفَات ثَقَرِيَّة

Faux frais, Menus frais (F). Incidental expenses, Petty expenses (E).
بناء من زجاج ، يلحف أو يستر عند الحاجة ، تستثبت فيه نباتات البلاد الحارة التي لا تتحمل البرد .

Serre (F). ٢٦٩٤٣ - مُصَرَّرِي * ، وَام

Greenhouse (E).
هي التي يكمن فيها بجمرة الشمس داخل الزجاج .

Serre froide (F). ٢٦٩٤٤ - مُصَرَّرِي بَارِدَة

Conservatory (E).
هي التي تستعد حرارتها بطريقة ثابتة حيث يراوح مدها من ٢٤ الى ٢٨ في زمن البرد والشتاء .

Serre chaude (F). ٢٦٩٤٥ - مُصَرَّرِي حَارَة

Hot-house (E).
هي التي تستعد حرارتها بطريقة ثابتة حيث يراوح مدها من ٢٤ الى ٢٨ في زمن البرد والشتاء .

٢٦٩٤٦ - مُصَطَّقِيَّة ، قَرَارَة

Trieur (F).
Sorting-machine (E).
آلة تفرق الفلك عن الحب والحب عن بعضه بعض بالنسبة الى حجمه .

٢٦٩٤٧ - مُصَطَّقَاة

Lentisque (F).
هو البطم الشرقي ، أطله .

٢٦٩٤٨ - مُصَعَّة ، مُصَعَّة

Mûre de ronce (F).
Blackberry (E).
ثمرة المليق وأنباعه من عوج وغيره وهي حمراء اللون تؤكل ج معع ومع .

٢٦٩٤٩ - مُصَعَّد ، أَنْوَدَة

Anode
هو لاجب التيار الايجابي في المفلط .

٢٦٩٥٠ - مُصَعَّد

Ascenseur (F). Lift, Elevator (E).
جهاز يستعمل في رفع الأشخاص والاثاث .

٢٦٩٥١ - مُصَعَّد

Sublimé (F). Sublimate (E).
٢٦٩٥٢ - مُصَعَّقةParatonnerre (F).
راجع دافع الصاعقة .

٢٦٩٥٣ - مُصَفِّ

Liqudateur (F). Liquidator (E).
من تناط به اعمال التصفية .

٢٦٩٥٤ - مُصَفَّاة

Raffinerie (F). Refinery (E).
معمل مجهز بالمادة اللازمة للتصفية .

٢٦٩٥٥ - مُصَفَّاة ، رَاشِح

Filtre (F). Filter (E).
أداة تصفى بها السوائل ، وقد تكون من خزف أو رمل أو ناعم الخ ...

مصري

٢٦٩٥٢ - مَصَامُضْ أَمْرِيكِي

Evonymus americana (S). Fusain d'Amérique (F).
نوع من المصامض، جنته صغيرة القند تملو من ١٠٠
الى ٢٠٠ سم. فروعها منتصبة مالة. أوراقها عابلة
تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣، نصلها
خلى الصفحة السفلى عادم التنين. أزهارها وردية اللون
رباعية البتلات، حقايقا مستديرة جوزية اللون رباعية
الفلق || أزهارها يستمر طول شهر حزيران .

٢٦٩٥٣ - مَصَامُضْ عَرَبِيضْ الْوَرَقْ

Evonymus latifolia (S). Fusain à larges feuilles (F).
نوع من المصامض المبلول، جنته تملو من ٢ الى ٥
امتار. فروعها مالة. أوراقها عابلة تطول من ٨ الى
١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦. نصلها جامد الصفحة،
سمن الحافة. أزهارها لخامية البتلات الحمر. حقايقا
قمرزية خامية الفلق || أزهارها يستمر من ايار الى
حزيران .

٢٦٩٥٤ - مَصَامُضْ قَرْمْ

Evonymus nana (S).
Fusain nain (F).
نوع من المصامض، جنته صغيرة القند مشوة تملو من
٥٠ الى ٨٠ سم. فروعها مجذارية مستقيمة. أوراقها
عابلة متبادلة سنائية، نصلها لامع الصفحة يطول نحو ٥ سم.
ويعرض نحو ١. أزهارها رباعية البتلات والاسدية، ثلاثية
التجميع لوها الى الحفرة الحمراء المواج. حقايقا وردية
اللون رباعية الفلق || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٦٩٥٥ - مَصَامُضْ مَبْدُولْ *، مَصَامُضْ أُرُوبِي

Evonymus vulgaris, E. europaeus (S). Fusain commun, F. d'Europe, Bonnet de prêtre, Bois à lardoire (F).
نوع من المصامض المبلول، يجيرته تملو من ٣ الى ٦ امتار.
فروعها رباعية التضلع مالة. أوراقها عابلة سنائية
تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤، نصلها
مالس الصفحة الجامدة، سمن الحافة. أزهارها الى الحصار
الاصفر. حقايقا رباعية الفلق الحمر. بزورها وردية.
أزهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٦٩٥٦ - مَصَامُضْ مَجْدَارْ

Evonymus radicans (S). Fusain radican (F).
نوع من المصامض، جنته مشوة صغيرة القند. ساقها مجذارية.
فروعها دقيقة بجمرة اللون. أوراقها أبيدة تطول نحو ٥ سم.
وتعرض نحو ٢، نصلها جامد الصفحة المستجة بالايض
الوردي. أزهارها رباعية البتلات والاسدية، زيتية اللون،
حقايقا وردية رباعية الفلق || أزهارها يستمر من
حزيران الى آب .

٢٦٩٥٧ - مَصَامُضْ يَابَانِي *

Evonymus japonica (S). Fusain du Japon (F).
نوع من المصامض، يجيرته منتصبة تملو من ٣ الى ٨ امتار.
فروعها مفصلة خضر اللحاء. أوراقها أبيدة تطول من ٧
الى ١٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٦، نصلها جامد الصفحة
المستجة والمزركشة بالايض والاصفر. أزهارها رباعية
البتلات والاسدية لوها الى الحصار الفسفي. حقايقا حمر
رباعية الفلق || أزهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٩٥٨ - مَصَامُضْ ٥

Intégration (F). Integration (E).
المصامضة الحلق شيء بأخر لإتمامه أو لإتمام كماله .

٢٦٩٤١ - مَصْمُونُوعَةٌ ٥ Sépiophores (F).

المصمنوعة والمصمنوعات فئة من الرغويات ثنائيات الخياشيم،
عشاريات الأرجل، مجهزة بصنخ كالحبائر وأمثاله .

٢٦٩٤٢ - مِصْنَهَر Haut-fourneau (F).

Blast-furnace (E).
موقد خاص عمودي الارتكاز يستعمل لتذويب الحديد
تحت تأثير الحرارة المرتفعة .

٢٦٩٤٣ - مِصُونَات Sonomètre (F). Sonometer (E).

جهاز يستعمل في قياس الاصوات ومقابلتها وتصنيفها .

٢٦٩٤٤ - مِصُوح Virescence (F).

هو المصح، التبديل الطارئي الذي يغير لون الزهر الطبيعي.

٢٦٩٤٥ - مِصَادُ الْحَيَوِيَّةِ، مُرْدُ، أَنتِيْبِيُوتِي Antibiotique (F). Antibiotic (E).

مادة ينتجها كيين معين تمارض نحو غيره من الكيينات ||
المضادات الحيوية المعروفة حتى الآن تقسم الى فئتين :
- فئة الفنجيات كالبنيسلين والستريبتوميسين والتتراسيكلين.
- وفئة البكتيريات كالتيوتريسين والبايسترارين .

٢٦٩٤٦ - مِصَادُ السَّكَّالْ Béchique (F). Béchic (E).

٢٦٩٤٧ - مِصَارَّةُ ٥ Polygamie (F). Polygamy (E).

المفارقة تعدد الزوجات عند الرجل .

٢٦٩٤٨ - مِصَامُضْ Eau saumâtre (F).

Brackish water (E).
المصامض : الماء لا يطلق ملوحة وصدقه القطيع وهو الصائي
الزلال .

٢٦٩٤٩ - مِصَامُضْ Evonymus (S).

Fusain (F). Spindle tree (E). Spindelbaum, Pfaffen-
hütchen (D). Fusano, Evonimo (I).
جنس اشجار وجنيات برية وتربيتية من فصيلة القاتيات.
انواعه عديدة، اعطائها فسيحة الاربعاء تشمل الشرق
والغرب وامريكا. أوراقها متبادلة منفعة كاملة مرطاة.
أزهارها عتكويلة التجميع ابطية الارتكاز. ثمارها جراء
مستديرة مفصصة. بزورها مرة الطعم مقية وسهلة
اختياها صفراء اللون شديدة الصلابة شائعة الاستعمال
الصائي. فحمها يستعمل في التصوير وفي صناعة
البابرد || اعرف انواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٦٩٥٠ - مِصَامُضْ أَسَدُ *

Evonymus atropurpurea (S). Fusain noir (F).
نوع من المصامض، يجيرته تملو من ١٢ الى ٧ امتار. فروعها
مالة. أوراقها عابلة تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٦.
نصلها سمن الحافة خلى الصفحة السفلى. أزهارها رباعية
البتلات الايجوانية، سقايقا الى الجوزة السوداء المواج.
أزهارها يستمر طول شهر حزيران .

٢٦٩٥١ - مِصَامُضْ أَكْتَلَتْ Evonymus verrucosa (S). Fusain verruqueux (F).

نوع من المصامض، جنته تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم.
فروعها ثملوية اللحاء. أوراقها عابلة بيضيه ذرية، نصلها
سمن الحافة يطول نحو ٦ سم. ويعرض نحو ٣. أزهارها
جوزية اللون رباعية البتلات. ثمارها رتقالية اللون،
رباعية الفلق || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .



مِصَامُضْ أَسَدُ



مِصَامُضْ مَبْدُولْ



مِصَامُضْ يَابَانِي

Embryon humain (F). **مُضَيَّع** ٢٦٩٧٣ -
Human embryo (E). هي الملقحة البشرية .

Embryonnaire (F). **مُضَيَّعِي ، جَيَّيْنِي** ٢٦٩٧٤ -
Embryonic (E).
نمت تعريفي يطلق عل ما هو مختص بالصفحة أو الجنين .

Polygone (F). Polygon (E). **مُضَلَّع** ٢٦٩٧٥ -

٢٦٩٧٦ - **مُضَلَّع دائري ، مُضَلَّع مستدير**
Polygone circulaire (F). Circular polygon (E).

Quadrilatère (F). **مُضَلَّع رُباعي** ٢٦٩٧٧ -
Quadrilateral (E). شبه مربع رباعي اضلاع .

Polygone régulier (F). **مُضَلَّع مُنْتَظِم** ٢٦٩٧٨ -
Regular polygon (E).

Manège (F). **مُضْمَل** ٢٦٩٧٩ -
Horsemanship (E). اليلدان المد لتفسير الخيل .

٢٦٩٨٠ - **مُضْمَفَة** صوت الحية من لسانها .

Ascence, Plôûre (F). **مُضَوْر** ٢٦٩٨١ -
Ascence (E).

٢٦٩٨٢ - **مُضَيَّاء** ٥
Photomètre (F).
Photometer (E). جهاز يستعمل في قياس حدة الضوء أو قوته .

Entomophyte (F). **مُضَيَّاف** ٢٦٩٨٣ -
Entomophyte (E).
نمت تعريفي يطلق عل كل نبات من غقيات الولىع
تنظلل عليه الحشرات .

Hampe (F). Stem, Flower-stalk (E). **مُطَا** ٢٦٩٨٤ -
المطا هو السراخ . مشناه مطوان . ج امطاء .

٢٦٩٨٥ - **مُطَاَرَة** الارض الكثيرة الطير .
Caoutchouc (F). **مُطَاَط** ٢٦٩٨٦ -

٢٦٩٨٧ - **مُطَالِيل** ٥
Phanérogames parasites (F).
هي النباتات الطفيلية من باديات الزهر كالجعفيل والكشوث .

٢٦٩٨٨ - **مُطَالِب**
Fins (F).
راجع اغراض .

٢٦٩٨٩ - **مُطَالَبَة**
Réclamation (F).
Complaint, Request, Claim (E).
الالتاس او الادعاء باقرار حق او حالة .

٢٦٩٩٠ - **مُطَالَبَة**
Revendication (F).
Claiming (E).
رفع دعوى يطلب رافنها الاعتراف بل حق الملكية عل
مال معين .

٢٦٩٩١ - **مُطَاوَع ، مُطَيَّاع** ٥
Plastique (F).
Plastic (E). هو ما كان قابلاً للشكل والتشكل .

٢٦٩٩١ - **مُضَيَّعَة**
Pompe (F). Pump (E).
آلة تستعمل في رفع او دفن المياه والسوائل وقد تكون يدوية
او محركه . اما اشكالها فثلاثة وهي :

مُضَيَّعَة دافعة ٢٦٩٩٢ -
Pompe foulante (F). Force-pump (E).
مُضَيَّعَة دافعة ٢٦٩٩٣ -
Pompe aspirante (F). Suction-pump (E).
مُضَيَّعَة دافعة ٢٦٩٩٤ -
Pompe aspirante foulante (F).
Suction-force pump (E).

٢٦٩٩٥ - **مُضَيَّع**
Ascence (F).
Ascence, Acidifying (E). ابتداء الحموضة في كل مادة .

٢٦٩٩٦ - **مُضَيَّع ، مَضَيَّع**
Piqué (F). Sour (E).
ما كانت فسلته الحموضة من خر وجعة وما اشبه .

٢٦٩٩٧ - **مُضَيَّع ***
Harpagus (S).
Diodon, Harpagus (F).

جنس طير من عمار البراة وفصيلة الصفريات . انواعه
قليلة جميعها ريشة الفراء صغيرة القد . اثوابها موشية تلبس
فيها الجفوة الخطية الملوحة . بطونها غير نمره . ازوارها
بيض . اوصافها سر . || موطنها الغابات الكثيفة . تعيش
منفردة ، قوتها القوام والمصاير والحشرات . تدفن في
الاخجار الرفيعة ، اناثها تحضن من ٣ الى ٥ زفئات مدة
٤ اسابيع .

٢٦٩٩٨ - **مُضَيَّع ***
Pyromètre (F). Pyrometer (E).
جهاز يستعمل في قياس الحرارة العالية .

٢٦٩٩٩ - **مُضَيَّع يه**
Multiplcande (F).
Multiplcand (E).

٢٦٩٩٥ - **مُضَيَّع يه**
Multiplicateur (F).
Multiplier, Multiplying (E).

٢٦٩٩٦ - **مُضَيَّع كذا**
Factorielle (F).
Factorial (E).

٢٦٩٩٧ - **مُضَيَّعَة** ٥
Himanthalia (S).
Himanthalie (F). Himanthalia (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات السر . انواعها المعروفة
قليلة العدد اعطائها جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة || كلالها شديدة القصر . قواضعها قدسية الشكل
ينشعب في قمرها غصن من السيور الفرقة يراوح طوطا من
متر الى ثلاثة امتار .

٢٦٩٩٨ - **مُضَيَّع**
Diplostème (F).
نمت تعريفي يطلق عل كل عليل او جش يكون عدد
اسديته ضمت عدد التمايلات او الفصل .

٢٦٩٩٩ - **مُضَيَّع**
Narcisse tazette (F).
هو التريج الشرقي ، اطليه .

٢٦٩٩٠ - **مُضَيَّع**
Mastication

٢٦٩٩١ - **مُضَيَّع التبغ**
Chiquer (F).
To chew tobacco (E).

٢٦٩٩٢ - **مُضَيَّع**
Compresseur (F).
Compressor (E).
اسم يطلق عل مختلف الاجهزة الضاغطة اخصها الملامسات
ومضاطبات الغاز .



مضح



مضرم

Tourbière (F). ٢٧٠٠٣ - **مِطْرَبَة** *
Peat-bog, Peat-moss (E).
هي التِّرْبَاء ، منجم التِّرْبَاء الغضوي .

Gaufrier (F). ٢٧٠٠٤ - **مِطْرَمَة** *
Waffle-iron (E).
جهاز مدني كابس يصطنع رقائق الشمع الملمدة لتجهيز القفدير اي خلية النحل .

Pluvial (F). ٢٧٠٠٥ - **مِطْرِي ، شَتَوِي**
Pluvial, Rainy (E).

Porte-greffe, Sujet (F). Stock (E). ٢٧٠٠٦ - **مِطْعَم**
الاصل الذي يركب فيه الطعم او الاصل الذي يفرس في الارض .

Pantogreffe (F). ٢٧٠٠٧ - **مِطْمَعَة**
اداة للتطعيم تطعم بضعة قصبان في آن واحد .

Billot à patée (F). Clog (E). ٢٧٠٠٨ - **مِطْمَعِيَة**

Greffon (F). Graft (E). ٢٧٠٠٩ - **مِطْعُوم**
هو الطعم ، اطلبه .

Parasite (F). ٢٧٠١٠ - **مِطْفَال** *
Parasite, Hanger-on (E).
نعت تمريني يطلق على كل نبات يعيش طفلياً على غيره من النباتات .

Argillière (F). Clay-pit (E). ٢٧٠١١ - **مِطْفَلَة** *
المقع الذي يستخرج منه الطفل اي الصلصال .

Diplodia (S). ٢٧٠١٢ - **مِطْق** *
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . يكتسبها فردية كروية تنشأ محفوفة ثم ترقى وتثرف . جوفها سميك الغلاف ، حنطلي اللون يملو مق صغير . غلبتها ثنائية ، حنطلية اهلالية ، طولها نحو ١٥ ميكرون . غلبتها ثنائية ، عنقوة الوثيرة الفاصلة || انواعه قليلة ، جميعها مؤذية ، اعرفها .

Diplodia griffoni (S). ٢٧٠١٣ - **مِطْق الاجاص** *
فطر مجهري يركب اغصان وانفساد الاجاص والتفاح فيعطبها ويهبطها || مظهره الخارجي يشور كيفية التسجيع تركب الحباء فتصدع البشرة بعد ان تقرر الادمه وتشوهها . يكالغ بقطعاق الاغصان الموصوبة وبظهور الجروح مع العلم ان هذا الفطر يتعدى على الانجبار الضعيفة دون سواها .

Diplodia zeae (S). Dry-rot du maïs, Pourriture sèche des épis (F). ٢٧٠١٤ - **مِطْق الدَّرَّة الصَّفْرَاء** *

فطر مجهري يصيب الدَّرَّة الصفراء في سبوتها ومطروها وعصفها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الحجم والشكل حراء اللون سريمة الاتساع تركب المصف فتؤذيه . وهو تركب السبال والامطار مشيح اغبر اللون ثم ينحرف الى السمرة فيبدو كالعفن الاسود الجاف || يكالغ بتطهر البذار بواسطة املاح الزئبق . ومن المستحسن اجتناب الزراعة في المواقع الرطبة والتخلي عن زراعة الدَّرَّة في الاثرية المويومة نحو ثلاث سنوات .

Dame (F). Dam (E). ٢٦٩٩٢ - **مِطْبَة**
اداة من خشب او حديد تضرب بها الارض لترص .

Plecoptera (S). ٢٦٩٩٣ - **مِطْبَقَة الأجنحة**
Plécoptères (F). Plecoptera (E).
هي اللؤلؤيات ، رتبة من الحشرات ، اطلبها .

٢٦٩٩٤ - **مِطْبَحَة**
المطبخة هي مؤخر ظلف الشاة وقيل هنة كالفلكة في رجلها تسحب بها الارض .

Minoterie (F). ٢٦٩٩٥ - **مِطْبَحَة**
Flour-mill, Flour-store (E).
البناء الملمد لصنع الطحين وهو يحوي جميع اجهزة الطحن ومستودعات الدقيق .

Pluie (F). Rain (E). ٢٦٩٩٦ - **مِطْر**
المطر هو الماء المنهمر من السحاب . ج امطار . والمطره هي الدفقة من المطر .

Rafle (F). ٢٦٩٩٧ - **مِطْر**
Head of maize stripped of all its fruit (E).
سنبول الدَّرَّة والذعن وشباهاها . ج امطار .

٢٦٩٩٨ - **مِطْرَاق**
الائني المطراق هي القرينة المهد يتركب الفحل اياها . تستعمل في التسمية والمزنة والبقرة .

٢٦٩٩٩ - **مِطْرَاق البَحْر** * ، **نَصَار**
Sphyrna (S). Requin-marteau, Squal-marteau, Marteau (F). Hammer-head (E).
من اسمائها : ابو مطرقة وسكة الاسكندر . جنس اسماك بحرية بيوض ولون من فصيلة القرشيات ورتبة الاشراق . انواعها المعروفة ستة جميعها من الاسماك المفترسة الشرسة الخفية . قوتها الاسماك والقشريات وكل ما تستطيع اليه سبيلاً في البحر || اعطائها مياه مجاذج واخوار البلاد الحارة || اجسامها وشعية الشكل تقطع من ٣ الى ٥ امتار . انوابها الى الكهبة تعمق او ترعو وتغير مع اختلاف الانواع . رؤوسها كطرفة النحات ، اسطوانية الشكل ، ممتزعة الارتكاز يفرق طولها ربع طول الجسم . عيونها كبيرة ، مستديرة ، بارزة ، تحتل اطراف المطارق المقطوعة . اعطائها لاطنة لكنها كبيرة الشدق وسلحة بثلاثة صفوف من الاسنان الذرية الحادة القوية للتحركة . زعانفها سبع تحكها من سرعة الانقلاب والحركة . زعنفتها الشرجية فارقة هالية الشكل || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٠٠٠ - **مِطْرَاق البَحْر الأطلنسي**
Sphyrna zygaena (S).
نوع من مطراق البحر ، تكثر في المحيط الاطلسي ، اعطائها مجاذج البلاد الحارة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ امتار .

٢٧٠٠١ - **مِطْرَاق البَحْر المَحْشُوسَط**
Sphyrna tudes (S). Maillet (F).
نوع من مطراق البحر . اعطائها مجاذج البحر الابيض المتوسط . طولها يراوح من مترين الى اربعة امتار .

٢٧٠٠٢ - **مِطْرَاق البَحْر الهِنْدِي**
Sphyrna blochi (S).
نوع من مطراق البحر . اعطائها تمتد من مجاذج الهند الى الخليج الفارسي فالبحر الاحمر فصيق زنجبار . طولها يراوح من ٣ الى ٤ امتار .



مطارق البحر



مطرقة



مطق الاجاص

٢٧٠٢٦ - مَطْبَرَات

Antiseptiques, Désinfectants (F). Antiseptic, Disinfecting (E).
مادة فعالة بسيطة أو مركبة تقضي على الجراثيم الممرضة مثلاً حامض الفينك والليزول . الخ.

٢٧٠٢٧ - مَطْوَار

Polyphasé (F).
Polyphase, Multiphase (E).
كثير الأطوار .

٢٧٠٢٨ - مَطْوَرَة

Montacuta (S).
Montacuta (F). Montacuta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مسطحة الجوانح وفصيلة البرسونيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من علم بحار المناطق الشالية . اجسامها صغيرة القد . اصدانها بيضيه اللون ، قليلة الاصداد ، ناشرة السن المصرية . الوانها سوية تزاوج من الانيص التي الى المصفد .



مطوط مبدول

٢٧٠٢٩ - مَطْوَر

Calandre (F).

طائر من فصيلة التبريات يدعى علم ، اطلبه .

٢٧٠٣٠ - مَطْوَرَة

Couleuvre à collier (F).

هي الحفّات المطوّق ، اطلبه .

٢٧٠٣١ - مَطْوَرَة ، أم حَسْرَة

Aspius (S).

Aspe (F).
جنس اسماك بحرية ونهرية من الشبوبيات . انواعها المعروفة قليلة يكثر وجودها في البحر الاسود وفي بحيرات وانهر الشرق الاوسط واروية الجنوبية . اجسامها مستطيلة الشكل طولها يراوح من ٢٠ الى ٥٠ سم . زعانفها الظهرية صغيرة القد عادة الحشف . اسنانها الامامية السفلية بحجة كغالب الطير . لحمها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٧٠٣٢ - مَطْوَر

Longe (F). Lunge, Tether (E).

المقود أو الحبل الذي يربط من مرسل الدابة لجروا .

٢٧٠٣٣ - مَطَى ، طَعَام الأَرْتَب

Phagnalon rupestre (S). Phagnale (F).

نبات عشبي برّي طيب من فصيلة المركبات . مهدد البلاد المتندلة الحارة . يوجد في المراعق الرطبة من الوسط البنانية . اوراقه متعاقبة ، لسنة ، صغيرة القد . ازهاره ضخمة التجميع ، هامة الارتكاز ، مستطيلة المالحق الدقيقة . تنويره ربيعي . منافعه الطبية مهمة .

٢٧٠٣٤ - مَطْبَاع

Tropophyte (F).

Tropophyte (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات يتكيف مع عوامل البيئة حيث يعيش فلا يتأذى بحداف ولا تؤذي رطوبة .



مطاهر

٢٧٠٣٥ - مَطْبَاع

Plastique (F). Plastic (E).

هو المطاوع ، ما كان قابلاً للشكل والتشكل .

٢٧٠٣٦ - مَطْبَاف

Spectromètre, Spectroscope (F). Spectrometer, Spectroscope (E).
مناظر طلي ، مجلّة الاشباح .

٢٧٠٣٧ - مَطْبَرَة

Oisellerie (F).

Bird-catching, Bird-shop (E).

هي صيد الطيور وتربيتها وفي أيضاً محل تربية الطيور .

٢٧٠١٥ - مَطَق الصَّوْبَر

Diplodia pinea (S).
فطر مجهري يركب اهداب الصنوبر فيعيلها ويقود البياض التي فقدت اهدابها الى الذبول واليباس .

٢٧٠١٦ - مَطَق قَاتَال

Diplodia natalensis (S).

فطر مجهري يصيب النخل في كربه واصول سغه . مظهره الخارجي يقع فسيحة مستطيلة غبراء اللون ثم سمراء . تركيب بشرة النسخ فتؤذي البسر تنطبه || يكافح عند ظهوره باستئصال سائل بودو الحلو نحو ١ ٪ يضاف اليه مثيل النسبة اي ما يصادد نحو ١ ٪ من الزيتون الشثوية .

٢٧٠١٧ - مَطَاب

Problème (F). Problem (E).

٢٧٠١٨ - مَطْلُوب

Débit (F). Sale, Retail (E).

ما عل المرد من حساب أو ما هو مطلوب منه .

٢٧٠١٩ - مِطْبَر ، زَيْق

Fil du maçon (F).

Mason-line (E).

خيط البناء .

٢٧٠٢٠ - مِطْبَرَة

هي المدفنة ، اطلها .

٢٧٠٢١ - مَطْمُورَة

Silo (F). Silo, Store-pit (E).

هي السيرة بناء خاص تحفظ فيه الحبوب والاعلاف .

٢٧٠٢٢ - مَطْمُور

Momot (F). Momot (E).

جنس طير من فصيلة المطمويات . انواعه المعروفة ٢٠ اصنافها البلاد الامريكية الحارة . تألف الاحراج والغابات . تتميز باستعالة اذنانها الرتاجية التركيب الثنائية الرقال المربعة قدر ثلاثة اصابع قبل الاطراف . مناقرها عظيمة مستطيلة شارقة المخاطم العليا المستنة الطغاف || قوتها الحشرات والدويبات والوزغ والفقران . تدلّش اوكاها في اوقاب الصخور . تضع الانثى من بيضتين الى ثلاث بيضات فضفاضا بمنأوى الذكر نحو ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه المطموط المبدول .

٢٧٠٢٣ - مَطْمُور مَبْدُول

Prionites momota (S). Momot vulgaire (F).

نوع من المطموط . اصنائه تشمل معظم مناطق البرازيل والقوقيان . طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه متباين الالوان . ظهره واعالي جناحيه الى اغصان الزيتي . مناكبه الى الزقة السنجيرية . عنقه وذوره وجوشنه وبعثه الى الصبهة التحاسية المواج . حصره وقة رأسه سود . جبته خضراء اللون يقابلها من الوراء حنار اخضر يطلق القفن . عيانه الى الجزء . منقاره اسود . رصاه الى الريدة السمراء || يألف الاحراج البعيدة عن كل عرآن . قوته الحشرات والوزغ والفقران .

٢٧٠٢٤ - مَطْمُورِيَّات

Momotidae (S). Momotidae, Prionitidae (F). Momotidae (E).

فصيلة طير من الجوامئ سنيات المناقير . انواعها المعروفة عديدة يجمعها جنس واحد يدعى مطموط || مهدها معظم احراج امريكة الوسطى والجنوبية . قوتها الحشرات والوزغ والفقران .

٢٧٠٢٥ - مَطْهَار

Autoclave (F).

Autoclave, Vacuum-pan (E).

مرجل يحك السد ترتفع فيه الحرارة والبخار المغصوط ، يستعمل للتطهير .

٢٧٠٤٩ - مُعَادَلَة بَيَانِيَّة ، مُعَادَلَة تَفْصِيلِيَّة
Equation graphique (F). Graphic equation (E).

٢٧٠٥٠ - مُعَادَلَة سِنِيَّة
Formule dentale (F). Dental formula (E).

٢٧٠٥١ - مُعَار ٥
Aptère (F).
Apterous, Wingless (E).

هي كل حشرة عادمة الروشن أو الغمد .

٢٧٠٥٢ - مُعَارَض شرعي
Contradictoire légitime (F). Legitimate adversary (E).
« هو ما كان يمثل في قضية من قضايا النسب جميع خصوم المتنازع في نسبة الموجودين والاحتاليين » .

٢٧٠٥٣ - مُعَارَضَة من الغير
Tierce-opposition
« هي إحدى طرق الطعن غير العادية في حكم لا يكون المعارض طرفاً أو مثلاً فيه ولكنه يكون قد أجحف بحقوقه » .

٢٧٠٥٤ - مُعَاص ٥
Milieu (F). Medium (E).
هو البيئة ، اطلبها .

٢٧٠٥٥ - مُعَاكَل ٥
Ligne de conduite (F).
Ligne de conduct (E).

الملك منج السلوك المتبع .

٢٧٠٥٦ - مُعَالَ كَسْتِي *

Hylactes castaneus (S). Mégalyonx châtain (F).
طائر من الجوارم سنيات المناقير وفضيلة لاقتفات التمل .
موطنه بلاد الشبيل . ملجته الحيثاني زويجي . يألف البراري
الدغلة ، يختلس قصص غيرة من الطير . قوته الحشرات
والتمل || جسمه ربة بطول نحو ٢٢ سم . يتميز بصغر
المنقاد والجناح والذنب . ساقاه وأصابعه شديدة النشاط
تمكّنه من العدو السريع . ثوبه كستني الرأس والرداء
والجناح وأطراف الذنب ، اشهب الزور والصدر والبطن .
بطنه مجلّج بالكستني . منقاد وساقاه الى الطحلة السمراء ||
الانثى تتحمل بطوب الذكر .

٢٧٠٥٧ - مُعَالَجَة ، مُدَاوَلَة ، عِلَاج

Traitement (F). Treatment (E).
حلة وسائل العناية بالحيوان أو النبات لانتفاء الامراض
أو لمداواتها . لذلك فالمعالجة قد تكون واقية أو شافية .

٢٧٠٥٨ - مُعَالَجَة بِاتَّصُل
Sérothérapie (F).
Serothrapy (E).

٢٧٠٥٩ - مُعَالِم الْأَرْض

Aboutissants et tenants (F). Adjacent lands (E).
هي قطع الارض المجاورة لملك من جهتي الطول والعرض .

٢٧٠٦٠ - مُعَالَسَة
Informatique (F).

هي الاستقصائية ، اطلبها .

٢٧٠٦١ - مُعَالَهَة ، مُسَالَهَة ٥

Alternative (F). Alternative, Alternate (E).
نعت ترميى يطلق على كل شجرة تحمل عاماً وتخلت آخر .

٢٧٠٦٢ - مُعَالِيَات ، فُطُور مُعَدِيَّة
Gastéromycètes (F). Gasteromycetes (E).

فصيلة فطور من الدعاميات .

٢٧٠٣٨ - مُطَيَّرَة (E). Volière (F). Large bird-cage (E).
البناء المد لتربية الطير .

٢٧٠٣٩ - مُطَيِّع ٥
Chambre à humidification (F).
Damping room (E).

حجرة رطبة يوضع فيها التبغ الجاف ليلين .

٢٧٠٤٠ - مُطِيل
Ductile (F).
ما كان يتصف بخاصة المط .

٢٧٠٤١ - مُطْ
Grenadier sauvage (F).
Wild pomegranate-tree (E).
هو الزمان البري ، جلناره مغربي يجرسه النحل فيكثر عمله .

٢٧٠٤٢ - مُطَاعَة *

Umbrella (S).
Ombrelle (F). Umbrella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
سقيات الخياشيم وفضيلة المظايعات . انواعها المعروفة
قليلة المدد اشهرها مظاعة الحند ومظاعة المتوسط || اصدافها
مظلية الشكل ، قليلة الارتفاع ، تغلف الغليل من الجسم .
اجسامها بيضية الشوزن ، متساكنة . عيونها كبيرة
قاعية . ارجلها وريدة ، متساكنة ، مبططة ، مالة
الصفيحة السفلى .

٢٧٠٤٣ - مُطَاعِيَّات ٥
Umbrellidae (S).
Umbrellidés (F). Umbrellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
سقيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة المدد
منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها صغيرة
مظلية الشكل . ارجلها فارشة بيضية الشوزن أو مستديرة ||
اعرف اجناسها المظاعة والتيلودين .

٢٧٠٤٤ - مُظْمَعِيَّات ، مُظْمِيَّ
Culture sèche (F).
Dry farming (E).
الذي تسقيه السماء من الزرع .

٢٧٠٤٥ - مُعَات ٥
Expédient (F). Expédient (E).
المعات الطريقة المناسبة .

٢٧٠٤٦ - مُعَادِل ، تَطْيِير
Pair (F).
Equal, Even (E).

٢٧٠٤٧ - مُعَادَلَة
EQUIPOLLENCE
التعادل في القوة أو القيمة .

٢٧٠٤٨ - مُعَادَلَة
Equation
المعادلة في علم الرياضيات هي مائلة للشئ ان في النسبة
أو في الصيغة . والمعادلات عديدة منها :

المعادلة التفاضلية (F).
المعادلة الثنائية (F).
المعادلة الزمنية (F).
المعادلة السنوية (F).
المعادلة العكسية (F).
المعادلة المتعدية (F).
المعادلة المتبادلة (F).



مظاعة



معال كستي

- 27080 - **مُعَدَّكَة ، رِيَسَاتَة** Rhéostat (F).
Rheostat (E).
جهاز يزيد أو ينقص المقاومة في التيار الكهربائي المقصود تقويته أو تخفيفه .
- 27081 - **مُعَدَّن** Mineral, Métal (F). Metal (E).
المعادن اجسام طَبيعية تتميز بصفاتها الكيماوية النوعية وبخواصها الفارقة لها الصلابة وقابلية الصهر والسحب والطرق باستثناء الزئبق المائع في الحرارة العادية .
- 27082 - **مُعَدَّن ، صَالِقُور** Epierreur (F).
Cleanser (E).
آلة تغلق الحجارة من الارض وتجمعها .
- 27083 - **مُعَدَّنَة** Minéralisation (F).
Mineralization (E).
المعدنة والتبدين واحد .
- 27084 - **مُعَدَّنِي** Minéral (F). Mineral (E).
نعت .
- 27085 - **مُعَدَّنِيَّة** Minéralogie (F).
Mineralogy (E).
علم المعادن وهو يبحث في تكوينها وتركيبها الحكي والكيماوي وطرق استغلالها واستعمالها وفوائدها .
- 27086 - **مُعَدِّيَّات ، مُعَدِّيَّات الأُرْجُل** Gastéropodes (F). Gastropoda (E).
صف حيوانات من الرخويات .
- 27087 - **مُعَدِّيَّات رُلُوِيَّة** Gastéropodes pulmonés (F). Pulmonate gastropoda (E).
صنف من الرخويات المعذبة .
- 27088 - **مُعَدَّقِي *** Erminette, Herminette (F).
Adze, Howel (E).
أداة تستعمل لمزق التربة واقتلاع الاشجار الفساة .
- 27089 - **مُعْدِر** Peu profond (F). Little deep (E).
رَبَة مَعْرَة : قليلة العمق وقليلة النبات .
- 27090 - **مُعْدِر** Pelade (F). Pelada, Fox-evil (E).
المعر : سقوط الشعر والريش .
- 27091 - **مُعْرَاج**
قال القزويني : دابة عظيمة حبيبة مثل الارنب صفراء اللون على رأسها قرن واحد اسود لم يرها شي من السباع والذئاب الا حرب (الجاسط) .
- 27092 - **مُعْرَابَة** Hibernie (F).
هي معربة الشجر ، اطلبها .
- 27093 - **مُعْرَبَة ، عُرْبَة** Tic
كل عادة مستقيمة يتنادها الفرس كصك الانسان وبلغ الهواة ونس الجدران والارباح ينة ويسرة الخ...
- 27094 - **مُعْرَشَة** هي المَشْرَشَة ، اطلبها .
- 27095 - **مُعْرُض** Exposition (F). Exhibition (E).
- 27096 - **مُعَارِبَة** Etalonnage (F).
Gauging, Standardization (E).
27097 - **مُعَارِشَة** Symbiose (F). Symbiosis (E).
هي الاشتراك التين في المعيشة بين فردين مختلفين وهو لا يسري على الذكر والانثى والاب والابن والعنقل وراثته .
- 27098 - **مُعَارِشَة** Visite (F). Visit, Search (E).
هي الجئكو ، اطلبها .
- 27099 - **مُعْمَرَشَة ، مُعْرَشَة** Liane (F). Liana (E).
كل جنبه متسلقة مستطيلة الساق كثيرة الفروع .
- 27100 - **مُعْتَشِب** Herbivore (F).
Herbivore, Herbivorous (E).
ما كان قوته الشب .
- 27101 - **مُعْتَرَق** Elué (F).
كل مادة تنفصل عن غيرها بواسطة عائق تدعى معتوق .
- 27102 - **مُعْتَن** Fumigant (F).
27103 - **مُعْتَجَال** Hâtif, Précoce (F).
Early, Precocious, Forward (E).
صفة النبات الذي ينمو ويدرك سريعا .
- 27104 - **مُعْتَجَن ، مُعْجَنَة** Pétrin (F).
Kneading-trough (E).
27105 - **مُعْتَجُون التَطْعِيم** Mastic à greffer (F).
Graft mastic (E).
ويدعى صمغ التطعيم وطلاء التطعيم ، اطلب « مستيك » .
- 27106 - **مُعْتَد** هو البقل الرخص والتمر الغض .
- 27107 - **مُعْدَات زَرَاعِيَّة** Matériel agricole (F).
Agricultural material (E).
هي الادوات والاجهزة الزراعية الآلية .
- 27108 - **مُعْدَّال** Statoscope (F).
Statoscope (E).
المعدال مرازز تفاضل يتأثر باضمت تقالبات الضغط الجوي . يستعمل في الملاحة الجوية خاصة عند الارتفاع او الهبوط .
- 27109 - **مُعْدَة ، مُعْدَة** Estomac (F).
Stomach (E).
جزء من جهاز الهضم في الحيوان . والمعدة انواع فهي بسيطة عند الحلياليات ومرتبة عند المفترسات حيث تمكن اصحابها من اعادة الطعام الى الفم لمضغه || اما اقسام المعدة المرتبة فاربعة وهي : أم التلافيف والألفحة والقلنسوة والكروش .
- 27110 - **مُعْدَل** Taux (F).
راجع حق .
- 27111 - **مُعْدَلَة** Statocyste (F). Statocyste (E).
المعدل جهاز التوازن عند الرخويات . مركزه الرأس او بالقرب منه .

مرة حاملة لها استعمالها الطبي || اشهر انواعه المزروع
المبذول .

٢٧١٠١ - مَعْرِضُون مَبْدُول *

Cneorum tricozum (S). Camélé commun (F).
نوع من المزروع وهو جنية سرورية مبذولة تملو من
٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها فراء. اوراقها ابيضاء زيتونية
الشكل. نصلها وحيد البرق، ملتصق الحمار، لامع
الصفحة البحرية اللون. ازهارها صغيرة القند ثلاثية التجميع
سفراء اللون. ثمارها الى الخضرة الشديدة الاسمرار.
يستخرج من اوراقها وبزورها عصارة مرة حاملة مسملة.

Cneoraceae (S). مَعْرِضُونِيَّات *
Cnéoracées (F). Cneoraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات الفصائل
مرقعات المبيض. اجناسها وانواعها عديدة، اعطاهما
الاقليم المعتدلة. اشهر اجناسها المزروع.

Blieuse (F). Hoer (E). مَعْرِضُون مَعْرِضَة *
جهاز زراعي يستعمل في عزق التربة تجره الدواب او
الحركات.

Caprinés (F). Caprinae (E). مَعْرِضَة *
اجد قسي فصيلة الغنيمات .

Lait (F). Milk (E). مَعِش *
المس هو اللبن، يقال ما في النجعة مس .

Tubériss (F). مَعِشَل *
٢٧١٠٦

Déshebant (F). مَعِشَاب *
٢٧١٠٧
كل مادة عاشوية تقضي على بعض الاعشاب الضارة
تدعى مشابا .

Herbier du littoral (F). Herbal of littoral (E). مَعِشَابَة مَحْدَاحِيَّة *
٢٧١٠٨
المعاشب المحداحية هي المواقف القريبة من المجادح
والتي تكثر فيها الثبوت والاعشاب البحرية .

Décagone (F). Decagon (E). مَعِشَر *
٢٧١٠٩

Pressoir (F). Press (E). مَعِصَر *
٢٧١١٠
كل آلة تستعمل للعصر من عصر الباز الى الحبوب لذلك
فالمعاصر عديد الاشكال والاجسام .

Brontomètre (F). Brontometer (E). مَعِصَاف *
٢٧١١١
جهاز آلي يسجل العوارض والظواهر الجوية (لأرولوجية)
اثناء الزوايح والمواسم والاعاصير . من البرق والصاعقة
والرعد الى هبوب الرياح وسرعتها الخفية والارولوجية الى اقطار
وغزاراتها الى البرد وحجمه الى الضغط الجوي .

Echenilloir (F). Branch-opper (E). مَعِصَال *
٢٧١١٢
اداة تستعمل في الاعصال تمكن العامل من الوصول للقضاء
على الاساريع والديدان الخفية في اعالي الاجمار .

Nimbus مَعِصَرَة *
٢٧١١٣
هي الدجعة نوع من الغيوم، اعطاهما .

Exposition agricole (F). مَعْرِض زراعي *
٢٧٠٩٦
Agricultural exhibition (E).
مكان يعرض فيه كل ما له علاقة بالزراعة من النبات
والآثار والحيوان والادوات والمعدات .

Déchaussé (F). مَعْرِض *
٢٧٠٩٧

Hibernia defoliari, Erannis defoliari (S). مَعْرِضَة الشَّجَر *
٢٧٠٩٨
Hibernia defoliari, Erannis defoliari (S). Hibernie
défeuillante, Phalène effeuillante (F). Mottled-
umber moth (E). Grosser Frostspanner (D).
حشرة من فصيلة الذارعات، ذكرها صغير القند اصفر
الجسم والارواش المسنجة والمزركشة بالاحمر والاسمر .
انتاعها معاداة سمراء اللون مستطيلة الجرازم والازباني والاشرة .
تمنع كبحها في اوائل الخريف عند انتشاب الاثمار فينشف
في اوائل الربيع عن رقات نمة تلثم البراعم والارواق
الغنية || تركيب معظم الاجنار الحرجية وبعض المشرة
كالسنديان والندارد والازنار والتبولا والترزفون والخلص
والزعرور والبنق والتفاح والاجاص || تكافح في الشتاء
باستعمال احد الماكن الفعالة .

Hibernia leucophaearia, Erannis leucophaearia (S). مَعْرِضَة زَبْدَاء *
٢٧٠٩٩
Hibernie grisâtre, Phalène du chêne (F).
Hibernia leucophaearia (E).
حشرة من الارقيات حرشيات الاجنحة . ذكورها مجنحة
اناثها معاد . موطنها البلاد المعتدلة الحارة من الشرق
الاسوط الى اوروبا . فراشها صفة تعيش على غزونها
الاعمالي . سرقها تعيش على اوراق السنديان والمقص ||
جسم الذكر صغير قصيف يطول نحو ٩ سم . بسطة نحو
٣٤ سم . رأسه الى الريدة . عتاه صغيرتان . زبانه
مشطيان . جوشه ويطه الى الريدة السراء الموج . رواشته
رمادية اللون يعلوها تيجج سؤوي وتسلج اسمر . اهدابها
الى الريدة القصية || الانثى معراة . جسمها اهليجلي
الشكل يطول نحو ١٠ سم . وينتهي بمز حاد . ثوبها
الى الريدة السراء تملوها رقة سوداء . جرائزها مستطيلة
نظيفة تكتبها من الانتقال بسرعة ومن تعلق الاجبار في
ها جيل واحد في الحول . تظهر في نيسان . تسرح في
الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ثلاث ساعات وتمتع
المكن محاديا على اباط الارواق || السرقة عند بلوغها
الاكامل تطول نحو ١٨ سم . جسمها اسطواني الشكل ،
مبهر اهلل الدقيق القصير . ثوبها الى الكهبة تملوها ثلاثة
خطوط سود قاطبة منها خط ثنجي مضاعف الغرض . رأسها
الى الخنوقة . شرجها محدوب الشكل ينتهي بزايدة ذلقة .
رواجها البطينية الوسطى شديدة القصر مما يجعلها تقصر
عند الانتقال || طور الاكامل يستمر نحو ٣٨ اسبوعا
وينقضي في التربة ضمن غلاف من العطن والبراز المجنون
بالريال .

Cneorum (S). مَعْرِضُون *
٢٧١٠٠
Camélé, Chamélé, Gousse (F). Spurge olive,
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-
meles, Calmolea (I).
جنس شجيرات وجنيات برية من فصيلة المزرونيات .
انواعها عديدة، جميعها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها
ابيدة متعاقبة . ازهارها خشوية ابوية الارتكار وسيدة
او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات الناشقة . بزورها



معيرة الشجر



معيرة ريداء



مزعرون مبذول



معصار



معصال

٢٧١٢٨ - معقم البرعمة العقدية في ساق النبات الحولي .

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Huilerie (F). | مَغْصَرَة - ٢٧١١٤ |
| Oil-works, Oil-shop (E). | معمل استخراج الزيت |

Articulées (F). ٢٧١٢٩ - مَعْمِيَّات ٥
Articulata (F).

Cidrerie (F). مَقْصَرَةُ التُّفَاحِ
Cider making, Cider-factory (E).

شعبة من مستورات الزهر الوعائية . رطبها وفصلاتها و اجناسها المعروفة عديدة ، مغلظها من احافير العصور الخالية اخصها الحقبة الكربونية . المعاصر منها الآن ينتمي الى فصيلة الاسونجيات . سوقها معقمة التركيب . اوراقها شديدة الصغر ، ضمية التجميع . اجهزتها البوغية سبيلات محورية متفاوتة الطول .

Ecimeuse (F). Pollarder (E). **معصفة** - ٢٧١١٦
آلة تشرف الزرع عالياً قبل الاسبال خشية الضجعان .

Commutateur (F). ٢٧١٣٠ - مِعْكَاسٌ
Commutator. Switch (E).

Emondoir, Serpe (F). ٢٧١١٧ - معضد
Pruning-hook (E). اداة العضد ويدم: المحطب .

Brachionidés (F). معصُودِيَّات ٢٧١٨
Brachionidae (E).

اداة تعكس التيار الكهربائي .

٢٧١٣١ - مغلاط المروج *

Glaucopsyche cyllarus (S). *Glaucopsyche* des prairies (F). *Glaucopsyche cyllarus* (E).

حشرة من فصيلة القنيتان ورتبة حرشيات الراجعة.
موطنها معظم الاسواق المعتدلة الحرارة من العالم القديم.
أفراسها قوشرية وأوترة رقيق الانحاضار.
فراشات الباتات المروية بالاصفر النثل // جسمها متوسط
القد بطول نحو ١٢ سم. بسلطان نحو ٣٢ سم. رأسها صغير
الجرم. عيناها كبريتات. زناناها صغيرتان. ريشها
بطين الجرم. جوشها ازرقة اللون تملوه بقع سوداء.
دفعات الون الزرق // جوشها الذكر الون الزرقه البنفسجية
يطوفها حمار اسود وتهدب ابيض. وراش الاني // لها
العلمة الكستنية يطوفها حمار اسود وتهدب ابيض // لها
جبل واحد في الجوف. ظهورها القراشة في زيران. نرس
في الراد. تماثل بد ظهري بنحو ست اابيع وتضع
المكثي ميحاديا على الصلصات السفل من نصال الازراق //
السرة عند بلونها الكمال تكلو نحو ١٥ سم. جسمها مقوس
الفكل، مستقيم القدم والمخبر. يها الون الرديء الخضراء
تملونها حطوط قاطبة جووية واطواق سكية سواء
الون. رأسها اسود. منها ورواجها على العللة الرصاصية //
طور الاكامل يستمر نحو ثلاثة اابيع تقضي الحادوة
تتولد بد عيشها كاتامه تصيد الحصفه.

Scissipare (F). Schizogenous (E). **مُعَفَى** - ٢٧١١٩
متناسل بالانقسام الى شطرين .

Amblycephalidae (S). مَعْطَّات - ٢٧١٢.
Amblycéphalidés (F). Amblycephalidae (E).

فصيلة حيّات بيوضة من عادات السموم . أجنتها المرفقة خمسة ، جسنان يعيشان في مناطق جنوب آسيا وثلاثة اجناس تعيش في البلاد الامريكية . أجنتها متوسطة الغلاظة ، شبه اسطوانية الشكل ، تغطون من ٦٠ - ٧٥ سم . رؤوسها مستديرة الاغصام ، رحية الاثناق . فمكها سنن . عيونها صغيرة . اعناقها لا ملحوظة . اذنابها قصيرة . اوتابها بليلة او مرقوشة . انواعها المرفقة ٤٢ . تألف الغابات والحراج الجبلية . تسرح في الليل . تفتقران وارجل والبغض والتعابن والصخرة .

Routoir (F). مَعْطَن - ٢٧١٢١
Retting-pond, Retting-pit (F).

مصنع أو حوض أو بركة أو غدير يعطى فيه القنبر
والكتان .

Putrescible (F). ^٥ مدعاص، ^٥ معفان - ٢٧١٢٢
Liable to putrefaction (E). صفة الشيء القابل للتعفّن.

Franc (F). Exempt (E). **مُعْفَى** - ٢٧١٢٣
خالص الاحرة او طليق من المكس .


٢٧١٢٤ - مِقَام ٥* ، مُعَقِّمَةٌ
Stérilisateur (F). Sterilizer (E).
جهاز للتعقيم وتكثيف الحرارة المرتفعة.

Drageonnante (F). **مُعَقَّة - ٢٧١٢٥**
هي النباتات الكثيرة العقان والملوخ كالنبتين والهور
والورد والرماني.

| | |
|---------------|----------------------|
| Pancréas (F). | ٢٧١٢٦ - معقّد |
| Pancreas (E). | هو الحلوة ، اظلمها . |

Articulation, Jointure (F). معقِم - ٢٧١٢٧
Articulation, Joint, Jointing (F).

المعاقم من الخيل هي المفاصل فالرسغ عند الحافر معقم
والركنة معقم والعقوب معقم || يقال فرس شديد المعاقم



معقّام



مخاطبات المروج



معلم

٢٧١٣٢ - مِعْلَاق (F). Peduncle (E).
جسم دقة، مستطيل، يحمل زهرة أو بعض أزهار.

Podocarpus (F). مغلاقيّة - ٢٧١٣٣
هي الفشم ، اطلبه .

Expérimenté (F). ٢٧١٣٤ - مُعَلِّس ٥
Experienced (E).

Mangeoire (F). * مَعْلَف - ٢٧١٣٥
Manger, Crib (E).
وعاء من خشب أو بابلون أو حجارة توضع فيه الاعلاف
للخيل والبقر وغيرها .

۲۷۱۳۶ - مَعْلَف
المعلف محبوة كواكب

٢٧١٣٧ - مَعْلُومَاتِيَّة
م. الاستقصائية ، اطلها .
Informatique (F).

Hydroscope (F). **مِعْيَان** ٢٧١٥٤
Water-diviner (E).
هو الذي يستكشف الينابيع ويمن مواتها .

Terror (F). Soil, Ground (E). **مَعْيَص** ٢٧١٥٥
صفة الارض بالنسبة الى الزراعة كقولك معيص جيد
الاتاء ، ومعيص كرم ، وطعم المعيص .

Losange, Rhombe (F). **مُعِين** ٢٧١٥٦
Lozange, Rhomb, Rhombus (E).
جسم رباعي الاضلاع المتساوية .

Hydroscope (F). **مَعْيَنَة** ٢٧١٥٧
Water-divining (E).
علم استكشاف الينابيع وتعيين مواتها .

Rhomboidal (F). Rhomboidal (E). **مُعِينِي** ٢٧١٥٨
مُعِينِي

Oculifère (F). **مَعْيُون** ٢٧١٥٩
المعِين من كان يعمل عيناً . راجع جاحم .

Miauler (F). To mew (E). **مَعَا** ٢٧١٦٠
معا وماغ وماء السور : صوت .

Glossostemon (S). **مُعَات** ٢٧١٦١
Glossostémon (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخبائيات .
انواعها قليلة العدد ، اصطلحها الشرق الاوسط . اوراقها
متعقبة متناقبة كلفة . ازهارها صغيرة القد فردية || اشهر
انواعها المغاث العجمي .

Glossostemon brugueri (S). Glossostémon de
Perse (F). **مُعَات عَجَمِي** ٢٧١٦٢
نوع من المغاث وهو عشبة برية طيبة تملا من ٥٠ الى
١٠٠ سم . جذرها حنزاوي الشكل احمر المادة اسود القلفة .
ساقها وفروعها زباه اللحاء . اوراقها مستطيلة الاحناء
خلية النصل . ازهارها صغيرة القد يبيض اللون || جلوره
تستعمل مسحوقة وتدخل في عدة مركبات تقيء المرأة النفساء .

Avaries (F). **مُعَارِم** ٢٧١٦٣
Damages, Averages (E).
هي الوار ، راجعه .

Magas (S). **مُعَاس** ٢٧١٦٤
Magas (F). Magas (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات عصفديات الاجرل
وفصيلة التفيديات || انواعها المعروفة عديدة جميعها من
متحجرات الاباج الاول .

Magas (S). **مُعَالِير** ٢٧١٦٥
المغافر والمغافير : صنع ينفسه المرطوب وهو حلو يؤكل
الا انه مقت الرائحة .

Hétérotrope (F). **مُعَاِير** ٢٧١٦٦
Heterotropous (E).
نمت تعريفية يطلق على كل نثيط (ملقوسة نباتية) رأس
طرفه لا يقابل انقور البزرة .

Néphélomètre (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٧
Nephelometer (E).
جهاز يمكن من درس القش وتعديله .

Vivace (F). Perennial (E). **مُعَمَّر** ٢٧١٦٨
نمت تعريفية يوصف به النبات الذي يعيش أكثر من
سنتين .

Novale (F). **مُعَمَّر ، مَعْمُورَة** ٢٧١٦٩
Newly broken-up (E).
كل ارض عيرة مستعدة .

Fabrique, Manufacture (F). Fabric, Manufactory (E). **مَعْمَل ، مَصْنَع** ٢٧١٧٠
معمل تصنع فيه البيرا اي الجمرة .

Brasserie (F). Brewery, Brewhouse (E). **مَعْمَل البيرة ، مَعْمَل الجعة ، مَعْمُورَة** ٢٧١٧١
معمل يصنع فيه البيرة اي الجمرة .

Glucoserie (F). **مَعْمَل الغلوكوز** ٢٧١٧٢
Glucose-house (E).
معمل يحول فيه النشا الى غلوكوز .

Grapperie (F). **مَعْمَبَة** ٢٧١٧٣
Grapery, Vinery (E).
هي دفيئة العنب ، بناء زجاجي السفى وبفس الجوارب
مجهز بمدة التذفئة يستعمل لفرس الكرمة ونتاج العنب
خلالاً لزمان الانتاج الطبيعي .

Insectarium **مَعْمَد الحشرات** ٢٧١٧٤
مؤسسة علمية مجهزة بالوسائل الخاصة التي تمكنها من تربية
الحشرات لدرس اطوارها وبيوتها .

Fiduciaire (F). Fiduciary (E). **مَعْمُود له** ٢٧١٧٥
هو الذي اوصى له بمال وفرض عليه دفعه للمستحق
المهدي .

Métamérisé (F). **مُعَمُود ، مَتِيل** ٢٧١٧٦
نمت تعريفية يطلق على الاعضاء المائلة المتماثلة في كامل
الجسم او في جزء منه .

Pioche (F). Pickaxe (E). **مَعْمُول *** ٢٧١٧٧
اداة زراعية تستعمل في ركاش التربة . اشكاله واسماجه
عديدة تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

Coelique (F). Coeliac, Celic (E). **مَعْمُورِي** ٢٧١٧٨
Intestin (F). **مَعْمِي** ٢٧١٧٩
Intestine, Bowel, Gut (E).
عضو من جهاز الهضم يمتد من المعدة الى الاست وهو
يقسم الى عدة اقسام اخصها المعى الدقيق والمعى الغليظ .

Intestin grêle (F). **مَعْمِي دَقِيق ، عَصِيج** ٢٧١٨٠
Small intestine (E).
القسم الوسطي من الامعاء .

Jéjunum (F). Jejunum (E). **مَعْمِي صَالِم** ٢٧١٨١
المعى الصائم جزء من المعى الدقيق مركزه بين المعج وبين
المعى الغليظ .

Côlon (F). **مَعْمِي غَلِظ ، مُصْرَان** ٢٧١٨٢
Colon (E).
القسم الاخير من الامعاء ينتهي في الاست .

Iléon, Iléum (F). Ileum (E). **مَعْمِي لَقِيف** ٢٧١٨٣
المعى اللقيف هو القسم الثالث والاطول من المعى الدقيق ،
مركزه بين المعى الصائم والاغور .



مَعْمُول



مِقْبَاش



مغث اخضر



مغث اريد



مغث غروي



مغثيرة



مغذيس الكرز

* مغث غروي

Alnus glutinosa (S). Aune glutineux, Auline, Verne, Vergne (F). Common alder (E). Alder, Erlenbaum, Erle, Schwarzerle (D). Alno, A. ontano, Ancetano, Aunera, Verna russa (I).

نوع من المغث المبلول . فروعه عديدة تملو من ٥ الى ٣ م. منبها المنافع ويجاري الماء . سويها جالسة قشورها الى السرة السوداء . فروعه زياه . اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص . نصلها عديد المروق الدبقه ، لامع البشرة المأللة على صفحتيه .

Alnus cordata (S). مغث قلبي الورق
Aune à feuilles en cœur (F).

نوع من المغث ، شجرته صغيرة القد تملو من ٨ الى ١٠ امتار . فروعه مأللة . اوراقها قلبية الشكل تملو من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ١٠ سم . نصلها مسنن ، الحافة خلي الصفحة السفلى . مخاريطها فردية التجميع جوزية القد .

27178 - مغثير ، مغثور ، مغثور
Miellet (F). Honey dew (E).

مواد سكرية لزجة تنفصها سمام اوراق بعض النباتات فيجربها النمل وتعيش عليها بعض الفطور المجهرية كغطر السمام .

27179 - مغثيرات
Nectarinidées (S). Nectarinidées (E).

فصيلة طير من الجوام رقيقات المناظر . اجناسها وانواعها زهاء ١٢٠ ، جميعها صغيرة القد ، جميلة الشكل ، زاهية الالوان المرائية ، مستطيلة المناظر الدقيقة || مهددا البلاد الحارة . تجرس ريشق الازهار والبال السكرية .

27180 - مغثيرة
Melica (S). Mélisque (F). Melic, Melick (E). Nickendes (D). Melica (I).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها عديدة جميعها علفية ترهاها الماشية . وهي تنبت في معظم الاصقاع المتدلة الحارة . سويها نخلة منتصبة . اوراقها عصفية ، متباددة ، قليلة . ازهارها صغيرة القد ، عذكويلة التجميع ، عطرية العرف ، غزيرة الرحيق يجربها النحل .

27181 - مغثد ، مغثد
Mélongène (F).

نبات زراعي مشهور باسم بادجنان ، اطلبه .

27182 - مغذاق
Pluvioscope (F). Pluvioscope (E).

المذاق جهاز يسجل زمن وقوع المطر وبعدة استمراره ومقداره .

27183 - مغذف
Rame (F). Oar (E).

المذف جهاز مجذائي الشكل يكون عند بعض المفصليات والروغويات والقشريات والحشرات .

* مغذيس الكرز

Magdalis cerasi (S). Magdalis des cerisiers (F). Magdalis cerasi (E).

حشرة خاضلة خائبة مؤذية من فصيلة السوسيات ورثة مندات الاجنحة . تألف جناتها الاجبار الشجرة من قنح واجاص وكرز وغوخ ... غناضها تعيش على نصال الاوراق . يرقاتها تنحلل الاناد والافصان حتى

27184 - مغثيرة ، مغثيرة
Vache taurière (F). المغثيرة الغلثة المأللة ابداق او الاستحرام .

27185 - مغثور
Echadé (F). Scalded (E).

المثوم من النبات : الذي لفسحه الحمر .

* مغث ، تغث ، جكر الماء

Alnus (S). Aune (F).

جنس نباتات شجرية وجنبية من فصيلة النجيليات . انواعها ١٦ ، اعطائها البلاد المعتلة . تعيش على ضفاف البحيرات ويجاري الماء . اوراقها عابلة . ازهارها قدية ، الكثرية منها تظهر في الخريف واللائوية تأخر الى الربيع . اشخاصها شائعة الاستعمال الصناعي لا يعطها الماء . فحمها يستعمل في صناعة البارود . قشورها وافر الطعان تصلح للداغة || اشهر انواعها ما يتبع .

27186 - مغث اخضر
Alnus viridis (S).

Aune vert, Aunâtre (F). Green alder, Mountain alder (E). Grünerle, Drosle (D). Drosia, Drosle, Trosage (I).

نوع من المغث وهو شجرة جبلية مبلولة تملو من ٢ الى ٦ امتار . اوراقها بيضيه ذلقة . نصلها يطول من ٣ الى ٨ سم . ويعرض من ٢ الى ٥ سم . وهو ثنائي التسنين . اخضر الصفحة العليا خلي السفلى .

27187 - مغث ارمذ
Alnus incana (S).

Aune gristère, A. de montagne, Aune blanche (F). Black alder, Hoary alder, Spalted alder (E). Weisserle, Grauerle (D). Auzano, Marassola, Ontanella (I).

نوع من المغث المبلول . فروعه عديدة ، ازهارها صغيرة القد تملو من ٥ الى ١٥ م . اوراقها مزرقية تملو من ٤ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٩ سم . نصلها باحث المخصرة ، ارمذ اللون ، كثير العروق ، مزدوج التسنين .

27188 - مغث اليابان
Alnus japonica (S).

Aune du japon (F).

نوع من المغث ، مهدد اليابان . شجرته متوسطة القد تملو من ١٠ الى ١٨ م . فروعه مضلمة زياه . اوراقها سنائية تملو من ٦ الى ١٤ سم . وتعرض من ٢ الى ٦ سم . نصلها قليل الزغب والخلل ، متبادد التسنين ، ينتهي بهدية مستدقة مستطيلة .

27189 - مغث بحري
Alnus maritima (S).

Aune maritime (F).

نوع من المغث ، شجرته صغيرة القد تملو من ٨ الى ١٠ امتار . فروعه مأللة . اوراقها تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ سم . نصلها مائل الصفحة العليا خلي السفلى لا قياس التسنين ينتهي بهدية قصيرة || وهو يرغب في المواقع الرطبة الساحلية ويجود قرب الماء .

27190 - مغث صباغي
Alnus tinctoria (S).

Aune tinctorial (F).

نوع من المغث ، مهدد اليابان وميتوريا . شجرته متوسطة القد تملو من ١٢ الى ٢٠ م . ساقها قشبة سمراء اللحاء . فروعه الفضية مغزيرة . افئانها قطنية الحمل . اوراقها اهليلجية مدوارة مقطوعة للقاعدة تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٥ الى ١١ سم . نصلها مجري اللون خلي الصفحة السفلى || قشورها صباغية شائعة الاستعمال .

2٧١٨٨ - **مِغْرَقَةٌ** (F). Scoop, Ladle (E).
رفش مقعر يستعمل في اغتراف الماء والمواد المائعة .

2٧١٩٩ - **مِغْرُودٌ** (F).
هو الكرم الأحمر ، اطليه .

2٧٢٠٠ - **مِغْرِيٌّ** (F).
نوع من الفجل الزراعي المأكول يعرف بفجل الهند او فجل جاوا .

2٧٢٠١ - **مِغْرَلٌ** (F). Distaff (E).
هو المردن ، شكل من اشكال تشذيب الشجر .

2٧٢٠٢ - **مِغْشِيلُ الْوَرْدِ*** (F).
Megachilles centuncularis (S). Megachile (F).
حشرة من المنشيليات طولها نحو ١٢ سم . تركيب الورد والفل فتتغذى نصل الارواق وتنقل الفتات الى غشائها الذي تقي به بعض التجاويف الخشبية حيث ترصفت الفتات سفلاً متتامة يتخللها المكان ، يفشاه ويحيط به شيء من العسل || يعتبر من الحشرات الضارة لانه يؤذي اوراق الورد والفل .

2٧٢٠٣ - **مِغْشِيلِيَّاتٌ** (F).
Megachilidés (F). Megachilidae (E).
فصيلة حشرات خاضعة جارية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، قريبة الشبه من النحل . جميعها صغيرة القدر ، طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تقم غشائياتها في تجاويف الاغصان اليابسة .

2٧٢٠٤ - **مِغْضٌ** (F).
Colique (F). Colic, Stomach-ache (E).
عارض يعتري بعض الحيوانات كالحيل والبق . اسبابه مختلفة وانواعه ايضاً اعصابها الكليوي والعموي .

2٧٢٠٥ - **مِغْضَنٌ ، مِغْضَدٌ ، مِغْضَبٌ** (F).
Ebranchoir (F). Pruning-tool (E).
اداة تستعمل في قطع الاغصان والافاندا .

2٧٢٠٦ - **مِغْضُ** (F). Momordica (S). Momordique (F).
جنس نباتات عشبية مدادة وعارضة من فصيلة القتانيات ، انواعها ١٢ منها الحولية والمعمرة . اوراقها متعاقبة ، منعقة ، كفية ، زغبية ، خشنة . ازهارها فردية التجميع ، كبيرة القدر ، وسيدة المسكن . ثمارها بيضيه الشكل ، ثعلولية القشور . بزورها مبطة ، حنطية اللون ، بارزة التسنيج والازراكن || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

2٧٢٠٧ - **مِغْضُ الْكُوْشْنِشِينِ** (F).
Momordica cochinchinensis (S). Momordique de Cochinchine (F).
نوع من المغض المعمر ، منته الكوشنشين والهند . جذوره عشقولة ، ساقه تطول نحو ٨ امتار . حوافه بسيطة . اوراقه ثلاثية او خماسية التفصيص . ازهاره كبيرة القدر قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الصفرة الباهتة ، بتلاتها سنانية الشكل ، مضلعة بالاسود . ثماره بيضيه حمر اللون تطول من ١٠ الى ١٨ سم .

2٧٢٠٨ - **مِغْضُ بِلْسَمِي*** (F).
Momordica balsamina (S). Momordique baumier, M. balsamine, Pomme de merveille, Pomme de Jérusalem (F). Apple of Jerusalem, Balsam apple (E). Balsamapfel, Wunderapfel (D). Momordica, Pomo Balsamo, P. di meraviglia (I).
اشهر انواع المغض . اعطانه فسيحة الاربعاء تمتد من الشرق

الاقبال فتعلبها وتؤذيها || جسمها صغير القدر يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها الى السواد الكامد . رأسها كبير الجرم ينتهي بمنك قاصم ثاقب . عينها كبيرتان . زباناها صوانجانيان . ظهرها مستدير المؤخر اللامع القارق الطرف . ارساغها رباعية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع . تسرح في الليل . تساهد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . قرّر المكان في لواء الافناد والاصناف في ثقبوت تخلجها بمكنها || البرقة مرقاة تطول عند تمام الادراك من ٦ الى ٧ سم . جسمها اهليلجي الشكل ، حنطي اللون ، اصفر المواجه اسمر الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في طرف الثقب الذي احفرته البرقة .

2٧١٨٥ - **مِغْدٌ** (F).
Nutritif (F). Nutritive, Nourishing (E).
نعت تعريفي تصوف به المواد الغذائية او التي لها علاقة بالتغذية .

2٧١٨٦ - **مِغْرَاسٌ*** ، **مِغْشَالٌ** (F).
Transplantoir (F). Garden trowel (E).
اداة مختلفة الشكل والحجم تستعمل في تحجوب التربة لتسكيرها من اقبال الشتول المطلوب غرسها .

2٧١٨٧ - **مِغْرَاسٌ كَلِي*** (F).
Transplantoir mécanique (F). Transplanting-machine (E).
جهاز آلي يؤمن غرس الشتول في التربة على ابعاد متساوية .

2٧١٨٨ - **مِغْرَبٌ** (F).
Albinos (F).
هو الاحصب ، اطليه .

2٧١٨٩ - **مِغْرَةٌ** (F).
Ocre (F). Ochre (E).
تراب صلبالي يستعمل في التخصيب .

2٧١٩٠ - **مِغْرَةٌ حَمْرَاءٌ** (F).
Ocre rouge (F). Red ochre (E).
تراب صلبالي اخر الخضاب .

2٧١٩١ - **مِغْرَةٌ صَفْرَاءٌ** (F).
Ocre jaune (F). Yellow ochre (E).
تراب صلبالي اصفر الخضاب .

2٧١٩٢ - **مِغْرَدٌ** (F).
Scare bird (F).
راجع ابو معقار ديك البحر .

2٧١٩٣ - **مِغْرُوزٌ** (F).
المغز او مغز الذئب نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

2٧١٩٤ - **مِغْرُوزٌ** (F).
Empattement (F). Footing (E).
2٧١٩٥ - **مِغْرُوزُ السَيْبِ** (F).
Ecamoussure (F).
مغز نصاب الحشرات .

2٧١٩٦ - **مِغْرُوزُ الطَّعْمِ** (F).
Enture (F).
Cut, Incision (E).
الموضع الذي يوضع فيه العلم من المظلم .

2٧١٩٧ - **مِغْرُوسٌ** (F).
Birone, Haque (F). Truck (E).
اداة من حديد مخروطية الطرف تغرز في التربة فتفتح حفرة توضع فيها الفرس .



مغراس



مغشيل الورد



مغض بلسمي

- الاذن الى الهند . ساقه تطول نحو ١٥٠ سم . حوالقه دقيقة .
اوراقه ثلاثية او خماسية التفصيص تطول وتعرض نحو ٨ سم .
نصلها مائل الصفحة الالامعة ، مسن الحافة . ازهاره
صفراء اللون ، اهليلجية البتلات . قناباتها قليلة الشكل ،
مسنة ، طرية الازدناز . ثماره برتقالية الشكل واللون تطول
نحو ٨ سم . وهي تؤكل خضراء في اول عهدها وتصبح طيبة
عند نضجها وقد تدخل في عدة مستحضرات دالة ومفيدة .

٢٧٢٠٩ - مغنّس خَلْبِي الْوَرَق *

Momordica charantia (S). Momordique à feuilles de vigne, Margose, Papareh (F).

نوع من المغنّس ، منبته البلاد الحارة . جذوره ليفية التركيب .
ساقه عارضة تطول نحو ٣٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه
خماسية او سباعية التفصيص . نصلها مسن الحافة ، خل
البشرة قبالة العروق البارزة . ازهاره صفراء اللون ، خفيفة
البتلات . قناباتها تتوسط المالحق . ثماره برتقالية اللون ،
مستطيلة الشكل ، ذرية الرأس والمقب ، ثملولة القشرة
الخشنة ، تطول الى ١٥ الى ١٨ سم . لبها احمر اللون
ماكول .

٢٧٢١٠ - مغنّس قَلْبِي

Momordica involucreta (S). Momordique à involucre (F).

نوع من المغنّس ، منبته افريقية الجنوبية . ساقه عارضة
تطول نحو ٢٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه صغيرة القد
خماسية التفصيص ، نصلها مسن الحافة يطول ويعرض
من ٤ الى ٦ سم . ازهاره بيضاء اللون مستديرة البتلات
قناباتها قلبية طرية . ثماره ارجوانية ، بيضيه الشكل
تطول نحو ٥ سم . لبها احمر .

٢٧٢١١ - مغنّير

Cochenille

المغنر والمغنّرية حشرة واحدة مشهورة باسم قرمزية .

٢٧٢١٢ - مغنّيريات ، قَرْمِزِيّات

Coccidae (S). Coccidées (F). Coccidées (E).

فصيلة حشرات من تصفية الاجنحة . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد تتميز بصغر قننها وبازدواجها الشكل والشبي
وبافرازاتها الشمعية او اللكية || ذكروها تحيلة الجسم
يجمدة . انائها معار يفضيه الشكل او مكرورة تعيش
على النسج النباتية فتشترها وتحص عصارها .

٢٧٢١٣ - مغنّيرية النُضَاح المَدَكَبَة

هي قرمزية النضاح ، اطلبها .

٢٧٢١٤ - مغنّيرية الحَمْضِيّات

Pseudococcus citri (S). Cochenille farineuse des agrumes (F).

حشرة من القرمزيات ، بيضيه الشكل ، صغيرة القد ،
مبططة الجسم ، ععدة الظفر ، صفراء اللون ، تحيلة الغلاف
الشمعي اللبكي التركيب || تركيب الحفصيات والمغنو
وبعض نباتات الزينة . اضرارها محدودة . تكاثرها كثيرا
من القرمزيات .

٢٧٢١٥ - مغنّيرية البَاسِمِين

Orthesia insignis (S). Cochenille du jasmin (F).

حشرة صغيرة من القرمزيات ، ثوبها الى الخضار البني
ينفشاها ندف شبي بمنطقها من كل صوب . طولها مع
كيس مكها يبلغ نحو ٧ مم . تركيب الباسمين والكرمزات
وغيرها من نباتات الزينة || تكاثر كاسر القرمزيات .

٢٧٢١٦ - مغنّيرية مَدَكَبَة

Serpette (F).

هي قرمزية فوريوزا ، اطلبها .

٢٧٢١٧ - مُغْنُور

هو المغنر ، اطلبه .

٢٧٢١٨ - مَغَلَّة

النسبة والمغز التي تنتج في عام مرتين . ج مغال .

٢٧٢١٩ - مُغَلَّق

Indéhiscet (F). Indéhiscet (E).

نمت تمرني يوسف به ما لا يفتح او لا يتشقق من
البروز وغيرها .

٢٧٢٢٠ - مَغْلِم

راجع منفلة .

٢٧٢٢١ - مَغْنَمَا ، صَهَارَة

Magma (F).

Magma (E).

المغما ، فيزيائيا وكيميايا ، كل مادة رغو شبه مائنة
كازجاج المصهور أو كالطع الذي يقدف به البركان
عند ثورانه .

٢٧٢٢٢ - مُغْمَدَة الْاَجْنَحَة

Coléoptères (F).

Coleoptera (E).

رتبة من الحشرات تعرف بقصدية الاجنحة ، اطلبها .

٢٧٢٢٣ - مَغْنَم

Ensacheur (F). Sacking (E).

اداة تجمل الكيس قائما مغنسا فيسول ملو حبا .

٢٧٢٢٤ - مَغْنَطَا

Magnétomètre (F).

Magnetometer (E).

جهاز يستعمل في قياس الانقلاب المنفلة .

٢٧٢٢٥ - مَغْنَطِيسِي ، مَغْنَطِيسِي

Magnétique (F). Magnétique (E).

٢٧٢٢٦ - مَغْنَة * ، مَوْنُور ، مَاهُون

Swietenia mahagoni (S). Mahogon, Mahogoni, Acajou à meuble (F). Mahogony tree (E). Mahogony baum, Acajou baum (D). Mogano, Acagiu (I).

شجرة متوسطة القد من فصيلة الازدرعيات . مهدها المناطق
الحارة الافريقية . خشبها اصفر اللون ، امير المواج ،
ناعم الزقمة ، فاخر الصنف ، يعتبر من اجدد انواع
الاكاجو . وهو شائع الاستعمال في البلاد الاستوائية لانه
عازل طبيعي للحرارة القوية المشنة .

٢٧٢٢٧ - مَغْنَط

Aimanter (F). To magnetize (E).

٢٧٢٢٨ - مَغْنَطَة

Magnétisation (F).

Magnetization (E).

٢٧٢٢٩ - مَغْنَطَة حَيَوَالِيَة

Zoomagnétisme (F).

Zoomagnetism (E).

علم يبحث في تأثير المغنطية على الاحياء .

٢٧٢٣٠ - مَغْنَطِيس ، مَغْنَطِيس

Aimant (F).

Magnet (E).

٢٧٢٣١ - مَغْنَطِيس كَهْرَبَائِي

Electro-aimant (F). Electro-magnet (E).

٢٧٢٣٢ - مَغْنَطِيسِي كَهْرَبِي

Magnéto-électrique (F). Electro-magnetic (E).



مغنّس خلبى الورق



مغنّة

٢٧٢٤٠ - مَغْطِيسِيَّة كَبِيرَة الزَّهَر

Magnolia grandiflora (S). *Magnolia à grandes fleurs* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . مجربتها كبيرة القد هربية الشكل تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . أوراقها أبيضه تطلو من ١٢ إلى ٢٥ سم . وتعرض من ٦ إلى ١٢ سم . نصلها لامع البشرة عابق الخضار عل صفحته العليا ، أسفم اللون الزنجاري عاقب صفحته السفلى . أزهارها مكبسة تلبية اللون ، عطرية العرف ، قطرها براوح من ١٨ إلى ٢٠ سم . يتلاتها تند من ٩ إلى ١٢ ، أقلام اسديتها ارجوانية || أزهارها يستمر طولان شهر حزيران .

٢٧٢٤١ - مَغْطِيسِيَّة كَبِيرَة الْوَرَق

Magnolia macrophylla (S). *Magnolia à grandes feuilles* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . مجربتها متوسطة الحجم تملو من ٨ إلى ١٨ م . افئافها وزعماتها خلية البشرة . أوراقها عابله كبيرة مستطيلة ، طولها براوح من ٢٠ إلى ١٠٠ سم . وعرضها من ١٠ إلى ٣٠ سم . نصلها أهليجي الشكل مقطوم القاعده . أزهارها عظيمة القدر ، قطرها براوح من ٢٠ إلى ٣٢ سم . وهي فواحه العرف ، بياضه اللون ، سداسية البتلات المستديرة || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٢٤٢ - مَغْطِيسِيَّة مَدْدُونَة

Magnolia coco, *M. pumila*, *Talauma pumila* (S). *Magnolia coco* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . مجربتها مثله تملو من ٢ الى ٤ امتار . أوراقها أبيضه سنائية ذرية تطلو من ٨ إلى ١٥ سم . نصلها اخضر الصفحه العليا ، بحري السفلى . أزهارها صغيرة القد ، قطرها نحو ٣ سم . وهي ثلاثية الفصل الخضر ، سداسية البتلات ، فواحه العرف العطري ، عاجية اللون . أزهارها يستمر طولان السنة .

٢٧٢٤٣ - مَغْطِيسِيَّة مَحْزِيَّة

Magnolia officinalis (S). *Magnolia officinal* (F).

نوع من المغنولية الطبية والزراعية ، مهداه الصين . مجربتها هربية الشكل تملو من ٦ الى ١٦ م . أوراقها عابله كبيرة تطلو من ٣٥ إلى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ إلى ٢٠ سم . نصلها اخضر الصفحه العليا ، خلى السفلى البهريه اللون . أزهارها مكبسة كبيرة القد قطرها براوح من ١٥ إلى ٢٠ سم . يتلاتها بيض اللون ، أقلام اسديتها قمرية . || أزهارها يستمر طولان فصل الربيع .

٢٧٢٤٤ - مَغْطِيسِيَّة مَظْلِيَّة

Magnolia tripetala, *M. umbrellae* (S). *Magnolia parasol* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . مجربتها مظليه الشكل تملو من ٥ الى ١٠ امتار . أوراقها عابله أهليجية مستطيلة ، طولها براوح من ١٢ الى ٦٠ سم . نصلها مالمس البشرة جبل الخضار الزاهي . أزهارها بياضه اللون . مستهجة العرف ، تساعية البتلات المستطيلة ، قطرها براوح من ٨ الى ١٢ سم . || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٢٤٥ - مَغْطِيسِيَّة مُؤَنِّقَة

Magnolia acuminata (S). *Magnolia acuminé* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . جنبها سرورية تملو من ٨٠ إلى ١٥٠ سم . وهي في اقلها وبديتها شجرة شاعه تملو نحو ٣٠ م . أوراقها عابله بياضية ذرية ، نصلها يطلو من ١٢ إلى ٢٢ سم . ويعرض من ٦ إلى ١٢ سم .

Magnétisme (F).

Magnetism, Mesmerism (E).

٢٧٢٣٣ - مَغْطِيسِيَّة

Magnolia (S).

Magnolier, *Magnolia* (F). *Magnolia* (E). *Magnolie*, *Lilienbaum* (D). *Magnolia* (I).

جنس اشجار وشجيرات وجنات برية طيبة وزبينية من فصيلة المغنوليات . انواعها عديدة . أوراقها متعاقبة ، كاملة ، جلدية النصل اللامع . أزهارها كبيرة القد ، ثلاثية الفصل ، عديدة البتلات المتركة ، كثيرة الاسدية ، فواحه العرف العطري . ثمارها تخاريط صغيرة القد ناشقة || اشهر انواعها ما يلي :

٢٧٢٣٥ - مَغْطِيسِيَّة بَحْرِيَّة الْوَلَن

Magnolia glauca, *M. virginiana* (S). *Magnolia glauque*, *M. de Virginie* (F).

نوع من المغنولية ، مجربتها تملو من ٥ الى ٢٠ م . أوراقها أبيضه بحرية اللون خلية الصفحه السفلى . نصلها يطلو نحو ١٨ سم . ويعرض نحو ٦ . أزهارها عطرية ، مكبسة ، عديدة البتلات البيض || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٢٣٦ - مَغْطِيسِيَّة بَهِيَّة

Magnolia denudata, *M. conspicua*, *M. precisa* (S). *Magnolia magnifique*, *M. yulan* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . مجربتها تملو من ١٠ الى ١٥ م . أوراقها عابله ، لامعة الصفحه ، تطلو من ٧ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ١٢ سم . أزهارها عطرية ، تساعية البتلات المنصبة ، قطرها براوح من ١٠ الى ١٥ سم . لوها الى البياض الثلجي ونها شروب وزدية اللون أو حواء . أزهارها يستمر طولان شهر نيسان .

٢٧٢٣٧ - مَغْطِيسِيَّة زَنْبِيَّة الزَّهَر

Magnolia liliflora (S). *Magnolia à fleurs de lis* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . ضروره وأصرامه عديدة ، جميعها جنبات فرعاء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . أوراقها عابله بياضية ، نصلها مقطوم القاعده ذرب الطرف يطلو من ١٠ الى ١٥ سم . ويعرض من ٦ الى ١٠ سم . أزهارها زنبينية الشكل ، سداسية البتلات الملونة ، فواحه العرف العطري . أزهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٧٢٣٨ - مَغْطِيسِيَّة صَغِيرَة الزَّهَر

Magnolia parviflora (S). *Magnolia à petites fleurs* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . مجربتها تملو من ٣ الى ٦ امتار . أوراقها عابله تطلو من ١٢ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٨ سم . نصلها مالمس البشرة كثير العروق الواضحة . أزهارها بياضه اللون ، عطرية العرف ، سداسية البتلات ، قطرها براوح من ٨ الى ١٠ سم . || أزهارها يستمر طولان شهر حزيران .

٢٧٢٣٩ - مَغْطِيسِيَّة صَفْصَافِيَّة الْوَرَق

Magnolia salicifolia (S). *Magnolia à feuilles de saule* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . مجربتها هربية الشكل تملو من ٣ الى ٦ امتار . أوراقها عابله ، صفصافية الشكل ، بحرية اللون تطلو من ٦ الى ١٦ سم . وتعرض من ٣ الى ٩ سم . أزهارها عطرية العرف ، بياضه اللون ، ثلاثية الفصل ، سداسية البتلات ، قطرها براوح من ٨ الى ١٢ سم . أزهارها يستمر طولان شهر نيسان .



مغنولية

٢٧٢٥٦ - مِفْصَلَةٌ ، مُمَيَّزَةٌ

Dédifférenciation (F). Dedifferentiation (E).

المفصلة أو المايزة الارتدادية ، بيولوجيا ، رجوع المحبّرات أو الخلايا إلى الحالة المصغية عند زرع الانسجة .

٢٧٢٥٧ - مُفْتَتِحُ التَّابِينِ

Apériture (F).

هو الزمن الذي يفتتح عنه التابين بفتحيه والتزامه بمبلغ معين . وهو الذي يفاوض وليس على المؤمنين الآخرين الذين يقومون المقدّ الأملق القبول .

٢٧٢٥٨ - مُفْتَرَشَةٌ ، قَارَشَةٌ

Etalée (F).

Spread (E).

نمت تعريفي توصف به النباتات التي تلحف التربة بأوراقها والأشياء المنبسطة الصفحات الكبيرة .

٢٧٢٥٩ - مَفْتُوحَاتُ الْمَنَاطَاتِ

Physostomes (F).

رتبة من الأسماك تعرف أيضاً بلبينات الزعانف .

٢٧٢٦٠ - مُفْتَحٌ

Carbonifère (F).

Carboniferous (E).

٢٧٢٦١ - مُفْرَدُ التَّحْدُبِ

Plan convexe (F).

Convex plane (E).

٢٧٢٦٢ - مُفْرَدُ التَّقَعُرِ

Plan concave (F).

Concave plane (E).

٢٧٢٦٣ - مُفْرَدُ الدَّوَرِ

Monophasé (F).

Monophasis (E).

٢٧٢٦٤ - مُفْرَدَاتُ

Simples (F).

هي النباتات الطبية التي يعالجون بها بعض الأمراض .

٢٧٢٦٥ - مُفْرَدَاتُ الْأَصَابِعِ

Périssodactyles (F).

Perissodactyla (E).

رتبة حيوانات تشمل ثلاث فصائل : الخيليات والكركنيات والتايريات .

٢٧٢٦٦ - مُفْرَصَدٌ

Acinaire (F).

Acinous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات تعلق لحاء ساقه أو أغصانه حويصلات صغيرة تشبه للفرد ، وهي تزايدات طبيعية لا علاقة لها بأي وسم كان .

٢٧٢٦٧ - مُفَرَّقٌ

Potentiomètre (F).

Potentiometer (E).

مقياس فروق الجهد الكهربائي .

٢٧٢٦٨ - مُفَرَّمَةٌ

Hachoir (F).

هي المخذعة ، راجعها .

٢٧٢٦٩ - مِفْصَلٌ ، مِفْصَلٌ ، مِفْصَلٌ

Multilobé (F).

Multilobate (E).

ما كان كثير الفصوص أو الفلق .

٢٧٢٧٠ - مِفْصَلَةٌ

Ecosseuse (F).

Sheller (E).

آلة تستعمل لأنتزاع زور القريليات من سنفها .

٢٧٢٧١ - مِفْصَلٌ ، مِفْصَلٌ ، مِفْصَلٌ

Lobé, Lobulé (F).

Lobate, Lobed (E).

٢٧٢٧٢ - مِفْصَلَةٌ ، مِفْصَلَةٌ

Seringue (F).

Syringe (E).

صفحة العليا بحرية اللون لامة ، صفحة السفلى خلية طلاء . أزهارها غادة البرق ، فسقية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم . ثمارها كالحبات الصغيرة تبدو بحرية الخضار ثم تحمر شيئاً فشيئاً حتى الإدراك || أزهارها يستمر من أيار إلى تموز .

٢٧٢٦٦ - مَقْنُولِيَّةٌ نَجِيَّةٌ

Magnolia stellata (S). Magnolia étoilé (F).
نوع من المَقْنُولِيَّةِ التَّيْبِيَّةِ . ثمرتها هرمية الشكل تعلو من ٣ إلى ٥ أمتار . أوراقها عابلة ملساء زاهية الخضار تظل من ١٦ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٤ إلى ٢ سم . أزهارها مكبة نجية الشكل تعد من ١٢ إلى ١٨ بطة ، قطرها نحو ٨ سم . بتلاتها عطرية العرف ، يفضاء اللون ، قدية الصفحة ، مدبية الطرف ، منبسطة الارتكاز || أزهارها يستمر من آذار إلى نيسان .

٢٧٢٦٧ - مَقْنُولِيَّاتُ

Magnoliaceae (S).

Magnoliacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القملات . اجناسها ٢٢ ، تشمل زهاء ١٥٠ نوعاً جميعها أشجار و شجيرات . أوراقها متناقبة بسيطة جلدية النصل . أزهارها خطرية أو وسدية المسكن ، فردية أو عنقودية التجميع . منبها البلاد الحارة ، فيها الطبية والصناعية والتزيينية .

٢٧٢٦٨ - مَقْنِيٌّ

Villa (F).

هي الدارة ، أطلها .

٢٧٢٦٩ - مَقْنِيَّيَا

Magnésie (F). Magnesia (E).
هي أكسيد المغنيزيوم ، يعتبر في تصنيف العناصر الغذائية النباتية من العناصر الأولية .

٢٧٢٥٠ - مَقْنِيَّيُومٌ

Magnésium (F).

Magnesium (E).

مدن صلب ، لونه إلى البياض الفضي ، رمزه (Mg-) وزنه الاتومي ٢٤,٣٢ . نقله النري ١,٧٥ ينصهر في ٦٥٠°س . وهو يمتزق في الهواء الطلق ، اشتعاله بأمر اللهب العواجة . يستعمل في عدة مركبات صناعية . أما ملح فسهل شديد الفاعلية .

٢٧٢٥١ - مَقْنِيَّاسٌ

Hygrophile

نمت تعريفي يوصف به كل نبات لا يعيش إلا في المواق

الرطبة .

٢٧٢٥٢ - مَقْنِيَّالٌ

Touffu (arbre) (F).

Thick (tree) (E).

الشجرة الملتفة الأغصان الكثيرة الورق .

٢٧٢٥٣ - مَقْنِيَّةٌ * ، حَشِيَّةُ السَّابِطِ

Mollugo (S). Mollugine (F). Mollugo, Carpet-weed (E).

Mollugo (D). Mollugo (I).

جنس أعشاب برية حولية من المَقْنِيَّاتِ . أنواعه نحو ٣٠ ، أصلها البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها مرصوة تستحبها

الماشية .

٢٧٢٥٤ - مَقْنِيَّاتٌ

Molluginae (S).

Molluginées (F).

فصيلة نباتية قريبة الشبه من الرجيليات . اجناسها وأنواعها

قليلة العدد ، جميعها برية مرصوة .

٢٧٢٥٥ - مَقْنِيَّاسٌ

Mare (F). Pool, Pond (E).



مقدرة

Epouilleuse (F).

Cleansing apparatus (E).

صندوق صغير يوضع فيه الطائر باستثناء رأسه لمعالجة ضد الحشرات الطفيلية والقضاء عليها .

Funiculé (F). Funiculat (E). ٥ - مُفْتَقِل

نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو مجهز بفنقل .

Argument a fortiori ٢٧٢٩١ - مَفْهُومُ الْاَوْتَرِيَّةِ

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها لان هناك اسباباً تجعل تطبيقه على هذه الحالة اولى من تطبيقه على المنصوص عليها .

٢٧٢٩٢ - مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ

Argument a contrario (F).

حجة ثبوتية للتدليل على المخالفة بين الامر الواقع والنص القانوني .

Argument a pari (F). ٢٧٢٩٣ - مَفْهُومُ الْمَوْافَقَةِ

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها لان اسبابها تضاهي اسباب الحالة المنصوص عليها .

٢٧٢٩٤ - مَفْرُوضُ الْيَاتُوعِ

Fondé de pouvoir (F). Legal representative (E).

المفروض له بالتوقيع هو الذي يوكله غيره بالقيام بمقامه في بعض ما له من سلطة .

Eléphantiasis (F). ٢٧٢٩٥ - مَقْبُولَةٌ ، دَاءُ الْفِيلِ

Elephantiasis (E).

التهاب مزمن يعترى جلد قوائم الخيل والبقر .

Ostiole (F). Ostiol (E). ٢٧٢٩٦ - مَقْ

هو الشق الدقيق المستطيل الذي يتفلق عن البوغ عند الادراك .

٢٧٢٩٧ - مَقَارِ الْقُطْبِ ، مَقَارِ رَاهِبِ ٥

Fratercula arctica (S).

Macareux arctique, M. moine, M. commun (F).

Sea-parrot, Coulter-neb, Puffin (E).

نوع من الخمار ، طائر مائي من فصيلة البطريقيات . اعطاه المناطق القطبية الاسيوية والاروپية والامريكية . ينزع في زمن الشتاء العاصف الى البلاد الشمالية التي لا يفترها الجليد || ملجئه الحياتي جماعي . اسرابه وافرة العدد . قوته الاسماك والقشريات وبعض النباتات ||

جسمه ربعة ، كثر ، يطول نحو ٣٠ سم . يتميز بمنقاده البريمي الشكل ، المتساوي الطول والارتفاع . ثوبه العلوي الى السواد الاسم . ثوبه السفلي وبصره الى الياض الناصع . عنقه مطوق بقلادة عريضة الجعدة من لون الرأس والرداء . منقاده اكهب اللون ، ازرق القاعدة ، احمر الطرف . حدقة عينه عاجية . اجفانه وكحلة عينه الى

الجزوة . رساه الى الحمرة البرتقالية الموج | الاثنى امير قداً من الذكر وتحتل بنفس الثوب . وكنته نفرة يعني بحفرها وترتيبها في اعل مرتفعات الجبال المدة للحسن .

الحضنة تتألف من بيضتين فقط . الترخيم الذي يستمر من ٥ الى ٦ اسابيع وتقوم به الاثنى بمناوبة الذكر ،

ينجز في الليل فقط .

Articulé (F). Articulata (E). ٢٧٢٧٣ - مِفْصَلِي

نعت تعريفي يطلق على كل عضو مركب من فصل ، كزبان الحشرة فهو مفصلي التركيب .

Arthropodes (F).

Arthropoda (E).

صنف من الحيوانات يشمل شعب الحشرات وكثيرات الارجل والمكبيبات والقشريات .

Desmodie (F).

نبات تزييني من القرنيات مشهور باسم ارقيس .

Desmodie du Bengale ٢٧٢٧٦ - مِفْصَلِيَّةُ الْبَنْغَالِ

نبات تزييني مشهور باسم ارقيس هندي ، اطلية .

Champignonnière (F).

Mushroom bed (E).

المكان المد لزراعة الفطور .

Muselière (F).

هي الكأمة ، اطلية .

Octographe (F).

المفعال جهاز يستعمل في تسجيل حركات كل كان حي لمعرة مدى نشاطه .

Aphromètre (F).

Aphromet (E).

جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في قناني الخمر القوارزة .

Rentable (F). Profit-earning (E). ٢٧٢٨١ - مِفْعَال

رابع مريع .

Van (F). Fan, Van (E).

اداة خاصة تستعمل في ذر البادير لفصل البر عن الدق . ج مغاقل .

Voltmètre (F). Voltmeter (E). ٢٧٢٨٣ - مِفْلَاط

مقياس التحليل الفلطي .

Failli (F).

Bank-rupt, Insolvent (E).

هو كل صاحب مستقل او متجر حكمت المحكمة بشهر افلاسه .

Pleuronectidae (S).

Pleuronectidés (F). Pleuronectidae (E).

هي جانبيات الموم ، اطلية .

Décussé (F). Decussate (E).

صفة المنسوب النباتي المتساوي الانغلاق الطولي .

Fissiflore (F).

Fissifloral (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات متفلق التويجات الزهرية .

Mouflon d'Europe (F).

نوع من الاروية يسمى اروية كورسيكة ، اطلية .



مَقَارِ الْقُطْبِ

2٧٣٠٨ - **مُتَاوِل رَادِف** (F). Sous-entrepreneur (F).
(E). Sub-contractor (E).

هو الذي يعمل على المقاول في جزء من العمل .

2٧٣٠٩ - **مُقَاوِمَة** (F). Résistivité (F). Resistivity (E).

2٧٣١٠ - **مُقَايَسَة ، مَبَيِّن تَفْصِيلِي** (F). Devils (F).

بيان مفصل بالأعمال المقصودة مقروناً بشئ كلفها .

2٧٣١١ - **مُقَابَضَة ، قِيَاس** (F). Echange, Troc (F).

Exchange, Barter, Truck (E).

عقد يدفع أحد طرفيه إلى الآخر شيئاً أو يتنازل له عن حق مقابل عين أخرى أو حق آخر . وفي كانت المقايضة بيع أعيان أو حقوق باعيان أو حقوق فهي القياس .

2٧٣١٢ - **مُقَابِلَة** (F). Rétrocession (F).

Retrocession (E).

التنازل إلى الغير عن صفقة بما لها وما عليها .

2٧٣١٣ - **مُقَايِس** (F). Mesures (F). Measures (E).

2٧٣١٤ - **مُقْبَض ، مِقْوَم** (F). Mancheron (F).

Stilt (E).

من أجزاء المحراث ، الحشبة التي يقبض عليها الفلاح لضبط التلم .

2٧٣١٥ - **مُقَبِّط** (F). Mélangeur (F). Mixer (E).

آلة تستعمل تخلط الأشياء كالاسمدة وغيرها .

2٧٣١٦ - **مُقْبُورَات** (F). Recettes (F).

Receipts, Returns (E).

المقبورضة نجم ثمر من كوكبة برج التوأمن مركزه على الركة اليسرى من التوأمن المؤخر .

2٧٣١٨ - **مُقْتَى** (F). هو القنء ، اطلبه .

2٧٣١٩ - **مُقْتِير *٥** (S). Mactra (S).

Mactre (F). Mactra (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وقصيلة المقطريات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اصداؤها شبه فريشة الشونز مائلة السطوح . مثابها معتلة الطول مزدوجة || تعيش في البال المنمورة بالماء قرب المصببات والاعوار || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

2٧٣٢٠ - **مُقْتِيرِيَّات ٥** (S). Mactridae (S).

Mactridés (F). Mactridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة المدد جميعها معتلة اللحم ، متبانية الاشكال ، ثنائية المضارع ، مستغلطة الرباطات الداعلية || اصلاها منظم بحار العالم اخصها بحار المناطق المعتدلة الحارة || اشهر اجناسها المقثير والصمرح والمصلخة والكومنتجة .

2٧٣٢١ - **مُقْنَنَة** (F). Culture de concombre flexueux (F).

زراعة القنء وموضع هذه الزراعة كالملبحة البطيخ .

2٧٢٩٨ - **مُقَارَض ، مُضَارِب** (E).

Commanditaire (F). Sleeping partner (E).

هو الشريك في إحدى شركات القراض أو المضاربة فلا يفتن من ديون الشركة إلا قدر ما يوزي حصته فإذا كانت شركة القراض بالسهم أطلق على المقارض اسم المساهم .

2٧٢٩٩ - **مُقَاَسَمَة الْمُتَنَازِع فِيهِ** (F).

Pacte de quota litis (F).

شرط يتنقذ بين المتنازعي والمحامي على أن اتأب القضية تكون جزءاً من كسبه وهو محظور في اللوائح المهنية .

2٧٣٠٠ - **مُقَاَصَة** (F). Compensation (F).

Compensation (E).

«هي إحدى وسائل الوفاء ، ترميها الشامل أن يتوافق التزامان متبادلان بين شخصين ويكون محل الالتزامين مبلغاً من النقد أو أشياء مثلية من نوع واحد . ويكونان مستحقين الدفع غايلين من الزراع واجبي الوفاء في مكان واحد . وإذا أدى أحد الالتزامين على الآخر كانت المقاصة في المبلغ الأدنى فقط » || والمقاصة قد تكون :

Compensation totale (F).

Total compensation (E).

مقاصة تامة

Compensation conventionnelle (F). Conventional compensation (E).

مقاصة جزئية

Compensation légale (F). Legal compensation (E).

مقاصة قانونية

Compensation judiciaire (F). Judicial compensation (E).

مقاصة قضائية

2٧٣٠١ - **مُقَاَصَاة الضَامِن** (F). Poursuite (F).

Suit, Proceedings (E).

«هي القيام بالمساعي والتدابير القانونية للحصول على قرار قضائي أو حكم . وهي في القانون الجنائي الإجماعات والتحقيقات التي تجري للكشف عن الجاني أو المجرم . »

2٧٣٠٢ - **مُقَاَصَاة الضَامِن** (F). Appel en garantie (F).

«إدخال الضامن في الدعوى وهو إجراء خاص يراد به ادخال من يكون عليه ضمان في دعوى لم يكن داخلها فيها حتى يجعل من الضمون له ما يمكن أن يحكم به عليه . »

2٧٣٠٣ - **مُقَاَط** (F). Colporteur (F).

Hawker, Pedlar (E).

هو البائع الجوال .

2٧٣٠٤ - **مُقَاَطِع** (F). Tâcheron (F).

One working by the job (E).

هو العامل المتقيل .

2٧٣٠٥ - **مُقَام** (F). Dénominateur (F).


Denominator (E).

2٧٣٠٦ - **مُقَاوِس** (F). Jockey (F).

هو الجوكي الذي يركب جواد الرهان .

2٧٣٠٧ - **مُقَاوِل ، مُقْتَرِم ، مُتَعَهِّد** (F). Entrepreneur (F). Contractor (E).

هو الذي يرتبط بمقدد المقاوله وبأخذ على عاتقه القيام بعمل معين يساعده فيه عمال مأجورون .



مقير

٢٧٣٣٧ - مَقْرَأُ* ، مَقْصَ السُّتَانِي ، مِقْصُ التَّقْلِيمِ ، مِقْصُ الشَّجَرِ (F).
Sécateur (F).
Pruning-scissors (E).
مقص تقليم به أغصان الشجر .

٢٧٣٣٨ - مَقْرَدُونٌ*
Macrodon (S).
Macrodon (F). Macrodon (E).

جنس اسماك نهري من مفتوحات الفم وفصيلة القرشانيات
انواعه المعروفة أربعة أعطانها أنهر وبحيرات المناطق
الاستوائية الامريكية || أجسامها مستطيلة الشكل ،
متدلة الطول الذي يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها
متوسطة الحجم . أشداقها رحيمة . أسنانها كبيرة ، ذرية ،
فردية الصف في الفكين . زعانفها الظهرية محدلة الحجم
يغلب فيها الشكل المربع . زعانفها الحوضية غليظة
الارتكاز ، صغيرة القد ، تقابل الظهرية . زعانفها
الذيلية مستديرة الأطراف عند جميع الأنواع . أذنيها تاراج
من الرتبة الى الكهبة . رؤوسها وتظهرها عبق خضاباً
من بطونها || لحومها متوسطة الصفت ، مأكولة || أعرف
أنواعه وأشهرها مقردون ترابيرا (Macrodon trahira)
الذي يكثر وجوده في أنهر البرازيل والفوياني .

٢٧٣٣٩ - مَقْرَطٌ
Pinceuse-rogneuse (F).
أداة تستعمل لقطع سروع الكوية .

٢٧٣٤٠ - مَقْرَعَةٌ
Courgerie (F).
منبت القرع ويوضع زراعته .

٢٧٣٤١ - مَقْرَعَاتٌ
Ascoceratidae (S).
Ascoceratidae (E).
مرتبة من الرغويات تنتمي الى رتبة رباعيات الخياشيم
فصلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد جميعها من
متحمرات الازمنة الغائرة .

٢٧٣٤٢ - مَقْرُونِسٌ*
Macrorrhinus (S).
Macrorrhine (F). Macrorrhinus (E).
جنس حيوانات لبونة ، مائية ، من فصيلة الفقعيات .
أنواعها المعروفة قليلة العدد ، أعطانها بعض مناطق المحيط
المحادي || أجسامها كبيرة القد . ذكورها أكبر من إناثها
وأضخم . رأس الذكر عذوب المقدم ، غليظ الشكل ،
ينتهي بظفر اسحن فكه العلوي يشرف على السفلي . عنقه
وقوائم قصيرة || قوتها الاسماك والرغويات والقشريات .
الانثى تضع جرواً واحداً في العام || تصاد من أجل جلدها
وزيوتها ونظامها || أعرف أنواعها الصرغامي والصيق
الحلم .

٢٧٣٤٣ - مَقْرُونِسٌ صِرْغَامِي*
Macrorrhinus leoninus (S).
Macrorrhine leonin (F).

نوع من المقرنيس . أعطانها مناطق جنوب المحيط المحادي .
طوله نحو ٩ أمتار . فوه كستني اللون يمتد عند الظهر
ويصغر عند البطن .

٢٧٣٤٤ - مَقْرُونِسٌ صَبَّيْخُ الخُطْمِ*
Macrorrhinus angustirostris (S).
Macrorrhine à rostre étroit (F).

نوع من المقرنيس . أعطانها مجاذع المسكوك وكليفورنية .
طوله نحو سبعة أمتار . ثوبه الى الجلود السفراء المواج
تتبع عند الظهر وتصفّر وتبهر عند البطن .

٢٧٣٣٧ - مِفْطَحَةٌ* ، مِفْطَحَةٌ
Ratissoire (F).
Scraper (E).
نصل عريض قاطع مركب على عصا تتحط به الأقدار
والأعشاب .

٢٧٣٣٨ - مِفْطَفٌ خَارِجِي*
Exopodite (F).
المفد الخارجى ، انبوبولوجيا ، جزء مفصل من الفك
مركزة في الجانب الخارجى من الحرقوة حيث يشرف على
الركبة || والمفد الخارجى ، زوولوجيا ، جزء من
زوائد المفصليات يملأ ، مع المفد الداخلى ، القسم
القاعدي .

٢٧٣٣٩ - مِفْطَفٌ دَاخِلِي*
Endopodite (F).
المفد الداخلى ، زوولوجيا ، جزء من زوائد المفصليات
يملأ القسم القاعدي .

٢٧٣٤٠ - مِفْطَمٌ الإِرْثُ*
Avancement d'hoirie (F).
هو التبرع لاحد الورقة الإبتدائية بجزء من نصيبه في
تركة التبرع .

٢٧٣٤١ - مِفْطَمٌ الجِسْمِ ، مِفْطَمٌ الجِسْمِ
Avant-main (F). Fore hand (E).
في الخيل والانعام وما اشبه .

٢٧٣٤٢ - مِفْطَمٌ الجَوْشَنِ*
Prothorax
هو في الحشرات القسم الاول من الجوشن او الحلقة
الصدرية الاولى .

٢٧٣٤٣ - مِفْطَمٌ المِحْرَاتِ ، مِفْطَمٌ المِحْرَاتِ
Avant-train (F). Wheels (E).
الجزء الامامى من المحرات حيث يوجد الناظم والمبيلتان .

٢٧٣٤٤ - مِفْطَمَاتٌ
Primates
هي الرئيسات ، رتبة من الثدييات تشمل مراتب البشرات
والقرديات والليموريات .

٢٧٣٤٥ - مِفْطَدُورُ القِسْمَةِ ، قَابِلُ القِسْمَةِ ،
مِفْطَسِمٌ
Divisible
هو ما كانت قسمته جائزة .

٢٧٣٤٦ - مِفْطَدُوسٌ
Persil (F).
نبات بقلي مشهور باسم بقدونس ، أعليه .

٢٧٣٤٧ - مِفْقَرٌ
Amer (F). Bitter, Harsh (E).
مقر الشئ . صَارَ مرأً فهو مقر .

٢٧٣٤٨ - مِفْقَرٌ ، مِفْقَدَانٌ
Aloès (F).
هو الألوة ، نبات صناعي وتزييني .

٢٧٣٤٩ - مِفْقَرٌ
Acaule (F). Acaulous, Stemless (E).
النبات العديم الساق ويدعى أيضاً نجمة .

٢٧٣٥٠ - مِفْقَرَأَسٌ ، مِفْقَرَأَةٌ
Réfrigérateur (F).
Réfrigérateur (E).

٢٧٣٥١ - مِفْقَرَأَسٌ*
Greffoir (F).
Grafting-knife (E).
سكين خاصة منقطة الطرف تستعمل في التطعيم .



مِفْطَفٌ



مِقْرَأُ




مِقْرَأُ



مِقْرَدُونٌ



مِقْرِنِسٌ صِرْغَامِي



مَقْصَب



مَقْطَاع



مَقْطَى



مَقْل

Cotonnerie (F). **مَقْطَنَة** - ٢٧٣٦٣Cotton-plantation (E).
الارض التي تزرع فيها القطنان . ج مقطن .Chapon (F). Capon (E). **مَقْطُوش** - ٢٧٣٦٤

هو الطُوشن اى فرخ الدجاج الخفي . ج مقاطيش .

Tronqué (F). Truncate (E). **مَقْطُوم** - ٢٧٣٦٥Epicyrus (S). Epicyrte (F). **مَقْطِي** * - ٢٧٣٦٦

جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة السلونيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض انهر البلاد
الحارة الاسيوية والامريكية || اجسامها اهليجية منبطة
تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . رؤوسها مستطلة . قصيرة .
عيونها كبيرة جاحظة . اشداها رجيبة . ظهورها ربيعة .
مقدمها يشرف على الرأس . تتميز بزغافنها الشرجية
المستطيلة وبالظهريه الثنائية المدد المتفاوتة الحجم .
انواها الى الريكة يملوها موج نفسي || غولها مأكولة .

Aloès (F). **مَقْعَدَان** - ٢٧٣٦٧

هو الألوّة والمقر .

Gibbeux (F). Gibbous (E). **مَقْعَر** - ٢٧٣٦٨نعت تعريفي توصف به الاشياء المقعرة السطوح ومنها
الاوراق والازهار .Concavilligne (F). **مَقْعَر الاطراف** - ٢٧٣٦٩

Concavilline (E).
نعت تعريفي ومعنى يستعمل في تصنيف الدوائج انحصا
للخيل والاففار . ويكون مقعر الاطراف ذا جبهة مقعرة
وحجاج بارز وكفل منح الخ...

* **مَقْل** - ٢٧٣٧٠

Balsamodendron africanum, Heudelotia africanum
(S). Balsamé d'Afrique, Arbre à baume (F). Bal-
samodendron kna, Bdellium tree (E). Afrikanischer
Balsambaum (D). Albero balsamo d'Africa,
Bdellio (I).

نوع من اللسان وفصيلة البخوريات ، منته البلاد الافريقية .
يكثر في تمام حوض البحر الاحمر . شجيره متوسطه القد
فروعها . اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية الشكل
المغطية الاطراف . ازهاره فردية محورية رباعية التركيب .
ثمارة جراه رباعية الفلق . يستخرج من ساقه عصارة
وراثنية بخورية فائرة الصنفر ويستعمل من زهره عطر
حزير .

Marrube blanc (F). **مَقْل الصَيْف** - ٢٧٣٧١

هو الفراسين الأبيض ، اطله .

Bdellium Indicum (S). **مَقْل الْبَهْود** - ٢٧٣٧٢

Balsamé de l'Inde (F). Indian bdellium tree, False
myrrh, galgal (E). Indisches Bdelliumbaum (D).
Bdellio (I).

نوع من اللسان وفصيلة البخوريات . يكثر في بعض
الاصقاع الهندية . شجيره صغيرة القد . اوراقه مركبة
ثلاثية او خاسية الوريقات . ازهاره رباعية التركيب
قواحة العرف || يستخرج من سوقه عصارة راثنية بخورية
تستعمل في المايد ويستعمل من ازهاره دهن عطري
مغروب فيه .

Malaxage (F). **مَقْس** - ٢٧٣٤٥

Kneading, Working (E).
مقس الزبدة بعد فصلها عن الخيض وقيلها لتتجانس
اجزائها بعد طرد الهواء منها .

Sébastien (F). **مَقْسَاس** - ٢٧٣٤٦

هو الدبيق ، شجرة حرجية صناعية .

Crémomètre (F). **مَقْسَاد** - ٢٧٣٤٧Crémometer (E).
مقياس القشدة .Ebogeuse (F). **مَقْشَر** - ٢٧٣٤٨

آلة تنزع القشور الشائكة التي تغلف ثمار الكستنا .

Décorqueur (F). **مَقْشَرَة** ، **مِكْشَطَة** - ٢٧٣٤٩

Disbarked (E).
اداة من حديد تستعمل في تنظيف سوق بعض الاشجار
من القشور اليابسة .

Sécateur (F). **مَقْص الْبُسْتَانِي** - ٢٧٣٥٠

Pruning-shears (E).
مقص البستاني . ويقص التقليم ومقص الشجر والمقراض
واحد .

Cannale, Roselière (F). **مَقْص الْخَضِير** هو المبر ، اطله . - ٢٧٣٥١Cane-plantation, Reed-bed (E). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥٢

كل مكان زرع فيه القصب بكرة او نبت طيبيا .

Faux (F). Scythe (E). **مَقْصَب *** - ٢٧٣٥٣

اداة كالمنجل كبيرة الشفرة المستطيلة تستعمل في الحصد
والخش .

Luzernière (F). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥٤

Lucerne-field (E).
المكان الخاص لزراعة القصب اى الفصة .

Colportage (F). Hawking (E). **مَقْط** - ٢٧٣٥٥

عيط يصاد به الطير .

Colportage (F). Hawking (E). **مَقْط** - ٢٧٣٥٦

هو بيع التجوال .

Multipolaire (F). **مَقْطَاب** - ٢٧٣٥٧

كثير الاقطاب .

Microtome * ، **مَقْطَاع** - ٢٧٣٥٨

مقشرة * - ٢٧٣٥٩

Distillerie (F). **مَقْطَرَة** - ٢٧٣٥٩Distillery, Still-house (E).
صناعة التقطير وبصل انتاجه .Section **مَقْطَع** - ٢٧٣٦٠Soc (F). Ploughshare (E). **مَقْطَع** - ٢٧٣٦١

جزء رئيسي من محراث مكانه وراء السكين وظيفته قطع
كتلة التراب انقيا .

Griffe (F). Root (E). **مَقْطَم** - ٢٧٣٦٢

القطم ج مقاط : هي الفروع الناشئة عن ارمدة الحليين
واشباعه من النبات .

Lip (F). ٢٧٣٨٥ - مَقَمَّة ، مِقَمَّة

Thick lower lip (E).
هي المومة اي شفة الحيوانات المجترية كالابقار والاعنام
وللماعر .

Patte (F). Paw (E). ٢٧٣٨٦ - مَقَنْب

كف الامة ، مخبط الامة في مقنبه . ج قنوب .

Chênevière (F). Hemp-field (E). ٢٧٣٨٧ - مَقَنْبِيَّة

مزدرع القنب مها اتسع .

Mimule (F). ٢٧٣٨٨ - مَقَنْبِيَّة

هي الدندل ، اطلبه .

Calyptrea (S). ٢٧٣٨٩ - مَقَنْبِيَّة * ٥

Calyptrée (F). Calyptraea (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديبات الارجل
وحيدات الاجهزة وفصيلة القرويعيات . انواعها المعروفة
عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطباشيرية والثالثة
والبعض الآخر معاصر منتشر في جميع بحار العالم . جميع
انواعها تحضن الشلق على الصخور ملحوظا بارجلها ||
اصداؤها يرمية الشكل . رؤوسها قصيرة مفلوقة المقدم .
اقواها مستديرة . لواصها مستطيلة . عيونها صغيرة قاعدية .
غياشيمها حلبيبة الشكل ، قاسحة .

Miconia (S). Miconie (F). ٢٧٣٩٠ - مَقَوَانِيَّة

Indian bush (E). Mikonie (D). Miconia (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القرانيات .
انواعها زهاء ٥٠٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية .
اوراقها لا قياسه الشكل والترتيب . ازهارها ابطية وطرفية
الارتكاز . مجارها حلمية مستديرة قاسية القشور . منها انواع
حمية . اوراقها عطرة تستعمل استعمال الشاي ومنها طيبة
يستعملون مجارها في معالجة علل المرارة . ومنها صناعية
صبغية غضاها اصفر اللون جيد الصنف .

Licol, Licou (F). Halter (E). ٢٧٣٩١ - مَقَوَد

اداة من جلد أو حبل تستعمل لقيادة الدواب .

Starter ٢٧٣٩٢ - مَقَوَس

حبل تصف عليه الخيل عند السباق . ج مقاروس .

Bouleté, Juché (F). ٢٧٣٩٣ - مَقَوَس الحَوْشَب

Upright on fetlock-joint (E).
تقويس في حوشب القرس يعتبر من عيوب الخيل القاسية .

Arqué, Brassicourt (F). ٢٧٣٩٤ - مَقَوَس الرَكْبَة

Bandy-legged, Knee-sprung, Arched (E).
نعت يوصف به القرس المقوس الركبة طبيعى لا عن مرض
ولا عن هرم .

٢٧٣٩٥ - مَقَوَسْ

«طائر معروف مطوق سواده في البياض كالحمام» . (الجاحظ) .

Machson (F). ٢٧٣٩٦ - مَقُون

فراشة من المذانيبات ، يرقها تعيش على اوراق الجزر
والشار . راجع مذئاب مقون .

٢٧٣٧٣ - مِقْلَاب ٥ ، دَاثِرَة الْإِنْقِلَاب

Tropique (F). Tropic (E).

المقلاب أو دائرة الانقلاب الحزام القائم بين دائرتي
الانقلاب الصيفي والشتوي أي دائرة السرطان ودائرة
الجدي .

Tropical (F). Tropical (E). ٢٧٣٧٤ - مِقْلَابِي ٥

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمقلاب كقولك
المناخ القلاني والامطار المقلابية والمنطقة المقلابية وهي
أحر مناطق الكون .

Atmomètre (F). ٢٧٣٧٥ - مِقْلَاص ٥

Atmometer (E).
جهاز خاص تقاس بولمسته مقادير سوائل تبخرت في
مدة معينة .

Versoir (F). Mould-board (E). ٢٧٣٧٦ - مِقْلَب

جزء محراث الذي يقبل كتلة التراب بعد أن يقطعها
المقطع .

٢٧٣٧٧ - مِقْلَبِيَّة ٥ ، تَمَقْلُب ٥

Tropicalisation (F).
المقلبة جعل المواد واللوازم الصناعية وغيرها لا تتأثر
بالمناخ القلاني .

٢٧٣٧٨ - مِقْلَبَة الْقَاصِي * ، يَطْبِخْ شَوْكِي

Melocactus (S). Mélocacte, Mélocactus, Melon-car-
don (F). Melon-thistle, Turk's-cap cactus (E). Melon-
enkactus (D). Papone spinoso (I).
جنس نباتات حلمية شائكة من فصيلة السباريات . انواعه
نحو ٣٠ منظرها زينة . اصطابها البلاد الحارة . سوقها
بطيحية الشكل ، مخززة ، شائكة ، عادمة الورق . ازهارها
اورصوية الازرتكاز ، كبيرة القد ، جميلة القالب والالوان
الزاهية . ثمارها ، عنية حمراء اللون ، ملساء البشرة .

Fauchard (F). Slash-hook (E). ٢٧٣٧٩ - مِقْلَد

المنجل يقطع به القت والغشب .

Carrière (F). Quarry (E). ٢٧٣٨٠ - مِقْلَع

ويدعى المنجر والمقلع ، هو المكان الذي تستخرج منه
الحجارة .

Déplantoir (F). ٢٧٣٨١ - مِقْلَع

Garden-trowel (E).
اداة تستعمل لقلع النباتات الصغيرة مع ثني من التراب
يحفظ شروشها ريثما تنرس في مكان آخر .

Dégazonneuse (F). ٢٧٣٨٢ - مِقْلَعَة الْخَضِير

Unturfer (E).
محراث مفلطح المقلع العريض القصير ، له سكتيان ، يستعمل
في اقتلاع الخضير .

Conserves (F). ٢٧٣٨٣ - مِقْلَعَات ٥

Conserves, Preserves (E).
هي الاطعمة المحفوظة المقطوع عنها الهواء . وينهم من
ساما مليبات . ويدعونها ، في مصر ، الكنسرة
والكنسروات .

٢٧٣٨٤ - مِقْلَم

قصب الثور والتميس والجلمل . والمقلعة : وهاء القصب .



مقلّة القاصي



مقنة

Mucuna (S).

Mucune, Pois à gratter, Pois pousseux (F). Cowitch, Cowage (E). Jackfasel, Stechende Echte Fasel (D). Fagiolo di Rio Negro (I).

جنس نباتات عارضة من فصيلة الآزيات الغرائية . أنواعها نحو ٢٥، أعطانها البلاد الاستوائية وأجزاء . سوقها لولبية التعريش ، حواملها ثنائية . أوراقها مركبة ، طويلة الزناد ثلاثية الوريقات . أزهارها كبيرة القد حمراء اللون . سنفاها مفلطحة مجنحة مستطيلة الهدبة الطرفية الشائكة . بزورها مستديرة ، مبطلة ، هلبية البشرة ، تغفل عند لمسها ما يفعله القراص .

Echelle, Mesure (F).
Ladder, Scale (E).

۲۷۳۹۸ - مقیاس

جهاز يمكن من معرفة درجة الحرارة اللازمة لتقليان كل جسم أو مائع .

٢٧٤١٢ - مقياس القشدة ، ميزان القشدة
Butyroscope, Grécomètre (F), Grécometer (F)

هو المكشاة ، اداة تقاس بها نسبة القشدة في الحليب .

Dynamomètre (F). ٢٧:١٣ - مقياس القوة
Dynamometer (E). هو المنشاط، أطله

133

Pèse-esprits (F). مقياس الكحول - ٢٧٤١٤
هو المكحول ، اطلبه .

Calcimètre (F). مقياس الكلس ٢٧٤١٥
Calcimeter (E).

هو المكلاس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس في التراب .

٢٧٤١٦ - مقبّاس السّان

Glossomètre, Glottomètre (F). Glossometer (E).

هو الملسان ، جهاز يقاس به خرطوم النحل لمعرفة الانواع الاصلح من غيرها في ارتشاف رحيق الزهر .

Colorimètre (F). ٢٧٤١٧ - مِقْيَاسُ اللَّوْنِ
Colorimeter (F).

هو الملوان، جهاز يقاس به مقدار تلوث السوائل والمائعات
لا سيما الحبر، اطلب ملوان.

Centésimal (F). ٢٧١٨ - مِقياس مِئويّ
Centésimal (E).

Makaira (S). ٢٧٤١٩ - مقير * ، مكير
Makaira (F).

جنس اسماك بحرية كبيرة القد من شائكات الزعنائف
وفصيلة الاسقمريات . انواعه المعروفة ثلاثة جميعها قشرية
الشب من سيف البحر ، اشهرها المقبر الاسود الذي لا
يقل طوله عن اربعة امتار ، وهو يتميز بكبر زعنفته الظهرية
التي تشبه الشراع وبجهازه العظيم الذي يمتد من فكه الاعلى
الى شكل السفن .

٢٧٤٢٠ - مقف

Ehretia (S). Ehrétie, **مقيف** - ٢٧٤٢٠
Cabrillet (F). Ehretia (E). Ehretie (D). Ehretia (I).

جنس اشجار وشجيرات من فصيلة الحمحميات . انواعه نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية . اوراقها معنقة، متقابلة او متعاقبة . ازهارها عشكولية التجميع ، ابطية الارتكاز وطرية . ثمارها مأكولة لكنها تفتة وهي نوية ، لحية ، قدرها قدر الحنطة الكبيرة || اشهر انواعه ما يلي .

٢٧٤٢١ - مَقْشَفٌ كَبِيرُ الْوَرَقِ

Ehretia macrophylla (S). Ehretie à grandes feuilles,
Cabrillet à grandes feuilles (F).

نوع من المقيف ، شجيرة سبروتية تعلو من ٥ الى ٨ امتار



مَقْبُولَةٌ



مقرر

٢٧٣٩٩ - مِقْيَاسُ اخْتِمَارِ اللَّبَنِ، مِضْرَابُ ٥
Lacto-fermentateur (F).

أداة تعرف بواسطتها جودة اللبن . أساسها ان الحليب
البردي يروب قبل الحليب الجيد في حرارة معلومة .

٢٧٤١٠ - مِقْيَاسُ الْاَدْهَانِ
Oleomètre (F).
Oleometer (E).
أداة تقاس بها كثافة الادهان وتسمى مدهان.

٢٧٤٠١ - مقياس الاستواء. Niveau (F). Level (E).
م. الفادن ، اطله .

Actinometre (F). مِقْبَاسُ الْأَشِعَّةِ ٢٧٤٠٢
Actinometer (E). آلة تقاس بها قوة الاشعة لا سيما الاشعة الشمسية.

Pèse-sels (F). مقياس الأملاح ٢٧٤٠٣
Araeometer for salt liquids (E).
مستكشف بين سرعة درجة كثافة الاملاح .

Gypsumètre (F). ٢٧٤٠٤ - مقياس الجص
Gypsumeter (E).
كبريتات البوتاس هو المخصص ، أداة تستعمل لقياس
في الحمر .

Aphromètre (F). مِقْيَاسُ الْحَبِّبِ ٢٧٤٥٥ -
 Aphrometer (E).
 هو المِفْقَاع ، جِهَاز يَقيسُ به ضَغطُ
 قِطْنَانِ الخَمْرِ الفَوَارَةِ .
 الغاز الكربوني في

Hygromètre (F). مقياس الرطوبة
Hygrometer (E). هو المراتب ، اطله .

Planimètre (F). ٢٧٤٠٧ - مقياس السطوح
Planimeter (E). مقياس المساحة

Saccharimètre (F). مِقْبَاسُ السُّكَّرِ ٢٧٤٠٨
Saccharimeter (E). هو المسكار والمقار ، اداة تبين مقدار السكر المذاب في السائل المقصود .

Dendromètre (F). مقياس الشجر ٢٧٤٠٩
Dendrometer (E).
هو المشعار ، أداة تستعمل لتقدير علو الشجرة وحجمها

Imperméable (F). **مِكْتَمَام** - ٢٧٤٣١
Impermeable, Impervious (E).
صفة التربة التي تملك الماء .

Acquis (F). **مِكْتَسَب** - ٢٧٤٣٢
Acquired, Secured (E).
نعت تعريفي تمت به الصفة المكتسبة من الحيوان او النبات حسنة كانت ام سيئة . وكلمة مكتسب هي نقيض خلقي اي فريقي .

Acquêts (F). **مِكْتَسَبَات** - ٢٧٤٣٣
An acquisition (E).
هي الاموال التي يكتسبها الزوجان في اثناء الزواج .

مِكْتَل - ٢٧٤٣٤
Vendangeoir, Vendangeret (F). Grape-basket (E).
وعاء ينقل فيه العنب من الكرم الى المصرة .

مِكْتَل - ٢٧٤٣٥
Bréviligne (F). Breviline (E).
نعت تصنيفي يطلق على الحيوانات القصيرة الجال الهيكل بالنسبة الى متوسط جال نوعها او سلالته .

مِكْتَلَفَة - ٢٧٤٣٦
Enclave (F). Enclave, Gore (E).
كل ارض لا طريق لها ، والقانون يعطي صاحبها حق المرور .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٧
Mycter (S). Myctère (F). Mycter (E).
جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٦ الى ١٠ سم . رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاضراس . عيونها بارزة . تاشبهها وكوكوها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية . كواسلها معدودة . اغامها لاحقة . قوائمها نشطة . انثواها وحيدة اللون ، تكثر فيها السمرة الفحمة والجلوة . كواسلها واغامها مغلفة بمخل دقيق اشبه اللون او غير . تألفت الحراج والبراري والحدائق . جميعها واسعة . اما البرقة فنادرة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٨
Mycter (S). Jabiru (F).
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتَبَرِ الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخطاب والخطاب || اعرف انواعه واشهرها المِكْتَبَرِ الافريقي .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

مِكْتَبَرِ - ٢٧٤٣٩
Mycter (S). Jabiru (F).
مِكْتَبَرِ افْرِيقِي ، مِكْتَبَرِ السنغال ، لَقَلَق مَسْرُوح المِنَقَار ، اَبُو مَيَّة ، اَبُو مَلِيَّة .

اسطوانات فسيحة الاجزاء تمتد من الهند الى اليابان . ساقها اسطوانية . فروصها مضلعة زياه اللحاء . اوراقها متعاقبة ، بيضية ، مقطوعة الطرف ، تطول نحو ٢٠ سم . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها مأكولة .

مِفْيَت مَدْبَب الْوَرَق - ٢٧٤٢٢
Ehretia acuminata (S). Ehretia à feuilles acuminées, Cab. illet à feuilles acuminées (F).
نوع من المقيف وهو شجيرة جاحدة تطول من ٦ الى ١٦ متر . مهددا الهند . ساقها وفروصها اسطوانية ملسة . اوراقها متعاقبة ، سنائية الشكل ، ذرية ومديبة . نصلها يطول من ١٠ الى ١٠ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . وهو مستطيل المنق ، مسنن الحافة ، لامع الصفحة || ازهارها بيضاء اللون . ثمارها مأكولة .

مِفْيَت مَدْبَب الْوَرَق - ٢٧٤٢٣
Emétique (F). Emetic (E).
هو حجر القزاع اي الارنب البري ونحوه . ج اماء .

مِكَا - ٢٧٤٢٤
Terrier (F). Burrow, Hole (E).
هو جحر القزاع اي الارنب البري ونحوه . ج اماء .

مِكَا - ٢٧٤٢٥
Lepidium meyenii (S). Maca (F).
نبات حولي يقل من فصيلة الصليبيات . مهدد بعض مرتفعات جبال الاند الايريكية . ساقه لغنية الشكل والقد ، مأكولة . اوراقه قوسية الالتشاب ، مركبة ، ريشية . شمرانها الزهري يطول نحو ٤٠ سم . ازهارها عككولي . ازهار صغيرة القد ، وردية اللون . غريباته بحيلة مستطيلة . يزوره كروية دقيقة || يتكاثر باليزر . منته الاقاليم الجردية . يرغب في الاثربة الخلوة الوافرة العناصر الغذائية .

مِكَا - ٢٧٤٢٦
Certhilauda (S). Sirli (F). Bifasciated lark (E).
جنس طير من فصيلة القربيات . انواعها ستة ، بعضها صحراوي وبعضها من طيور الشرق الادنى واروبة وطسا جميعها تصيد في الجو رهيبون وهي في ذلك تمكرو وتصفر . اجسامها صغيرة القد تطول من ٢٢ الى ٢٤ سم . انثواها متعادلة الانوان يكثر فيها الاخراج والاضحل . صدورها موشية . اعناقها بيضاء . منقبتها قوية مستطيلة منقوفة الطرف . غنايلها نشيطة . حادة الاظفار ، تمكسها من استنار التربة || تألف الغشاب والاراضي للمساحة قوتها الحشرات واليزور البرية || تدن عشها في افحوص بين الاذغال والحش . فضتها حولية تتألف من ٤ او ٥ بيضات تحضنها بمنارة الذكر .

مِكَا - ٢٧٤٢٧
Emoluments (F). Remuneration (E).
هي ما يمنح من تعويض عن القيام بأمد التأدية .

مِكَا - ٢٧٤٢٨
Moelle (F). Pith (E).
القسم الداخلي المركزي من ساق النبات .


مِكَا - ٢٧٤٢٩
Médullaire (F). Medullary, Medulla (E).
مِدْلاية .

مِكَا - ٢٧٤٣٠
Press (F). Pressure, Throng (E).
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .






مِكْنَاة



مِكْحَال



مِكْحَال الحمر



مَك



مِكْرَة مَبْدُولَة



مَكْرُور نَفْثِي



مَكْرُور مَبْدُول

القاعدة ذرب الزام الاخير، يبدو احمر اللون ويستقر على الخضار البحري تملوه حلة كثيفة. بتلات ازهارها صغيرة ضيقة تطول نحو ٢ سم. ثمارها حامضة لا تؤكل.

٢٧١٥٤ - مَكْرَة مَبْدُولَة *، بَشْمَلَة

Amelanchia rotundifolia, *A. vulgaris* (S). *Amélan-chier commun* (F). *Savoy medlar*, *Service-berry* (E). *Felsenbeer*, *Felsenbirne*, *Gemeine Felsenbeer*, *Traubenbirne* (D). *Aronia* (I).

نوع من المكر وهي جنبة مبدولة تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها بيضيه مستديرة الطرف تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها يبدو قطبي الصفحة السفلى ثم يستقر على الحزمة. بتلات ازهارها خلية البشرة. ثمارها سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ١ سم.

٢٧١٥٥ - مَكْرَة يَابَانِيَّة

Amelanchia asiatica (S). *Amélan-chier du Japon* (F). نوع من المكر وهي شجرة دائمة متوسطة القد تطول من ١٢ الى ١٢ م. اوراقها شتائية، نصلها خلي الصفحة مسنن الحافة بطول نحو ٧ سم. ويعرض نحو ٤ سم. بتلات ازهارها قدية الشكل خلية الصفحة الخارجية. ثمارها سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

Cerisae (S). *٢٧١٥٦ - مَكْرُوزَة*
Cherry-orchard (E). هي مزروع الكرز.

٢٧١٥٧ - مَكْرُورُوم السَّخْل * هو زفقوق السخيل، اطلبه.

Macurus (S). *٢٧١٥٨ - مَكْرُور **
Macroure, *Lépidolèpre*, *Grenadier* (F). *Macrurus*, *Rat-tail* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المَكْرُورِيَّات. انواعه المعروفة ثمانية منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة. جميعها مستطيلة الاخطام الذلقة، قصيرة الاشداق السفلى، كبيرة العين الجاحضة، مستطيلة القدم، مستديرة المؤخر العادم الزعفة. سفنها مثلث الزوايا، مستقي الطرف الشائك || اشهر انواعه المَكْرُور المبدول والنفسي.

٢٧١٥٩ - مَكْرُورُوفِي * *Macurus trachyrrhynchus* (S).

Macroure argenté, *Lépidolèpre argenté* (F). نوع من المَكْرُور يكثر وجوده قرب الساحل الافريقي من البحر المتوسط والخليج الاطلسي. طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى الطحلة الفضية الملاج يعقب مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن. لحمه متوسط الصنف مأكول.

٢٧١٦٠ - مَكْرُورُ مَبْدُول * *Macurus caelorrhynchus* (S). *Macroure commun*, *Lépidolèpre commun* (F). *Common Rat-tail* (E).

نوع من المَكْرُور يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط. طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الريدة البنفسجية الملاج يعقب عند الظهر ويميل الى الفضي عند البطن. لحمه متوسط الصنف مأكول.

Macrouridae (S). *٢٧١٦١ - مَكْرُورِيَّات **
Macrouridae, *Macruridae* (F). *Macrouridae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من المملوات شاكيات الزعانف. اجناسها وانواعها متوسطة العدد. اعطائها بحار المناطق

سواء. اساق الى الكعبة العابقة يملوها مواج احمر || يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان. يأنث مجاري الماء وخصاف الاثر وشواطي البحر. قوته اخشرات والمظاه والحيات والاسماك. يند في الانجار. انتاه تحضن اربع بيضات.

Crémomètre (F). *٢٧٤٤٠ - مِكْنَاة **

Creamometer (E). اداة تقاس بواسطتها نسبة القشدة في الحليب.

Densimètre (F). *٢٧٤٤١ - مِكْنِاف*

Densimeter (E). اداة تستعمل لمدرة الثقل النوعي في كل جسم.

Condenseur (F). *Condenser* (E). *٢٧٤٤٢ - مِكْنِث*

Condensateur (F). *٢٧٤٤٣ - مِكْنِثَة*

Condenser (E).

Alcoolomètre (F). *٢٧٤٤٤ - مِكْحَال **

Alcoholometer (E). هو ميزان الكحول، جهاز ينفطس في السائل الكحولي فيبين نسبة ما يحويه من كحول.

*٢٧٤٤٥ - مِكْحَال الخُمُر **

Vinomètre, *Vinoscope* (F). *Vinometer* (E). جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في الخمر.

Jacinthe muguet (F). *٢٧٤٤٦ - مِكْحَلَة*

نبات تربيني ينضج جاست. شرقي، اطلبه.

Râteau (F). *Rake* (E). *٢٧٤٤٧ - مَكْد **

اداة تستعمل لتضيق التربة.

Grange (F). *٢٧٤٤٨ - مَكْدَس*

هو السقيفة، اطلبه.

Botteuse (F). *٢٧٤٤٩ - مَكْدَسَة*

Binder, *Sheaf-binding machine* (E).

جهاز يلوي آلي يستعمل لكس القش والبن وما اشبه.

Irriguer (F). *To irrigate* (E). *٢٧٤٥٠ - مَكْر*

مَكْر الارض: سقاها. امكروا الارض فانها صلبة ثم اخروها. والمكرو هي السقية. ج مكر ومكور.

Rectificateur (F). *٢٧٤٥١ - مِكْرَارَة **

Rectifying (E).

جهاز خاص يستعمل لتكرير الكحول وذلك باعادة التقطير.

Amelanchia (S). *Amélan-chier* (F). *٢٧٤٥٢ - مَكْرَة*

جنس شجيرات وجنات برية وتربينية من فصيلة الورديات. انواعها عديدة، اعطائها العالم. سوقها فوا. اوراقها بسيطة عابطة، نصلها كثيفة البروق. ازهارها عنقودي التجميع محوري الارتكاز. ازهارها قليلة العدد مستطيلة البتلات البيض. ثمارها نورية، صغيرة القد، بنفسجية اللون || اعرف انواعها ساءيل.

٢٧٤٥٣ - مَكْرَة كَنْدِيَّة

Amelanchia canadensis (S). *Amélan-chier du Canada* (F).

نوع من المكر وهي شجرة متوسطة القد تطول من ٥ الى ١٠ امتار. اوراقها مستطيلة، نصلها بيضي الشكل قلبي

* مَكْرُوسِيورِيوم الموز * ٢٧٤٦٨

Macrophoma musae, Phoma musae (S).
وصم بعثري الموز سببه فطر مجهري يركب الاوراق والثمار || مظهره الخارجي يقع مستديرة متتامة حنطية او سمراء اللون تقطع النصل من الفلج الى الحافة . وهو ان الثمار يقع سود صغيرة متتامة تشبه القشور دون ان تؤذي اللب || يكافح باستعمال سائل بودرو وبتغليظ معلق الكيما عند اكتمال امشاطها بالورق الابيض او المستعمل من اي صنف كان .

Mucron ٢٧٤٦٩ - مَكْرُون ٥
من صغيرة بارزة مختلفة الاشكال ترتكز عليها بعض الاعضاء الفطرية او النباتية كارتكازها على محور او على وثيرة . ج . مكارن .

Macronyx (F). ٢٧٤٧٠ - مَكْرُونِيكس
هو الزهدل ، اطليه .

Douane (E). ٢٧٤٧١ - مَكْس ، جَمْرُوك
Customs, Custom-house (E).

Péage (F). *Toll* (E). ٢٧٤٧٢ - مَكْس المُرُور
رسم محدد تفرضه السلطة على كل شخص او سيارة تمر في مكان معين .

Trigonocephalus piscivorus, * ٢٧٤٧٣ - مَكْسَان ٥
Ancistrodon piscivorus (S). *Trigonocéphale piscivore, Moccasin* d'eau (F). *Motton-mouth* (E).
حية سرلودة سامة من الانواع انبويات الاخايد . موطنها يشمل امريكا الوسطى والمكسيك . تألف غشاف مجاري الماء والمناقع والمرزات || جسمها يطول نحو ١٥٠ سم . رأسها حرسائي الشكل . عنقها دقيق وذنبها كذلك . قرينة الشبه بالصنعية لكنها عادمة الجهاز الحركسي الصنعي الصوت || تعتبر من الانواع الشرسة الجيئة الشديدة الاذى .

Ratissoire (F). *Scraper* (E). ٢٧٤٧٤ - مَكْسَحَة
اداة يلوze تستعمل في تسوية التربة وتنظيفها من الاعشاب .

Myxomatose (F). ٢٧٤٧٥ - مَكْسُومَة الارنب
Myxoma (E).
تزيد حجروي يصيب الارنب فيقطع النسيج التي يتركز فيها .

Thermoscope ٢٧٤٧٦ - مَكْسَف ٥
محار هوائي يستعمل في درس الفوارق الحرارية بين وسطين او بيتين .

٢٧٤٧٧ - مَكْسَف الجلكد ، مِكْشَلَد ٥
Pagoscope
جهاز يدل على الصقيع وهو من ادوات البورات يستدل به على امكان حصول الصقيع ليل . راجع مجلد .

Avant-soc, Rasette (F). ٢٧٤٧٨ - مِكْشَط
Tuning-wire (E).
قلعة من المحراث تتقدم السكة وظيفتها كشط التربة .

Emousseir (F). ٢٧٤٧٩ - مِكْشَطَة *
Moss-scraper (E).
صفحة معدنية مسنة او قفاز من شريط يستعمل في كشط الطلعب عن الشجر .

الحارة . جميعها سامة تألف اللجاج وقلما تقترب من المحاذق والشلوط || اجسامها شبه رجمية الشكل ، مستدقة الاذيال الماددة الزعانف . مخروطية الرؤوس الذلقة ، كبيرة البون المستديرة الجاحضة ، قصيرة الاشداق السفلى المنطفعة . حراشيفها مثلثة الزوايا ، مستدقة الاطراف الشائكة . زعانفها الظهرية والشرجية تمتد كالنواشع المتتامة القصيرة حتى اطراف الاذيال || اعرف اجناسها واشهرها المكروور .

٢٧٤٦٢ - مَكْرُوسِيورِيوم ٥
Macrosporium (S).
جنس فطور مجهرية من عمار الزاسمايات وقصيلة اللطحيات . كانت انواعه فيها مضى عديدة وبخلفة الاشكال فاطر العلم الحديث ضرورة احاطها بالاجناس والمارات التي تشبهها فلم يبق منها سوى النوع المعروف بمكروسيوريوم الشام .

٢٧٤٦٣ - مَكْرُوسِيورِيوم الشَّام *
Macrosporium cucumerinum (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق وثمار الشام والبطيخ . مظهره الخارجي يقع صغيرة متراكبة سمراء اللون تملص الاوراق والثمار وتمتطها بهالات متتامة عابقة اللون تسبب يباس النسيج المتحارة ثم ذبول نصال الاوراق وتقريح قشور الثمار || يكالنج يتطهر البذار قبل زرعه وقد يحسن نضج المبطحة عند ظهور الوسم . بأحد املاح النحاس المركز او المخلول من ٥ ٪ الى ٧ ٪ .

٢٧٤٦٤ - مَكْرُوسِيول ٥
Macrostylis (S). *Macrostyle* (F).

جنس شجيرات وجنبات برية وريبيية من فصيلة السلايبات . مشهورة بازهارها المستطيلة الالوان الزرقية السات .

٢٧٤٦٥ - مَكْرُوسِيومَة ٥
Macrophoma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفيغيات . يتميز بكتائله المستطيلة القائمة ضمن بكتيدات سميكة الجول ، ضيقة المقل انواعه التي تهم الاقتصاد الزراعي قليلة ، اعرفها :

٢٧٤٦٦ - مَكْرُوسِيومَة الشاي ٥
Macrophoma theicola (S).
فطر مجهري يصيب الشاي في افاده واوراقه . مظهره الخارجي يبور قرصية مستطيلة تركب لواء الافناد خففي على نموها ، وبقع حنطية تصيب نصل الاوراق في زانها الاخير فتدولها || يكالنج يتقلم الافناد الموصوة وينضج الجنبات بسائل بودرو او بغيره من القواطير المخربة .

٢٧٤٦٧ - مَكْرُوسِيومَة القاصِصِيَة ٥
Macrophoma phaseoli, M. corchori, M. cajani, M. sesami (S).

فطر مجهري ناعم ، واسع الانتشار ، يوجد في جميع البلاد الحارة . يركب جذور وسوق وثمار عدة نباتات مختلفة احصاها القاصصا والقلطن والبطاطا الخلسو والحمضيات والبن والكافور والبطاسا والسنط || يصيب القاصصا بجذورها وجنبها وساقها فيعفن الجذور والجنبات ويمتلق الساق بنشأه ليد امر اللون || وهو على القطن عفن اسمر يركب الجذور وبقع قرصية لونها الى الجذوة تملو الساق فوق التربة || وعندما يصيب البطاطا الخلسو يحول لياها الى مادة اسفنجية سوداء اللون || وهو في الحمضيات عفن اسود يركب الجذور ووصم يحل بلحاء السوق فيصيب جفانها وانصداعها ورشح عصارة صمغية تفقد الشجرة بعض حيويتها وتقودها نحو القمامة || يكالنج باستعمال اسود القواطير الفعالة غير المركزة على النحاس .



مكروسيوريوم الشام



مكروفيوم الموز



مكسان



مكشطة

٢٧٤٩٣ - مَكُونَة الاسْتِرْدَاد ، خَبَار الاسْتِرْدَاد

Faculté de rachat

هو حق ارتجاع المبيع بموجب شرط الرّوَاء .

٢٧٤٩٤ - مَكْنَس ، كِنَاس

Retraite (F).

Retiring (E).

مولج الرّوح من الطّباء والبرّق تستكن فيه من الحرّ .

٢٧٤٩٥ - مَكْنَس

Sorgho à balais (F).

نبات زراعي مشهور باسم ذرة المكاس .

٢٧٤٩٦ - مَكْنَسَة الأندَلُز

Molène blanche (F).

هي البوسير الأبيض ، اطليه .

٢٧٤٩٧ - مَكْنَسَة الجَنَّة

Kochie (F).

هي الهيشم ، نبات تزييني جميل القالب والخفّار .

٢٧٤٩٨ - مَكْنَسَة السّاحِرَة

Balais de sorcière (F). Broom of the sorceress (E).

تعريف وصفي يطلق على اثنان مشابهة مريضة تكون

في بعض الانجبار الشجرة والحرجية سبها فطور مجهرية

مختلفة .

٢٧٤٩٩ - مَكْنَسَة

Mécanisation (F).

Mechanization (E).

٢٧٥٠٠ - مَكُون

Potentiel (F). Potential (E).

صفة القوة الكامنة .

٢٧٥٠١ - مَكُو

Terrier du lièvre (F).

Hole of the hare (E).

جحر القرواي اي الارنب الوحشي .

٢٧٥٠٢ - مَكُونَة *

Manucodia (S).

Manucodia (F). Manucodia (E).

جنس طير من الجولام وفصيلة الترزورويات . انواعه

المعروفة نحو ١٠ جميعها من طيور استرالية والجزر

المجاورة . ملجها الحيائي جماعي . جامعاتها متوسطة العدد .

تألف القابات . قوتها الحشرات والثمار والبذور || اجسامها

ربعة تطول من ٢٠ الى ٢٦ سم . اثوابها تراوح بين

الازرق والاخضر والاسود جميعها سفاه المواجه . رؤوسها

مكّلة بريش نام صغري لونه يختلف عن لون الرأس

والرءاء . اجنتها معتدلة الحجم . اذنانها مستديرة الاطراف .

انثاها تتحلل بنفس الاثواب || تدفن اعشاشها في الانجبار

الرفيعة . الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٦

بيضات . الترعيم يستمر نحو ١٥ يوماً .

٢٧٥٠٣ - مَكُونَة *

Limacoda (S).

Limacode (F). Limacode (E).

حشرة من فصيلة المكوديات ورتبة حشرنيات الاجنحة .

اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف

الحراج التي تكثر فيها الانجبار الابيدة الدواك || جسمها

صغير اللد ، كثيف الحمل الناعم . بسطها نحو ٢١ سم .

اسها شبه مزواني الشكل . عيناها صغيرتان . خطها

شديد القصر . ملمسها دقيقان ، مستطيلان . زباناتها

خطياني . كوسلها متكاثف الحمل . يلبسها متراكب

السف والخلل || سرقها قريبة الذيله بالخلازون وتنقل

بطءه مثله . وهي خاضعة تعيش على اوراق السديان ويقره

من الانجبار الابيدة .

٢٧٤٨٠ - مَكْعَب

Cube (F). Cube, Cubic (E).

٢٧٤٨١ - مَكْعَبِي

Cuboïde (F). Cuboid (E).

٢٧٤٨٢ - مَكْفَهَر

Cumulo-nimbus

هو الركام ، نوع من الغيوم ، اطليه .

٢٧٤٨٣ - مَكْلَاس

Calcmètre (F). Calcmeter (E).

هو مقياس الكّلس ، جهاز يمين مقدار كربونات الكّلس

في التراب .

٢٧٤٨٤ - مَكْلَف ، مَعَهْدُ له

Grevé (F).

Burdened, Encumbered (E).

٢٧٤٨٥ - مَكْلُورَة

Maclure (F).

هي القانة ، ثمرة فراء من القراصيات .

٢٧٤٨٦ - مَكْنَسَة

Truffière (F).

Truffe-ground (E).

ارض تثبت الكم . ومستنبث الكم .

٢٧٤٨٧ - مَكْنَة ، مَخَنَاقَة

Butteuse, Buttoir (F).

Ridging-plough (E).

محراث خاص يستعمل لكي افي تخفيض المزروعات التي

تتطلب هذه الحالة .

٢٧٤٨٨ - مَكْن

Œufs d'insectes (F).

Eggs of the insects (E).

المكن هو بيض الحشرات . الواحدة مكنة .

٢٧٤٨٩ - مَكْنَان

Ovisac

جراب المكن في بعض الحشرات وقد يكون في البطن

او شرجي الانكاز .

٢٧٤٩٠ - مَكْنَانَة ، مَدْرَة

Galega (S).

Galega, Lavanèse (F). Goat's rue (E). Geiss-raute

(D). Galega, Lavanese (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات

الفراسية . انواعها عديدة جميعها علفية تنشط الدر . اوراقها

متعاقبة ، مركبة ، ريشية ، ورتية . ازهارها عتقوية التجميع ،

ابلية الارتكاز ، زرقاء اللون او بنفسجية || اشهر

انواعها ما يلي .

٢٧٤٩١ - مَكْنَانَة شَرْقِيَة

Galega orientalis (S).

Galega oriental (F).

نوع من المكثنة وهي عشبة معمرة مبلولة تطول من ٦٠

الى ١٢٠ سم . ارضها ممدادة ، ساقها فراء خلية . اوراقها

تعد من ١١ الى ١٧ وريقة . وريقاتها بيضية مدببة تطول

من ٥ الى ٥ سم . نصلها خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها

بنفسجية اللون ، ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

يقال انهم تحلل خواص المكثنة المغزلية ولكنها دونها منقعة .

٢٧٤٩٢ - مَكْنَانَة مَخَزْنِيَة *

Galega officinalis (S). Galega officinal, Rue des chèvres

(F).

نوع من المكثنة وهي عشبة مبلولة معمرة تطول من ١٠٠

الى ١٥٠ سم . ساقها فراء . اوراقها تعد من ٩ الى ١٣

وريقة ، وريقاتها سانية تطول من ٢ الى ٤ سم . نصلها

مالس الصفحة مهدب المقع . ازهارها زرقاء اللون .

ازهارها يستمر من حزيران الى آب . وهي صباغية وتعتبر

من النباتات الطبية الممنوعة تدخل في عدة علاجات اخصها

علاج السلس .



مكثنة مخزنية



مكود



مكود

٢٧٥١٢ - ملاخ

بقلة طيبة رخصة تدعى كشعفة (السان). الواحدة ملاخة.

Resumuria (S).

Réaumur, Réaumurie (F).

جنس نباتات بحالية وجنبية من فصيلة الالديات. انواعها المعروفة سبعة منها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط || سوفها منتصبه رفيعة فرعاء تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها متعاقبة، متقاربة الارزكاز، خطية النصال الصغيرة القذ البحرية اللون. ازهارها فردية التجميع، ابطة وطرفية الارزكاز، خاسية التركيب، تكثر فيها اللون الابيض. ثمارها خاسية الفلق. تنديرها صيفي || اعرف انواعه واشهرها الملاح البودي المعروف بحشيشة الحصف.

٢٧٥١٤ - ملاخ دودي

Réaumurie vermiculée (F).

نبات بري طبي مشهور باسم حشيشة الحصف، اطلمها.

Saline (F).

Salt-marsh, S.-mine, S.-pit (E).

المكان المد لاصطناع الملح ومنجم الملح.

٢٧٥١٥ - ملاخة

٢٧٥١٦ - ملازة

مزدور اللوز وكل ارض تكثر فيها اشجار اللوز.

Malleus (S).

Marteau (F), Malleus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم، عادات المتأصب وفصيلة الاطريات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي || اصداقها لانظامية، متباينة الاشكال، لاقياية المصاريع، بعضها قريب الشبه بالمطاس. مفصلاتها عادمة التسنين || تعيش لاصقة بصخور المجاح على اعماق تراوح من ٥ الى ١٥ م.

Crenatula (S).

Crenatula (F), Crenatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادات المتأصب وفصيلة الاطريات. انواعها المعروفة ثمانية جميعها من عظم البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصداقها شبه مروحية الشكل، رفيعة المظهر، رقيقة المصاريع الامتساوية، نحلة التخديد لؤلؤة الداخل || تعيش لاصقة بالاسفنج.

٢٧٥١٩ - ملاسة، مملسة، مالح، مملقة

Rouleau (F), Roll, Roller (E).

معدلة اسطوانية تستعمل في تحليس او حذل التربة الزراعية. اشكالها واحجامها عديدة تختلف باختلاف الغاية من استعمالها. اعماها:

Rouleau plombé (F).

ملاسة واصة

Rouleau ondulé (F).

ملاسة مناجاة

Rouleau à bates (F).

ملاسة خياطة

Rouleau marqueur (F).

ملاسة مخططة

Rouleau brise-mottes (F).

ملاسة مفتحة المدر

Limacodidae,

Cochlididae (S), Limacodidae, Cochlididae (F).

Limacodidae, Cochlididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم اغصها المناطق الحارة والاستوائية || اجسامها صغرة. بسطها تراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها صغرة. اخطامها شديدة القص. ملاسها منتظلة، نحلة. قرونها الاستشعارية خيطية. بطونها متراكبة السطح الدقيق والحمل الناعم. اجنحتها مستعرضة، عادمة التهديد || تسرح في الليل. اساريمها شبه بيضيه الشوزن، قصيرة الجرامز الصدرية، ثلعية الجرامز البطنية. جميعها غاضلة || اشهر اجناسها المكودة.

٢٧٥٥٥ - مكيتال، قداك

Module, Mesure de capacité (F), Modul, Dry measure (E).

اسم شامل يطلق على كل وحدة كيلية من اي حجم كانت او سمة.

٢٧٥٠٦ - مكير هو المقير، اطلمه.

٢٧٥٠٧ - ملاب ملاب : كل عطر مائع.

٢٧٥٠٨ - ملاب *، متبغيا

Malpighia (S), Malpighie, Malpighier (F), Barbados cherry (E), Barbadoskirschen (D), Malpighia (I).

جنس نباتات شجرية من فصيلة المليات، مهدها البلاد الاستوائية. انواعها نحو ٢٠، اوراقها متعاقبة متنة اهليلجية، نصلها خلي البشرة سنن الحافة الشائكة. ازهارها عنقودية او نورية التجميع منها الاحمر والوردي والابيض. اعرف انواعها واشهرها:

ملاب حريف Malpighie brûlante, Bois capitaine (F).
شجرة امريكية المنبت، قشورها حامزة كاوية طيبة وصناعية.

ملاب كروي Malpighie glabre,
Cerisier des Antilles, Moureiller, Xocat (F).

شجرة تكثر في المكسيك، ثمارها كروية مأكولة لا تخلو من الحامضة وقد تزوع للزرين.

٢٧٥٠٩ - ملابار

Epinard de Malabar (F).
بقلة زراعية تدعى بازيلة بيضاء، اوراقها تستعمل استعمال الاسبانخ.

٢٧٥١٠ - ملابيات

Malpighiaceae (S).

Malpighiacées (F), Malpighiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين مستقلة القعالات. اجناسها ٥٠ وانواعها ٦٠٠ مغلها من نباتات المناطق الاستوائية الاسريكية. جميعها اشجار وشجيرات وجنبات. اوراقها متعاقبة بسيطة او مركبة. ازهارها خاسية القعالات والبلات، عنقودية التجميع، صفراء اللون او بيضاء او حمراء. ثمارها جراء مكبرة عديدة البزور.

٢٧٥١١ - ملاخ، صبر فيضي

Gelée, Givre (F).

Frost, Jelly, Rime (E).

هو جلد نقي الماء على سطح التربة والنبات من هبوط درجة الحرارة الى ما دون الصفر.



ملا ب



ملاسة

Féculerie (F). مَلَبَّة ٢٧٥٣٢

Manufacture of faecula (E).

الملبة او مصنع اللبوب أو منشأة البطاطا في المصنع المخصص باستخراج اللبوب.

Laiterie (F). مَلَبَّة ٢٧٥٣٣ ، مَعْمَل أَثْبَان

Dairy-farm (E).

المعمل الذي يعالج فيه الحليب رتباً يباع .

٢٧٥٣٤ - مَلَبِّيَا في الملب ، الملب .

Malt مَلَت ٢٧٥٣٥

في الحبوب الناشئة صناعاً لا سيما حبوب الشعير التي تستعمل في صناعة البيرة .

Maltage (F). مَلَتَاج ٢٧٥٣٦

الملتاج اي صنع الملت، هو عمل استحالة الشعير وغيره من الحبوب الى ملت اي حبوب ناشئة .

Maltase مَلَتَاز ٢٧٥٣٧

خيرة قابلة للبريان تحول الملتوز الى غلوكوز قابل الاختيار .

Manducable (F). مَلَتَاك ٢٧٥٣٨

Verdoyant (F). مَلَتَاج ٢٧٥٣٩

المجت الارض اجتمع نهباً وكثر . والارض الملتجة : الكثيرة الخضرة .

Conjonctive (F). مَلَتَاخَة ٢٧٥٤٠

Conjunctiva (E).

ملتحة العين، غشاء يلمس صفحة المقلة الخارجية وصفحة الاغفان الداخلية .

٢٧٥٤١ - مَلَتَرَم هو المقابل .

٢٧٥٤٢ - مَلَتَمَقَات الأصابع ، مَكَمَقَات

Syndactyles (F). مَلَتَمَقَات ٢٧٥٤٣

أحد قسمي الطيور الجوارح ، يشهد فصليتها انخفاضات والقرليات .

Volubile (F). مَلَتَمَق ٢٧٥٤٣

Voluble, Voleuble, Twining (E).

صفة النبات العارشي الذي يمتدق بأي جسم كان فيسلكه ويلتف حوله حلزونيًا .

Circinal ٢٧٥٤٤ - مَلَتَمَق ٥

نمت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل عضو ، ان ورقة أو غيرها دائرية الالتفاف .

Convergent مَلَتَمَق ٢٧٥٤٥

Plein (F). مَلَتَمَق ٢٧٥٤٦

الملك والمصمت : ما لا جوف له .

Maltose مَلَتُوز ٢٧٥٤٧

نوع من السكر القابل للاختبار ، يحصل من تسكير النشا بالملت .

Contiguité (F). Contiguity (E). مَلَاصِقَة ٢٧٥٢٠

Cément (F). Cément (E). مِلَاط ٢٧٥٢١

٢٧٥٢٢ - مَلَاغِب ظِلَّة

اسم يطلق على طائر ين مختلفين ما الزفرات والقرنل الشائع ، اطلبها .

٢٧٥٢٣ - مَلَاغِي ٥

Platalea (S).

Spatule (F). Spoon-bill (E).

جنس طيور مائية من طوال الساق القواطع . انواعها المعروفة ٨ ، تتميز بمناقيرها الكبيرة الملتفة الشكل ، بسوقها الغضائية الذرية ، بأرأسها المستطيلة وبشئتها المفرفة . تعيش قرب الماء . قوتها السك والديدان والحشرات والزخويات . تنشأ أوكها في الاجنار وبين القصب . اناتها تقص من يفضين الى أربع بيضات مستطيلة تحضنها ثلاثة اسابيع || اشهر انواعها ما يلي .

٢٧٥٢٤ - مَلَاغِي أَبْيَض ، أَبْر مَلْعَقَة ، دَوَّاس

Platalea leucorodia (S). Spatule blanche (F).

نوع من الملاحق وهو طائر كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم . ثوبه الى البياض الناصع باستثناء مناقره ورشبه الصد وتجره وزفده وطرف مناقره الصفرة . أرياش رأسه مستطيلة مهدلة . يعيش جماعات كبيرة تدن في مكان واحد . يحوي البلاد في طلب المصيف والشتى . يكثر على شواطئ الخليج الفارسي والبحر الاسود وعلى ضفاف الدلتا وفي هولندا .

٢٧٥٢٥ - مَلَاغِي زَرْدِي ، أَبْر مَسْطُوط ، مِدَوَّاس

Platalea alaja (S). Spatule rose (F).

نوع من الملاحق طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه وردي اللون . اصطناعه شطوط وضفاف الشرق وغربيته الشرقية . جماعته متوسطة الكبر ، عدد افرادها يراوح من ٦ الى ٢٤ ، وهي تدن في مكان واحد .

٢٧٥٢٦ - مَلَاغِيَة

نبات حليبي من الجوزليات يدعى قَطَلَة ، اطلبها .

٢٧٥٢٧ - مَلَاك

Terrien (F).

Landed, Proprietor (E).

هو صاحب الاملاك اي الاراضي الزراعية والحرجية .

٢٧٥٢٨ - مَلَاكُ الْبَحْرِ

سمكة بحرية ولدت مقرنة مشهورة باسم سقطين ، اطلبها .

٢٧٥٢٩ - مَلَامِس

Palpes (F). Palps, Feelers (E).

زوائد مفصليّة فكية تنلمس اشئرات بواسطتها مأكلسها وربما يمدادها .

٢٧٥٣٠ - مَلَبَاب ٥

Féculomètre (F).

Faeculometer (E).

جهاز يستعمل في تحديد محوى اللبوب الناشئ الموجود في مادة معينة .

٢٧٥٣١ - مَلَبَان ٥

Galactomètre (F).

Galactometer (E).

جهاز تقاس بواسطته المواد السكرية والسنية والجينية والجلطة الموجودة في الحليب .



ملاحق

Régime (F).

هو مجموعة العوامل والانفعالات الطبيعية التي تسيطر عليها الحيوان. كقولك ملجن الاطيار وملجن الرياح الخ. ج ملجن .

٢٧٥٥٩ - ملح

الملح : ورم في عروق الفرس دون الجرد فاذا اشتد فهو الجرد .

Sel (F). Salt (E).

٢٧٥٦٠ - ملح

الاملاح ، كايوا ، مواد ناتجة عن احلال مدن محل الهيدروجين في حامض . فاذا اضيف مثلاً الحامض الكبريتي الخفف الى الزنك يتصاعد غاز الهيدروجين ويختفي المعدن ويتكون ملح كبريتات الزنك .

٢٧٥٦١ - ملح البارود ، تطرون ، بوق ارمسي
Nitre, Salpêtre (F). Nitre, Salpêtre (E).

هو كايوا نترات البوتاس، يحصل ويتجمع طبيعياً على الصخور الكلسية وعلى جدران الاقباء الرطبة ويستعمل في صنع البارود .

٢٧٥٦٢ - ملح الطعام

Sel de cuisine, Chlorure de sodium (F). Kitchen salt (E).

تعريفه الكيماوي كلوريد الصوديوم . يستخرج بأكثر منه من مياه البحر بعد ترقيدها وتغييرها في الملاحات ثم معالجة بلوراتها ضمن مجاف خاصة .

٢٧٥٦٣ - ملحان
Janvier (F). January (E).

هو شهر كانون الثاني .

Halimodendron (S).

٢٧٥٦٤ - ملحان

Halimodendro (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الفربيان . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها اسوية المهد ، تنبت في رمال الشواطئ البحرية . معظمها جنبي وبعضها شجر . اوراقها مركبة عابلة . ثمارها قرنية ، بزورها مغلظمة || اشهر انواعه التزيينية الملحان القضي .

٢٧٥٦٥ - ملحان فضي

Halimodendron argenteum (S). Halimodendro argenté (F).

نوع من الملحان يعيش في الاربة الرملية المالحة . جنينه شائكة فارسة تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها عابلة ، مركبة ، شغمية . وريقاتها رباعية العدد ، اهليلجية الشكل ، مقطوعة النصل البحري اللون القضي المواج . ازهارها كبيرة القد ، منها الثنائية التجميع ومنها الثلاثية ، معاليها مستطيلة متدلية . لونها الى الحرة البنفسجية المواج || تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٥٦٦ - ملحواوات ، نصيفة
Feuillus (F). Leavy (E).

هي الاشجار الحرجية والتزيينية التي يسقط ورقها في الشتاء . تفيضها العروات ولايبدى اي الدائمة الخضرة التي لا يسقط ورقها . واحدها ملحاه .

٢٧٥٦٧ - ملح
Annexe (F). Annexed, Appended (E).

هو كل تابع لحق بأصل .

٢٧٥٤٨ - مُلتَوِيَات الأَجْنِيحة ، مُتَعَفِفَات

الأَجْنِيحة
Strepsiptères, Rhiptères (F). Strepsiptera, Rhiptera (E).

رتبة حشرات من طبقة غشائيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها فصيلة الحشيشيات .

٢٧٥٤٩ - مُلتَوِيَة
Latanier (F).

هي الخشخاش ، اطلبه .

٢٧٥٥٠ - مُلتَيْن ، مُلتَيْن ، ميسين
Maltine, Maisine (F).

الملتين اي كسب الذرة الصفراء هو التفل الناتج عن صناعة تقطير الذرة ، ويعتبر من اعلاف الماشية .

٢٧٥٥١ - مُلتَوْد ، لتيد
Synanthérique (F). Synantheric (E).

الملتود واللتيد من الازهار ما كانت اسديتها ملتحمة المآبر .

٢٧٥٥٢ - مُلْج
Abri (F). Refuge, Shelter (E).

هو نوى المقل . ج املاج .

٢٧٥٥٣ - مُلْجَا

٢٧٥٥٤ - مُلْجِدَة

Mulgedium (S). Mulgédie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة عديدة . اعطانها بعض مناطق الشرق الاوسط واروبية || سوقها فروع تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم . ازهارها كبيرة مفردة لامتساوية التفرع . ازهارها عثكوي التجميع . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الازرق || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٥٥٥ - مُلْجِدَة تَرْتَرِيَة

Mulgedium tataricum (S).

Mulgédie de Tartarie (F).

نوع من المجلدة التريينية . مهدا بلاد التتر . ساقها قليلة الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها حاضنة بحرية اللون . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها الى الزرق الساجونية || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٧٥٥٦ - مُلْجِدَة جَلْبِيَة

Mulgedium alpinum (S). Mulgédie alpine (F).

نوع من المجلدة التريينية البروتية تعيش في جميع الاتربة ويختلف المواع . مهدا جبال الشرق الادنى وبعض جبال اروبية . ساقها فروع تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها حاضنة كبيرة النصل المرطاء . ازهارها عثكوي التجميع ، معتدل الكثافة . ازهارها الى الزرق الباهة || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٥٥٧ - مُلْجِدَة كَبِيرَة الزَوَق

Mulgedium macrophyllum (S).

Mulgédie à grandes feuilles (F).

نوع من المجلدة التريينية . مهدا بعض المناطق التركية والقوقاز . ساقها فروع ، خلية الهاء ، تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها كبيرة القد ، قليلة النصل ، مائلة الصفحات العليا ، مزغبة السفلى . ازهارها عثكوي التجميع ، كبير القد . ازهارها الى الزرق الزاهية || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

استقي الرأس الأسود ، مستدق المؤخر والسكة الشرجية ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في التربة
ضمن جلاب من الطين والبراز ينقل عن غطاء الحشرة .

٢٧٥٧٥ - مَلَحِيَّةٌ حَمْرَاءُ *
Malachius rufus (S). Malachie rouge (F). Malachius rufus (E).

حشرة وأشعة قانصة من فصيلة الملخيات ورثبة معدنات
الاجنحة . تألف البراري والمراعي والأحراج الغدلة .
غناها ترتشف رحيق الأزهار وتقترب الحشرات الدنيا .

تتميز بجهازها الحويصلي القاسح الاثري الرائحة التي تحذر
الاعصاب . يرقاتها تعيش تحت لحاء الأشجار وفي الاخشاب
النخرة قوتها اساريع الحشرات الخائبة || جسمها صغير
القد يطول من ٦ الى ٧ سم . رأسها مستطيل الجرم اسمر
اللون . زباناها مستطيلان مستقان . عيناها كبيرتان .

فكهاا ضليخان . كوسلها صناعي اللون تتوسطه بقعة غضراء .
ظهورها مستدير الطرف الاخف ، احمر اللون . ارساغها
خامسة المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة
الجدلانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر حزيران .

تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع .
تتمتع المكان تحت لحاء الاشجار وتحت الانقاض || البرقة
عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٠ الى ١٢ سم . جسمها
شبه اسطواني الشكل مستطيل الرأس ، مستدق الطرف ،
سداسي الراجب القصيرة ، اسمر اللون ، اصفر المواج ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في آخر
سرداب دخلته البرقة .

٢٧٥٧٦ - مِلْدَان *
Flectometre (F). Flectometer (E).

جهاز يستعمل في قياس لدانة المعادن تحت ضغط معين .
٢٧٥٧٧ - مِلْدَنْ *
Pellicule (F). Pellicle (E).

صفحة او عصابة سليلوزية رقيقة منسوبة السطح تستعمل
في شق الصناعات اخصها صناعة الافلام السينمائية حيث
تطلى على احلى جهتها بمادة جيلاتينية حساسة يؤر
فيها النور .

٢٧٥٧٨ - مِلْدُون *
Pelliculé (F).

منقى بالملدن .
٢٧٥٧٩ - مَلَز *
Mélèze (F).

شجرة حرجية تسمى لاريس ، اطلبها .
٢٧٥٨٠ - مَلَز كاذب *
Faux-mélèze (F).

شجرة حرجية وزينية تسمى لاريس كاذب ، اطلبها .
٢٧٥٨١ - مَلَزَان *
Gonocytisus (S). Gonocytise (F).

جنس نباتات نجمية ، متوسطة الارتفاع ، برية ، ممره ،
من فصيلة القرنيات الفرائشية . انواعه المعروفة قليلة العدد ،
منتهيا بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اخصها
تهام لبنان والمنطقة العلوية السورية || سوقها متصبية ،
فرعاه ، عادة الشوك . اوراقها مركبة ، وثرية العدد .
وريقاتها شبه بيضية النصال المستطيلة . ازهارها ابطية
الانتشاب ، مستطيلة الزناد ، صفراء اللون ، مستحبة
العرف ، يحرسها النحل .

٢٧٥٨٢ - مَلَحَقُ التَّائِينَ
Avenant (F). Modification (E).

عقد كتابي يضاف الى وثيقة التائين للدلالة على تعديل
وقع في بعض شرائطها .

٢٧٥٨٣ - مَلَحَقُ الوَصِيَّةِ
Codicille (F). Codicil (E).

هو الملحق الذي يحرمه الموصي بعد تحرير وصيته إما لانها
او لتعديلها او لانهاثامها .

٢٧٥٨٤ - مَلَحُوظٌ ، مَلَحُظٌ
Prévisible (F). Foreseeable (E).

٢٧٥٨٥ - مَلَحُوبَاتُ الْفِكَ
Plectognathes (F).

رثبة من الاسماك المنطيات .

٢٧٥٨٦ - مَلَحُ
Drageon (F). Sucker (E).

الملح والمعان : قصب ينمو من برصة عرضية نشأت
على جذر نبات معق .

٢٧٥٨٧ - مَلَحِيَّاتُ *
Malachiidae (S). Malachiids (F). Malachiidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقانصة من رثبة غمديات الجناب ||
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات
البلاد الحارة وبعضها يأنف مناطق البلاد المعتدلة الحرارة .
مرتها النباتات العشبية والادغال ترتشف رحيق
وتقترب الحشرات الدنيا التي تقترب منها . وبعض اجناسها
يتميز بجهاز خاص يمكنه من دفع حويصلات جاذبية
جرها اللون تطفح منها رائحة اثيرة تحذر الاعصاب ، قليلة
الاذى || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ،
مستعرضة الرؤوس . مستدقة الزباني المستطيلة المركبة من
١١ فصلة . ارساغها خامسة المقل || يرقاتها تعيش تحت
الحاء وفي الاخشاب المنخورة ساعية وراء اساريع الحشرات
الخائبة لا تراها || اشهر اجناسها الملخية والملاشاة
والوسكة .

٢٧٥٨٨ - مَلَحِيَّةٌ ثَلَاثِيَّةُ الْبُؤُر *
Malachius bipustulatus (S). Malachie bipustulée (F).

حشرة وائمة جاذبة قانصة من فصيلة الملخيات ورثبة
معدنات الاجنحة . تألف الحول المزدرة والمراعي .
غناها ترتشف رحيق الأزهار وتقترب الحشرات الدنيا .

تتميز بجهاز حويصلي قاسح تدفقه الحشرة الى الخارج ،
عند الحاجة ، فيلور احمر اللون يفرز مادة اثيرة نافذة
تحذر الاعصاب تكفي لشل مقاومة الغرم . يرقاتها تعيش
على جذور النجيليات وعلى ما تقترب من اساريع الحشرات
الاثيرة والدانة || جسمها صغير القد يطول نحو ٦ سم .
رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخيط ، اخضر اللون .

عيناها كبيرتان . زباناها ضليخان . فكهاا ضليخان .
كوسلها شبه مربع الشكل ، اخضر اللون . ظهورها الى
الخضار الالامس أما الاطراف الخلفية فالاحمر . غداها
خفيفتا التحيز من المهم المخلوط . ارساغها خامسة المقل ||
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجدلانة في ايار
وتعيش حتى آب . اناثها تهريق المكان قرب سوق النبات
وتحت الارواق التي تلامس التربة || البرقة عند الادراك
التام تطول نحو ٩ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ،
سداسي الراجب القصيرة ، حنلي اللون ، اسمر المواج ،



ملخية ثنائية البؤر



ملخية حمراء

Lin commun (F).

٢٧٥٩٢ - مَلَسَج

هو الكتان الشائع ، اطليه .

Melasmia (S).

٢٧٥٩٣ - مَلَسَسِيَّة

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهذكيات . انواعه قليلة
عامة القيمة الاقتصادية . بكنهاته ديمية التركيب ،
فحمية اللون ، ترتكز عل ونية قارضة فرجية الانفلاق .
بويضاته مخروطية منقطة ، شفافة ، وحيدة الخلية .

Mylesinus (S), Mylésine (F).

٢٧٥٩٤ - مِلْسِين *

الواحدة ملسينة . جنس اسماك نهريه من مفتوحات المائنة
وفصيلة القرصانيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها انهر
البرازيل والغويان || اجسامها بيضيه الشوزن ، مسطلة
الجرم ، صغرة القد ، تقطوع الى ١٦ الى ٢٠ سم . زعانفها
الظهرية والشرجية كبيرة متقابلة . اما الذيلية فهلالية
الشكل . اثنائها الى الحصار المتفاوت المجابت || حولها
مأكولة ، متوسطة الصنف .

٢٧٥٩٥ - مِلْسِيَت السَلْجَم

هي وذعة السلجم ، اطلبها .

٢٧٥٩٦ - مِلْسِيَت المَلْفُوف

هي وذعة الملفوف ، اطلبها .

Fluoroscope (F).

٢٧٥٩٧ - مِلَصَاف

جهاز يستعمل في تشعيع الالاصف اي الفلورور الموجود
في المواد المدنية .

Dugong (F).

٢٧٥٩٨ - مَلَصَة

هي الاطوم ، حيوان بحري غليظ الجلد ، اطلبه .

Compresseur à pistolet (F).

٢٧٥٩٩ - مِلَطَاس

جهاز آلي يستخدم في ثقب المواد الصلبة كالصخور
وغيرها .

Malthusianisme (F).

٢٧٦٠٠ - مَلَطُوسِيَّة

الملطوسية مذهب اقتصادي اجتماعي نادى به الاقتصادي
الانكليزي «ملطوس» ملخصه ضرورة كبح الانجاب
لان التكاثر البشري يزداد والمواد الغذائية القروية
تنضب .

Tissu sous-cutané (F).

٢٧٦٠١ - مِلَطَى

Subcutaneous tissue

قشرة رقيقة بين العظم واللحم .

Cochléaire, Cochléiforme (F).

٢٧٦٠٢ - مِلَعَقِي

ما كان شكله شكل الملعقة .

Cochléaria officinal (F).

٢٧٦٠٣ - مِلَعَقِيَّة

هي حشيشة الالاعق ، من النباتات الطبية ، اطلبها .

Clematides (S).

٢٧٦٠٤ - مَلْعُونَات

Clématidées (F). Clématidées (E).

مجموعة نباتية من فصيلة الشقيقيات . اعطائها البلاد الحارة
والمعتدلة . انواعها كثيرة المدد معظمها مداد عارض . سوقها
لغية . اوراقها متقابلة طويلة الريجيات ، عصارتها سامة
حرقه . ازهارها عادية البتلات كبيرة الفصل الملوثة .

Malesherbia (S).

٢٧٥٨٢ - مَلْزُزْبَة

Malesherbie (F).

جنس نباتات عارشة ، معمرة ، برية وتربينية من فصيلة
الملززيات . انواعها المعروفة حسة . منبتها الطوي بعض
مناطق الشيل والبرو || تزرع للزيت في المراكب وفي
المواقع التي لا تخشى الصقيع في الشتاء .

Malesherbiaceae (S).

٢٧٥٨٣ - مَلْزُزْبِيَّات

Malesherbiacées (F). Malesherbiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتقين عديدة القملات . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها الطوي بعض اصقاع
امريكية الجنوبية || نباتاتها معمرة ، عارشة ، قريبة الشبه
بالالاميات . اوراقها متعاقبة . ازهارها خشوية ، كبيرة
القد ، جملة الالوان ، سننية الارتكاز . تتميز باستطالة
انبوب الكرم وباسديتها المتدرجة في قاعدة الزرعم ||
اشهر اجناسها الملزربة .

Synallagmatic (F).

٢٧٥٨٤ - مَلْزِم لِطَرْقَيْن

Synallagmatic, Reciprocal (E).

هو العقد الذي يلتزم فيه كل فريق من المتعاقبين نحو
الفريق الآخر .

Coobligé (F).

٢٧٥٨٥ - مَلْزُوم مع غَيْرِه

Coobligant (E).

هو الشريك في الالتزام .

Amygdalaire (F).

٢٧٥٨٦ - مَلْزِي

Amygdaloid (E).

نعت تعريفي يطلق عل كل صخر يحوى بعض الحجمات
المشحورة او بعض الحصبيات .

Châtrer (F).

٢٧٥٨٧ - مَلَس

To castrate, To geld (E).

ملس الحصى : اسئلها بعروقها . ولس الكبش : سل
خصيتيه بعروقها فهو ملس والكبش ملس .

Glossomètre (F).

٢٧٥٨٨ - مِلْسَان

Glossometer (E).

هو مقياس اللسان ، جهاز تقاس به غراطين التحسل
لعرفة الانواع الاصالح من غيرها في جرس رحيق الازهار .

Anacanthiniens (F).

٢٧٥٨٩ - مَلَسَاوَات

رئة من الاسماك العظمية .

٢٧٥٩٠ - مَلَسُومَة *

سَازَج هِنْدِي

Melastoma (S). Mélastome (F). American goose-

berry (E). Schwarzmund (D). Melastoma (I).

جنس ثجيرات وجنات برية وزراعية من فصيلة الملتويات .
مهداها المناطق الاستوائية . انواعها عديدة . اوراقها منقطة ،
متقابلة سنانية النصل . ازهارها محورية الارتكاز او هامية .
ثمراها ثنوية مستحبة العرف والطعم ، عصيرها اسود اللون
يدبغ اللسان والقلم .

Melastomaceae (S).

٢٧٥٩١ - مَلَسُومِيَّات

Mélastomacées (F). Melastomaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتقين ، مستقلات القملات ،
منخفضات المبيض . اجناسها وانواعها زهاء ١٨٠٠ ، جيمها
من نباتات المناطق الاستوائية . اوراقها كاملة متقابلة .
ازهارها لحامية التركيب .



ملسومة



ملسين



ملئى ارجوانية



ملئى جبليّة



ملئى زرقاء



ملئى سامة



ملئى صفراء

٢٧٦١٢ - ملئى شَرْبِيَّة

Clematis orientalis (S). Clématite d'Orient (F).
جنية عارشة عديدة الغروب تطلو من ٣ الى ٦ امتار.
اعطائها الشرق من شط بحر قزوين الى منشوريا. اوراقها
مركبة، ثلاثية الفصوص القلبية الشكل، المسنة الحافة.
نصلها بحري اللون. ازهارها رباعية الفصل، قطرها نحو
٣ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٧٦١٣ - ملئى صَفْرَاء *

Clematis ochroleuca (S). Clématite jaune (F).
بجلة فراء منتصبه تملونحو ٦٠سم. مهدها البلاد الامريكية.
اوراقها بسيطة لاطئة متقابلة، نصلها بيضى الشكل مالى
الصفحة. ازهارها حامية الارتكاز، فردية، صفراء اللون،
زيتية المواج، اجانية الشكل، متدلية || ازهارها يستمر
من ايار الى حزيران.

٢٧٦١٤ - ملئى شَفِيَّة الْوَرَق، ظَبَّان

Clematis angustifolia (S). Clématite à feuilles étroites (F).
جنية دخلة مثندوة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبه.
اوراقها مركبة. وريقاتها خفيفة بسيطة او ثلاثية التفريض،
عصائرها سامة. ازهارها كثيفة التجميع، خافتة الورد،
بيضاء اللون. تكثر في بعض الاحراج الرطبة. تجلحها
الماعز ولا تنضمر منها.

٢٧٦١٥ - ملئى عُنْكُولِيَّة

Clematis paniculata (S). Clématite à panicules (F).
جنية سبروتية عارشة تطلو نحو ٤ امتار. مهدها اليابان
وكوريا. اوراقها مركبة. وريقاتها خاسبة او سباعية
الازواج، ريشية التركيب. نصلها بطول من ٥ الى ٨ سم.
ويعرض من ٢ الى ٤. ازهارها عشكولية التجميع، رباعية
الفصل الشفافة، قطرها نحو ٣ سم. || ازهارها يستمر
ملول شهر ايلول.

٢٧٦١٦ - ملئى عَنَمِيّ، مَرْعَان، حَبَل مَسْكِيّ

Clematis cirrosa (S). Clématite à vrilles, C. tou-jours verte (F).
جنية عارشة برية وريبيتية تملو من ٣ الى ٥ امتار.
حوالفها مركبة ثلاثية. اوراقها ابيدة بسيطة لا قياسية
الشكل. ازهارها قمية رباعية الفصل الحولية البشرة
لونها الى البياض الاغبر تملو مائة وريدي || عصارة
اوراقها قليلة المادة القلوية السامة لكنها حريفة تحرق
الجله || ازهارها يستمر من اذار الى كانون.

٢٧٦١٧ - ملئى قَلْبِيَّة الْوَرَق

Clematis cordata (S). Clématite à feuilles en coeur (F).
جنية عارشة تطلو نحو ٦ امتار. اوراقها مركبة مشطية.
وريقاتها تعد من ٥ الى ٧ ازواج، نصلها قلبي الشكل
مسن الحافة. ازهارها خلية الفصل البياض || ازهارها
يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٧٦١٨ - ملئى كَرْشِيَّة الْوَرَق

Clematis apifolia (S). Clématite à feuilles d'ache (F).
جنية سبروتية عارشة تطلو نحو ٨ امتار. اصغائها الصين
واليابان. اوراقها مركبة كرسية الشكل. نصلها اخضر
اللون مسن الحافة. ازهارها عشكولية التجميع، صفيرة
القد، رباعية الفصل، بيضاء اللون، قطرها نحو ١٥ سم.
ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

٢٧٦١٥ - ملئى شَرْبِيَّة

Clematis (S). Clématite, Clématide (F). Clematis (E). Waldrebe (D). Clématide (I).
جنس نباتات معمرة عارشة من المعلومات. انواعها عديدة.
اوراقها لا نظامية تكثر فيها الاشكال المركبة الريشية.
ازهارها عادمة البتلات تستعفى عنها بالفصل الملونة المختلفة
الاحجام والاشكال || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢٧٦١٦ - ملئى اَرْجَوَانِيَّة *

Clematis coccinea (S). Clématite écarlate (F).
جنية فراء منتصبه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروصها
جزوية اللون. اوراقها متقابلة، لاطئة، بسيطة. نصلها
سناي الشكل، بارز العروق، خلي البشرة. ازهارها
ارجوانية اللون، اجانية الشكل تطلو نحو ٤ سم.
ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٧٦١٧ - ملئى بَحْرِيَّة

Clematis maritima (S). Clématite maritime (F).
جنية فراء منتصبه تملو نحو ١٢٠ سم. منبها الشطوط
البحرية. اوراقها مركبة، وريقاتها قدية التفريض
بحرية اللون. ازهارها صفيرة القد تبينة البياض || ازهارها
يستمر من ايار الى تموز.

٢٧٦١٨ - ملئى جَبَلِيَّة *

Clematis montana (S). Clématite montagnarde (F).
جنية سبروتية عارشة تطلو من ٤ الى ٦ امتار. ساقها
وفروصها جزوية اللون. اوراقها مركبة مشطية. وريقاتها
اهليجية الشكل، عابقة الخضار. ازهارها بيضاء اللون،
ابطية الارتكاز، مستطيلة المالحق، كبيرة القد، قطرها
١٠ سم. || ازهارها يستمر من ايار
الى حزيران.

٢٧٦١٩ - ملئى جَرَسِيَّة

Clematis campaniflora (S). Clématite en cloche (F).
جنية سبروتية عارشة تطلو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها
مركبة ثلاثية. نصلها اخضر اللون عادم التنسين. ازهارها
جرسية الشكل، رباعية الفصل الزرق، مستطيلة المالحق،
متدلية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٧٦١٠ - ملئى زَرْقَاء *

Clematis viticella (S). Clématite bleue (F).
جنية سبروتية عارشة تطلو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها
مركبة ثنائية التثلث، وريقاتها خفيفة عادمة التنسين.
ازهارها كبيرة القد زرقاء اللون، قمية الشكل، رباعية
الفصل، قطرها براوح من ٥ الى ١٢ سم. || ازهارها
يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٧٦١١ - ملئى سَامَّة، شَرَاخ

Clematis vitalba (S). Clématite des haies, C. brûlante, Herbe aux yeux, Berceau de la Vierge, Vigne blanche (F).
جنية مبلولة عارشة تطلو من ١٠ الى ٢٠ م. اوراقها
مركبة مشطية. وريقاتها تعد من ٥ الى ٧ ازواج، نصلها
حبل الغفار الزاوي. ازهارها رباعية الفصل الحولية
البياض اللون، قطرها نحو ٣ سم. اسديتها وندقاتها بيض.
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. وهي تكثر في المواقع
الرطبة احصها السياجات. عصائرها غزيرة المادة السامة
التشيلة.

٢٧١٢٨ - مَلْعُفُون * Sicana odorifera (S).
Melocoton (F).

نبات زراعي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات . مهدد بعض مناطق امريكا الجنوبية . يستعمل كخضار انواع القرع في المطبخ ويستعمل ايضا في تطهير المنازل والبقاعات العامة لانه فواح العرف المستحب || ساقه عارشة تطول نحو عشرة امتار . حولانها مجهره بحاجب تمكها من الالتصاق بأي سطح كان . اوراقه معتقة كثيفة ، سباعية الفصوص . ازهارها صفراء اللون ، كبيرة القد ، خاسية البتلات . ثماره قرعية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . لونها ، عند الادراك ، الى الحمرة البرتقالية || تؤكل الثمار مطبوخة قبل دغوها في طور الادراك لان لبابها يتصلب عند الادراك ويفوح منه اريج عطر ثابت يستقر بعض الوقت .

٢٧١٢٩ - مَلْعُورَة Embryon (F). Embryo (E).
المادة الخية المكثفة الناشئة التي يستمر بها الحيوان والنبات . وهي في الانسان مضغة وفي الحيوان نرعة وفي النبات نثيط .

٢٧١٣٠ - مَلِك الْعُقْبَان Aigle impérial (F).
هو العقاب القيصري ، اطلبها .

٢٧١٣١ - مَلِكَة النَحْل Reine des abeilles (F).
Queen-bee (E).
هي النحلة الانثى البيض و اميرة ثول النحل والحلية والقفير .

٢٧١٣٢ - مَلَكُورِيَة Malacologie (F).
Malacology (E).
فرع من الزولوجية يبحث في شعبة اللافقريات .

٢٧١٣٣ - مَلِكُوك * Melicoccus (S).
Mélisque (F). Melicoccus (E).
جنس اشجار وشجيرات برية عرو من فصيلة السابنديات . انواعها المعروفة قليلة المدد موطنها بعض المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية ، اعصها جيمكة || سيقانها منتصبه كثيرة الفروع تطول من ٣ الى ١٠ امتار اوراقها ابيده ، مركبة ، متعاقبة . وريقاتها شفعية العدد ، ثنائية او ثلاثية الازواج . نصلها جامدة الوثل ، يضيء الشكل . ازهارها عثكولي التجميع ، طري الاوتكاثر . ازهارها صغيرة يضيء اللون او وردية ، عطرية العرف . ثمارها نوية مأكولة اللباب والمعجات .

٢٧١٣٤ - مَلِكِيَة Propriété (F).
Property, Ownership (E).
هي حق الاستعمال والاستمتاع والتصرف في الشيء اطلاقا في نطاق القانون .

٢٧١٣٥ - مَلِكِيَة مُشْتَرَكَة Copropriété (F).
Joint property (E).
هي حق ملكية مال منقول او ثابت موزع على افراد متعددين . وقد تكون الملكية المشتركة شائعة او غير شائعة .

٢٧١٣٦ - مَلِكِس ثُرْمِي Dracocéphale moldavique
هو رأس الثنين الملداني ، اطلبه .

٢٧١٣٧ - مَلْعُوس * Melampus (S).
Mélampe (F). Melampus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدميات الأرجل وفصيلة الحفصيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠

٢٧١٢٩ - مَلْعَى لَهَب ، مَلْعَى عَطِرَة ، قَمِيص يَنْثُ الْمَلِك ، عَنَصَرَة

Clematis flammula (S). Clématite odorante, C. flammette (F).
جنبه مذبذبة عارشة تطول نحو ٤ امتار . اعطائها حوض البحر المتوسط . اوراقها مركبة شطية . وريقاتها ضيقة كثيرة العدد . نصلها لا يقاسي الشكل . عصارته سامة حريفة كارية تحرق الجلد . ازهارها صفيرة القد غبراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٧١٢٠ - مَلْعَى مُنْتَصِبَة Clematis recta (S).
Clématite dressée, Téverin (F).
جنبه حصاصه دغلة مذبذبة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها منتصبه جوفاء . اوراقها مركبة ثنائية او ثلاثية الازواج . وريقاتها يضيء النصل ، بحرية اللون . عصارته لا تكوي . ازهارها مكسبة ، عطرية ، يضيء اللون . ازهارها يستمر من ايار الى تموز

٢٧١٢١ - مَلْعَم Pêristome (F). Peristome (E).
ما يكتنف القم في الحيوانات الدنيا وما يحوق ثغرة الفطور ج ملائم .

٢٧١٢٢ - مَلْعَف ، خَنْزِيرَة Treuil (F).
Windless, Hand-winch (E).
آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الانقال .

٢٧١٢٣ - مَلْعُوف * ، كَرْئِب ، لَخْنَة Brassica oleracea capitata (S). Chou, Chou cabus, Chou potager (F). Cabbage, Drum head cabbage (E).
Kraut, Kopfkohl (D). Cavolo, Cavolo cappuccio (I).
بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات . ضرورها واسرارها كثيرة العدد . جميعها ملغفة الاوراق المأكولة الغنية ببعض الفيتامينات الصحية . تحليلها الوسطي يعطي :

٣٧.٠ ٪ من المواد الازوتية

٥.٠ ٪ من المواد العنينة

٢٥.٠ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٧١٢٤ - مَلْعُوف بروكسل * Brassica oleracea gemmifera (S). Chou de Bruxelles (F). Brussels sprout (E). Brüsselar kohl, Rosenkohl (D). Cavolo di Brusselle (I).
نوع من الملفوف الزراعي المأكول . لشجايته ضنية الشكل ، صفيرة القد ، تمد من ٦ الى ٢٠ ، ادراكها تدريجي يبتدئ من الاسفل .

٢٧١٢٥ - مَلْعَاح Gravid (F).
Gravid, Pregnant (E).
الملقاح الحامل من الاناث او من كانت طائتها تمكها من ذلك .

٢٧١٢٦ - مَلْعَاح Malachra (S).
Malachre (F). Wild ochra (E). Malachra, Welchmalve (D). Gombo salvatico (I).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الجبازيات . انواعه المعروفة خمسة ، جميعها مرموية ، اعطائها البلاد الامريكية . اوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل والتفصيص . ازهارها رويسية منها الابيض والليلكي والوردي والاحمر .

٢٧١٢٧ - مَلْعَط Pointe du bec (F).
Point (of the beak) (E).
هو طرف منقار كل طائر إلا الكاسر .



ملعى منتصبه



ملفوف



ملفوف بروكسل



ملعظون



ملكوك

منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اصنافها شبه غروميلة الشكل، طرفية اللوية المنسوبة الخطوط. فوهاتا مستطيلة مسنة الخفاف .

٢٧٦٣٨ - ملتح *
Profil (F).
Mélange (E).
مظهر الشئ الجانبي .

٢٧٦٣٩ - ملتس
Palpe (F). Palp (E).

٢٧٦٤٠ - ملتس شفوي
Palpe labial (F).
Labial palp (E).

٢٧٦٤١ - ملتس فكي
Palpe maxillaire (F).
Maxillary palp (E).

٢٧٦٤٢ - ملتسي
Palpifère, Palpigrè (F).
Palpifer (E).

نعت تعريفي يطلق على كل عضو حشري أو نباتي يحمل ملتسا أو يقوم بوظيفة الملتس أو يشبه الملتس .

٢٧٦٤٣ - ملتح
Aile (F). Wing (E).
ملتح الطائر جناحه . ويقال لجناحي الطائر ملتحة .

٢٧٦٤٤ - ملتكة
Trompe de l'éléphant (F).
Trunk (E).

هي غروم المقليل يتلصق به الطعام والماء ويستعمله في الدفاع عن النفس وفي نقل الاثقال .

٢٧٦٤٥ - ملتسيوم
Melanthium (S).
Mélante (F). Melanthium, Bunch flower (E).
Braunblümchen (D). Melanthio (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من السورجانيات . انواعه المرفوعة ثلاثة ترغب في المواق الرطبة الظليلة . سوقها نخلة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . تنتهي بالعتاد الزهرية التي يراوح ارتفاعها من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها قدية ، غمية ، كثيرة العدد تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٦ الى ١٨ م . ازهارها الى البياض الاخضر المواج || ازهارها يستمر من ايار الى تموز . وصغير صقلها مع معلق المواد السكرية ، يقتل الديدان .

٢٧٦٤٦ - ملتكنيس
Melancontis (S).
جنس فطور مجهرية من الرغيات ، راجع رفة .

٢٧٦٤٧ - ملتباب ، ألتهوب
Lance-flammès (F). Flame thrower (E).
آلة تصدر اللهب وتنفذ وهي تستعمل خاصة في مكافحة الجراد .

٢٧٦٤٨ - ملتب *
Pyrocephalus (S).
Pyrocéphale (F).
جنس طير من الجوارث سنيات المنقار وفصيلة القصبويات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ اعطائها تمتد من المكسيك الى البرازيل اقسامها صغيرة . رؤوسها متوتجة بطراز تشرف على القفز . اناؤها متراكبة الالوان الزاهية الجميلة يكثر فيها الاحمر الصانبي الشبيه بلهب النار || قوتها العشرات الصغيرة والديدان والحوم .

٢٧٦٤٩ - ملوكان
Colorimètre (F).
Colorimeter (E).
هو مقياس اللون ، جهاز تقاس به الوان السوائل لا سيما الجمر اذ يجتازها نور النار .

Salinité, Salure (F).
Salinity, Saltness (E).

٢٧٦٥١ - ملوحيه *
Corchorus olierioris (S).
Corète potagère, Corette potagère, Guimauve potagère, Mauve des Juifs, Mélochie (F). Jew's-mallow, Nalta jute (E). Judenmauve, Meluchie (D). Corcoro ortense, Malva dei giardini (I).
ويسم من قال « ملوحي » . نبات عشبي ينقل حولي من فصيلة اليرفونيات . يزرع لأزهاره الطويلة الناعمة التي تفيد المدة والامعاء . متطلبات زراعتها تربة مروية غرارة خصبة يكثر فيها عنصر الأزوت العضوي والاعلاف .

٢٧٦٥٢ - ملود *
Meloë (S). Méloé (F).
Oil beetles (E). Mäulwürmer, Ölkäfer (D).
جنس حشرات من الملوديات . انواعه المرفوعة ١٢ اصنافا المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . اجسامها تطول من ١٠ الى ٤٠ م . ذكورها اصفر قدام اناثها . اناؤها تراوح من الزرقة الى السواد الفحمي . يكثر وجودها في المراعي على الاعشاب البرية من نيسان الى حزيران .

٢٧٦٥٣ - ملود ملون *
Meloë variegatus (S).
Méléo variable (F).
نوع من الملود ، ثوبه الى الزرقة الخضراء المواج ، حنار رأسه وكوسله وسكن يلمع الى الجزء السفلى الذكر بطول نحو ١٢ م . والانثى نحو ٣ م . || يكثر وجوده في نيسان وايار . مسرعه الاعشاب والمراعي والازهار البرية .

٢٧٦٥٤ - ملوديات *
Meloïdæ (S). Méloïdés (F).
Meloïdæ, Blister beetles (E). Blasenkäfer, Pflasterkäfer (D).
فصيلة حشرات من مخديات الاجنحة . اجسامها وانواعها عديدة ، جميعها ملونة صغيرة القد أو متوسطة ، بعضها طيب . مرتفعها الاتجار والازهار والاعشاب . تفرز ، عند لمسها ، مادة صفراء اللون كريهة الرائحة . شواربها وبهاها السوي يحويان مادة لظافة تنج الجمل وتثير الياه || قوتها الاستعمارية صونجانية ، مركبة من ٩ الى ١١ فاصلة . ارساخها خفاصة التركيب باستثناء الخلفية فانها رباعية المقاسل .

٢٧٦٥٥ - ملور * ، مريون
Malurus (S).
Malure, Mérion (F). Malurus (E).
جنس طير من الجوارث سنيات المنقار . انواعه المعروفة نحو ١٥ اعطائها بلاد استرالية . ملجتها الحياتي جامي . جاعاتها قليلة المدد . جميعها من الارباب تألف الاجراج المبحرة الانجار والبراري البقلة . قوتها الحشرات اعصها الحنطة والذئبان وبعض الثمار العنية البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٦ م . تتميز باستقامة اذناها وبكثافة سبالها . اناؤها متباينة الالوان فيها الاسود والاضفر الالمن والاضفر الزرق والجوري والكتشي والاشهب والاطمل والاشع . اناؤها الاناث لا تختلف عن اناؤها الذكور لكنها اقل زخا وعة || تدشن اعشاشها في الادغال . اناؤها تحضن نحو ٦ بيضات في مرتين في الحول . الذكور تناوب الاناث في الحضان .

٢٧٦٥٦ - ملون
Chêne égllops (F).
هو السنديان الرومي ، اطلبه .



ملبوس



ملهب



ملوشية



ملود ملون



ملور

اعطائها بحيرات وانهار الهند الصينية وقد انتشرت تربيتها في الاكوادور يوم نظراً لجالها وصغر قدما لانها لا تطول اكثر من ١٠ سم. ثوبها زبرجدي اللون مجذع بالاصفر والاخر. الذكر يجمع سره الانثى تحت قبة عاتمة يصنعها من النسالة واللعاب ويحافظ عليه دون انقطاع حتى التفك والانسلخ.

٢٧٦٦٩ - مَلِكِيَّة - Régulus (F). Regulus (E). الملكيك نجم نيز من كوكبة الاسد الاصفر. يبعد عن الارض نحو ٩٠ سنة ضوئية.

٢٧٦٧٠ - مَلِكِيَّة، جَنْجَل - Abeille mère, Ab. femelle, Reine (F). Queen bee (E). الملكية او الجبل الانثى الكاملة الشوار الثقي من النحل. تتميز بحمها الايهف المستطيل. وظيفتها منع المازن للمحافظة على استمرار النسل والتكاثر النوعي || تساهل مرة واحدة في حياتها وتعيش نحو خمس سنوات تمتع بجلالها ملايين المازن.

٢٧٦٧١ - مِلْيَمِتْر - Millimètre (F). Millimetre (E). جزء من ألف من المتر.

٢٧٦٧٢ - مِلْيَمِيكْرُون - Millimicron هو جزء من اصل مليون جزء قسم اليها المليمتر الواحد.

٢٧٦٧٣ - مَلَكِين - Malléine (F). سائل يستخرج من تكثير قصبات الروام ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل.

٢٧٦٧٤ - مَلِكِين - Laxatif (F). Laxative, Opening (E). مسهل خفيف.

٢٧٦٧٥ - مَلِكِيَّة - Mélinet (F). هي السرته، عشبة مغرية طيبة، اطلبها.

٢٧٦٧٦ - مَلِكِيُولَا * - Meliola (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الوثغيات. انواعه عديدة معظمها من فطور المناطق الاستوائية. مشيها غليظ الشكل اسمر اللون دقيق الاهداب المشفونة الاطراف يدب على بشرة الانفاد والافان والاورق ويتركز بمراشفت بغلها في النسيج. اصابته الخارجية مكررة الشكل تلحفت ازقاً عديدة تحضن البوغيات. بوفاته، عند الادراك، سمراء اللون اهليلجية الشكل لا قياسية الانقسام الجولي المتعرض.

٢٧٦٧٧ - مَلَكِين - Million الملين : ألف الف.

٢٧٦٧٨ - مَلَكِين مِفْر - Mégamètre (F). Mégaméter (E).

٢٧٦٧٩ - مُمَاتَنَة، شَوْدَلَة - Mimétisme (F). Mimesis, Mimicry (E). راجع شودة.

٢٧٦٨٠ - مُمَالِيل - Identique (F). Identical (E). **٢٧٦٨١ - مُمَاد** - الماء : المرتوي من النبات.

٢٧٦٥٧ - مِلْيَاف * - Filandreux (F). Fibrous, Stringy, Thready (E). نعت تعريفي يطلق على ما كان كثير الالياف من الثار واللصوم وغيرها.

٢٧٦٥٨ - مِلْيَب - Maelibea (S). Mélébe (F). Maelibea (E).

جنس دوبيات بحرية من الرعويات مديات الازبل وفصيلة التيتيتيات. انواعه الماصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها عريضة مستطيلة مبططة، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رؤوسها كبيرة عريضة الشكل يعلوها في نفعها من منتصف الرأس الى طرف الجسم بعض الحليات الدقيقة || لونها الى الشبهة السمر. حلياتها شديدة السمر. ارجلها صغيرة، قليلة العرض، مستديرة الاطراف.

٢٧٦٥٩ - مِلْيَت - سنن شجر المرخ.

٢٧٦٦٠ - مِلْيَت * - Meletta (S). Melette (F). Melet (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابوغيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة، شبه وشية الشكل، تطول نحو ١٠ سم الى ١٨ سم. رؤوسها معتدلة الجرم، صغيرة الاخطام والاشداق. زعانفها الظهرية فردية تتوسط الظهر. الخرسية شديدة الصغر تقابل الظهرية. اما الذيلية فقاركة. انوثها تراوح من الريدة الفضية المواج الى الشبهة الرصاصية. اشهر انواعها الثلاثة التالية :

٢٧٦٦١ - مِلْيَت التوسط - Meletta phalerica (S). Melette de la méditerranée (F).

نوع من المليات. يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط. لحمها جيد الصنف || تستعمل استمعال السردين.

٢٧٦٦٢ - مِلْيَت مَبْدُولَة - Meletta sprattus (S). Melette commune (F).

نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الاطلسي. تستعمل استمعال السردين والبلح.

٢٧٦٦٣ - مِلْيَت سَامَة - Meletta venenosa (S). Melette vénéneuse (F).

نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الهندي. لحمها ذائع السم عيت.

٢٧٦٦٤ - مِلْيَج - الجدي الرضيع. ج. ملج.

٢٧٦٦٥ - مَلِيَّحَة - Blongios nain (F). هي الواق الصغير، اطلبه.

٢٧٦٦٦ - مِلْيَغْرَام - Milligramme (F). Milligram (E). جزء من ألف من الغرام.

٢٧٦٦٧ - مَلَكِيَّا - Poisson-cheville (F). المليفيا سمكة بحرية تدعى سفرنه، اطلبها.

٢٧٦٦٨ - مِلْيَغِيَّة * - Macropodus (S). Macropode, Poisson de paradis (F). Paradise fish (E). سمكة نهريه وحيدة الجنس والنوع من كثيرات الزعانف.



مَلِيَّت



مَلِيَّة



مِلْيُولَا

Retenue (F). Reserved (E). **مَمْسُك** ٢٧٧٠٠
حاجز طبيعي أو اصطناعي قليل الارتفاع يعترض مجرى
سيح الماء. ج. ماسك.



مسح

Cocher (F). Auriga (E). **مَمْسُك الأَعْيَنَة** ٢٧٧٠١
مسك الاعنة كوكبة نجوم شالية الموضع تسمى أيضاً ذو
الاعنة، اطلبا، وبهم من سماها النياز.

Râteau (F). Rake (E). **مِمَشَاط** ٢٧٧٠٢
أداة يدوية تستعمل في تمشيط التربة قبل سفلها.

Teilleuse, Tilleuse (F). **مِمَشِكَة** ٢٧٧٠٣
Scutcher, Scutching-machine (E).
آلة تقشر سوق القنب والكتان تفصل عنها المشاقة.

Pholadidae (S). **مِمَصَّات** ٢٧٧٠٤
Pholadidés (F). Pholadidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم.
اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة المدد مولها جمع بحار
العالم. اصداها صغيرة لاقبابية الشكل يكثر فيها اللون
الابيض والاذفر والتبني. اجسامها مجهزة بمصمات
اسطوانية الشكل. تعيش لاصقة بالاعشاب والصخور ||
اعرف أنواعها وأشهرها المِصَّة.



مِعَدَة

Pholas (S). **مِمَصَّة** ٢٧٧٠٥
Pholade (F). Pholas (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم،
وفصيلة المصمات. انواعها المعروفة متوسطة المدد منتشرة
في منظر بحار العالم. تعيش على الصخور والاعشاب
المنعومة ويزاها انها مجهزة بعدة فسفورية تمكها من
الاشعاع || لحوبها مأكولة جيدة الصنف وقد تكون شاذية.

Siphonae (S). **مِمَصَّيات** ٢٧٧٠٦
Siphonées (F). Siphonae (E).
هي المصبيبات، فصيلة من الخفيات الخضر.

٢٧٧٠٧ **مِمَطَار**، **مِمَطَر**، **مِيزَان المطر**،
Pluviomètre (F). **مِقْبَاس المطر**
Pluviometer (E).

جهاز يستعمل لقياس ارتفاع المطر الساقط في مكان ما.

Ductilité (F). Ductility (E). **مَمَطُولِيَّة** ٢٧٧٠٨
قابلية المثل.

Irrigué (F). Irrigate (E). **مَمْعُون** ٢٧٧٠٩
يسقى بالماء الجاري. يقال شجر معون وزراعة معونة.

٢٧٧١٠ **مِمَعَار** النخلة الحمراء الثمر.

Bifère (F). Biferous (E). **مَمْعِل** ٢٧٧١١
نمت تمريني يطلق على كل نبات يزهر ويثمر في عام
واحد مرتين.

Salaisons (F). **مَمَلَّحات** ٢٧٧١٢
Salt provisions (E).
المأكولات التي تحفظ بطريقة التليح.

Rouleau (F). **مَمَلَّسَة**، **مَمَلَّكَة** ٢٧٧١٣
المسلة والمملكة هما الملاسة، اطلبا.

Croisement (F). Crossing (E). **مُعَادَّة** ٢٧٧١٢
هي التصالب والكونة، راجعها.

Tangente (F). Tangent (E). **مُمَاس** ٢٧٧١٣

٢٧٧١٤ **مُمَاس النِّمَام**، **نَظِير المُمَاس**
Cotangente (F). Cotangent (E).

Tangential (F). Tangential (E). **مُمَاسِي** ٢٧٧١٥

Gradient **مَمَال** ٢٧٧١٦
هو فرق الضغط الجري الحاصل بين نقطة ما معينة وبين
محور الاصمار. ج. مالات || الممال الضعيف يسبب
الزوايح.

Dédifférenciation (F). **مُمَايَرَة** ٢٧٧١٧
هي المفاضلة، اطلبا.

٢٧٧١٨ **مِمَخَاض**، **مِمَخَض**، **مِمَخَفَة**
Déalteuse, Baratte (F). Churn (E).
آلة نابذة تفصل الكثرة عن الحيفض. راجع ابريج.

Bâtard (F). Bastard (E). **مُمَدَكِر** ٢٧٧١٩
كل حيوان يتحلل بخلق أو صفات نوحية دون خلق أو
صفات ابائه وأجداده.

Paracel (F). Paracel (E). **مَمَر** ٢٧٧٢٠
فلج رحب بين الخفاف البحرية معتدل الفور أو بعيد
يسمح بمرور البواخر والسفن.

Hâtif (F). Forward (E). **مِمَرَّاح** ٢٧٧٢١
هي صفة التربة التي تسوق النبات ليسرع في ادراك.

Coulard (F). **مِمَرَّاط** ٢٧٧٢٢
الممراط والصمصاء والنتار هو كل نبات معرض لسقوط
الزهر أو امتلاص الثمر بعد العقد.

٢٧٦٩٣ **مِمَرَّاع** راجع غصيب.

Grande chélideine (F). **مِمَرَّان** ٢٧٦٩٤
هو عروق الصباغين، اطلبه.

Macérateur (F). **مِمَرَّس**، **مِمَرَّس** ٢٧٦٩٥
Macerator (E).
آلة للثرت تستعمل في معال النشا والسكر والتقطير.

Souille (F). **مَمَرَّع**، **مَمَرَّع** ٢٧٦٩٦
Wallowing-place (E).
كل مكان مستنقع تتمرغ فيه الايائل والظباء والحنازير.

٢٧٦٩٧ **مِمَرَّعَة**
الممرعة هي الممي الاعور، اطلب أعور.

Brasserie (F). Brew house (E). **مَمَرَّزَة** ٢٧٦٩٨
هي المعمل الذي تصنع فيه البيرا.

Graphomètre (F). **مِمَمَّاح** ٢٧٦٩٩
Graphometer (E).
مقياس المساحة، جهاز يمكن من قياس الزوايا والمساحة.



مطار

Manne (F). Manna (E). - مَنَّ - تَرْجَمِين. مادة سكرية او بالاحرى مزيج من السكر والمنسخت والسكرين تفرزه بعض النباتات اما طوعياً او بواسطة حُر اللحاء او بتأثير ونز بعض الحشرات كقرمزية المن وزر المران وغيرها || والمن يقع على اشكال عديدة تختلف باختلاف مصادر وطرق جمعها . اما النباتات التي تفرز المن فكثيرة العدد اشهرها الاثل النيلي والحوير والشيح والمائل والمران المنى .

Puceron (F). - مَنَّ - مَنَّ حُر الأرق ، اطليه .

2٧٧٢٦ - مَنَّ قُطْنِي *
Aphis lanigera, Eriosoma lanigerum, Myzoxylus mali, Schizoneura lanigera, S. americana, S. crataegi (S). Puceron lanigère (F). Woolly aphid (E). Blutlaus (D).

حشرة صغيرة القد من الاقليات ، تركب التفاح من براعم الى جلوره . تعيش ضمن نطاق من النورس الشمسي المتراكب الذي يشبه ندف القطن || اغصانه وخيشة العاقية . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الحواشير الفعالة نفساً على الانجبار وجذوعها لتسكين وصول السائل الغدالى الى منشئ الجلود .

Spalacids (F). Spalacidae (E). - مَنَاجِد - هي فصيلة الخلديات من رتبة القوائم .

Climat (F). Climate (E). - مَنَاح - هو مجموعة العوامل الجوية المؤقية المميزة . راجع اقليم .

Climatérique (F). Climatic (E). - مَنَاحِي - كل ما له صلة بالمناخ .

Borne (F). Landmark, Milestone (E). - مَنَار - ما يوضع لاشهار حدود العقار او الملك . وما يوضع على الطرقات العامة للإرشاد واستدلال المسافة .

Pupidae (S). Pupids (F). Pupidae (E). - مَنَارَات -

فصيلة من الرغويات مديات الارجل رزوية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة الحرارة من السواحل الى الجبال والجرود ، ترغب في المواقع الرطبة ولا تتخفى الصقيع || اصداقها شبه اسطوانية الشرن متفاوتة الاحجام تبدو كالابرار || المنارات || اعرف اجناسها واشهرها المنارة والتملوط .

Rorqual commun (F). - مَنَارَة - هي المحركل المعروف ، اطليه .

Pupa (S). Pupa, Mallot (F). Pupa (E). - مَنَارَة -

جنس حيوانات برية من الرغويات مديات الارجل وفصيلة المنارات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاف البلاد المعتدلة الحرارة ، ترغب في المواقع الرطبة ولا تخرج من مكانها الا بعد اول حماية مطر || اصداقها شبه اسطوانية الشرن تقصير مع الاقتراب من المقب . جميعها محاذرة وبعضها او مسج او ماس . اجسامها خضراء باحساء الخلد .

Règne (F). مَمْلَكَة - عَالَم
Kingdom (E).
اول قسم في تصنيف الاحياء والجماد . يقال مملكة او عالم الحيوان ومملكة او عالم النبات ومملكة الجماد .

Règne minéral (F). مَمْلَكَة الجَمَاد
Mineral kingdom (E).
هي مملكة الكائنات الطبيعية الخارجة عن نطاق الحيوان والنبات ، التي لا تتناسل ولا تتحرك .

Règne animal (F). مَمْلَكَة الحَيَوَان
Animal kingdom (E).
المملكة الحيوانية قسم من الكائنات الحية تتغذى بالنبات والحيوان وتتكاثر ونحس وتتحرك وتنتقل . اقسامها عديدة تبينئ بسيدات الحلية وتنتهي بالحيوان الناطق .

Règne végétal (F). مَمْلَكَة النَبَات
Vegetable kingdom (E).

المملكة النباتية قسم من الكائنات الحية . تحليتها العامة : تتناسل من بعضها لكنها لا تحس ولا تستطيع الانتقال من مكان الى آخر . وهي تعد ملايين الانواع تجمعها اربعة اقسام رئيسية || اولها كرونباء ، اي اسفلها درجة ، المشريات وهي عادمة المنور والسوق والاوراق كالحفريات والفطريات || ثانياً الطحلبات وهي تشمل الطحالب والكبديات || ثالثاً مستورات الزهر الرزائية وهي تشمل السراخس والاموسغيات والخديرات || رابعاً البزوبيات وهي تشمل مريانات البزور وبعائيات البزور . من عريانات البزور المحرطيات والسيكاسيات . ومن وعائيات البزور رحيات الفلقة ونشائيات الفلقة || الرسم النباتي التابع « شجرة الانساب النباتية » يميز الاقسام وقرونها وبين درجات سلم الارتفاع النباتي من البدييات ذوات الحلية الواحدة الى الوعائيات ذوات ملايين الخلايا .

Eclat (F). مَمْلُوحَة - قَسْحَة
Fragment (E).
كل فصيلة نباتية برزت لها جذور تمكها من الحياة المستقلة فيها لو فصلت وزرعت وسعدا .

Terre noire fertile (F). مَمْنَانَة
الممتنة : الارض السوداء الخصبة .

Nectrioidaceae (S). مَمْنَانِيَّات -
Nectrioidacées (F). Nectrioidaceae (E).
فصيلة تطور مجهرية من رتبة الزويعيات . اجناسها وانواعها عديدة لا مؤذية . تتميز بوظيفتها الجلدية التركيب المحصورة في الانسجة النضلية التي تجمعها عند انتشارها . لونها ينحرف من الاصفر الى الاحمر القرميدي . يكنيتها صغيرة . بويضاتها شفافة ومستطيلة .

Mammée (F). مَمِيَّة
هي الجباس ، اطليه .

Mammée d'Amérique - مَمِيَّة اَمْرِيكِيَّة
هي جباس امريكة ، اطليه .

Glaucière (F). مَمِيَّاق
هو الغامياش ، اطليه .



من قُطْنِي



منَارَة

٢٧٧٤٦ - مَنَّة٥ Nucléole (F). Nucleolus (E).

النواة اللدنية الرئيسية. وعضو التناسل في الخيئات.

٢٧٧٤٧ - مَنَّة٥ Monine, Guenon (F).

She-monkey (E).

الفة انثى القرد. ومن اسمائها القردة والدعية والالفة.

٢٧٧٤٨ - مَنَّة٥ Munna (S). Munna (F). Munna (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدوبيريات. انواعها المدروسة قليلة العدد منتشرة في البحار الشالية || اجسامها صغيرة مبططة، مستعرضة الرؤوس، كبيرة العين الجاحضة. قوائمها متساوية الشكل والطلول باستثناء الزوج الامامي الاول المتحول الى ملاقط فكية.

٢٧٧٤٩ - مَنْتَجِع Pâturage (F).

هو المنتجع، اي المرعى الطبيعي.

٢٧٧٥٠ - مَنْتَجِع Pore de la peau (F).

Pore of skin (E).

ج منائع. والمنتاج هي المناظ المجهزة الطبيعية الموجودة في بشرة الجلد عند الانسان والحيوان.

٢٧٧٥١ - مَنْتَجِش Germoir (F). Hot-bed (E).

اداة زراعية توضع فيها البزور المطلوب انتاشها.

٢٧٧٥٢ - مَنْتَجِع Usufruitier (F).

Usufructuary (E).

هو الذي يملك حق الانتفاع.

٢٧٧٥٣ - مَنْتَجَعَاتُ الْإِمَارَ Faisances (F).

Dues (E).

ما يزداد من المنافع على حصة صاحب الارض.

٢٧٧٥٤ - مَنْتَجِعَة * فِساء الكَثْب Chenopodium vulvaria (S). Vulvaire, Anserine fé-

tide, Arroche puante (F). Stinking goose-foot, Dog's orache (E). Stinkender Gäusefuss (D). Chenopodio fetido, Atriplice puzzolana (I).

نبات كرهه الرائحة من فصيلة السرمقيات. اوراقه متعاقبة منتفحة كاملة طحله اللون. ازهاره عنقودية التجميع تحوي مع اوراقها بعض المواد الصمغية والعناصر الفعالة كسكر بونوات الامونيك ونيترات البوتاس التي تلتصق بها الرائحة الكريهة

٢٧٧٥٥ - مَنْتَجُوشَة Prégermée (F).

صفة البزور التي دخلت في طور التصعد او البروز قبل وضعها في التربة.

٢٧٧٥٦ - مَنْتَاكِر Coulard (F).

هو المراتط، راجعه.

٢٧٧٥٧ - مَنْتَوْر، خَيْرِي Cheiranthus (S).

Giroflée (F). Gilliflower (E).

الاسم العلمي من العربي. والحريه جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الصليبيات. انواعها ١٢ منها الحولية والحولة والمعمرة. سوقها عشبية خشبية. اوراقها متعاقبة بسيطة سنائية. ازهارها عنقودية التجميع صفراء اللون او حمراء || والمنتور اسم شامل يطلق ايضاً على المنيولا الشبيهة به.

٢٧٧٤٥ - مَنَازِلُ الْقَمَرِ Etapes de la lune (F). Stage of the moon (E).

منازل القمر ثمانية وعشرون. ينزل القمر كل ليلة بواحد منها من مستهلها الى ثمانية وعشرين ليلة من الشهر. ثم يكون الحاقق. فان كان الشهر تسعاً وعشرين يوماً استمر ليلة ثمان وعشرين وان كان ثلاثين استمر ليلة تسع وعشرين. والربط تقسم هذه المنازل الى قسمين وتسعى اربعة عشر منها شامية واربعة عشر بمانية. فالشامية، بترتيب تواليا، تبثدئ بالشرطين ثم البطن والثرى واللدبران والمهقة والهمنة والذراع والثرثرة والظرف والجبية والزبرة والصرة والمواء والسالك || اما البانية فالوا الغفر ثم الزبانا والاكليل والقلب والشولة والنعام والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعد وسعد الاخبية والفرع الاول والفرع الثاني وتنتهي ببطن الحوت المعروف ايضاً بالرشاء.

٢٧٧٣٥ - مَنَاسِلُ Organes reproducteurs (F).

Reproductive organs, Sire organs (E).

هي الاعضاء التناسلية في الحيوان عامة.

٢٧٧٣٦ - مَنَاعَة Immunité (F). Immunity (E).

سلامة الجسم من الامراض وقوته الدفاعية. والمناعة قد تكون طبيعية او اكتسابية. راجع حصانة.

٢٧٧٣٧ - مَنَاعَة، مَقَاوِمَة Résistance (F).

Resistance (E).

٢٧٧٣٨ - مَنَاقِصَة Adjudication au rabais (F).

راجع مزاد المنقصة.

٢٧٧٣٩ - مَنَاقِصَة مُقَيَّدَة Restricted allocation (E).

انحداد رسترينت (F). نوع من المناقصات لا يكون باب التنافس فيها مفتوحاً لكل راضع بل يقتصر فيها على بعض المتنافسين من تتنجهيم الادارة بعد استبعاد الآخرين.

٢٧٧٤٠ - مَنَاقِيعِيَّة٥ Hélophyte (F). Helophyte (E).

نعت ترميى يطلق على كل نبات يعيش وينمو في ارسال المستنقعات غير المالحة.

٢٧٧٤١ - مَنَاقِب Rémiges secondaires, Favillons (F). Wing secondaries (E).

من ريش جناح الطائر ما يتبع صف القوامد ويتقدم الخواطي. الواحد منكب.

٢٧٧٤٢ - مَنَاقِيعِيَّة٥ Praticabilité (F).

Praticability (E).

هي التيسير في النهج والعمل تسهلاً لازمة.

٢٧٧٤٣ - مَنَاقِرَاتُ تَدْلِيسِيَّة Manœuvres dolosives (F). Swindling (E).

اعمال خارجية مادية بخدع بها فاعلها مخدعاً آخر. وهي من طرق النش والخداع التي ينص عليها القانون.

٢٧٧٤٤ - مَنَتَب Habitat

الكورة او المكان الذي يلائم هذا النبات فيعيش فيه طويلاً او طويلاً.

٢٧٧٤٥ - مَنَتَب Source (F). Spring (E).

المكان الذي ينبع منه الشيء كالماء والنفط الخ...



منتنة

27768 - مَثُورٌ أَصْفَرٌ * ، خَيْرِي أَصْفَرٌ
Fauille (F).
Sickle, Reaping-hook (E). أداة يدوية تستعمل للحش .

27769 - مِثْجَلٌ مَائِيٌّ
Faucard (F).
Long-handled scythe (E). منجل خاص مستطيل المقبض يستعمل في حش النباتات المائية .

27770 - مِثْجَلِيٌّ
Falciforme (F).
Falcate, Falciform (E). نمت وصفي يطلق على ما كان شكله شكل المنجل .

27771 - مِثْجَمٌ
Gisement, Mine (F).
Lie, Layer, Mine (E). موقع المدين في جوف الارض .

27772 - مِثْجَلَةٌ
Rucher (F).
Stand or shed for bees (E). المنحلة والمعمرة والنحيتة هي مجموعة القفران أو الخلايا التي يتجمعها النحال .

27773 - مِثْجَنٌ ، أَزْوَرٌ
Courbe (F).
Graph, Graphic curve (E).

27774 - مِثْجَنِيٌّ الْأَضْلَاعُ
Curviline (F).
Curvilinear (E).

27775 - مِثْجَنِيَّاتُ الْإِرْتِفَاعِ
Courbes de niveau (F). Contour lines (E). هي خطوط الارتفاع ، راجعها .

27776 - مِثْجَابٌ °
Calibreur (F). Jiggerer (E). آلة تَنْخَبُ التَّارِ أي تفرقها وتوزعها بحسب أبعادها .

27777 - مِثْجَرٌ
Naseau (F). Nostril (E).

27778 - مِثْجَرِيَّاتٌ
Foraminifères (F).
Foraminifera (E). رتبة حيوانات دنيا من الجدریات .

27779 - مِثْجَسٌ
Aiguillon (F). Goad, Sting (E). عصا طويلة مسارية الطرف ينخس بها بقر الحراثة .

27780 - مِثْجَسِيَّاتٌ
Porte-aiguillons (F).
في الحمويات ، راجعها .

27781 - مِثْجَفِضَةُ الْمَيْضِ
Infériorité (F).
Inferior (E). نمت تعريبي توصف به ازهار النبات المنخفضة المبيض من فئة المتحدات القملات .

27782 - مِثْجَلٌ ، مِثْجَلٌ
Blutoir (F).
Bolter (E).

27783 - مِثْجَدَةٌ °
Vaporisateur (F).
Vaporizer, Sprayer (E). جهاز يستعمل لنفض السوائل وذرها كالنبي .

27784 - مِثْجَالٌ °
Conocephalus mandibularis (S). Conocéphale (F).
حشرة من الجنادب وفصيلة القبطويات . ثوبها ثنائي اللون ، اخضر الكوسل والبطن والظهوران ، اسمر الرأس والشرج والسيقان . جسمها صغير القد يطول من ١٩ الى ٢٧ م . جناحهاا يلحفان الجسم والسررك والمرز . ساقاها طولان من ١٦ الى ٢٠ م . مرزهاا وسرركهاا مستطيلان جالسان

27758 - مَثُورٌ أَصْفَرٌ * ، خَيْرِي أَصْفَرٌ
Cheiranthus cheiri (S). Giroflée commune, G. jaune, G. de muraille, Carafée, Violier jaune, Ravenelle (F). Bleedingheart, Wall-flower, Yellow gilliflower (E). Goldlack, Leucoje (D). Violacciocco giallo, Bastone d'oro, Ramo d'oro (I).

نوع من المَثُورِ التَّريبي . بجمته سر ودية ، معمرة ، فراء ، تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها كاملة منقطة ، نصلهاا بحري اللون ، ساني الشكل ، خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها عبقودية التجميع ، ناجي الايتكان . ازهارها عطرية العرف ، صفراء اللون || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

27759 - مَثُورٌ بَرِّيٌّ * ، شِمْتَمٌ ، خَمِثَمٌ
Matthiola livida (S). Matthiolo livide, Giroflée livide (F). Gilliflower (E). Levkoje (D). Violacciocco (I).
نوع من المَثُورِ البرية الملبلة يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . ازهارها عبقودية ، طرفية ، متفرقة ، قليلة العدد ، لونها الى الصفرة الزيتية اللامعة يملوهاا تزييح ضيق اسمر || ازهارها يستمر طوال الربيع .

27760 - مَثُورٌ شَتَوِيٌّ *
Cheiranthus incanus, Matthiola incana (S). Giroflée quarantaine, G. d'hiver, Cocardeau, Violier (F). Gilliflower, Queen's stock, Stock (E). Gemeine Gartenlevkoje, Winterlevkoje (D). Viola, Fior barco, Fior bono (I).

نوع من المَثُورِ الحولي والغول وهو بالحقيقة نوع من المَثُورِ . ضروريه واسمره كثيرة العدد . نباتاته تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . سورهاا غشوية فراء . اوراقها منقطة احليجية الشكل . نصلهاا بحري اللون ، اطحل الملاج ، خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها عبقودية التجميع يكثر فيها المكبس وفي عطرية العرف مختلفة الالوان منها الاحمر والبنيجي والوردي والابيض والاصفر والمزق والموشح . ازهارها يستمر من اذار الى تموز .

27761 - مَثُورٌ لَيْلِيٌّ
Giroflée des jardins (F).
هو المَثُورِ المكسبة ، اطلهاا .

27762 - مِثْجُ مِثْجُ : المِثْجُ : الماش الاخضر .

27763 - مِثْجَا ، مِثْجُو ، مِثْجُو ، مِثْجُو
Manglier (F). Mango tree (E).
هي شجرة الانبيج ، اطلهاا .

27764 - مِثْجَاةٌ * ، مِثْجَاةٌ ، مِثْجَاةٌ
Mangue (F). Mango (E).

هي ثمرة الانبيج ، تعتبر من افيد ثمار البلاد الحارة ويقال انها تنشط الدم وتقيد الامعاء .

27765 - مِثْجَبِيٌّ
Mangabey (F).
هو الحودل ، من القردة الالبالة ، اطلهاا .

27766 - مِثْجَبَرِيَّاتٌ
Orycteropidae (S).
Orycteropidae (F).
هي فصيلة الحافرات من رتبة الدرد .

27767 - مِثْجَبُ
Pâturage (F).
Pasture, Grazing (E).
هو المِثْجَبُ ، مرج طبيعي اقل عشبا من المرعى .



مَثُورٌ أَصْفَرٌ



مَثُورٌ بَرِّيٌّ



مَثُورٌ شَتَوِيٌّ



° مِثْجَاةٌ

* ۲۷۷۹۷ - منڈوسه اليڳيه *

Bruchus brachialis (S). Bruche de la vèscé (F).
Vetch weevil (E). Zottelwickenkäfer (D).



منڊال

Appontement (F).

* ۲۷۷۹۵ - منڈنڅه *

Flying-bridge (E).

صقاله بحريه تقوم على الركائز تستعمل لشد السفن، بقلوسها، اليها تنه الشحن او التفريغ. ج. منادخ.

Menodora scabra (S).

Ménodore scabre (F).

جنبه عمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الزيتونيات. مهدا المكسيك والمناطق المجاورة من الولايات المتحدة الامريكية تزور للتزوين || ساقها قصيرة تملو من ۲۵ الى ۴۰ سم. فرونها مزوانية اوراقها صفرة خيطية النصل طولها نحو ۲۰ م. وضرها ۳ م. لونها الازرق الاصفر اعذارها بويّة صفراء اللون قطرها نحو ۲ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

Mandarinier (F).

Mandarin orange tree, Tangerine orange tree (E).
هي شجرة الليمون الاندي اي اليوسني، اطليا.

Mandarine (F).

Mandarin, Tangerine (E).

ثمرة المندرين اي اليوسني او الليمون الاندي.

Adné (F). Adnate (E).

* ۲۷۷۹۹ - منڈنڅيم *

Zygomorphe (F). Zygomorphous (E).

نمت تعريفي يوصف به كل نبات زوائده الزهرية متشابهة متحدة.

Protractile (F). Protractor (E).

* ۲۷۷۹۱ - منڈنڅيع *

Amarante tricolore (F).

هو القليقة الثلاثية الالوان، اطليا.

Mendélien (F). Mendelian (E).

نمت تعريفي يطلق على كل قاعدة او عملية بنشقة من مذهب مندل الوراثي.

Mendélisme (F). Mendelism (E).

هي مذهب مندل في الوراثة، ملخصه ان النبات يتوارث صفات معينة دون غيرها وذلك ينسب بحسب مذهب لا شذوذ فيها.

Monodore (F).

* ۲۷۷۹۵ - منڈودره *

شجرة تدعى حيدلان، اطليا.

* ۲۷۷۹۶ - منڈوسه البازله *

Bruchus pisorum (S). Bruche du pois (F). Pea beetle (E). Erbsenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات. طولها يراوح من ۴ الى ۵ سم. ثوبها الى السرة، ظهرها مبقع بالاعفر، زغها حنطي. جيلها الحولي واحد. تركيب البازله دين سولعا فتتخر الحبة وتقيم فيها ولا يوبد في الحبة الواحدة سوى حشرة او يرقة.

* ۲۷۷۹۸ - منڈوسه العدس *

Bruchus lentis, B. pallidicornis (S). Bruche des lentilles (F). Lentil weevil (E). Linsenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات. طولها نحو ۳ م. ثوبها الى السرة تملوها زغبة بنية ويقع غبار اللون قليلة الاتسام || جيلها الحولي واحد. تركيب العدس فتتخر الحبة وتقيم فيها.

* ۲۷۷۹۹ - منڈوسه الفول *

Bruchus rufimanus (S). Bruche de la fève (F). Bean beetle (E). Spelsebohnenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات. طولها يراوح من ۴ الى ۵ سم. ثوبها اسود اللون يملوه زغب خفي اطحل المراج || جيلها الحولي واحد. تركيب الفول فتتخر الحبة وتقيم فيها مع يرقاتها.

* ۲۷۸۰۰ - منڈوسه اللوبيه *

Acanthoscelides obsoletus (S). Bruche du haricot (F). Common bean weevil (E). Spelsebohnenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات. طولها يراوح من ۳ الى ۴ م. ثوبها الى الحنطي، زغها اطحل اللون. زباناها منشارية الشكل. جيلها الحولي واحد. تركيب اللوبيه فتتخرها وتقيم فيها مع يرقاتها.

* ۲۷۸۰۱ - منڈوسه التفل *

Bruchidius trifolii (S). Bruche des trèfles (F).

حشرة من المنوسيات. طولها ۲ م. ثوبها اسود اللون، ظهرها مخطط بالاعفر. قوائمها وزباناها سود || جيلها الحولي واحد، تركيب مع يرقاتها يذو التفل على انواص.

* ۲۷۸۰۲ - منڈوسه صيڻه *

Callosobruchus sinensis (S). Bruche chinoise (F). Cowpea weevil (E). Chinesischer Bohnenkäfer, Kundekäfer (D).

حشرة من المنوسيات. طولها يراوح من ۲ الى ۳ م. ثوبها



منڈوسه البازله



منڈوسه اليڳيه



منڈوسه العدس



منڈوسه الفول



منڈوسه اللوبيه

بحرية اللون. ازهارها ضمني الشكل ، خاسي التجميع .
ازهارها صغيرة المالحق بيضاء اللون ، صناعية المالحق ،
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. تنويرها يستمر طوال
شهر ايار .

٢٧٨١٣ - **مَنْتَزِيلِيَّة** *
Mentzelia (S).
Mentzélle (F). Mentzelia (E).

جنس نباتات عشبية برية ويزنينية من فصيلة الورديات .
منبتها بعض مناطق امريكا ، الشمالية . سوقها فروع تملو
من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها لاطنة ، متعاقبة . خاسية
التفريص ، مدببة الفلق . ازهارها غشوية ، خاسية
الفصل ، خاسية او عشارية البتلات ، عديدة الاسدية ،
عطرية العرف ، عاجية اللون او صفراء ، تنبلج في الليل
ابتداء من الغروب الى اشراقها المتفرقة قليلة العدد اشهرها
النالية :

٢٧٨١٤ - **مَنْتَزِيلِيَّة عَشَارِيَّة البتلات** *
Mentzelia decapetala (S). Mentzélle à 10 pétales (F).

نوع من المَنْتَزِيلِيَّة . عشبة محولة تملو من ٦٠ الى ١٠٠
سم. ساقها وفروعها كثيفة الاهداب القصيرة . اوراقها
تطول نحو ١٥ سم. ازهارها عاجية اللون ، كبيرة القد ،
قطرها من ١٠ الى ١٢ سم. وهي عشارية البتلات تضم
نحو ٣٠٠ مداة الى تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٨١٥ - **مَنْتَزِيلِيَّة ليندلي** *
Mentzelia Lindleyi (S). Mentzélle de Lindley (F).

نوع من المَنْتَزِيلِيَّة . عشبة حولية تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم .
ساقها فروع ماسلة اللحاء . اوراقها تطول نحو ٧ سم .
نصالحها خلية على الصفحتين . ازهارها بجيلة الصفار
الزاهي ، قطرها نحو ٨ سم . وهي خاسية البتلات ، عديدة
الاسدية نحو ١٥٠ الى تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٢٧٨١٦ - **مَنْتَس** *
Méristème (F). Meristème (E).

هو النسيج الانشائي في النبات .

٢٧٨١٧ - **مِنْشَاب** *
Compas de proportion (F).
Proportional compasses (E).

٢٧٨١٨ - **مِنْشَاح** * ، **بولدوزر** *
Bulldozer

جراة آلية ينسج بها التراب والصخور فتدفع بها جرفاً
من مكان الى مكان .

٢٧٨١٩ - **مِنْشَاح** *
Pantographe (F).
Pantograph (E).

جهاز يستعمل في نقل الرسوم وتكبيرها وتقليصها .

٢٧٨٢٠ - **مِنْشَر** *
Bec d'oiseau de proie (F).
Bill of the prey (E).

هو منقار كواسر الطير ، يتميز بقوته وانغاف بهرته الذرية
الحادة الطرف .

٢٧٨٢١ - **مِنْشَقَّة** *
Lame (F). Scale (E).

٢٧٨٢٢ - **مِنْشَف** ، **مِنْشَقَّة** *
Van (F).
Winnowing-basket, W.-machine (E).

جهاز يدوي او آلي يستعمل في نفس الحبوب لتنظيفها
من الاجرام .

اسود اللون يعلو بقع بيض جليلة الانسجام الى جيلها
الحولي واحد . تركب مع رقاتها الهندس والمخمس والفاصوليا
فتنخر الحب وتعلبه .

٢٧٨٠٣ - **مَنْتَدُوْسِيَّات** *
Bruchidae (S).
Bruchidés (F). Bruchidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة عُمَدِيَّات الاجنحة . اجناسها
وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، زياة الجسم ، خطمية
الملك . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة لكنها
غثلفة الاشكال يكثر فيها الخيطي والمشاري والمشي
والصولياني . انحدارها لا تلتحف كآمال الجسم . ارساغها
خاسية التكون ، رباعية المظهر الخارجي . مكنها ذري
القدر ، يضي الشكل ، اصفر اللون ، تمتعه الاثنى على
الازهار والثيار والجوب فيتفت عن رقات دقيقة غبراء
اللون تعيش على الثيار والجوب فتنخرها وتنسلخ فيها وتتحول
الى حوريات فحشرات كاملة .

٢٧٨٠٤ - **مَنْتَدُول** *
Maena (S). Mendole (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المنطويات . انواعها المعروفة
اعطائها المتوسط . جميعها صغيرة القد تطلو من ١٨ الى ٢٢ سم
تتميز زعانفها الظهرية الفردية المستطيلة وزعانفها الشربية
الفاخرة الى اشهر انواعها المنطولة المبدولة ، اطليا .

٢٧٨٠٥ - **مَنْتَدُولَة مَبْدُولَة** *
Maena vulgaris (S). Mendole commune, Amendoula,
Matasouldat (F).

نوع من المنطول وهي سمكة مبدولة في المتوسط . جسمها
اهليلجي الشكل يطلو نحو ٢٠ سم . ثوبها فضي اللون ،
ظهورها عايق التفتيض تملو خطوط سم .

٢٧٨٠٦ - **مَنْتَدُوْسِيَّات** *
Maenidae (S).
Ménidés (F). Maenidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكان الزعانف ، اجناسها
وانواعها عديدة . اشهرها المنطول والشلام .

٢٧٨٠٧ - **مَنْتَدِي** *
Sennopithèque (F).

نوع من القرد المقدسة يدعى هبار ، اطليه .

٢٧٨٠٨ - **مَنْتَدِيلِيَّة** *
هي قوتحان المروج ، اطليه .

٢٧٨٠٩ - **مِنْزَحَة** ، **مَنْزَرَف** *
Drain (F).
Drain-pipe (E).

منزعة . ج . منازح ، قناة تستعمل لتفويض التربة اي
لصرف مياهها الزائدة .

٢٧٨١٠ - **مَنْزَرَع** ، **مَنْزِل** *
Tendance (F).
Tendency (E).

٢٧٨١١ - **مَنْزَوَع المَلِكِيَّة** *
Exproprié (F).
Expropriate (E).

هو المقار التي نزع ملكيته من يد صاحبه .

٢٧٨١٢ - **مَنْزَوِيَّة** *
Menziésia (S).
Menziésie (F). Menziésia (E).


نبات معقود التعريف على اسم العلامة الانكليزي "ارشيليه
منزي" جنس جنبايات صغيرة معمرة من فصيلة الحنليجات
مهدها امريكة النالية . انواعها المعروفة قليلة العدد الى
سوقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عابلة
متعاقبة . نصالحها اهليلجية مستطيلة . صفحاتها السفلى



مندولة مبدولة



مندولة



منشاح

٢٧٨٢٣ - منسل ، غُدَّة قَنَاسِيَّة

Gonade (F). Gonad (E).

هي الغدة التي تنتج البويضات وتفرز الهرمونات. لذلك فالخصية هي المنسل الذكري والمبيض هو المنسل الانثوي ج منسل.

٢٧٨٢٤ - منسل

Narine de poisson (F).

Nostril of the fish (E).

المنسل ج مناس. هو منخر الاسماك خاصة.

٢٧٨٢٥ - منسل

Aspidium lonchitis (S).

Aspidie (F). Holly fern, Shield fern (E). Schilfarn (D). Capeivenere doppio (I).

نوع من السراخس البسيجايات المعمرة. ضروريه عديدة منها البرية والزرينية. يرغب في الارترية الرملية وفي المواقع الرطبة. ابروته مدادة. اوراقه منتصبه، مراجه مثله الزوايا، زركامه عادمة للنشاء، لونه الى الخضار الاصفر. يزرع في المراكن فيجود.

٢٧٨٢٦ - منسيلة

Mancenillier (F).

هي الصابة، اطلبها.

٢٧٨٢٧ - منسوب

Homogène (F).

Homogenous (E).

٢٧٨٢٨ - منسوبية

Relativisme (F).

Relativism (E).

المنسوبية مذهب فلسفي يقول بنسبية المعرفة حتى في الزمان والمكان.

٢٧٨٢٩ - منسوح

Lézardé (F). Cracked (F).

ما كان النسيج صلب.

٢٧٨٣٠ - منسوية

Méristématique (F).

Meristematic (E).

منطقة التكاثر الخليوي حيث النسيج الانشائي.

٢٧٨٣١ - منسية

Trucherau (F).

هي الميوافريون المعروف، اطلبه.

٢٧٨٣٢ - منشأ

Origine, Source (F).

Origin, Spring (E).

هو مصدر الشيء او منبعه.

٢٧٨٣٣ - منشاة

Amidonnerie (F).

Starch-works (E). هي الملل الذي يصنع فيه النشا.

٢٧٨٣٤ - منشاح

Plastotype

نعت تعريفي يطلق على كل جزء اثني يتأثر بالحيض فيتنور.

٢٧٨٣٥ - منشار

Scie (F).

سمكة بحرية من الاشلاق، مشهورة باسم ابو منشار.

٢٧٨٣٦ - منشار

Scie (F). Saw (E).

اداة يدوية أو آلية تستعمل في نشر الاشخاب والعمادن والحجارة، الخ.

٢٧٨٣٧ - منشاري

Serriforme, Serrulé (F).

Serriform (E).

نعت تعريفي وصفي يطلق على كل ما كان تقريص حافته يشبه اسنان المنشار.

٢٧٨٣٨ - منشاريات

Pristidae (S).

Pristidés (F). Pristidae (E).

فصيلة اسماءك من رتبة الاشلاق.

٢٧٨٣٩ - منشاريات

Tenthredinidae (S).

Tenthredinidés (F). Tenthredinidae, Sawflies (E). Blattwespen, Sägewaspen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها صغيرة القفا طويلا براوح من ٣ الى ١٥ سم. اثارها مختلفة الالوان. قربها الاستعمارية خيطية || رقاتها دودية عديدة الارجل تحمل عادة دون الثانية او اكثر من ١٦ وهي باكريتها خائبة ومنها الواشمة والشارمة.

٢٧٨٤٠ - منشارية ، ذباب منشاري

Tenthredo (S). Tenthredé, Mouche à scie (F).

جنس حشرات من فصيلة المنشاريات، انواعه نحو ٢٠٠ اكثرها من الحشرات الضارة، شذام مرزا من كائنات غرق اصلب اللحاء. رقاتها ناعمة لا تعف من شيء. اشهر انواعه المؤذية ما يتبع:

٢٧٨٤١ - منشارية السوسن

Rhadinoceraea micans (S). Tenthredé des iris (F).

نوع من المنشارية، لها جيلان في الحول، طولها براوح من ٧ الى ٩ سم. ثوبها الى السواد اللامع. زباناها قصيرتان. تظهر في اوائل حزيران || رقاتها اسطوانية الجسم المائل الاشهب التوب، رأسها مستدير الشكل جوزي اللون. تركب اوراق السوسن فتقذها اشد الاذى.

٢٧٨٤٢ - منشارية الكشميش

Pteronidea ribesii (S). Tenthredé du groseillier (F).

Imported currantworm (E). Gelbe Stachelbeerblattwespe (D).

نوع من المنشارية، اجيالها الحولية ثلاثة. طولها براوح من ٦ الى ٨ سم. ذكورها سود الانواب اناثها صفر. رقاتها خضر الانواب المنمشة بنكت سود. تركب الكشميش فتلهم كامل نصل الورقة وقد لا تعف من العروق.

٢٧٨٤٣ - منشارية الفت

Athalie colibri (S). Tenthredé de la rave (F).

Turnip sawfly (E). Kohlrübenblattwespe, Rübenblattwespe (D).

نوع من المنشارية، اجيالها الحولية ثلاثة. طولها براوح من ٧ الى ٨ سم. ثوبها الى الصفرة. رأسها والقسم الخلفي من جوفها الى السمر. رقاتها سمراء اللون غير الملامح تحمل ١٦ زوجاً من الارجل. تركب مختلف اوراق الصليبيات اخضها الفت.

٢٧٨٤٤ - منشارية الورد

Arge rosae, Hylatoma rosae (S). Tenthredé du rosier (F). Arge rosae (E). Rosenbüschthornwespe (D).

نوع من المنشارية، لها جيلان في الحول. طولها براوح من ٧ الى ١٠ سم. رأسها وزباناها سود. جوفها اسود واصفر، بطها وارجلها صفر. اجنحتها شفافة وريدية الملامح. رقاتها الى الحفرة الزاهية. تركب اوراق الورد تقضي عليها.



منسل



منشارية السوسن



منشارية الكشميش



منشارية الفت



منشارية الورد

Clivé (F). Cleavat (E). ٢٧٨٥٥ - مُنْشَطِرٌ

Phénomène (F). ٢٧٨٥٦ - مُنْشَعٌ
Phénoménon (E). هو الظاهرة . ج مناشع .

Phénoménisme (F). ٢٧٨٥٧ - مُنْشَعِيَّةٌ
المنشعية مذهب فلسفي يدعى أيضاً الظاهرية والحيلولة .
أطلب ظاهرية .

Narine d'oiseau (F). ٢٧٨٥٨ - مُنْشَقٌ
Nostril of the bird (E). هو المنخر عامة ومنخر الطير خاصة وهما منشقان .

Bissectrice (F). Bisecting (E). ٢٧٨٥٩ - مُنْشَقٌّ

Germandrée sauvage (F). ٢٧٨٦٠ - مُنْشَارٌ
هو الاسقروديون البري ، اعطيه .

٢٧٨٦١ - مُنْشَعَةٌ ، مُنْشَحَةٌ
Pulvérisateur (F). Pulverisateur, Vaporizer (E).
آلة تستعمل لنضح الادوية السائلة على النبات . وللمناضج
مختلفة الاشكال والاحجام والتصاميم وقد تكون آلية أو
يدوية .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). ٢٧٨٦٢ - مُنْشَدٌّ
هو حجر الشيست . راجع شيست .

Coercible ٢٧٨٦٣ - مُنْشَطُطٌ
ما كان قابلاً لضغط كالخيار وغيره .

Megaderma (S). ٢٧٨٦٤ - مُنْشَاطٌ *
Mégaderme (F).
جنس حيوان من فصيلة الحوريات . انواعه اربعة تتميز
بفراطيسها الطويلة الذقنة ، بزوائد المنخرية الشارفة ،
بامتطاطها ورحابة ساطها الفشائي ويغطيها من الذئب الظاهر .
كما انها عادمة النشاي العلوية ، أما نواجلها فخمسة .
اجسامها صغيرة القد طويلاً يراوح من ٨ الى ١١ سم .
وبسطها من ٣٥ الى ٤٥ سم . ألتواها رماية اللون يعلوها
مراج اصفر يمتد مع اقترابه من ثيج الظهر || موطنها
الريفية الشرقية وسرنديب والهند . تألت الكهوف والمغاور
واليبيوت الحرة . تعيش جماعات قليلة العدد . قوتها الحشرات
والديدانيات والصفادوق والاسماك الصغيرة .

Polyplodie (F). Polyplod (E). ٢٧٨٦٥ - مُنْشَاطٌ *
كل خلية تتألف مجموعة نشبة المتشابهة من عدة مناشط .

Aérostatics (F). ٢٧٨٦٦ - مُنْشَطَّةٌ
Aerostatics (E). هي علم توازن الهواء .

Gamme ٢٧٨٦٧ - مُنْشَطَسٌ *
هو سلم سياق الانغام المتتابعة المتناسقة ان صاعدة او
هابطة . وهو مدرج تتابع الالوان والمذاقات الخ ...

Génome, Haplome (F). ٢٧٨٦٨ - مُنْشَطَسٌ *
مجموعة نشاط او نشب العامة الواحدة .

Zone ٢٧٨٦٩ - مُنْشَطَّةٌ
مساحات من الارضين تخضع لنظام طبيعي واحد وعوامل
جوية واحدة .

٢٧٨٤٥ - مُنْشَارِيَّةٌ بِرَّاقَةٌ *

Caliroa limacina (S). Tenthredine limace (F).
Pear slug, Cherry slug (E). Schwarze Kirschblatt-
wespe (D).

نوع من المنشارية ، طويلاً نحو ٥ سم . ثوبها الى السمرة
السوداء ، اجنحتها شفافة . مرزها مستطيل الشلام . اناثها
اكثر عدداً من ذكورها تمتد بكها في بشرة الفصلي فينثف
عن برقات تشبه البراق ، لوها الى الخضرة السمراء . تركيب
اوراق معظم الانجسار المشرية فترى النصل وتنف عن
البروق .

٢٧٨٤٦ - مُنْشَارِيَّةٌ دَمِيمَةٌ

Tenthredo difformis (S). Tenthredine difforme (F).
نوع من المنشارية ، متوسطة القد ، غليظة الشكل . طويلاً
يراقح من ٦ الى ٧ سم . ثوبها الى السمرة . اجيالها الحولية
ثلاثة . يرقاتها مؤذية تقضم اوراق الورديات والصليبيات .

٢٧٨٤٧ - مُنْشَارِيَّةٌ سَوْدَاءُ *

Tenthredo aethiops (S). Tenthredine noire (F).
نوع من المنشارية ، صغيرة القد ، طويلاً يراوح من ٥ الى
٦ سم . ثوبها الى السمرة السوداء . اجيالها الحولية ثلاثة .
يرقاتها مؤذية تقطع خضيب النصل على صفحتها العليا .
والبرقة تبدو صفراء اللون خضراء المواج ثم تتعرف رويداً
رويداً الى السمرة الخفيفة الفالدةكة .

٢٧٨٤٨ - مُنْشَارِيَّةٌ مُزَرَّةٌ *

Emphytus cinctus (S). Tenthredine ceinture (F).
نوع من المنشارية ، متوسطة القد ، طويلاً نحو ٨ سم . ثوبها
الى السمرة المزرة بالاسود . اجيالها الحولية تراوح من
٢ الى ٣ . يرقاتها سمراء اللون خضراء في الانابيب الميكانيكية
تندخلها من مواضع القطع على اثر الاشذيب والتقليم .

٢٧٨٤٩ - مُنْشَارِيَّةٌ مُنْشَطَّةٌ *

Tenthredo zonata (S). Tenthredine zonée (F).
نوع من المنشارية ، صغيرة القد ، طويلاً نحو ٥ سم . ثوبها
الى السمرة الفاتحة المخططة بالاسود . يرقاتها مؤذية تقضم
اوراق نباتات الفصيلة الوردية اخصها الورد .

٢٧٨٥٠ - مُنْشَاطٌ ، مُقْبِاسُ الْقُوَّةِ

Dynamomètre (F). Dynamometer (E).
جهاز تقاس به قوة الانسان والحيوان والآلات الميكانيكية .

٢٧٨٥١ - مُنْشَاطٌ كَهْرَبَائِيٌّ *

Electrodynamomètre (F). Electrodynamometer (E).
جهاز يرتكز على ما تمارسه المغنطة من تأثير في التيار
الثابت والمتحرك .

٢٧٨٥٢ - مُنْشَاعٌ *

Doseur (F). Dosimeter (E).
جهاز يستعمل في التثنيح او التركيز .

٢٧٨٥٣ - مُنْشَرٌ

Séchoir (F). Drying-sun (E).
المكان اللند للنشر وتجفيف اوراق التبغ في الشمس وهو
يعني أيضاً الاجهزة المختلفة التي تنشر عليها مشاكيل التبغ
الاخضر ربيعاً تجف الاوراق اخصها المناشر الطليقة
والمجموعة والنقالة .

٢٧٨٥٤ - مُنْشَرَّةٌ

Scierie (F). Saw-mill (E).
هي معمل نشر الخشب وصناعتها .



منشارية برّاقة



منشارية سوداء




منشارية مزرّة



منشارية منطقة



منشفة يدوية



منشفة آلية



منطاب

Manguier (F).

٢٧٨٨٤ - مِنَقَاة

هي شجرة الانج ، اطلبها .

Manganate

٢٧٨٨٥ - مِنَقَاتَات ، مِنَقَاتَات

المنقعات هي املاح الحامض المننكي .

٢٧٨٨٦ - مِنَقَاتِيْزَا ، مِنَقَاتِيْس ، مِنَقَاتِيْز

Manganèse (F). Manganese (E).

معدن اشهب اللون شديد الصلابة واللوعة قابل للصلق .
وزنه (Mn - م) وزنه الانوي ٤٤,٩٣ ءقله النوي ٧,٢

يحلل الماء في ١٠٠م.غ. ينصهر في ١٢٢٥م.غ. ويغلي في ١٩٠٠م.غ. وهو يوجد في الطبيعة على هيئة مركبات كبرايوة اخصها الاوكسيدات والكربونات ، ويوجد ايضاً في معظم النسيج النباتية ولكن بمقادير ضئيلة كما يوجد في جميع الارربة . بذات السبب الضئيلة || يستعمل ويستعمل صناعياً في عدة تراكيب اخصها الصلب .



منقاخ

٢٧٨٨٧ - مِنَقُو هو الانج ، اطلبه .

Mangiferae (S).

٢٧٨٨٨ - مِنَقِيَات

Mangiférées (F). Mangiferae (E).

سبط من البطميات ومنهم من جعلها فصيلة مستقلة .

Soufflet (F). Bellows (E).

٢٧٨٨٩ - مِنَقَاخ *

اداة يدوية تستعمل في ذر المساحيق الزراعية .

Soufreuse (F).

٢٧٨٩٠ - مِنَقَاخ كَبِيرِيْة *

Sulphurator (E).

اداة تستعمل في ذر مساحيق الكبريت .

Caillette (F).

٢٧٨٩١ - مِنَقَحَة ، مَنُون

Rennet (E).

جزء من معدة المبررات .

Préure (F). Rennet (E).

٢٧٨٩٢ - مِنَقَحَة

هي المسوة ، خيرة قابلة للذوبان ، تستخرج من منقعة الجدي الرضيع ، تستعمل في تجبين الحليب .

Exécuteur (F). Executor (E).

٢٧٨٩٣ - مَنَقَد

هو من قام بالتنفيذ .

٢٧٨٩٤ - مَنَقَد الوصية

Exécuteur testamentaire (F). Executor (E).

هو الذي يعينه الموصي في الوصية لينفذ ما جاء فيها .

Déodactyles (F).

٢٧٨٩٥ - مِنَقَصَلَات الاَصَابِع

احد قسمي الطيور الجوارم ، يشمل عدة رنقيات والمعدية من الفصائل والجناس والانواع .

٢٧٨٩٦ - مَنَقِص

نمت تعريفي توصف به الدجاجة التي كفت عن البيض .

Egrenouse, Egre noir (F).

٢٧٨٩٧ - مِنَقِص

آلة تفصل حب الذرة وبزور مختلف نباتات الكلا عن مطرها ورائيسها وسابلهما وسفلهما .

Déhiscent (F). Dehiscent (E).

٢٧٨٩٨ - مَنَقَلِق

نمت تعريفي توصف به الاعضاء النباتية التي ينقل درزها عند الادراك .

Bec (F). Beak, Bill (E).

٢٧٨٩٩ - مِنَقَاد ، مِنَقَار

الجزء القرني الامامي البارز من رؤوس الطير .

Ressort (F).

٢٧٨٩٠ - مِنَقَلَقَة الاِختِصَاص

Province (E).

هي المنطقة التي يشملها اختصاص احدى المحاكم وهي ايضاً تعيين درجة الاختصاص .

Baudrier d'Orion (F).

٢٧٨٩١ - مِنَقَلَقَة الجَوَزَاء

Orion's belt (E).

ثلاثة نجوم مستقيمة الصف مركزها في وسط كوكبة الجبار اي الجوزاء . وتُدعى ايضاً النطاق ونطاق الجوزاء وفقار الجوزاء ويد الجوزاء .

Zone franche (F).

٢٧٨٩٢ - مِنَقَلَقَة حَرَّة

Franked zone (E).

منطقة اقليمية معينة لا تخضع للرسوم الجمركية .

Circonscription foncière (F). Ground circumscription (E).

٢٧٨٩٣ - مِنَقَلَقَة عَقَارِيَّة

Cestodes (F). Cestoda (E).

٢٧٨٩٤ - مِنَقَلَقِيَات

صف من الديدان الرنفيات .

Mniotiltidae (S).

٢٧٨٩٥ - مِنَقَطِيْلِيَات

Mniotiltidés (F). Mniotiltidae (E).

فصيلة طير من الجوارم سنيات المناقر . اجناسها وانواعها عديدة اعطائها نعت من الهند الى امريكة الجنوبية والشيالة || اجسامها منقطة قريبة الشب بالقرنف . اذواها ملونة تكثر فيها الطحلة والياض || ملجها الحيائي زوجي في زمن التافد والحضن ثم جماعي || قوتها الحشرات وكبها ويرقاتها والثار البائعة والبلور || تدفن في تجاويف الانجار من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حفنتها اربع يبيضات .

Isotherme (F). Isotherm (E).

٢٧٨٩٦ - مِنَقَطَاة

منظام او ايزوترم . ج منظم : خطوط الحرارة الاقليمية او العالمية للمساوية التوزيع .

Détargent, Détersif (F).

٢٧٨٩٧ - مَنَقَط

Detergent, Detersive (E).

Organisation (F).

٢٧٨٩٨ - مَنَقَطَة

Organization (E).

٢٧٨٩٩ - مَنَقَطُور عَطِي

Perspective linéale (F). Linear perspective (E).

Crabe (F). Crab (E).

٢٧٨٩٠ - مَنَع

حيوان مائي من القشريات يعرف بالسرطان .

Crabe à laine (F).

٢٧٨٩١ - مَنَع مَصُون

هو الخيتل دويبة بحرية من القشريات ، اطلبه .

٢٧٨٩٢ - مَنَعَقَات التَهَر

منعطف النهر ثلاثة انجم نيرة متتالية من كوكبة النهر المعروفة ايضاً بكوكبة اريدانوس . موقعها في المنعطف الثاني للنهر .

٢٧٨٩٣ - مَنَعَقَات الاَجْنِعة

راجع ملتويات الاجنعة .



منقاخ كبير

مترابكة اللولان الساطعة. قوتها الثَّار والبذور وبعض الحشرات || اعرف انواعها واشهرها المنكان الطويل الذئب والمنكان الزاهب .

٢٧٩١٤ - مَنَكَّان رَاهِب * Pipra monacus (S).
Manakin moine (F).

طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الثَّيَاب . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربة ، يطول نحو ١٥ سم . ثوبه العلوي الى السواد الاسفغ المواج . ثوب السفلي الى البياض الاصفر . يتميز بقده عنقه التي تتنفع وتنتفش عند الطلب فتبدو كاللقن وهو ما دعي الى كنيته بالراهب . مقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف المسن . حدة عينه عسيلة اللون . جناحه قصير وذنبه كذلك . رصاه دقيقان ، رفيهان ، احمران || اخلاقه رضية لكنه كثير الوجيل وشديده الحذر . قوته الثَّار البانمة وبعض الحشرات || يدن عنده في الاشجار القليلة الارتفاع . الاثني تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٧٩١٥ - مَنَكَّان طَوِيل الذَّئْب * Pipra candata (S). Manakin à longue queue (F).

طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الثَّيَاب الرطبة . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربة ، يطول نحو ١٧ سم . ثوبه الى الزرقة البياوية . جبهة وقمة رأسه الى الحمرة الزاهرة . حمراء وعنقه وجناحاه وذنبه الى السواد الاسفغ اللامع . ذنبه مستطيل الشكل ، مستدير الطرف . حدة عينه الى الحمرة القرمزية . مقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف المسن . رصاه دقيقان رفيهان ، حطيا اللون . ثوب الاثني الى الخضار الزيتي السوي . ثوب الصغار حق التحسير الاثني لا يختلف عن ثوب الاثني || اخلاقه هنية لكنه كثير الوجيل والحذر . قوته الثَّار البرية والزراعية والحشرات . طيرانه قصير الشوط يكثر فيه السفيف والتصعيد والتبييط || يدن عنده في الاشجار القليلة الارتفاع عند اطراف الاغصان . الاثني تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٧٩١٦ - مَنَكَب الْجَوَازَة Bételgeuse (F).
Bételgeuse (E).

منكب الجوازات نجم ثَّير يرتقالي اللون من المرتبة الاولى . مركزة على منكب الجبار البني اي الشرقية . يبعد عن الارض نحو ٣٠٠ سنة ضوئية .

٢٧٩١٧ - مَنَكَبُ الْقَرَس Brunfelsia hopeana, Francisca uniflora (S).
Manaca (F). Manakakraut (D).

الاسم العربي كالفنسي والانكليزي والاماني تعريب الاسم البرازيلي . شجيرة طيبة برية وتربينية من فصيلة الباذنجانيات . مهدها بعض مناطق امريكا الجنوبية اخصها البرازيل || ساقها فرعاه تدلو نحو اربعة امتار . اوراقها متعاقبة ،

٢٧٩١٨ - مَنَكَب ذِي الْعَيْنَان

كوكب .

٢٧٩١٩ - مَنَكَّة

٢٧٩٠٠ - مَنَقَّار الدَّجَاجَة

منقار الدجاجة نجم ثَّير من كوكبة الدجاجة .

٢٧٩٠١ - مَنَقَّار الْغُرَاب

منقار الغراب نجم من كوكبة الغراب المعروفة ايضا بالغلاب الياني .



منقابة

٢٧٩٠٢ - مَنَقَّاعِيَّات Limnanthaceae (S).

Limnanthaceae (F). Limnanthaceae (E).
فصيلة نباتية من ذات الفلتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها اعشاب متعمية ، معظمها حولي . اوراقها مركبة مستطيلة الزناد . ازهارها فردية ، خاسية البتلات ، عشارية الاسدية . ثمارها عتبية صغيرة القد .

٢٧٩٠٣ - مَنَقَّاعِيَّة Limnanthes (S).

Limnanthe, Cresson fleuri (F). Meadow-foam (E).
Rosenrote Sumpfbiume (D). Limnanto (I).
جنس نباتات عشبية متعمية من فصيلة المنقاعات . انواعها قليلة العدد ، جميعها برية ، سوقها تطول من ٢٠ الى ٧٠ سم . معظمها ينبت على الارض . اوراقها مركبة ريشية مخبرية . ازهارها كثيرة العدد منها الاصفر والابيض والوردي .



منقل

٢٧٩٠٤ - مَنَقَب

المنقب نجم ثَّير من كوكبة قيطس مركزة في الرأس .

٢٧٩٠٥ - مَنَقَبَة Palmeria (F).

Palm-plantation (E).
هي الحائش اي بستان النخل العامر .

٢٧٩٠٦ - مَنَقَسِم، مَقْدُور الْقِسْمَة Divisible

٢٧٩٠٧ - مَنَقِص Déperditeur (F).

نمت تعريفي يطلق على كل مادة او عنصر يسبب نقصاً في طاقة الجهد اي الطاقة الكامنة في الجسم .

٢٧٩٠٨ - مَنَقِطِع Discontinuu (F).

Discontinuu (E).
هو المنقطع اي غير المستمر او المتواصل .



منكاش

٢٧٩٠٩ - مَنَقَع Marais, Marécage (F).

Marsh, Bog, Fen, Swamp, Morass (E).
ارض منخفضة يستنق فيها الماء .

٢٧٩١٠ - مَنَقَعِيَّة Palustre (F). Paludal (E).

منقعي وغلدياني وغديري : نمت تعريفي يطلق على النباتات التي تعيش في المناطق .

٢٧٩١١ - مَنَقَل *، مَزُوكَان Gonlometre (F).

آلة للمسح ، تقاس بها زوايا الارض . (E).
٢٧٩١٢ - مَنَكَّاش Binette (F). Hoe (E).

اداة الغرز الخفيف تستعمل باليد .



منكان راهب

٢٧٩١٣ - مَنَكَّان Pipra (S).
Manakin (F). Manakin (E).

جنس طير من فصيلة البيريات . انواعه المعروفة عديدة . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى والجنوبية . تألف الرياض والغابات الرطبة . نظامها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ١٥ الى ٢٠ زوجاً || اجسامها صغيرة ، ربة ،



منورينة

Manorina (S). ***مُنُورِينَة** ٢٧٩٣٣
Manorine (F). Manorina (E).
جنس طير من فصيلة المغرريات . انواعه المعروفة خمسة
موطنها أستراليا والجزر القريبة منها . لونها الحياتي
جامعي قوتها رقيق الازهار والثمار البائنة والمولم || اجسامها
صغيرة . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . مناقبها
خروطية . السنها خيطية منمطة . تجرس الزهر كالنحل .
الاوليا متراكبة الاالوان الزاهية || تدفن في الادغال القليلة
الارتفاع . اناثها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة
الذكور نحو ١٢ يوما .

Mannose **مَنُوز** ٢٧٩٣٤
سكر غلوكوزي ، بلورزي التركيب ، سريع الذوبان في
الماء ، ينتج خميرة البيرة ، يوجد في بعض النباتات انحصها
نحار الخروب وقشور البرتقال .

Monaul (F). **مَنُول** ٢٧٩٣٥
هو الخنط الهبي ، اطلبه .

Narcotique (F). **مُنُوم ، مُخَدَّر** ٢٧٩٣٦
Narcotic (E).
نمت تعريفي يطلق على المواد شبه قلبية المخدرة الموجودة
في بعض النباتات . وقد يطلق تعميماً على كل نبات
يحوي هذه المادة او المواد .

Sperme (F). Sperm (E). **مَسِي** ٢٧٩٣٧
مادة مركبة مائنة لزجة تؤمن حياة الحورن المنوي تقترنها
خصيتا الذكر وتغذيها الحويصلات النوية عند وجودها
ويدهنها القصب عند الاندلاق .

Aphididae (S). **مَسَيَات** ٢٧٩٣٨
Aphididés (F). Aphididae (E).
هي فصيلة الاقيات ، اطلبها .

Sarcelle marbrée (F). **مَسِيَة** ٢٧٩٣٩
هي الخلف الجبيل ، اطلبه .

Spermatisme (F). **مَسِيَة** ٢٧٩٤٠
Spermatism (E).
المنية مذهب الذين يعتبرون ان مني الذكر يحوى جميع
اجزاء الملقحة . وان ما تقدمه الانثى منوط بالنشو والنوثة
فقط .

Mania maura (S). ***مَسِيَة مُورَا** ٢٧٩٤١
Mania maure, la Maure (F). Mania maura (E).
حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا وافريقية الشمالية .
قراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرتها تعيش على
اوراق النباتات المرعوية والحولية والحولة || جسمها
صغير الجسم حنطى اللون . عينها كبيرتان . ذنانها
خيطيان . جوشها وبعطها الى الحنطى الكسني المولج ||
رواشنها عند الشقن الى الحنطى الاسمر المولج تملو في
الزوج الامامي زركمة كسنية وتمشج وتبضع براوح
من الجؤوة الى السمرة الكسنية . وتعلو في الزوج الخلفي
مشحان مفرضتان لونها الى السمرة الكسنية . حناورها

ممنقة ، مستطيلة الزناد ، خلبية النصل الاقياصي التفصيص
خلية البشرة على صفحتها || ازهارها فردية ، محورية
الارتكاز ، مستطيلة المالحق ، صغيرة الحجم ، ليلكية
اللون || ثمارها عنبية ، جعالية المادة ، تبدو خضراء
وتنتهي ، عند النضج ، بالبنفسجي العابق .

Hache fourrage (F). **مَسَكِلَة** ٢٧٩٤٠
Fodder-cutter (E).
آلة تستعمل في فرم ورق التوت والكلأ وما اشبه .

Décalcifié (F). **مَسَكِلِس** ٢٧٩٤١
Decalcified (E).
فقد كله .

Serfouette (F). Small hoe (E). **مَسَكِفَة** ٢٧٩٤٢
أداة تستعمل في عرق تربة حدائق الزهور والمباتل .

Masticable (F). **مَسْخَع** ٢٧٩٤٣

Fourmillière (F). **مَسْمَلَة** ٢٧٩٤٤
Ant-hill, Ant's nest (E).
هي قرية النمل .

Butyromètre (F). **مَسْمَدَة** ٢٧٩٤٥
Butyrometer (E).
هو ميزان الحليب ، جهاز يستعمل لمعرفة مقدار السن
في الحليب .

Méthode (F). **مَسْمَج ، مَسْمَج** ٢٧٩٤٦
Method (E).
هو الاسلوب المتبع ، راجع طريقة .

Allergique (F). Allergic (E). **مَسْمَدَف** ٢٧٩٤٧
المسمدف من كان جهازه العضوي عرضة للانهداف .

Ebauche (F). Rough Shape (E). **مَسْمَر** ٢٧٩٤٨
الرسم الاجمازي للشيء وبداية تكوين الشيء . ج مناهر .

Shénique (F). Schenic (E). **مَسْمِيَة** ٢٧٩٤٩
نمت تعريفي يطلق على كل مادة من عقاقير وغيرها تنشط
فاعلية الاعضاء .

Menhir (F). Menhir (E). **مَسْمِيَر** ٢٧٩٥٠
المسمر حجر ضخم مستطيل منتصب يعود الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبود
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال الى المناهر
كثيرة العدد ، متفاوتة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

مَسْمَرَة ، مَسْمَرَة ٢٧٩٥١
Jour de souffrance, Jour de tolérance
مطل يبيحه القانون لدخول النور فقط . ويجب ان تغفل
الكوة بالزجاج والحديد وتكون على ارتفاع قانوني لا يقل
عن ٢٦٠ سم . من ارض الفرقة .

Sciaphyte (F). **مَسْمَرِي** ٢٧٩٥٢
نمت تعريفي يطلق على كل نبات لا يستطيع النوثة في
الضخ العادي بل ينمو في ظل غيره .



منية مورَا

بعد النقع والغلي في الماء ، لأنها غنية بالعناصر المرة السامة ، لبوب نشوي غذائي شائع الاستعمال يدهى تيبوكا أو قساوا . ولبوبها هذا يحوي ما قدره نحو :

٣,٦٨ ٪ من المواد الازوتية

١,٩٨ ٪ من المواد الدهنية

٩١,٤٤ ٪ من المواد التشوية

وهو كالمنهوت الحلو يرغب في الاتربة الخفيفة الدبالية الغنية المروية ، يتكاثر بالقلع .

Tannerie (F).

٢٧٩٤٩ - مَنِيَتَة

هي المدينة ، أطلها .

٢٧٩٥٠ - مَهَاة * ، مَهَا

Addax nasomaculata (S). Addax, Antelope de Nubie, A. de Mendès (F). Addax (E).

الجمع مهوات . والمهاة بقرة وحشية قوية جامدة رقيقة الحاروك وسيدة الجنس والنوع . ثوبها الى البياض الاغبر . رأسها عابق اللون مستطيل الشكل يحمل قرنين كبيرين لولبيين ، راوح طوله ٥٠ الى ٧٠ سم . صيانتها كيرتان مكحلان . عنقها اصغرم من عنق الظباء . طول جشها نحو ٢١٠ سم . وارتفاعها ٩٠ سم . اناثها رباعية الاعلاخ || تمش ادرات متوسطة العدد ، موطنها الصحاري والغياي توجد في الجزيرة وسورية والنوبة وليبيا وتونس والجزائر ومراكش .

Antelope saiga (F).

٢٧٩٥١ - مَهَاة سِيكَا

نوع من الظباء يدعى سِيكَا ، اطلها .

Atomiseur (F).

٢٧٩٥٢ - مِهْبَاب ، مِهْبَاب

آلة خاصة بالمساحيق والسوائل تذرلها كالنبار .

Cathode (F).

٢٧٩٥٣ - مَهْطِط

Remise (F).

٢٧٩٥٤ - مَهْطِط الطير

المكان الذي يأوى اليه الطير عند الجفوم او الاستراحة .

Vagin (F). Vagina (E).

٢٧٩٥٥ - مَهْطِل

من اعضاء التناسل في الحيوان وهو القناة التي تصل الشفر بعنق الرحم .

Vaginal

٢٧٩٥٦ - مَهْطِلِي

Potomètre (F) Potometer (E).

٢٧٩٥٧ - مَهْطَان

المهتان جهاز يستعمل في قياس ما يتنفس النبات من ماء .

Turbellariés (F).

٢٧٩٥٨ - مَهْطَرَات

صف من الدم العريض .

Tératologie (F).

٢٧٩٥٩ - مَهْطَجَة

علم غرائب الخلقة والتعاجيب .

Tératologie (F).

٢٧٩٦٠ - مَهْطَجِي

علم غرائب الخلقة والتعاجيب .

Habitat (F).

٢٧٩٦١ - مَهْد

هي البلاد التي يعيش فيها الحيوان الممين منذ الاعداء اليه .

الخارجي مذبذب الاطراف || لها جليل واحد في الحلو . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتحت المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل المقدم والمؤخر . ثوبها الى الخضار الالسن تعلو خطوط جانبية معتدلة بيضاء اللون وخط ثنجي اسود قاطب . مدنها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في التربة حيث تنفخ السرعة لمتلصقة بجلبلاب من الطين .

Mannite (F).

٢٧٩٤٢ - مَنِيَت

مادة سكرية قابلة للتبلور تستخرج من بعض النباتات والفطور .

Magnésie (F).

٢٧٩٤٣ - مَنِيَرَا

هي المغنيزا اي اكسيد المغنيزيوم .

Résistant (F). Unyielding (E).

٢٧٩٤٤ - مَنِيَع

Spermine (F). Spermin (E).

٢٧٩٤٥ - مَنِين

شبه قلوي غير سام يكثر في المني ويوجد في البصاق .

Manihot (S).

٢٧٩٤٦ - مَنِيَهْوَت

Manihot, Manioc, Magnoc (F). Mandioc plant, Cassava plant (E). Bitter Manioka, Kassava-wurzel (D). Manioc, Mandiocca, Jatropha officinale (I). جنس نباتات معمرة من فصيلة الفربيونيات . انواعه نحو ٤٠ جميعها جنبية منها البرية والزراعية الغذائية . اعطائها البلاد الاستوائية . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، اذنية ، كفية النصل ، خاسية او سباعية القصوص . ازهارها فستقية اللون ، صغيرة القد ، عشوية التجميع ، محورية وطرفية الازتكاك . ثمارها جراح ثلاثية الاضحية تنقل عن ٦ صمرايع || تزرع من اجل جذورها العشوية الغليظة المستطيلة التي يستخرج منها لبوب نشوي غذائي يدعى تيبوكا || اشهر انواعه الزراعية سايي .

٢٧٩٤٧ - مَنِيَهْوَت حُلُو *

Manihot dulcis, M. aipi, M. palmata (S). Manioc doux, Camagnoc, Cassave (F).

نوع من المنهوت الزراعي . ضروبه كثيرة العدد . جلوره قليلة المواد المرة السامة . سوقه متعينة عادمة التضلع ، اوراقه مستطيلة الاذنيات والاعناق الخضراء ، مستعرضة القصوص . جراؤها عادمة الجناح . جلوره نشوية غذائية تحوي ما قدره نحو :

٣,٢٥ ٪ من المواد الازوتية

١,٥٦ ٪ من المواد الدهنية

٨٨,١٢ ٪ من المواد التشوية

يرغب في الاتربة الخفيفة المروية ويتكاثر بالتعليل .

Manihot utilisima (S).

٢٧٩٤٨ - مَنِيَهْوَت مُر *

Manioc amer, Cassave amère (F). نوع من المنهوت الزراعي ، ضروبه كثيرة العدد . جنباته كبيرة القد تملو من ٣ الى ٥ امتار . سوقها مصلعة . اوراقها مفصصة قصيرة الاعناق الجلوية اللون ، اذنياتها جدعة . قصوص نصلها مستطيلة ضيقة . جراؤها مجنحة || عساقها غليظة كبيرة تستعمل في صناعة الكحول ويستخرج منها



منهوت حلو



منهوت مُر



مهة

ازهارها قنولية مغلوقة الكأس تبدو كاثقاب المدببة الاطراف .

٢٧٩٧٦ - مَهْمَزِيَّة *

Dicentra, Dielytra, Bicuella (S). Diélytra, Diélytre, Dicentre, Bicuclée (F). Seal flower, Bleeding heart, Locket flower (E). Flammendes, Fliegendes Harz, Tränendoppelsporn (D). Dielltra (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الخشخاشيات . انواعها المعروفة ١٢ معظمها بري وبعضها طبي يدخل في علاجات الفسلس وبعضها تزييني . اوراقها متعاقبة ، متعقبة ، مفرصة . ازهارها جميلة الشكل مهازية || اشهر انواعها واعرفها سالي .



مهرس العنب

٢٧٩٧٧ - مَهْمَزِيَّة اُنَيْقَة Dicentra eximia (S). Diélytra d'élite, D. distingué (F).

مجلة تزيينية مثدونة معمرة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها بحرية اللون . عناقيدها الزهرية هرمية الشكل منتصبة . ازهارها حراء اللون قصيرة المهازين || ازهارها يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف .

٢٧٩٧٨ - مَهْمَزِيَّة جَمِيلَة

Dicentra formosa (S). Diélytra gracieux, D. à belles fleurs (F).

مجلة معمرة طبية مثدونة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها جميلة الخضار الزاهي . نصلها قدي التشرم . عناقيدها الزهرية مخروطية الشكل . ازهارها وردية اللون ، قصيرة المهازين || جلورها غنية بمادة الكورديالين الشائعة الاستعمال الطبي || ازهارها يستمر من ايار الى اواسط الخريف .



مهليل

٢٧٩٧٩ - مَهْمَزِيَّة ذَهَبِيَّة

Dicentra chrysantha (S). Diélytra jaune d'or (F). مجلة تزيينية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ساقها فرعاء مورقة . اوراقها كثيفة التجميع غيظية التشرم . عناقيدها الزهرية منتصبة . ازهارها صغيرة القذ والمهازين ، ذهبية اللون || ازهارها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٧٩٨٠ - مَهْمَزِيَّة رَائِعَة

Dicentra spectabilis (S). Diélytra remarquable, Cœur du Marie, Cœur de Jeannette (F). مجلة تزيينية معمرة تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . ساقها فرعاء مورقة . عناقيدها الزهرية كبيرة القذ متدلية . ازهارها قلبية الشكل ، مستطيلة المهازين ، قرمزية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٧٩٨١ - مَهْمَزِيَّة عَارِشَة

Dicentra torulosa (S). Diélytra grimpat (F). مجلة تزيينية عارشة تملو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها وفروعها نحيلة . حواملها بسيطة . اوراقها تدية التشرم . عناقيدها الزهرية كبيرة القذ متدلية . ازهارها قرنية الشكل ، صفراء اللون ، عطلة || ازهارها يستمر طوال فصل الخريف .



مهازية

٢٧٩٨٢ - مَهْمَتُون Aristoloché (F). هو الزراوند ، من النباتات الطبية ، اطلبه .

٢٧٩٨٣ - مَهْمِي * Subdésertique (F).

Subdesertic (E). هو البلقعي ، نمت تعريفي وصفي لائق الشبه صحراوي .

٢٧٩٦٢ - مَهْدَ Aplanir (F). To level, To smooth (E).

اصلع وبسط التفر من الارض او ما اتخضض منها في سهولة واستواء . ويقال مهد الارض وقدن التربة .

٢٧٩٦٣ - مَهْدَاج Vent précurseur de pluie (F). الريح الخنون تستبق المطر .

٢٧٩٦٤ - مَهْدَب Ctenoide (F). Ctenoid (E). نعت تعريفي يطلق على الحراشف الابرية او المسنة الحمار الطليق . راجع مبراش .

٢٧٩٦٥ - مَهْرٌ ، لَكُوْ ، لِيْلُو Poulain (F). Foul, Yearling (E). ولد الفرس قبل بروز ثنيته الثابتين . ج مهاد ومهاد ومهارة وفلاء واغلاء .

٢٧٩٦٦ - مَهْرُ الْجَنَّة Iris orateur (F). حشرة من السرعوفيات تدعى قسطية ، اطلبها .

٢٧٩٦٧ - مَهْرَة ، قَلْوَة ، قِلْوَة Poulche (F). Filly (E). هي انثى القلو والمهر .

٢٧٩٦٨ - مَهْرَسُ الْعِنَب * Fouloir (F). Beater (E). مهرس العنب او العاصرة ، آلة يسحق فيها العنب لاستخراج عصارتة .

٢٧٩٦٩ - مَهْرَمَة Hachoir (F). هي الخفخة ، اطلبها .

٢٧٩٧٠ - مَهْرِي Méhari (F). Heiri (E). سلالة من الابل الركائب السريعة منسوبة الى مهن حيدان . يقال ابل مهيرية .

٢٧٩٧١ - مَهْمَشَرَة Trayeuse mécanique (F). Milking machine (E). هي الهامرة ، جهاز آلي يستخرج الحليب من الضرع .

٢٧٩٧٢ - مَهْنَلَص Arracheuse (F). Drawer, Spud (E).

٢٧٩٧٣ - مَهْمَلَمَل * Todirampus (S). Todirampe. جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة المد . موطنه البلاد الاسيوية . يألف مجاري الماء والشلوط والغابات . اجسام هذه الطيور متوسطة القذ تغزل نحو ٢٧ سم . انواها متراكبة الالوان فيها اليبيض والاخضر والازرق والجودي والاسمر والاسود || قوتها الاسماك الصغيرة والحشرات . انها تبويض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . (راجع مازوريات) .

٢٧٩٧٤ - مَهْمَز داuphinelle des jardins (F). نبات تزييني يعرف بمائق الحدائق ، اطلبه .

٢٧٩٧٥ - مَهْمَزِيَّات Dicanraceae (S). Dicanracées (F). Dicanraceae (E).

سبط من فصيلة الطحلبيات ، اجناسه وانواعه نحو ١٠٠ منها النباتات القليلة . جلورها نحيلة قليلة العدد والامتداد . سوطها مستنقة . اوراقها غيظية كثيفة تكسو كامل الساق .

٢٧٩٩٩ - مَوَادٌ زَيْتِيَّةٌ
Matières huileuses (F).
Oily material (E). توجد في المادّن كالنُفُط مثلاً .

٢٨٠٠٠ - مَوَادٌ شَحْنِيَّةٌ
Matières grasses (F).
Greasy material (E). توجد في الحيوان .

٢٨٠٠١ - مَوَادٌ عَازِلَةٌ
Matières enrobantes (F).
Wrapping material (E).

٢٨٠٠٢ - مَوَادٌ عَضْوِيَّةٌ
Matières organiques (F).
Organic material (E). هي المواد البسيطة الممتزجة التي ترتكّب منها نسج الحيوان والنبات .

٢٨٠٠٣ - مَوَادٌ غِذَايَةٌ
Matières alimentaires (F).
Alimentary material (E). هي جميع المواد الصالحة لغذاء الحيوان . وقد وضعنا في ذلك جدولاً أخذناه عن «كلتر» نذكر فيه تركيب الاعلاف الوسيطى ويحاوّلها من المواد الخام والمنهضسة مع قبها الغذائية بالنسبة الى النشا . اطبل علف .

٢٨٠٠٤ - مَوَادٌ مَصَّاةٌ
Substances hygroscopiques (F).
Hygroscopic substances (E). هي المواد التي تمتص الرطوبة كالنترات الذي يمتص رطوبة الهواء والدبال الذي يمتص رطوبة التربة .

٢٨٠٠٥ - مَوَادٌ مُدْخَرَةٌ ، مَوَادٌ إِحْصِيَاطِيَّةٌ
Matières de réserve (F).
Reservation material (E). مواد غذائية يُخزّنُها النبات كاللادخان في البياطات الزرئية ، والسكر في الشوندر والمصان ، والنشا في البطاطا .

٢٨٠٠٦ - مَوَادٌ مَعْدِنِيَّةٌ
Matières minérales (F).
Mineral material (E). هي الاجسام غير المتعضية كالآزوت والاكسجين والفوسفور والكلس والحديد والبوتاس والصوديوم الخ .

٢٨٠٠٧ - مَوَادٌ مُغْدِيَّةٌ
Matières nutritives (F).
Nutritive material (E). هي جميع المواد الصالحة لتغذية النبات .

٢٨٠٠٨ - مَوَادٌ تَشْوِيَّةٌ
Matières amylacées (F).
Amylaceous material (E). اصول مركبة ، اساسها النشا ، توجد في اعضاء بعض النباتات .

٢٨٠٠٩ - مَوَادٌ هَيْدُرُوكَرْبُونِيَّةٌ ، هَيْدُرَاتُ الْكَرْبُونِ
Matières hydrocarbonées.
Substances hydrocarbonées, Hydrates de carbone (F).
Hydrocarbons material (E). مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين منها المخلصات اللاآزوتية كالنشا والسكر والصمغ ... ومنها المواد الدهنية ومنها الخليوص اي السليلوز .

٢٨٠١٠ - مَوَازٍ
Tropomètre (F).
Tropometer (E).

الموار ميقت شديد الالتقان والدقة يستعمل في تحديد دائرة الطول في البحر .

٢٨٠١١ - مَوَازٍ ، مُتَوَازٍ
Parallèle (F).
Parallél (E).

٢٧٩٨٤ - مَهْوٌ ، تَارْهِنْدِي ، تَارْمَشَكْ
Mesua (S). Méua, Bois de fer (F).
Iron wood, Indian rose chestnut (E). Eisenbaum, Kastanien Rose (D).
Albero della fero (I).

الواحدة مهوة . جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الكلوزيات ، مهدا الهند . اوراقها كاملة متقابلة معنقة مستطيلة النصل . ازهارها نورية التجميع او فردية ، ابطية الارتكاز او تاجية وفي ذكية العرف للمستحب . ثمارها جراء تعلق بزر ، كبيرة القد ، تشبه الكستناء طيبة الرائحة ، مأكولة اللباب . اغشائها شديدة الصلابة مرغوب فيها .

٢٧٩٨٥ - مَهْوِيٌّ
Périgée (F).
Perigee (E). اقرب محل لسيارة من الارض .

٢٧٩٨٦ - مَهْيَاتٌ
Multiforme (F).
Multiform (E). كثير الهياث والاشكال .

٢٧٩٨٧ - مَهْيَةٌ ، كَنْدِرِيُوم
Chondriome (F).

٢٧٩٨٨ - مَهْيِدٌ ، مَهْيَدَةٌ
Plonnière (F).
Pioneer (E).

هو النبات الطوعي الذي يكتسح التربة الحديثة الاستصلاح وهو ايضا كل نبات بزر او غرس لهيئة الظروف المناسبة لنبات لاسق .

٢٧٩٨٩ - مَهْيَصٌ
هو مسلح الطير . ج مهايص .

٢٧٩٩٠ - مَهْيَلٌ
هو الفحل الذي اذا غرب لم يلقح .

٢٧٩٩١ - مَهْيُمٌ
Assouffé (F).
Thirsting (E). تمت تعريفي بوصفه به من كان شديد العطش .

٢٧٩٩٢ - مَوْ
Aneth sauvage (F).

هو الثيث البري ، اطليه .

٢٧٩٩٣ - مَوْاءٌ
Mialement (F).
Mewing (E). صوت المهر .

٢٧٩٩٤ - مَوَادٌ اَحْيَاءٌ ، مَوَادٌ اَلْبُيُومِيْنِيَّةُ
Albuminoïdes, Substances protéiques (F).
Albuminoid, Proteinic substances (E). مواد تركيبها ونوعاها كتركيب ونوعاها بياض البيضة .

٢٧٩٩٥ - مَوَادٌ اِسْتِخْرَاجِيَّةٌ ، مَوَادٌ اِسْتِخْلَاصِيَّةٌ
Matières extractives (F).
Extractive material (E).

هي ما يمكن ان يبقى من مواد بعد تبخير سائلها .

٢٧٩٩٦ - مَوَادٌ ثَلَاثِيَّةٌ
Substances ternaires (F).
Ternary substances (E).

مواد غذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الاكسجين والهيدروجين والكربون .

٢٧٩٩٧ - مَوَادٌ دُهْنِيَّةٌ
Matières sébacées (F).
Sebaceous material (E).

٢٧٩٩٨ - مَوَادٌ رُبَاعِيَّةٌ
Matières quaternaires (F).
Quaternary material (E).

مواد عضوية مركبة من اربعة عناصر وهي الكربون والهيدروجين والاكسجين والازوت كالاتح مثلاً .

28020 - موافقة * Congruité (F). Congruity (E).

28021 - موافقة * Approbation, Entérinement (F). Approbation, Ratification (E).

28022 - مَوَاق * Grallaria (S).

Grallaire (F). Grallaria (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الجبليثيات.
انواع المعروفة نحو ٣٠ حينها من طيور امريكا الجنوبية. تألف الرياض والغابات الرطبة. ملجئها الحيائي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. قوتها الحشرات وخصها النمل السيار الذي تكثر قوافله الجمرارة في معظم تلك الاصقاع || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٨ سم. اثنائها مختلفة الالوان تكثر فيها الشققة والشبهة. تحورها وصودرها وبطنوها صفراء اللون او غبراء تعلوها ريشة سمراد او بيضاء وتسنج حنطي. رؤوسها ومناقيرها واجنحتها معتدلة الاحجام. اذناها قصيرة مخروطية الشكل. قوائمها رقيقة تحمكها من العدو بسرعة || تدثن اعشاشها في الادغال على ارتفاع قليل لا يتجاوز ثلاثة امتار. الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول.

28023 - مَوَاقير Métayer (F). Farmer (E).

28024 - مَوَاقرة Métayer, Colonge (F).
هي المزارعة، راجعها.

28025 - مَوَالِسة Connivence (F).
Connivence (E).
شيء من التواطؤ او الاشتراك في عمل ما.

28026 - مَوَالِيْدِي Naturaliste (F).
الماليم يعلم المواليدي.

28027 - مَوَاتَن، وَبَاءَ حَوَاتِي Epizootie (F).
Murrain, Epizooty (E).
هو كل مرض بعد سريع الانتشار الشامل.

28028 - مَوَكْرَة Raidisseur (F). Wire-strainer (E).
اداة تستعمل لتفتير الاسلاك.

28029 - مَوَكْمَر Congrès (F). Congress (E).

28030 - مَوَيْل * Mutilla (S).

Mutille (F). Mutilla (E).
جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المنحسرة وفصيلة المويليات. انواعها المعروفة كثيرة العدد، نحو ١٦٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف اليرير والمناطق الجرداء. تتطفل في طورها اليرير على جمع انواع غشائيات الاجنحة الخشاعة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد. اثنائها مقلبة. الوانها زاهية، سقاءها الخوا || ذكورها مجنحة. اناثها عادمة الاجنح، مستطيلة الحيات الذرية.

28031 - مَوَيْلَات * Mutillidae (S).

Mutillidés (F). Mutillidae (E).
فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المنحسرة ورتبة الحمويات. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد، منتشرة في معظم اقطار العالم || جمع اجناسها مقلبية في

Musophaga (S). 28012 - مَوَاز * Musophage (F). Musophage (E).

جنس طير من فصيلة المازيات. اعطاهن نعت من توش والغرب الى اطراف اعصها افريقية الشمالية || انواعها المنزوعة قليلة العدد تتميز باستطالة الجسم ويكثر الذنب الاطليجي الشكل. مناقيرها مخروطية، قوية، مسننة الطفاف، صفراء اللون. جباهها ملحوق بصحيفة قرنية المادة، صفراء، تبدو كأنها امتداد المنقاد نحو الرأس || طيراتها خفيفة الحركة وسريع. تدثن في تجاويف الاشجار القديمة العهد. اعرف انواعها واشهرها المواز البنفسجي.

28013 - مَوَازِ بَنَفْسَجِي * Musophaga violacea (S). Musophage violet (F).

نوع من المواز. اعطاهن نعت من توش والغرب الى اطراف غنية الجنوبية. يألف الحراج ويقرب من المزارع والبساتين اعصها بساتين الموز || جسمه يطول نحو ٥٥ سم. قوته الى السواد البنفسجي تعلو ماجة ارجوانية || قوته الثار على اختلاف انواعها وخصها الموز الذي يفضل على كل شيء. || الاثني تحضن بمناوبة الذكر من ٥ الى ٦ بيضات الترخيم يستمر نحو ١٥ يوما.

28014 - مَوَازَة Parallélisme (F). Parallelism (E).

هي توازي الخطوط او السطوح.

28015 - مَوَازَة Balance (F).

28016 - مَوَازَة حِسَاب Balance d'un compte (F). Balance of an account (E).

28017 - مَوَازِيَات * Musophagidae (S).

Musophagidés (F). Musophagidae (E).
فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، جميعها افريقية المهد || تتميز باستطالة الجسم، بقصر العنق، باعتدال الاجنحة وباستطالة الذنب. مناقيرها مخروطية الشكل، مستعرضة الاشدق. اثنائها جميلة الالوان المتراكبة القاعة || ملجئها الحيائي جماعي. سرها لا يقل عن ٥٠ زوساً. تألف مجاري الماء والمواقع الرطبة. قوتها جميع المواد النباتية من البراعم والتواقي الى الثمار والحبوب || اعرف اجناسها المواز والطورق.

28018 - مَوَاسِطَة * Gymnapistis (S).

Gymnapiste (F). Gymnapistis (E).
بعض صيادي سمك طرابلس يسمى بلشفيك وأبو شوكة. جنس اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف وفصيلة الجلاخيات || انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها صغيرة الحجم، شائكة الزعانف الظهيرية السامة المؤذية || اثنائها تختلف مع الانواع منها الاسمر والاحمر والوردي والاحمر العنابي الكؤود بالاسود || لحومها كاتمة الصفت قل من يرغب فيها.

28019 - مَوَاصِلَة * Consanguinité (F).

Consanguinity (E).
الموصول من الدواب الذي لم يتر على امه غير ابيه. والمواصلة هي اشتراك اواصر القرابة اي الصلة الدموية بين الاولاد والاباء او الاجداد. الغاية منها استمرار تحسين النسل.



مَوَاز



مَوَاسِطَة



مَوَاق



مَوَيْل

مزقية. اوراقها مفصصة، نصلها رهل النسيج، خلي البشرة، مسن الحافة. ازهارها حمر الون متدلية مستطيلة. ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٨٠٤٧ - مؤنثديّة مؤنثة

Maurandia semperflorens (S). *Maurandie toujours fleurie* (F).

جنية تريينية عارشة تطلو نحو ثلاثة امتار. غروبها واصرارها عديدة. اوراقها قليلة مزوانية، نصلها مالى البشرة متمتع الصفحة. ازهارها كبيرة القذ قطرها راوح من ٣ الى ٥ سم. لونها تختلف باختلاف غروبها، اشبعها الابيض والمرقظ والبفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٨٠٤٨ - مؤنثديّة مكسيكية، مؤنثديّة كبيرة الزهر

Maurandia grandiflora (S). *Maurandie du Mexique* (F).

جنية تريينية عارشة تطلو من ٣ الى ٤ امتار. جذورها وساقها ليفية. اوراقها شبه قليلة. نصلها مالى الصفحة. ازهارها كبيرة القذ قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الازرقوانى يعلو موج بنفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٨٠٤٩ - مؤنثديّة موريتية

Mauritia (S). *Mauricie, Mauritie, Palmier bâche* (F). *Mauritia, Moriche palm, Carana palm* (E). *Mauritia-Palme, Moritz-Palme* (D). *Palma mirici, Palma ita* (I).

جنس اشجار نخيلة، اعطائها المناطق الاستوائية الامريكية. انواعها ثمانية، جذورها منتصبه مستقيمة تملو من سبعة الى ثمانية امتار. يستخرج من بعض انواعها لوبوب نشوية غذائية ومن البعض الآخر عصارة سكرية قابلة التخثير تستعمل في صناعة الخمر والكحول.

٢٨٠٥٠ - مؤنثديّة موريكانديّة

Moricandie (F).

نبات يدعى الخمر، اطليه.

٢٨٠٥١ - مؤنثديّة مورين

Mylobatis (S). *Mylobate, Mourine, Aigle de mer* (F).

جنس اسماء مذنية بحرية من فصيلة الشفنيات. انواعها المعروفة ٧ جميعها كبيرة القذ مبططة مستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحها. اذناها مستطيلة كالسياط تحمها عند قواعدها مناس مستنة حادة. قوتها الاسماك. تألف المياه الاقليمية الصيقة الغور || اشهر انواعها واعرفها ما يلي.

٢٨٠٥٣ - مؤنثديّة جودرية، عقاب البحر

Mylobatis bovina (S). *Mylobate vachette, Mourine vachette* (F).

نوع من المورينه متوسطة القذ والتبطيط، ثوبها اغبر اللون اشهل الموج. اعطائها البحر المتوسط والاسود والاحمر. وهي اقل سطوة من الجفاعة.

Prostate

جسم غدي التركيب يغلف عند الذكور ثيج المثانة وجزء من الحالب.

٢٨٠٣٣ - مؤنثديّة

Tissu lâche (F). *Loose tissue* (E).

٢٨٠٣٤ - مؤنثديّة

Bailleur (F). *Lessor* (E).

٢٨٠٣٥ - مؤنثديّة

Différé (F). *Deferred* (E).

٢٨٠٣٦ - مؤنثديّة

نعت تمريني يطلق، في علم النبات، على الطحالب المجزأة باجنيات اي اجرية لحفظ البويضات.

٢٨٠٣٧ - مؤنثديّة

Cuniculé (F). *Cuniculate* (E).

الموجور ما حوى حفرة مستطيلة بعيدة الغور.

٢٨٠٣٨ - مؤنثديّة الجوف

Post-abdomen (F). *Postabdomen* (E).

مؤخر الجوف عند الحشرات هو الخس حلقات الاخرة من بطن الحشرة اي جوفها || وهو زوولوجيا ذنب القشريات ومؤخر جسم التريلوبيت.

٢٨٠٣٩ - مؤنثديّة

طويلة صغيرة قصيرة العنق نحو القبرة (السان).

٢٨٠٤٠ - مؤنثديّة

Mora (F).

سمكة بحرية تدعى جنة المتوسط، اطليها.

٢٨٠٤١ - مؤنثديّة

De cujis

هو الذي مات عن مال يورث من بعده.

٢٨٠٤٢ - مؤنثديّة

Roseraie (F). *Rosery, Rose garden* (E).

حديقة الورد وزراعتها الاستارية.

٢٨٠٤٣ - مؤنثديّة

Frondifère (F). *Frondiferos* (E).

المورق ماكان يحمل ورقاً.

٢٨٠٤٤ - مؤنثديّة

Lapinière (F). *Hutch* (E).

هي الهزة، اطليها.

٢٨٠٤٥ - مؤنثديّة

Maurandia (S). *Maurandie* (F).

جنس نباتات عارشة معدرة من فصيلة الخنازريات. انواعها المعروفة ١٢. سوقها متسلقة. اوراقها قليلة النصل. ازهارها كبيرة القذ محورية الارتكاز. توحيها انبوني الشكل، خاسي الفصوص اللامشوية || اشهر انواعها ما يلي.

٢٨٠٤٦ - مؤنثديّة حمرّة

Maurandia erubescens (S). *Maurandie rougeâtre* (F).

جنية تريينية عارشة تطلو نحو ٤ امتار. ساقها وروبها



مورانية



موريسية

كباشته مجنحة متدلية. ثمارها صغيرة ناشقة لا تؤكل، يزورها كروية كاملة صالحة للتكاثر || وهو يزرع من أجل لباب ساقه الذي يستعمل استعمال الدقيق. زراعته تدوم ٤ سنوات تنتهي بكسح الساق واستخراج لبابها وقد يجري ذلك قبل تبشير الانزهار بنحو ٥ أسابيع.

٢٨٠٥٩ - موز السعد Musa religiosa (S).

Bananier fétiche (F). نوع من الموز البري الافريقي، مهدد المناطق الانشائية. ارضيته معقة. ساقه تنمو نحو ١٠ أمتار. اوراقها كبيرة القند متدلية الاطراف. نصلها جامد الصفحة المائلة، مجري الخضار. كباشته كبيرة القند، نارية القنابات، ارجوانية الطرطب. ثماره دقيقة، مستطيلة، ناشقة لا تؤكل.

٢٨٠٦٠ - موز الصين Musa sinensis (S).

Bananier de Chine (F). ويدعى موز الهند، ثماره مأكولة. ضرابه الزراعية المشهورة خمسة. ارضيته معقة. ساقه تنمو من ٤ الى ٨ أمتار. اوراقها اهليلية الشكل، متوسطة القند، منفردة الانتساب. نصلها فارش الصفحة المنبسطة العادة الانتلاء، لونه الى الخضار الباهت. كباشته متدلية عديدة الاشطاء. ثماره ضخمة قصيرة مأكولة متوسطة الصنف.

٢٨٠٦١ - موز اليابان Musa japonica, M. Basjoo (S). Bananier japonais (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار. مهدد اليابان وقد انتشرت زراعته في معظم المناطق الحارة نظرا لقلة متطلباته المناخية وضالة ما يلزمه من سرعات حرارية يستهلكها تنمو ويفتضيها اذراك ثماره || ارضيته معقة. ساقه خمر اللون تنمو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها تعطل من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ٨٠، نصلها جامد الصفحة الناعمة، عابق الخضار. كباشته منتفخة متدلية عديدة الاشطاء. قناباته ارجوانية. طرطبه غروطي الشكل بنفسي اللون. ثماره مأكولة مستحبة الطعم متدلة الغلاظة والعلول.

٢٨٠٦٢ - موز لينهي Bananier textile, B. d'Amboine

هو الايق، اطلبه.

٢٨٠٦٣ - موز مبدولة * موز الرشد

Musa sapientum (S). Bananier commun, B. des sages (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار. ضرابه المعروفة زهاء ٨٠٠ منتشرة في جميع الاسواق الحارة. ارضيته معقة. ساقه تنمو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها كبيرة القند نصلها جامد الصفحة الزاهية الخضار. كباشته مستطيلة متدلية كثيرة الاشطاء التي يراوح عددها من ٩ الى ٢٥، ثماره مستطيلة، مفصلة، سكرية الطعم، مستحبة المذاق والبرفر.

٢٨٠٦٤ - موزة Banane, Figue-banane (F).

Banana (E).

ثمرة الموز المأكولة وهي تحوي العناصر التالية:

| | |
|--------------|--------------------------|
| نحو ٧٢,٢٤٠ ٪ | من الماء |
| ١,٤٤ ٪ | من المواد الاوتوية |
| ٠,٠٩ ٪ | من المواد البهنية |
| ٢٣,٩٣ ٪ | من المواد الهيدروكربونية |



مورينه مبدولة



موز الجنة



موز مبدولة

٢٨٠٥٤ - مورينه مبدولة * عقاب البحر

الجفاسخة Myliobatis aquila (S).

Myliobate commune, Mourine commune, Mourine glorieuse (F).

نوع من المورينه كبيرة الجفة تهاجم الى البني الاسود المراج. اعطائها جميع مجار البلاد الحارة والمعتدلة. وهي شرسة بطاشة شديدة السلطة.

٢٨٠٥٥ - مورينيات Myliobatidae (S).

Myliobatidés (F). Myliobatidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السنفقيات ورثة الاشلاق اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها مجار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة. قربها الاسماك والمجار || اجناسها مفصلة، مبطقة، ملتصقة الزعانف الصدرية الكبيرة المستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحها. رؤوسها مخروطية شارفة. اشدانها متوسطة الانفراج اسنانها مسطحة، سباعية الصفوف. عيونها جانبية الارتكاز. اذنانها مستطيلة كالسياط محيطها، عند قواعدها مناحس كبيرة مسنة حادة || اشهر اجناسها واعرفها المورينه.

٢٨٠٥٦ - موز Musa (S). Bananier (F).

Banana-tree (E). Echte Banane (D). Banano (I).

جنس نباتات عشبية ليفة من فصيلة الموزيات. انواعها عديدة، اعطائها البلاد الحارة والاستوائية. جميعها عادمة البرق الخشبية. ارضياتها معمرة معقة. جذورها ليفة افقية الانبساط. سوقها مجموعة من الاغصان الليلية المنفردة المتراكبة القرمزية الانتساب. تنتهي بنصال فارشة اهليلية الشكل جامدة الصفحة المائلة اهليلة الخضار. انزهارها سنبل التجميع، هامي الارتكاز، كبير القند. ثمارها لبية، مستطيلة، كثيرة العدد، تؤلف كباشة مركبة من عدة اشطاء متعاقبة || والموزة اي ساق الموزة ثمر مرة واحدة وموت، أما الارومة التي تحفظ النسل فهي معمرة وتتكاثر بالفصل على عمر الاعوام || والموز يجود في جميع الارضية المتوسطة الاندماج الغنية بالمواد البدائية والناصر الغذائية وهو من النباتات المروية التي تلتزم الاسماء المنتظم || أما انواعها المشهورة فهي ما يتبع.

٢٨٠٥٧ - موز الجنة * Musa paradisiaca (S).

Bananier du Paradis, Figulier d'Adam, Bananier légume (F).

نوع من الموز الزراعي. ضرابه المشهورة نحو ٥٠، اعطائها البلاد الاستوائية. ارضياتها معقة. سوقها اسطوانية الشكل خضراء اللون تنمو من ٣ الى ٥ أمتار. اوراقها كبيرة القند جامدة الصفحة. كباشتها متدلية عديدة الاشطاء. ثمارها مستطيلة، غليظة، معجبة الاطراف. لبابها غزير المادة النشوية الغذائية يصنع منه بعد التجفيف والسحق دقيق شائع الاستعمال يدعى دقيق الموز.

٢٨٠٥٨ - موز الحبشة Musa ensete (S).

Bananier d'Abyssinie (F).

نوع من الموز، يتكاثر بالذر، مهدد الحبشة. ارضيته لا تنق، ساقه تنمو من ٣ الى ٧ أمتار وهي ضخمة الجذع على حدود زانها الاول. اوراقها اهليلية الشكل تنمو من ٤ الى ٦ أمتار وتعرض من ٨٠ الى ١٢٠ سم. نصلها جامدة جامدة جميلة الخضار، ضلوعها غليظة جؤوية اللون. انزهاره سنبل التجميع. انزاعه بنفسجية كبيرة القند،

Canthus ٢٨٠٨٠ - **مُوق**

هو ملتقى الجفنين وما اثنان: الموق الاكبر والمسق الاصغر. فالأكبر ما كان من جهة الانف والاصغر من جهة الأذن.

Réchaud (F). Chafing-dish (E). ٢٨٠٨١ - **مُوقِد**

Apogée (F). Apogee (E). ٢٨٠٨٢ - **مُوقِل**

البعد الأقصى لنجم عن الارض.

Mandant (F). Employer (E). ٢٨٠٨٣ - **مُوسِكِل**

هو الذي يصدر منه التوكيل الى شخص يدعى وكيلًا.

Eleveuse (F). Raiser (E). ٢٨٠٨٤ - **مُوسِكِن ***

دفينة اصطناعية تستعمل لحسن القوب.

Mull ٢٨٠٨٥ - **مُوَل**

ساف من الطبقة الدنياية يرتكز على التربة المعدنية، يتميز بحبيباته الرملية وبكثرة ديدانه وحشرات وبحافضته النسيجية وبوفرة المواد الغذائية.

Financier (F). To finance (E). ٢٨٠٨٦ - **مُوَلّ**

Araignée (F). Spider (E). ٢٨٠٨٧ - **مُوَلَّة**

المول اسم للمكبوت. الواحدة مولة.

Zeus (S). ٢٨٠٨٨ - **مُوَلِّك**

Zée, Dorée, Poisson de St Pierre (F). سكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شائكات الزعانف وفصيلة المولكيات. اعطائها البحر الابيض المتوسط ويعمل مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه بيضي الشوزن يغسل من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسها مستطيل الجرم، كبير الفخذ الرب. عيناها ماحتان. زعنفتها الظهرية كبيرة مستطيلة، منخسبة القسم الامامي، سرعة الخلفي. ويدعولها في القسم الامامي نحو ١٢ حكة مستطيلة دقيقة غسروية التركيب. زعنفتها الخرجية ثلاثية المناخن الحادة. الذيلية شبه مربعة مقطوعة. ثوبها الى الصفار المذهب. يدعولها في اعلى خوشها: نقطة سوداء مستديرة || لحنها مأكول متوسط الصنف.

Zeidae (S). ٢٨٠٨٩ - **مُوَلِّكِيَّات**

Zeidae (F). Zeidae (E). فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطائها بحار العالم || اجسامها متباينة القد، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة. جميعها بيضبة الشوزن او اهليلجية. رؤوسها مستفخمة. زعانفها الظهرية كبيرة مزينة || لحونها مأكولة لكنها من الاصناف المبتذلة.

Molannidae (S). ٢٨٠٩٠ - **مُوَلِّسِيَّات**

Molannidae (F). Molannidae (E). فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد، مراء اللون. بسطة اجنحتها تراوح من ١٨ الى ٢٨ م. اجنحتها مستطيلة الشكل، ضيقة. الامامية منها كثيفة الخمل، الخلفية شفاة || تألف البعيريات والمنساق والغدران. اساريها تعيش في المياه الراكدة ضمن جلايب رملية

١,٢٢ ٪ من السليلوز

٠,٩٢ ٪ رماد

Mouzambi (F). ٢٨٠٩٥ - **مُوزَمْبِي**

هو التليكة من النباتات البقيلة، اطلبها.

Equilibré (F). Balanced (E). ٢٨٠٩٦ - **مُوزُون**

نمت تعريفي يطلق على كل تبغ متدل العلم لا يتورده نقص.

Musaceae (S). ٢٨٠٩٧ - **مُوزِيَّات**

Musacées (F). Musaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. انواعها عديدة تجمعها ثلاثة اجناس: الموز والهيل والوشيج. اعطائها السيلاد الاستوائية والحرارة. نباتاتها عشبية عادمة الجلولع الحشوية. سوقها اعماق ليفية، متراكبة، قرصية الانتشاب، ترتكز على ارومة.

Muscardine (F). ٢٨٠٩٨ - **مُوسِكِرْدِين**

مرض يصيب دود القز يدعى الشلل الوردى، اطلبه.

Thérophyte (F). ٢٨٠٩٩ - **مُوسِيَّي**

Therophyte (E).

كل نبات يزري المنشأ دورته الحياتية تطول موسمًا واحدًا لا يتعدى الخول.

Prisme (F). Prism (E). ٢٨٠٩٠ - **مُوسُور**

جسم متوازي الحروف الجانبية المتساوية العمودية على كل من قاعدتيه || والمشور قد يكون قائمًا ومزودجًا وثلاثيًا ورباعيًا وخماسيًا الخ... || يستخدم المشور الزجاجي الثلاثي الصلوح في علم الضوء وهو يتكون من وسط شفاف محصور بين سطحين مائلين تحدهما زاوية تدعى زاوية الانكسار.

Prismatique (F). ٢٨٠٩١ - **مُوسُورِي**

Prismatic (E).

نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالمشور.

Paille (F). Straw (E). ٢٨٠٩٢ - **مُوس، قش**

Commissure ٢٨٠٩٣ - **مُوسِل**

موضع اتصال بعض اجزاء الجسم.

Efférent (F). Efferent (E). ٢٨٠٩٤ - **مُوسِل**

Inducteur (F). ٢٨٠٩٥ - **مُوسِل كَهْرَبَائِي**

Inductor, Field-magnet (E).

Légitaire (F). Legatee (E). ٢٨٠٩٦ - **مُوسِي له**

هو الذي يستحق له المصير به.

Hétérozygote (F). ٢٨٠٩٧ - **مُوسُوت**

Heterozygote (E).

هو الاشب، راجعه.

Mahogon (F). ٢٨٠٩٨ - **مُوسُوت**

هو الفتة، راجعها.

Fourmis allées (F). ٢٨٠٩٩ - **مُوق**

Winged ants (E).

هو النمل المجنح.



مُوسِن

شبه مخروطية الشكل يطولها مجرى رقيق قلبي الشكل ، من التركيب ذاته يعينها على الانتقال . اشهر اجناسها :

Molanna (S).

المولنة

٢٨٠٩١ - **مُوَلَّيات** ٥ Laemobothronidae (S).

Laemobothronidae (E). Laemobothronidae (F). فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلديات وطبقة التعلبات . انواعها عديدة يجمعها جنس واحد . جميعها صغيرة القذ مفلطة الجسم المستطيل ، طولهاراوح من ١٠ الى ١٠٠ م . اناؤها الى الكهبة الغبراء يطولها تخطيط اسمر . وفي تميش على الطيور الكراسر فتضيقها . واحدها مولة والجمع مول .

٢٨٠٩٢ - **مُوَلَّيت قرنائه** Molyte (F).

هي خنفساء الجزر ، راجعها .

٢٨٠٩٣ - **مُوَلَّيرة** ٥ Mulleria (S).

Mullerie (F). Mulleria (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مصفحات الشياشيم وفصيلة الينادات . انواعها المعاصرة المروفة قليلة العدد اعطائها ابنر ومنافع وغدران امريكة الاسرائيلية || احدائها لانظمة الاشكال والاحجام ، لامتناهية المصارع ، ملحوظة بادمة سيكة باعة الخفسار || تميش منمنعة في الاحمال ، لحوبها كاعنة الصنف .

٢٨٠٩٤ - **مُوَلَّيرة** ٥ Molinie (F).

هي الخوطاية الزرقاء ، اطلبها .

٢٨٠٩٥ - **مُوَم** Meum (F).

هو الشيت البري ، اطلبه .

٢٨٠٩٦ - **مُوَمَزَة** ٥ Bananera (F).

Banana-plantation (E).

هي بستان الموز .

٢٨٠٩٧ - **مُوَمَزَة ، اُسْتِين** Monarda (S).

Monarde (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D).

Monarda, Menta americana (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعها سبعة . سوقها فروع قصيرة . اوراقها كاملة مسننة متعاقبة . ازهارها غنية التجميع ، ابطية الارتفاع او طرفية . اوراقها وزاعارها غنية بمادة التبول || اشهر انواعها شاي بلسفانغ وتنعن الخيل والناسورية والمرقطة .

٢٨٠٩٨ - **مُوَمَزَة مَرْقطة** Monarda punctata (S).

Monarde punctuée (F).

نوع من الموزدة وهي بجلة تربيتية معمرة تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها فروع . اوراقها سنانية . نصلها خلى البشرة مسنن الحافة . ازهارها الى الصفرة المرقطة بالحمرة . ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٨٠٩٩ - **مُوَمَزَة نَاسُورِيَّة ، بَرَعَمَت** ٥

بَرَي ، نَعْتَع الفَرَس ، نَعْتَع الخَيْل

Monarda fistulosa (S). Monarde fistuleuse, Bergamote sauvage, Menche de cheval (F). Wild Bergamot, Horse Mint (E). Pferdeminze (D). Monarda

pelosa, Menta rossa (I).

نوع من الموزدة وهي بجلة تربيتية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها مسنن فروع . اوراقها بيضيه ذرية . نصلها خلى الصفرة مسنن الحافة . لون ازهارها يختلف

باعتلاف القروب . منها الابيض والبنى والاصفر والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من حزيران الى آب . اوراقها عطرية فواحة العرف تستعمل في صناعة العطور ويستخرج منها زين الازهار ، بالتقطير ، زيت طيار له رائحة الكافور وهو منه ، طارد للرياح ، مضاد للتشنج ، مفو للاعصاب خافض الحرارة . اوراقها الجافة تستعمل استمعال الشاي .

٢٨١٠٠ - **مُوَمَت** Acuminé (F). Acuminate (E).

نعت وصفي يطلق على الورقة او الشرة المدببة الطرف .

٢٨١٠١ - **مُوَمِيلِيَّة** ٥ Monilla (S).

جنس فطور مجهرية من التوسيات وفصيلة الوطحيات . جربها الكنديية واضحة الهيئة . كثالها لبنيوية الشكل ، سحبة التجميع || انواعها عديدة معظمها مقبلي يشكل الطور الكنديي في اللبن || اعرف انواعها وانتهورها الثلاثة التالية .

٢٨١٠٢ - **مُوَمِيلِيَّة بَيْضَاء** ٥ Monilla candida (S).

فطر من المونيلية يركب القش والاخشاب المنحلة والسائرة الى الاعلال والثمار السكرية المخمزة والمصير والهدام... . كثالها سحبة التجميع . قياس الكتيبة ٥×٧ م .

٢٨١٠٣ - **مُوَمِيلِيَّة ذَهَبِيَّة** ٥ Monilla aurea (S).

فطر من المونيلية يركب الخاء الجذوع والافصان اليابسة . يبدو كالمصادة . كثالها لبنيوية الشكل صفراء اللون مدببة الموج قياسها ١×٢٠ م .

٢٨١٠٤ - **مُوَمِيلِيَّة مَهْمَاء** ٥ Monilla fimicola (S).

نوع من المونيلية فطرها يركب عرم الفطائر فيمنطها ويومحها بمشجبه الامهق اللون ، اللبد التجميع ، الذي يقضي على الفطور المرئية الناشئة || يكافح بفضخ الغرمة المصابة بالمخاض الخلي عيار ٣٣٪ المركز ١ على ٧ اي جزء واحد من المخاض في سبعة اجزاء ماء .

٢٨١٠٥ - **مُوَمِيلوبيسيس** ٥ Monillopsis (S).

جنس فطور مجهرية من السنيات . مشجبه قدي الشكل ، لبد التجميع ، يسرح على الاعضاء النباتية عند سطح التربة . هيئة اسطوانتي الشكل ، دقيق الجول ، كثير الفروع ، متركب القوامس || انواعها قليلة المدد والاذى اعرفها سالي .

٢٨١٠٦ - **مُوَمِيلوبيسيس اُورْدُهُولدي** ٥

Monillopsis aderholdi (S).

فطر من المونيلوبيسيس يركب سوق واوراق الارطسية والدغلية والكرزيم ويخمر مرمم والسرارخ... . اغمرها في الازراق عادية لا تستوجب المكافحة . اما اذا تمكن من السوق فانه يقضي على اللحاء عند سطح التربة . لذلك تحسن المكافحة .

٢٨١٠٧ - **مُوَمِيلوبيسيس قَاصِي** ٥

Monillopsis fagi (S).

نوع من المونيلوبيسيس فطره يركب اوراق الزان فيؤذيها لانه يسبب يباس النسيج .

٢٨١٠٨ - **مُوَمِيلوبيسيس فوليكولا** ٥

Monillopsis follicola (S).

نوع من المونيلوبيسيس فطره يركب اوراق الاكينسيا . والبندق والاجاص فيشدها بمض الشئ دون ان يؤذيها .



موزدة ناسورية



مونيلية



مُونِيْمَة



مُونِيْمَة غُوْلِيَّة




مُوو



مَآبِر مُخْتَلِفَة



مَنْتَل



مَنْتَل

٢٨١١٩ - مُونِيْمَة *

Monimie (F).
جنس نباتات جنسية من فصيلة المونيميات . انواعها عديدة اعطائها البلاد الحارة اخصها الهند والجزر . اوراقها متعقبة متقابلة بيضية . فصلها جامد الصفحة اللامعة ، بارز الروق . ازهارها ثنائية المسكن . ثمارها كالتين شكلاً وقد يهي مأكولة سكرية الطعم لا تخلو من الحموضة . لحاء سوقها حارمة طيبة كانت ولا تزال تستعمل ضد الحمايات .

٢٨١١٠ - مُونِيْمَة غُوْلِيَّة *

Monima gothica (F). Monima gothica (E).
حشرة من السقليات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية المتاخمة . فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار العروة والمالة . جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م . يسلطها نحو ٣٦ م . رأسها حنطي اللون . عينها ناشرتان . زباناها خطيان . رشفها معتدل الجرم والظليل . جوشها وبعطها الى الحنطى الاسمر المواج || روشنها الاماميان الى الحنطى يملوه تقيس وتغريظ وتبضع وزرقة خضابها اسمر . ويملوه ايضا بقعة مرمية واخرى مستطيلة لونها الى الكستى القاتم . روشنها الحلفيان الى الحنطى الاصفر يملوه حنط حار تبني ينهي بالاهداب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آذار وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الوراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، واضح الحيد . ثوبها الى الخضار الاطمل المواج يملوه خط لثجي اسود وثلاثة خطوط جانبية حراء سمر . رأسها اسود . مدنها الى الطحلة الرصاصية . رواجبها الى السرة القائمة || طول الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً ينقص في التربة حيث تنتمن السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٨١١١ - مُونِيْمَة مُنْتِيْمَة *

Monimia stabilis (S). Monimia stabilis (E).
حشرة من السقليات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار العروة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . يسلطها نحو ٣٣ م . رأسها حنطي اللون . عينها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خطيان عند الانثى . جوشها وبعطها الى الحنطى الاشعث المواج || روشنها الاماميان الى الحنطى الاشعث تملوه دائرتان متساوتان وسط معرض وتغريظ حنط حار . جميعها الى الحنطى الشديد السرة . روشنها الحلفيان الى الركبة الغبراء تملوها ماجة فضية وخط اسمر يستيق الحنط الخارجى || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آذار وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الوراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى السرة الزرقية المواج يملوه خط لثجي جزوي وثلاثة خطوط جانبية منها خطان اسودان والخط الوسطي اصفر . رأسها اجر . مدنها الى الطحلة الغبراء . رواجبها الى السرة ||

طول الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقص في التربة حيث تنتمن السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٨١١٢ - مُونِيْمِيَّات *

Monimiaceae (S). Monimiaceae (F).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها اشجار وجنبات . اوراقها متقابلة بسيطة . ازهارها وحيدة الشق . اشهر اجناسها المونمية .

٢٨١١٣ - مُوو *

Moho (S). Moho (F). Moho (E).
جنس طير من الجوامث ريقات المناقير وفصيلة المغريات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الصندوش . ملجتها الحياني جماعي . جامعاتها قليلة العدد . قوتها رحيق الازهار والموط || ... اجسامها صغيرة مستطيلة المناقير القليلة التفوق . اذنانها رتاجية مستطيلة . اثوابها لثائية الالوان فيها الاسود والاصفر والابيض . بطنها دائماً صفراء اللون او بيضاء ويميلوا الى اياطها زغب دقيق ناعم . تدثن في الادغال . انثاها تضع ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوماً .

٢٨١١٤ - مَرَّوِب له

Donataire (F).
هو الذي يقبض الهية .

٢٨١١٥ - مَوَّلَة

Provision (F).
٢٨١١٦ - مِثْبَار * ، مِثْبَر ، مَثَل
Anthère (F). Anthère (E).
العصو الذكري في النبات وهو الجزء العلوي من السداة يرتكز على الحنط ، اليه تنتهي جذرات الطلع وفيه تنضج وبته لتتثر .

٢٨١١٧ - مِثْل *

Manomètre (F).
Manometer (E).
جهاز خاص يستعمل في قياس ضغط الغازات والبخرة .

٢٨١١٨ - مِثْقَب

Affluent (F).
Falling into, Running into (E).
الجدول الذي يصب في البحر . ج مآكب .

٢٨١١٩ - مِثْخَار ، لَقِيْس

Tardif (F). Tardy (E).
هو ما طال زمن نموه ان في الحيوان او في النبات .

٢٨١٢٠ - مِثْكَل *

٢٨١٢١ - مِثْقَاق
Acidimètre (F). Acidimeter (E).
مقياس الحموضة . يستعمل لمعرفة مقدار مسا في بعض السوائل كالحجر والحليب وما اشبه من حواض .

٢٨١٢٢ - مِثَّاح

Périscopie (F). Periscope (E).
٢٨١٢٣ - مِثَّاط
Afférent (F). Afferent (E).
ناقل السائل الى العضو او الى المركز .

٢٨١٢٤ - مِيعَا

Marée descendante (F).
Falling-tide (E).
هو ما يدعونه الجزر اي تباعد مياه البحر عن الشط ورجوعها الى ما كانت عليه قبل المياط .

٢٨١٢٥ - مِيعَا

Vasculose (F).
مادة النسيج الوعائية .



مير للذك



ميشة الرخس



ميشة مقننسة



ميشة نقية



ميشة وردية



ميج

٢٨١٣٣ - مَيْحَان ، مَيْحَان
Méthane (F). غاز مئلب عديم اللون .
Marsh gas (E).
٢٨١٣٤ - مَيْحُوكُولَرِي
Mitochondrie راجع كوندريوزوم .

٢٨١٣٥ - مَيْشَنَة
Mycena (S).
Mycène (F). Mycena (E).
جنس فطور من فصيلة الفاريقويات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطاه غابات مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز بنكهاتها الصغيرة وباطراسها الحادة الاطراف الملونة . بعض انواعها جيد الصنف مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه || اعرف انواعها واشهرها الاربعة التالية .

٢٨١٣٦ - مَيْشَنَة السَّرْحَسْ *

Mycena epipterygia (S). Mycène des fougères (F).
توجد في المواقع الرطبة بين السرخس . ساقها دقيقة ، رفيعة ، لزجة . نكهتها قمية الشكل . صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم . لونها الي الصفار البيوتي || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٧ - مَيْشَنَة مَقْنَنَسَة *

Mycena galericulata (S). Mycène à bonnet (F).
توجد في الغابات على الجذوع النخرة القريبة من التربة . ساقها دقيقة ، متدلة الارتفاع ، تبنية اللون . نكهتها قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الي الكهبة الصفراء . اطراسها وردية اللون || لحيتها مأكولة ، لذيدة الطعم ، مرغوب فيها .

٢٨١٣٨ - مَيْشَنَة نَقِيَّة *
Mycena pura (S).
Mycène pur (F).
توجد في المواقع الرطبة . تعيش على الببال . رائحتها رائحة الفجل . ساقها متدلة الارتفاع والانلافة . نكهتها صابجية الشكل ، صفراء اللون يعلوها موج ليكني عابق . اطراسها وردية اللون || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٩ - مَيْشَنَة وَرْدِيَّة *
Mycena rosalia (S).
Mycène rosé (F).
توجد في المواقع الرطبة بين الصنوبر . ساقها رفيعة ، دقيقة ، وردية اللون . اوصرتها صابجية الشكل ، صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم . لونها الي الوردى العايق || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٤٠ - مَيْح *
Dactylopterus volitans (S).
Dactyloptère, Grondin rouge (F). Flying-fish (E).
جنس اسماك بحرية طيارة زاهية الالوان من فصيلة الميجيات . وريثة شاكات الزعانف الاسعبية . انواعه قليلة العدد ، اشهرها ميج المتوسط الذي يبلغ طوله نحو ٥٥ سم . له زعنفتان يجتاحتان طول الواحدة نحو ٣٥ سم . تمكنه من الارتفاع والسير فوق الماء فطير نحو نصف دقيقة على ارتفاع متر .

٢٨١٤١ - مَيْح مَبْدُول ، مَيْح المَوَسَط

Dactylopterus volitans communis (S).
Dactyloptère pirapède, D. commun, D. de la Méditerranée (F). Swallow-fish, Kite-fish, Common Flying-fish (E).
نوع من الميج . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الميجيات

٢٨١٤٥ - مَيْحَاع
Fluidiste (F). Fluidiste (E).
الميعان من شايح النظرية الفائلة بان الغناطيس الحيواني يعود الي جاذبية خاصة .

٢٨١٤٦ - مَيْيَاكَة ، كَيْلَايَسِيَّة
Collectie (S).
Collectie, Mayaca (F). Mayaka (E).
مياكة هو الاسم الشلي . جنس نباتات برية معمرة ، طيبة من فصيلة البقييات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منهاها بعض مناطق امريكا الجنوبية اعصها الشلي والبيرو || جميع انواعها شجيرات وجنيات فروع . معظمها شائك الاقناد والاقنان . اوراقها متعاقبة ، منققة ، اهليلجية النصال الصغيرة . ازهارها فردية ، ابيلة الارتكاز ، عطرية العرف ، يكثر فيها اللون الابيض . ثمارها عناية الشكل والقد ، مأكولة لكنها تسهل المدة .

٢٨١٤٧ - مَيْيَا وَرَاكْدَة ، مَيْيَا آسَنَة

Eaux stagnantes (F). Stagnant water (E).
٢٨١٤٨ - مَيْيَاكَة
Hydrométrie (F).
Hydrometry (E).
علم كل ما هو يخص بالماء كالكثافة والضغط والسرعة الخ .

٢٨١٤٩ - مَيْبَنَة
Jus de coing (F).
Juice of the quince (E).
عصير السفرجل .

٢٨١٣٠ - مَيْبَر المَيْسَك *
Bledius littoralis (S).
Blédie armée, Blédie du littoral (F).
Bledius littoralis (E).

حشرة جاسة وانجة من فصيلة الدنليات وريثة غحديات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . تألف المواقع الرطبة واعصها البساتين . خنافسها ويرقاتها تعيش على المواد العضوية وكل ما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القد ، نحيل ، يطول من ٦ الى ٧ سم . فوهها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، جزوي الغمدين والجرازم . رأسه صغير الحجم قصير الخطم ينتهي بفكين ضليعين . ورأس الذكر مسلح بقنرين ذريين . زبانه مرفقيان عيتاه صغيرتان . ظهرانه اعدام التحزيز يلحف نحو خشي البطن || يدعى مير الميسك نسبة الي ما تقتره سكته البطنية الثامنة من مادة عطرية قريبة الشبه بعرف المسك || الذكر ابرز قدام من الانثى وأغ ثوباً منها واطول زبانا وادق بطناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار || البرقة بطنة النور لا تترك الكمال الجسدي قبل اواسط شباط . جسمها يطول من ١٢ الى ١٥ سم . وهو مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق الطرف اغبر اللون ، اسمر الرأس والشرج ، منقط الجانبين الايمن والايسر بتمول سود تتوسط السكر || طور الاكمال يستمر من اواسط شباط الى اواخر آذار .

٢٨١٤١ - مَيْبَنَة
Guenon (F). She-monkey (E).
المية القردة الغنية وتدعى قَيْشَة . اما التي بلغت الضبة فتدعى زَيْمَة .

٢٨١٤٢ - مَيْيَا فَيْزِيك ، مَا وَرَا لَيْيَة

Métaphysique (F). Metaphysics (E).
علم ما وراء المادة او الطبيعية من المعقولات .



مَيْجَة



مَيْجَل



مَيْجَة البَطَايَا



مَيْجَة الْغَارِيْقُون



مَيْجَة خَيْثِيَّة



مَيْدَاس



مَيْدَع

شائكات الزعانف الاصبعية || اعطائها بحار البلاد الحارة وبها المتوسط . يكثر وجودها في المياه التونسية واليبية ويقل في المياه اللبنانية || جسمها شبه وشعي الشكل بطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، غروطي الشكل . فكها الاعلى يتقدم الاسفل قليلا . عينها كبريتان ، متفترتان ، ناشترتان . رفيعتا الارتيكاز . ثوبها يراوح بين الاحمر والوردي الزاهي يملوه مواج اصفر وبمسجي || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام . الظهرية مستطيلة الشاكفة . الصدرية كبيرة جناحية الشكل يملوها عند قاعدتها شعاع ومثل الطوف || زعنفتها الصدرية متفترتان مجتاحتان تمككها من الارتفاع فوق سطح الماء والطيران نحو نصف دقيقة وأكثر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٨١٤٢ - مَيْجَة * (F). *Maja, Maia* (F). Spider crab (E). جنس منع من القشريات المعروفة ببنابك البحر . انواعه عديدة ، اعطائها بحار البلاد الحارة . يكثر وجودها بين الخث ومثل الصخور || اشهر انواعه المأكولة الميحية المجلولة التي يراوح طولها من ١٨ الى ٢٢ سم .

٢٨١٤٣ - مَيْجَل * (E). *Ameiva* (S). *Ameiva* (F). *Ameiva* (E). جنس حيوانات زحافة من الغطاء وفصيلة التدييات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها امريكة الوسطى والاكوادور . تألف البراري والغياي الرملية . قوتها الحشرات واسارها والديدان || اجسامها تطول من ٢٥ الى ٣٧ سم . اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها الرزمة السراء .

٢٨١٤٤ - مَيْجِيَّات (S). *Dactylopteridae* (S). *Dactylopteridés* (F). *Dactylopteridae* (E). فصيلة اسماك بحرية بيروضة من رتبة الغطيات شائكات الزعانف الاصبعية || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . مسطعها من اسماك المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر || اجسامها وشعي الشكل تطول من ١٥ الى ٧٠ سم . رؤوسها كبيرة . تحملها قصيرة . زعانفها الصدرية مستطيلة ، جناحية الشكل ، تمككها من الطيران فوق سطح الماء || اشهر انواعها واعرفها الميج المجلول .

٢٨١٤٥ - مَيْج : مَيْج : مئي البطة . ماحت تيج .

٢٨١٤٦ - مَيْجَاد * (E). *Isol* (F). *Isolate* (E). الشجرة او الاكّة المنفردة البائنة عن اغزلها . ج مواحيد .

٢٨١٤٧ - مَيْجَة * (S). *Hypomyces* (S). جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات . انواعها عديدة معظمها من الفطور التي تنطلق على غيرها من الزقيات والدعامات وبعضها يعيش على النباتات العليا . اصناسها وتكاثرها دقيقة ، نكاهها اروسية الشكل متراكبة . بوزها متتابع الخلايا وردي اللون || انواعها المؤذية ثلاثة وهي :

٢٨١٤٨ - مَيْجَة الْبَطَايَا * (S). *Hypomyces haematococcus, Nectria citri, Fusarium solani eumarti* (S). فطر مجهرية يصيب عدة نباتات اخضها البطاطا والحضيات والبن والكاكاو الخ ... || يركب جذور البطاطا ودرناتها . مظهره الخارجى يقع سمر لا قياسه تنشئ البشرة واللب فتسبب عنها دون ان تؤذي البون || ويركب سوق

الاشجار من الحضيات وغيرها فيسب قروحاً لونها الى السمرة تبدو كالحشيش المسجة ثم تنتشر فتسبب للماء والشكر والخشب وتقود الجذع الى الصرم || يكافح بالكريزول المحلول ١ ٪ . ان يعاد التطهير مرة ثانية بعد الاول ياربعة او خمسة ايام .

٢٨١٤٩ - مَيْجَة الْغَارِيْقُون * (S). *Hypomyces rosellus, Dactylopus dendroides* (S). فطر مجهرية يتطفل على الغاريقون فيؤذيه . مظهره الخارجى يقع خلية ، لونها الى البياض الاغبر ، قطرها يراوح من ١٠ الى ٣٠ سم . تملو المفطرة هنا وهناك ثم يركب الغاريقون وقد تصيب نكمتة فتسببها وتشوهها بعد ان تمطعها بمشج خاص ، نواسه كنفد القطن لونه الى الصبغة الزرقاء || يكافح باستعمال الليزول المحلول ٢ ٪ او الفورمول التجاري المحلول ايضا ٢ ٪ .

٢٨١٥٠ - مَيْجَة خَيْثِيَّة * (S). *Hypomyces perniciosus, Mycogone perniciosus, Verticillium, Cephalosporium* (S). *Môle du champignon de couche* (F). فطر مجهرية يتطفل على بعض انواع الفطور المأكولة واخصه الغاريقون المرئي || مظهره الخارجى يقع خلية لونها الى الرماد تملو سطح المفطرة ثم تمتد الى الفطور فتسببها وتشوهها || يكافح باستعمال الليزول المحلول من ٢ الى ٢٥ ٪ .

٢٨١٥١ - مَيْجَدِي * (F). *Unio* (F). نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تبيض موسماً واحداً متتابعاً لاستقطاً في دورتها الحياتية الحولية .

٢٨١٥٢ - مَيْدَاء * (F). *Style* (F). يقال بنوا يبيتهم على مياء واحد اي على طريقة واحدة .

٢٨١٥٣ - مَيْدَاس * (S). *Midas* (S). *Tamarin* جنس قرود امريكية من فصيلة القرود الدبية . انواعه ٢١ . موطنها كستارياكا وباناما وكوليبيا والبيرو والبرازيل والغويان || اجسامها صغيرة القد ، حيلة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم الوثير . رؤوسها مستندرة ، اذانها عادمة الور . اذانها مستطيلة حيلة . اثوابها سوية الالوان المتباينة المواج || تعيش بين الاغلال وفي المروج القرية من الغابات . قوتها الحشرات والغطاء والصفادع والمصافير وبعض الثار والحبوب .

٢٨١٥٤ - مَيْدَاس ، مَيْدَاس (F). *Hippodrome, Champ de courses* (F). *Hippodrome, Race-course, Race-ground* (E). مكان سباق الخيل .

٢٨١٥٥ - مَيْدَس * (F). *Fluviographe, Fluiometer* (F). *Fluviometer* (E). جهاز يستعمل في قياس مياه الانهار ونسبة انحدرها .

٢٨١٥٦ - مَيْدَع * (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتدلة . اجسامها اهلبيجية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شاكفة ، زعانفها الشرجية فارة . اثوابها فضية اللون يملوها تحيط مذهب قاطب .

٢٨١٥٧ - مَيْدَع * (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتدلة . اجسامها اهلبيجية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شاكفة ، زعانفها الشرجية فارة . اثوابها فضية اللون يملوها تحيط مذهب قاطب .

٢٨١٥٨ - مَيْدَع * (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتدلة . اجسامها اهلبيجية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شاكفة ، زعانفها الشرجية فارة . اثوابها فضية اللون يملوها تحيط مذهب قاطب .

٢٨١٥٩ - مَيْدَع * (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتدلة . اجسامها اهلبيجية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شاكفة ، زعانفها الشرجية فارة . اثوابها فضية اللون يملوها تحيط مذهب قاطب .

٢٨١٦٠ - مَيْدَع * (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتدلة . اجسامها اهلبيجية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شاكفة ، زعانفها الشرجية فارة . اثوابها فضية اللون يملوها تحيط مذهب قاطب .

٢٨١٦١ - مَيْدَع * (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتدلة . اجسامها اهلبيجية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شاكفة ، زعانفها الشرجية فارة . اثوابها فضية اللون يملوها تحيط مذهب قاطب .

٢٨١٦٢ - مَيْدَع * (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتدلة . اجسامها اهلبيجية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شاكفة ، زعانفها الشرجية فارة . اثوابها فضية اللون يملوها تحيط مذهب قاطب .



ميروس



ميريد



ميرة



ميرسين



ميرف



ميروس

٢٨١٦٣ - مِيرَة ، مِسْطَرَّةُ الْإِرْتِفَاعِ

Mire (F). Sight (E).
مسطرة مرقعة تستعمل لقرعة الارتفاعات في مسح الأرض .

٢٨١٦٤ - مِيرَا

Mira (F). Mira (E).
ميرا نجم ثير من كوكبة قيطس مشهور باسم أصجوبة ،
أطلقها .

٢٨١٦٥ - مِيرَاث

Héritage, Hoirie, Succession (F). Heritage, Inheritance, Succession (E).
هو التركة ، الميراث .

٢٨١٦٦ - مِيرَة ٥

Mira (S). Mira (F).
جنس حشرات ناعمة من فصيلة الشراقيات ورتبة ششائيات
الاجنحة المخفضة . أنواعها عديدة موطنها بعض مناطق
البلاد المعتدلة الحارة ، جميعها تتطفل على الحشرات الضارة
من الحشرات وذوات الجناحين || أجسامها صغيرة القد
تطول نحو ١ سم . رؤوسها نصف دائرية الشكل . قرونها
الاستشعارية مرفوعة ، صهييفة ، كبيرة . جواشئها مستطيلة .
بطونها قصيرة يرمعية الشكل . مرزاتها قصيرة . اجنتها
جلداع عند الشقين . أطولها تراوح من الوردي إلى الصنابي
الاصفر المالح .

٢٨١٦٧ - مِيرْسِين * ، قَتَم

Myrsine (S).
Myrsine (F). Myrsine (E). Trugmyrte (D). Mirsine (I).
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الميرسينيات . أنواعه
عديدة ، أعطائها البلاد الحارة المتحيرة نحو الاستوائية .
جميعها تشبه الآس ، بعضها زراعي ثماره نووية صغيرة
القد مأكولة .

٢٨١٦٨ - مِيرْسِينِيَّات ، قَتَمِيَّات ، جَنَاحِيَّات

Myrsinaceae (S). Myrsinacées (F). Myrsinaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وأنواعها نحو
٥٠٠ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية ، فيها الأشجار
والشجيرات والجنابات . أوراقها متعاقبة . أزهارها صغيرة
القد ، منها الخشوية ومنها وحيدة السكن . ثمارها نووية
مأكولة في بعض الأنواع .

٢٨١٦٩ - مِيرَق * ، مِيرَق

Myagre perfolié (F).
نبات عشبي بري حولي من فصيلة الميرسينيات . منبتة
البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الأوسط وأوربية . ساقه
فرعاء . أوراقها متعاقبة ، ريمية الفصل ، بحرية اللون .
أزهارها تاجي الارتكاز عنقودي التجميع . أزهارها صغيرة
القد صفراء اللون دقيقة المالحق . ينبت بين الزرع ،
كثرت مؤذية .

٢٨١٧٠ - مِيرُوس ٥

Myrus (S).
Myre (F). Myrus (E).
جنس اسماك بحرية من مفتوحات المائدة وفصيلة الشقييات . منبتة
أنواعه المعروفة اثنان ، واحد منها الميروس الميزل يعيش
في البحر الأبيض المتوسط والثاني من اسماك بحار الصين
واليابان || جسمه مستطيل الشكل كالانكليش ، طوله
يراوح من ٦٠ إلى ١٢٠ سم . جلده ابرط عادم المارشف .
أسره غروطي ، ذلق الخطم ، وأسع الذلق ، عيناها صغيرتان
ماصحتان . زعنفته الظهرية قاطبة ، ضيقة تقابلها الشرجية
التي تمتد من اواسط البطن إلى طرف الذيل . ثوبه إلى

٢٨١٧٠ - مِيدَاحٌ مُشْبَرٌ

Pentapus vittatus (S).
Pentapode rayé (F). Sea rough (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرغيات ورتبة شالكتات
الزعانف . أعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ومنها
البحر الأبيض المتوسط . تعتبر من اسماك الغنات المتوسطة
الغور || جسمها اهليجي الشكل ، يطول من ١٥ إلى
٢٥ سم . ثوبها إلى الزرقاء الفضية المالحق يبق عند الرأس
والظهر وبقيش وببيش عند البطن ويعلموها في جانبها ستة
خطوط ذهبية قاطبة . زعانفها زرقاء اللون ، الصدرية
والخوضية والشرجية والذيلية حر القواعد . رأسها غروطي
الشكل ، ذلق الخطم . شفتها معدن الانفراج . اسنانيا
صغيرة ذرية . عيناها كبيرتان ، ناشزتان ، عسلتان .
زعنفها الظهرية واحدة مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة ||
لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٨١٥٨ - مِيدَاحٌ ٥

Parefeu (F). Firebreak (E).
حاجز طبيعي أو صناعي جردت منه جميع المواد القابلة
للاشتعال منعا لانتداد الحريق في الغابات والاحراج .

٢٨١٥٩ - مِيدُوس ٥

Mydaus (S).
Mydaus (F). Mydaus (E).
حيوان لبون مفترس من فصيلة السوريات . موطنه الهند
الصينية وبنيزيا || جسمه قريب الشبه بجسم الغرير .
رأسه غروطي الشكل ، ذلق الخطم . قوائمها قصيرة .
أظافيره مستطيلة ، شديدة الصلابة ، حلبة خشن . ثوبه
إلى السمرة الكستانية يعلمو خط أبيض يمتد من القطن إلى
مفرز الذنب . ذنبه جذعة كستانية اللون يضاء الطرف ||
من ميزاته انه يربي علوه بسائل كاس كرهه الرائحة تفرزه
الغد الشرجية ويسدده ببقضييه على أبعاد من متر .

٢٨١٦٠ - مِيدِيَّات

Mytilidae (S).
Mytilidés (F). Mytilidae (E).
فصيلة من الرخويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وأنواعها
عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . أشهرها الميدي .

٢٨١٦١ - مِيدِيَّة * ، بَلَحُ الْبَحْرِ

Mytilus (S). Moule (F). Mussel (E).
جنس بحار من فصيلة الميديات . أنواعه المعروفة نحو ٧٠
معظمها مأكول مستحب الطعم . يعيش على الصخور التي
يغمرها المادوق يرب في أحواض بحرية خاصة صار تجهيزها
في هذا السبيل .

٢٨١٦٢ - مِيدَاحٌ ٥

Hemientetes (S).
Hémicentète, Hémitanrec (F).
جنس حيوانات لبونة حارشة من فصيلة المائلات . أنواعه
المعروفة قليلة العدد موطنها الساحل الشرقي من جزيرة
مدغشكر . تأتف السباب والاماكن التي يكثر فيها
الاعشاب البرية . مسرعا دجوي . قوائمها الحشرات
والديدان || أجسامها صغيرة مكرومة تطول من ٢٠ إلى
٢٥ سم . أعطائها مستطيلة . عليها معدن الشخانة تتخلله
سائل متباينة الطول تكثر في فيج الظهر . أطولها إلى
السر البوداه يعلوها تسنج قاطب اصفر . ومنها نوع
اسود الرأس || انائها ثوزرة تقصع في كل رمص من ١٠
إلى ١٢ جروا || بيئاتها الشتوي يستمر نحو أربعة أشهر .

٢٨٣٠٥ - نأرجيل شيلي

Jubée (F). هو الجوبة ، اطليا .



نأرجيل ميشل

٢٨٣٠٦ - نأرجيل معرُوف * ، جَوَزُ الهِنْد ،

رَأَج ، شَعْمُور ، حَشْرَج

Cocos nudifera (S). Cocotier commun (F). Cocconut palm (E). Kokospalme, Indischer Nussbaum (D). Cocco, Albero del cocco, Noce d'India (I).

نوع من النأرجيل الزراعي . ساقه اسطوانية منتصبة تملو نحو ٣٥ م . اعطانه بعض المناطق الاستوائية . يعيش قرب الماء ويجود على الشواطئ البحرية . ثماره بيضية الشكل تطول من ١٦ الى ٢٢ سم . تشورها خشية تغلفها الالياف . لبها جامد الحُسر ، عاجي اللون ، مستحب الطعم ، شائع الاستهلاك الغذائي والصناعي .



نأرجيل معروف

٢٨٣٠٧ - نأرجيلة * ، جَوَزَةُ الهِنْد ، جَوَزَةُ

النأرجيل

Coco, Noix de coco (F). Coco-nut (E).

ثمرة النأرجيل ، لبها يتفع من البلمغ والسوداء وضعف الكبد والكلل والمثانة وقروح الباطن . ويزيل اوجاع الظهر والبدان والواسير ويهيج افقو الجنبية ويمنع تقطير البول . عصارتهم مع السكر تشطب الدم وتقوي الفريرة . رماد قشوره يحلوا الانسان ويزيل الكلف والنمش والحكة ويشد الشعر اذا استعمل مع الحناء .



نأرجيلة

٢٨٣٠٨ - نأردين ، سُبَيْل

Valeriana (S). Valériane (F). Valerian (E). Baldrian (D). Valeriana (I).

جنس نباتات طبية برية وزراعية من فصيلة النأردينات . انواعه زهاء ١٥٠ جميعها اشباح خولية او معمرة . اوراقها متقابلة مركبة ويضية . ازهارها نوري او مشكوية التجميع ، اعطي وتاجي الارتكاز . ازهارها خشوية جميلة الشكل يكثر فيها الابيض والوردي || اشهر انواعه الطبية والزراعية والبرية ما يتبع .

٢٨٣٠٩ - نأردين أزرق * ، سُبَيْل أزرق

Valeriana wallichii (S). Valériane indienne, Nard indien (F). Indian valerian (E). Indische Narde (D). Spiganardi (I).

نوع من النأردين البري والزراعي . جذاميره ملفطة . ساقه غندة . اوراقه عاقبة الحُسر . ازهاره كثيفة مغلطة . زرقاء اللون ، مستحبة العرف . جذاميره طيبة || اذا استعمل مسحوقها مع الاستئين والسندل لم يشمر صاحبه بشيء من شدة تقويته المدة . ويظهر اللون ويزيل البرقان والكبد والحصى . واذا طلى بالخل قطع العرق وطيب رائحة البدن وان طبخ بالحُسر حتى يتقزم وظل به الشعر سوده وطوله .



نأردين أزرق

٢٨٣١٠ - نأردين إقريطي * ، سُبَيْل رُومي ،

عَطَارِد

Valeriana celtica (S). Valériane celtique, Nard celtique, Spic celtique (F). Celtic valerian, Celtic spikenard (E). Alpenbaldrian, Nardenbaldrian (D). Nardo celtico, Baldrica, Spiga celtica (I).

نوع من النأردين البري الطبي الحُسر . ينبت في الآرتبة الرملية الجبلية . جذاميره مستطبة مستطبة فواحة العرف . ساقه نحيلة تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقه اسفل كاملة العليلجية . اوراق الوسطى والعليا مركبة . ازهاره عقودية التجميع بيضاء اللون . ثماره بيضية الشكل ، صغيرة القد ناعمة ومفذية .



نأردين إقريطي

٢٨٣١١ - نأخس * ، نَحْطُوس

Tragelaphus spekei (S). Tragelaphe de Speke (F). Nakong (E).

نوع من الجبل ، قدره قدر القنمار ، له قرنان جالسان ثوبه الى السرة يملوه تجذيع ابيض . اعطانه اواسط افريقية . يألث الهضاب والقيافي ويرتاد المناقع وضفاف مجاري الماء . قوته الاشباب . اجله يعد من ٥ الى ٢٠ نفراً .

٢٨٣١٢ - نأر هندي

Mésua (F). هو المهر ، اطية .

٢٨٣١٣ - نأرايو

Naranio (S). Naranio (F). Naranio (E).

نأرايو هو الاسم الهندي . جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم وفصيلة التيقبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد بعضها هندي والآخر استرالي || اجسامها صغيرة . مثابها بارزة ، طليقة . اصداؤها مبيونية الشكل || تعيش في اتفاق تنقب في الصخور المغسورة بالماء قرب مصبات الانهر || ليفها غزير المادة ، جيد الصنف .

٢٨٣١٤ - نأرجيل

Cocos (S). Cocotier (F). Cocoa-nut palm (E).

جنس اشجار الجذع من فصيلة النخلات . انواعه المعروفة ٣٠ ، اعطائها المناطق الاستوائية والحارة . معظمها بري وتربني وبعضها زراعي صناعي . اشهر انواعه النأرجيل المعروف (المطلة) . اما الانواع التريينية التي تعيش في بعض المواقع الحارة من الاقاليم المعتدلة فهي :

- نأرجيل احمر الكافور Cocos erythrospatha
- نأرجيل اشعر الكافور Cocos eriospatha
- نأرجيل الجنوب Cocos australis
- نأرجيل الحرس Cocos lapidea
- نأرجيل املس الكافور Cocos leiopatha
- نأرجيل بلحي Cocos datil
- نأرجيل تاجي Cocos coronata
- نأرجيل حقلي Cocos campestris
- نأرجيل رشقي Cocos elegantissima
- نأرجيل ورموزوف Cocos romanzoffiana
- نأرجيل ريشي Cocos plumosa
- نأرجيل مارن Cocos flexuosa
- نأرجيل مستدير القمة Cocos capitata
- نأرجيل وديليانا Cocos weddelliana
- نأرجيل ياطاي Cocos yatay

٢٨٣١٥ - نأرجيل سيشل * ، نأرجيل بحري

Lodoicea (S). Lodoicée des Seychelles, Cocotier des Maldives (F). Double cocoa-nut palm (E). Maledivische Nuss (D). Coco di Moldiva (I).

نخلة وحيدة الجنس والنوع ، قرية الشبه من النأرجيل ، موطنها سيشل والهند وسرنديب وموريس . ساقها اسطوانية مستقيمة تملو نحو ٣٠ م . ثمارها كبيرة القد مستطيلة الشكل ثنائية التجميع ، واحداها وزن من ١٠ الى ١٢ كيلو يعي تنقسم على الشجرة ، من التآبير الى الادراك ، نحو الحول . عصية الثمرة قرب الادراك تحوى مادة لبنية آحية لليلة الطعم ناعمة ومفذية .

Valeriana saluina (S). **ناردين عطر** ٢٨٣١٧
Valériane odorante (F).

نوع من الناردين البري والزراعي المعمّر. ساقه مثنونة تملو من ٥ إلى ١٥ سم. تحمل ورقين صغيرين ثلاثية التركيب. ازهاره نوري التجميع. ازهاره صغيرة القذ، وردية اللون. جذوره فواحة العرف يستخرج منها دهن عطري فاخر الصنف || تنوره يستمر من محو إلى آب.

٢٨٣١٨ - **ناردين مخزني* ، حشيشة القط، بقلة الهر**
Valeriana officinalis (S).

Valériane officinale, Herbe aux chats (F). Common valerian, All-heal, Cat's valerian (E). Echter Baldrian (D). Valeriana minore, Amantilla (I).

نوع من الناردين الطبي البري المعمّر المبلول. ساقه محدودة منتصبة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه مركبة، ويريقاتها سنائية التصل، منفعة الحافة، ورتبة التجميع تعد من ٥ إلى ٢٣. ازهاره نوري. ازهاره صغيرة القذ، وردية اللون. جذوره طيبة وعطرية يستخرج منها عطر الناردين وهي بحللة قوية للاصصاب، مفيدة لقلب والكل والطحال، منبهة للقوة الجنسية، مفادة للتشنج، تنظم الحضم وتزيل الانتفاخ. جرعة المسحوق منه تراوح من غرام إلى خمسة.

٢٨٣١٩ - **ناردينيات**
Valerianaceae (S). Valérianacées (F). Valerianaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة الفعالات. ازهارها كثيرة تجتمع إلى عدة اجناس، نباتاتها عشبية وجنبية. اوراقها مركبة متقابلة. ازهارها لا قياسي التجميع والارتكاز. ازهارها لا نظامية || اشهر اجناسها الناردين والوشة والتركوك والكرول.

٢٨٣٢٠ - **ناركيد**
Pavot blanc (F). هو رمان السمك أي الخشخاش الابيض.

٢٨٣٢١ - **نارمسك ، نارمشك**
« نارمسك والنارمسك : رمان صغيرة مفتحة كأنها وردة لونها إلى البياض والحمرة والصفرة في وسطها نوار، لونه كذلك طعمه عفص ورائحته طيبة » (أ.م.) || « هو الرمان البري يحبس الزئفر والانهال. شربه دزمان ».

٢٨٣٢٢ - **نارنج* ، نقاش ، أبو صغير**

Citrus amara, C. vulgaris (S). Bigaradier, Oranger amer (F). Sour orange, Bitter orange (E). Bitter-orangenbaum (D). Arancio agro, Arancio amaro (I). نوع من الحمضيات والفصيلة النارجية. منبه المقدر بلاد الصين أو الهند الصينية ثم ادخل إلى الهند فبلاد المعم والعرب كانوا اول من ادخلوه إلى افريقية الشالية وأروبه (المسودي) || ثمرته شاذكة نفاذ ورائحة تملو من ٣ إلى ٧ اثمار. أوراقه منفقة متقابلة. نصلها بمنج العنق، ايليجي الصفحة الجامدة الجميلة الخفسار. ازهاره خاسية البتلات البيض، منجاة الاسدية، فواحة العرف الذكي المستحب. منجاة مستدرة الشكل برتقالية القذ واللون، غليظة القشور المرة الحامزة. عصارة فصوصها شديدة الحموضة والمرارة المستنكرة. قشور ثماره تربب بالسكر بعد مساجها بالماء والكلس وهي صعبة، نافعة، غنية، يبيض الفيتامينات، خافضة الحرارة، مضادة للتشنج. يستنطر من زهره المرفوف بالقدح دهن يدهس البطر الليرولي ويستقطر أيضاً من زهره وأوراقه ماء الزهر المشهور

حشيشة البشرة. || جلوره صناعية يستخرج منها عطر الناردين وتستعمل في الطب استعمال الناردين الحزني إلا أنها أقل فعالية منه.

٢٨٣١١ - **ناردين الجبل**
Valériane de montagne (F).

نوع من الناردين البري المعمّر المبلول. ساقه تملو من ١٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه الجذعية اعليلية التصل المنس الحافة. أوراقه العليا مركبة ريشية. ازهاره عشكولي التجميع، مستطيل الشكل. ازهاره صغيرة القذ خضر القبايات وردية البتلات || تنوره يستمر من نيسان إلى محو.

٢٨٣١٢ - **ناردين الحدائق* ، سنبل الحدائق، فو**

Valeriana phu, V. discordis (S). Valeriana phu, V. des jardins (F). Cretan spikenard, Garden valerian (E). Grosser Baldrian (D). Valeriana maggiore, Fu pontico, Nardo agreste (I).

نوع من الناردين الزراعي المعمّر. جلوره مدادة، اسطوية، مشعشة. ساقه ملسة منتصبة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه السفلى اعليلية كاملة. أوراقه الوسطى والعليا مركبة مشطية. ازهاره عشكولية التجميع، كبيرة القذ، يبيضه اللون أو وردية، فواحة العرف العطري المستحب. جذوره طيبة لكنها قليلة المواد الفعالة || ازهارها يستمر من ايار إلى محو.

٢٨٣١٣ - **ناردين الصخور**

Valeriana saxatilis (S). Valériane des rochers (F). نوع من الناردين البري المعمّر. يعيش بين الصخور ويرقب في الاثرية الكلسية. ساقه نحلة تملو من ١٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه الجذعية سنائية التصل. أوراقه العليا مركبة ريشية. ازهاره عشكولية التجميع. ازهاره يبيضه اللون || تنوره يستمر من حزيران إلى محو

٢٨٣١٤ - **ناردين الطيب* ، ناردين هندي**

Valeriana spica (S). Valériane des Indes, Nard des Indes, Spicanard (F). Indian valerian, Nardus, Spikenard (E). Indische Narde, Echte Nardenähre (D). Spignardi (I).

نوع من الناردين البري الطبي المعمّر. اعطاه بلاد الهند. جلوره غليظة مغلقة رائحة المادة العطرية. ساقه منتصبة محدودة تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه مركبة. وريقاتها شبيقة التصل المنس الحافة. ازهاره عشكولية التجميع، صغيرة القذ، فواحة العرف. يستخرج من جلوره دهن عطري يعتبر من اجود انواع الطيب.

٢٨٣١٥ - **ناردين المروج***

Nardus stricta (S). Nard des prés, Nard bâard (F). Nard, Mat-grass, Wire bent-grass (E). Straffes Borstengrass (D). Nardo, Cervino, Fieno del monti, Spigo fitto (I). نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات. ساقه نحلة منتصبة فواحة. أوراقه خفيفة مستطيلة. ازهاره سنيلية التجميع، صغيرة القذ، وردية اللون || وهو من النباتات المروعة التي يجود عليها الدرد ويطيب.

٢٨٣١٦ - **ناردين بري**

Nard sauvage (F). هو الاسارون، اطلية.



ناردين الحدائق



ناردين الغيب



ناردين المروج



ناردين مغني



نارج

٢٨٣٢٩ - نَارِيَّة الحِمَار المُجَفَّفَة

هي نداسة التبع ، أطلبها .



ناره

٢٨٣٣٠ - نَارِيَّة الحِنطَة * ، ضِفُّ الشَّعِير

Plodia interpunctella (S). Teigne orientale des denrées (F). Indian meal moth, Meal worm moth (E). Dörrmotte (D).

حشرة من الناريات، صغيرة القد . رواشها ملوثة ناعمة الابيض والخطي والاسمر الاسفع المواج . ريقها دقيقة نحيلة تركيب الجيوب المخزونة على اختلاف انواعها كالحنطة والشعير والذرة والشوفان والسلت ...



نارية البرتقال

٢٨٣٣١ - نَارِيَّة الخُرُوب *

Melois ceratoniae (S). Pyrale des caroubes, Teigne des caroubes et des figues (F). *Melois ceratoniae* (E).

حشرة صغيرة من فصيلة الناريات وربة حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازمار . سرقها ثائرة قوتها لباب قرون الخروب وثمار التين || جسمها نحيل اهيف يطول نحو ٨ م . بسطها نحو ٢١ م . رأسها معتدل الحجم . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان . مشرقها معتدل الطول . جوشها وبطنها الى الشبهة || رواشها الاماميان الى الشبهة الحديدية يملوها بتقيج ابيض وصف من البقع البيض يستيق الحمار الخاريجي . وروشها الخلفيان الى الشبهة السمر . اهدابها الى الشبهة البيضاء || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في حزيران . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع قرقر المكن مباحداً في قرون الخروب || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٩ م . جسمها اسطواني الشكل . وأسها شديد السمر . ثوبها الى البياض التي تملوها ماجة وردية . وواجها الى السمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن صلجة تحببها السرفة تحت القشور او بين شقوق السعاء .



نارية الحنطة



نارية الخروب

وهو يفيد الفص والمضغ || نصوب الناريات تستعمل كعلم لمختلف انواع الحمضيات وذلك لانها قوية المناعة الجليسة ولا تخشى الازربة المتدججة التي تنفر منها انواع الليمون المرذلة .

٢٨٣٣٢ - نَارَنْج مَرْمِيسِي

Oranger à feuilles de myrte (F).

هو الليمون المرسي ، اطلبه .

٢٨٣٣٤ - نَارَة *

Acanthosicyos horrida (S).

Nara (F).

اسما الاثري ناره وهي جنه من فصيلة القرصيات منبتها صماري افريقية الشالية . ساقها ليفية فروعها تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها اقية الانتشاب ، متبسطة متدلية ، تطول نحو ٤ امار وهي عادية الورق كثيرة الشوك . جلودها تنور في الرمال من ٣٠ الى ٤٠ م . اثمارها كبيرة القد . ثمارها يرتقيا الحنج والمون ، تشورها مخفكرة ، هريئة التعل . لها مستحب الطعم مأكل وهو ادم وأصل وألذ من البليخ . يزورها مأكلة طازجة ومبطونة . لها مومان في العام الواحد . وهي من النباتات العزرة الكثيرة النفع .

٢٨٣٣٥ - نَارِيَّات

Pyralidae, Pyralididae (S). *Pyralidés* (F). *Pyralidae, Pyralin moths, Snout moths* (E). *Zünstler* (D).

فصيلة حشرات من ربة حشرقيات الاجنحة . اسباطها ١١١ ، اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠ . جميعها فراشات ليلية صغيرة القد ، دقيقة الاجسام ، اثرية الاعظام ، واضحة التأثير . رواشها ضيقة ، مهدبة الاطراف ، متداخلة الالوان . ابيالها الحولية لاقياسة . ريقاتها ملونة . غادراتها تلتحف بأغشية حريرية النواس .

٢٨٣٣٦ - نَارِيَّة البَاذَنْجَان

هي ينظفرو الباذنجان ، أطلبها .

٢٨٣٣٧ - نَارِيَّة البُرْتُقَال * ، Prays citri (S).

Teigne des fleurs d'oranger (F).

حشرة من الناريات ، صغيرة القد ، نحيلة الجسم ، قريبة اليه من قوقعة الزيتون . بسطها تراوح من ٩ الى ١٠ م . رواشها الاماميان الى الكهبة النضية المواج تملوها رشفة رعداء لا متسوية الثر . رواشها الخلفيان الى الربة الزاهية السوية يحرقها اطار من اهدب الكثيف المستعرض . ابيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ . تمتع الاثني مكها على الازمار والثار القليلة ينقث عن ريقات دقيقة تراوح طرما عند اكمال نموها ، من ٥ الى ٦ م . ثوبها الى الكهبة الزاهية يملوها ثلاثة خطوط قاطبة واحد يكتنف الظهر من الرأس الى الترج واثان جانبيان . رأسها الى السمره الباقية . مدبها الى السمره الحنطية يرتكز على خمسة ازواج من الجرايز السمر || اسباطها اقليم البرتقال الذي يمتد من الهند الى كابل حوض البحر المتوسط || اغراضها قد تكون مؤذية فبا كثر عددها ذلك لانها تقضم بتلات الازمار واسديتها واقلام مدقاتها وقد تمطب في ظروف خاصة تشور الثار التي تقضمها وتسردب لبابها || تكافح بالروقيين الذي يقضي عليها .

٢٨٣٣٣ - نَارِيَّة الدَّقِيقِ الْغَرَاء

هي نداسة الدقيق ، اطلبها .

٢٨٣٣٤ - نَارِيَّة الدُّرَّة *

Pyrastus nubilalis (S). *Pyrale du maïs* (F). *Corn moth* (E). *Malszünstler, Hirszünstler* (D).

حشرة من الناريات ، ريقها غليظة الشكل تطول نحو ٢٥ م . ظهورها اسمر اللون يملوه خطوط قرفل . مدبها الى السرة الحنطية || تحمل على جانبها نقط سمر داكنة يملوها حلب مستطيل || تركيب سوق الدرر فتخروصا وتسبب قصصها .



نارية الدرر

٢٨٣٣٨ - نَارِيَّة البُسْر ، نَارِيَّة البَلَح

هي نداسة البسر ، اطلبها .

Stalactite

٢٨٣٤٦ - نازلة ٥

نازلة ج نوازل : رواسب كلسية متحجرة في سقف
الماور الرطبة .

٢٨٣٤٧ - نازون قصير الزبان ٥*

Nasonia brevicornis (S). Nasonie brévicorne (F).
حشرة ناعمة من فصيلة الطليطنيات ورتبة غشائيات الاجنحة
المقصورة . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة المنحرفة نحو
المتدلة . تنطفل عل ذوات الجناحين اخصها الذباب ||
جسمها صغير القد بطول نحو ١ م . واربية خطوط .
رأسها مستعرض الشكل . زباناها صولجانيان صغيران .
جوشنها ضيق المؤخر بطنها شبه بيضي الشكل . مرتزها
قصيرة مستقيمة . اجنحتها وردية اللون . ثوبها الى الخضار
الالمن .

Fistule (F). Fistula (E).

٢٨٣٤٨ - ناسور

٢٨٣٤٩ - ناسير هو الفل المصري ، اطلبه .

Diffuseur (F). Diffuser,
Mixing cone (E).

٢٨٣٥٠ - ناشيرة

اداة الانتشار ، تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة
السكر ، راجع انتشار .

Lymexylon (S).

٢٨٣٥١ - ناشيرة الخشب *

Lymexylon, Lime-bois (F).
جنس حشرات خاشية من مقدمات الاجنحة . انواعها
ثلاثة ، جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، برتقة الجسم .
برقاتها تنفك باخشاب الاشجار القائمة والمقطوعة فتسرقها
وتعطبها .

Exsert

٢٨٣٥٢ - ناشز

نعت تعريبي يوصف به الشي المرتفع عن سطح محيطه .

Assez fort (F).

٢٨٣٥٣ - ناشط

نعت تعريبي يطلق على التبروغ التي تتحمل بسورة ناشطة
مركزها التصنيفي دون المانعة وفوق المعتدلة .

Oryx de Nubie (F).

٢٨٣٥٤ - ناشط

هو الارخ السوداني ، اطلبه .

٢٨٣٥٥ - ناشفة

هي مجرى السيل الى الوادي . ج نواشع .

٢٨٣٥٦ - ناصعات ، قنبرويات ٥ ، ناصيات

Buprestidae (S). Buprestidés,
«Richard» (F). Buprestidae, Flatheaded beetles (E).
Prachtkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة رديميات الاجنحة . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد . معظمها من حشرات المناطق المعتدلة والحارة .
اشكالها مأنوسة ، الالوان عابكة زاهية ، ورؤوسها قصيرة ،
قرونها الاستعارية مركبة من ١١ فاصلة ، اراسها
خامسة ، امخاها مستطيلة . جميعها تسرح في النهار وهي
سريعة الحركة والطيران . || برقاتها خاضعة تميم على
جنود وسوق واوراق مختلف النباتات . كثرها على بعض
اعشاب المراعي تسبب الحباط اي التلف في الايقار التي
تبتلعها مع العشب .

٢٨٣٥٥ - نارية السيسيم *

Antigatra catalaunalis (S). Antigastre du
Sésame (F).

حشرة من الناريات . رقتها صغيرة القد تطول نحو ١٢ م .
لونها الى الخضرة الرمداء الموجات تعلوها رقعة سوداء || تركيب
السسم من ساقه الى ازهاره ومماره .

٢٨٣٥٦ - نارية الشمع الصغيرة

Alveicole, Teigne de la cire (F).
هي صمل النحل الصغير ، اطلبه .

٢٨٣٥٧ - نارية الشمع الكبيرة

Gallérie de la cire (F). اطلبه .

Pionea forficalis (S). Nارية الصليبيات
Pyrale des crucifères (F).

حشرة من الناريات ، رقتها صغيرة ، دقيقة ، سمراء اللون ،
سريعة الحركة . تركيب اوراق الصليبيات على صفحاتها
السلط .

٢٨٣٥٩ - نارية المصان *

Mecyna gilvata (S).
Pyrale des cannes à sucre (F).
حشرة من الناريات متوسطة القد غبراء اللون مزركشة
الرواشن . رقتها تطول نحو ٢٢ م . لونها الى الحمرة تحمل
عل ظهرها وجانبها خمسة خطوط ارجوانية || تركيب
المصان فتتخرق الساق وتذهب فيه صمداً حتى القعة .
وتركب اللزق فتقتل فيها ذات الشيء وتركب الارز فتقتل
السوق والسنايل .

٢٨٣٤٠ - نارية اللوبياء *

Etiella zinckenella (S). Etielle du haricot, Pyrale
des haricots (F). Lima bean pod borer (E).

حشرة من الناريات ، رقتها تطول نحو ٢٥ م . وهي
ارجوانية الظهر غبراء المذب || تركيب ازهار وممار
وجيوب اللوبياء فتعطبها .

٢٨٣٤١ - نارية الوزيم

Myelois cribrella (S).
Myelois des fleurs (F).
حشرة من الناريات ، رقتها دقيقة نحيلة حنطية اللون
تميش داخل وزم وسوق نباتات الفصيلة المركبة .

٢٨٣٤٢ - نارية الياسمين *

Glyphodes unionalis (S). Pyrale du jasmin (F).
حشرة من الناريات ، حنطية اللون سوداء الزواكش . رقتها
صغيرة القد مستطيلة الجسم ، غبراء اللون ، سمراء الموج .
تركيب براعم وازهار الياسمين وسنايل الزيتون .

٢٨٣٤٣ - نارية الخضر *

Pachyzancla licaresalis (S). Pyrale des gazons (F).
حشرة من الناريات ، رقتها مستطلة تطول نحو ٢٥ م .
ثوبها الى السمرة يطولها تنقطة اسود منتظم الترتيب وحيد
الهيئة المستطيلة || تركيب مختلف اوراق الاعشاب الفتية
اخصها التجيلية فتقتلها .

٢٨٣٤٤ - نارية ذهبية

Pyrausta aurata (S).
Pyrale dorée (F).
حشرة من الناريات ، رواشها ذهبية اللون . رقتها صغيرة
القد غبراء اللون . تركيب براعم وازهار النباتات العطرية
اخصها التنع .

٢٨٣٤٥ - نارية شهباء

Pyrale grise (F).
فراشة مؤذية تدعى طينية المصان ، اطلها .



نارية السسم



نارية المصان



نارية اللوبياء



نارية الياسمين



نارية الخضر



نازون قصير الزبان



ناشرة الخشب

Maille (F). Stitch (E). **نَاطِيَة ، نَاطِيَة** ٢٨٣٦٨
ج. نواطيل. والنواطيل هي خروق المصفاة.

٢٨٣٦٩ - نَاطِيَة

الناطيل نجم نير من كوكبة برج الثور ويسمى قرن الثور الشبلي.



ناصية الخوخ

Eprouvette graduée (F). **نَاطِل** ٢٨٣٧٠
عشار مدرج تكال به السوائل.

Aiguardier (F). **نَاطُور المَاء** ٢٨٣٧١
Freshwater guardian (E).
هو الشاوي الذي يحافظ على مياه الري ويوزعها على مستحقها بالعدل.



ناصية الدراق السوداء

Tarbophis **نَاطِر * ، رَقِيب** ٢٨٣٧٢
جنس حيات سامّة من فصيلة الحفشيات. انواعه عديدة. اعطائها البلاد الحارة الافريقية والاسيوية. شكلها كالحفاح، مستطيلة الجسم، دقيقة العنق، سريعة الحركة. انطواها الى السمرة الغبراء المروضة.

٢٨٣٧٣ - نَاطِر مَآكِر ، رَقِيب خَدَّاع

Tarbophis fallax (S).
Tarbophis trompeur, Serpent chat (F).
حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحفشيات خفليات الاغادي || جسمها متدل الخعانة يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى السمرة الخنطية الموجع يطولها يتبعج ثلاثي الالوان لاقباس الزاويق، يكثر فيه الرمادي والجويرو والاصفر، يمتد من الرأس الى الذنب. رأسها بيضي الشوزن. عنقها متوسطة الطول. عينها كيرتان. عدد اسناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الفك الاعلى من اصلها اربعة عناق عذدة، ثابتة، خلفية الارنكاز تبح السم في كل عضو تصببه عندما يرق حتى مستواها الداخلي || تألف البراري والاطلال. قوتها كل ما دب وطار. تنقض على فريستها انقضاض السنور على الفأرة || تسرح في النهار وفي اوائل الليل. بيئاتها الشوي يستمر نحو خمسة اشهر. تبلغ كامل نموها بمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسافد بمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٣٢ بيضة مجموعة في سبحتين تطيرهما في الرمل || تعتبر من التعابين المؤذية.



ناصية الورد

Palonnier (F). Swing-bar, Pole (E). **نَاطِم** ٢٨٣٧٤
هو الميزان، قطعة من خشب او من حديد مركزها مقدمة آلة الحرت او العربة، تعلق بها السيور للجر.

Culcivore (F). Culcivorous (E). **نَاعِير** ٢٨٣٧٥
الناعر من الطير والحيوان من كان قوته النعر وما اشبه.

Aphrodisiaque (F). **نَاعِظ** ٢٨٣٧٦
Aphrodisiac (E).

٢٨٣٧٧ - نَاعِقَان

الناعقان كوكبان من كواكب الجوزاء اي الجبار يتقدمان الرجل.

٢٨٣٧٨ - نَاعِمَة هي القوسية، اطباء.

Bupreste (F). Buprestis (E). **نَاصِيَة** ٢٨٣٧٧
هي الزقنيت، اطباء.

Bupreste du chêne (F). **نَاصِيَة البَلُوط** ٢٨٣٥٨
اطلب زقنيت السنديان.

٢٨٣٥٩ - نَاصِيَة الخُوخ * ، زَقْنِيَتُ الخُوخ
Ptosima undecimmaculata (S). Bupreste du prunier (F).
حشرة من الناصعات. طولها نحو ١٠ مم. لوها الى السواد الاسفع، نمداها رباعية الخطوط المنعرجة النارية اللون. رقتها شديدة الاذى تسردب سوق معظم اشجار الفصيلة الوردية اعصها الملوخ والمشمش.

٢٨٣٦٠ - نَاصِيَة الدَّرَاقِين السَّوَدَاء * ، زَقْنِيَتُ الدَّرَاقِين
Capnodis tenebrionis (S).
Bupreste noir du pêcher (F). Pesch capnodis (E).
Capnodis tenebrionis (D).
حشرة من الناصعات، طولها نحو ١٨ مم. لوها الى السواد الفضي تعلو ماجة غبراء. رقتها تسردب سوق الموزيات اعصها الدراق قطعها وتوقع بها اشد الاذى.

Bupreste des pins (F). **نَاصِيَة الصَّنَوْبَر** ٢٨٣٦١
اطلب زقنيت الصنوبر.

٢٨٣٦٢ - نَاصِيَة الوَرْد * ، زَقْنِيَتُ الوَرْد
Coraeus rubi (S). Bupreste du rosier (F).
حشرة من الناصعات، طولها نحو ١٠ مم. لوها الى السواد الازرق الموجع. نمداها مجعدتان بخطوط غبراء معترضة. رقتها تنخر سوق الورد واغصانه.

Bupreste vert (F). **نَاصِيَة خَضِرَاء** ٢٨٣٦٣
اطلب زقنيت اخضر.

Spondylocladium (S). **نَاصُورَة** ٢٨٣٦٤
جنس فطور مجهرية من الريديات وفصيلة الطحليات. جره الكنيدي خنطية، ضمية التجميع. كئائده هليية الشكل، مستندقة الاطراف، ومنها حلزونية. || انواعه قليلة اعرفها ناصورة البطاطا.

٢٨٣٦٥ - نَاصُورَة البَطَاطَا ، جَرَب فُصِي
Spondylocladium atrovirens (S). Gale argentée de la pomme de terre (F).
فطر مجهرية يتطفل على البطاطا في طور نموها الاخير، قرب ادراك الدرن. || مظهره الخارجي بقع مستديرة، غبراء اللون، فضية الموجع، تتخللها بنور ثولوية صغيرة مضبوغة الغلاف الاسود الشق، تركيب الدرة فتتعلب البشرة مع قليل من الباب || يكافح بتطهير البذار قبل الزرع وذلك بتقع الشعف مدة ٢٠ دقيقة باحدى املاح الزئبق المحلولة ٥ ٪.

Toupet (F). Foretop (E). **نَاصِيَة** ٢٨٣٦٦
غصلة الشمر المتدلية على جبهة الفرس.

Trop mûr (F). Overmature (E). **نَاضِج** ٢٨٣٦٧
نعت تمرين توصف به جميع المحاصيل الزراعية بعد اجتيازها دور الانعاج ودخولها في دور النضج.



ناظر

Vertex

٢٨٣٩١ - نَاقُور

النَاقُور هو قِوَّة الرَأس في تَشرِيح الحِشرات .

Chamelle (F). She-camel (E).

٢٨٣٩٢ - نَاقَة

النَاقَة هي الأُنثى من الأيمل . ج . نوق . كُنْهَبا ام بِن وَاَم حائِل وَاَم حِوَار وَاَم السَق وَاَم مَسعود || مَحْجَلا يَسْتَقِيم سَنَة وَاَمْلَاج حِوَارِها يَسْتَمِر سَنَة .

Dugong (F).

٢٨٣٩٣ - نَاقَة البَحر

هي الأَطوم ، راجع .

Acidiphile (F).

٢٨٣٩٤ - نَاقِس

نعت تَعرِيفي تَوصَف به النَباتات الَّتِي تَربَغ في الأَرتَبَة الحَمَضِيَّة الَّتِي يَراوَح دالِها من ٦,٥ إلى ٥,٥ .

Afférent (F).

٢٨٣٩٥ - نَاقِل ، مُرْسِل

Afferent (E).

Contage (F).

٢٨٣٩٦ - نَاقِلَة العَدَوِي

مادَة تَنتَقِل مِيكْرُوب الوَسم المَعدِي .

Conductibilité (F).

٢٨٣٩٧ - نَاقِلِيَّة

هي الأَيصَالِيَّة ، أَطْلَبها .

Pic (F).

٢٨٣٩٨ - نَاقُوبَة

هي النَكار ، أَطْلَبها .

Regressif (F).

٢٨٣٩٩ - نَاقِص

النَاقِص من أَرَدَ إلى ما كانَ عَليه . راجع أَشَم .

٢٨٤٠٠ - نَاقِيس الكُتُب * ، قُصَل الكُتُب

Atropos

حِشْرَة من فَصِيلَة النَاسِيَّات ، طُولُها نَحو ٢ م . نَواها إلى النَيرَة . أَصْلانُها العالَم . قَوتُها المَواد السَّيلُولُوزِيَّة ، تَقرَض أَوراق الكُتُب فَتَعضُها .

Atropidae (S).

٢٨٤٠١ - نَاقِسيَّات

Atropidés (F). Atropidae (E).

فَصيلَة حِشْرَات من رَتبة القَهْلِيَّات ، أنواعتُها عَديدة ، جَمِيعُها صَغيرة القَد ، طَول أجسامِها يَراوَح من ١ إلى ٣ م . أَثوابُها إلى الصَغرَة النَبراء . قَوتُها المَواد العَضويَّة والنَشويَّة . نَوع مَها يَدْعى نَاس الكُتُب يَعضُري أَوراق الكُتُب والْقَاطِيعُ فَيَخرُها وَيَعضُها .

Formicivore (F).

٢٨٤٠٢ - نَاقِل

Formicivorous (E).

نعت تَعرِيفي يَطلَق عَلى كُل حَيوان أو طائر قَوتُه التَمل .

Myrmecophagidae (S).

٢٨٤٠٣ - نَاقِلَات

Myrmecophagidae (F). Myrmecophagidae (E).

فَصيلَة حَيوانات من رَتبة الدَرد الحِاشِرات . قَوتُها التَمل . راجع أَكَلات التَمل .

Culcinés (F).

٢٨٤٠٤ - نَاقِيس

هو البَومُض ، أَطْلَبها .

Formicide

٢٨٤٠٥ - نَاقِيس

نعت تَعرِيفي يَطلَق عَلى جَمِيع الأَدويَّة المَوضُوعَة لِقَضاء عَلى التَمل .

Roue hydraulique (F). نَاعُورَة . Water-wheel (E).

دولاب مائي مَركَب من قَوادِيس تَحرُكَة سَرعَة جَري المَاء فَيَخرُج ما غَرقَه القَوادِيس في جَدول يَأخُذ المَاء إلى حَيت المَاجَة .

٢٨٣٨٠ - نَاعُور هَوَائي ، نَاعُورَة هَوَائيَة

Eolienne (F). Aeolian (E).

آلة لَرفَع المَاء تَحرُكُها الرِيح . وَتَدعى أَيْضاً دُولاب هَوا .

Galliardie (F).

٢٨٣٨١ - نَاعُورَة

هي الفَردِيَا ، أَطْلَبها .

Noria (F).

٢٨٣٨٢ - نَاعُورَة ، سَانيَة

Noria, Chain-pump (E).

آلة رَافِعة لِمَاء تَدور بِوسِطَة الدُولاب أو المَحرَكات .

Nagana

٢٨٣٨٣ - نَاعَانيَة

وَسم يَصبِيب الحَيوانات الدَاجِنة سَببُه مَشبِيَّة تَقلُّها الشَّاةُ اللَاسِمة .

Naja indien (F).

٢٨٣٨٤ - نَاعَيران

Indian cobra (E).

هو الصَل الهِندِي وَيَدعى أَيْضاً أَفَسي هَندِيَة وَناثِر هَندِي .

Vessie du musc (F).

٢٨٣٨٥ - نَافِجَة

Musk-bladder (E).

جِراب المَسلِك في الحَيوانات الَّتِي تَفرُز هَذا المادَة .

٢٨٣٨٦ - نَافِجَة البَقر * ، أَغْزِيل الوَزَال

Agrilus cinctus (S). Agrile des genêts, Bupreste vert (F).

حِشْرَة من النَاصِعات ، طَولُها نَحو ٨ م . لَونها إلى الخُضار الأَسمَق المَواج . تَعيش عَلى رَعيق أَزهار الفَصيلَة القَرنِيَّة . تَمتَص مَكنَها عَلى جَذوع الوَزَال فَيَنتَفِع عَن رِقات غَاضِلَة تَقتَضي عَلى القَضيان والأَفْئان . || أَمّا تَسمِيَتُها بِنَافِجَة البَقر فَذلك لِأنَّها عَندما تَكثرُ في بَطن البَقر من جَراء ابتِلاعِها مَعَ العُشب ، تَشبِّب الحِياط وَهو نَفقَة في الخُوش قد تَكون مُؤذِيَة .

٢٨٣٨٧ - نَاقِل المَفعُول ، تَنتَفِيزِي

Exécutoire (F). Executory (E).

ما كانَ يَحمِل الصَيفَة التَنتَفِيزِيَّة مِن أَحْكام أو أوامِر أو عَقد .

Caducue, Caducifolié (F).

٢٨٣٨٨ - نَاقِص

Deciduous (E).

اسم حال يَوصَف به النَبات الَّذِي يَنتَفِض وَرَقه كُل سَنَة . راجع عَابِل .

Vésicants (F). Vesicants (E).

٢٨٣٨٩ - نَاقِلَات

فَئة حِشْرَات من مَعدَّات الأَجِنَّة تَشمَل النَواطِط وَالنَواارِيع وَالوَرِيقَات .

Mylabris (S). Mylabre (F).

٢٨٣٩٠ - نَاقِلَة

جَنس حِشْرَات من النَافِطات المَفسَدةَات الأَجِنَّة . أنواعتُها زَهاء ٣٠٠ تَعيش في المَناطِق الحَارة وَالمَعتدلة . جَمِيعُها من الحِشْرَات النَافِطة ، تَمتَص مَكنَها في مَغازِر الجِراد وَأَشباهه فَيَنتَفِع عَن رِقات هَمة لَئِهم السَوء .



نَافِجَة البَقر



نَاس الكُتُب

٢٨١١٢ - نَبَاتَاتٌ وَ نَبَاتٌ (F). Plant (E).
كلمة شاملة تعني العشب والجنبنة والشجرة . الواحدة نبتة
والجمع نباتات وأنبثة || والنبات هو إحدى المملكتين
اللتين تنقسم اليها الكائنات الحية وهما الحيوان والنبات .
ويقسم النبات الى وسيدات الحلية وهي كائنات دنيا
ترتكز على خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف الحياتية .
ولل ولى عديدات الخلايا وهي كائنات راقية تتكون من جذور
وسوق وأوراق خضر وأزهار وممار وبذور .

٢٨١١٣ - نَبَاتَاتُ الْإِلْفِ الْمِلْحِ (F). Plant salicole
Salt-producing plant (E).

كل نبات يعيش في الأترية المالحة .

٢٨١١٤ - نَبَاتَاتُ النَّارِ (F). Plant salicole
Salt-producing plant (E).

هو القرامس الكاري ، اطلبه .

٢٨١١٥ - نَبَاتَاتُ بَرِّيَّ (F). Plant agreste
Uncultivated plant (E).

كل نبات تنبته الطبيعية في الاراضي غير المزروعة .

٢٨١١٦ - نَبَاتَاتُ جَبَلِيَّةٍ ، نَبَاتَاتُ جَبَلِيَّةٍ (F). Plant alpestre
Alpine plant (E).

كل نبات يعيش طويلاً في الجبال العالية .

٢٨١١٧ - نَبَاتَاتُ رُحَاقِي ، نَبَاتَاتُ رُحَاقِي (F). Plant mellifère
P. nectarifère (F). Melliferous plant (E).

النبات الرحاقي كل نبات يفرز الرقيق من ازهاره او
ينضج المغفر من مسام اوراقه فيجبرسه النحل ويعمله الى
عسل || اشهر النباتات الرحاقية ما جاء في الجدول التالي .

٢٨٤٠٦ - قَامِيَّة (F). Dragoon, Jet (F).

Sucker, Shoot (E).
شط او قصب في ريان نشأ على جمع او جذر النبات .

٢٨٤٠٧ - نَاهَ (F). To vegetate (E).

ناه النبات نما وارتفع .

٢٨٤٠٨ - نَاهِر (F). White grapes (E).

نمت تمرني يطلق على كل عنب ابيض من اي ضرب
كان .

٢٨٤٠٩ - نَاهِيض (F). Sommet de l'omoplate (F).

Extremity of shoulder-blade (E).
رأس المنكب في الحيوان وهما ناهضان . ج نواهض .

٢٨٤١٠ - نَاهِم (F). Polyphage (F). Polyphagous (E).

نمت توصف به كل حشرة أكلة تقتني بمواد شديدة
الاختلاف .

٢٨٤١١ - نَاهُور (S). Ovis nahoar (S).

Mouflon bharal (F). Bharal (E).
نوع من الاراري موطنه جبال التيت وهضابها . يألف
المراعي المكشوفة البعيدة الاطراف . وهو ربع الجنة ،
كبير القرن غليظه عند الذكور ، دقيقه عند الاناث .
ثوبه الى الريدة الشهداء يميح عند ثييج الظهر ويبيض عند
البطن . اجله براوح من ٧ الى ١٠ انفار يقودها نيزب
مانع .

جدول النباتات الرحاقية

| اسم النبات | بالانكليزي | بالفرنسي |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| بَرْبَرِيْس ، عُوْدُ الرِّيح | Barberry, Pipperidge | Berberis, Epine vinette |
| إِبْجَاص ، كُمُتْرِي | Pear tree | Poirier |
| أَخْذَرِيَّة | Evening primrose | Aenothère, Enothère |
| أَحْيُون | Viper's bugloss | Vipérine |
| أَذْرِيُونُ الْعَاء ، مُرْعُوْس | Water butter-cup | Populage, Calthe |
| أَرَلِيَّة | Angelica tree | Angélique sauvage |
| أَرَسِيْمُون | Burdock | Bardane |
| أَرَسِيْمُون | Erysimum | Erysimum, Vêlar |
| أَسْطَر ، نَجْمِيَّة | Starwort | Aster |
| أَقَاقِي ، دُنْدُرَان | Tufted vetch | Vesce craque |
| أَيْبَغُطْس | Epipactis | Epipactis, Héléborine |
| أَكُونِيْت ، يَشْر ، أَثَلَه | Aconite | Aconit |
| أَكُونِيْت ، مُسَمَّكَة بَنَاقِيَّة | Japan medlar | Néflier du Japon, Bibaciar |
| أَكِيلَاجِيَا ، كُولْمَبِيْن | Columbine | Ancolie, Colombine |
| إِبْرُوس ، كُرُونِيَّة | Coronilla | Coronille |
| أَنْشُورَة | Bugloss | Buglosse |
| بَاقِيَّة ، يَنْقَة | Common vetch, Lints | Vesce, Pasquier |
| بُؤْلَا ، سُنْدُر | Birch | Bouleau |

| اسم النبات | بالانكليزي | بالفرنسي |
|---|------------------------------|-----------------------|
| بَرْيَلَا ، بَرْيَلَة | Common pea | Petit pois, Pois vert |
| بَسَلَة بَرْيَة | Wild pea | Pois sauvage |
| بَصَل | Onion | Oignon |
| بَقْلَاط ، جَنْجَر ، شَيْطَ العُول | Knot-grass | Renouée des oiseaux |
| بَطِيخ ، جَنْبَس | Water-melon | Pastèque |
| بَقْس ، شَمَشَاد | Box tree | Buis |
| بُنْدُق ، جَلُور | Hazel-tree, Filbert | Noisetier, Coudrier |
| بُورْقِيصَا ، دُودَار ، غَرْغَاء | Elm-tree | Orme |
| بُرْمُس | Lupine | Lupin |
| بُرْنَجَان ، حَشِيشَة النَّحْل | Bee-balm | Mélisse |
| بُرْنَسَاه ، بُرْنَسَان | Blue-bottle, Bachelor button | Bleuet, Aubifoin |
| بُقَاح | Apple-tree | Pommier |
| بُتُوب | Fir-tree, Silver fir | Sapin |
| جَرْجِير ، رُكَّة ، بُهَّان | Rocket | Roquette |
| جَرْجِير بُرِّي ، بُهَّان | Wild rocket | Roquette sauvage |
| جَلِيَان | Vetch | Gesse |
| جُنْجُل ، حَشِيشَة الدِّيَنَار | Hop, Bine | Houblon |
| جُولِيَانَا | Gilliflower | Julienne |
| جِيرَانِيُوم ، غُرُوق | Geranium, Shepherd's needle | Geranium, Gêranier |
| حَرْفِ العَمَاء | Buck's horn | Sénébière |
| حَشِيشَة الرِّقَّة | Lung-wort | Pulmonaire |
| حَشِيشَة السَّعَال ، دُوسَة الجِمَار ، قُرْقَارَة | Cough-wort | Tussilage |
| حَشِيشَة المَلَاك | Angelica | Angélique |
| حَصَا البَان ، اِكْلِيلِ الجَبَل ، نَدَى البَحْر | Common rosemary, Oldman | Romarin, Encensier |
| حَضَض ، غُرْقَد ، اُطَد | Boxthorn | Lyciet |
| حَلَالَاب | Hare's-ear | Buplèvre |
| جَنْجَم | Borage | Bourrache |
| جَنْبَس | Chick-pea, Gram | Cicérole, Pois chiche |
| حَنْبَل ، قَاصُولِيَاء | Kidney-bean | Haricot |
| حَنْدُوق | Sweet-clover | Mélilot |
| حَوْد (جميع الأنواع) | Poplar | Peuplier |
| حَمِي العَام ، حَيُون ، وَدَنَة | Orpine, Stonecrop. | Orpin, Sedum |
| حَبَّازِي ، حَبَّازَة | Mallow | Mauve |
| حَرْبِق | Hellebore | Hellébore, Ellébore |
| حَرْدَل | Mustard | Moutarde, Sénévé |
| حَرَام | Reseda | Réséda |
| حَرَامِي ، لَافَنْدَة | Lavander | Lavande |
| حَلْتَج ، شَنْطَلَف | Heath, Heather | Bruyère |
| حَلُود ، عَمِير | Jupiter's beard | Joubarbe |
| حَنَازِيرِيَة | Figwort | Scrofulaire |
| حَوْمَج | Prune tree, Plum tree | Prunier |
| حَمِيَار ، قَدَد | Cucumber | Concombre |
| حَمِيرِي ، مَشُور | Stock, Gilliflower | Giroflée |
| دَبَاب ، نَعْنَع الحَقْل | Pudding grass | Pouliot |
| قَبِيع | Scorzonera | Scorzonère |

| اسم النبات | بالانكليزي | بالفرنسي |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| دُمُرَج | Spurred vetch | Vesce éperonnée |
| دُرَّاقِي، دُرَّاق، بُرْمِك | Peach tree | Pêcher |
| دَقَّة حُود الغار | Spurge laurel, Dwarf bay | Daphné lauréele |
| دِيحَنَال، زَهَر الكَثَائِيْن، مُعَيَّة | Finger flower | Digitale, Gautelet |
| رَاسٌ دَقِي، طَبَاق، طَبُون | Rock flea-bane | Inule conyze |
| رُيْدَان، رَجُل المَصْفُور | Bird's-foot | Ornithope |
| رَعْرَاع | Common flea-bane | Pulicaire |
| رَبْعِي الحَمَام | Vervain | Verveine |
| رُوبِيَّة شَيْثِيَّة، سُنَط كَاذِب | Locust acacia, False acacia | Robinier faux-acacia |
| زَبَاد، زَبَاوِي، سَحَاء | Starwort | Pallénis, Petit mugue |
| زَفِيرِيْن | Alaternus | Alaterne |
| زَوْفَا، جِسْمِي، حَسَل | Common Hyssop | Husope officinale |
| زُرْبُون | Linden | Tilleul |
| بَيْت الحُسْن، بِلَادُون | Dwale, Banewort | Atrope, Belladone |
| سَرْتَه . (لِسَان المَصْفُور) | Hony wort | Cêrinthe, Mélinet |
| سُرُو | Cypress tree | Cyprès |
| سَطَاقِيْس، سَطَاقِيْس | Stachys | Epiaire |
| سَمَرْجَل | Quince tree | Cognassier |
| سَمَقْدَر لَاصِع | Knee holly | Fragon piquant |
| سَلْسَقِيل | Salsify | Salsifis |
| سَمَارَة، تَوْدَرِيَج، فِجُل الجَمَال | Hedge mustard | Sisymbre |
| سَمِيْسَم | Common ling | Callune vulgaire |
| سِيْدِيَان | Oak tree | Chêne |
| سُنَط | Acacia | Acacia |
| سِيْسَارُون | Skirret | Chervis |
| سِيْسَم | Snapdragon | Muffier |
| سِيْث، سِيْث | Anet, Dill-seed | Aneth, Fenouil bâtard |
| شَكَاغِي، أَفْسُون | Scotch thistle | Onoporde |
| شَمَار . شَمَرَة . شُونَار | Fennel | Fenouil |
| شَمَام | Melon | Melon |
| شِيْدَاب | Eryngo | Panicaut, Erynge |
| شُوك، شَهِيَاء | Thistle | Chardon |
| شُوك الجَمَال | Globe thistle | Cardère |
| شُونِيْر، شِيْنِيْر | Black cumin | Nigelle |
| ضَرِيْمَة الجَدِي | Caprifoly | Chèvrefeuille |
| صَفَر، صَفَر (جَمِيع الانواع) | Thyme & Marjoram | Thym et Origan |
| صَفَصَاف، سَوَحْر | Willow | Saule |
| صَفِيْرَاء | Sophora | Sophora |
| صَفْلَاك | Silk cotton | Asclépiade |
| صَوْنُوْر | Pine-tree | Pin |
| صَمْعَة | Echinops | Echinopse |
| صَمِيْرَان، نَعْنَع اللاء | Water mint | Menthe aquatique |
| طَرِيْمَقُون، هِيْدَب | Blow-ball | Pissenlit officinal |
| طَوْرَقِيُون | Germander | Germandrée |
| طَبْطَان، كَرْمَات البَر | Crow garlic | Porette |

| اسم النبات | بالانكليزي | بالفرنسي |
|--|---------------------|----------------------|
| طَبَخْ ، بُوَيْشِيَّةُ الدِّينِ | Holly, Christmas | Houx commun |
| طَقْرَاءُ ، نَمْنَعُ بَرِّي | Wild mint | Menthe sauvage |
| عَالِقُ | Delphinium | Dauphinelle |
| عَرَاوِقُ | Spiraea | Spirée |
| عَرْنُ ، سَفُونُ ، سَلَّةُ زُرَاعِيَّةِ | Holy clover | Sainfoin, Esparcette |
| عَسَلِيَّةُ ، زَعْفَرَةُ الْعَسَلِ | Honey flower | Mélianthé |
| عَشَقَّةُ | Ivy | Lierre |
| عَصَا الرَّاعِي ، قُرْدَبُ | Persicaria | Persicaire |
| عِثَازُ | Lily grass | Butome |
| عَوَسَجُ | Bramble | Ronce |
| غَبِيرَاءُ ، صَرَبَةٌ | Service tree | Sorbier |
| غَعَثُ | Eupatorium | Eupatoire |
| فَاشِرَا ، فَاشِيرُ ، فَسُ | Bryony | Bryone |
| فَرَاثِيُونُ ، بَادَاوَرْدُ | Horehound | Marrube |
| فَرُثِيُونُ ، يَنْوَعُ ، عُنْجَدُ | Spurge | Euphorbe |
| فَيْصَةُ ، فَيْصِيصَةٌ ، قَضْبُ | Lucern | Luzerne |
| فَيْصِيَّةُ مَنِيْرِيَّةُ | Silver tree | Protée mellifère |
| فُودَسَجُ | Wild marjoram | Fausse marjolaine |
| فُولُ ، بَابِلْجِي ، جُمِي | Broad bean | Fève |
| فِينُومَةُ ، فُونُومَا | Rampion | Raiponce |
| فِيرُونِيكَا | Veronica | Veronique |
| قَتَا ، فَيْصَةُ بَرِّيَّةِ | Sea hedgehog medick | Lazerne sauvage |
| قَرَطْمُ ، إِخْرِيشُ ، بَهْرَمُ ، مَرِيْقُ | Safflower | Carthame |
| قَرَعُ | Gourd | Courge |
| قَرَاوُسُ ، قَرَانِيَا | Cornel-tree | Cornouiller |
| قَسْوَانُ | Horse-thistle | Cirse |
| قَضْبُ الدَّهَبِ ، عَصَا الدَّهَبِ | Golden-rod | Solidage, Verge d'or |
| قَلَّاحُ | Self-heal | Brunelle |
| قَطِيطُ ، قَرْنِيطُ | Cauliflower | Chou-fleur |
| قَنْدَلُ | Horse-chestnut-tree | Marronnier |
| قَطْرِيُونُ ، قَطَارِيُونُ | Centaury | Centaurée |
| قَنْفُولُ | Canavalia | Canavale |
| قُوَيْسَةُ ، قُوَيْصَةُ ، نَاعِيَّةُ | Sage | Sauge |
| قَيْبُ ، أَسْفَنْدَانُ | Maple-tree | Erable |
| كَأَوَشِيرُ ، جَرْدُ بَرِّي | Opopanax | Opopanax |
| كَرَاتُ مَعْرُوفُ | Leek | Poireau |
| كَرَرُ | Cherry tree | Cerisier |
| كَرْسِيَّةُ | Ers, Ervil | Ers, Ervillier |
| كَرَلِينُ | Carlina | Carlina |
| كَرْبُ | Kohl-rabi | Chou-rave |
| كَسْبِيَّةُ ، قَسَلَّةُ ، شَاةُ بَلُوطُ | Chestnut-tree | Châtaignier |
| كَشِيشُ | Currant-bush | Groseillier |
| كُشِّي | Bitter vetch | Orobe |
| كُحْلَةُ مَدَادَةٍ ، لَبْلَابُ الْأَرْضِي | Ground ivy | Gléchoime hédéracé |
| كُتْنَسُ | Gypsophila | Gypsophile |

| اسم النبات | بالانكليزي | بالفرنسي |
|---|-----------------------|-------------------------|
| كُوسَى | Vegetable marrow | Courgette |
| كُوسَى | Pibughman's spikenard | Conyze |
| لَارِيْس ، مَرْ | Common larech | Larix |
| لُرْآن | Broom | Cytise |
| لِسَانُ الْكَلْب ، آذَانُ الْأَرَوْب | Gipsy flower | Cynoglosse |
| لِفَتْ | Rape | Rave, Navet |
| لُثَام ، نَعْنَعْ أَخْضَر | Spearmint | Menthe verte |
| لُؤْيَاء | Black eyed delichos | Dolique |
| لُؤْز | Almond tree | Amandier |
| لُؤْلُؤِس ، لُؤْلُؤِس | Lotus | Lotier |
| لُيُون (جميع الأنواع) | Citrus | Citrus |
| لِيْنَارِيَّة ، حَبَاب | Linaria | Linnaire |
| مَازَرْيُون ، أَثْم ، دَقَّة سَاة | Mezereon | Daphné mézérèon |
| مَحَلْب | Parfumed cherry | Mahaleb |
| مَرْن ، لِسَانُ الْعُشْفُور | Ash-tree | Frêne |
| مَرْغَابِيلَا ، رِجْمُ الْإِبِل | Echinops | Echinope |
| مُشَط الرَّاغِي ، شَوْك الدَّرَاج | Teazle | Cardère à foulon |
| مُشْمُوش | Apricot tree | Abricotier |
| مُشْمَلَّة | Medlar tree | Néflier, Merlier |
| مُشْرِقِيَّة | Melick | Métique |
| مُطْفُوف ، كُرْتَب ، لَحْتَة | Cabbage | Chou |
| نَارِيَيْن ، سُبُل | Valerian | Valériane |
| نَبِي | Alder | Nerprun |
| نَد ، حَبِيرَاء | Willow-herb | Epilobe |
| نَدَاف | Savory | Sarriette |
| نَعْنَع | Mint | Menthe |
| نَعْنَع الْبَر | Cat-mint | Calament |
| نَقْل | Clover | Trèfle |
| هَذَال | Common mistletoe | Gui |
| هَرَنْبِيَّة | Heracleum, Parsnip | Berce |
| هَلِيُون | Asparagus | Asperge |
| هِنْدِيَاء | Endive | Chicorée endive |
| وَبِيرَة | Phacelia | Phacélie |
| وَرْدَال ، جُنْدَح ، جُونُك | Furze | Ajone |
| وَسْمَة الصَّابِغِيْن | Woad | Guède, Pastel |
| وَسْمَة حَمْرَاء | Red spur-valerian | Centranthe rouge |
| يَاسَم ، فُؤ ، وَنَاقِيَة | Privet, Privy | Troène, Prune |
| يَعْقِيْد ، يَنْصِيْفِص | Lion's tooth | Léontodon, Dent de lion |
| يَعْقِيْقِيْن أَقْرَع ، قَاوُون الْبِير | Squash | Pâtisson |

النافعة الصالحة لتطبيب . النباتات الطبية كثيرة العدد ،
معظمها مشهور وبعضها لا يزال في دور التمييز
الاختباري || أشهر هذه النباتات ما جاء في الجدول التالي.

Plante médicinale (F).
Medicinal plant (E).

٢٨٤١٨ - نَبَاتَات طَبِي

النباتات الطبي كل نبات حوى بعض العناصر الفعالة

جدول النباتات الطبية

| التحليل | النبات |
|--|--------------------------|
| عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها عطرية صفراء اللون | أبست، شبح رومي |
| عشبة معمرة مفضلة الساق. اوراقها مفصصة. ازهارها قليلة العرف باهنة الصفار | أبست بحري |
| عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة مشطية. ازهارها الى البياض الوردية | أخيليا أم آلف ورقة |
| عشبة معمرة فرعاء. جذرها عسقلي. ازهارها وردية كبيرة صفراء اللون | أدونييس ربيعي، عين الثور |
| عشبة حولية فرعاء. اوراقها ريشية خملية النصال. ازهارها صغيرة | أديون عذري |
| جنية معمرة فرعاء. اوراقها كلية النصال. ازهارها عطرية زرقاء. ثمارها صغيرة كالفلفل | إرث، سراسد |
| عشبة معمرة، اوراقها كبيرة مفرصة ومشرمة، ازهارها رئيسية طرفية | أرضي شوكي، خرشوف |
| جنية معمرة متسلقة. اوراقها عروبة سنانية. ازهارها بوقية عطرية صفراء | أرطاة، ياسمين اصفر |
| عشبة معمرة غشوشية الساق. اوراقها سنانية. ازهارها رئيسية خضراء | أرطاسية جليلة |
| بجلة حولية. اوراقها كبيرة قلبية. ازهارها ارجوانية. تتميز بجنتها الغليظ | أرقطيون |
| عشبة معمرة مستغلظة الجذر. اوراقها سنانية. رؤسائها الزهرية الى الصفار البرتقالي | أرنكا جليلة، زهرة العطاس |
| عشبة دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب سهمية كبيرة. ضبتها صفراء المواج | أروم، ترياق ابيض |
| عشبة دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب ثلاثية الوريقات. ضبتها موشحة | أروم ثلاثي الورق |
| عشبة جذمورية معمرة. اوراقها لحمية كلوية الشكل. ازهارها صغيرة ارجوانية | أسارون، ناردين بري |
| ضمة من الخيوط والحزم الفوقية سمراء اللون زيتية المواج | اشنة عمرية |
| عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها صغيرة بيضاء | اطريفل نخل |
| جنية معمرة فرعاء غليظة الازمولة. اوراقها مركبة. ازهارها الى الخضار الباهت | أقنى عفوفية |
| عشبة حولية. ساقها ضعيفة. اوراقها صغيرة مشرمة. رؤسائها الزهرية صفراء | أقمون حنين |
| جنية معمرة فرعاء. اوراقها صغيرة لينة. ازهارها زرقاء اللون | إكليل الجبل، حصا البان |
| عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها صغيرة وردية | أتاروف، انجار |
| عشبة معمرة او حولية. اوراقها لينة مستخشنة. ازهارها الى الزرقا البنفسجية | أنشوزة عذرية |
| عشبة حولية فرعاء. اوراقها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها يزور عطرية خضراء اللون | أنيسون |
| شجيرة فرعاء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها لوزية دهنية اللباب | أنيسون نجمي |
| شجرة ضخمة باسقة. اوراقها سنانية جامدة، بحرية الخضار | أوكالبتوس عريض الورق |
| جنية معمرة فرعاء. اوراقها اهليجية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل ثلاثية البذور | إيوجنة |
| عشبة معمرة متسلقة فرعاء. اوراقها مركبة خيطية. ازهارها رئيسية صفراء | بابونج عطر |
| عشبة حولية صغيرة. اوراقها ثنائية التظليل الريشي. ازهارها رئيسية صفراء | بابونج عطر |
| جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنانية جامدة النصال. ازهارها بيضاء اللون | باروسه بولينا |
| شجرة عديمة الفروع. اوراقها قلبية كبيرة سباعية التفصيص. ثمارها قرعية | بياط زراعي، دباء الهند |
| شجرة فرعاء. اوراقها قلبية كبيرة. ازهارها غبراء. ثمارها جوزية | بتولا بيضاء |
| جنية معمرة فرعاء. اوراقها يفسية جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها عجمية | بريريس، عود الريح |
| شجيرة شائكة فرعاء. اوراقها يفسية مسنة. ازهارها بيضاء. ثمارها خوخية | برقوق شائك |
| جنية معمرة فرعاء. اوراقها يفسية جامدة. ازهارها حمراء. ثمارها نووية جتوية | برتن عصبلي |
| عشبة صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها شمراخية. ثمارها يزور صغيرة | برقوقه، علة البراغث |
| عشبة حولية فرعاء. اوراقها صغيرة. ازهارها بيضاء او وردية ثمارها يزور صغيرة | بطاطا، شبط الفول |
| عشبة معمرة. اوراقها سنانية مسنة. ازهارها عطرية حمراء اللون | بطونيقا طيبة |
| عشبة حولية. اوراقها مركبة. وريقاتها ثلاثية التفصيص. ازهارها خضراء اللون | بقدونس |
| جنية معمرة. اوراقها صغيرة ابيدة جامدة. ازهارها وردية. ثمارها عنبية | بقس، ششاد اخضر |
| عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنانية مزغبة ومسنة. ازهارها صغيرة ليلكية | بقلة الأوجاع |
| عشبة جذمورية شمراخية. اوراقها مركبة خماسية. ازهارها بيضاء. بزورها دقيقة | بقلة الرئيس |
| جنية معمرة فرعاء. اوراقها كبيرة متموجة. ازهارها وردية. ثمارها عنبية | بلاذون، ست الحسن |
| شجرة معجزة الساق. اوراقها سنانية جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها قلبية لحمية مأكولة | بلاذر شرقي |

| الاجزاء الصالحة | المنافع والاستعمال |
|----------------------------|--|
| الأوراق والأزهار | مغلي الأوراق والأزهار ينشط الهضم والابلاع والطمث ويدفع الحثيات |
| الأوراق والأزهار | يستعمل مغلي الأوراق والأزهار كطارد للبدان. وينشط الهضم |
| الأوراق والأزهار | مستحباً مقو، منبه، مضاد للتشنج، ويفيد المدة والامعاء |
| العشبة برئتها | تنظم النبض، ترفع الضغط الدموي، تزيد ادرار البول |
| العشبة برئتها | تقيحها يسكن آلام الحصى. مستحب الأزهار يفيد العنة عند الذكور |
| الأزهار والثمار | الثمار محمّدة للقوة الجنسية. الأزهار والثمار هاضمة، طاردة للغازات وتدر البول |
| الأوراق وصلوعها | عصيرها يفيد الحفر والاستسقاء واليرقان واحتقان الكبد ويتر البول |
| الأرومة والجذور | مخففة للضغط الشرياني، تدفع الحمى والأمراض العصبية. استعمالها خطر لأنها سامة |
| اليزور والعشبة برئتها | مقوية تفيد الصدر والمعدة. مدرة للحيض |
| الحش والأوراق الغضة | خارجياً تفيد الأمراض الجلدية والدمامل. داخلياً منعشة ومقوية للدم |
| الأزهار والجذر | مضادةً للالتهابات والربو. تشفي جروح الاوعية الدموية |
| الدرن والأوراق الغضة | عصيرها سهل، ممتد للحصى الكلوية. استعمالها خطر لأنها سامة |
| الدرن والأوراق الغضة | من الداخل تفيد الربو والزلات الزمنية والعلل العصبية. من الخارج مضطمة |
| الجذامير والأوراق | تقيحها اوسحقوها سهل شديد الوقع. وتستعمل كمقيء |
| النبات برئته | يستعمل كطارد للدرور خاصة عند الأطفال |
| الأوراق | مقوية. تفيد المعدة. تدفع الحمى. تدر الطمث |
| الأرومة | مقوية للمعدة. تفيد الرقص الزنجبي والروماتيزم المفصل والنقرس |
| العشبة برئتها | مضادةً للتشنج. مطمئة. دافعة للحميات. طاردة للدرور |
| الأوراق العليا والأزهار | تقيح الأزهار ناعوظ. تقيح الأوراق يقضي على الصفراء. الأوراق والأزهار تنشط الاعصاب |
| | والذاكرة |
| الأوراق والأزهار والجذامير | قايضة نشيطة لا تضر الجهاز الهضمي |
| العشبة برئتها | معرفة ومنقية للدم. تفيد الأمراض الصدرية والحلقية |
| اليزور | مغلي اليزور ينشط الهضم ويسكن المعص ويزيل الانتفاخ ويتر البول |
| الأوراق والثمار | تستعمل استعمال الانيسون |
| الأوراق | مغلياً منمش، معرف، مضاد للحمى ويفيد العلل الرئوية والمسالك البولية |
| الأوراق والأزهار والثمار | مقوية للقلب، منعطة، مشهية |
| العشبة برئتها | تفيد المعدة وتطرد الغازات وتقوي الاعصاب. مضادةً للتشنج |
| الأزهار | مضادةً للتشنج. تدفع الحمى والريح. تقوي الاعصاب |
| الأوراق | مقوية. ناهضة، هاضمة. مدرة للبول |
| الثمار | عصارة الثمار قبل الادراك تخفف من سرعة خفقان القلب وتفيد الهضم والمعدة |
| الأوراق | اوراقها من الخارج تفيد الروماتيزم المعص والمفصل والنقرس. عصيرها يفيد الكل والكبد |
| الأوراق والثمار واللحاء | تفيد المعدة وامراض الرئة واليرقان |
| الأزهار والثمار | مستحب الأزهار يفيد التهاب المثانة وصعوبة التبول. عصير الثمار يفيد الرعاف وقروح الفم |
| الثمار | مستحب الثمار طاردة للدرور لاسيما الدودة الوحيدة |
| الأوراق والشجاريخ واليزور | مغليها يقضي على الامساك |
| العشبة برئتها | مغليها يقطع الاسهال ويفيد الهضم والجهاز البولي. التليخ باوراقها المهروسة يفيد القروح |
| الأوراق | دافعة للحمى وتفيد ضعف الاعصاب والطحال والكبد |
| اليزور والجذور والأوراق | تقيح اليزور يقي الدم ويتر البول. الجذور منبهة. والأوراق منهضة |
| الأوراق واللحاء والجذور | معرفة. دافعة للحمى. تفيد العلل العصبية |
| الجذامير والأوراق | مقوية للقلب والمعدة. مضادةً للتشنج. ضاد اوراقها يزيل الاوجاع |
| الجذامير | منبهة، منشطة، هاضمة وتفيد الربو |
| الأوراق والأزهار والجذور | مضادةً للتشنج والافرازات. تحمّد حذقة المين - مسحوق او صبغة |
| الثمار القويّة | تستأصل العنول والقويّة استعمالاً خارجياً |

| النبات | التحليل |
|----------------------------------|---|
| بلدس ، شجرة الكبد | شجرة صغيرة فراء. اوراقها بيضيه ابيدة جامدة. ثمارها كالبزورسركية مأكولة |
| يلسم مكّه | جنية معمرة فراء. اوراقها مركبة وثريّة. ورقانها صميكة. ازهارها غبراء اللون |
| بنّ | شجيرة فراء. اوراقها متقابلة ابيدة. ازهارها بيضاء عطريّة. ثمارها نويّة ثنائية الحب |
| بنج اسود | بجلة حوليّة. اوراقها مقرّضة كريمة الرائحة. ازهارها كبيرة. يزورها مقلطحة |
| بندق هندي | جنية معمرة داسية. اوراقها مركبة شفعية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل. يزورها كروية |
| بنفسج عطر | عشبة رملية معمرة. اوراقها قرصية الانتشابه معقّفة. ازهارها بنفسجية عطرة |
| بشّية البق، عود الخير | شجرة فراء. اوراقها جامدة ابيدة مسنّنة شاكّة. ازهارها صغيرة. ثمارها عنيّة |
| بشّية الشاي | شجرة كبيرة فراء. اوراقها بيضيّة. ازهارها صفراء اللون. ثمارها الى الحمرة |
| بوسير ابيض | عشبة ليغية حوليّة. اوراقها بيضيّة خملية البشرة. ازهارها عطريّة صفراء اللون |
| بولوغالي مرّ، حشيشة اللبن المرّة | عشبة حزميّة معمرة. اوراقها صغيرة رعيّة. ازهارها جلجلية زرقاء اللون |
| بيش ، أكويت هرمي | عشبة معمرة. اوراقها ريشيّة شديدة الخضار. ازهارها الى الزرق العاقبة |
| بيلسان اسود | شجيرة معمرة فراء. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة صفراء اللون |
| تاغست ، ملكة الحشائش | عشبة جلمونية معمرة. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة كبيرة بيضاء اللون |
| ترنجان | بجلة معمرة. اوراقها بيضيّة بارزة العروق. ازهارها بيضاء فواحة العبير |
| ترنشا | عشبة حوليّة. اوراقها ضيّقة النصال لانظاميّة. رؤسائها الزهرية زرقاء اللون |
| توت اسود، توت شامي | شجرة دالحة. اوراقها قليّة خشنة عابلة. ثمارها حسله جؤونة للبيدة الطعم |
| ثلثان حلومرّ | جنية معمرة متسلّقة. اوراقها معقّفة شديدة الخضار. ازهارها بيضاء بنفسجية المواج |
| ثوملا أكمله | عشبة حوليّة فراء. اوراقها قليّة بحريّة اللون. رؤسائها وردية |
| جرجير حقلي | عشبة حوليّة فراء. اوراقها شديدة التفرّض. ازهارها وردية. ثمارها يزور بجلة |
| جرومة ترسيّة | شجرة دماعة جوفاء الساق. اوراقها ترسيّة مفصّصة. ازهارها حامية صفراء |
| جزر الرعاة، دوقس | عشبة معمرة جنيّة الجذر. اوراقها مركبة ريشيّة. ازهارها صغيرة غبراء اللون |
| جكرنده بروسيرا | شجرة فراء. اوراقها مركبة ريشيّة. ازهارها كبيرة زرقاء اللون. ثمارها لحميّة مأكولة |
| جلاب | عشبة عسقلية متسلّقة معمرة. اوراقها قليّة. ازهارها كبيرة قرمزية. |
| جملج صنيّ | عشبة حوليّة مزغية فراء. اوراقها سنائيّة مسنّنة. ازهارها بيضاء مستحيّة العرف |
| جنجل شائع | عشبة معمرة عارشة. اوراقها مفصّصة. ازهارها وحيدة للسكن |
| جنس | جنية فراء مستغلطة الجذور. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها وردية اللون |
| جوز عادي | شجرة كبيرة دالحة. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها قذية. ثمارها مأكولة اللباب |
| جينكو | شجرة ضخمة دالحة. اوراقها مروحية مشقوفة. ثمارها لوزية لحميّة السؤذق جحاليّة |
| حبّ المسك | عشبة حوليّة زياء. اوراقها خاسية اوسباعيّة الفصوص. ازهارها كبريتيّة اللون. يزورها بلسيّة |
| حبّ معروف | عشبة حوليّة فراء. اوراقها لسنة منديّة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة كروية |
| حمرل | بجلة معمرة مدّادة. اوراقها مقرّضة ريشيّة التشرّيم. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة |
| حشيشة الحفر | عشبة معمرة فراء. اوراقها مستطيلة مقرّضة. ازهارها صفراء. يزورها دقيقة سمراء |
| حشيشة الحطاف | عشبة معمرة درنيّة الجذور. اوراقها قرصيّة مزرقية. ازهارها صفراء |
| حشيشة الالة المخزنية | عشبة معمرة لحميّة زياء. اوراقها رعيّة مزغية. ازهارها وردية لم بنفسجية |
| حشيشة التزجاج | عشبة معمرة فراء. اوراقها لسنة زياء. ازهارها خضراء اللون |
| حشيشة السعال، فرفارة | عشبة جلمونية معمرة. اوراقها قليّة مزغية. ازهارها صفراء اللون |
| حشيشة القراز | عشبة حوليّة فراء زياء. اوراقها بيضيّة مزغية. ازهارها بيضاء اللون |
| حشيشة اللامق | عشبة حوليّة صغيرة. اوراقها ملحيّة الشكل درماء النصال. ازهارها بيضاء |
| حشيشة الملاك | عشبة معمرة فراء. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها بيضاء اللون. يزورها بمحّة |
| حشيشة مباركة | عشبة جلمونية معمرة. اوراقها القرصية ريشيّة اما العليا مفصّصة. ازهارها برتقالية اللون |
| حلبة روميّة | عشبة حوليّة. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. ثمارها حنابل. يزورها شبه كروية |
| حلبوب حولي | عقّة حوليّة صغيرة. اوراقها سنائيّة. ازهارها خضراء اللون |
| حمحم عرنيّ | عشبة حوليّة زياء. اوراقها سنائيّة خشنة. ازهارها زرقاء اللون |
| حميض الحقل | عشبة معمرة فراء. اوراقها سنائيّة مستطيلة داكنة الخضار |
| حميض زراعي | عشبة معمرة فراء. اوراقها رعيّة قائمة الخضار. ازهارها خضراء اللون |

| الاجزاء الصالحة | المنافع والاستعمال |
|----------------------------|--|
| الأوراق | تستعمل في علاجات الكبد، مقوية، هاضمة |
| صمغ يستخرج بالحز من الساق | يسكن السعال، يقوي المعدة |
| الحب | مسحوق الحب المحمص ومغليه ينضج الاعصاب |
| الأوراق والبيزور | مسحوقها او صيتها منومة، مضادة للتشنج، تقيد للمغص الكلوي، تمدد حدة العين |
| الأوراق والبيزور | مغليها مقو، مضاد لنوبات الحمى المتقطعة |
| الازهار والأوراق والرواكب | تقيع الازهار الجافة لعاني وينفع الصدر والسعال. الأوراق والرواكب مقوية |
| الأوراق | تقيع الأوراق او مغليها يقيد الرشح المستعصي |
| الأوراق | مغلي الأوراق الجافة منضج وعاضم |
| الازهار | مستحلب الازهار يقطع السعال الجاف والتهاب الحنجرة. صيتها تنفع التهاب الجفون |
| الجذور والأوراق والازهار | مغليها ينشط دَر اللبن عند المرضع. مضادة للسعال. تقيد المغص |
| الأوراق والازهار والجذور | الصبيغة والمستحلب المؤثر مسكن نشيط. يدر البول، مضاد للاحتقان |
| الأوراق واللحاء | مغليها يقيد التلات الصدرية والتهاب اللوزتين والصداغ |
| الجذور | مسحوقها منضج، معرق، يساعد المغص، يدفع الريح ويدر البول |
| الأوراق | مغليها منبه، يقيد الآلام العصبية والصداغ |
| الازهار | تقيعها يقوي العين ويغضي على الرمذ |
| ثمار | عصيرها قابض. يقيد المعدة والأمعاء |
| الفروع المحولة | مسحوقها الجاف يقيد الامراض الرئوية والعصبية والقرص |
| الأوراق | عصيرها ينشط افراز اللعاب ويقيد اللثة وفساد الدم |
| الأوراق والبيزور | عصير الأوراق منضج ومضاد للحفر. مسحوق البذور نافع وينشط الباه |
| الأوراق والجذور | مغليها يقيد الربو والاستسقاء وامراض الكبد |
| الجذور والبيزور | مغليها منضج نشيط. يقيد المستيريا، يدر البول |
| الأوراق واللحاء | اوراقها تقيد الأمراض الجلدية. اللحاء معرق ومدرة للبول |
| العسافل | مسحوق العسافل سهل فكال |
| العشبة برستها | مغليها يقيد التشنج الربوي ويقيد الربو والتهاب الحنجرة |
| للمخاريط الاثوية | مغليها يسكن الاعصاب والاعماظ. مضاد للحفر والامراض الجلدية |
| الجذور | مسحوقها منضج نشيط او شاي حسب الاستعمال. لا يسيء الى الجهاز العصبي. |
| الأوراق وقرقة ثمار الخضراء | مغلي الأوراق يقيد الآفات الجلدية. صبة قرقة ثمار منهضة |
| البيزور | طاردة للدود |
| البيزور | مستحلبها مضاد للتشنج |
| الأوراق والازهار | مغليها مقو، منبه، هاضم، يزيل الصداغ، مضاد للتشنج |
| البيزور | مسحوقها ومغليها يدر الطمث ويغضي. استعمالها عطر يوجب الحذر |
| الأوراق والازهار | مغليها دواء للحفر ومضاد للسعال. تقيعها يقيد البحة والتهاب الحنجرة |
| العشبة برستها مع الجذور | تستعمل في معالجة البواسير ممزوجة ببعض المساحيق او المرهم |
| الساق والأوراق | مغليها يقيد الصدر والالتهابات الشعبية والرئوية |
| العشبة برستها | مغليها ملين ويدر البول |
| الأوراق والازهار | مستحلبها مضاد للسعال والتهاب الحنجرة |
| العشبة العفصة برستها | مستحلبها يقيد ضعف القلب ويغضي على التلات الصدرية الخفيفة |
| العشبة برستها | شرايبها او صيتها منشطة، محرقة، مضادة للحفر، مقوية للدم، تدر البول |
| الجذور | مغليها يقيد الجهاز التنفسي والمعدة ويقطع المغص |
| الجذور | مغلي المسحوق يقيد القلب والدماغ والذاكرة والاعضاء التناسلية |
| البيزور | مغليها يقيد الالتهابات الرئوية والاسماك والبواسير وينشط السنة |
| الأوراق | مغليها ملين وسهل |
| الأوراق والازهار | مغليها معرق، يدر البول، مضاد للسعال والامراض الصدرية وألمعصية |
| الجذور والأوراق | مغليها مقو، يقي الدم، يقيد الامراض الجلدية |
| الأوراق | عصاريتها منهضة، تنقي الدم، تغضي على الاسماك |

| النبات | التحلية |
|-------------------|---|
| حنطوق حقل | عشبة حولة فرعاء. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها صفراء اللون كثيرة العدد |
| حنظل | عشبة حولية مدادة. اوراقها كبيرة خشنة مزغبة. ازهارها صفراء. ثمارها قرعية |
| خب الرمال | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها عصبية حشوة البشرة مهدبة الحار |
| خيارة برية | عشبة ليفية حولية او حولة. اوراقها مفصصة. ازهارها بنفسجية كبيرة |
| خيزرة عذرية | عشبة ليفية معمرة. اوراقها ثلاثية او خماسية القصوص. ازهارها وردية |
| خلدرة، رجل الذئب | عشبة معمرة. اوراقها خيطية متراكبة. ازهارها غبراء متبلة التجميع |
| خربق اسود | عشبة صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة وثرة. ازهارها بوقية بيضاء اللون |
| خربوق ابيض | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنائية زباء. ازهارها بيضاء يعلها موج اخضر |
| خردل اسود | عشبة حولية فرعاء. اوراقها كبيرة زباء. ازهارها صغيرة صفراء. بزورها دقيقة |
| خرز الصخور | من النباتات الدنيا. جامد البشرة. يعيش في المواد المعوية على الصخور الرطبة |
| خروب هندي | شجرة داحلة. اوراقها مركبة وثرة ايده. ازهارها خضراء اللون. ثمارها قرنية كثيرة البذور |
| خزامى عذرية | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها لسنة خيفة خيطية. ازهارها زرقاء اللون |
| خشخاش ابيض | عشبة حولية عشوشية الساق. اوراقها جذعية مقرضة. ازهارها كبيرة. ثمارها جراء |
| خشخاش اعلى | عشبة حولية صغيرة حشفة. اوراقها مقرضة. ازهارها كبيرة حمراء. ثمارها جراء |
| خلقة | عشبة حولية فرعاء. اوراقها مركبة مشرنة. ازهارها عطرية بيضاء اللون |
| خلود السطوح | عشبة لحية معمرة عادمة الفروع. اوراقها لحية قرصية الانتشاب. ازهارها الى الحمرة الوردية |
| خلولجان عذري | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها بيضاء اللون |
| دازي رومي | عشبة معمرة. اوراقها الحليلية كثيرة الجيوب المدببة. ازهارها صفراء. ثمارها جراء |
| دكمون ابيض | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة وثرة. ازهارها بيضاء مقلعة بالارجواني |
| دند اللوك | جنية معمرة. اوراقها اصحية مقرضة. ازهارها غبراء. بزورها شبيهة بزور الخروع |
| ديجنال ارجواني | عشبة حولية ليفية سرحة. اوراقها يهية. ازهارها قمية ارجوانية |
| ديش مشوك | شجرة صغيرة فرعاء. اوراقها مركبة وثرة عطرية. ازهارها خضراء اللون |
| ذرة صفراء | عشبة حولية متصبية. اوراقها عصبية سنائية مستطيلة |
| ذقة، زين الوادي | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها جملجية بيضاء |
| راسن طهي | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها قلبية كبيرة. رؤسائها الزهرية صفراء اللون |
| راوند عذري | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها كثيرة خضراء اللون |
| ريوق | جنية معمرة. ساقها شائكة فرعاء. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها بنفسجية او بيضاء |
| رجل القط الشائع | عشبة معمرة جنتية الجذر. اوراقها ملوقة. ازهارها رؤسية |
| رصاصية اريوية | بجلة فرعاء. اوراقها ملعقة مسنة. ازهارها بوقية بنفسجية |
| رعي الحمام المخزي | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها يهية مقرضة الحواشي. ازهارها عطرية وردية اللون |
| رمان | شجرة معمرة فرعاء. اوراقها رعية. ازهارها ارجوانية. ثمارها كروية |
| زداع شايين | جنية معمرة فرعاء. اوراقها جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها حبة. بزورها مستطيلة |
| زراوند لعباني | عشبة عارشة معمرة. اوراقها كبيرة رعية. ازهارها بوقية غبراء اللون |
| زراوند فطاني | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها قلبية. ازهارها قمية صفراء. ثمارها كمار |
| زرنيك فيرجية | شجيرة داحلة. اوراقها سنائية النصال الجامدة. ازهارها صفراء اللون عطرية |
| زعرور شائك | شجرة فرعاء شائكة. اوراقها مفصصة مسنة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية |
| زعران عذري | نبات دوفسي حولي. اوراقه خيطية ضمية. ازهاره عطرية |
| زعدة عذرية | عشبة لحمية معمرة. اوراقها سنائية قرصية الانتشاب. ازهارها جرسية. ثمارها حبة |
| زنجبيل عذري | عشبة جذمورية عقداة. اوراقها كبيرة سنائية. ازهارها صفراء برتقالية البتلات |
| زوقا | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها عطرية سنائية. ازهارها عطرية عديدة الالوان |
| زيزوفون | شجرة كبيرة. اوراقها معلقة قلبية. ازهارها عطرية تبنة اللون |
| سزيكوس ابناس | جنية عارشة معمرة. اوراقها يهية. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية |
| سداب عذري | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة مقرضة. ازهارها فستقية اللون |
| سرخس ذكر | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها كبيرة مستطيلة. مرجنتها حرشمية |
| سرفل بقلي | عشبة حولية فرعاء. اوراقها مركبة شديدة التفريض. ازهارها بيضاء بزورها صغيرة |

| الاجزاء الصالحة | النافع والاستعمال |
|-----------------------------|---|
| الأوراق العليا والأزهار | مغليا قابض، مضاد للسعال. مرهم العنبة الغضة يحل الورم الجامد |
| لب الخمار | سهل شديد الروع. لا يستعمل إلا بأمر الطبيب |
| الجذمور | مغليه مرقق ويدز البول ويفيد الروماتيزم |
| الساق والأوراق والأزهار | مغليا مضاد للسعال ويفيد النزلات الصدرية والتهاب اللوزتين |
| الأزهار والجذمور | مغليا مسكن للسعال والأمراض الصدرية وحرقة البول. غرغرة في التهاب اللوزتين |
| الطلع | مضاد لداء المفاصل والصرع والتفتة. يفيد الاكتزما الرطبة عند الاطفال |
| الجذور | مغليا سهل عنب، مطعش، طارد للذود |
| العنبة برنتها | مغليا يفيد التقرس ويسكن الآلام العصبية |
| البزور | مغليا حريف، نافع، مرقق، ينه الهضم والقلب |
| النبات برنته | مسحوقه ومغليه مضاد للتقيء، مقه، يفيد الصدر |
| لباب البزور | تقيحها ومستحلبا ملين يناسب الاطفال |
| الأوراق والأزهار | مغليا يسكن الأعصاب ويفيد اضطرابات المعدة |
| عصارة الساق والجراهم | مغليا يخدر الأعصاب او يسكنها |
| عصارة الساق | مسكنة، مرققة، تفيد السعال الديكي. مؤنة |
| البزور | مغليا مقو، مضاد لداء المفاصل، يفيد الهضم ويدز البول |
| عصير الأوراق | يفيد القروح والسمامير والتآليل والتهاب اللثدي |
| الجذمور | مسحوقه منقطع شاق اذا قمع في الحليب. مغليه يفيد المعدة والمغضم ويطرد الغازات |
| الأوراق والأزهار | تلم الجروح وتنفي الحروق وتوقف بصر الدم وتفيد الصرع العصبي |
| الجذور | مغليا مضاد للصرع، مرقق، طارد للذود |
| الساق والأوراق والبزور | القليل منها مغلي ملين عمود |
| الأوراق | مغليا يقوي القلب وينظم خفقانه. استعمالها خطر لأنها سامة |
| للحاء والأوراق | مسحوقها ومغليا منبه، منفض، يفيد داء المفاصل ووجع الاسنان |
| شوشة الغرنوس | مغليا يفيد التهابات الكلى والمبولة |
| الأزهار | مغليا ينشط القلب ويخفف سرعة النبض ويفيد العدة الدرقية |
| الجذور | مستحلبا مقو، منبه، مرقق. مغليا يشفي الجروح والقروح |
| الجذمور | الجرعة الصغيرة من التقيع تقوي المعدة وتفيد الهضم. الجرعة الكبيرة سهلة |
| الأوراق | مغليا مسكن وملين |
| الأزهار | مغليا مضاد للسعال وملين |
| الجذور | مسحوقها ومغليا انتيبيرتيك. يفيد وجع الاسنان والجرب والقروح |
| الأوراق والأزهار | مستحلبا يفيد الرنم والضمف واحتقان الكبد. مغليا يفيد التهاب اللوزتين |
| الأزهار ولحاء الجذور | مغليا طارد للذود. استعمالها حذر |
| الأوراق والأزهار | القليل مقو الكبير سهل. تستعمل مغلية |
| الجذور | مسحوقها ومستحلبا وتقيحها مقو، منفض، مرقق. وتفيد الربو |
| الجذور | مسحوقها مطعش. تقيحها ومغليا مقو، ويفيد القروح والدمامل |
| لحاء الجذور والساق | مغليا يفيد المرارة ويدز الصفراء والبول |
| الأزهار والثمار ولحاء الساق | مستحلب الأزهار وصيبتها مسكنة للقلب وبحقفة لضغط الدم |
| الأزهار والبصلة | مغليا يفيد المعدة، مطعش ومنبه نشيط |
| الأزهار والجذمور | مغليا مضاد للسعال والتشنج. يفيد الآلام العصبية |
| الجذمور | مسحوقها ومغليا محرص، منقطع، مقو، هاضم، طارد للغازات |
| الأوراق والأزهار | مغليا منش، يفيد الصدر، يقطع السعال |
| الأزهار | مستحلبا يفيد الزكام الحفنز والنزلات الشبيهة والسعال |
| الثمار والبزور | القليل القليل من مسحوقها منشط ناهض. استعمالها خطر لأنها سامة |
| الأوراق | تقيحها ومغليا نافع، خافض للحرارة. مضاد للتشنج، يدز الطمث |
| العنبة برنتها | مغليا يفيد آلام الظهر والعلل العصبية والصداع وينفضي على الدودة الوحيدة |
| الأوراق | مغليا هاضم، ينقي الدم، يلين المعدة، يدز البول |

| النبات | التعليق |
|----------------------|---|
| سرو شائع | شجرة منتصبه رفيعة. اوراقها فلسية عايقه الخضار. ثمارها اكراز كروية |
| سعر البز | عشبة معمرة. اوراقها اهليلجية خملية النصال. ازهارها وردية |
| سفابل | عشبة دوفصية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب عصفية. ازهارها ارجوانية |
| سفرجل | شجرة عارشة الاغصان. اوراقها خملية النصال. ازهارها وردية. ثمارها كروية صفراء |
| سفندر لاسع | جنية معمرة فرعاء. اوراقها رداثن جلدية النصل. ازهارها خضراء. ثمارها عنبية |
| سكب الغرب | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها كلبية مفصصة. ازهارها وردية |
| سكع | عشبة عسقلية حصصية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب قلبية. ازهارها زنادية عطرة |
| سحفرطان مخزني | بجلة معمرة فرعاء. اوراقها سنائية خشنة. ازهارها انبوبية ملونة |
| سمسيم | جنية معمرة. اوراقها صغيرة ابيدة. ازهارها ليلية اللون |
| ستا سوري | جنية معمرة. اوراقها مركبة شفعية ريشية. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبططة |
| ستا مكجي | جنية معمرة. اوراقها مركبة شفعية ريشية. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبططة |
| ستادان مرتد، دور | شجرة كبيرة هرمية الشكل. اوراقها معتقة مفصصة. ثمرها محبب الحراشف الصغيرة |
| سورنجان الخريف | عشبة دوفصية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب ضيقة مستطيلة. ازهارها ليلية كبيرة |
| سوس مخزني | جنية جذمورية معمرة. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها زرقاء. يزورها مستديرة مفلطحة |
| سوسن ابيض | عشبة ارمولية معمرة. اوراقها مستطيلة منجلبة. ازهارها كبيرة فيا الالبيض والازرق والاصفر |
| سولع مخزني، ألوة | عشبة ارمولية لحمية معمرة. اوراقها لحمية ليفية منتصبه سنن الحنار |
| شامرنج مخزني | عشبة حولية لحمية فرعاء. اوراقها مركبة مفرصة. ازهارها عقودية وردية |
| شاوا، كسو | شجرة كبيرة. اوراقها مركبة. ورقها سنائية. ازهارها صفراء اللون |
| شبت | عشبة حولية منتصبه. اوراقها مركبة خيطية. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة عذدة |
| شرعطق منعمي | عشبة معمرة. اوراقها مركبة منشرة النصال. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة خضراء |
| شقيق النعمان اللبلول | عشبة صغيرة معمرة. اوراقها مركبة خيطية. ازهارها كبيرة قرمزية. يزورها كروية |
| شار حلز | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها صفراء. يزورها صغيرة |
| شعرة بحرية | عشبة صغيرة معمرة. اوراقها لحمية مركبة. ازهارها بيضاء ثمارها بيضيه عذدة |
| شعرناض عارض | عشبة عارشة معمرة. اوراقها معتقة اهليلجية. ازهارها ارجوانية اللون |
| شجنار مخزني | عشبة مخشوشة معمرة. اوراقها صغيرة ضيقة مزغبة. ازهارها بيضاء. يزورها كروية صلبة |
| شوكة مباركة | عشبة حولية فرعاء. اوراقها كبيرة مضلمة هلبية الزغب. ازهارها صفراء |
| شوكران | عشبة محولة ليفية الساق. اوراقها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية صغيرة |
| شولاه | عشبة مخشوشة معمرة. اوراقها ثلاثية التفصيص. ازهارها عطرية صفراء |
| شيلك | عشبة رطلية معمرة. اوراقها مركبة ثلاثية خشنة. ثمارها شمولية مأكولة |
| صبار معروف | نبات لحمي معمر. الساق وقروعا الواح كبيرة بيضيه. ازهارها كبيرة نارية اللون |
| صعتر شائع | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها بيضيه خملية النصال. ازهارها وردية |
| صفصاف ابيض | شجرة منبسطة الفروع. اوراقها سنائية النصال. ازهارها شريفة صفراء |
| صنوبر بري، برز | شجرة كبيرة. اوراقها هدية شفعية. اكرازها مردية. يزورها دقيقة بمنحة |
| طوقيون مخزني | عشبة معمرة ليفية. اوراقها اهليلجية سنن. ازهارها حمراء |
| ظهرة بلورية | عشبة لحمية حولية. اوراقها لحمية كبيرة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة سوداء |
| عافر قرحا | عشبة حولية فرعاء. اوراقها ريشية ثنائية التفليل. ازهارها صفراء. يزورها بمنحة |
| عاد الشمس السنوي | عشبة حولية. اوراقها معتقة قلبية خشنة. ازهارها كبيرة صفراء. يزورها وثدية |
| عراوة ملكة المروج | جينية معمرة فرعاء. اوراقها مركبة سنائية وثرية. ازهارها الى الخضار الباهت |
| عرعر شائع | جنية معمرة فرعاء. اوراقها ابيدة هدية. ثمارها عنبية حلوة اللذاق عطرية |
| عرعر كادي | شجيرة فرعاء. اوراقها ابيدة هدية. ثمارها نووية حمصية اللد والشكل |
| عرف الذهب المخزني | جينية حولية معمرة. جذورها غليظة. اوراقها معتقة صغيرة. ازهارها فردية |
| عرف انجبار | عشبة مدادة معمرة. اوراقها مركبة خماسية. ازهارها كبريتية اللون |
| عرون مخزني | عشبة حولية فرعاء. اوراقها صغيرة منشارية الحافة. ازهارها وردية |
| عروق الصباغين | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة مفرصة. ازهارها صفراء اللون |

| الاجزاء الصالحة | المنافع والاستعمال |
|--------------------------|--|
| الاكراز والخشب | صيفتها قابضة ، مضادة للتزيف وتفيد البواسير |
| الاوراق والازهار | مستحلبا يقوي القلب والمعدة . مغليا يفيد السعال الديكي والتزلة الوافدة |
| البزور | مسحوقها مسهل عتيق ، معطس ، يدرّ اللعاب ، استعمالها خطر |
| ثمار | عصيرها مضادّ للاسهال |
| البزور والاوراق | مسحوقها وتقيها هاضم ويدرّ البول |
| الاوراق | مستحلبا يفيد التهاب اللوزتين غرغرة . ويشفي الجروح |
| الحصية | صيفتها تقيد طين الاذنين . مهروسها يقضي على الاورام والدمايل لصقاً |
| الارومة والاوراق | مهلوس الاوراق لبدناً يفيد التهاب الاعصاب وعرق النساء والدوالي . مسحوق الارومة للتزيف المجهلي |
| الزهار والاوراق | مستحلبا يدرّ البول ويفيد التهابات الكلى والمجاري البولية |
| الاوراق | تقيها مسهل شائع الاستعمال |
| الاوراق | تقيها مسهل شائع الاستعمال |
| اللحاء | مغلي المسحوق او تقيها قابض |
| الدوقصة والبزور | مستحضراتها تقيد داء النقطه وتقضي على التقرس |
| الجذور | تقيها مسهل خفيف . مغليا يفيد التهابات الكلى والثانة والحنجرة |
| الاروملة | مغليا منفث ويفيد العلل الصدرية |
| الاوراق | القليل من عصيرها مسهل . الكثير منه ماسط |
| العشبة يرمتها | مغليا مقو ويقي الدم ويفيد البرقان والامراض الجلدية |
| الازهار | مغليا طارد للود من اي نوع كان |
| الاوراق والبذور | تقيها يفيد المعدة والاعماء ويمنع الارق ويدرّ البول |
| البذور | مغليا يفيد الامراض الصدرية ويدفع الحمى ويدرّ البول ويخترّ الاعصاب |
| العشبة يرمتها | عصيرها او مسحوقها الجاف مضاد للتزلة . مسكّن ومطعم |
| الجذور والبذور والاوراق | مغلي الجذور والاوراق يدرّ البول . مغلي البزور مشه ، يدرّ الحليب والطمث |
| الاوراق وثمار | عصارة الاوراق وتقيع ثمار طارد للود |
| اللحاء | مسحوقها يفيد العلل العصبية ويسكّن ويقيد المعدة |
| البذور | مغليا يفيد علل المسالك البولية وقد يذيب الحصى ويفيد في الزنطاري |
| الاوراق والازهار | مغليا مقو ، دافع للحصى ، رقيقها دامل للحرج |
| الاوراق وثمار | تقيها مضاد للتشنج ويفيد الربو والسعال الديكي . استعمالها خطر لانها سامّة |
| الاوراق والازهار والجذور | الاوراق والازهار مطبوخة ، الجذور مضادة للتشنج والصرع والرقص الزنجي |
| الارومة والجذور | تقيها يدرّ البول وقابض ، مغليا يفيد التقرس ويذيب الرمل |
| الالواح | عصارتها مقوية للقلب . تقطع الزحار والاسهال |
| الاوراق والازهار | مغليا يسكّن التشنجات العصبية . مسحوقها ينشط الشهية ويدرّ البول |
| اللحاء | مغليا مضاد لالتهاب والحصى ، يعرق ، يسكّن الآلام ، يدرّ البول |
| البنائق | مغليا يدرّ البول ويفيد التزلات الشعبية |
| الاوراق والازهار | مغليا مقو ، محرّض ، هاضم ، يفيد علل الطحال |
| الاوراق | مغليا يفيد عسر البول والسعال التنسجي . مهلوسها يفيد الحروق والجروح |
| الجذور | مسحوقها يدخل في عذّة تراكيبي طيبة اخضعها معجونات الاسنان |
| بتلات الازهار | مغلي البتلات مضاد للحيمات والملازيا . ولعابجة نوسحات القصبه المجايفة |
| الجذور والازهار | الجذور قابضة ، تدرّ البول ، تقطع التزيف . تقح الازهار يفيد الاستسقاء والالتهابات |
| ثمار | تقيها يقي الدم ، يدرّ البول ، يفيد العلل الكبدية والمسالك البولية والنشاف الشرياني |
| الاوراق | تقيها مسهل وطارد للود |
| الجذور | مسحوقها مقو ، منفث ، مضاد للاسهال . استعمالها خطر يوجب الحذر الكلي |
| الجذور | التكيد بمغليها يقضي على الاكزما ، المضمضة تقيد نزيف اللثة |
| العشبة يرمتها | مستحلبا يفيد الرشح والتزلات الشعبية ، ويقوي العيون ، ويفيد الرمد |
| العشبة يرمتها | عصارتها تقضي على التاول . خلاصتها المائمة تقيد المعدة والاعماء والتهاب الماراة |

| التيات | التحلية |
|----------------------|--|
| عسم سندي | جنية معمرة فرعاء. اوراقها بيضيه ازهارها ورديه. يزورها دعيت |
| عشبة القوق الوزيه | عشبة مداده معمره. اوراقها مركبه ثنائيه الصف. ازهارها كبريتيه اللون |
| عُشْر جيار | شجيرة متباعدة الفروع. اوراقها ابيده سنائيه بارزه العروق. ازهارها ورديه |
| عققة مبدولة | جنية متسلقه معمره. اوراقها ابيده جلدية النصال. ازهارها يضاء. ثمارها نوويه |
| عَلْد مزروع السابل | جنية معمره فرعاء. اوراقها كالخراشف. ثمارها عنيه |
| عنب الدب، عيران | جنية معمره فرعاء. اوراقها ابيده صغيره. ازهارها جلجله ورديه. ثمارها عنيه |
| عود الانبياء | شجرة متوسطه الحجم. اوراقها مركبه شفعيه. ازهارها زرقاء. يزورها صفراء اللون |
| عود الوج | عشبة جذموريه معمره. اوراقها عصفيه قرصيه الانتشاب. ازهارها صفراء اللون |
| عوسج شائع | جنية شائكة معمره فرعاء. اوراقها مركبه وثيره. ازهارها ورديه. ثمارها شاميل كرويه |
| عينون عطر | بجله ليفيه معمره. اوراقها ابيده ملمعتة جامده. ازهارها عطريه زرقاء اللون |
| غافث غولاني | عشبة معمره شائكة الساق. اوراقها مركبه وثيره. ازهارها عطريه صفراء اللون |
| غالوين حقيقي | عشبة فرعاء مضلمة الساق. اوراقها ضميمه صغيره خصليه. ازهارها الى الصفرة الزاهيه |
| غالوين صليبي | عشبة فرعاء مضلمة الساق والفروع. اوراقها صغيره ضفئه. ازهارها صفراء اللون |
| غيراه الحاملين | شجرة فرعاء. اوراقها مركبه وثيره. ازهارها كبريه الرائحة. ثمارها صغيره كرويه |
| غراسيله غزيره | عشبة جذموريه معمره. اوراقها ضميمه مسننه. ازهارها بويه ورديه |
| غرندليه ضليعه | جنية معمره فرعاء. اوراقها سنائيه جامده. رؤسائها الزهرية صفراء اللون |
| غرغوق عطر | عشبة معمره فرعاء. اوراقها مفضضة مشتمه. ازهارها الى البياض الليلكي المواج |
| غفت ابن سينا | عشبة ليفيه معمره. اوراقها مركبه سنائيه النصال. ازهارها ورديه. يزورها دقيقه |
| غلقة | جنية معمره مداعة. اوراقها اهليلجيه شديده الخضار. ازهارها يضاء. ثمارها كعابير |
| فلارشا يضاء | جنية متسلقه معمره. اوراقها كلفه مفرضة. ثمارها عنيه. يزورها زيتيه اللباب |
| فاغية الخنان | بجله معمره فرعاء. اوراقها ضميمه النصال. رؤسائها الزهرية بيض اللسيئات |
| فجل حار | عشبة حويله غليظه الجذر. اوراقها مستطيله مفرضة ومسننه. يزورها كرويه |
| فراسيون ابيض | عشبة معمره فرعاء. اوراقها يضيئه خشنة مسننه ازهارها يضاء |
| فراسيون ازغب | عشبة محوله زباء. اوراقها خشنة مزغبه ومسننه. ازهارها حمراء مرقوشه بالابيض |
| فراسيون اسود | عشبة معمره فرعاء. اوراقها خصليه النصال للسمنه. ازهارها حويله مزغبه |
| فراسواز، عوسج ابيده | جنية ارموليه معمره فرعاء. اوراقها مركبه مزغبه مسننه. ثمارها شاميل مأكوله |
| فربيون لسيرس | عشبة ليفيه محوله مداعة. اوراقها متصاليه سنائيه. ازهارها ورديه |
| فربيون مخزني | جنية معمره فرعاء. اوراقها اهليلجيه جامده النصال. ازهارها يضاء اللون |
| فشاغ مخزني | جنية ليفيه معمره. اوراقها قلبيه جامده النصال. ازهارها صغيره صيوائيه |
| فلقل كبابه | شجيرة سريعه الفروع. اوراقها اهليلجيه جامده. ازهارها مرجانيه. ثمارها كرويه |
| قوة | عشبة جذموريه معمره. اوراقها ضميمه متقابله سنائيه مزغبه. ازهارها صفراء |
| فوقس حويصلي | نبات بحري قلدي الجذور والسوق والاوراق. لونه الى الخضار الاغبس |
| فول | عشبة حويله جوفاء الساق. اوراقها شففيه. ازهارها يضاء مرقوشه |
| فول كلبار | جنية عارشة معمره. اوراقها مركبه ثلاثيه. ازهارها ارجوائيه. ثمارها قرون تغلف الحبوب |
| قات | جنية معمره فرعاء. اوراقها ابيده اهليلجيه بارزه الضلع مسننه. ازهارها خضراء اللون |
| قبيليس نيه، خيط ذهبي | عشبة حويله صغيره. اوراقها صغيره مفرضة. ازهارها رديه يضاء اللون |
| قتوايه | جنية معمره فرعاء فناء. اوراقها سنائيه جامده. ازهارها ورديه مرقوشه |
| قنأه برّي | عشبة حويله مداده. اوراقها معتمه كبيره. ازهارها صفراء. ثمارها رفيفه صفراء |
| قراض يرق | عشبة حويله فرعاء زباء. اوراقها ناشرة العروق مسننه كلفه الغلب. ازهارها خضراء |
| قره | عشبة مائيه معمره. اوراقها مركبه ثلاثيه. ازهارها برتقاليه اللون |
| قرطم الصباغين | عشبة حويله سرحه. اوراقها سنائيه بارزه العروق. ازهارها برتقاليه اللون |
| قرقه سرنديب | شجرة منتصبه فرعاء. اوراقها ابيده جامده. ازهارها عقوديه غيراه. ثمارها عنيه |
| قرنفل | شجرة فرعاء فناء. اوراقها ابيده جامده. ازهارها عقوديه صغيره حمراء. ثمارها نوويه |
| قسوة راحيه | جنية عارشة. ارمومتها معمره. ساقها حويله. اوراقها كلفه خاسيه التخصيص. ازهارها تينيه |
| قطرم اخر، خشيشه اخر | عشبة معمره فرعاء. اوراقها سنائيه مسننه. ازهارها عطريه يضاء |

| الاجزاء الصالحة | المنافع والاستعمال |
|--------------------------|---|
| اللحاء | مسحوقها يذيب الحصى الصفراوية |
| العشب برتبنا | نقعها او مغليا يفيد جميع انواع التشنجات ويوقف التزيف |
| الجذور واللحاء | اللحاء نفيد الاسهال والزطاري. الجذور لمعالجة الامراض الجلدية. قليها مقو، كثيرا مقيء |
| الاوراق والثمار واللحاء | الثمار مسهلة عتية، الاوراق واللحاء نفيد السلس والقوياء |
| الانفاد الزهرة | مغليا يفيد داء الفواصل |
| الاوراق | مغليا قابض، يدر البول، يطهر الكلي ويفيد مجاري البول ويسهل الطاق |
| الخشب | صيته نفيد اضطرابات الحليس والقرص. مسحوقه يفيد السلس |
| الجذور | صيته او مغليه تقوي الجهاز العصبي وتساعد المضم ويفيد التزلات الصدرية |
| الثمار والاوراق والجذور | عصير الثمار منعش ومضاد للحيمات. مغلي الاوراق يفيد العدة. مغلي الجذور لرمل الكل |
| الاوراق والازهار | مغليا يفيد الحيمات المتقطعة والقيض المستعصي. استعمالها حذر |
| الاوراق | مهلوسها او نقعها يفيد الامراض الجلدية وغشاوة العين والتهاب الحنجرة |
| العشب برتبنا | مغليا قابض غثيف، مضاد للتشنجات والاسهال، مرقق |
| العشب برتبنا | مغليا مقو ويفيد المعدة |
| الثمار | عصيرها او مستحلبها مقو، منفض، مضاد للحفر والزحار، يدر البول. |
| الجذور | مسحوقها مسهل غثيف، مقيء، يدر البول. استعمالها خطر يوجب شدة الحذر |
| الاوراق والازهار | مغليا منعش، يفيد الريو والعلل الرومية والسعال الديكي |
| العشب وازهارها | يستعمل مستحلب الاوراق والازهار ضد العقم. الوراق المهروسة تنفي القروح |
| الاوراق | مغليا يفيد الكبد والتهابات الميلة وقد يحلل الرمل |
| الجذور | نقعها منبه، مرقق، مهوج ويذر البول |
| الجذور | عصارتها مسهل غثيف. استعمالها شديد الخطر. يقال انها تحرق الشعر |
| الاوراق والازهار | مغليا مضاد للتشنج، طارد للغازات، يدر الطمث والبول |
| الجذر | مستحلبه يدر الصفراء ويفيد احتقان الكبد والريو والسعال |
| الاوراق | مغليا منفض، يفيد السعال، خافض للحرارة ويذر الطمث |
| الاوراق | مغليا يفيد الامراض العصبية والاستسقاء ويذر البول ويذيب الحامض البولي |
| الاوراق والازهار | مغليا يفيد المنص والسعال الديكي، مضاد للتشنج |
| الثمار | عصيرها يدر البول، مرطب، ملين |
| الاوراق والجذور | عصير الاوراق يحرق الشعر. الجذور منفة ومقيئة، استعمالها خطر |
| عصارة الساق | استعمالها خارجي ولا يجوز الا بمعرفة الطبيب |
| الجذور | مغليا يفيد الرشوحات والامراض الجلدية |
| الثمار | زيتها يفيد المالك البولية والسيلان والتهاب الحنجرة والتزلات الشمية |
| الجذور | مغليه يفيد الكساح، مقو، هاضم، يدر الحليس والصفراء. يفتت الحصاة الفوسفاتية |
| النبات كما هو | مغليه يزيل السمّة وتضخم الغدة الدرقية ويفيد تصلب الشرايين |
| الازهار | مغليا يدر البول. يفيد الرشح والمساك البولية، يذيب الرمل |
| الحبوب | مستحضراتها عديدة توصف بأمر الطبيب |
| الاوراق | القليل من مغليا يقوي الدماغ. استعمالها خطر |
| الجذور | مغليا مقو |
| الاوراق واللحاء | خلاصتها السائلة ناعوظ مشهور. مضادة للسلس وخففة للفضط |
| الثمار | عصارتها او مغليا مسهل غثيف يستعمل في الاستسقاء والشلل واحتقان الملح |
| العشب الزهرة برتبنا | مستحلبها ينقي الدم ويحذد الشيا. بدورها مثيرة للرغبة الجنسية |
| القروح والاوراق والازهار | عصيرها مضاد للحفر، يفيد الملل العصبية وداء الخنازير. منقث ويذر اللعاب |
| البزور | مغليا مسهل ويفيد الملل العصبية |
| اللحاء | مسحوقها ينه الأعصاب وينشطها، يقوي القلب، مضاد للتشنج |
| الازهار | صيتها ومغليا منعشة، محرقة، منقطة، طاردة للغازات |
| الجذور | نقعها مقو نشيط ويفيد المعدة |
| الازهار | نقعها يفيد المعدة، طارد للريح، مطهئ |

| النبات | الحلية |
|---------------------------|---|
| قام آسي | جنية معمرة فرعاء فتاه. اوراقها آسية جامدة. ازهارها وردية. ثمارها عنبية مأكولة |
| قنب | عشبة حولية. اوراقها كلفية مركبة وثرية. ازهارها ثنائية المسكن. يزورها مكورة |
| قنة مهجونة | عشبة معمرة. اوراقها مركبة قلبية الوريقات. ازهارها ثنائية |
| قتلي مبدول | شجرة كبيرة فارشة. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها عشوية. ثمارها كستنية الشكل والقد |
| قنصور شائع | جنية معمرة. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها برتقالية اللون. ثمارها سفلية |
| قطريون صغير | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها رحيمة صغيرة. ازهارها وردية اللون |
| قوسه غزبية | عشبة معمرة زياه فرعاء. اوراقها صغيرة خملية النصال كالقورية العرف. ازهارها عظرية بنفسجية |
| قيصوم، رمان الارض | جنية لينة فرعاء. اوراقها بسيطة خطية. ازهارها ذهنية اللون. ثمارها لينة كحب الآس |
| كافور | شجرة كبيرة دائحة. اوراقها اهليلجية جامدة. ثمارها زيتونية نوية |
| كثان شائع | عشبة حولية صناعية. اوراقها سنائية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها جراه. يزورها زنبية |
| كراويا | عشبة عملة. اوراقها ريشية مغلوقة. ازهارها صغيرة بيضاء. يزورها زنبية |
| كرفس | عشبة حولية ضخمة الجشت. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها بيضاء ممتحة بالاخضر |
| كرفس الماء | عشبة معمرة غليظة الجذر. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها بيضاء. ثمارها كباير. يزورها دقيقة |
| كركم صباغي | عشبة صفولية معمرة. اوراقها سنائية مستطيلة. ازهارها سنائية صفراء اللون |
| كروتن الزيت | جنية فرعاء. اوراقها رحيمة جامدة. ازهارها جميلة. ثمارها حبوب شبيهة بالخروج |
| كزبرة الير | عشبة جنمورية معمرة. زناد اوراقها ثنائي الانتشاب راعي القروع الموحية صغير الوريقات |
| كزبرة مزروعة | عشبة حولية فرعاء. اوراقها مركبة مقرضة مشرقة. ازهارها وردية. ثمارها يزور دقيقة |
| كستة | شجرة ضخمة دائحة. اوراقها ناشرة العروق منشارية الحافة. ثمارها مأكولة اللباب |
| كشمش احمر | جنية فرعاء فتاه. اوراقها خلية مقلقة ومسننة. ازهارها موشحة بالاحمر. ثمارها مأكولة |
| كشمش اسود | جنية فرعاء فتاه. اوراقها خلية مفصصة ومسننة. ازهارها حمراء. ثمارها مأكولة |
| كشوث السعز | نبات طفلي خيطي ملتف. اوراقه حرشفية دقيقة. ازهاره وردية |
| كايلة المروج | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها خلية مقرضة ناشرة العروق. ازهارها صفراء اللون |
| كشون | عشبة حولية فرعاء. اوراقها مهدلة. ازهارها بيضاء. ثمارها كباير. يزورها صغيرة |
| كنكلييه، عسم رفيع | شجرة صلبة فرعاء. اوراقها مائلة النصال عابقة الخضار. ازهارها وردية. ثمارها يزور |
| كنكينيا | شجرة فرعاء حمراء اللحاء. اوراقها كبيرة النصال. ازهارها خشوية. ثمارها جراه يزورها دقيقة |
| كهنة | شجيرة متسلقة فرعاء. اوراقها جامدة النصال. ازهارها وردية. ثمارها لحية عافصة |
| كوشاد اصفر | جنية سرحة مستخلطة الجذور. اوراقها كبيرة. ازهارها صفراء اللون |
| كوكا | جنية معمرة فرعاء. اوراقها اهليلجية ناشرة العروق. ازهارها صفراء. ثمارها نوية حمراء |
| كولا، كوله | شجرة فارشة. اوراقها ابيدة جامدة. ثمارها قروء. مبطلعة تغلف من لوزتين الى عشر لوزات |
| كيس الراعي | عشبة حولية. اوراقها لاقباسية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها خربيات. يزورها خردلية |
| لايمون ابيض | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها سنائية منشارية الحافة. ازهارها عطرية بيضاء اللون |
| لئين شائك | جنية معمرة شائكة. اوراقها سنائية مسننة. ازهارها وردية |
| لسان الحمل الساني | عشبة معمرة مقرة. اوراقها قرصية جامدة النصال. ازهارها ثنائية |
| لسان الحمل الكبير | عشبة معمرة مقرة. اوراقها قرصية ملطية جامدة النصال. ازهارها صفراء اللون |
| لسان الكلب المخزي | بلعة معمرة فرعاء. اوراقها سنائية خملية النصال. ازهارها حمراء اللون |
| لوشيا ناعمة، حشيشة الجرح | عشبة مستطيلة الساق. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها صفراء. يزورها صغيرة |
| مازريون، دفنة سامة | جنية صغيرة معمرة فرعاء. اوراقها جلدية النصال. ازهارها انبوية عطرية. ثمارها عنبية |
| مثنان، دفنة لاحقة | جنية معمرة فرعاء. اوراقها عروء مستطيلة. ازهارها عطرية بيضاء. ثمارها عنبية |
| مرآن شامخ | شجرة باسقة فرعاء. اوراقها وثرية. ازهارها بيضاء خضراء المواج. ثمارها جناحية |
| مشتركة فيرجينية | جنية معمرة فرعاء. اوراقها بيضبة مسننة الحافة. ازهارها صفراء اللون |
| مضاض اسود | شجيرة فرعاء، اوراقها اهليلجية مسننة الحافة. ازهارها جوزية. يزورها صغيرة |
| مئل | جنية فرعاء شائكة. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها فردية. ثمارها جراه |
| مكثانة غزبية، سذاب الماعز | بلعة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها الى الزرقعة |
| منتنة، فساء الكلب | عشبة حولية فرعاء. اوراقها اهليلجية مزغبة. ازهارها بيضاء كرسية الرائحة |

| الاجزاء الصالحة | المنافع والاستعمال |
|------------------------|---|
| الثمار | عصيرها يشفي الامراض الجلدية الرطبة . مغليا يقطع الاسهال |
| البزور | مغليا يسكن تشنجات الاطفال ويغيد الربو والسعال |
| عصارة الساق | عمرضة ، مطهرة ، منبهة ، مضادة للتشنج ، منقعة وتدر الطمث |
| قشور الثمار | مغليا مضاد لتجلط الدم ، يفيد في معالجة الدولي والبواسير واحتقان الكبد |
| البزور | مغليا ملين او مسهل |
| العشبة باستثناء الجذور | نقيعها او مسحوقها يفيد ضعف المعدة وينشط الشهية ويفيد فقر الدم |
| الاوراق | مستحلبها يقوي الاعصاب ويكافح المقم عند النساء . يفيد السعال الناشف والتزيف الرحمي |
| الازهار والثمار | مغليا مقو، منبه ، مضاد للحميات ، يزيل الطلخ الحمر من الجلد |
| زيت الكافور | جافر ومضاد للتشنج |
| البزور | الليخة الساخنة تسكن آلام المعدة ويقيد التهاب الغدد التكفية وللعمفاوية |
| البزور | مسحوقها مقو، هاضم ، يفتح الشهية ، يدر اللعاب ، ينشط العصائر المعدية |
| الجذث والاوراق | تنفث الصدر وتحلل الورم وتدفع الحصى وتفتح الشهية |
| الجذر والاوراق والبزور | الجذر والاوراق مضادة للحفر وتدر البول . البزور مهيجة للقوة الجنسية |
| المساقل | نقيعها ومغليا منمنش ويدر البول |
| الحبوب | مسحوقها منقط ، مسهل شديد الوقع . تستعمل بحرفة الطبيب |
| العشبة برمتها | مغليا مضاد للسعال |
| البزور | مسحوقها ومغليا عمرض ، هاضم ، يفيد القلب والضغط الدموي |
| الاوراق | مغليا مضاد للسعال الديكي |
| الثمار | عصيرها يدر البول ويفيد من العلل العصبية والتقرس واليثرور |
| الثمار والاوراق | عصيرها مرطب ، هاضم ، يفتح الشهية . مغلي الاوراق يفيد في التهاب المفاصل |
| النبات برتمه | مغلي يقضي على القبض للسعصي ويدر الصفراء |
| الاوراق | مغليا شاي ويوتر اغشية الكارة . يفيد الافرازات المهبلية وينظم الحيض |
| البزور | مسحوقها ناعظ اذا مزج مع الفلفل والعسل . منبه للاعلاء ، طارد للغازات |
| الاوراق | نقيعها يذيب الحصى الصفراوية ويفيد في بعض الحيات |
| القشور | مسحوقها مقو، دافع للحميات |
| الاوراق والثمار | عصارتها مقوية |
| الجذور | عصيرها مثير للشهية ، منمنش ، مقو، مخفض للحميات |
| الاوراق | نقيعها ومغليا مقو، مضاد للاوجاع العصبية |
| اللوزة | ماكولة منبهة مقوية ، منشطة ، تدر البول |
| العشبة برمتها | مستحلب الاوراق والازهار يفيد الاساك المزمن ، معرق ، مضاد للسعال ويدر البول |
| الازهار | مستحلبها ينظم الحيض ومنع اضطراره ومنع السيلان الابيض |
| النبته برمتها | نقيعها يفيد الامراض الكلوية والعلل العصبية ويدر البول |
| الاوراق والازهار | عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والاسهال |
| العشبة قبل التذير | عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والاسهال |
| الجذور | مغليا مخدر ، مسكن ، مضاد لبصق الدم والاسهال |
| الاوراق والازهار | مهروسها يطهر الجرح ويكلمه ويقضي على الالتهاب |
| للحاء | نقيعها او مغليا منقط ، معرق ، مهيج ، يدر البول . الاستعمال خطر يوجب الحذر |
| للحاء | منقعة كآوية |
| الاوراق والللحاء | للحاء دافعة للحميات . الاوراق ملينة ، معرقة ، مقوية ، تدر البول |
| الاوراق والللحاء | مسحوقها ومغليا قابض ، مضاد للتزيف . يفيد العلل الشريانية والاحتقانات |
| للحاء | مسحوقها مسهل ، يفرز الصفراء . يفيد الكبد والمرارة |
| عصارة الساق | منعقة ، مقوية ، مضادة للتشنج |
| الازهار | نقيعها يدر الحليب ويفيد السفلس . خلاصتها او مغليا علاج للسكرى |
| الاوراق والازهار | نقيعها ومغليا مضاد للتشنج ويدر الطمث |

| النبات | التحلية |
|-----------------------|---|
| مشور اصفر، خيري اصفر | عشبة معمرة صغيرة. اوراقها سنائية خملية. ازهارها عطرية صفراء. بزورها مستديرة مبططة |
| منكة | شجيرة معمرة فرعاء. اوراقها خيلية خملية. ازهارها ليلكية. ثمارها عنبية |
| نادرين مغزلي | عشبة معمرة. اوراقها مركبة وترية. ورقاتها سنائية مسننة. ازهارها وردية |
| نبق اسود | شجيرة فرعاء. اوراقها بيضيه ناشرة العروق، ازهارها خضراء اللون |
| نبق مسهل | شجيرة شائكة فرعاء. اوراقها بيضيه جامدة. ثمارها خوخية بنفسجية |
| نجير زاحف | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها عصفية صغيرة. ازهارها سنبلية التجميع |
| نسرين | جنية معمرة فرعاء شائكة. اوراقها مركبة وترية. ازهارها غبراء. ثمارها نووية |
| تعتع زراعي | عشبة معمرة مذادة. اوراقها سنائية ناشرة العروق مسننة الختار |
| نومان امرد | عشبة معمرة فرعاء. اوراقها بيضيه. ازهارها بيضاء. ثمارها يزور نشوئة المادة |
| نيدمان مستدير الورق | عشبة معمرة مقررة. اوراقها قرصية الانتشاب معتقة. ثمارها جراء |
| هال صغير، قافلة صغيرة | نبات جذموري معمر. اوراقه سنائية كبيرة. ازهاره سنبلية. ثماره جراء |
| هدال | نبات طفيلي معمر. ساقه مذادة. اوراقه صغيرة جامدة. ثماره نووية داقية |
| هدرسة كندية | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها كفية مضفصة. زهرتها وحيدة بيضاء |
| هلع، بلح الصحراء | جنية معمرة فرعاء شائكة. اوراقها بيضيه جامدة. ثمارها نووية زيتونية |
| هلتاس اصفر | عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية. ازهارها صفراء. ثمارها جراء |
| هندب، طرخشقون | عشبة معمرة مقررة. اوراقها قرصية مستطيلة مقرضة. ازهارها صفراء اللون |
| هندباء برية | عشبة حولية حترائية الجذر. اوراقها مقرضة. ازهارها زرقاء اللون |
| هيفسان، فجل الخيل | عشبة معمرة وتدية الجذر. اوراقها سنائية. ازهارها صغيرة بيضاء. بزورها زيتية |
| وثير مذاد | نبات معمر مذاد. اوراقه عروية بيضيه جلدية النصال. ازهاره جلجلية بيضاء |
| وژال | جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنائية صغيرة. ازهارها عطرية صفراء |
| يوهنيه | شجرة كبيرة دالحة. اوراقها ابيدة بيضيه حامدة. ازهارها بيضاء اللون صفراء المواج |

٢٨٤١٩ - نباتات مُتَحَجِّر

٢٨٤٢٠ - نباتات مُقَعَّد ، اَمْع

Phytolithe
Plante épiphyte (F). Epiphyte plant (E).
كل نبات يعيش على نبات آخر دون أن يستمد منه غذاءه .

٢٨٤٢١ - نباتات بِحَرِيَّة
Plantes marines (F). Sea weeds (E).

هي النباتات المائية التي تعيش في البحار .

٢٨٤٢٢ - نباتات بِمَنَاطِي

Plantes d'appartement (F). Apartment plants (E).
هي النباتات الزينية التي تُزَرَع في المراكن وتعيش في المساكن .

٢٨٤٢٣ - نباتات جُمَالِيَّة

Plantes vénéneuses (F). Poisonous plants (E).
هي النباتات التي تحوي بعض العناصر الجُمَالِيَّة المؤذية او المميتة وهي عديدة ، اشهرها ما جاء في الجدول التالي :

| نوع النبات | الاعضاء الجُمَالِيَّة |
|-----------------------|-----------------------------------|
| أرطاة | الجذور |
| اروم، ترياق ابيض | الارومة والاوراق |
| ازديخت | الجذور والثمار |
| الجنين، شوك الملك | الجذور |
| اشقيل بحري، عنصل بحري | جميع الاعضاء |
| اطرب، ست الحسن | جميع الاعضاء |
| افلوس | الاوراق بعد اكتمال نموها |
| اقي | جميع الاعضاء |
| اكوزيت، بيش | جميع الاعضاء |
| اكيلاجيا عقابية | جميع الاعضاء اخصها البزور |
| امارلس، شيك | جميع الاعضاء |
| ايلنطس | الاوراق |
| يقس، ششاد | جميع الاعضاء اخصها الورق |
| بنج | جميع الاعضاء |
| بنفسج | الزواكب والبزور |
| بوصير، مسكر الحوت | البزور |
| ترس | جميع الاعضاء اخصها الثمار |
| تمم | جميع الاعضاء |
| ثلثان | الثمار |
| ثليب | الجذور |
| جصفيل، حامول، سبج | جميع الاعضاء |
| نوع النبات | الاعضاء الجُمَالِيَّة |
| أبنوس كاذب | جميع الاعضاء |
| أهل، عرعر سبته | الاوراق |
| أدونيس، زغاليل | الجذور |
| أذريون الماء، صرغوس | جميع الاعضاء وتفقددها بعد التجفيف |

| الاجزاء الصالحة | المنافع والاستعمال |
|------------------------------------|---|
| الاوراق والازهار الثمار والجذور | مغليا يسكن الآلام العصبية والصداع ، ويقوّي القلب ، يدرّ البول . مضادّ للتشنج مسحوقها طاسم ، مجعش ، يقضي على الروماتيزم مسحوقها او نقيعها او مغليا مضادّ للتشنج والصرع العصبي ودافع للحصى ويسكن وطارد للديدان |
| اللحاء | مسحوقها ومغليا ملّين ومسهل عصيرها مسهل |
| الثمار | مغليه مرطب ، يدرّ البول ، يفيد في الروماتيزم العضلي وداء الثغرس والتهاب المثانة |
| الجذور | منهض نشيط يقوّي مناعة الجسم . مسحوق الثبلات الجفّة يفيد التسلّحات |
| لبّ الثمار | مغليا منهض عام . يفيد المعدة . يسكنّ التشنجات ، يدرّ الصفراء |
| الاوراق | مغليا يفيد التهاب الكلى ويدرّ البول |
| العشب برمتها | مغليا مسكنّ للسعال الديكي ، مفيد لأمراض الصدرية اخضها السّلّ |
| العشب برمتها | يزوره مقوية ، هاضمة . ادهان الزّور والجذور منهّجة للقلب والقوّة الجنسيّة |
| الجذور والزور | مغليه مخفض للضغط الشرياني ، مضاد للتشنج ، يفيد الصرع واضطرابات الحيز |
| الثبات برمتها | مسحوقه ومغليه يفيد المسالك الشريانية واليوساير والتزريف |
| الجذور | الناضجة ملّية . الفجة مسهلة ، طاردة للدود |
| الثمار | مغليه مقوّة ، يفيد انحطاط الاعضاء التناسلية ، يدرّ البول . يفيد سيلان الرحمي والحيز |
| الجذور | والاحتلام |
| الاوراق والجذور | مستحبها مقوّة ، ينّي الجسم ، يفيد الكبد ، يدرّ البول |
| الاوراق والجذور | عصيرها يفيد احتقان الكبد ويقضي على اليوساير وينّي الجلد من الدمايل |
| الجذر | عصيرها منهض فعّال يفيد المعدة ويدرّ البول . مضادّ لداء الحفر |
| الاوراق والازهر | مغليا قابض مضاد للاسهال |
| الازهار | نقيع ازهارها الغضة يدرّ البول ، يلذب الحصى الكلوية . يفيد الزلال والوهن |
| اللحاء | مسحوقها منغظ . ويدرّ الحيز . ويكافح العتّة |

| نوع النبات | الاعضاء الجحالية | نوع النبات | الاعضاء الجحالية |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| جلسان | الاوراق والازهار | جلسان | جميع الاعضاء |
| سربل | الاوراق والازهار | سربل | جميع الاعضاء |
| حشيشة الفقراء | جميع الاعضاء | حشيشة الفقراء | جميع الاعضاء |
| حشيشة القمل | جميع الاعضاء | حشيشة القمل | جميع الاعضاء |
| حلوب | الاوراق والازهار | حلوب | جميع الاعضاء |
| حويش النعم | الاوراق تؤذي الدواب | حويش النعم | جميع الاعضاء |
| حنظل | جميع الاعضاء اخضها الثّار | حنظل | جميع الاعضاء |
| حوذان | جميع الاعضاء وتقدّمها بعد التجلّيف | حوذان | جميع الاعضاء |
| حبيّ العالم ، حيون | جميع الاعضاء | حبيّ العالم ، حيون | جميع الاعضاء |
| خر بوق | جميع الاعضاء | خر بوق | جميع الاعضاء |
| خر بوق | جميع الاعضاء | خر بوق | جميع الاعضاء |
| غرول حقل ، ليسان | الاوراق بعد الازهار | غرول حقل ، ليسان | جميع الاعضاء |
| غرم الحنطة | الزور | غرم الحنطة | جميع الاعضاء |
| غروب | الزور والكسب | غروب | جميع الاعضاء |
| عشخاش منوم | جميع الاعضاء اخضها الكمار | عشخاش منوم | جميع الاعضاء |
| غناز برية | جميع الاعضاء | غناز برية | جميع الاعضاء |
| عوشان ، قرقد | جميع الاعضاء | عوشان ، قرقد | جميع الاعضاء |
| داتوره | جميع الاعضاء | داتوره | جميع الاعضاء |
| داذي ، هيوفاريقون | جميع الاعضاء | داذي ، هيوفاريقون | جميع الاعضاء |
| دفل ، حبن | جميع الاعضاء | دفل ، حبن | جميع الاعضاء |

٢٨٤٢٧ - نباتات دهنية ، نباتات زيتية
Plantes oléagineuses (F). Oleaginous plants (E).
هي النباتات الممكن استمال ثمارها او بذورها لاستخراج
الدهن او الزيت .

٢٨٤٢٨ - نباتات سكرية
Plantes saccharifères (F). Sacchariferous plants (E).
هي النباتات التي يستخرج منها السكر ، اشهرها قصب
السكر والشوندر .

٢٨٤٢٩ - نباتات صبغية
Plantes tinctoriales (F). Tinctorial plants (E).
هي النباتات التي يستخرج منها مواد صبغية .

٢٨٤٣٠ - نباتات صناعية
Plantes industrielles (F). Industrial plants (E).
هي النباتات التي تزرع لاستعمالها الصناعي كالتبغ والقنب
والكتان الخ ...

٢٨٤٣١ - نباتات ضارة
Plantes nuisibles (F). Hurtful plants (E).
هي النباتات الطوعية او الدخيلة التي تكثر بين الزروع
وفي المياقل والحدايق فتستنزف خصب التربة وتسيء الى
النباتات المزروعة || النباتات الضارة كثيرة العدد تقتصر ،
في الجدول التالي ، على ذكر اشهرها واشهرها :


| اسم النبات | اسم النبات |
|----------------------------|-----------------------|
| سراخس | اخيليا ام الف ورقة |
| سمادي | اروم ، لوف ميقع |
| سعد مستدير ، صباح الخير | اريفارون ، شيخ الربيع |
| سورجان الخريف ، قاتل الكلب | اسل |
| شقار | اكونيت هربي ، بيش |
| شقيق ، عمى الدجاج | اسنوخ |
| شر الكلب | انجبار ، انارف |
| شوك | تفان |
| شوكران | ثوم بري |
| طحالب | ثيل |
| عراوة | جصفيل ، حامول ، سيع |
| عشبة القوي | حرميل |
| عوسج ، عليق | حشيشة القمل |
| غيطل | حليوب |
| فربيون ، عنجد ، يتوع | حيض |
| قرطب | حيض المناقع |
| قصولان | حودان |
| قطريون | خرطال فتوا |
| كرسة | خرم |
| كرنس نبطي | خان |
| كشوث | دققة |
| لسان ، خردل بري | دوسة الحمار ، فرفارة |
| لباب | دوسر |
| لبن | ديجتال ، زهر الكشاثين |
| لسان الحمل | ذيل الثعلب |
| نجيل | رازيانة ، مشفيل |
| هدال | ريخاخ |
| هيسان ، فجل الخيل | زوان مسكر |

| نوع النبات | الاعضاء الجحالية |
|----------------------|----------------------------------|
| شقار | جميع الاعضاء وتقددها بعد التجفيف |
| شقيق ، عمى الدجاج | جميع الاعضاء |
| شوكران | جميع الاعضاء |
| صرمية الجدي | الازهار والثمار |
| مقلاب سوري | عصارة الساق |
| مقلوس ، ذنب | الاوراق |
| ملنينية | عصارة الساق ولباب البزور |
| عائق | جميع الاعضاء اخصها البزور |
| عبر | جميع الاعضاء |
| عمر فريجيني | الاوراق |
| عروق الصباغين | جميع الاعضاء |
| عشقة | الثمار |
| عصل | الاوراق والازهار |
| عنب الثعلب ، فناة | جميع الاعضاء |
| غفو | جميع الاعضاء |
| فاشرا | الجذور والنبوي والثمار |
| فاشرشين | الثمار |
| فربيون ، عنجد ، يتوع | الاوراق والازهار والثمار |
| قناه بري | جميع الاعضاء اخصها لباب الثمر |
| قرطب الزرع | البزور |
| قنة مبلولة ، كلخ | الاوراق حتى الازهار |
| كرز غاري | الاوراق |
| كردبان ، مشان | جميع الاعضاء |
| كلابة | اللحاء والنسيج |
| لبن المروج ، زغيلة | جميع الاعضاء |
| لفاح ، يروح | جميع الاعضاء |
| لكية عشارية الاسبدة | الاوراق تؤذي الدواب |
| لويليه | عصارة الساق |
| ليناريه ، حياحب | جميع الاعضاء |
| ماميا صفراء | الاوراق والازهار |
| مديد | عصارة الساق |
| مضاض | اللحاء والاوراق والثمار |
| معزرون | جميع الاعضاء |
| ملعى سامة | الاوراق بعد اكتمال نموها |
| لبق | الاوراق والثمار |
| هدال | الثمار |
| هورة | عصارة الساق والبزور |
| هيشان | الاوراق بعد ازهار النبات |
| ينبوت نن | جميع الاعضاء |


٢٨٤٢٤ - نباتات حولية
Plantes annuelles (F). Annual plants (E).
هي النباتات العشبية التي تعيش سنة او دون السنة .

٢٨٤٢٥ - نباتات عكلية
Thallophytes
صف نباتات فطرية الجرم خالية من الجذور والسوق
والاوراق والازهار . اطلب مشريات .

٢٨٤٢٦ - نباتات دنية
Végétaux inférieurs (F). Inferior plants (E).
هي النباتات الوحيدة الخلية .



مخطّط تسلسل أنساب المملكة النابتية



٢٨٤٣٢ - نباتات طوعية

Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).
Plantes spontanées, Végétation spontanée (F).
Spontaneous plants (E).
هي النباتات التي تعيش وتتكاثر من تلقاء ذاتها .

٢٨٤٣٣ - نباتات عطرية ، ربحان

Plantes aromatiques (F). Aromatic plants (E).
هي التي يستخرج منها العطر .

٢٨٤٣٤ - نباتات علفية ، نباتات الكلاء

Plantes fourragères (F). Fodder plants (E).
هي التي تستعمل كمغذيات للحيوان .

٢٨٤٣٥ - نباتات علبة ، نباتات عليا

Végétaux supérieurs (F). Upper plants (E).
هي النباتات العديدة الخلايا الكاملة التركيب ، فيها الجذور والسوق والاوراق والازهار .

٢٨٤٣٦ - نباتات لحمية

Plantes grasses (F). Thick-leaved plants, Succulent plants (E).
هي نباتات تخزن الاوراق المكثفة بالماء للعضارة .

٢٨٤٣٧ - نباتات محولة

Plantes bisannuelles (F). Biennial plants (E).
هي التي تعيش نحو عامين .

٢٨٤٣٨ - نباتات مصلحة

Plantes améliorantes (F). Ameliorating-plants (E).
هي النباتات التي تفيد التربة وتصلحها ، اشهرها الباقية والبرسيم .

٢٨٤٣٩ - نباتات معروفة

Plantes sarclées (F). Weeding-plants (E).
هي النباتات التي تستوجب الزق .

٢٨٤٤٠ - نباتات معمرة

Plantes vivaces, P. pérennes (F). Perennial-plants (E).
هي النباتات التي تعيش أكثر من سنتين .

٢٨٤٤١ - نباتات مفترسة

Plantes carnivores (F). Carnivorous plants (E).
نباتات مختلفة الفصائل والاجناس يجمعها قاسم مشترك واحد افتراس الحشرات || الافتراس يتم بواسطة الاوراق التي تشتمل كل حشرة تقترب منها ، اغصانها للذباب واليعوض والحمام || اشهر هذه النباتات المذكورة في موطنها ، هي :

Céhalote (F).

الاجنية

Sarracénie (F).

البوقية

Grassette (F).

حشيشة الدهن

Dionée (F).

خائق الذباب

Népenthe (F).

السلول

Drosophylle (F).

النقاص

Drosère (F).

التيديمان

٢٨٤٤٢ - نباتات منبهة

Plantes épuisantes (F). Tiring-plants (E).
هي النباتات التي تستنزف خواص التربة .

٢٨٤٤٣ - نباتات نسيجية

Plantes textiles (F). Textile-plants (E).
هي النباتات الصناعية النسيجية ، اشهرها القطن والكتان .

٢٨٤٤٤ - نباتات وعائية

Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).
هي النباتات التي يشمل نسيجها اوعية يجري فيها النسج .

٢٨٤٤٥ - نباتة

Plante (F). Plant (E).
هي البنية واحدة النبات .

٢٨٤٤٦ - نباتي

Végétal (F). Vegetable (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالنباتات .

٢٨٤٤٧ - نبات

Abolément (F). Barking (E).
هو صوت الكلب . وانبع الكلب واستنبح حمله على النبات .
قال الشاعر :

قوم اذا استنبح الاضياف كلهم
قالوا لأهم بولي على النار
نفسك البول بجلا او تجود به
وما تبول لهم إلا بمقدار

٢٨٤٤٨ - نبات

Guib
هو البرع ، نوع من الجبل ، اطلبه .

٢٨٤٤٩ - نبات *

Scalaire (F). Wentletrap (E).
جنس حيوانات بحرية مفعورة من الرضويات الممدتة الاربجل . انواعه المفعورة نحو ١٥٠ صنفها بيض صفار ، هياكلها مخروطية الشكل ، حلزونية ، ناشرة التخديد المستطيل . يكثر وجودها في مجار البلاد الحارة .

٢٨٤٥٠ - نبات

Albugo, Cystopus (S). Cystope (F).
جنس فطور مجهرية من عارة النباتات وفصيلة الصنائيات .
انواعه المؤذية قليلة اشهرها النبات الابيض الذي يذوي البع والصليبيات .

٢٨٤٥١ - نبات الدبب الأبيض *

Albugo tragopogonis, Cystopus tragopogonis (S).
Rouille blanche des scorsonères, Cystope blanc des scorsonères (F). White rust of salsify (E). Weiber rost der schwarzwurzel (D).
وصم يصيب الدبب وغيره من نباتات فصيلة المركبات .

سببه فطر مجهرية من النباتات يركب نسج الاوراق في طورهما التشوي فيعزل عملها الغذائي والحياتي بما يسي الى نمو النبات وانتاجه || مظهره الخارجي يشو بيض لا قياسية الترتيب والحجم تملو نصل الاوراق فتشوها وتمنعها عن القيام بعملها الجسدي على الوجه الاكمل .
يكافح باستعمال أحد مركبات النحاس .

٢٨٤٥٢ - نبات الصليبيات الأبيض *

فطر
الصدء الأبيض

Albugo candida, Cystopus candidus (S). Rouille blanche des crucifères, Cystope blanc des crucifères (F). White blister of crucifers (E). Weiber Rost der Kreuzblütler (D).
وصم يعترى بعض نباتات الفصيلة الصليبية اغصانها

الكرنب واللثف والملفوف والفجل والرشاد || سببه فطر مجهرية من النباتات يركب السوق والازهار في طورهما التشوي . مظهره الخارجي يشو بيض تملو نسج السوق والاوراق والازهار والثمار فتشوها وتعاظمها || يكافح كسائر الصنائيات باستعمال مركبات النحاس .

٢٨٤٥٣ - نباتة *

Epimedium (S). Epimède (F).
جنس نباتات عشبية جذمورية من فصيلة البرباريسيات .



نباح



نباح الدبب الابيض



نباح الصليبيات الابيض



نباتة

Remugle (F). ٢٨٤٦٣ - نَبْدَة
Mustiness, Musty smell (E).
النبة : الرائحة الكريهة التي تكتسبها الأشياء المخزونة في أماكن لا تصلح .

Plante (F). Plant (E). ٢٨٤٦٤ - نَبْتَة
واحدة النبات تطلق على العشب والفرسة .

Nemopteridae (S). ٢٨٤٦٥ - نَبْتُورِيَّات
Nemopteridés (F). Nemopteridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شرافات الاجنحة . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة مستطيلة الاعناق . رؤوسها محرمة . عيونها صغيرة ، نائضة . قرونها الاستشعارية خيطية ، قصيرة . ملاسها الفككية مستطيلة ، منجلية الشكل . بطونها مستعرضة معتدلة التبيط . اجنحتها لمناسوية ، الزوج الامامي صغير القد ، الزوج الخلفي مستطيل ، مجذلي الشكل ، بسطته تراوح من ٣٢ الى ٥٢ سم . ثآلف البراري والادغال . يرقاتها مفترسة ، سريعة الحركة والانتفاخ في التربة || اشهر اجناسها النبتور .

٢٨٤٦٦ - نَبْتُوسُ اَزْبَع
حشرة تدعى هبون المصاحف . اطلها .

Neptune (F). Neptune (E). ٢٨٤٦٧ - نَبْتُون
كوكب سيار يقع النظام الشمسي . اكتشف عام ١٨٤٦ . قطر دائرته يعادل ضعف قطر الارض وحجمه يبلغ ١٦ مرة حجمها اما وزنه النسبي فثلاث مرات أقل من وزن الارض . دورته حول الشمس تستمر نحو ١٦٤ سنة ٢٨٠٠ يوماً . سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٩٥٤٨ كيلومتر بالساعة . يدور في فلكه قران : تريتون ونيريد .

Curage, Curement (F). ٢٨٤٦٨ - نَبْث
Cleansing, Water-pepper (E).
هو تنظيف الجارير والاقنية والانابيب ...

Platycodon (S). Platycodone (F). ٢٨٤٦٩ - نَبْثَج
جنس نباتات عشبية حولية برية ورتينية من فصيلة الجريسيات . انواعه المعروفة خمسة ، بعضها جامدة مستقيمة تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها متقابلية او ضمية ، تصلها يضي الشكل ، جامد الصلصة ، سنن الحافة . ازهارها فردية التجميع ، ابوية وطرفية الارتكاز ، عديدة الالوان يكثر فيها الازرق والايض || ازهارها يستمر من نموز الى تشرين .

Haut perchis (F). ٢٨٤٧٠ - نَبْثَجَة
هي الاجة المستطيلة النبت العالمي ج نباج .

Clavelée, Variolée ovine (F). ٢٨٤٧١ - نَبْثَج
Sheep-pox (E).
النبح او جذري الضأن مرض معد يصيب الغنم .

Advection (F). Advection (E). ٢٨٤٧٢ - نَبْد
النبد حركة الريح الاقنية الانتشار .

انواعها وضروبها البرية والرتينية عديدة . جذاميرها مدادة معمرة . سوطها منصبة حولية . اوراقها مركبة . وريقاتها مسنة الحافة || اشهر انواعها ما يتبع .

Epimedium sinense (S). ٢٨٤٥٤ - نَبَاقَةُ الصَّيْنِ
Epimède de Chine (F).
نوع من النباق الترتيني . ساقها موقرة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . ازهارها عنقودي لبد التجميع . ازهارها صغيرة ألقد يبيض اللون . تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

Epimedium alpinum (S). ٢٨٤٥٥ - نَبَاقَةُ جَبَلِيَّة
Epimède alpin, Chapeau d'évêque (F).
نوع من النباق الترتيني . ساقها موقرة تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . وريقاتها يضيية الشكل تطول من ٤ الى ٦ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهارها عنقودي التجميع ، هامى الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، صفر البتلات ، حر الفصل . تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٢٨٤٥٦ - نَبَاقَةُ رَيْشِيَّةُ الْوَرَق
Epimedium pinnatum (S). Epimède à feuilles pennées (F).
نوع من النباق الترتيني . ساقها عريضة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاب ، ريشية الشكل ، مستطيلة الاسنان الشائكة . ازهارها عنقودي ، وعل التجميع . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون . تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٨٤٥٧ - نَبَاقَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق
Epimedium macranthum (S). Epimède à grandes fleurs (F).
نوع من النباق الترتيني . ساقها موقرة تملو من ٢٥ الى ٥٠ سم . وريقاتها دوقية الشكل مستطيلة الزناد . نصلها جلوي الصلصة ، ذلق الزام الاخير . ازهارها كبيرة القد ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الضرب ، منها الايض والاصفر والاحمر والبفسجي . تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٨٤٥٨ - نَبَاقَةُ
Enation
عارض يصيب اوراق النبات فيحجبها ويشوه نصلها بطريقات وثنية تملو الاضلاع والعروق .

٢٨٤٥٩ - نَبَاقَةُ
Toxotes (S). Toxote, Archer (F). Archer, Dartier (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السمكيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها المحيط الهندي والبحر الاحمر والخليج || يدعونها ببالة لانها تنقذ الحشرات والحوام الحائمة فوق سطح الماء بنقطة ماء من فيها تجعل الطريدة تفقد توازنها وتسقط في الماء فتبتلعها البالة .

٢٨٤٦٠ - نَبْت
Végétal (F).
هو النبات ، اطله .

٢٨٤٦١ - نَبْتُ الْحِرَاجِ
Sous-bois (F). Underwood (E).
كل نبات عشبي او بجلي او جنبي يعيش في ظل الاشجار الحرجية .

٢٨٤٦٢ - نَبْت
يقال نبت الشجر اذا غرسه ورياه . ونبت الحبوب اذا بذرها للاستنبات .

٢٨٤٧٣ - تَبْدَة

هو الإنباز، أظله.

Centrifugation

٢٨٤٧٩ - نِيرَبَاسُورِي *

Gastrophilus haemorrhoidalis (S). *Estre hémorroidal* (F).

نوع من التبر، ذبابته تطول نحو ١٠ سم. ثوبها إلى السرة السوداء، صدرها إلى الكهبة يعطو غط مشعر أسود. بطنها أبيض المقدم، أسود الوسط، اعترض المؤخر. رواشها شفافة عادمة التشويش. رقاتها حمراء اللون طولها يراوح من ١٣ إلى ١٦ سم. تمر بالمدلة وتقيم فيها بعض الوقت وينتهي بها المطاف إلى السرم حيث تنقل قنق بعض الوقت تقسب الحسكاك وزنق الدم || تركيب الدواب على اختلافها وأعصها الخيل.



نير الأبل

٢٨٤٧٤ - نِيرَبَاسُورِي * شُعْرَانَة

(S).

Estre (F). *Botfly*, *Gadfly* (E). جنس حشرات من فصيلة البريات. أنواعه قليلة العدد جميعها غليظة الشكل، هليية الجسم، صغيرة الخلف، دقيقة الذيل القصير، مزركشة الثوب، شفافة الجناح. أناتها تلتقي المكن دون أن تمتص لأنها عادمة المرزات النازعة || اغرارها تحصل من رقاتها التي تدعى نفقا والتي تعيش في مددة الحويان وتحت جلده. ج نبار وأنبار.

٢٨٤٧٥ - نِيرَبَاسُورِي * شُعْرَانَة البعير

Cephalomyia maculata (S). *Céphalomylie du chameau* (F). *Botfly of the camel* (E).

نوع من التبر يركب الأبل والألبانيس. ذبابته تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. ثوبها إلى الخلفي يعطو تجذيع اصفر. تهرق مكنها بين الثوب من ظهور وياطال الأبل فينتف عن رقات خيطية هليية تغلقها الأبل بالنسب من جلودها إلى حلوقها فيطونها حيث تلتس || وتزقي حتى التسج الجلدية تنفج الجلد مع انتهاء طورها البرقي وتنسج على الارض وتتحول إلى كزود ثم إلى حشرة تعيد سيرتها الأولى.

٢٨٤٧٦ - نِيرَبَاسُورِي * شُعْرَانَة البقر

Hypoderma bovis (S).

هو لقاعة البقر، أظله.

٢٨٤٧٧ - نِيرَبَاسُورِي * شُعْرَانَة الضأن

Estre ovivis (S). *Estre du mouton* (F). *Botfly of the sheep* (E).

نوع من التبر يؤدي الغم ويهزها. ذبابته تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. ثوبها إلى الكهبة الصفراء المواج. صدرها أسود النقيط، بطنها أسود التيقج. رواشها شفافة يعطو عند قواعدها ثلاث عروق سود. تظهر من أيار إلى ايلول. أناتها تقصر المكن بين الحب الذي يحف بالأنت فينتف عن وضعه أو بعده بضع ساعات عن رقات دقيقة تسمى إلى داخل الأنت فتتسلل في مجاريه وتجاوبه وتبقى حتى اكتمال طورها البرقي الذي يدوم من ١٠ إلى ١١ شهرا. والبرقة عند نهاية تطورها تطول من ٢ إلى ٣ سم. وتعرض نحو ١٠ سم. ثوبها إلى البياض الاصفر يعطو حيد اسمر. يكافح بطني جباه الضأن بزيت السمك الذي يمنع اقتراب النسر.

٢٨٤٧٨ - نِيرَبَاسُورِي * شُعْرَانَة الفرس

Estre equi, *Gastrophilus equi* (S). *Estre du cheval* (F). *Botfly of the horse* (E).

نوع من التبر، ذبابته تطول من ١٣ إلى ١٤ سم. الاثن أكبر قدما من الذكر. ثوبها إلى الصفراء الاغبر تملو مزركشة سمراء. رواشها شفافة. يتوسطها تفتيش احمر. تظهر في اواخر الصيف ثم تلتق مكنها على اجسام الخيل والبعال والحير. مكنها اسطواني الشكل ابيض اللون دابق الطرف يلمس بالسر إلى أن ينقف عن رقات وشعية الشكل هليية الخد غراء اللون، هليية ينشب في الجلد فينبه ما يدعو الدابة إلى الحس فتعلق البرقة بالسان الذي ينقلها إلى الحلق ومنه تسير إلى المددة حيث تستقر بين طياتها الحاطية إلى أن تم انسلخاتها التي تدوم نحو عشرة اشهر فتخرج مع الروث وتتسول إلى كزود صليجية الغلاف يحسب من ٣٠ إلى ٤٠ يوما ثم تنشق الصليجة عن الحشرة الكاملة فتظهر وتعيد سيرة حياتها المذكورة.

٢٨٤٨٠ - نِيرَبَاسُورِي * شُعْرَانِيَّات

Estriidae (S). *Estriidae*, *Bot-flies* (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة الحجم، هليية الجسم، أثوابها إلى الخلفي المزركش بالاسمر والاسود. خطمها قريب الشبه من خطم النحل. اشربها تلتق لكها خالية من جهاز الوخز والرز. رقاتها طفيلية. بعضها يتطفل على الدوابن وأعصها الخجرات.



نير الضأن

٢٨٤٨١ - نِيرَبَاسُورِي *

Nebria (S).*Nébrie* (F). *Nébrie* (E).

جنس حشرات نافعة مقترنة من فصيلة التبرديات. أنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، طولها يراوح من ١٠ إلى ٢٠ سم. ألوانها زاهية، اعتمادها حنطية المروج. تعيش على المخاض البحرية تحت الحجارة والانفاض والاختساب. اشهر أنواعها:

Eurynebria complanata (S). نيربة الرمال*Nébrie des sables* (F).*Nebria brevicollis* (S). نيربة قصيرة العنق*Nébrie à cou court* (F).

نير الفرس

٢٨٤٨٢ - نِيرَبَاسُورِي * نِيرَبَاسُورِي قَصِيرَة العنق *

Nebria brevicollis (S). *Nébrie à cou court* (F).*Nebria brevicollis* (E).

حشرة قانصة من فصيلة التبرديات ورتبة مفصلات الاجنحة. تألف الاراضي المزروعة والبساتين والغابات. قوتها ما تيسر لها من الحشرات والديدان والمروج || جسمها متوسط القد بطول من ١٢ إلى ١٤ سم. ثوبها إلى السوداء الحليدية اللامع. رأسها مستعرض الجرم، قصير العنق، فكها ضليمان. زباناها خيطيان. عيناها صغيرتان. ظهراها قليل الاحديباب، مستدير الطرف اللاصق، ثمانية التحزيز العنقي النظامي المخطوط. ارساها خابية العقل || الاثن اصغر قدما من الذكر ورايت ثوبا منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الخريف. تسرح في التبار. تسافه في آب. تمتع المكن تحت الحجارة والعليل || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموري. تطول من ١٨ إلى ٢٠ سم. جسمها اسطواني الشكل، سداسي الرواجب، اسمر اللون، اسود الرأس والشرج والرواجب || طور الكمال الذي يستمر من ٥٠ إلى ٦٠ يوما ينقص في بيش عودي الفور تحفره البرقة على عمق ٥ أو ٦ سم.



نير باسوري



نيربة قصيرة العنق

٢٨٤٨٣ - نِيرَبَاسُورِي * نِيرَبَاسُورِي

Nebriidae (S).*Nébridiés* (F). *Nébridiés* (E).

فصيلة حشرات نافعة مقترنة من رتبة عمدة الاجنحة.

Faulbaum, Pulverfaulbaum, Schwarzholtz (D). Frangula, Ontano nero, Alno nero, Frangolo (I).

نوع من التَّبَقْ، شجرته صغيرة القند تملو من ٣ الى ٧ أمتار . فروعها سرحة لونها الى الاسود الازرق المواج تعلو رقة ريداء . براعمه عريانة . اوراقه متعاقبة عابطة ، فصلها سباعي او تساعي المروق البارزة . ازهاره خاسية الاجزاء ، ابطية الاذناكاز ، لا قياسية التجميع . ثماره طيبة . عشيق خفيف الوزن يستخرج منه بعد التفحص نوع من البارود شائع الاستعمال . ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

٢٨٤٩٤ - تَبَقْ الصَّبَاغِين * ، شَوْكَة الصَّبَاغِين Rhamnus tinctoria, R. utilis (S). Nerprun tinctorial, N. des teinturiers (F). Dyer's buckthorn (E). Immergrün (D). Ramno del tintori (I).

نوع من التَّبَقْ وهو جنبة شالكة تملو نحو ثلاثة أمتار . فروعها زيتية اللون ، افنانها جزئية . اوراقها تطول من ١٢ الى ١٤ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ ، فصلها الى الخصار الاصفر المواج . عرقها بارزة ملتقبة قليلة العدد . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ثمارها عنابية اللون يستخرج منها صباغ اصفر || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٨٤٩٥ - تَبَقْ الْمَسِيح Nabka (F). هو الصدر ، اطليه .

٢٨٤٩٦ - تَبَقْ جَرْدِي Rhamnus alpina (S). Nerprun alpin (F).

نوع من التَّبَقْ وهو جنبة كبيرة تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم . ساقه عريانة ، فروعها سرحة منتصبة . براعم حوشية الخمار . اوراقها عابطة ، فصلها سنن الحافة عروقه بارزة عددها يراوح من ٩ الى ١٢ زوجاً . ازهاره خاسية الاجزاء . ثماره صغيرة القند يقال انها طيبة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٤٩٧ - تَبَقْ كَلِفُولِيَّة Rhamnus californica (S). Nerprun de Californie (F).

نوع من التَّبَقْ ، شجرته صغيرة القند تملو من مترين الى خمسة أمتار . ساقه كهباء . فروعها خلية شالكة . اوراقه ابيدة ؛ فصلها جامد الصفحة ، سنن الحافة ، فسنتي اللون ، بارز المروق . ازهاره خلية الاجزاء الحاربية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٤٩٨ - تَبَقْ لُبْنَانِي Nerprun du Liban (F).

هو الزفرين اللبناني ، اطليه .

٢٨٤٩٩ - تَبَقْ مَتَرَدَف Alaterne (F).

هو الزفرين الجردى ، اطليه .

٢٨٥٠٠ - تَبَقْ مَقْدُون Rhamnus pumila (S).

Nerprun nain (F).

نوع من التَّبَقْ وهو بجلة صغيرة مثقوبة تعيش بين الصخور تملو نحو ٢٠ سم . ساقها وفروعها متعوجة سرحة . اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم . فصلها سنن الحافة بارز المروق التي يراوح عددها من ٥ الى ٧ ازواج . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٨٥٠١ - تَبَقْ مُسْهِل * ، شَجَرَة الدُمْن

Rhamnus cathartica (S). Nerprun purgatif, Bourguépine, Noirprun, Epine de cerf (F). Common buckthorn, Purging buckthorn (E). Echter Kreuzdorn, Purgirdorn (D). Ramno purgativo, Prognolino, Spina servina (I).

نوع من التَّبَقْ وهو شجرة شالكة ، رغب في الأثر البه لصبية ،

اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها صغيرة القند او متوسطة . قرونها الاستعمارية ثمانية الفواصل . اناؤها مختلفة وكثيرة . تعيش على السواحل قرب الشطوط البحرية . اشهر اجناسها التبرية .

٢٨٤٩٤ - نِيرِيس * Nebris microps (S).

Nebris (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شالكات الزعانف وفصيلة البهاريات . اعطائها بحار بعض المناطق الحارة . يكثر وجودها قرب شواطئ القويان || جسمها اهليجي الشكل متدل الحجم والتخطيط يطول نحو ٣٥ سم . ثوبا الى الشبهة الغصية يعقب في الرأس والظهر . تتميز برحابة شدتها وبعصر عيناها || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٨٤٩٥ - نِيَش

« شجر رقة كدروق الصنوبر ارزن من الانبوس خشبه احر تمل منه خماسر الجانب . وهو اصفر من شجر الصنوبر واشد اجتماعاً » (اللسان) .

٢٨٤٩٦ - نَبَضْ Poulis (F). Pulse (E).

هو الصوت الذي يحدثه اندفاع الدم من القلب الى الشرايين .

٢٨٤٩٧ - نَبْطَة Extrapoler (F).

استخلص من سلسلة معلومات او وقائع مفروضة معلومات او وقائع جديدة تسمح باطالة السلسلة .

٢٨٤٩٨ - نَبْط نبط البئر : استخرج مامها .

٢٨٤٩٩ - نَبْع

النبع : شجر تتخذ منه القسي ومن اغصانه السهام ينبت في قلة الجبل والنابت منه في السفح الشريان وفي الخضيف الشوط . قال مرة : النبع شجر اصفر البود رزينة ثقله الى ايدى واذا تقادم احمر . الواحدة نبعة . وفي الحديث ذكر النبع ، قيل : « كان شجر يطول ويعلمو فدعا عليه النبي صل الله عليه وسلم فقال لا اطالك الله من عود فلم يطل بعد » (اللسان) .

٢٨٤٩٠ - نَبْع ، قَطْع Polliniser (F).

To pollinate (E).

نَبْع وقطع وأبر : نقل غبار الطلع من متك زهرة الى مياسمها او مياسم غيرها من الازهار .

٢٨٤٩١ - نَبْطِيَّات Albugées, Cystopées (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصناتيات ، تتميز بمشج خلويي يبي جهاز بمراشف حوصلية . تكاثرها خططي ، خارجي ، مستقيم الانشعاب ، سبجي الرصف البويضي . انواعها قليلة العدد يجمعها جنس واحد يدعى البناغ .

٢٨٤٩٢ - تَبَقْ Rhamnus (S). Nerprun (F).

جنس اشجار وجنيات حرجية من فصيلة النبقيات . انواعها نحو ٦٠ معظمها شائك الاغصان والافنان . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، بسيطة . ازهارها خشوية او ثنائية المسكن . ثمارها كروية خوخية صغيرة القند || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٨٤٩٣ - تَبَقْ أَسَد * ، جَلْثَم ، عَوْسَج أَسَد

Rhamnus frangula (S). Bourdaine, Bourguène, Aune noir, Bois à poudre, Bois de chien (F). Alder buckthorn, Black alder, Glossy buckthorn (E). Gemeiner



نيريس



نَبَقْ أَسَد



نَبَقْ الصَّبَاغِين



نَبَقْ مُسْهِل

٢٨٥١١ - نَبِيخة

صوت التيس في زمن السفاد . يقال نبّ التيس .

٢٨٥١٢ - نَبِيخة

Plantule (F). Small plant (E).

هي البتة الصغيرة لا تزال في طور النشوء البدائي .

٢٨٥١٣ - نَبِيخة

Curure (F).

Dirt, Muck, Sewage (E).

هي الاعشاب والارساح والامخا والاصواع التي تستخرج من البئر والحوض والقناة عند تنظيفها .

٢٨٥١٤ - نَبِيخة *

Monodonta (S).

Monodonta, Labio (F). Monodonta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة المديبيات . انواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداقها شبه قمية الشكل ، صغرة القد ، بحلة الالوان الزاغية المرقوشة او المنطقة بالاسود والابيض . فواظها نصف دائرية الانفراج ، حمزة الخمار الداخلي ، مجهزة بنتو صغير شبيه بالنس او بالنب || اجسامها محزنة . رؤوسها صغرة ثنائية اللوامس المخروطية المعينة . ارجلها مهدبة الحمار . اسفاظها قرنية المادة .

٢٨٥١٥ - نَبِيخة *

Dothidella (S).

جنس فطور مجهرية من البياضات وفصيلة المشويات . اجسامها ميمية لا قياسية ، تكاثرها مركزة على حافة الرنبية الجلية الجول ، وبظها بيضي الشكل شفاف || اعرف انواعه الثلاثة التالية .

٢٨٥١٦ - نَبِيخة الكشمش *

Dothidella ribesia, Plowrightia ribesia (S).

فطر مجهرى يركب سوق الكشمش فيقطعها ويسبب بياها . مظهره الخارجي غضن مستطيلة حنطلة اللون تملو حلاء الفروع فتسبب تخفدها وتشقيها ثم بياها . || يكتا ح يقطع وحرر الفروع الموبدة وينفخ الاشجار بسائل يورده لالحول ١٪ .

٢٨٥١٧ - نَبِيخة المطاط *

Dothidella uteli, Scoleotrichum heveae, Fusicidium macrosporum, Passalora heveae (S).

فطر مجهرى يصيب المطاط فينبى انتاجه بعد ان يؤذي جميع اعضاءه الهوائية || مظهره الخارجي يقع زيتية تبتدئ صغرة ثم تكبر وتسبب يباس التسبب المطرب فيبدو التصل كالغربال . وقد يركب الانزاع والثار فيؤذيها ويكتنف الاغصان فيلطمها يقع قرسية سود || اضراره تعود الى نسبة عطب الاوراق والاغصان لانها تزر في انتاج المطاط . يكثر في الاراضي الرطبة الواقعة في الاقاليم الحارة . يكتا ح يتعففس التربة وياستهال احد الفطائر الغفالة .

٢٨٥١٨ - نَبِيخة النفل *

Dothidella trifolii, Sphaeria trifolii, Polytetrinidium trifolii (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق النفل ، على اختلاف انواعه ، فيقطعها ويسبب بياها || مظهره الخارجي نكت سود مستترة الشكل قطرها نحو ١ م . تركب التصل على صمخته السفل . تظهر وتتكاثر في الربيع قبل حلول الصيف . اضراره تعود الى نسبة عطب الاوراق .

تتلو من مترين الى سبعة امتار . فروعها وافنانها شائكة الاطراف . اوراقها وافنانها متقابلة . نصال اوراقها يفضية الشكل مقطوعة تقطو من ٥ الى ٩ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ ، عروقها بارزة ملتفة . اضرارها خشوية ، خاصة الاجزاء ثامرها طيبة تستعمل في عدة علاجات بيطرية وفي سوداء اللين ، بنفسجية اللباب الحوضي || اضراره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٥١٢ - نَبِيخة

Rhamnaceae (S).

Rhamnaceae (F). Rhamnaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين كثيرة . الفعالات اجناسها وانواعها زهاء ٤٥٠ اعطاها جبال وعصاف البلاد الممتدة الحرارة والحارة . اشهر اجناسها البلق والغباب . نباتاتها مجهرات وسنبات . اوراقها لا قياسية التشكيل ، منسها البسيطة والمركبة . اضرارها ابطية خشوية او ثنائية المسكن . ثامرها لحية منها المأكولة وبعضها طيبى وصناعى .

٢٨٥١٣ - نَبِيخة

Souche (F). Stump (E).

النبيخة هي الجرثومة كقولك نبيخة الشجرة اي جرثومتها . ج نيك ونيك .

٢٨٥١٤ - نَبِيخة

Nebalia (S).

Nébalie (F). Nebalia (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا رقبات الصدف . انواعها قليلة العدد تعيش في المواع التي تكثر فيها الرحول البحرية والاسمال || اجسامها صغرة قرنية الشبه بالقريدس . عيونها منزدة . قواظها الصدرية متساوية القد ، ثنائية المخادف .

٢٨٥١٥ - نَبِيخة *

Sagitta (S).

Flèche (F). Sagitta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة الريانات . انواعها المروفة قليلة العدد . جميعها ميمية . اعطاها بحار البلاد الحارة والممتدة الحرارة . اسرارها متوسطة العدد . تظهر على سطح الماء بعد غروب الشمس || اجسامها عريانة مستطيلة شبه وشعية الشكل ، هلامية المادة ، شفافة . افواظها غطسية مهدبة الحافة . زعانفها مستطيلة الشكل ، الذيلية منها مغلوقة .

٢٨٥١٦ - نَبِيخة

Népenthe (F).

نبات يعرف بالوس ، اطلية .

٢٨٥١٧ - نَبِيخة

Flore (F). Flora (E).

جاء النباتات في قطر او بلاد . يقال نبوت لبنان ونبوت الشرق الادنى ، الخ . . .

٢٨٥١٨ - نَبِيخة مائية *

Flore aquatique (F).

Aquatic flora (E).

النباتات التي تعيش في الماء او في الخناق .

٢٨٥١٩ - نَبِيخة

Végétatif (F). Vegetative (E).

نعت تربوي يدل على المقدور الانباتي .

٢٨٥٢٠ - نَبِيخة

Forjet, Forjeture (F).

Projection (E).

النور ننو غير عمودي يحصل في البناء . او ننو غير مستقيم يحصل في التخبط .



نبلة



نبيخة



نبيخة الكشمش



نبيخة النفل

Portée (F). Bearing (E).

٢٨٥٢٩ - نَبَاج

التاج مجموع ما تقصه اثنى الحيوان البون من جراء في ولادة واحدة . راجع بحيل .

Produit (F). Produce (E).

٢٨٥٣٠ - نَبَاج

اسم يشمل وضع جميع البهائم .

Exsudat (F).

٢٨٥٣١ - نَبَاج ، نُحُوح ، لَتَى

Exudate (E).

Vis-à-vis (F). Opposite (E).

٢٨٥٣٢ - نَبَاق ، حَيَال

بني داره نَبَاق داري أي قبالتها .

Apogamie (F).

٢٨٥٣٣ - نَبَالَة ، نَعَل

Apogamy (E).

مجموعة الوسائل التي يمكن بعض النباتات الدنيا من الكاثر في حالة فقدانها الشقية .

Transpiration (F).

٢٨٥٣٤ - نَبَاح

Transpiring (E).

رشح الافرازات المائية الزائدة عن حاجة النسيج الحيوانية والنباتية في بعض الظروف الخاصة .

Nitrification

٢٨٥٣٥ - نَبَرَجَة

تفاعل جرثومي كياوي يحول الازوت العضوي الى امونيا في فينيري فينيراني ولا يتم الا عن طريق الجراثيم التي تغير الحالة . لذلك فجراثيم النترجة على ثلاثة أنواع لثلاث حالات .

Nettastoma (S).

٢٨٥٣٦ - نَبَسْتُوم

Nettastoma (F). Nettastoma (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البشقيات مفنوحات المائة . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة كاجسام الانقليس . رؤوسها واعناقها اسطوانية . مخاطها مستطيلة ، مقطوعة الاطراف الفظيضية الشكل . اشداها كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية تتقابل وتلتحم عند طرف الذنب || اعرف انواعها واشهرها تنسوم المتوسط .

٢٨٥٣٧ - نَبَسْتُوم أُرْبَد رَصَاصِي * ، نَبَسْتُوم

المُتَوَسِّط .

Nettastoma melanura (S).

Nettastoma gris plomb, N. de la Méditerranée (F).

Nettastoma melanura (E).

سمكة بحرية بيوض من النستوم . اعطائها البحر الأبيض المتوسط . تعتبر من اسماك المجامع والتفاف . مسرحها المادي في الطبقة التي يراوح عمقها من ١٠ الى ٣٠ مترًا || جسمها شبه انقليسي الشكل ، اسطوانية العنق والراس والخطم ، يطول نحو ٨٠ سم . مسكها عادم الحراشف وتشاء مادة مخاطية لزجة || ثوبها الى اليردة الرصاصية الفضية المواجه || زعنفتها الظهرية تلتقي بالشرجية عند طرف الذنب || لحمها متوسط الصنف ، أجود من لحم الانقليس .

٢٨٥٣٨ - نَبَش ، نَبَش ، نَبَش

Radicle (F). Radicle (E).

جذر البزرة الجنيني .

٢٨٥٣٩ - نَبَع

Perspiration (F). Perspiration (E).

التنع صدور التنج من المسام الجلدية على شكل بخار لا يشاهد بالعين المجردة ولا ينشأ منه الجلد كما في العرق .

٢٨٥١٩ - نَبِيدِيَّات ، نَبِيدِيَّات

Nabidae (S). Nabidés (F). Nabidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبيعة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، معتدلة البسيط ، ملونة . رؤوسها صغيرة معتقة . اخطائها رباعية الاجزاء . عيونها جانبية الارتكاز . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، رباعية الفص . كواسلها يرمية الشوزن ، ترتكز على قواعد شبه مستديرة . حجابها صغيرة محرمة . حناجيبها متباينة الحجم ، يكثر فيها الصغر والقصر . رؤوسها لاحفة . قوائمها نشيطة || جمع انواعها خاضعة تعيش على اوراق النباتات البرية .

٢٨٥٢٠ - نَبِيد ، خَصَر

Vin (F). Wine (E).

شراب كحولي يحصل من اختار عصير الثمار اغصها العنب .

٢٨٥٢١ - نَبِيد الإِجْصَاص ، نَبِيد الكَمْثَرِي

Polré (F). Perry (E).

شراب يتخلص من عصير الاجاص .

٢٨٥٢٢ - نَبِيد العَسَل

Enomel

شراب يستحصل عليه من تخمير العسل مع عصير العنب .

٢٨٥٢٣ - نَبِير

Fromage (F). Cheese (E).

هو الجبن ، تقول اكلت النبير .

٢٨٥٢٤ - نَبِيس الخَلْنَج

Nabis ericetorum (S). Nabis des bruyères (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النبدييات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ م . رأسها صغير الجرم ، بني اللون ، احمر المراج . خطمها معتدل الطول ، طليق . عينها صغيرتان ، بارزتان . زباناها دقيقان مستطيلان . كوسلها بني مزركش بالاسود . حجبها صغيرة سوداء . ظهورها لاحف ، وردي اللون . نبطها احمر المذب . قوائمها مستطيلة || تألف المراج . قوتها اوراق الخلنج والقطلب ...

٢٨٥٢٥ - نَبِيس قَقْرِي

Nabis ferus (S).

Nabis sauvege (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النبدييات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٩ م . رأسها صغير ، حنطي اللون ، اسمر المراج . خطمها طليق ، معتدل الطول . عينها صغيرتان . زباناها مستطيلان . كوسلها الى الحنطي الاسمر . حجبها صغيرة سوداء . ظهورها لاحف ، حنطي اللون ، وردي المراج . اسود العروق والاعاصيب . نبطها اسمر . كثيف العمل والزغب . قوائمها مستطيلة ، حنطية || تألف البراري والمراعي . قوتها اوراق الاعشاب على اختلاف فصائلها .

٢٨٥٢٦ - نَبِيقَة

النبيقة زعمة الكرمة اذا عظمت . ج نباتي .

٢٨٥٢٧ - نَبِيسَة

هي الورقة التي اعترتها النباكة .

٢٨٥٢٨ - نَبَاة ، نُحُو

Omboon, Protubérance (F). Umbo, Protuberance (E).



تنسوم المتوسط

٢٨٥٥٣ - نَثْرة

النَثْرة منزل من منازل القمر الشامية ، يقال لها أيضاً أنف الأسد . وهما كوكبان بينهما رقعة قدر شبر يملوها تلطيخاً غير كأنه قطع بحباب || رقب النَثْرة يدعى سمد الذابح .



نوم اشبه

٢٨٥٥٤ - نَطَط Levée (F). Gathering (E).
هو اول ظهور النبات بعدما يصدع التربة ويقل أن يجلها .

٢٨٥٥٥ - نَتُور Prolifique, Multipare (F). Multiparous (E).
صفة الحيوان الكثير التاج || انثى الحيوان تلد عدة اولاد معاً .

٢٨٥٥٦ - نَثِير Ebrouement (F). Snorting (E).
النثير هو عطاس الدواب . تقول نثرت الدابة : عطست .

٢٨٥٥٧ - نَقِيط Embryon (F). Embryo (E).
هو الملقحة النباتية .

٢٨٥٥٨ - نَجَا Naja (F).
في الصل ، جنس حيات خبيثة من امميات الاخايد .



نجر

٢٨٥٥٩ - نَجَاب Corticicole (F). Bark miner (E).
النجاية هي الحشرة التي تقضي الدورة البرقية من حياتها داخل لحاء الاشجار .

٢٨٥٦٠ - نَجَار Lactarius lactarius (S).
Lactaire, Lactaire pêche-laie (F).
سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الاسقمريات . موطنها البحر الاحمر والخليج وبحار الهند . جسمها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . رأسها مقنطوم ، زعنفتها الشرجية فارقة . ثوبها الى الخضار القضي المالح . لحمها لذيذ الطعم جيد الصنف .



نَجَالة

٢٨٥٦١ - نَجَافَة * Pelamis (S).
Pélamis (F). Pelamis (E).

جنس حيات خبيثة سامة من امميات الاخايد وفصيلة الهيدروفيات . انواعها المروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اعصها البحر الاحمر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها مستطيلة شبه مزاوية الشكل . رؤوسها صغيرة مخروطية الشوذن . اذنانها مبطنة عجايدية . اثوابا ثنائية اللون ، النصف العلوي عايد الخضار الاليس او الازرق الاسود والنصف السفلي الى الريدة . اذنانها مرقوشة .

٢٨٥٦٢ - نَجَال Dactyloctenium (S).
Dactylocténion (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، ممددة من فصيلة النجيليات . انواعها المروفة سبعة . منها بعض اقالييم البلاد الحارة من الشرق الاذل واfrريقية الشرقية || جميع انواعها شطئية . عصفها ضيق مستطيل ، يكثر فيه التسنين الدقيق الحاد . ازهارها طري مكنل ، لبد الزغب .

٢٨٥٦٣ - نَجَالَة Agrostology (F).
Agrostologie (E).
درس يبحث في نباتات الفصيلة النجيلية .

٢٨٥٤٠ - نَتَل

النَتَل والنَتَلُ بيض النعام الفارغ .

٢٨٥٤١ - نَتَلَة Bourse (F). Purse (E).
هي الابنة النورية استكملت جرمها المميز .

٢٨٥٤٢ - نَتُوج Pleine (F). Full part (E).
التنوج : الحامل من الدواب وجميع الحافار .

٢٨٥٤٣ - نَتُوم Neotoma (S).
Néotome (F). Neotoma (E).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الفأريات . انواعه المروفة قليلة العدد اعطائها بعض المناطق الامريكية . تألت الموامق القريبة من الماء . قوتها المواد النباتية والصفناود وبعض الثريات اعصها السرطان || اجسامها ربعة متوسطة القد تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . بما فيها الذنب . وهي شبيهة بالجرذون وبالقناد في آن واحد . اثوابها تختلف مع الانواع || تحلل اجسامها في الهوم وفي مؤلفه من انفاق مستطيلة وحجر وسطى فسيحة وتعرض الانفاق من البين والبسار عدة دهاليز تحزن فيها مؤنة الشتاء || الاناث تقص من ٤ الى ٨ ادراس ترضعها نحو اربعة اسابيع || اعرف انواعها واشهرها :

٢٨٥٤٤ - نَتُوم أَشْهَب * Neotoma cinerea (S).
Néotome gris (F).

طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الشبهة يسمر بعض النثير في الرأس والظهر ويغير في البطن . وبره متدل الطول . ذنبه جشيل يشبه ذنب السنجاب الا انه اقصر منه .

٢٨٥٤٥ - نَتُوم فلوريدا Neotoma floridana (S).
Néotome de la Floride (F).

طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الريدة السوداء . بطنه الى الريدة البزراء ، وبره نام قصير . ذنبه حشفي القشار عادم الورب .

٢٨٥٤٦ - نَتِيجَة Conclusion

٢٨٥٤٧ - نِثَاق Onguent (F). Unguent (E).
المزج ينث به المزج .

٢٨٥٤٨ - نِثَار، نَثَر Fécondité (F). Fecondity (E).
كثرة التاج في البائم .

٢٨٥٤٩ - نِثَالَة Déblai (F). Clearing, Cutting (E).
تراب الزكية يستخرج منها وكل تراب يستخرج من حفرة او ردم .

٢٨٥٥٠ - نِثَد Pointer (F). To point (E).
نثد : نبت ، يقال نثد الفطر ونثدت الكمامة : خرجت من الارض .

٢٨٥٥١ - نَثَر Epandre (F).
نثر الشيء : ذره بالسواي . . To scatter, To strew (E).

٢٨٥٥٢ - نَثَر الأسمدة Epandage des engrais (F).
Scattering of fertilizer (E).
هو ذر الاسمدة على التربة وقد يتم اما باليد او بواسطة آلات خاصة تقوم بهذا العمل .

Etoile polaire (F). **نَجْمَةُ الْقُطْبِ** - ٢٨٥٨٠

Pole-Star (E).

نجمة القطب أو القطب نجم نير بين الجدي والفردين
تنبى عليه القبلة .

Ostracionidae (S). **نَجْمِيَّات** - ٢٨٥٨١

Ostracionidés (F). Ostracionidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة ملحومات الفكوك اجناسها
وانواعها عديدة ، اشهرها أبو صدوق .

Aster (F). **نَجْمِيَّة** - ٢٨٥٨٢

هي الأسطر ، اطلبه .

Nutrition (F). **نَجُوع** - ٢٨٥٨٣

راجع مادة اغتذاء .

Stelleridae (S). **نَجْمِيَّات** - ٢٨٥٨٤

Stelleridés (F). Stelleridae (E).

شعبة حيوانات من صف الثوكيات يشمل نجوم البحر .

نَجْمِير * ، سَقُون - ٢٨٥٨٥

Agropyrum junceum (S). Agropyre, Froment des
jones (F). Sea wheat grass (E). Binsenquecke, Binen-
weizen (D). Agropiro (I).

نبات عشبي بري مرعوي من فصيلة النجيليات.
يكثر بين الزروع وفي الاراضي المذمسة وعلى جوانب
الطرقات الريفية .

نَجْمِير زَاحِف * - ٢٨٥٨٦

Agropyrum repens, Triticum repens (S). Agram,
Chlendent rampant (F). Couch grass, Quitch grass,
Twitch grass (E). Echte quecke, Grasquecken (D).
Gramigna, Caprinella (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه عقدية
مدادة نسيطة كثيرة الانعصاب والأذى لانها تثب التربة
وتتقن الاعمال الزراعية وتسيء الى النباتات المزدرة ان لم
يقض عليها .

نَجْمِيرَة - ٢٨٥٨٧

سقية من خشب ليس فيها قصب ولا غيره .

Agrostis (S). Agrostide (F). **نَجِيل** - ٢٨٥٨٨

جنس نباتات عشبية مرجية معمرة من فصيلة النجيليات .
بعضها يزرع في المروج . اكثرها ينبت عرضاً ويسوء
الى الزروع وسائر النباتات || اشهر انواعه ما يلي .

نَجِيل أَيْبُس * ، أَرْوَا أَيْبُس - ٢٨٥٨٩

Agrostis alba (S). Agrostide blanche, Florin, Traine,
Pavine (F). White bent grass, Florin grass (E).
Weisses Straussgras, Floringras (D). Agrostide
blanca, Pennacchini (I).

نوع من النجيل ونحو نبات مرعوي بري معمر يملو من
٢٠ الى ٥٠ سم. عصفه ضيق النصل جيل الخضار .
سبيلاته صغيرة القد، متباعدة النجيب ، يضاء اللون .

نَجِيل أَحْمَر * ، أَرْوَا أَحْمَر - ٢٨٥٩٠

Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin
rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herden-
gras (D). Fieno rosso (I).

نوع من النجيل المرجي المرعوي المعمر يملو من ١٠ الى
٦٠ سم. عصفه مستطيل النصل الجامد . اغداد غليظة
جووية اللون . سبيلاته مستطيلة ، سبيلاته متفرقة .

Liber **نَجَب** - ٢٨٥٦٤

الطبقة السفلى من اللحاء تكون بين القشرة والخشب في
سوق وجذور النباتات الوعائية .

نَجَبَة - ٢٨٥٦٥

هي قرصة النمل اي حصن قريته المد لحسن المازن .

Péricarde (F). **نَجْب ، نَجْب** - ٢٨٥٦٦

Pericardium (E). هو الشف ، غلاف القلب .

Coteau, Plateau (F). Slope (E). **نَجْد** - ٢٨٥٦٧

النجد ما اشرف من الارض وارتفع . ج أجد وأجداد ونجد
ونجد . والنجد المكان لا يجر فيه .

نَجْد * ، نَجْدَة ، زَهْرَة العُجْد - ٢٨٥٦٨

Coleus (S). Coleus (F). French nettle (E). Buntlippe,
Buntblättrigenessel (D). Coleus (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه
المعروفة نحو ١٢ معظمها بري طبي وبعضها زينة .
سوقها فراء ، تملو من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متعاقبة
معققة كاملة ، فصالحا قلبية الشكل ، خلية البشرة ،
مسنة الحافة . ازهارها صغيرة القد ، ضمية التجميع ، عديدة
الالوان ، يكثر فيها الازرق .

Dolsage (F). Planing (E). **نَجَر** - ٢٨٥٦٩

نحت الخشب وقصه وتركيبه .

Simulie (F). Simullum (E). **نَجْرَس * - ٢٨٥٧٠**

النجرس والنقرس والقنرس : بومض صغير اجزم الأنف
يشبه السكيت ، لسعه مؤلم .

Transhumance (F). **نَجْمَة** - ٢٨٥٧١

طلب الكلا في موضعه ، راجع انتجاع .

Pastoral **نَجْمِيَّ** - ٢٨٥٧٢

Déboisement (F). **نَجْف** - ٢٨٥٧٣

Deforestation (E). النجف هو قطع الاشجار من اصوفا وبادتها .

نَجْمَة القليل من الشيء . - ٢٨٥٧٤

Bloquer (F). **نَجَل** - ٢٨٥٧٥

نجل التربة : شققها للزراعة .

Etoile (F). Star (E). **نَجْم** - ٢٨٥٧٦

ويسمه عام كل كوكب سماوي ثابت او سيار يدعى نجماً ،
ما عدا الشمس والقمر . ويوسمه خاص ، كل كوكب
نير يتلألأ في السماء ويبدو ثابتاً في مركزه الفضائي .

Acaule (F). **نَجْم ، نَجْمَة ، مَقَر** - ٢٨٥٧٧

Acaulous, Stemless (E). اسم تعريفي وصفي يطلق على كل نبات لا ساق له .

Ostracion cornu (F). **نَجْم أَحْطَم** - ٢٨٥٧٨

سكة بحرية مشهورة باسم ابوصندوق احطم ، اطلها .

Alétris (F). **نَجْم لَامِع** - ٢٨٥٧٩

هو حشيشة الآخ ، اطلها



نجد



نجرس



نجير



نجير زاحف



نجيل ايبس



نجيل احمر



نَجِيلِ أَرْزَق



نَجِيلِ أَسْوَد



نَجِيلِ عَائِق



نَحَام



نَحْبُوسِ الشَّافِ

وهو لا يتأثر بألوانه الناشف التي إنما يتأثر بألوانه الرطب وبالعنايات الحامضية التي تتلقفها بطنية من الإلحاح المختلفة الألوان والتركيب أشبهما الزخارف الأخضر السام ، وهو ما يدعو إلى « تبييض » أي طلاء الأواني النحاسية المطبوعة بالقصدير .

٢٨٦٠٠ - **نَحَال** (F). Bee-keeper (E). Apiculteur (F). من تقاطي تربية النحل .

٢٨٦٠١ - **نَحَالَة** (F). Bee-keeping (E). Apiculture (F). هي فن تربية النحل . وهي تتركز على أصول وقواعد لا بد من الإلمام بها للوصول إلى أجود النتائج ولإجتناب أوجع المواقف لا نذكر شيئاً عما يجب معرفته عن النحلة ونظام حياتها وتغليتها أو فقيرها إنما يرشد الذين يتباطون هذه التربية إلى أفضل السبل التي تؤمن استرداد النجاح . أخصها : درس المتلفة لمعرفة المواقف التي تكثر فيها التباينات المفترية و تركيز المناهل في الأماكن الصالحة ضمن المتلفة المتخينة والحفاظ على الثوال قوية ، كثيرة العدد ، أمراثها ملكات فتية ؛ منع الإفراخ قدر المستطاع ؛ الإبقاء على ما يلزم من عمل في كل غلية أو قفير كئذله لفصل الشتاء ؛ اجتناب زيارة القفران وتدخينها في شتى المناسبات والظروف العادية .

٢٨٦٠٢ - **نَحَام** ، * ، **نَحْرُوش** ، **سُرْحَاب** ، **مِرْزَم** ، **نَحَام** (F). Phœnicopterus (S).

واحدته نحامة ، والنحام جنس طيور مائية من فصيلة النحاميات . أنواعه ستة جميعها طويلة الأعناق والسيقان إلى حد الفراية ؛ ارتفاعها منتصبة يراوح من ١٥٠ إلى ١٧٠ سم . مناقيرها غليظة منقعة صفر الأجسام سود اللامط . أثوابها إلى الحمرة الوردية الزاهية قوامه سواقطها سود . أنثاها بيض الريش حر القوامد || أعطانها السواحل البحرية . يألف رقار الماء ومصبات الأنهر . يمتص صائب يراوح عدد أفرادها من ٥٠ إلى ٥٠٠ أنثاها تحضن من ٢ إلى ٣ بيضات في عش رفيع تركزه على الحفص تحتطيه طوال مدة الترخيم كما يحتمي الفارس القرس .

٢٨٦٠٣ - **نَحَامِيَّات** (S). Phœnicopteridae (S). Phénicoptéridés (F). فصيلة طير وسيدة الجنس من صفحيات المناقر ورتبة كنفيات القدم .

٢٨٦٠٤ - **نَحْبُوسِ الْعَاب** ، * ، **تَطَّاطُ الْعَاب** (F). Nemobius sylvestris (S). Grillon des bois, Némobie (F). حشرة من الجندقيات صغيرة القدر رتبة الشكل سود الرأس صفراء الدرز سمراء الجسم المهبذ والمتعطف بالأصود والأخضر . ظنايبها مسلحة بالهلب الشائك الثلاثي التجميع . ظهران ذكورها أسمر اللون يلحف النصف الأول من البطن . ظهران أنثاهن صغير القدر يكاد لا يلحف نصف الزايل الأول من البطن || يظهر في أوائل الصيف . يألف النابات والأحراج . سرجه يستمر من الشروق إلى فحة الليل . يعيش على المواد العضوية . يستكن تحت الجلالة والعليل .

٢٨٦٠٥ - **نَحْبُوسِ شَفَّاف** ، * ، **تَطَّاطُ إِيْطَالِي** (F). Ecanthus pellucens (S). Grillon d'Italie, Ecanthe diaphane (F). حشرة من الجندقيات متوسطة القدر ، نحيلة الجسم ، معطلة الرأس ، خفراء الثوب الأصفر المواع . طويلا يراوح من

٢٨٥٩١ - **نَجِيلِ أَرْزَق** ، * ، **نَجِيلِ كَوَكَبِي** ، **سَنَبِلَة** (S). Agrostis verticillata (S).

Agrostide verticillée, Trainasse (F). Switch grass (F). Haargras (D). Granacino (I). نوع من النجيل المرجي المرعوي المعمر . يعلو من ٣٠ إلى ٩٠ سم . عصفه عريض النصل المستطيل . أعماه جادة ، مابقة الخضار . سنابله كبيرة القصد ، شديدة الخضار البنفسجي الموالج .

٢٨٥٩٢ - **نَجِيلِ أَسْوَد** (F). Agrostis vulgaris (S). Agrostide commune (F). Bent grass, Black quitch grass (E). Rotes Straussgras (D). Agrostide vulgare (I).

أشهر أنواع النجيل وأضيها وهو من النباتات المعمرة الجذمورية المدادة المؤذية التي تميش وتتكاثر في جميع الأزربة أخصها المروية . أضراره تشمل التربة وما عليها من نبات . || استئصاله من التربة واجب رغم صعوبة تحقيقه .

٢٨٥٩٣ - **نَجِيلِ عَائِق** (F). Agrostis nebulosa, A. capillaris (S). Agrostide nébuleuse, Foin capillaire (F). Cloud grass, Bird grass (E). Prachtvoll (D). Agrostide capillaire, Erba d'ucello (I).

نوع من النجيل المرجي المرعوي يعلو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . عصفه عايق الخضار . أعماه جادة . سنابله كثيفة التجميع فسخة .

٢٨٥٩٤ - **نَجِيلِ عَطَر** (F). Flouve odorante (F). هو الانتروكسانت ، اطباء .

٢٨٥٩٥ - **نَجِيلِيَّات** (S). Graminées (F). Graminaceae (E).

فصيلة نباتية من وسيدات الفلقة . اجناسها ٣٠٠ وأنواعها ٣٥٠٠ ، معظمها أعشاب حولية وبعضها جذموري معمر . سوقها قضيبية جوفاء السلايات . أوراقها شراشية عصفية مستقيمة المروق . أزهارها باكثرها سبيلية التجميع . ثمارها حبوب غنية بالمواد النشوية . واليها تنتمي أهم النباتات الغذائية والمغذية كالقمح والذرة والارز والشعير والخرواطال الخ ...

٢٨٥٩٦ - **نَجِين** (F). Néogène (F). ما كان حديث العهد من طبقات الارض السطحية ، اطلب نيوسين .

٢٨٥٩٧ - **نَحَار** (F). Embryogénie (F). Embryogeny (E).

علم يبحث في تغلث المراحل التي يمر بها الجسم الحيواني أو النباتي من حين تكوينه إلى تمام كماله .

٢٨٥٩٨ - **نَحَارَة** (F). Embryogenèse (F). Embryogenesis (E).

النحارة علم يبحث في اصل الملقوسة وفي الاجزاء التي تتكون منها .

٢٨٥٩٩ - **نَحَاس** (F). Cuivre (F). Copper (E). معدن جزوي اللون اسفج المواع يتميز بقابليته للتحرق والسحب وبايصاله للحرارة والكهرباء || يدعى (نح - نح) (Cu) وزنه الأتومي ٦٣,٥٧ ، ثقله النوعي يراوح من ٨,٨٥ إلى ٨,٩٥ ، صلابته من ٢,٥ إلى ٤ ؛ ينصهر في ١٠٧٥°س .

- Apis fasciata (S). نحلة مصرية
Abeille égyptienne (F).
Apis indica, A. dorsata (S). نحلة هندية
Abeille indienne (F).
Apis cecropia (S). نحلة يونانية
Abeille grecque (F).

٢٨٦١٠ - **نَحْلَة**
النحلة كوكبية نجوم موهبا الجنوب مركزها تحت قديم
قطبوس بين كوكبة الحراة وكوكبة الصليب . عدد
نجومها ١٣ منها نجم واحد من المرتبة الرابعة .

٢٨٦١١ - **نَحْلِيَّات**
Apidae (S).
Apidés (F). Apidae (E).
فصيلة النحل من رتبة غشائيات الاجنحة .

٢٨٦١٢ - **نُحُور**
Diverigation
هو الانتداد الانقباضي عن الشكل الجسموي المعروف .
اسبابه كثيرة تعود الى عوامل شتى اخصها الاوصام وفعالية
الادوية ومدى تأثيرها في التسج المنسية .

٢٨٦١٣ - **نَحْوص**
Anesse pleine (F).
النحوص هي الاقان الوحشية الحامل . ج نحص ونحاص .

٢٨٦١٤ - **نَحْي ، سُكُوء ، سَقَاء**
Baratte (F).
Churn (E).
وعاء تمخض فيه الكتانة لاستخراج الزبدة .

٢٨٦١٥ - **نَحْيِيَّة**
Cadre (apic.) (F). Section (E).
لوح من الشمع المصنوع يحمضه اطار من خشب يوضع
في القفص فيشيد النحل عليه تخاريبه ويمر اقراصه .
ج تحت .

٢٨٦١٦ - **نَحْيِيَّة**
Substratum
ركيزة الصفات المميزة في الشيء .

٢٨٦١٧ - **نَحْيِض**
Amorphe (F).
Amorphous (E).
عديم التبلور ، غير محدد الشكل .

٢٨٦١٨ - **نَحْيِيَّة**
Abre petit (F).
هي الاروس العطر ، اطليه .

٢٨٦١٩ - **نَحْيَاة**
Sélectivité (F). Selectivity (E).
٢٨٦٢٠ - **نَحْطَاس ، جَنْبَل**
Maquignon (F).
Horse-dealer, Horse-coper (E).
هو تاجر الخيل . وتجارة الخيل تدعى نحطاسة وجنبرة .

٢٨٦٢١ - **نَحْطَاشِش**
Oües (des poissons) (F). Gillis (of fish) (E).
هي في الاسماك الخروق الفرجية التركيب القائمة عند مؤخر
جانبي الرأس . وظيفتها صرف الماء الذي ترشقه الاسماك
بمقاطعتها عند التنفس . الواحد نخشوش .

٢٨٦٢٢ - **نَحْطَاس ، نَحْطَاس**
Moelle (F). Marrow (E).
يقسم النحطاس الى ثلاثة اقسام : النحطاس العظمي او رَم
العظم والنحطاس الشوكي او الحبل الشوكي والنحطاس المستطيل .
فالنحطاس العظمي نسج دهني يحمضه السمحاق الباطن ،
يوجد في تجاويف العظام وفي ثناياها الاسفنجية وهو على
نوعين ، ابيض اغبر مركزه في تجاويف العظام الطويلة واسمر
احمر المواج مركزه في فجوات الثنايا الاسفنجية || اما

الى ١٥ م . ظهرنا شفاف يطول عند الذكر من ١٠
الى ١٥ م . وعند الانثى من ٩ الى ١١ م . زباناها خطيئة
الشكل مجنحة الطرف . سيقانها الخلفية تطول من ٨ الى
٩ م . مرز الانثى جالس الانتشاب يطول من ٦ الى ٨ م .
يظهر النحوص الشفاف عند اوائل الصيف . يأنف الاغفال
والاعشاب الرقيقة . اناته ترز السرة في سوق ونبوع
النباتات المختلفة اخصها الاقسن والحشفت والشنداب
والبرواق والحيويات على اختلاف انواعها والتنع وسروع
الكركمة || دباهه ونعيقانه وحشراته الكاملة تعيش على
اوراق النباتات والمواد العضوية || مسرعه دجوي يستمر
من الغروب الى الفجر .

٢٨٦١٦ - **نَحْص**
Piedmont (F).
اصل الجبل وصفحه .

٢٨٦١٧ - **نَحْص**
Asepsie (F).
Aseptic methods, A. treatment (E).
مجموعة الطرائق العلاجية التي تستعمل الميكروبات دون
الاستمالة بالعوامل المضادة لها .

٢٨٦١٨ - **نَحْطَلَة**
هي اللهجة ، اطلبها .

٢٨٦١٩ - **نَحْل**
Apis (S). Abeilles (F). Bees (E).
جنس حشرات مفيدة من فصيلة النحلويات ورتبة غشائيات
الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة ، اعطائها العام . قوتها
الكبير ورسوق الاضرار . اجسامها اسطوانية الشكل .
عيونها مركبة ، اعطائها قارضة لافعة . صدرها نشيطة
تعمل ثلاثة ازواج من الاجنحة الشفافة . بطونها مركبة
من عدة حلقات وبرجات تنتهي بشذام لامع عند الامامات .
والنحل يعيش عيشة اشتراكية تعاونية في مستعمرات مستقلة
مؤلفة من ثول قوامه ملكة او اثني كاملة تعيش نحو ٥
سنوات وظيفتها منح السرة . جسمها مستطيل الشكل عديم
الحلم الاذن ما يمنحها عن تناول الغذاء تلقائيا وما يدعو
وصيفاتها الى تزويجها المستمر . ثم البيخور وهو الذكر
الذي يركم الملكة مرة واحدة في حياتها يموت له اثرها .
وبالخير لا يقل عددها في الثول الواحد عن بضع مئات ،
وهي اكبر حجما واغظل جسما من الامامات وهي عادمة
الشذام اللامع . حياتها تطول من ٨ الى ١٠ اسابيع وتعيش
ما تحية الامامات . ثم العاملة وهي اثني ناقصة التركيب ،
عادمة الشوار الجنسي ، وظيفتها جني الرقيق والطعم وصنع
الدنج والشمع والعسل وحراسة الخلية وتدير شاتها وشان
الحضنة والسمي . وهي مجوزة بشذام لامع تستعمل للدفاع
عن النفس . والامامات التي يبلغ عددها عدة آلاف تشكل
اكثر من ٩٩ ٪ من مجموع افراد الخلية او الثول . وهي
تعيش من ٣ الى ٥ اسابيع باستثناء فصل الشتاء حيث
تعيش نحو عشرة اسابيع . || اما اشهر انواع النحل فهي
ما يلي :

- نحلة ايطالية
Apis ligustica (S).
Abeille italienne, A. ligurienne (F).
نحلة سوداء ، نحلة مدغسقر
Apis unicolor (S).
Abeille noire, A. de Madagascar (F).
نحلة سيفانية ، نحلة عربية
Apis arabica (S).
Abeille arabe (F).
نحلة شائعة
Apis mellifica (S).
Abeille commune (F).
نحلة صينية
Apis socialis (S).
Abeille de Chine (F).



نحوص شفاف



نحور

نحل



نحية

وأوراقه حازمة مطهرة وباسطة عند الاكثار منها || تنوره يستمر طوال شهر تموز .

٢٨١٣٣ - **نَحْرُط الصَّبَاغِين ، عَظْلِيم ، عَظْلِيم**
Baptisia tinctoria (S). Baptisia tinctoriale (F).
نوع من النخرط الزراعي الصباغي . جذوره غليظة مستطيلة . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه مركبة ، ثلاثية الورقيات . وريقاته فضية منتعكة مسوطة ؛ تصلها ماس البشرة ، عابق المخضار . أزهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، متوسعة القد ، صفراء اللون || جذوره صباغية ، غصنها أزرق اللون كثائيلة || تنوره يستمر من تموز الى آب .



نخرط

٢٨١٣٤ - **نَحْرُط مَثْقُوب** (S). Baptisia perfoliata (F).
Baptisia perfoliata (F).
نوع من النخرط الزبيني الممر . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه بسيطة ، مثقوبة ، مستدرة الشكل ، مائلة البشرة . أزهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، صفراء القد ، صفراء اللون . || تنوره يستمر طوال شهر آب .

٢٨١٣٥ - **نُحْرُوب** (F). Alvéole, Cellule (F).
Alveolus, Cell (E).
هو عين الشهاد المسددة الاضلاع التي يصنعها النحل ويمتج فيها سره او يضع فيها عسله . ج نخراب .



نحرية الارز

٢٨١٣٦ - **نَحْرِيَّات ٥ ، رُهْبُونِيَّات ٥**
Tilletiaceae (S). Tilletiellaceae (F). Tilletiaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بغطائها اللاتيلية التركيب والانتظام . دعائمتها بسيطة لا وثرية ، بونياتها عديدة فردية التجميع او مدفوعة || اشهر اجناسها : الانتوريز ، الاتيلوم ، التليقة ، الطاعول ، الميلاونولوم ، النخرية ، النيوسيه .

٢٨١٣٧ - **نَحْرِيَّة ٥ ، رُهْبُون ٥** Tilletia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة النخرات يركب عدة نباتات اخصها نباتات الفصيلة التليقية . || جرمة وثلاثة يتميزان بدعائم قصيرة غليظة مدفوعة البويغات . بوطه اسمر اللون كرهية الرائحة يبدو مملكا لرجا ثم ينمدل فيصبح كالهاب || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨١٣٨ - **نَحْرِيَّة الأَرز ٥ ، رُهْبُون الأَرز ٥**
Tilletia horrida (S). Carle du riz (F).
فطر مجهرية يصيب الارز فيؤذي . اعطانه قسمة الاجزاء تشمل البلاد الاسيوية والامريكية . || يركب بعض ازهار المتكول فيموتها الى بؤرة بولية تنفجر عن غبار لزج كثيف ثورته الى السرة الفصحية يتدل كالخيوط المسترقة من الزهرة الى الماء قبل ان يجف ويتطاير . اضراره زهيدة لا تتسبب المكافمة النباتية اما يحسن مداركة البذار باحد العلاجات الواقية كغسلها بالشاب في بعض مركبات الزئبق او الفرمول .



نخرية الحنطة

٢٨١٣٩ - **نَحْرِيَّة الحِنْطَة ٥ ، رُهْبُون الحِنْطَة ٥**
Tilletia tritici, T. caries, Uredo caries, Lycopodon tritici (S). Carle du blé, C. du froment (F). Stinking smut (E). Stinkbrand des weizens, Steinbrand (D).
فطر مجهرية يصيب الحنطة على اختلاف انواعها . يكثر في البلاد المعتدلة المناخ والباردة . يركب الحب فيموت

النخاع الشوكي فهو جزء من الجهاز العصبي يمتد الى القناة الفقرية من النخاع المستطيل الى الفقرة القطنية الاولى . وهو ضفيرة من الالياف العصبية وظيفته نقل الاحساس بين اطراف الجسم والمراكز العليا منها والها || واخيراً النخاع المستطيل الذي يقع بين مؤخر المخ والنخاع الشوكي فهو أحد أجزاء الدماغ الذي يمين على الجهاز العصبي ويسيطر على تنظيم حركات القلب والتنفس والضغط الخ . وهو يشبه الحبل الشوكي من حيث تركيز المادة السمر في القسم الباطن والمادة البيضاء في المحيط الخارج .

٢٨١٦٣ - **نُحَالَة** (F). Bran (E).
هي الفضلات المتأينة عن نخل الحبوب بعد طحنها لا سباً الحنطلة .

٢٨١٦٤ - **نَحْمَاة** (F). Prune visqueuse (F).
بادة عضوية طليسية التركيب لزجة تنشي بشره سوق واوراق بعض النباتات .

٢٨١٦٥ - **نُحْبِيَة** (F). Select (E). Select (E).

٢٨١٦٦ - **نُحْتَة** (F). Picotet (F). Peck at (E).
نحت الطائر الثمرة : تفحرا .

٢٨١٦٧ - **نُحْجَة** (F). Bœufs de travail (F). Oxen (E).
الثقة هي البقر الموامل دون تمميز .

٢٨١٦٨ - **نَحْر ، دَهَب** (F). Nécrose (F). Canker (E).
داء في نسج النبات سببه فطور طليسية مختلفة .

٢٨١٦٩ - **نَحْر الحَبُوب** (F). Carle (F).
مرض فطري يعترى الحبوب لا سباً الحنطة . سببه بعض الفطور النخرية المعجربة . اطلب نخرية .

٢٨١٣٠ - **نَحْرُط *** (S). Baptisia (F). Baptisia (S).
False indigo (E). Farberhülse (D). Baptisia (D).
جنس نباتات عشبية من البداريات وفصيلة القرنيات القرشاية . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها صباغي او طبي . اربائها مدادة . سوقها منتصبة . اوراقها لا قياسية الشكل منها المركبة والمعنقة والحاضنة . ازهارها لا نظامية التجميع . ثمارها حنابل اهليلجية قصيرة القد . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨١٣١ - **نَحْرُط أَبْيَض** (S). Baptisia alba (S). Baptisia blanche (F).
نوع من النخرط الزبيني . ساقه منتصبة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته اهليلجية الشكل مقطوعة الطرف . أزهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز وابعية ، كبيرة القد ، لونها الى البياض العاجي . تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨١٣٢ - **نَحْرُط البَر ، نَيْلَة بَرِّيَة**
Baptisia australis (S). Baptisia australis (F).
نوع من النخرط الطبي والزبيني . جذوره غليظة . ساقه منتصبة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية الورقيات . وريقاته اهليلجية مقطوعة ، تصلها ماس البشرة ، جميل الخضار الزاهي . أزهاره عنقودي التجميع هامي الارتكاز . أزهاره صفيرة القد زرقاء اللون || جذوره

سولية أيضاً وثلاثية التنسين كما في الذكرية، لكن توجيها ثلاثي البتلات المرصومة وأسدتها شقية حشرفية ومدقاتها ثلاث وبهي بضيعة الشكل نجمة منفصلة وصماتها لامتلة وثمارها وسيدة البزرة. || أشهر أنواعه على الإطلاق هو النخل المعروف أي النخيل .

٢٨٦٤٦ - نَخْلُ الدَّقِيقِ *

Phoenix farinifera, Ph. pusilla (S). Dattier à farine (F). نوع من النخل غليظ الجذع القصير . ساقه تعلو نحو ٢٠٠ سم . بيتنا لا يقل قطرها عن ١٠٠ سم . سعفه كسفت النخيل وأشد اخضراراً . جريده يتحجم عند زامه الأخير . مهده منخفضة سهل الهند الشرقية . يرغب في الأثرية الدبالية المروية . ثماره صغيرة القند صفراء اللون لا تتوكل يستخرج من جماره ساقه الضخم لبوب نشوي المادة مأكول يقال أنه كثير الفوائد الصحية . || يزرع خارج مهده للزينة فقط .

٢٨٦٤٧ - نَخْلُ الدُّهْنِ * ، نَخْلَةُ الزَّيْتِ ، إلْوَيْس
Elaeis guineensis (S). Eléide, Eléis, Avouira, Palmier à huile (F). Oil palm (E). Olpalme, Guineische Palme (D). Palma avouira, P. da olio, Aouara di Guinea (I).

نوع من النخل، مهده بلاد إفريقية الاستوائية انحصها غنيا . ساقه حلقة اللحم مرطاه . سعفه ريشي التركيب . ثماره نوبية الشكل، جوزية الحجم، صفراء اللون، تحضن ثلاث عجمات يستخرج من لها دهن أصفر عطر يستعمل في صناعة الصابون . ويستخرج من صلام عجمها سمن نباتي أبيض اللون يستعمل للأكل .

٢٨٦٤٨ - نَخْلُ الشَّعْرِ * ، سِيرُوكِيلِ

Ceroxylon (S). Céroxyle, Palmier à cire, Arbre à cire (F). Wax palm (E). Andenwachspalme (D). Palma della cera (I).

جنس نخل أمريكي. أنواعه المروفة قليلة. سوقها رقيقة تعلو نحو ٤٠ إلى ٥٠ م . سعفها يشبه سعف النخيل لكنه يطول نحو ٦ أمتار . يكثُر وجودها في بلاد البربر عند جبال الاندل مع مقربة من الثلج الدائم . ثمارها نوبية ، كبيرة ، بنفسجية اللون ، سكرية الطعم . عصارتها شمية تستعمل في عدة صناعات .

٢٨٦٤٩ - نَخْلُ القُطْبِ * ، نَخْلُ نَاتَالِ

Phoenix natalensis (S). Dattier du Natal, D. du Cap (F).

نوع من النخل الصغير القد . جذعه جالس مستقيم يعمل نحو ٣ أمتار . ساقه مخروطية الشكل غليظة القاعدة دقيقة القرص السفلي . جريده سعفه يطول نحو ٣ أمتار . خوصه بحري اللون تعلوه شعبة غبراء || مهده بلاد رأس الرجاء الصالح والنتال . يزرع للزينة . يجود في جميع الأثرية ويميل على معظم شواطئ البحر المتوسط . ثماره حامزة صلبة صفراء اللون .

٢٨٦٥٠ - نَخْلُ التَّشَا
Sagoutier (F).

هو السافوتية ، اطبا .

٢٨٦٥١ - نَخْلُ بَرِّي

Phoenix sylvestris (S). Dattier sauvage (F). Wilder Dattelpalm, Tannenpalme (D). Palma salvatica (I).

نوع من النخل الكبير القد . جذعه يرتفع من ١٠ إلى ١٢ م . سعفه كسفت النخيل، يزم خوصه مستند الطرف طويل الهدبة، لونه إلى الخضار الزاهي . || مهده بلاد

كامل البر أو بعضه إلى كتلة من البورغ || وهو لا يعطب السوق لكنه يسبب قصر السلاحيات والشرانف ثم عقر القسم الأعلى من السنايل . || أضراره قد تكون فادحة إذا لامته العوامل الجوية وانحصها اعتدال الحرارة أو تدنيتها || يكافح باستعمال أجد الفواطير الغفالة منها زرينغات النحاس أو املاح الزئبق أو مركبات الفرميل .

٢٨٦٤٥ - نَخْرِيَّةُ الشَّعِيرِ * ، رُهْبُونُ الشَّعِيرِ
Tilletia panicis (S). Carie de l'orge (F).

فطر مجهري يركب جميع أنواع الشعير . يكثُر وجوده في أروبة الوسطى . || طياسه مستدرة الشكل أو يضيعة لونها إلى السمرة تعلوها مشعة بنفسجية عابكة . أضراره محدودة لا تتجاوز ، في أشد الإصابات ، ثلاث حبات في السلة الواحدة . || يكافح مكافحة سائر النخرينات .

٢٨٦٤٦ - نَخْرِيَّةُ الشَّيْمِ * ، رُهْبُونُ الشَّيْمِ

Tilletia secalis, Uredo secalis (S). Carie du seigle (F).

فطر مجهري يسبب الشيلم فيؤذيه . يكثُر وجوده في المناطق الباردة انحصها بلاد الاتحاد السوفياتي . وهو على السنايل الملوقة مشعة من الزرقعة البهية بيتنا يكون البر أصفر قدماً من المعتاد وأغلظ قطراً . || طياسه كروية الشكل أو يضيعة . يوفه لبد التصيب ، كرية الريح ، أسود اللون ، أزرق الموالج ، دقيق الثمار . || أضراره فادحة تراوح بالنسبة إلى المواقع والعوامل الجوية من ٢٠ إلى ٧٠ ٪ . || يكافح مكافحة نخرية الخطة ومن الواجب اجتناب زراعة الشيلم في الاماكن الرطبة .

٢٨٦٤٧ - نَخْرِيَّةُ مُتَنَسِّةِ * ، رُهْبُونُ مُتَنَسِّةِ

Tilletia foetida, T. levis, Ustilago foetens (S). Carie fétide (F).

فطر مجهري يركب بر الخطة في جميع المناطق الحارة والمتندلة المناخ . || طياسه كروية الشكل أو يضيعة ، بشرتها مائلة السطح موحجة بالأسود . يوفها كرية الراحه . || أضراره شبيهة بأضرار نخرية الخطة تزداد مع ازدياد وطفة الحر . || يكافح مكافحة نخرية الخطة .

٢٨٦٤٣ - نَخْرَ - Térébrer (F). To terebrate (E).

٢٨٦٤٤ - نَخْشُوشُ

Ouies des poissons (F).

Gills of fish (E). نخشوش ج نخاشيش . هي أداة السمع عند الأسماك وهي تقوب قلبية متصلة بالخياشيم من عن يمين الرأس ويساره .

٢٨٦٤٥ - نَخْلُ

Phoenix (S). Dattier (F). Palm tree (E).

جنس اشجار لبينة من فصيلة النخلات عديد الأنواع والفروبي جميعها من نباتات المناطق الحارة . || جذوعها منتصب رقيقة أو نجمة والجذع عند وجوده يكون اسطواني الشكل وسيد الساق المستقيمة الكعرة الكرنازية وغير المتفرعة . اوراقها سفية طويلة الجريد غليظة الكرب ريشية الشكل . خوصها تجزل التركيب ، ثنائي البزيم البهي التصل المستطيل المدب الهدبة . || والنخل من النباتات الثنائية المسكن التي يتميز ازهارها بظلمة فناء وكافور بسيط . اما ازهارها فخلاصة وقد يختلف تركيبها بالنسبة إلى كونها ذكرية أو أنثوية . فالازهار الذكرية تتميز بكأس سولية الشكل ثلاثية التنسين مع تويج ثلاثي البتلات واسدية شقية وبآبر خيطية منتصبه . || اما الازهار الانثوية فكأسها



نخريّة الشعير نخريّة الشيلم



نخل الدقيق



نخل الدهن




نخل القطب



نخل التمشا

فهرست



- 1 من - 2 لئاک، خلم مرقوش - 3 خلم منکش - 4 من بیچ - 5 لئاک - 6 غیل - 7 من شلال، پرتکوب - 8 لئوس، منک بجر - 9 لئاک - 10 کزک - 11 کزک - 12 کهد بجر - 13 زوزج - 14 حکوس - 15 رانیت - 16 منقار، منقاریل - 17 بافور - 18 بافور لئاک - 19 موقوس - 20 کرک، جراد بجر - 21 دشاغ - 22 شیشل - 23 سرطان - 24 خشتاک - 25 خشتاک - 26 ام عود - 27 سرعوة البحر، شیشاک - 28 غرور غش - 29 عشاگر - 30 شیشاک - 31 خیرور - 32 عدنه - 33 حیرس - 34 خشتاک - 35 قسوة الیقة - 36 قسوة عمودیه - 37 سالة - 38 سمرین - 39 لئاک - 40 صکة البحر



نباتات حورية وريشة : 1 ثعلبية حبيبية - 2 ثعلبية مرث الهيك - 3 بما ، عصليونية - 4 كريسيس - 5 خالدة انابيه - 6 خشكار - 7 غلبية منتصبة - 8 غلبية جيلة - 9 قوتحات - 10 زينة - 11 شب القبار - 12 ليلاب لغتي - 13 مشور شغري - 14 مشور اصغر ، غيريري - 15 شرة مرث ، الغلبية مرث - 16 حبل اسباني - 17 غلر المسك - 18 غلبية وريشة - 19 عشاخ كاليفورنية - 20 عشاخ - 21 فريجين - 22 زهر الكشاكش - 23 لسان الزمار - 24 دائره مصرية - 25 بديه - 26 سلوت - 27 بديج القاتون - نباتات دوليبية وعلدوروية : 28 اماريش ، فريجين - 29 تريش الفشار ، نفو - 30 فريش فريد - 31 فريش طر - 32 فريش بزي ، سراس - 33 بديونا زليلية - 34 تا - 35 اعاليا ، دعليه - 36 اعاليا كروية - 37 و 38 اعاليا ايربوانية - 39 اعاليا زليلية - 40 اعاليا ايربوانية - 41 دلوت ملطع - 42 دلوت الحصاد - 43 دلوت نقي - 44 سون جراني - 45 سون اسباني - 46 سون شوشان - 47 زعفران - 48 عين الطالوس - 49 عرار - 50 جوشن ، انجيل - 51 زنبق ابيض - 52 زنبق رشيق - 53 زنبق زعفراني - 54 زنبق ، زنب - 55 ثوليب الزكرين - 56 ثوليب مكسي - 57 ثوليب فريج - 58 ثوليب بيبي - 59 غشكار كوكبي - 60 غشكار ايق - 61 حيوان الزمكرين




نباتات معمرة: 1 أروم، 2 ثرياق، 3 جريسة هيربسة، 4 جريسة كبيرة، 5 نفيس، 6 قزقل الشاعر، 7 قزقل الزخارين، 8 قزقل صيني، 9 اسطر صيني، 10 اسطر مبدول، 11 كزيتان منيات، 12 كزيتان لولبي، 13 كزيتان نخفيشي، 14 كزيتان مزب، 15 كزيتان امفغ، 16 كزيتان مسطح الزهر، 17 كزيتان صيني، 18 كزيتان كدان، 19 عتير كشيري، ناعوره، 20 فزان، 21 غريديب ودي، 22 مزار الشمس، 23 رفسية، 24 اسفلويد جودي، 25 مهازيب، 26 ميون كبير الزهر، 27 ميون كزيتان، 28 ميون زناغ، 29 ميون مشيق، 30 قويسة، 31 جليلان حريضي الورق، 32 فالتة صناعية، 33 ترميتويا، 34 بوكا، 35 عطي، 36 ايلسي اسفر، 37 تيلوفر، 38 عشخاش قنابي، 39 شوكاظة حنوكية، 40 شوكاظة دروني، 41 زلفه ليجيمية، 42 زلفه اذان الدب، 43 زلفه يايانبة، 44 زلفه لافرة، 45 رصاصية، 46 اكلجيا مبدولة، 47 اكلجيا ذهيب، 48 شتار الياپان، 49 روح صغير الزهر، 50 روح صيني، 51 دندل، 52 سيم، 53 السمكة، 54 دالوره مشجرة، 55 حشفة، 56 كازا، 56 رعي الهام




البحار والجزيرات : 1 كنبية - 2 لكويه - 3 الفوس للهي - 4 صريرة الجدي - 5 درويطة - 6 جلتان عريان الزهر - 7 كريل - 8 معسل - 9 نزان - 10 بلبية - 11 دوبييه وردية - 12 مغولية
 كبيرة الزهر - 13 مغولية جيبية - 14 غلبي ملكي - 15 غلبي الفريدي - 16 نيلج - 17 ليك هجين - 18 سرجة - 19 ملي - 20 دوح بحري - 21 كرز الزهاري - 22 لوز -
 شمشو اليابان - 24 ورد قناري - 25 ورد خلي - 26 ورد جا كير - 27 ورد المارشال نبال - 28 ورد ديجون - 29 ورد فرسي - 30 ورد ليلبون - 31 ورد غسبي - 32 ورد كبير الزهر - 33 ورد
 سلوتي - 34 نلب - 35 دفل - 36 سمينة - 37 جلتان هندي - 38 رمان - 39 ميون - 40 اريترينا - 41 جديكوس - 42 كاسيوم - 43 فوشيا جيبية - 44 فوشيا هجين - 45 فوشيا غلجية -
 46 الليمية - 47 ارفلتيا بدولة - 48 ارفلتيا عكوكية - 49 كاسيلا يابانية - 50 كاسيلا كبيرة الزهر - 51 غسة - 52 طرخون - 53 كاسيلا - 54 صريرة المرجان



- نباتات زينة العدد 1 : تغير الامازون - 2 زراثة جبر - 3 الكروم كرز - 4 الكروم كرز - 5 بيليجيه برولينا - 6 بيليجيه كبر - 7 تيلاندا مطلق - 8 تيلاندا ليتن - 9 غريزة جبر - 10 اخيون ، شربة - 11 تير - 12 تير - 13 اسكيت - 14 غلوكيني ، سلطان - 15 فرنسي - 16 آند ، جرياني - 17 لاجيري - 18 ابر تاون ، جرة الكوك - 19 بونجليه ، جهتيه - 20 سكي ، بخور سرج - 21 زنده العين - 22 غريزيه ستل - 23 مرموزة - 24 سنخايه - 25 براسافولا - 26 قطلة دوشانا - 27 قطلة شغريه - 28 كوريش مزول - 29 باريه بكال - 30 باريه برورد - 31 باريه ايسو - 32 باريه سدر - 33 باريه ريشيلد - 34 دندوب الفرديت - 35 دندوب الزعرة - 36 دين كبره الزهر - 37 جويل اصغر - 38 ليه شطه - 39 ليه ارجواني - 40 ليكاس - 41 فيكله ساعده - 42 مكيله سدر - 43 مياويه ميرة - 44 مياويه ميرة - 45 نشفه كبره الزهر - 46 نشفه شطه - 47 معد فزاني - 48 صليبه كبره الزهر - 49 صليبه طاهره - 50 صليبه - 51 فند ، متجوليه - 52 فند ، سدر - 53 زنده عرقه - 54 بيليا ملكيه



1 بيريت طيبي - 2 بيريت (كبريتيد الحديد) غشّس الزرديا - 3 بيريت (مكسبات راحة) - 4 بيريت (مكسبات طليق) - 5 أجد - 6 حور حار بعض الذهب - 7 تير ذهب طيبي - 8 تير بلاتين طيبي - 9 نقت طيبي - 10 زرايخ البريت (بيديكل) - 11 حديد اوليجستي - 12 سدرور او حديد فغشم - 13 زلك مكبرت - 14 زلك فغشم - 15 رساس مكبرت - 16 قصدير سناكسد - 17 بيريت النحاس (كلكو بيريت) - 18 منغنيت - 19 نحاس طيبي - 20 دهنج - 21 زنجفر - 22 لازورد شبي - 23 غير او كهرمان اصفر - 24 اسرب ، غرائوت



1. مرو فضائف - 2. توريدالين رودي - 3. توريدالين اسود - 4. عين الحُرّ الأسترالي - 5. ماس اسفّر - 6. ماس ابيض - 7. ماس أزرق - 8. سفير - 9. زبرجد - 10. كيروز - 11. باقوت احمر، لعل - 12. عين الحُرّ - 13. زبرجد - 14. جاست ار - جشت شرقي - 15. مرو جمني - 16. زبرجد طيني - 17. يمان - 18. ياقوت، مطبق، انط - 19. شيموليت 1 - 20. شيموليت 2 - 21. صليان 1 - 22. صليان 2 - 23. دية من الباغريد - 24. صليان شرقي - 25. ايجيت - 26. كاسيت نقي - 27. كاسيت ممتلئ - 28. جيس - 29. لاصف بنفسجي - 30. ملح ناي



1 بوق البحر - 2 عيشة البحر - 3 مردن بحري - 4 عجربة - 5 أم شوشة - 6 غلوم - 7 براني - 8 عرطوزة - 9 فيزولس - 10 مغرقة - 11 صنديرة - 12 خودة البحر - 13 ترس البحر - 14 ابو جريون - 15 رساس - 16 بنفاق - 17 نقة - 18 خميرة - 19 قبة - 20 فيشان - 21 انشان (في ابل عهده) - 22 علية - 23 زب البحر السوطي - 24 زب البحر الطائلي - 25 زب البحر التنجل - 26 دقلة - 27 دقة اليم - 28 بلة البحر الحمراء - 29 بلة البحر المشبكة - 30 كوكبة - 31 لجة القاع - 32 يفتكرين - 33 كرمات مسيل - 34 عنكوب - 35 رصيفة - 36 لصة - 37 نفا البحر - 38 عرطن الريل - 39 كركاشة - 40 ام كلاليب - 41 اشارة - 42 فلدوس - 43 ابو مير - 44 بطريل



نخل بُوْتَان



نخل شائك



نخل كرتبي



نخل كناري



نخل معروف

جمارة قلبه المأكولة . ويزرع في المراكز وفي المواقع التي لا تخشى الصقيع . ساقه قصيرة . كربة عادم الشوك . سعفه مستطيل الخوص جميل الخصار .

٢٨٥٨ - نخل كناري* ، نخل الجوز الحامض

Phoenix canariensis, P. tennisi (S). Dattier des Canaries (F).

نوع من النخل المتوسط القد، جذعه يعلو من ٨ إلى ٨ أمتار . ساقه اسطوانية غليظة يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم . سعفه مستطيل القد ، كثيف الخوص ، متدل التحجين الذي يتوسط الزمام الثالث || مهده جزر كناريه ومنها انتقل الى معظم مناطق حوض البحر المتوسط . ضرره عديدة معظمها تزييني سريع النمو يعيش في جميع الأترية وبعضها زراعي يفرس لجي ثماره المأكولة الحمراء اللون .

٢٨٥٩ - نخل معروف* ، نخيل

Phoenix dactylifera, P. excelsior (S). Dattier fruitier (F). Date palm (E). Dattelpalme, Palmbaume (D). Palma, Dattiero, Palmizio (I).

نوع من النخل ، كبير القد ، كثير السعف ، جذوعه مستقيمة السوق المستقيمة تعلو من ١٢ إلى ٢٥ مترًا . جريد سعفه يطلو من ٣ إلى ٥ أمتار وهو شائك الكرب غليظ الكراث . خوصه مستطيل البرج المذهب الهدية ، لونه الى الخضر الازيد || ازهاره عشكولي التجميع عند الذكر والانثى ، عشكولي يدعى افرىضاً ، يبدو عند ظهوره محاملاً بقبابة كبيرة تدعى القنن . اما العشكولي الانثوي الذي يعمل الثمر يدعى عرجوياً . ثمرة النخيل مستطيلة الشكل ، لينة السوخذ ، سكرية الطعم ، مأكولة . نواتها زرة خضية قاسية تقطعها شق طولي عميق يدعى التقير . وهذه الثمرة اسم زينة عديدة تختلف مع تطورات مراحلها الحياتية من الارام الى الانواع . فهي بعد الارام سيابة ثم خلافة فيلسة فنبذلة فنبسة فربلة واخيراً ثمرة . || اعطانه فحوض البحر الاخر قصر فليبا فحوض فالجزائر فراكش . يعيش ايتياً زرع غير انه يفضل الأترية الرملية البدالية العميقة الغور المنسجمة الرطوية . وكلما ازداد غناء الأترية بالمواد العضوية والعناصر الغذائية كلما ازداد حل النخيل الحولي وانقطع عن المساهنة . || اقليمه الافضل هو الاقليم الذي تشتد فيه الحرارة من اوتال ايار الى اواخر تشرين الاول حيث يبلغ مجموع الساعات الحرارية ، خلال هذه المدة ، نحو ٥٠٠٠ ساعة وعلى ان يكون متوسط الرطوبة الجوية النسبية نحو ٤٠ ٪ || اشهر ضرره واجودها ما يتبع .

— إريجي — ثمرة تطلو نحو ٥ سم . حراء اللون تسهلك جافة .
— أمهات — ثمرة تطلو نحو ٣ سم . شديدة الخلاوة تؤكل رطبة وجافة .
— برنامودا — ثمرة تطلو نحو ٥ سم . تسهلك رطبة وجافة .
— بنت عيشه — ثمرة تطلو نحو ٤ سم . تؤكل رطبة وجافة .
— فوري — ثمرة تطلو نحو ٦ سم . قليلة الاليات تؤكل جافة .
— جندلا — ثمرة تطلو نحو ٥ سم . تسهلك جافة .
— حلاو — ثمرة تطلو نحو ٤ سم . حنطية اللون تصدر بكثرة .
— حياي — ثمرة تطلو نحو ٥ سم . تسهلك رطبة وجافة .

الهند الشرقية ومنها انتشر في معظم بلدان حوض البحر المتوسط . يزرع للزئين . ثماره صنية حامزة .

٢٨٥٩ - نخل بُوْتَان* ، نخل سيكيم ، نخل المتق

Phoenix rupicola (S).

Dattier des rochers (F).

نوع من النخل المتوسط القد، يتميز بجلو جريده من الكرناف التاتم بين الساق والكرب، جذعه يرتفع من ٥ الى ٧ أمتار . سعفه رشيق الشكل يطلو نحو ٤ أمتار . خوصه عريض البرج المذهب الطوف || مهده مناطق بُوْتَان وسيكيم من اعمال الهند . وهو من اجل انواع النخل شكراً وإرفاقاً لذلك يزرع للزئين ويوجد منه على بعض شواطئ البحر المتوسط || ثماره حنطية اللون مأكولة لونها يجمعها قنن كبير القد لا يقل طوله عن ١٢٠ سم .

٢٨٥٩ - نخل زَنْزِبَار ، نخل مقوس

Phoenix reclinata (S). Dattier de Zanzibar (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه رشيق القوام يرتفع من ٤ الى ٦ أمتار وكثيراً ما يتقوس عند زانه الثالث . سعفه مستطيل القد محجن الجريده . كربة حاد الشوك . خوصه جميل الخضر اللامع || مهده زيار وما قاليها من القارة الافريقية . وهو من الانواع السريعة النمو يفضل الأترية الحصية ولا يتأذى من غيرها . يزرع للزئين . ثماره صنية القد . صفراء اللون لا تؤكل .

٢٨٦٤ - نخل سَرْدَيْب ، نخل سيلان

Phoenix ceylanica (S). Dattier de Ceylan (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه يرتفع نحو ٥ أمتار . سعفه يطلو نحو ٤ أمتار . كربة شائك . خوصه مستطيل البرج المذهب ، لونه الى الخضر اللامع || مهده جزيرة سرديب يعيش في حصص وسفوح هضابها القاحلة . يزرع للزئين .

٢٨٦٥ - نخل سيام

Phoenix siamensis (S).

Dattier de Siam (F).

نوع من النخل المقر العادم الساق . جريد سعفه يطلو نحو ٣ أمتار . خوصه كثيف التجميع جميل الخضر الزاهي . يزعمه مذهب العنقة ، طويل الهدية || مهده سهل سيام الرملية . متطلباته الزراعية قليلة لانه من النباتات العادية وقد يرغب في الأترية الرملية التي لا تخلو من الدبال . ثماره ارجوانية اللون مأكولة .

٢٨٦٦ - نخل شائك*

Phoenix spinosa, P. leonensis, P. senegalensis (S). Dattier épineux (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه منتصب الساق يعلو من ٤ الى ٦ أمتار . جريد سعفه يطلو نحو ٣ أمتار . خوصه جميل الخضر المايق ، يزعمه مذهب شائك . مهده افريقية الاستوائية . يرغب في الأترية الطينية الكلسية ولا يخشى الريحاح البحرية . يعيش على شواطئ البحر المتوسط || ثماره متوسطة القد ، تحملة الجرم . يسرها مرجاني اللون . رطبها اخر خري . ثمارها سكرية اللون . سكرى الطعم مأكول .

٢٨٦٧ - نخل كرتبي*

Oreodoxa oleracea (S). Orédoxe oléracé, Palmiste franc, Chou-palmiste (F). Cabbage palm (E). Kohlpalme, Kohlrangende, Arekapalme (D). Palmisto, Palma cavolo (I).

نوع من نخل البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. يزرع لجي

royal, Palmier royal (F). Royal wine palm (E). Königs-palme (D). Palma regia (I).

نوع من النخل الزراعي التزييني . جذعه رفيع الساق المنتصب . همرته تاجية الشكل جميلة القالب . سفحه متوسط الطول قليل التحجين . خوصه جيل الخضار الزاهي . طلعته كبيرة القد فاشرة . ثماره صغيرة الحجم . ارجوانية اللون ، ناعفة السوط ، لا تؤكل . جارة قليه مأكولة مستحبة الطعم .

Phoenix paludosa (S). **نخل متقيعي** *
Dattier des marécages (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه منتصب الساق المستقيمة يعلو من ٨ الى ١٠ أمتار . جريد سفحه يطلو نحو ٣ أمتار وهو شائك الكرب مجن الزام الأخير . خوصه بجبل الخضار الفتتي . يزيمه مذيب الطوف || مهده منافع اخذ القرية وقد يعيش في جميع الأتربة الدبالية الرطبة . ثماره لا تخلو من الحلاوة لوها الى الصفار القاتم .

Phoenix acaulis (S). **نخل تجصي** *
Dattier acule (F).

نوع من النخل العادم الساق . سفحه كبير القد ريشي الخوص . يزيمه صلب النصل ، مذيب الطوف ، جبل الخضار الزاهي || مهده مرتفعات سهل الهند شرقي بحر الكنج || ثماره خرية اللون حامزة الطعم لا تؤكل . يزود للزيت وقد يعيش على الشواطئ اللبنانية ويعود في الأتربة الرملية القليلة الرطوبة .

Palmicole (F). **نخلاني** ٥ ٢٨٦٦٤

نعت تعريفي يطلق على كل ما يعيش على النخيل او ينمو عليه .

٢٨٦٦٥ - **نخللة الجوز** هي الكريوت ، اطلبها .

٢٨٦٦٦ - **نخللة السكر** * ، **أرنقا**

Arenga saccharifera, Borassus gomutus (S). Areng. Palmier areng. P. à sucre (F). Gomuti palm (E). Gomutepalme, Zuckerpalme (D). Palma arenga, P. dello zucchero (I).

نوع من النخل الهندي المنبت ، تكثر زراعته في الهند والكوششين وجاوا وبلقه حيث يستخرجون السكر من ثماره . ساقه منتصبه رفيعة تعلو من ١٥ الى ٢٠ م . سفحه كبير القد متعبد الخوص . يزيمه مقطوم الطوف ، فصله عابق الخضار || ثماره لبدة التجميع حلوة المذاق يستخرج منها عصارة سكرية شائعة الاستعمال .

Palmaceae (S). **نخلانيات** ٢٨٦٦٧

Palmacées, Palmiers (F). Palmae, Palm-trees (E). فصيلة نباتية من وحيدات الخلق . اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ اعطائها البلاد الحارة والاستوائية من المالمين القدم والبلد . جلدورها وحيدة السوق الرقيقة المنتصب . اوراقها سفحية التركيب حامية الارتكاز . ازهارها وحيدة او ثنائية المسكن . ثمارها لا قياسية الشكل والحجم لينة السوط .

٢٨٦٦٨ - **نخلين** (F). Palmitein (F). Palmitein (E). مادة بلورية توجد في الدهن ويكثر وجودها في حامض النخل وقد تستحضر بتألف الحامض النخلي مع الفليسرين .

٢٨٦٦٩ - **نخوس** هو الناحس ، اطلبه .

٢٨٦٧٠ - **نخيب** (F). Selectif (F). Selective (E).

— خدأوي — ثمرته تطول نحو ٤ سم . سمراء اللون . جيدة الصنف .

— خلاص — ثمرته تطول نحو ٤ سم . تعتبر من اجود الاصناف وافخرها .

— داجانا — ثمرته تطول نحو ٤ سم . تسهل جافة .

— دجلة النور — ثمرته تطول نحو ٤ سم . تعتبر من اجود الاصناف وافخرها .

— زاهدي — ثمرته ذهبية اللب متوسطة القد جيدة الصنف .

— زغلولي — ثمرته كبيرة القد شديدة الحمره فاخرة الصنف تؤكل رطبة .

— سلطاني — ثمرته كبيرة القد حنطية اللون فاخرة الصنف تؤكل جافة .

— سمائي — ثمرته بيضيه الشكل صفراء اللون تؤكل رطبة ورطب .

— سيدي — ثمرته صغيرة القد شديدة الحلاوة كثيرة الالياف .

— ترابي — ثمرته صغيرة القد تؤكل رطبة وجافة .

— طبرزي — ثمرته متوسطة القد فاخرة الصنف تؤكل رطبة .

— عجلاني — ثمرته متوسطة القد جيدة الصنف تسهل رطبة وجافة .

— حمري — ثمرته تطول نحو ٧ سم . جيدة الصنف تؤكل رطبة وتصدر .

— قسطوي — ثمرته متوسطة القد فاخرة الصنف تؤكل رطبة .

— كسيه — ثمرته متوسطة القد مشارة جيدة الصنف تؤكل رطبة وجافة .

— عجبول — ثمرته كبيرة القد فاخرة الصنف تؤكل رطبة .

— مقطوم — ثمرته متوسطة القد مشارة جيدة الصنف تؤكل رطبة .

— نرساني — ثمرته كبيرة غليظة صفراء اللون جيدة الصنف تربب .

وتمر النخيل ان رطبة او جافة ، اي ثمره ، غنية بالاملاح المعدنية القلوية التي تعادل حموضة اللحوم والبيض والخبز وهي غنية بالفيتامين (١) ومتوسطة الفتي بالفيتامين (ب) و (د) . اما متوسط العناصر المختلفة الموجودة في ١٠٠ غ . من لب التمر فهو :

٣٠ ٪ من الماء

٩٥ ٪ من السكر

٣ ٪ من البروتين

١ ٪ من الهلام

هذا مع العلم ان القيمة الغذائية للمواد السكرية الموجودة في التمر توازي ضعف قيمة السكر العادي .

٢٨٦٦٠ - **نخل مِثْلَاقِي**

Phoenix pedunculata (S). Dattier pédonculé (F).

نوع من النخل الصغير القد . جذعه اسطواني الساق يعلو نحو ١٠٠ سم . جريد سفحه يطلو نحو اربعة أمتار . خوصه مستعرض كبير يطلو نحو ٣٠ سم . يزيمه جبل الخضار الزاهي ينبت عند زامه الأخير . || مهده جبال الهند الشرقية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . يعيش في جميع مناطق ساحل البحر المتوسط . يزود للزيت . ثماره صفراء اللون حنطية المواج غير مأكولة .

٢٨٦٦١ - **نخل ملكي** *

Oreodoxa regia, Roystonea regia (S). Oréodoxe



٢٨٦٧١ - نَخِيرَة

Branchiostome (F).

النخيرة فوعة شبيهة يمكن الخياشيم من الاتصال بالخارج .

٢٨٦٧٢ - نَخِيرَة * ، غُصْرِيَّة النِّع ، لَزْبُود رَمَه
Lasioderma serricorne (S). Lasioderma (F). Cigarette Beetle (D). Tabakkäfer (D).

حشرة من غديات الإجنحة وفضيلة الغفريات . جسمها اسطواني الشكل ، صغير القد ، يطول نحو ٣ سم . لونها الى البني الكستنائي المالح يعلو خل المحل . رتبته قفزة الجسم ، غبراء اللون ، ثنائية الرأس ، مهدبة الظفر والجوابب والأطراف ، تطول نحو ٤ سم || اجبالها الحولية عديدة تراوح من ٣ الى ٦ ، جيلها يمر من ٤٤ الى ٧٢ يوماً . الحشرة الكاملة تعيش من ٣ الى ٦ اسابيع تمتع مكثها افراديا على التئن يقيف خلال مدة ادناها ٥ ايام واقصاها ١٠ . اما البرقة فتعيش من ٣٠ الى ٥٠ يوماً ثم تتحول بعد انسلاخها الثاني الى عذارى ثم الى حشرة كاملة . وهي من حشرات البلاد الحارة والمعتدلة تسرح في الليل وتأتلف الاماكن الآهلة . يرقاتها تتركب التئن ولقاف التئ فتتوقع بها الاضرار الجسيمة لأنها تنخرها وتمتطها . تكاثرها بواسطة مصائد النور او المصائد الكهربائية .

٢٨٦٧٣ - نَخِيرَة

Beurre (F). Butter (E).

من اسماء الزبدة ولعلها الزبدة كالزخف .

٢٨٦٧٤ - نَخِيرِل

هو النخل المعروف ، اطلبه .

٢٨٦٧٥ - نَد * ، غُصْرَاء

Epilobium (S).

Epiloba (F). Willow-herb (E). Weidenröschen (D). Epilobio (I).

جنس نباتات عشبية مخشوشة مسمرة من فصيلة الاخدريات . انواعها المعروفة نحو ٦٠ معظمها بري ومنها الطبي وبعضها تزييني . منها الاصقاع المعتدلة في جميع البلاد . سوقها فروع ، اوراقها كاملة مستطيلة متعاقبة ، ازهارها رباعية النصل والبيلات ، ثمانية الاسدية ، سنبلية التجميع ، عذرية الارتكاز او هامية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٨٦٧٦ - نَد * رَبَاعِي الزَوَايَا ، أَذْثَاب القِطْعَة

Epilobium tetragonum (S). Epilobe angulaire (F).

نوع من الند البري الميزول . ساقه صلبة عسوية كثيرة الفروع مفصلة رباعية الزوايا . اوراقه متعاقبة ، رخية النصل ، منشارية الحافة ، نائضة العروق . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره اربوئية اللون وريدة المالح . يوجد في الاماكن الرطبة من الساحل الى الجرد حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٧ - نَد * سُنْبِلِي

Epilobium angustifolium, E. spicatum (S). Epilobe en épi, Laurier de St. Antoine (F). Rose-bag willow-herb, Blood vine (E). Waldweidenröschen, Weide-riech, Antonskraut (D). Epilobia a spighe, Lauro roseo, L. di St. Antonio (I).

نوع من الند الزراعي التزييني الميزول . اربوطة مفادة . ساقه فروعاً تملو من ٨٠ الى ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة ، متعاقبة ، نصلها سناني الشكل نائش العروق على صفحاته السفلى . ازهاره سنبلية التجميع هامية الارتكاز . ازهاره قمرية اللون قطرها نحو ٢ سم . ومنه ضروب يبيض ازهاره وموحيه || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٨٦٧٨ - نَد * صَغِير الزَهْر

Epilobium parviflorum (S). Epilobe à petites fleurs (F).

نوع من الند البري الطبي الميزول . ساقه فروعاً تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه زغبية متعاقبة ، نصلها رخي الصفحة مسن الحافة . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره صغيرة القد وريدة اللون || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٩ - نَد * عَفَالِي ، نَد * قُفْذِي ، عَقِص ، فَرْلُور

Epilobium hirsutum (S).

Epilobe hérissé, Nériette (F). Great willow-herb, Apple-ple (E). Zottiges Weidenröschen (D). Epilobio amplicaulo, Peleso (I).

نوع من الند البري الطبي الميزول . ساقه فروعاً تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه حاشية متعاقبة نصلها كبير القد منشاري الحافة خلي البشرة على صفحته . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره قمرية اللون قطرها نحو ٢ سم . || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٨٦٨٠ - نَد * قَسْوَسِي

Epilobium rosmarinifolium (S). Epilobe à feuilles de rosmarin (F).

نوع من الند الجلي الميزول . ساقه فروعاً تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه متعاقبة تشبه اوراق القسوس . نصلها ضيق الصفحة الجامدة العادمة العروق النائضة . ازهاره عقنودي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهاره صغيرة القد هراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨١ - نَد * مَسْجَعِي

Epilobium palustre (S). Epilobe des marais (F). Marsh epilobium, M. willow-herb (E). Sumpfweidenröschen (D). Epilobio palustre, Garofanini di padule (I).

نوع من الند البري الطبي يكثر في المالح والمواعق الرطبة . ساقه عسوية فروعاً تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه متعاقبة سنائية مستطيلة . نصلها جامد الصفحة مسن الحافة . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره وريدة اللون صغيرة القد . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨٢ - نَد * تَعْنَمِي

Epilobium menthoides (S). Epilobe menthoide (F).

نوع من الند البري الطبي الميزول يكثر في بعض الجرد البنيانية . ساقه فروعاً تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه نعنعية الرائحة لقياسية الترتيب والشكل مسنة الحافة نائضة العروق . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره صغيرة القد وريدة اللون يضاء المالح || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٨٣ - نَدَاة

Couronne solaire (F).

Solar corona (E).

النداء هي دائرة الشمس .

٢٨٦٨٤ - نَدَاخَة

Taxonomie, Taxinomie (F).

Taxonomy (E).

٢٨٦٨٥ - نَدَاخَة * ، صَدَاخَة الغَاب

Luscinola melanopogon (S). Lusciniole à moustaches (F). Moustaches Warbler (E).

عصفور من الموازج وفضيلة الغابات . موطنه يشمل معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اعطاه اللبناني تيمتد من السواحل الى الجرد والبقاع || جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٣ سم . وبسطه نحو ١٥ سم .



نخيرة (البرقة والملكة)



نخيرة (الحشرة)



ند



نَدَاخَة

والكوبلت والزنك ... لان وجودها إلزامي ان من الوجهة الانشائية او من الوجهة الغذائية .

Bourrelet, Bourlet (F).

٢٨٦٩٢ - نَدَّيَّة

Pad, Cushion (E).

اثر الجرح بعد التآلم في النسيج الحيواني والنباتية .

٢٨٦٩٣ - نَدَّحَكَة ، نَدَّحَكَة

Barème, Barrème (F). Printed table, Schedule (E).

Barème des prix (F). نَدَّحَكَة الأَسْعَار

Price table (E).

٢٨٦٩٥ - نَدَّحَكَة الجَمَاعَات

Barème des salaires (F). Wage table (E).

Apponter (F). To land (E). نَدَّخ

شد المركب بالصقالة المخصصة لربطه .

Aborder un rivage (F). نَدَّخ

Phototropisme (F). نَدَّخ

Phototropism (E).

التد وتدعى جاذبية النور ، خاصة تتميز بها بعض اعضاء النبات في توجيه اطرافها نحو النور .

Satureia (S). Sarriette (F). نَدَّغ

جنس نباتات برية مخشوشة تآلمة من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة متفاوته الاشكال والاحجام منها العشية والبلجة والجنبة . اوراقها عطرية لا تقياسية القد متعاقبة او ضمية . ازهارها ابطية الارتكاز او تاجية يكثر فيها اللون الالبيض والبنفسجي والاحمر . جميعها مغفرة يجرىها النحل . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨٧٠٠ - نَدَّغ اِكْرِيَتِي * ، نَدَّغ صَعْتَرِي

Satureia thymbra (S). Sarriette de Crète (F). Savory of Crete (E). Kretisches Bohnenkraut (D). Santoreggia verticillata, Tragorigano (I).

نوع من الندغ الطبي المعمر . عشته نجمة صغيرة الحجم . اوراقه ضمية التجميع صغيرة القد ، نصلها سناني الشكل خلى البصرة الرمداء اللون . ازهاره ثلاثية التجميع بنفسجية اللون وردية الموانج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٨٧٠١ - نَدَّغ الجَبَل * ، زُوْبَاع البر ، صَعْتَر الجبل

Satureia montana (S). Sarriette montagnarde (F).

نوع من الندغ الطبي المعمر . مجلته تملو من ٤ الى ٨٠ سم . ساقه مخشوشة فراء . اوراقه سنانية مستطيلة مدببة المنقصة . نصلها جامد الصفحة الالامعة مذهب المختار . ازهاره وردية اللون او بنفسجية || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٨٧٠٢ - نَدَّغ بُسْتَانِي * ، زُوْبَاع ، صَعْتَر البر

Satureia hortensis (S). Sarriette des jardins (F). Summer savory (E). Gartenbohnenkraut (D). Santoreggia, Timbra, Cunilla (I).

نوع من الندغ المحول المبدول يكثر من النباتات الطبية الجزيلة النفع العديدة الفوائد الصحية وهو من التوابل المستحبة الطعم والورف . اوراقه سنانية النصل ، رهلة

ثوبه الى النبي الاطحل . رأسه كسني اللون اسود الموانج . محسره الى الكسني يمتدعه خط ابيض يملو العين . رداؤه وظهوره وجناحه وصغيره وذنبه الى النبي الاطحل يملو شمشج عايق . زوره اغبر ابيض . صدره الى الغيرة البنية . حلقه عينه بنية . سباله واقر الحلب وهو ما دعى الى تلقيبه « باني شوارب » || الاثنى اصفر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه || يآلف المقاصب والمآسل والآجام وصفات مجاري الماء . تفرده صمداح لطيف متباين الانعام القصيرة || يفتن عشه في الآجام الجفافة على ارتفاع متر عن سطح المنقع او التربة || الاثنى تحضن ثلاث مرات في السنة . حشيتنا من ٣ الى ٥ يضايت ترجمها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً || قوته الحشرات المجتحة اغصها الفراش والذباب والحوام ثم الديدان والبراغيث || يعتبر من المصافير النافعة .

٢٨٦٨٦ - نَدَّاد

Photophile (F).

Photophilous (E).

نعت تعريفية يطلق على كل حيوان او نبات لا يعيش الا في النور .

٢٨٦٨٧ - نَدَّاسَة البُسْر * ، نَارِيَّة البُسْر

Ephestia calidella (S). Pyrale des dattes (F).

فراشة من الناريات صغيرة القد غبراء اللون مجتمعة بالاسود . ريقها دقيقة نحيلة جنوية الثوب تقرض البسر وتطبعه .

٢٨٦٨٨ - نَدَّاسَة التبغ * ، نَارِيَّة التبغ

المَجْشَقَة

Ephestia elutella (S).

Pyrale des tabacs, Pyrale des fruits secs, Teigne du cacao (F). Tobacco moth, Cacao moth, Currant moth (E). Dürrobstzünsler, Kakaomotte, Henmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة الناريات ، بسطها نحو ١٧ م . روشناها الاماميان الى الكهجة الزرقاء الموانج ، روشناها الخلفيان الى الريدة . ريقها صغيرة دقيقة رمداء اللون تميش على مختلف الباز الجفافة والخبز والبسكوت واوراق التبغ الجافقة المخزونة || اجيالها الحولية وهي مرقطة بموانج الممانج تراوح من ٣ الى ٥ .

٢٨٦٨٩ - نَدَّاسَة الدقيق * ، نَارِيَّة الدقيق

الفَبْرَاء

Ephestia kuehniella (S).

Pyrale de la farine (F). Mediterranean flour moth (E). Mehlmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة الناريات . بسطها نحو ١ م . روشناها الاماميان الى السمرة الخطية يمتدعهها جذبج وتبيج . روشناها الخلفيان مهديا المختار ثوبها الى البياض الاغبر يملو شمع اشقر . اجيالها الحولية عديدة ، تكثر في الاماكن الحارة وتقتل في الباردة . ريقها دقيقة الجسم ، حنطية اللون سوداء الرأس ، تميش على مختلف انواع الدقيق .

٢٨٦٩٠ - نَدَّاسَة * ، نَدَّش * ، كَيْمِيَا حَيْة

Biochimie (F). Biochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

٢٨٦٩١ - نَدَّالِر

Oligo-éléments (F).

Trace elements (E).

تدريج دائر . اسم يطلق على العناصر التي تدخل في المركبات العضوية والنباتية بكميات متناهية الصغر كما هي الحال في اليود والتيتان والزنك والنيكل والحديد



نداسة البسر



الفراشة



البرقة

نداسة التبغ



نداسة الدقيق



ندغ اكريني



ندغ الجبل



ندغ بستانى



ندوة



نداية مبدولة



نرتين



نرجس أخضر



نرجس اسلي



نرجس الشعراء

تطول من ٤ الى ٧ م. ازهارها صغيرة القدر خضراء اللون تنور خلال شهر حزيران . ثمارها عنبية قنبرا قدر الحصة الصغيرة لوها الى الحرة البرتقالية المواج .

٢٨٧١٤ - نَرْجِسِيْن *
Neritina (S).
Nérítine (F). Neritina (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مهدبات الارجل وفصيلة الزُرِّيَّات . انواعها المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة . منظرها بهري ومتين وبعضها بحري . جميعها مغترسة || اصنافها ثنائية الاشكال ، يكثر فيها الشكل البرمي المنحرف القليل الحلزونة المحصورة في الاغقاب . جميعها ملونة ، قل فيها اللون السوي وكثر التصليح والتجذيع والرسنجة والزخرفة .

٢٨٧١٥ - نَرْجِسِيْن *
Nérítica (F).
نعت تمريني يطلق على كل منطقة رسوبية تنعمرها المياه ولا يتجاوز غورها ٢٠٠ م .

٢٨٧١٦ - نَرْجِس ، قَهْد *
Narcissus (S).
Narcisse (F).

جنس نباتات بصلية حولية سربوتية من فصيلة النرجسيات . انواعها وضروبه واصرامه كثيرة العدد . ازهارها فواحة العرف لاقياسية التجميع منها الفردية والثنائية والثلاثية والرابعة حتى العشارية . وفي تركبها على شراخ اجوف يعلو شراف قصير بسيط يحتمل توزيع لاقياسي الشكل منه القمعي والبوقي والجبري والبولابي . اوراقه قرصية الانتشابه ، قذية التصل ، مستطيلة || يعيش ويوجد في جميع الأتربة الزراعية ولا يخفى سوى فوط الاندماج وكثرة الرطوبة .

٢٨٧١٧ - نَرْجِس أَخْضَر *
Narcissus viridiflorus (S). Narcisse vert (F).

نوع من النرجس الجادح . اوراقه قرصية الانتشابه ، اسطوانية التصل الخدد . شراخه الزهري دقيق ونحيل . ازهاره عطرية الرائحة ، رعيحة البتلات اللدبية الخضراء اللون . وفي لاقياسية التجميع يراوح عددها من ١ الى ٤ . توجعها دولابية الشكل || ينور في تشرين الثاني .

٢٨٧١٨ - نَرْجِس اسْكِي * ، جنكبيل *
Narcissus jonquilla (S). Jonquille (F). Jonquil (E).
Jonquillon (D). Giunchiglia, Narciso d'Oriente (F).
نوع من النرجس السربوتي . ضروبه واصرامه كثيرة العدد . اوراقه قرصية الانتشابه نصلها اسطوانتي الشكل ، خدد الصفحة ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . شراخه الزهري دقيق القصبه يطول نحو ٣٠ سم . ينتهي بقصبة من الازهار يراوح عددها من ٢ الى ٦ ، توجعها كوبي الشكل ، رائحتها فواحة العرف البرتقالي ، لوها الى الصفار الخادق . ينور في نيسان .

٢٨٧١٩ - نَرْجِس الْأَمَازُون *
نوع نضري الامازون ، اطليه .

٢٨٧٢٠ - نَرْجِس الشُّعْرَاء * ، عَقُوقُ

Narcissus poeticus (S). Narcisse des poètes, Herbe à la vierge, Claudinette, Moulin à vent (F). Poet's daffodil (E). Dichter Narcisse (D). Narciso dei poeti, Flor maggi (I).
نوع من النرجس السربوتي . ضروبه كثيرة العدد . اوراقه

الصفحة ، قاعمة الخضراء . ازهارها صغيرة القدر يضاء اللون او وردية || تنوره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٢٨٧٠٣ - نَدِيَّة *
هي اليروقيل ، اطليه .

٢٨٧٠٤ - نَدْوَة *
Cressa (S). Cresse (F).

Rosin weed (E). Harzkraut (D). Cressa (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السقنويات . انواعها المعروفة ثمانية منها سواحل البلاد الحارة من الملين القديم والجديد . ازهارها عديدة الالوان عادمة العرف .

٢٨٧٠٥ - نَدْوَة زَرَّاعِيَّة *
Comice agricole (F).
Agricultural committee or show (E).

كل جمعية زراعية تعمل على انتشار الزراعة العملية الصحيحة .

٢٨٧٠٦ - نَدْوَة عَسْكَيَّة *
هي الارق ، اطليه .

٢٨٧٠٧ - نَدْوَة *
Phototropique (F).
Phototropic (E).

ما هو منوط بالند .

٢٨٧٠٨ - نَدِّي *
Rosée (F). Dew (E).
رذاذ يتكاثف بسبب الرضاء على النباتات والاشياء المجودة في الغلا || وفي التخصيص يطلق الندى على ما سقط من بلل آخر الليل وما الذي يسقط اوله فهو السدى .

٢٨٧٠٩ - نَدِّي الْبَحْرِ *
Romarin (F).
هو حصا البان ، اطليه .

٢٨٧١٠ - نَدِيَّازَة مَبْدُولَة * ، دُودَة السَّطَط *
Nadlasi obsoleta (S).
الصبرية

فراشة من فصيلة الجفنيات ، صغيرة القدر طولها نحو ١٢ م . لوها الى الخشنبي البني . اجنحتها موشحة بثلاثة خطوط معرضة متعرجة لوها الى السمرة الداكنة . زباناها مشطية الشكل . الاثنى اكبر حجماً من الذكر واكثر لوناً . تمتع مكثها الاخضر اللون على فروع واغصان السطط ينقث برقاق تلهم الازراق وتعمل الاشجار ثم تلسع شراقق ، اسطوانية الشكل ، مستديرة القطلين ، دقيقة الوسط ، خيطه سريري اسمر ، تبيت فيها وتتحول الى عذراء || اما البرقة فسواء اللون ، حليبة القشار يقطبها غطان علويان لوها الى البرتقالي وتحمل في كل من حلقاها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة واحادية عشرة غدة جرابية محشوة بالحب الاسود اللدنيق تستعمله للدفاع عن النفس فيلهب جلد الجسم الذي يلقى به .

٢٨٧١١ - نَدِّيَّان *
هو النيدمان ، اطليه .

٢٨٧١٢ - نَدِّيَّة *
Cicatricule (F).
Cicatricule, Tread (E).

الندبية علامة يضاء تشاهد على عقرب البيفة ، اي صفارها . يتكون منها الجزء البروتوبلاسمي حيث تنشأ الجرثومة الحية مزكوة كانت او غير مزكوة .

٢٨٧١٣ - نَرْجِيرَا *
Nertera (S). Nertère (F).

جنس نباتات عشبية معمرة وحولية من فصيلة اللويات . انواعها المعروفة قليلة . مهدا بلاد زيلندا الجديدة . سوقها مشونة تملو من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها يفضية التصل

الصفار البرتقالي. شروبه وأصممه الزراعية عديدة أوراقها استطالة الشراخ ولون الزهر.

٢٨٧٢٧ - نرجس نسيمي * هو الزفير، اطلبه.

٢٨٧٢٨ - نرجس يعقوب * نرجس يعقوب

Sprekelia formosissima (S). Sprékelle magnifique, Lis St. Jacques, Amarylil à fleur en croix (F). Jacobean lily, St. Jame's-cross lily (E). Echte Jakobillie (D). Giglio di St. Giacomo, Croce di St. Giacomo (I). نبات يصل من فصيلة النرجسيات يزرع للزينة. أوراقه مزدوجة التصفيغ، قرصية الانتشاب، عصفية الشكل تظهر بعد الإزهار. أزهاره مركب من زهرة كبيرة واحدة ترتكز على شراخ يعلو نحو ٦٠ سم. بتلاتها متدلية تطول نحو ١٠ سم. لونها إلى الحمرة القرمزية العاقبة. زراعتها لا تتطلب عناية خاصة إنما يرغب في الأتربة القليلة الانساج.

٢٨٧٢٩ - نرجسيات * Amaryllidaceae (S).

Amaryllidacées (F). Amaryllidaceae (E). فصيلة نباتية من وحيدات الغلّة. أجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم. أشهر أجناسها النرجس والنرجوس والأماريلس والباهرة.

٢٨٧٣٠ - نرجس * Hippeastrum (S).

Hippéastre (F). جنس نباتات بسلية عشبية من فصيلة النرجسيات. أنواعه وشروبه عديدة. أوراقها قرصية الانتشاب، قدية الشكل. بتلاتها الزهرية مجوفة. أزهارها عريضة وبحورية متدلية، قدية القالب، سداسية البتلات، عديدة الألوان المختلفة التي تراوح من الأبيض إلى الأحمر القرمزي || أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢٨٧٣١ - نرجس أرجواني * Hippeastrum rutilum (S).

Hippéastre écarlate (F). نوع من النرجوس السروتي. يصلته رائحة الجذور. أوراقه مستعرضة جميلة الخضار الزاهي تطول نحو ٣٠ سم. شراخه الزهري يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره ثنائية التجميع، متقاربة الارتكاز، عادمة العرف، أرجوانية اللون. تنوره يستمر طوّل فصل الربيع.

٢٨٧٣٢ - نرجس أميري * Hippeastrum aulicum (S).

Hippéastre princier (F). نوع من النرجوس السروتي. هذه البرازيل. أوراقه عديدة جميلة الخضار تطول نحو ٤ سم. شراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم. ينتهي بزهريتين كبيرتين لونها إلى الأحمر المائل بالجوي أما التويج فاخضر اللون، مذهب التهديد. تنوره يستمر طوّل شهر كانون.

٢٨٧٣٣ - نرجس الملكة كارولين * Hippeastrum reginae (S).

Hippéastre de la reine Caroline (F). نوع من النرجوس الجادح. أوراقه عديدة مستطيلة النصل الفيق، شراخه الزهري يعلو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره وريّة التجميع كبيرة القذ أرجوانية اللون يتوسط تويجها نجوم خضر || تنوره يستمر من أيار إلى تموز.

٢٨٧٣٤ - نرجس بيجاني * Hippeastrum psittacium (S).

Hippéastre perroquet (F). نوع من النرجوس السروتي الشائع الزراعة. أوراقه خضراء

قدية مستطيلة. شراخه الزهري يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ينتهي بزهرة وسيدة، كبيرة القذ، عطرية الرائحة، بيضاء اللون، ترتكز على تويج أصفر القالب، أحر الإطراف. ينور في الربيع.

٢٨٧٣١ - نرجس برّي * نرجس جبلي،

سيراس

Narcissus pseudonarcissus, N. sylvestris (S). Narcisse sauvage, N. trompette, N. des prés, Porlon, Clochette des bois, Coucou, Jeannette (F). Wild narcissus, Daffodil, Lent lily (E). Gemeine Narzisse (D). Narciso del boschi, N. falso, Tromboncino (I). نوع من النرجس السروتي المبلول. أوراقه قرصية الانتشاب، خماسية أو سداسية المدد. نصلها منتصب الصفحة المنسلة. شراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. ينتهي بزهريتين كبيرتين بوقية التويج لونها إلى الصفار الكبري || ينور في آذار. يعيش في جميع المواقع والأتربة.

٢٨٧٣٢ - نرجس شرقي * مضغف

Narcissus orientalis, N. tazetta (S). Narcisse tazette, N. à bouquet, N. de Constantinople (F). French daffodil, Polyanthus narcissus (E). Tazetten-Narzisse (D). Narciso a mazzetto, Tazetta (I). نوع من النرجس السروتي المبلول. شروبه أنواعه لا تقل عن ١٢٠ جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط. أوراقه قرصية الانتشاب قدية النصل البحري الخضار القليل التخديد. شراخه الزهري قوي القصبة يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ينتهي بضمة من الزهر. أزهاره مستطيلة الاذن، متدلية، متوسطة الحجم، لونها إلى الأبيض الأصفر الملوّج، عرقها ذكي الرائحة الفواحة || ينور في الربيع.

٢٨٧٣٣ - نرجس عطر * جرناء

Narcissus odoratus (S). Narcisse odorant, Camparnelle, Jonquille camparnelle (F). Camparnelle Jonquil (E). Wohlriechende Narzisse (D). Giracapo, Giracoli (I). نوع من النرجس السروتي الشائع الاستعمال الزاهي. أوراقه ميزانية الشكل، جميلة الخضار الزاهي. أزهاره ثنائية أو رباعية التجميع، ذكية العرف، صفراء اللون، ترتكز على تويج قدي الشكل يكمل هامة الشراخ الذي يعلو نحو ٣٥ سم. || ينور من آذار إلى نيسان.

٢٨٧٣٤ - نرجس عنكبوتي * Pancratier (F).

هي الحلة، من النرجسيات، أطلبها.

٢٨٧٣٥ - نرجس مبخار * Narcissus serotinus (S).

Narcisse tardif (F). نوع من النرجس الجادح المشاخ. أوراقه خيطية الشكل راوح عددها من ١ إلى ٢، شراخه الزهري دقيق ونحيل يعلو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ينتهي بزهرة وسيدة كبيرة القذ، عطرية الرائحة، بيضاء اللون، صفراء التويج. ينور في تشرين.

٢٨٧٣٦ - نرجس مدّيسي * Narcissus bulbocodium (S).

Corbularia bulbocodium (F). Narcisse bulbocode, Trompette de méduse (F). نوع من النرجس السروتي. أوراقه قرصية الانتشاب قدية النصل الفيق المستطيل. شراخه يعلو نحو ٣٠ سم. ينتهي بزهريتين كبيرتين. تويجها بوقي الشكل لونها إلى



نرجس برّي نرجس شرقي



نرجس عطر



نرجس مدوسي



نرجس يعقوب



نرجس

٢٨٧٤١ - نُرَّاقَة

النَّزَّاء : داء يأخذ الغم فتزور منه حتى تموت .

٢٨٧٤٢ - نُرَّاقَة ، نَسَّارُع (F). Conflit (F). Conflict (E).
هو التعارض بين موقفين . وهو في القانون الإداري خلاف بين حكمتين على اختصاصهما في النظر بدعوى واحدة .



نَزَّاف مَبْدُول

٢٨٧٤٣ - نُرَّاقَة (F). Litige (F). Litigation (E).
خاصية تقضي على رفع دعوى .

٢٨٧٤٤ - نُرَّاقَة

Vampyrus (S).
Vampire (F). Vampire (E).
جلس غفائش من فصيلة الوريقات . أنواعه عديدة ، موطنها البلاد المتندلة المشرفة نحو الحارة ، تكثر في أمريكا الجنوبية || أجسامها متوسطة القد . رؤوسها ضخمة ، مستطيلة . فرائسها بارزة . زوائد المخارية سنانية الشكل ، كبيرة ، ضيقة . أذنانها لا ر لها || تألف الأراج الكثيفة والأشجار القضة . تعيش منفردة . ذكورها تقرب أنثاه عند الكوم فقط . مسرحها من الفسق إلى الفجر . قوتها الحشرات والآبار والدم تستنزف من مختلف الحيوانات أنصمها الحيل والبقر || أرف أنواء وأشهرها الزئاف المبدول .



نَرَّاق

٢٨٧٤٥ - نُرَّاق مَبْدُول * ، نُرَّاق شَبَّعِي

Vampyrus spectrum (S). Vampire spectre, V. commun (F). Great vampire, False vampire (E).
نوع من النُرَّاق ، طول نحو ١٤ سم . وبعسته ٣٥ سم . ثوبه خفي للممس كسني الرأس والظهر ، أشبه البطن والحواشي . موطنه فسيح الإرياء يم أمريكا الجنوبية ، يكثر في الفريسان . يألف الأراج الكثيفة . قوته الحشرات والآبار والدم .



نَرَّاقَة

٢٨٧٤٦ - نُرَّاق * ، أبو صَكَن

Antidorcas enchora (S).
Gazelle à bourse, Sprinbok (F). Sprinbok (E).
نوع من الغزلان . حيوان لبون مجتر أجوف القرن ثنائي الاخلاف . موطنه افريقية الجنوبية . يألف السباب . ملجئه الحيائي جماعي . إجله يد بعض المئات || جسمه ربع القامة رشيق القوام كسائر الغزلان . ثوبه إلى السمرة الخفيفة . عنقه وصدره وبطنه وقفاء إلى الأبيض النبي الحواج . قرنه متتابع الحيد ، ذرب الطرف المنمط || يتميز بالحفة وبسرعة المدو ويتابع الغنم البيد الجبال .

٢٨٧٤٧ - نُرَّاقَة *

Pilea (S).
Piléa, Herbe au feu d'artifice (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الانجريات . أنواعها المعروفة عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية والحارة . معظمها معمر وبعضها حولي || سوقها فراء . أوراقها متعاقبة ، سنانية الشكل ، مستطيلة التنديب . تصالها كثيرة العروق والأعصاب ، خلية البشرة ، مسنة الحواشي . أزهارها وحيدة المسكن ، عنقودية التجميع ، أبطية الارتكاز . مآبر أزهارها الذكورية تفجر عند أدراك الطلع وتذلق به ببدا || منها أنواع تزينة ترزع في المصاري أعصها الزئافة النخامية (Pilea mucosa) .

اللون تطول نحو ٤٥ سم . شراخه الزهري يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أزهاره محورية الارتكاز وغامية ، ثنائية التجميع ، لزها إلى الخضار المضلع والجذع بالأحر القرمزي . تنوره يستمر من الربيع إلى الخريف .

٢٨٧٤٥ - نُرَّاق جَرَل

Hippestrum bifidum (S). Hippéastre bifide (F).
نوع من النرجوس السبروي . أوراقه بحرية اللون تطول نحو ٣٠ سم . شراخه الزهري يتقدم الأوراق ويعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم . ضسته الزهرية تجمع من ٤ إلى ٦ أزهار . توجيها مهدب اختار ، أزهاره جزلة تطول نحو ٥ سم . ثلاثها قرزية اللون يتوسطها خط أخضر || تنوره يستمر من حزيران إلى ايلول .

٢٨٧٣٦ - نُرَّاق جَرَل قَهْدِي

Hippestrum pardinum (S). Hippéastre léopard (F).
نوع من النرجوس الجالنج . أوراقه شديدة الخضار تطول نحو ٦٠ سم . شراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم . أزهاره كبيرة القند ، عاجية اللون ، ومطلة بالأحر الجوزي || تنوره يستمر طول شهر شباط .

٢٨٧٣٧ - نُرَّاق جَرَل مُوشَّع

Hippestrum vittatum (S). Hippéastre à bandes, Amaryllis à bandes, A. de Rouen (F). Banded amaryllis (E). Bandirte Amaryllis (D). Amariill striscia (I).
نوع من النرجوس السبروي الشائع الزراعة . أوراقه عاجية الخضار تطول من ٦٠ إلى ٧٠ سم . وتعرض نحو ٥ سم . شراخه الزهري غليظ القصبية الثلثية يعلو من ٩٠ إلى ١٠٠ سم . أزهاره لا يقاسية التجميع تراوح ضمتها من ٤ إلى ٩ أزهار ، تكثر في اواسط الشراخ وتقل مع اقترابها من الهامة . والزهرة كبيرة القند مدبة الثلاث الهجئة وهي عطرية الرائحة عاجية يعلمها توضع وردي كامل الخطوط . تنوره يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٨٧٣٨ - نُرَّاقِين *

Narcinus (S).
Narcine (F). Narcinus (E).
جنس اسمك بحرية من السفقيات وفصيلة الرمادات . أنواعها المعروفة خمسة ، أعطائها بحار المناطق الاستوائية والحارة || أجسامها متندلة الطولي ، يرمية الشكل ، مبططة القدام ، مستطيلة الاذنان || من ميزاتها الخاصة انطلاق ساقها الخيشومية من أربع فجوات مستطيلة مركزها في مقدم الرأس ، فموتان تحت كل عين || لحومها مأكولة ، متندلة الصفت .

٢٨٧٣٩ - نُرَّاقِينَة

Polliothyrsis sinensis (S).
Polliothyrs de Chine (F).
شجيرة برية وتزيينية من فصيلة النصفيات . مهدها الصين . ساقها متصبية فراء تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . فرونها حر الهواء . أوراقها عابطة منعقة متعاقبة . فصلها قلبي الشكل مائل الصفحة العليا خفي السفلي . أزهارها وحيدة المسكن ، عادمة التوزيع ، صفيرة القند ، يبيض اللون . أزهارها مشكوكي التجميع ، طرفي الارتكاز . ثمارها حقية الشكل ، رباعية المصاريع || تنوره يستمر طول شهر تموز .

٢٨٧٤٠ - نُرَّاقَة ، نُرَّو

Saillie, Monte, Coit (F).
Covering, Serving, Cotion (E).
النزاء والنزو هو جاع الحيوان الداجن كالخيل والبقر .

٢٨٧٦٣ - نَزُونِيَّة * ٥

Nasonia brevicornis (S).

Nasonia brevicorne (F).

حشرة نافعة من الصفريات النشائية الاجنحة. تتطفل على معظم حشرات ذوات الجناحين اخصها الذباب المنزلي. طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الصغار الاسود الاسفح المواجه. زباناها قصيرة القذ صولجانية الشكل.

٢٨٧٦٤ - نَزْرِب

Bramée, Bramelement (F).

Belling (E).

صوت الايالي والغلياء.

٢٨٧٦٥ - نَزْرِبَف

هو الثَّزَف ، اطلبه .

٢٨٧٦٦ - نَزْرِبَقَّة ٥

Amphipore (F).

جنس ديدان خموسية مبنولة في معظم بحار العالم .

٢٨٧٦٧ - نَزْرِك * ، كَاكُو

Narvalis (S).

Nasique Kakau (F). Nose-ape (E).

قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة الهباريات . موطنه جزر الزايج . يألف الغابات القائمة على ضفاف المنابع ويجاري الماء . طوله نحو ٧٦ سم. وذنبه ٧٠ سم. يتميز بانفه المستطيل الارنية . ثوبه كيف الشعر الناعم للمسن ، لونه الى الكهبة الصفراء يبق عند الظهر ويمر عند الصدر والبطن .

٢٨٧٦٨ - نَزْرِيُوس الشَّرُونِيَّات ٥

Nysius senecionis (S). Nysius des seneçons (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطيريات ورتبة مختلفات الاجنحة. جسمها صغير القذ ، طولها نحو ٤ مم. رأسها شبه مزواني الشوزن ، مذهب اللون . غطلمها صغير . عينها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها مستطيلتان . كسلها والصفحة العليا من بطنها الى الصغار المذهب . الصفحة السفلى الى السرة السوداء . حقيقتها صغيرة بحمرمة . قشراتها شفافة || مسرحتها البراري . تركب نباتات فصيلة المركبات واصحها الشرونيات .

٢٨٧٦٩ - نَزْرِيُون * ٥

Nisonades (S).

حشرة من المسيريات . فراشتها صغيرة القذ ، مردنية الجسم . حنطية الثوب ، طولها نحو ٢٦ مم. في الذكور والاناث . رواشتها كستنية اللون سفع المواجه ، حنطية التصديق والزركمة في الاناث ، بيض التنقيط في الذكور . يكثر وجودها من نيسان الى حزيران . رفاقها تركب معظم النباتات التريينية دون ان تقتربها شديد الانثى .

٢٨٧٧٠ - نَزْرِيُون تاج * ٥

Nisonades tages (S).

Nisonades tages, Thanaos tages (F).

Nisonades tages (E).

حشرة من فصيلة المسيريات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاذني واروبة . فراشتها واثمة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الشنداب والاروس واكثر نباتات القرنيات القرشاية || جسمها متوسط القذ يطول نحو ١٣ مم. بسطها نحو ٢٧ مم. رأسها كستني اللون . عينها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشنها وبطنها الى الكستني الاسمر الاسفح المواجه || رواشن الذكر الى الكهبة البتراء تملوها في الزوج الاسامي اربع جدات متعقبة كستنية اللون ويملوها في الزوج الخلفي تخفصيب كستني متفاوت السرة || رواشن

٢٨٧٦٨ - نَزْر

النزور دم في فرع البقرة . يقال بقرة مزورة اي وامة الفرع .

٢٨٧٦٩ - نَزْرَع البَرَام

Ebourgeonnage, Ebourgeonnement (F). Nipping of buds, Dis budding (E).

هو التشديد اي انتزاع البرام الزائدة او القفارة لتحويل ما تستهلكه من نضج الى سائر ما تبقى من اعضاء النبات الهوائية .

٢٨٧٧٠ - نَزْرَع المُلْكِيَّة ، اِسْتِمْلَاك

Expropriation

هو سلب المالك ملكه قانونياً للنفع العام على ان يدفع مئته المقدم اليه .

٢٨٧٧١ - نَزْرَعَة ، نَزْرُوع

Atavisme (F).

Atavism (E).

هي البنج والبنوج اي نزع الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اصبحت عنه انسائها السابقة او السالفة .

٢٨٧٧٢ - نَزْرَعَة

« بقلة كالخضرة تكون بالمرض وليس لها زهر ولا ثمر ، تأكلها الابل اذا لم تجد غيرها » (ابو حنيفة) .

٢٨٧٧٣ - نَزْرَف ، نَزْرِف

Hémorragie (F).

Haemorrhage (E).

خروج الدم من مجاريه الطبيعية .

٢٨٧٧٤ - نَزْرَف الرِّحْم

Métrorragie (F).

Metrorrhagia (E).

نزف رمي يحصل اثناء الحمل يؤدي الى الاجهاض .

٢٨٧٧٥ - نَزْرِك

Hemipenis (F). Hemipenis (E).

النزك قضيب الذكر عند الزحافات كالحيات والسلاحف والعظاء . وهو يتميز بانزواجيته وباشكاله المختلفة وبتماليه المدبية الاطراف او المسنة التي تمكنه عند انتشارها من الالتحام وعدم الافلات .

٢٨٧٧٦ - نَزْرُك

Produit (F). Produce (E).

النزل والذقة من محاصيل الارض الزراعية .

٢٨٧٧٧ - نَزْرَكَة

Catarrhe (F). Catarrh (E).

التهاب الغشاء المخاطي وسيلانه .

٢٨٧٧٨ - نَزْرَكَة والذقة

Grippe (F). Influenza (E).

هي الوالدة والانفلونزا والنزلة الصدرية الوبائية، مرض معد يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٧٩ - نَزْرَكَة وقوية ، نَزْرَكَة صُدْرِيَّة

Broncho-pneumonie (F). Broncho-pneumonia (E).

مرض التهاب الشعب الرئوية يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٨٠ - نَزْرَكَة شَعْبِيَّة ، بَرُونَشِيَّت

Bronchite (F). Bronchitis (E).

مرض التهاب الشعب يصيب معظم الحيوانات الداجنة لا سيما الخيل والضان .

٢٨٧٨١ - نَزْرُو

هو النزاء ، اطلبه .

٢٨٧٨٢ - نَزْرُوع

Atavisme (F). Atavism (E).

هي نزع الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اصبحت عنه انسائها السالفة . اطلب نزع .



نَزُونِيَّة



نَزْرِك



نَزْرِيُون



نَزْرِيُون تاج

٢٨٧٨١ - نِسْبِيَّةٌ
Proportionnalité (F).
Proportionality (E).
حالة الأعداد أو الأشياء المتناسبة فيما بينها .

٢٨٧٨٢ - نَسَّةٌ * ، نَسَّةٌ
Nyssa (S).
Nyssa, Tupélo (F). Tupelo tree (E). Tupelobaum (D). Niss (I).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النسيات . أنواعها المعروفة قليلة، جميعها أشجار ونجيرات عابلة . جذورها هشة تستعمل استعمال الفلين . سوقها رقيقة منتصبة الأغصان، اغشائها لينة للمادة البيضاء اللون . أوراقها متعاقبة جامدة للتصل للاعم . أزهارها لا نظامية التركيب منها الخشوية النحاسية الاسدية ومنها الذكرية المشارية الاسدية المنقودة التجميع ومنها الانثوية الثلاثية النورة . ثمارها عجيبة النواة ، لبية السودق || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .



نَسَّة

٢٨٧٨٣ - نَسَّةٌ بَيْضَاءُ
Nyssa candicans, N. ogeche (S). Tupélo blanchâtre (F).
نوع من النسة، شجرتها متصلة القد سريعة النمو تملو من ٦ الى ١٦ م. . أوراقها قصيرة الاعناق تطول نحو ١٥ سم. نصلها اسفلي الشكل مائل الصفحة العليا نحو السفلي التي تبلو كأنها مغطاة بالرماد الأبيض || عناقيد أزهارها الذكرية صغيرة الحجم . أزهارها الانثوية فردية التجميع مزينة الاغصاء . ثمارها بيضيه الشكل حمراء اللون تطول من ٢ الى ٤ سم. سوقها حامض الطعم . صعبتها عميقة التخثيد الطولي .

٢٨٧٨٤ - نَسَّةٌ جَبَّارَةٌ
Nyssa aquatica, N. uniflora (S). Grand tupélo (F).
نوع من النسة، شجرتها كبيرة الحجم سريعة النمو ترفع في المناطق والمواقع الرطبة . تملو نحو ٣٠ م. . أوراقها كبيرة القد، أهليلجية الشكل، مديبة المقصعة، مجهزة بثلاثة اسنان كبيرة القد مستدقة الأطراف . نصلها مائل الصفحة العليا، حلي السفلي . خله فني التجميع اغبر اللون . أزهارها الانثوية فردية التجميع . ثمارها بيضيه الشكل تطول نحو ٣ سم. لونها الى الزرقاء العابقة .



نَسْرٌ

٢٨٧٨٥ - نَسَّةٌ جَبَلِيَّةٌ
Nyssa sylvatica (S).
Tupélo de montagne (F).
نوع من النسة، شجرتها كبيرة الحجم سريعة النمو تملو من ١٢ الى ٣٦ متراً . أوراقها مستطيلة الاعناق تطول نحو ١٢ سم. نصلها أهليلجي الشكل لامع البشرة على صفحتيه . عناقيد أزهارها الذكرية مستطيلة . الانثوية شغمية التجميع براوح عددها من ٢ الى ٨ . ثمارها حبيبة القد والشكل لونها الى الزرقاء العابقة .

٢٨٧٨٦ - نَسْتَرٌ *
Amorpha (S). Amorphe (F).
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة القرنيات . انواعه المعروفة قليلة جميعها جنينات ونجيرات لاقيامية القالب والبهيمة . أوراقها ريشية ، وريّة التركيب، عابلة . أزهارها مستحبة الرائحة ، متبيلة التجميع ، بنفسجية اللون || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٨٧٨٧ - نَسْتَرٌ أَيْضٌ
Amorpha canescens (S).
Amorphe blanchâtre (F).
نوع من النستر البروني التريبي . جنته صغيرة القد تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها تطول نحو ١٠ سم. وريقاتها

الائى قريبة الشبه برواشن الذكر الا انها ابيضت ماجة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في التبار . تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح الممكن مباحدياً على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستصفي الوسط، مائل القشار، اسمر اللون، تملو ماجة غضراء زرقاء . رأسها اسود . مدنها ورواجبها الى السرة القائمة || طور الكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً ، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ اسبوعاً وينتهي ضمن صلجة تحجبها السرة بين الاوراق الابيدة .

٢٨٧٧١ - نُسَاحٌ * ، نَسَحٌ *
Lézarde (F).
Crack (E).
انصداع في جدار البناء سببه مرور الزمن او عيب في البليان او خلل في الهيكل نتج عن ظرف قاهر .

٢٨٧٧٢ - نَسَاسٌ *
Délisquent (F).
Délisquent (E).
نمت تعريني يطلق على الاجسام التي تتأخ من تشربها رطوبة الهواء .

٢٨٧٧٣ - نَسَاسَةٌ *
Délisquense (F).
Délisquense (E).
صفة الاجسام التي تتأخ من الرطوبة التي تمتصها او تشربها من الهواء .

٢٨٧٧٤ - نُسَافٌ
طائر له مغار كبير (ابن سيده) ج. نسايف .

٢٨٧٧٥ - نَسَافٌ ، نَسَافَةٌ
Tarare, Vanneuse (F). Winnowing-machine (E).
آلة تنظف الحبوب بواسطة تيار هواء يتسلط على غرابيلها المزانة .

٢٨٧٧٦ - نِسَافَةٌ *
Taxologie (F). Taxology (E).
النساق علم يبحث في تنسيق جميع معارف البشر .

٢٨٧٧٧ - نَسَبٌ ، نَسَبٌ
Lignage (F). Lineage (E).
هو القرابة في الآباء خاصة . وهو نوصان نسب مستقيم وهو ما كان بين الآباء والابناء . ونسب عرضي وهو ما كان بين الاخوة وبني الاخوة وبني الاعام . ج انساب

٢٨٧٧٨ - نَسَبٌ
Généalogie (F). Genealogy (E).
هو سلسلة تتابع الانسال في الاسرة الواحدة او العرق الواحد .

٢٨٧٧٩ - نِسْبَةٌ غَذَائِيَّةٌ ، نِسْبَةٌ غَذَائِيَّةٌ
Relation nutritive (F). Nutritive relation (E).
هي نسبة المواد الأروية الى غيرها من المواد الغذائية القابلة للمضم في كل علف او مخنة .

٢٨٧٨٠ - نِسْبِيٌّ ، نَسَابِيٌّ ، مُنَاسِبٌ
Proportional (F). Proportional (E).
نمت تعريني توصف به مناسبات الاشياء المختلفة .

وهو من القواطع يحجب أجواء آسيا الوسطى وأفريقية الشرقية والشمالية وأروبة الجنوبية. سره يتألف من ثلاثة إلى ستة أزواج || قوته الجيف على اختلاف أنواعها وإذا جاع تعدى على الغنم والماعز والقطا || الذكر لا يفارق أنثاه مدى الحياة. يذنّ وكه بين فروع شجرة داسية على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض || أثناء تبيض رقتين كبيرتين لونها إلى الرماد اللامع تعلو ريشه حراء. الخشن يستمر نحو ستة أسابيع تتناوب عليه الأنثى والذكر .

٢٨٧٩٤ - نَسْرٌ أَمْرِيكِيٌّ Condor (F).
هو الكندور، أطلبه.

٢٨٧٩٥ - نَسْرٌ طَائِر Altair (F). Altair (E).
النسر الطائر ويدعى الطير، نجم نيز من كوكبة العقاب .
راجع طير .

٢٨٧٩٦ - نَسْرٌ قَحَاح Condor (F).
هو الكندور ويدعى النسر الأمريكسي، أطلبه .

٢٨٧٩٧ - نَسْرٌ قُتْرَانِيٌّ * ، نُسْتُوس Vultur occipitalis (S). Vautour huppé (F). White headed vulture (E).
نوع من النسر، كبير الهامة قدره قدر نسر الجواء . ثوبه إلى البياض الأغبر الزاهي المواج . قرص رأسه متوج بفتحة صغيرة زغبية الريش ناعسة البياض . عنقه أغفر الريش الأغبر، برائله أصفر باهت || موطنه أفريقية الوسطى . يألف الإحراج ويجاري الماء، أخلاقه وطباعه لا تختلف عن أخلاق وطباع نسر الجواء .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ وَاقِع Vége (F). Vega, Wega (E).
النسر الواقع نجم نيز لامع من كوكبة القيثارة . يعتبر من ألم نجوم السماء . يبدد عن الأرض نحو ٢٦ سنة ضوئية . يبدو أن النظام الشمسي بكامله يسير باتجاهه أي أنه يجذبه نحوه .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّات Vulturidae (S).
Vulturidés (F). Vulturidae (E).

فصيلة من لمة النسور وفئة كواس النهار ورتبة الجوارح، تشمل النسر والرخة والأنوق والقشام والبيات والستل . جميعها كبيرة الجثة والسقط . رأسها أصلع أو أغفر . برائلها كبيرة . عنقها أغفر الريش الناعم . أرسافها عارية بخلاف أرساف العقاب الكاسية السرملة . غناها ظفرية لذلك فهي لا تقوى على حل فريستها كما تفعل العقاب وهذا ما يجعلها تقع على الجيف ولقيا نصية .

٢٨٨٠٠ - نَسْرِين * ، جُلْنِسْرِين ، وَرْدَبَرِّي ، وَرْدُ السِيَّاح

Rosa canina (S). Eglantier, Eglantine, Rose sauvage, Ros des chiens (F). Canker flower, Dog-rose, Dog-briar, Hephrose (E). Hundrose, Hundrose (D). Rosa canina, R. delle siepi, Cinorrodo (I).

نوع من الورد البري . ساقه تعلو من متر إلى ثلاثة أمتار . شوكه متنازع الدرز ، حاد الطوف المحجن . وريقاته وريّة الشجيج ، مستطيلة الاعناق ، ناشرة العروق والأعصاب ، مسنة الحافة . أزهاره غبراء اللون ، وردية المراج ، مسحة العرف الذي الراححة ، بتلاتها وحيدة الصف . نواحه وردية

كبيرة العدد الوردي الذي يراوح من ٢١ إلى ٤٩ ، نصلها خلي البثرة على صفحتها السفلى . سنابله الزهرية مستطيلة . أزهاره يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ مُشَجَّرٌ Amorpha fruticosa (S). Amorpha arbusif, Indigo bâtar, Faux indigo (F). Bastard indigo (E). Bastard-Indigo, Strauchige Uniform (D). Amorfa, Indaco bastardo, Falso Indaco, Amorosa (I).

نوع من النسر السرموني الشائع الزراعة . شجيرة كبيرة القدر تملو من ٣ إلى ٤ أمتار . أوراقه مستطيلة الأعناق طولها نحو ٢٥ سم . وريقاتها تعد من ١١ إلى ٢١ نصلها يبيض الشكل يعلو من ٢ إلى ٣ سم . سنابله الزهرية غنية لبدة تملو نحو ٢٠ سم . || أزهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّس * Agonostoma (S). Nestis (F).
جنس أسماك نهربية من شالكاكات الزعانف وفصيلة البوريات. أنواعه المعروفة نحو ١٠ أعطائها أنهر أفريقية الاستوائية || أجماعها أهليلجية الشكل ، معتدلة التطيط، تملو من ١٥ إلى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة مفلطحة كروؤس البوري . زعانفها الظهرية ثنائية ، الخلفية منها تقابل الشرجية . زعانفها الذيلية كبيرة مقطوعة الأطراف أو قابلة التقدير . أثوابها تراوح من الركبة متفاوتة السمرة إلى الشبهة . خضاب رؤوسها وظهورها أصبق من خضاب بطونها الذي يدر عند بعض الأنواع || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٨٧٩٠ - نَسَحَ Epandre (F). To scatter (E).
نسخ السباد والرباق والقش ... أذراها .

٢٨٧٩١ - نَسْرٌ Fourchette (F). Frog (E).
من أجزاء حافر الخيل وهو القسم البارز من باطن الحافر .

٢٨٧٩٢ - نَسْرٌ Vultur (S).
Vautour (F). Vulture (E).

جنس طير من الكواس ينتمي إلى فصيلة النسريرات . أنواعه قليلة العدد كبيرة الجثة الضخمة . رؤوسها صلع غفر . مناسره مستطيلة جالسة تنتهي بهرة منمنقة حادة . أعناقها زغبية الريش الأغفر . قواعد أعناقها مطوقة ببرائل مهدلة الزغب . سواقلها مستطيلة منفرجة . أذنانها قصيرة مستديرة . أرسافها قوية عارية || والنسر شره نهم زغب، إذا وقع على جيفة وأتلا منها لم يستعمل الطيران حتى يثب وثبات متالية . يرتفع على أرها شيئاً فشيئاً || ويقال للنسر عريف الطير . كنيته أبو الورد وأبو الأصم وأبو مالك وأبو المبال وأبو يحيى . والآن يقال لها أم قنصر . ويحي نسرًا لأنه ينسر الشيء ويصلته . جمه في القلة النسر وفي الكثرة نسور || أعرف أنواعه وأشهرها نسر الجواء والنسر القنبراني .

٢٨٧٩٣ - نَسْرٌ الْجَوَّاءُ * Vultur monachus (S). Vautour moine, V. cendré, V. arrian, Grand vautour (F). Hooded vulture (E).

نوع من النسر، طولها نحو ١٢٥ سم . وفتحة منقطة نحو ٢٥٠ سم . ثوبه إلى السمرة الخطية الغبراء . رأسه أصلع . عنقه أغفر الريش الأطلح . برائله خطي اللون ، منسره كبير القدر ، حاد البهرة الزرقاء الشديدة الانعقاد .



نَسِس



نسر الجواء



نسر قنبراني



نسرِين

جوزية اللد ، ارجوانية اللون ، ناشغة اللب ، غنية بالحامض الاستربري الذي يستعمل ضد الحفر .

٢٨٨٠١ - نِسْطُور

سكة تعرف بِلوت المتوسط ، اطلبها .

٢٨٨٠٢ - نِسْطُور *

Nestors (S).

Nestor (F). Nestor (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة اربعة موطنها زيلنده الجديدة والجزر المجاورة . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد . تألف العنابر والمواقع التي تكثر فيها الصغور المتراكبة لانها تدفن اعشاشها في تخاليفها قوتها المواد النباتية واخصها الثمار العنبة والعسائل والنواحي وبعض الحشرات واساربعها || اجسامها معتدلة القد تعول من ٤٥ الى ٥٠ سم . اذنانها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف . اوتها قائمة الالوان تكثر فيها الشبه السمراء والحمرية الجوزية || الانثى تضع اربع بيضات تحضنها نحو ١٩ يوما بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٨٨٠٣ - نِسْطُوك

Nostoc (F).

ألف مأكول يكثر وجوده في بعض مناطق الصين . يدعى بقة القمر .

٢٨٨٠٤ - نِسْطُوم

Neostoma (S).

Néostome (F). Neostome (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوسحات المثانة ، عذبات السهف ، كيريات الشفق . انواعه المعروفة قليلة العدد تعيش في المناطق الحدية البعيدة الغور ولا تشاهد الا نادرا قرب الجبال والشواطئ . اجسامها مستعرضة القدام ، مستتقة المتوسر ، تعول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اشدانها كبيرة غنية . جلودها عادمة السهف . لحمها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٨٨٠٥ - نِسْغ

Vent du Nord (F). North wind (E).

النسج اسم ريح الشمال . ويقال ريح نسعية اي شمالية .

٢٨٨٠٦ - نِسْغ

Poignet (F). Wrist (E).

النسج : المفصل بين الكف والساعد .

٢٨٨٠٧ - نِسْغ

Sève (F). Sap (E).

سائل غذائي يؤمن حاجة مختلف اعضاء ونسج النبات . وهو على نوعين : نسج باهل او ساعد او ناقص او وارد ونسج كامل او هابط وهو الصادر المنفذ .

٢٨٨٠٨ - نِسْغ بَاهِل ، نِسْغ نَاقِص ، نِسْغ

Sève brute (F). Inorganic sap (E).

صاعيد
هو ما يمتصه النبات من مواد قابلة للتفصيل فيوردها الى الاوراق لتضميرها وتحولها الى غذاء .

٢٨٨٠٩ - نِسْغ كَامِل ، نِسْغ هَاطِط

Sève élaborée (F). Elaborate sap (E).

هو ما حضره الاوراق من النسج الباهل فاصبح كاملا صالحا لتصدريه الى الجذور التي توزعه على مختلف اجزاء النبات .

٢٨٨١٠ - نِسْغ

Vannage (F). Winnowing (E).

نفض الحب وغربلته بالنسف .

٢٨٨١١ - نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة

نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة

Basalte (F). Basalt (E).

وقد ترد بالثين بدلا من البين ، هي سجارة الحرة السوداء ذات التخاريب .

٢٨٨١٢ - نِسْفَة

Meulière (F). Millstone grit (E).

صخور صوانية تحرة تستعمل كآرامية .

٢٨٨١٣ - نِسْق شَامِي

النسق الشامي مجموعة كواكب مصطفة على رأس الحية في كوكبية حور وسية .

٢٨٨١٤ - نِسْق يَمَانِي

النسق الياني مجموعة كواكب مصطفة تحت عنق الحية في كوكبية حور وسية .

٢٨٨١٥ - نِسْكَ

Cinnryris alblventris (F).

هو الثبير الابيض البطن ، اطلبه .

٢٨٨١٦ - نِسْلَة

Neslia (S). Nestle (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها يتجدد من الشرق الاوسط الى اوروبا || سوقها منتصبة فراء . اولاقها كاملة . ازهارها عنقودي او عنكولي التجميع . ازهارها صغيرة يكثر فيها اللون الاصفر || اعرف انواعها واشهرها النسلة العنكولية .

٢٨٨١٧ - نِسْلَة عُنْكَرِيْلَة

Neslia paniculata (S). Nestle paniculée (F).

نوع من النسلة . عشبة برية ، حولية . منها بعض الاصقاع اللبنانية ، اخصها الجبلية || ساقها فراء . اولاقها متعاقبة ، رقيقة النصال المستطيلة . ازهارها عنكولي التجميع . ازهارها صغيرة ، صفراء اللون || تنويرها ربيعي .

٢٨٨١٨ - نِسْئاس

Nisnas (F).

هو هجرس الغاب ، اطلبه .

٢٨٨١٩ - نِسْئاسَة

هي الطيطوى الاخضر ، اطلبه .

٢٨٨٢٠ - نِسْئوس

هو الثسر القبراني ، اطلبه .

٢٨٨٢١ - نِسْوَحَة

Poliste (F).

هي الزنبور الصغير ، اطلبه .

٢٨٨٢٢ - نِسْئَات

Nyssacées (F). Nyssaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد اشهرها النسة .

٢٨٨٢٣ - نِسْج

Tissu (F). Tissue, Web (E).

الانسجة هي الخامات التي تتكون منها اعضاء الاجسام الحية . وهي عديدة الانواع المختلفة التركيب والخصائص تتألف من خلايا ماثلة شكلا وحجا . || اشهر انواع النسج ما يتبع .

٢٨٨٢٤ - نِسْج دُعَامِي

Tissu palissadique (F).

Palissadic tissue (E).

اسم يطلق على النسج المنفسي القائم الخلايا المتأسكة المشدودة كما هي الحال في نصال الاوراق .



نسطور

Crédit (F). **٢٨٨٤٠ - تَسْيِفَة ، إِشْمَان**
Credit (E).
الزَّام يقطعه مصرف أو شخص لمن يطلب منه أن يميز له استعمال مال معين نظراً للغة التي يشتر بها نحوه . وقد تطلق اللفظة أيضاً على المال نفسه .

Amidon (F). Starch (E). **٢٨٨٤١ - نَشَاء ، نَشَاء**
النشا مادة عضوية لا متبلورة ، يفسد اللون ، عامدة العلم والرائحة ، ناعمة الملمس ، تلدب في الماء الدافئ . وهو ينتمي ككبريتاً إلى فئة مركبات هيدرات الكربون ويتكون مجهرياً من حبيبات ذرية يختلف شكلها وحجمها باختلاف مصدرها || يوجد النشا في معظم أجزاء النبات وأخصها الأوراق الخضر وكثير في بعض الحبوب والعلساق كالحنطة والارز والشعير والقرطم والحمص والفاصوليا والبطاطا والانيام الخ ...

فحبة الحنطة تحوي نحو ٧٠ ٪ من النشا
وحبة الارز تحوي نحو ٨٠ ٪ من النشا
ولبوبر البطاطا يحوي نحو ٢٥ ٪ من النشا

Météorite (F). Meteorite (E). **٢٨٨٤٢ - نَشَاب**
شذرة معدنية التركيب مصدرها الاجرام السماوية . يقال انها من حطام النيازك التي تحترق الاجواء الارضية . راجع نيزك .

Serpent volant (F). **٢٨٨٤٣ - نَشَاب**
نوع من الثعابين يدعى السف ، اطلبه .

٢٨٨٤٤ - نَشَادَر ، نَشَادِر
هو الامونياك ، اطلبه .

Vermoulure (F). Worm-hole (E). **٢٨٨٤٥ - نَشَارَة**
صحيح الخشب الذي يخرج من الثقبوب والانفاق التي تخلدها الحشرات في الاخشجار والاعشاب || وهي ايضا صحيح الخشب الناتج عن النشر .

Osyris blanc (F). **٢٨٨٤٦ - نَشَاس**
نبات زيبى يعرف بأبي ليله ، اطلبه .

Cirro-cumulus **٢٨٨٤٧ - نَشَاص ، نَمَرَة**
نوع من الغيوم البعيدة العالية ، مظهرها كتل صغيرة تشبه القطن المنذوف || يقال صحاب نشاس وغيوم نمره .

Dynamique (F). **٢٨٨٤٨ - نَشَاطَة ، دِيْنَمِيْكَ**
Dynamics (E).
هي علم القوى .

٢٨٨٤٩ - نَشَان هو كركدن سويترا ، اطلبه .

Chromosome **٢٨٨٥٠ - نُشْبَة ، نُشْطَة**
مواد جبرية شكلية نووية معدودة تكون في الخلية اثناء انقسامها . اما عدد النشَب فهو نوعي لا يتغير .

٢٨٨٥١ - نَشَج النشج هو جبرى الماء الطبيعي .

Phototactisme (F). **٢٨٨٥٢ - نَشَج**
Phototactism (E).

النشج مدى تأثير النور باعضاء النبات .

Plasmon **٢٨٨٥٣ - نَشْخَة**
التراث الوراثي الخارج عن نطاق النشَب .

Tissu adipeux (F). **٢٨٨٥٥ - نَسِيج شَحْمِيّ**
Adipose tissue (E).
كل نسيج في الحيوان تحولت خلاياه وحوث شحماً من جراء التسمين .

Tissu conjonctif (F). **٢٨٨٥٦ - نَسِيج ضَمّ**
Conjunctive tissue (E).
هو في النبات نسيج الرّون الذي يتكون من خلايا عادية التمييز تصنف بمقدورها الانسيابي الذي يؤهلها الى الدخول في تركيب مختلف النسيج .

Tissu nerveux (F). **٢٨٨٥٧ - نَسِيج عَصَبِيّ**
Nervous tissue (E).

Tissu de soutien (F). **٢٨٨٥٨ - نَسِيج عَضْدِيّ**
Support tissue (E).
هو النسيج الدعامي الذي يمد النبات بالصلاية النوعية اللازمة .

Tissu musculaire (F). **٢٨٨٥٩ - نَسِيج عَضَلِيّ**
Muscular tissue (E).

Tissu osseux (F). **٢٨٨٦٠ - نَسِيج عَظَامِيّ**
Osseous tissue (E).

Tissu cartilagineux (F). **٢٨٨٦١ - نَسِيج غُضْرُوِيّ**
Cartilaginous tissue (E).

Tissu de revêtement (F). **٢٨٨٦٢ - نَسِيج كِسَاطِيّ**
Revetment tissue (E).
هو النسيج الذي يغلّف الاعضاء النباتية الهوائية فيحميها من الجلل والنشاث ويختلف المواضع الخارجية .

Tissu méristématique (F). **٢٨٨٦٣ - نَسِيج مَتَسِيّ**
Meristematic tissue (E).
كل نبات وعائي يحوي مجموعة من الخلايا غير الممتعة تتكاثر في مناطق معينة ، توجه تخصيصها النسيجي ، تدعى المناطق المنقسمة . وهي تقسم الى قسمين قسم النسيج المنقسم الاولى او الهامة وقسم النسيج المنقسم الثانوية او القلبية .

Tissu conducteur (F). **٢٨٨٦٤ - نَسِيج مُوَصِّل**
Conducting tissue (E).
هو النسيج الوعائي والانبوبي الذي يؤمن النقل السريع بين مختلف اعضاء الجسم النباتي .

Textile **٢٨٨٦٥ - نَسِيجِيّ**
نعت تعريبي توصف به كل مادة يمكن حلها الى خيوط صالحة للحياكة .

Humidité normale (F). **٢٨٨٦٦ - نَسِيم**
Normal humidity (E).
الرطاب الطبيعي المألوف الذي يكون في سائر المواد الاستهلاكية وهو ما يبرهن عنه بالرطوبة النوعية .

Nucelle (F). **٢٨٨٦٧ - نُسَيْلَة**
هي السرية اطلها .

٢٨٨٦٨ - نُسَيْلَة هي الزوان المعمر ، اطلبه .

٢٨٨٦٩ - نَسِيم ، رِيْدَة
Brise, Vent très faible (F). Breeze, Weak wind (E).
كل ريح ضعيفة لا تحرك مجراً ولا تعني ثراً . ج. نسام .

* ٢٨٨٧٢ - نَشِيعُ الزَّرْعِ *

Helminthosporium gramineum, Pleospora graminea, Pyrenophora graminea (S). Helminthosporiose des graminées, Maladie des stries de l'orge (F). Stripe disease of barley (E). Streifenkrankheit der gerste (D).

فطر مجهري يصيب النجيليات اغصانها الشعير والخنطة والشيلم والدخن والذرة || مظهره الخارجي يقع مستطيلة قدية الشكل تملو العصف فتبدو عابقة اللون ثم شاحبة وتنتهي بالسرة || يركب الزرع بعد ادياسه باربدة او خمسة اسابيع وينتقل من صنف الى اخرى اعل منها حتى السلة فينتعها عن التطعيج او يسبب انماض معقدا . يكافح اما بامتعال بذار جديد خال من فطر المرض او بتطهير البذار الموجود بواسطة الاملاح النحاسية او مركبات الزئبق .

* ٢٨٨٧٣ - نَشِيعُ الشَّعِيرِ *

Helminthosporium teres, Pleospora teres, Pyrenophora teres (S). Helminthosporiose de l'orge (F). Net blotch of barley (E). Blattfleckenkrankheit der gerste (D).

فطر مجهري يركب القلت وجعب انواع الشعير الزراعية والبرية . مظهره الخارجي ، في اول عهده ، يقع مائمة لا قياسية الشكل والحجم تملو نصل العصف وتستقر بين الاعصاب ، لوها الى الحنطى الزيتوني اللامع ، ثم تتنجم وتتأخذ شكل المستطيلات || اضراره في الغالب محوودة وقد تبلغ في بعض المواقع الرطبة والظروف الخاصة نحو ٥٠ ٪ . يكافح بتطهير البذار بالاملاح الزئبقية او غيرها .

* ٢٨٨٧٤ - نَشِيعُ الشُّوْقَانِ *

Helminthosporium avenae, Pyrenophora avenae (S). Helminthosporiose de l'avoine (F).

فطر مجهري يصيب الشوقان فيطيه . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة شاحبة اللون ثم حنطية زاهية قفاقية تركب اواسط نصل العصف ثم تمع قسبب ذبوله وبياسه . اضراره في غالب الاحيان زعيدة || يكافح بتطهير البذار كغيره من فطور النشيع .

* ٢٨٨٧٥ - نَصْبُ *

Plantation (F). Plating (E). النصب هو زرع الغراس في التربة . وقد يتم على عدة اشكال اعماها الرزدة والتخميس .

* ٢٨٨٧٦ - نَضَبَةٌ *

Plant (F). Young plant, Slip (E). النضبة والزرعة والغريسة هي كل نبات صغير في تمكته يقوده من استمرار الحياة متفردا .

* ٢٨٨٧٧ - نَضِيعُ *

Chloroleucite, Chloroplaste, Chloroplastide جسم مشرب الخضيب يوجد في ودة الخلية النباتية . ج . تصايع .

* ٢٨٨٧٨ - نَضَّةُ *

Oiseau femelle (F). She-bird (E). النضة هي المصفورة ، انثى المصفور .

* ٢٨٨٧٩ - نَضِجِيَّاتُ الْجَنَاحِ *

Hemiptera, Hemipteroides (S). Hémiptères (F). Hemiptera (E). طبقة حشرات من شعبة الهليات . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى رتبتي : متجانسة الاجنحة ومختلفة الاجنحة .

Sciage (F). Sawing (E).

* ٢٨٨٥٤ - نَشْرُ *

هو قطع الخشب بالشار .

Bulletin (F).

* ٢٨٨٥٥ - نَشْرَةٌ *

* ٢٨٨٥٦ - نَشْرَةٌ جَوِّيَّةُ *

Bulletin météorologique (F). Weather forecast (E). موزن الاحوال الجوية وعواملها التي حصلت في فترة معينة . وقد تبحت ايضا في الاحوال الجوية المرتقبة .

* ٢٨٨٥٧ - نَشْعُ *

Doser (F). To proportion (E). نشع وركز وعابر : حدد مقادير المواد المختلفة بالنسبة الى بعضها . او عين مقدار المادة الفعالة بالنسبة الى كمية محدودة من الماء او غيره .

* ٢٨٨٥٨ - نَشْعَةٌ *

هي المقدار الكافي من المادة الفعالة .

* ٢٨٨٥٩ - نَشْعَةٌ ذَاعِيَةٌ *

Dose létale (F). Lethal dose (E). هي الكمية اللازمة من كل مادة جحالية او سامة لقتلها على كائن معين موسوف .

* ٢٨٨٦٠ - نَشَلُ *

هو اخراج المخرات من التراب في آخر التلم .

* ٢٨٨٦١ - نَشَمُ *

Micocoulier (F). هو الميس ، اطليه .

* ٢٨٨٦٢ - نَشَمُ اُنْبَيْسُ *

Fabrecoulier (F). هو ميس الجبل ، اطليه .

* ٢٨٨٦٣ - نَشَمُ شَرْقِيَّ *

Micocoulier oriental (F). هو ميس الشرق ، اطليه .

* ٢٨٨٦٤ - نَشَمُ صِيْنِيَّ *

Micocoulier de Chine (F). هو ميس الصين ، اطليه .

* ٢٨٨٦٥ - نَشَمَةٌ *

Anabase (F). هي الاناباز ، اطليه .

* ٢٨٨٦٦ - نَشُورُ *

Affleurement (F). ضرب من السمك (السان) .

* ٢٨٨٦٧ - نَشُوطُ *

نبات الرثد من اودته اول ما يبدو حين يصدع الارض .

* ٢٨٨٦٨ - نَشُوطُ *

نبات الرثد من اودته اول ما يبدو حين يصدع الارض .

* ٢٨٨٦٩ - نَشُولُ *


التشول : قلة الحرارة .

* ٢٨٨٧٠ - نَشِيَّةُ *

Odeur naturelle (F). Natural odour (E). هي الرائحة الطبيعية تفوح من الشيء دون واسطة . ج نشايا .

* ٢٨٨٧١ - نَشِيعُ *

Pyrenophora (S). جنس فطور مجهري من السخايات وفصيلة المشويات . تتميز باصنافها السوداء الهلية المسام . تكاثرها دويوسية الشكل مرموقة . بونها شمعي التجميع ، نمالي الاينكاز ، وبثري الخلية || انواعه الاقتصادية قليلة اشهرها :



نضج الزرع



نضج الشوقان

٢٨٨٩١ - نَصَار ، كَامَلِيَّة Camelina (S).

Cameline (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . أنواعه عديدة معظمها بري ، يكثر بين الزروع فيؤذيها || أشهر أنواعه النصار المزروع .

٢٨٨٩٢ - نَصَار مَزْرُوع * ، كَامَلِيَّة مَزْرُوعَة

Camelina sativa, Myargrum sativum (S). Cameline cultivée, Sésame d'Allemagne (F). Cameline, Gold of pleasure (E). Echter Dotter, Leindotter (D). Cameline, Sesamo di Germania, Dardella (I).
نوع من النصار الاستاثري زرع لبزوره الزيتية الشائعة الاستعمال الصناعي || عشبته فراءه . أوراقه صغيرة القد ، سنانية النصل الأخضر . أزهاره عقودية التجميع . أزهاره صغيرة ، صفراء اللون ، تنور في أوائل الصيف . ثماره غردلية ، بزورها دقيقة يضيء الشكل يرتقالية اللون تحوي نحو ٣٥ ٪ من الزيت الصناعي الذهبي اللون .

٢٨٨٩٣ - نَصَار Requin-marteau (F).

هو مطراق البحر ، سمكة من القرشيات ، اطبله .

٢٨٨٩٤ - نَصَارِيَّات Chrysomelidae (S).

Chrysomélidés (F). Chrysomelidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غدديات الاجنحة . اجناسها وأنواعها بضعة آلاف . معظمها حشرات صغيرة القد . اجسامها مألولة البشرة ، زاهية الالوان . قرونها الاستنشاقية عديدة الاشكال فيها الخيطي والحلبي والصولجاني والمشاري . اسرارها خاسية التكوين ، رباعية المظهر الخارجي . قوتها اوراق والياب والثمار والنبات . مكثا تبني اللون ، تختلف الاشكال تكثر فيه الاستطالة ، تمتص الاثني على النبات المائل او تلقيه في التربة قرب العرائل || يرقاتها خاضعة ، سداسية الارباع ، عديدة الالوان ، تركب النبات فتقضم الاوراق وتغرس السورق عند جفاف التربة وبعضها يركب الجلود || حورياتها صغيرة القد تلتحف بشرقتها تصنعها من الطين والمواد العضوية .

٢٨٨٩٥ - نَصَارِيَّةُ الْحَمَاض * Gastrophysa raphani (S). Chrysomèle de l'oseille (F).

حشرة من النصاريات . طولها نحو ٥ م . ثوبها الى الخضار البرجدي الزاهي المواج . تظهر في أواخر الربيع وتنتج لطبخ مكثا على الصفحات السفلى من اوراق الحماض ينفتق خلال شهر ايار عن رقات سمراء اللون نمة تقضم الاوراق وتؤذيها .

٢٨٨٩٦ - نَصَارِيَّةُ الْحَوْر * ، لِينَا الْحَوْر

Lina populi, Melasoma populi, Chrysomela populi (S). Lina du peuplier (F).
حشرة من النصاريات طولها نحو ١١ م . رأسها ودوقتها الى الخضار الازرق المواج . غمدتها الى الحجرة يعملونها عند طرفها تبقيج اسود . اجيالها الحولية ثلاثة . رقاتها صغيرة القد ، وردية الجسم ، سوداء الرأس ، تركب اوراق الحور فتقضم الخشب ولا تترك سوى الاعصاب والشرابين . وقد تصدى على النوامي وعلى البرام الفتية فتقضي عليها .

٢٨٨٩٧ - نَصَارِيَّةُ الزُّوْفَا

تعرف بأدريما مرجيناتا ، اطبلها .

٢٨٨٩٠ - نَصْفِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ Hémiptère (F).

نعت تعريبي يطلق على جميع الحشرات التي تلتصق الى طبقة نصفيات الجناح .

٢٨٨٩١ - نَصْل ، حَاشِيَّة ، شَقْرَة ، صَفِيحَة

Limbe (F). Limb (E).
هو الجزء المنبسط المستطيل العريض من ورقة النبات .

٢٨٨٩٢ - نَصْلِي Limbale (F). Limbate (E).

نعت تعريبي توصف به الاعضاء التي تولد النصل كقولك خلایا نصلية .

٢٨٨٩٣ - نَصْلُ الْحَافِر Avalure (F).

Sloughing of the horny part of the (E).
عارض يصيب الحافر فيسبب هبوطه في الخيل .

٢٨٨٩٤ - نَصِي * Sasa (S).

Bambou (F). Bambou (E).
جنس نباتات قصية برية وزراعية من عمادة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعه عديدة ترغب في المواقع الرطبة والاثربة القليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية || أشهر انواعه ما يتبع .

٢٨٨٩٥ - نَصِي أَلْبَق Sasa variegata (S).

Bambou bandé (F).
نوع من النصي يعملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه مزدوجة التصفيق ، نصلها مائل الصفحة العليا الخضراء اللون ، خلى السفلى الملققة بالابيض || يرغب في الاثربة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٢٨٨٩٦ - نَصِي مَذْهَب Sasa auricoma (S).

Bambou à chevelure dorée (F).
نوع من النصي يعملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . سلامياته بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٧ سم . نصلها خلى البشرة على صفحتيه ، يعملو توشيح ذهبي || يرغب في الاثربة الرملية الدبالية الرطبة .

٢٨٨٩٧ - نَصِي مَزْدُوجُ التَّصْفِيف

Sasa disticha, Bambusa nana (S). Bambou distique (F).
نوع من النصي يعملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه ضيقة مستطيلة مزدوجة التصفيق تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم . نصلها اخضر الصفحة السفلى مخضب العليا ، خضبا أدجواني يميح عند الازرباب . يرغب في الاثربة العميقة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٢٨٨٩٨ - نَصِي يَابَانِي Sasa japonica (S).

Bambou japonais (F).
نوع من النصي يعملو من المترين الى الخمسة امتار . سلامياته الى الخضار الاسفر . اوراقه تطول من ١٠ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مسن الحافة ، مائل الصفحة العليا المائلة الخضار ، خلى السفلى الزرقاء اللون . يرغب في الاثربة الخفيفة الغنية الرطبة .

٢٨٨٩٩ - نَصِيب Part, Quote-part (F).

Share, Part, Portion (E).
هو جزء من ذمة مالية يختص بها احد المتقاسمين . وهو حصه المهر في شيء او مال شاع .

٢٨٨٩٠ - نَصْ ، وَشَل Suint (F).

Grease of wool, Yolk (E).
هو نفضيس الصوف اخضره صوف الغنم .



نصي



نصار مزروع



نصارية الحماض



نصارية الحور

ثلاثة خطوط سمر تعلوها كشاش من الحلب الدقيق ||
طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينتهي ضمن
جرباب في التربة .



نضارية الصفصاف الخضراء

٢٨٩٠٥ - نُضَارِيَّة مُتَبَرِّجَةٌ

Chrysomela fastuosa (S). *Chrysomèle guindée* (F).
Chrysomela fastuosa (E).

حشرة غاصلة من فصيلة النضاريات ورنية معدنات
الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة
الشفوية واخصها الصمتر . خنافسها تعيش على الاغصان
والنواصي . يرقاتها تركب الاوراق || جسمها صغير القد
يطول من ٦ الى ٧ مم . ثوبها الى الخضار الاسفح المواج
يعلو في الظهران تحشيش طولي ارجواني وارزق . رأسها
كبير الجرم . عينها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان ،
دقيقان . ظهراتها مستدير الزوايا والظرف اللاحف .
غمداهما متباعدتان التفرقت الخفيف . ارساغها رباعية المقل
الظاهرة || الاثنى اميز قدما من الذكر وابنت ثوباً منه
واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة
الجلجلة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول . تخرج
في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام نموا تطول
نحو ١٢ مم . جسمها وشي الشكل ، قليل التقويس .
مستطال المقدم ، مستدق المؤخر ، سداسي الروابج . ثوبها
الى الطحلة الخطية المواج . رأسها وشريها ودراجها الى
السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع
ينتهي في التربة تحت الجلجلة او تحت الحماجرة .



نضارية الصفصاف الزرقاء



نضارية القرة



نضارية القريعات

٢٨٩٠٨ - نُضَارِيَّة الصَّفَصَاتِ الْخَضِرَاءُ *

Phyllodecta vitellinae (S). *Chrysomèle verte de l'osier* (F).

حشرة من النضاريات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ مم . ثوبها
الى الخضار الزبرجدي . تركب مع يرقاتها اوراق وبراعم
الصفصاف فتؤذيها اشد الاذى .

٢٨٩٠٩ - نُضَارِيَّة الصَّفَصَاتِ الزَّرْقَاءُ *

Phyllodecta vulgarissima (S). *Chrysomèle bleue de l'osier* (F).

حشرة من النضاريات ، طولها نحو ٥ مم . ثوبها الى الزرق
القائمة . تركب مع يرقاتها اوراق الصفصاف فتخربها
وتقتسم النواصي وبراعمها فتؤذيها اشد الاذى .

٢٨٩١٠ - نُضَارِيَّة الصَّلِيصِيَّاتِ

هي الخلدوش ، اطليه .

٢٨٩١١ - نُضَارِيَّة القُرَّة *

Phaedon cochleariae (S). *Chrysomèle du cresson* (F).

حشرة من النضاريات بيضبة الشكل محدودة ، طولها نحو
٤ مم . ثوبها الى الزبرجدي يعلو مواج ازرق . زباناها
الى السوداء النحسي . تركب مع يرقاتها اوراق القرة فتجملها
كالسدر وتتدلى على اوراق الفجل واللفت والملفوف فتفعل
فيها فعلها بالقررة .

٢٨٩١٢ - نُضَارِيَّة القَرَعِيَّاتِ * ، رَقِيسْد ،

Raphidopalpa foveicollis (S). *Raphide, Galéruque du melon* (F).

حشرة من النضاريات ، طولها نحو ٧ مم . ثوبها الى الحمرة
البرقالية . تعيش على اشباب المرابي الطبيعية والنقصة
والبرسيم . اناتها تلقي بمكها على التربة قرب عوائلها ، اخصها
القرعيات ، فينقب المكان عن رفات صغيرة تبينة اللون
تركب وتخرس سوق الشمام والبطيخ والخيار والكوسى وسائر
نباتات الفصيلة القرعية .

٢٨٩١٣ - نُضَارِيَّة الكَرْمَةِ

هي رموس الجفنة ، اطليه .

٢٨٩١٤ - نُضَارِيَّة اُنَيْقَةٌ *

Chrysomela polita (S). *Chrysomèle élégante* (F). *Chrysomela polita* (E).

حشرة غاصلة من فصيلة النضاريات ورنية معدنات
الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وفضاف مجاري الماء .
خنافسها ويرقاتها تعيش على جميع انواع النعم البري
والزراعي فتتغصم الاوراق وتؤذيها || جسمها صغير القد
يطول من ٦ الى ٨ مم . ثوبها متراكب الالوان كوسلها
الى الشقعة النحاسية الخضراء المواج ، ظهراتها الى الشقعة
الصنايية المذهبة المواج . رأسها معتدل الجرم . عينها
صغيرتان . زباناها خيطيان دقيقان . ظهراتها معتدل
الاحدياد مستدير المؤخر الخفيف . ارساغها رباعية
المقل الظاهرة || الاثنى اميز قدما من الذكر واكد ثوباً
منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر
الحشرة زبانا || اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر
الصيف . تخرج في النهار || والبرقة عند ادراكها الكمال
الجمودي تطول نحو ١٥ مم . جسمها وشي الشكل ،
قليل التقويس ، احمل اللون . رأسها غليظ الجرم اسمر
اللون . دراجها الى السمرة . تحمل في ظهرها ويانبيها

٢٨٩٠٦ - نَضْبُ

Tarir (F).
To drain, To exhaust (E).

نضب التبع : انقطع ماؤه . ونضب الماء : غار في الارض .

٢٨٩٠٧ - نَضُج

Pleine maturité (F).
Full maturity (E).

هو بلوغ الثمرة كالها الجمسوري ويصورها آخر دور
من ادوار حياتها . والنضج يأتي بعد الادراك والابناج .

٢٨٩٠٨ - نَضُح

Bassinage (F). *Sprinkling* (E).

هو الاسقاء بالرداذ اي الاسقاء الخفيف .

٢٨٩٠٩ - نَضُخ

Pulvérisation (F).
Pulverization (E).

هو رش الماء او اي سائل آخر بواسطة جهاز ضاغط خاص
يدفعه بمف .

٢٨٩١٠ - نَضْد

Stratifier (F). *To stratify* (E).

نضد البذور ، جعل بمضها فوق بعض صفيقاً مَرَصَافَةً
متتابعة .

٢٨٩١١ - نَضَف

هو الصمتر البري ، اطليه .

٢٨٩١٢ - نَضَكَّة

Naucles (S).
Naucière, Milan-hirondelle, Epervier à serpent (F).

جنس طير من حمارة الحداة وفصيلة الصقريات . انواعه
المعروفة قليلة العدد ، تتميز باجسامها الجاهة . رؤوسها
صغيرة . اعناقها قصيرة . سواقطها مستطيلة ذائقة الاطراف .
اذنابها شديدة الطول فارقة . مناسرها قوية ، منقطة البهرة
الحادة . ارساغها قصيرة ، مخالبها قوية ذرية . || تألف
الحياة الجاهية سربها يراوح من ١٠ الى ١٠٠ زوج .
قوتها الحشرات والوزع والفضاء والحيات ، تدن اركانها
في فن الاشجار اخصها السنديان والصنوبر . اناتها تنصع



نضارية انيقة

وهو سريع النمو ولادراك يحد في الاثرية الكلسية التي لا تصلح للزراعات الاخرى .

٢٨٩١٨ - نَهْشَاصُ * ، قُنْشُدُ التَّمَلِّ

Echidna (S), Echidné (F), Echidna (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جاس من وحدات المسلك .
انواعه المعروفة قليلة ، اعطانها جبار استراليا وفيها الجديدة .
اجسامها مكورة تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . يغلفها شوك دقيق كثيف ذوب الاطراف كشوك القنفذ . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل تنتهي بخلم مستطيل كالنفاخ . جرابها مسلمة باظفار قوية سادة تحمكها من الحفر . السنتها مستطيلة دقيقة احادة اندفاعية تحمكها من ارتشاف الحشرات والنمل . تألف المواقع القليلة الادغال . تروح في الليل . محاجرها دهاليز متعادية المتناوب وحيدة المنفذ .

٢٨٩١٩ - نَهْشَوَّةُ * Fer à cheval (F), Horseshoe (E).
حديقة تمتل بها حوافر الدواب .

٢٨٩٢٠ - نَهْشِي * Verge des équidés (F).
Penis of the equidae (E).
النهي قضيب ذكور الخيل وحر الوحش .

٢٨٩٢١ - نَهْشِي * Couche (F), Layer, Stratum (E).
كل ساف مرصوف من الشي المنصود .

٢٨٩٢٢ - نَهْشِير * Eucharis
جنس نباتات بصلية من فصيلة الترجيبات منها المقدر بلاد امريكا الجنوبية . انواعه المعروفة قليلة ، بعضها بري وبعضها تربيني . اوراقه قدية الشكل مخددة النصل . شمارجه مجوفة تنتهي بفسمة من الازهار عطرية العرف الفرج ، جميلة الشكل ، مختلفة الالوان . || اشهر انواعه التريبيتي نصير الامازون .

٢٨٩٢٣ - نَهْشِيرُ الْأَمَازُون * ، نَهْشِيرُ الْأَمَازُون Eucharis amazonica (S), Eucharis de l'Amazone (F), Amazon lily (E), Amazonische Lilie (D), Eucaris (I).
نوع من النصير التريبيتي السبروتي . اوراقه قرصية الانتشاب مستطيلة النصل القدي الشكل المخددة الصفحة . شراخه الزهري يحمل فسمه من الازهار الماجية العطرية العرف . يوجد في جميع المواقع والارضية ولا يخشى سوى الرطوبة المستحكة .

٢٨٩٢٤ - نَهْشَاةُ * Cupule
هي قمع الزهرة والشرة . ج . أنطاه .

٢٨٩٢٥ - نَهْشَاةُ * ، أَبُو حَرَّةُ Monacanthus (S).
Monacanthé (F), Monacanthus (E).

جنس اسماك بحرية من ملحوبات الفك ، قاسيات الجلد ، تقتني الى مجموعة النفاير اي عنز الماء . انواعه المعروفة خمسة اعطانها جبار البلاد الحارة || اجسامها ربة تطول نحو ٤٠ سم . رؤوسها كبيرة القد ، مخروطية الشكل ، متوجة بقرن كالخربة ينشئ في القمة . زعانفها الصدرية والبطنية والظهرية شائكة . اثنائها الى السلحة السوداء المبقعة والمزخمة بالابيض والاصفر والافضر . زعانفها صفراء اللون || لحويها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٨٩٢٦ - نَهْشَارُ * Epouvantail (F), Scarecrow (E).
هو الجدار ، ينصب في الزرع والمباقل مزجرة الطير والوحش .

من رفثين الى اربع رفثات تحضنها بمناوبة الذكور . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨٩١٣ - نَهْشَاةُ افْرِيقِيَّةُ *

Naclerus rlocouri (S), Naclère d'Afrique (F).

نوع من النصفه ، موطنها معظم اقطار افريقية الجنوبية الشرقية والوسطى . جسمها يطول نحو ٥٥ سم . رأسها وصنفا وصدرها وبطنها الى البياض العاجي . سقاطها وظهورها وذهنها الى السواد اللامع تملو ماجة خضراء . منسرها اسود اللون . حذقة فيها كاليقوت . ارساها كاسية . || تألف الاحراج ويحاري الماء . تجوب البلاد في طلب الرزق . سرها يعد من ١٠ الى ٥٠ زوجاً .

٢٨٩١٤ - نَهْشَاةُ امْرِيْكِيَّةُ *

Naclerus furcatus (S), Naclère-martinet, Naclère d'Amérique (F).

نوع من النصفه ، موطنها فسيح الاربا . يشمل امريكا الجنوبية والشمالية . جسمها يطول نحو ٥٧ سم . رأسها وصنفا وجوشها وبطنها الى البياض الثلجي وما تبقى اسود اللون ازرق المراج تملو خضرة صفراء . منسرها عايق السرعة . حذقة فيها جثوية . ارساها الى الصفراء الاخضر المراج . تألف الاحراج . تجوب البلاد الامريكية في طلب الرزق والصيف والمشي . سرها يعد من ٢٠ الى ١٠٠ زوج .

٢٨٩١٥ - نَهْشَمُ ، سَرَّازَانُ Fagopyrum (S), Sarrasin
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة البطيانيات . سورها منتصب قليلة الصلابة . اوراقها متعاقبة معتقة . نصلها قليلة الشكل او سهية ، خماسية اللوح ، عايقه . انزاعها عقدوي التجميع . انزاعها خشوية ، صغيرة القد ، خماسية البتلات ، عادمة التويج . ثمارها حقائق لا قياسية الشكل والحجم يكثر فيها المخروطي . بذورها حادة المادة ، دقيقتها غذائي شائع الاستعمال في صناعة الماعين و علف الدواجن || . اعرف انواعه واشهرها مايتبع .

٢٨٩١٦ - نَهْشَمُ شَائِعُ * ، سَرَّازَانُ شَائِعُ ، حَنْظَلَةُ سَوْدَاةُ ، قَمَحُ الْبَقَرِ

Fagopyrum esculentum, Polygonum fagopyrum (S).
Sarrasin commun, S. ménager, Blé noir, Bucal, Carabin (F), Buck wheat, Sarrasin corn (E), Buckenweide, Echter Buchweizen (D), Saraceno, Fagopiro, Grano nero, Fraina (I).

نوع من النظم الزراعي ، ساقه منتصبه فراء . اوراقه سهية النصل ، مستطيلة الملق ، لاحقة النمد . انزاعه يبيض اللون . حقائقه مخروطية الشكل حادة الزوايا . بذوره سود . وهو سريع النمو ولادراك دورته الحياتية تستلزم من ١٨٠٠ الى ١٩٠٠ سرة تنويها ينحو ١٠٠ يوم . وهو يجمد في جميع الاثرية باستثناء القوية الاندماج الرطبة .

٢٨٩١٧ - نَهْشَمُ هِنْدِي * ، سَرَّازَانُ تَهْرِي ، حَنْظَلَةُ تَهْرِيَّةُ ، قَمَحُ الْبَقَرِ الْهِنْدِي

Fagopyrum tataricum (S), Sarrasin de Tartarie, S. de Sibérie, S. galeux, Blé de Tartarie (F), Indian wheat, Tatarian buckwheat (E), Grüner Buchweizen (D), Saraceno di Siberia (I).

نوع من النظم الزراعي العلفي . ساقه منتصبه فراء . اوراقه لنبية النصل ، امحاده مجنحة لا حاضنة . انزاعه الى الخضراء الاصفر . حقائقه رباعية الحروف مستطيلة الشكل . بذوره صغيرة حمرية سمره اللون علفية غزيرة المادة الغذائية .



٢٨٩٣٧ - نَظَاشُ مِصْرِيّ

Crotalaria segyptica (S). *Crotalaire d'Egypte* (F). *Rattle-box* (E). *Klapperhölse* (D). *Nacchera* (I).
نوع من النطاش المعمّر. جنبته مثنونة القذ، فراء الساق، صغيرة الارواق السنانية الزردية. اعطانه فسيحة الارباع، تمتد من صمرا سينا الى الحصارى المصرية.

Chromosome ٢٨٩٣٨ - نَظَاشَة ٥

هي النشبة والكرموزوم.

٢٨٩٣٩ - نَظَل، طَعَمُ المَزْدَرَع

Goût de terroir (F). *Native tang*, *Raciness* (E).

طعم خاص يعطى طعم بعض المحاصيل الزراعية كالعنب والتين فيشبهها بعض الشيء وهو يعود الى بعض عناصر التربة اللامتجانسة الدائمة.

Vin de presse (F). ٢٨٩٤٠ - نَظَل

ما يسيل من عصر العنب وقد تكون غرة اذا حسن صنعها فاشرة الصف.

Nothura (S). ٢٨٩٤١ - نُظُورَة *، نُوْظَر

Nothure (F).

جنس طير من الدجاجيات وفصيلة الزرقنات. انواعه المعروفة سبعة منتشرة في جميع بلاد امريكا الجنوبية. شكلها قريب الشبه من الفرغر. اجسامها متوسطة القد. اذنانها جذعة. اثوابها الى الصبهة المشقة والحذقة بالاسود. اعناقها وصدرها وبطنها الى الصبهة السنانية الزاهرة || قوتها الحشرات والبلذور البرية. تألف حواشي الغابات. صيدعا مرغوب فيه لانها من الطرائد السنية المستحبة الطعم.

Natica (S). ٢٨٩٤٢ - نَظِيسَة *

Natic (F). *Natica* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارباع وفصيلة النطيسيات. انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها مفترسة قوتها الرخويات والديدان || اصدافها مائلة، شبه كروية الشكل، صغيرة الغلب المحزن المذهب. اجسامها فضية الشكل، مستعرضة الاربدة، عريضة الرؤوس المبطة، ثنائية اللواس المعبوة، كبيرة الارباع || تعيش في الاسمال وعلى رمال الشطوط المغمورة بالماء.

Naticidae (S). ٢٨٩٤٣ - نَظِيسِيَّات

Naticidae (F). *Naticidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارباع وحيئات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الطباشيرية والجبورية، وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصدافها شبه كروية الشكل، صغيرة اقلعة، قصيرة الغلب، فسيحة الفوة. اسفاطها كبيرة، قرنية المادة او كلسية، توصد الفوة عند الحاجة || جميع انواعها مفترسة تقتضي عل الديدان والرخويات الصغيرة. اعرف اجناسها واشهرها النطيسية.

Alnitam ٢٨٩٤٤ - نِظَام

النظام نجم نير من كوكبة قيطس مركزة على اصل الذئب.

Statut (F). Status (E). ٢٨٩٤٥ - نِظَام، قَانُون

هو اتفاق او قانون يضمن حسن انتظام العمل.

٢٨٩٢٧ - نَظَاشُ الكُورِيل ٥

Lestoteuthis Kamschatka (S).

Lestoteuthis de Kamschat (F).

حيوان بحري مفترس رشيد الجنس والنوع من الرخويات رأسيات الارباع، مزودجات الخياشيم، عشاريات الجرامز وفصيلة الطردوسيات. اعطانه جزر الكوريل || جسمه مخروطي الشكل، كبير القد، يطول نحو خمسة امتار، زعنفته طرفيتان، كبيرتان، مزوانيتان. جرامزه عجمية، طليقة، لامتناهية الطول ونها زوج لقيف شديد الطول ينتهي برسى سنانية الشكل تملؤها حناجر وكلايب.

٢٨٩٢٨ - نَظَاشُ اخْضَر

هو القبوط الاخضر، اطليه.

٢٨٩٢٩ - نَظَاشَات

فصيلة حشرات من نمديات الاجنحة تعرف بالسلوليات، راجعها.

٢٨٩٣٠ - نِظَاق، نِظَاقُ الجَزَء

Baudrier d'Orion (F). *Alnitak* (E).

النطاق او نطاق الجوزاء ثلاثة النجم مستعرضة وباصة في وسط الجوزاء تسبها العرب النظم وهي مثل في الانتظام والالنتظام.

٢٨٩٣١ - نَظَح

الطلع نجم نير من كوكبة برج الحمل.

Notornis (S). ٢٨٩٣٢ - نَظَرْنُوس *

Notornis (F). *Notornis* (E).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة النطليقيات. انواعه المعروفة ستة انقرض خمسة منها وبقي نوع واحد يسير في طريق رفاقه. موطنه غابات نيوزيلندا وارجعها || جسمه يضاهي اجسام الحبشيات لكنه صغير الجناح، عادم الذنب، ضلع المفاذ القصير المخروطي الشكل || قوته الاعتشاب والبلذور والحبوب البرية. مسرحه عند الصباح ويقل الغروب. يعدو بسرعة فائقة ولا يستطيع الطيران || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه.

Nitre (F). ٢٨٩٣٣ - نَظَرُون

هو ملح البارود، اطليه.

Nitreux (F). Nitrous (E). ٢٨٩٣٤ - نَظَرُونِيّ

نمت تعريفي يدل على وجود النطرون، ككوك حامض نطروني وزراب نطروني.

Crotalaria (S). Crotalsire (F). ٢٨٩٣٥ - نَظَاش *

جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراسية. انواعه زهاء ٣٠٠ جميعها جنبات واعشاب برية. منهاها البلاد الحارة من المابين القدم والجديد. اوراقها واغصانها مرعوية تتلفها الماشية. ازهارها مغترية تجرورها النحل.

Crotalaria juncea (S). ٢٨٩٣٦ - نَظَاشُ البَنَغال

Crotalaire du Bengale, *Chanvriar du Bengale* (F). *Bengal hemp plant*, *Sunn hemp plant* (E). *Bengalischer Hanf* (D). *Nacchera del Bengala* (I).

نوع من النطاش يكثر في بعض مناطق الهند اخصها البنغال. ساقه اسلية الشكل يستعملون لافانها استعمال القنب.



نطروش



نطش



نظورة



نطيسية

Paranucléines (F). **نَظِيرَةُ النَّوَاتِين** ٢٨٩٦٢

Zygomycètes (F). **نَظِيرَات** ٢٨٩٦٣
مرتبة من رتبة الفطور البيضاء، أجناسها وأنواعها كثيرة
العدد تنقسم إلى فصليتين: المجففات والمغليات.

Corbillat, Corbillot (F). **نَعَاب** ٢٨٩٦٤
فرخ الغراب.

Serinus syriacus (S). Serin de Syrie (F). Syrian
canary (E). **نَعَار * ، نَعَر سُوْرِي** ٢٨٩٦٥

نوع من النفر حسن الصوت يكثر وجوده في البلاد اللبنانية
السورية. طوله نحو ١٢ سم. ثوبه ترنجبي اللون يعلوه في
ظهوره وجناحيه شمشيح اسمر. زوره وبشوشه وبلته إلى
الصغار البرتقالي المواج تملوه بقشة مستطيلة سمراء. منقاره
وهذقه عينه وسفاه سمير. || يألف الحدائق والجنان
والنباتات القريبة من الممران. يذبح عشه في الأشجار الشفاء.
اذا تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها وسدا نحو ١٣
يوماً.

Embryologie (F). **نَعَارَةٌ** ٢٨٩٦٦
Embryologie (E).

Embryologie végétale (F). **نَعَارَةٌ نَبَاتِيَّةٌ** ٢٨٩٦٧
Vegetable embryologie (E).

النعار النباتية علم يبحث في التكوين النباتي وفي المراحل
المتتابعة التي يمر بها كل نبات.

* **نَعَاسَةُ التَّبَعِ** ٢٨٩٦٨
Dicyphus minimus (S). Dicyphe minime, Punaise du
tabac (F). Suck-fly (E).

حشرة ثاقبة ماصة كربية الرائحة صغيرة القد مستطيلة الشكل
من فصيلة خاسيات الفواصل. طولهاراوح من ٨ إلى
١٠ سم. رأسها اسود اللون. زباناها خيطية مستطيلة
منمنقة إلى الوراء. ظهرها ملون وموشح بالخطي والوردي
والاسمر والاخضر والاسود. بطنها إلى السمرة العابقة.
اناثها تمتع الممكن افرادياً في وثن التصل فينقش بعد متحه
بنحو ٧ أيام عن يرقات دقيقة مرقلة تركيب التصل وتمتص
خلايا نسجها || الحشرة الكاملة تمتص عصارة قة الساق
وفصول الأوراق الخالية فتسبب لها الذبول والالتواء نحو
الأرض فتبدو كأنها عادمة الحيل لا تقوى على متابعة
شباغها ودورتها الحياتية || أضرارها قد تكون جسيمة اذا
اعترت الشتل في زمن الشباغ. تكافح عند الحاجة باستعمال
أحد الحواشير النافذة الذي يؤثر في أعصاب الحفم.

٢٨٩٦٩ - **نَعَاعَةٌ** بقلة ناعمة كالناعمة. ج نعام.

٢٨٩٧٠ - **نَعَام ، نَعَام**

النعام أو النعام منزل من منازل القمر البائية. وهي ثمان
كواكب على اثر الشولة. اربعة منها في الهجرة وهي النعام
الواردة لانها شرعت في الهجرة كأنها تشرب. واربعة خارجة
عن الهجرة وهي النعام الصادرة كأنها شربت ثم صدرت ||
رقيب النعام يدعى الهنعة.

٢٨٩٧١ - **نَعَامَات**

النعامات خمسة نجوم من كوكبية يقطس مركزها في اواسط
البذن.

Régime (F). **نِظَام ، أُسْلُوب** ٢٨٩٤٦
Rules, Regulation (E).
مجموعة القواعد المفروضة أو المتبعة.

Système (F). System (E). **نِظَام** ٢٨٩٤٧
مجموعة عقائد أو مبادئ مرتبطة بشكل مذهب أو اعتقاد
خاص.

٢٨٩٤٨ - **نِظَامُ الاسْتِغْلَال ، طَرِيقَةُ الاسْتِغْلَال**
Système de culture (F). Cultivation system (E).
الطريقة التي يتبعها المزارع في استغلال ارضه.

٢٨٩٤٩ - **نِظَامُ الاسْتِزْنَاك**
Exploitation patronale (F). Sweating system (E).
هي المضاربة التي ترمي الى خفض اجور العمال حتى الحد
الادنى.

٢٨٩٥٠ - **نِظَامُ الْأَمْثَالِ الْعَامَّةِ**
Domainialité publique (F). Public property (E).
نظام قضائي خاص سنّ للاعمال العامة.

٢٨٩٥١ - **نِظَامُ الْحَصْرِ**
Régie (F). Stewardship (E).

ادارة الاعمال وحصرها وتوجيهها توجيهاً اقتصادياً صحيحاً.

٢٨٩٥٢ - **نِظَامُ الْمَطَر ، مَنَاجِنُ الْأَمْطَار**
Régime des pluies (F). Rain regulations (E).
كيفية الاطوار المحلية وكيفية توزيعها على مختلف شهور
السنة.

٢٨٩٥٣ - **نِظَامُ التَّعَابُكَات**
Syndicalisme (F).
Syndicalism (E).

٢٨٩٥٤ - **نِظَامُ دَوْرِي**
Système circulaire (F).
Circulation systemic (E).

نظام دورة الدم في المجموعة الوعائية الجسدية.
٢٨٩٥٥ - **نِظَامُ عَيْشِي**
Statut réel (F).
Real status (E).

صفة تقليدية تدل على القانون الذي يعالج موضوع الاموال
المنقولة منفردة.
٢٨٩٥٦ - **نِظَامُ وَرَقِي**
Foliation

النظام الورقي هو الشكل الترتيبي الذي يتخذ الورق
على الفصن. ويدعى الارياق.
٢٨٩٥٧ - **نَظَرِيَّة**
Théorie (F). Theory (E).

مذهب علمي او علم نظري لا علمي.
٢٨٩٥٨ - **نَظَرِيَّة**
Théorème (F). Theorem (E).

قضية يطلب برهانها.
٢٨٩٥٩ - **نَظَرِيَّةُ الطَّوَرِئ**
Théorie de l'imprévision (F).

٢٨٩٦٠ - **نَظْم**
النظم ثلاثة انجم من الجوزاء تدعى النطاق ، راجع نطاق.

٢٨٩٦١ - **نَظِير ، نَظِيرِ السَّمْت ، سَمْتُ الْقَدَم**
Nadir
نقطة السماء التي تحت قدمي الراصد وهي تقابل سمت الرأس.



نعار



نعاسة التبغ



نعام



نمبول باشا



نمرة البقر



نمرة المائي



نمرة المزن



نمرة سوداء



نمرة مزعجة

٢٨٩٧٩ - نمرجة

Brebis (F). Ewe (E).

أنثى القسان منذ اجتيازها الشهر الخامس عشر من عمرها أي من وقت صلاحها للسفاد .

٢٨٩٨٠ - نمر

Tabanus (S).

Taons (F). Gadflies (E).

جنس حشرات من النمرات. أنواعه عديدة ، ذكورها تعيش على ريق الازهار ، أنثاها تعيش على ما تحته من دم وهي تلص الحيوان ولا تنف عن الانسان ، وبعضها ينقل مرض الدباب في الابل الى الخيل فيبعضها . الواحدة منها تدعى نمر . اعرفها واسمرها ما يلي .

٢٨٩٨١ - نمرعة

Embryon d'animal (F).

Animal embryo (E).

٢٨٩٨٢ - نمرعة البقر

Tabanus bovinus (S).

Taon des bœufs (F). Ox-fly (E).

ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١٨ الى ٢٥ سم . ثوبها الى السرة . صدرها وساقها صفر . ارسافها سود . يكثر وجودها في فصل الصيف والخريف . أنثاها تنمى على البقر والخيول والحير .

٢٨٩٨٣ - نمرعة المائي

Chrysops caecutiens (S). Taon aveuglant (F). Horse-fly, Breeze fly (E).

ذباب صغيرة من النمرات ، طولها يراوح من ٦ الى ١٠ سم . خطها قصير القد . عويناتها خضر يعلوها موج ذهبي لامع . أنثاها تنمى على الخيل والحير والبقير ولا ترتد عن مائها .

٢٨٩٨٤ - نمرعة المزن

Chrysosona pluvialis (S). Taon pluvial (F). Cleg (E).

ذباب صغيرة من النمرات ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . عويناتها خضر النصف الاعل ، زرق النصف الاسفل . يكثر وجودها من حزيران الى اواخر ايلول . أنثاها تنمى على جميع الدواب وتقتحم الانسان .

٢٨٩٨٥ - نمرعة سوداء

Tabanus morio, Pangonius micanus (S). Taon noir (F).

ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم . ثوبها اسود اللون ، زباناها الى الصفة ، خطها مستطيل المنك . يكثر وجودها من حزيران الى تموز .

٢٨٩٨٦ - نمرعة مزعجة ، نمرعة الربيع

Tabanus bromius (S). Taon bryant (F). Gadfly (E).

ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١١ الى ١٥ سم . ثوبها اسمر اللون مبقع بالاسود . مقدمها اغبر . عويناتها الى الخضر المشع بالاحمر . يكثر وجودها من ايار الى حزيران . ذكورها لا تفارق ازهار الخيميات . أنثاها تقتحم جميع الحيوانات ولا تنف عن الانسان .

٢٨٩٨٧ - نمرات

Tabanidae (S). Tabanidae, Gadflies (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من الذباب الكبير . اعطائها مستطيلة ، احاطها ثاقبة ماصة ولاعة . قروها الاستعمارية لذاتة الفواصل . عويناتها كبيرة القد ، متصلة في الذكور ، مفترقة متباعدة في الاناث . اجنحتها غشائية التركيب شفافة . ذكورها تعيش على مثر الازهار وداعة الانجار

٢٨٩٧٩ - نمرعة ، نمرعة

Struthio camelus (S). Austruche (F). Ostrich (E).

طائر من العوادي وحيد الجنس والنوع من فصيلة النعاميات . اسم الجنس نعام والذكر ظليم والانثى ربداء وقلوص والصغير ربال والجماعة بنات الحق وعود . وكنتها ام البيض . صياح الظليم يدعى عرادا وصياح القلوص زبارا . || تعتبر النعام اكبر واضخم الطيور المعاصرة . تملو نحو ٢٦٠ سم . والذكر ارفع من الانثى . ريشها ناعم مبدل متباين . لونه يراوح من الاسود القاتم الى الرمادي فالابيض ثم البني . عنقها منتصب مستطيل ، عادم الريش ، كثيف الزغب الاغفر ، ينهي برأس صغري القد وسنقار مفلطح . ساقها قويان رفيضان تساعدها على العدو السريع . يبعضها كبير القد ، عاجي اللون ، اصفر المراج ، وزن الواحدة منه ١٤٥٠ كغ . قوتها الاشباب والبقول والصبان والبلور والحبوب والبار والخرشا والعفاء البع ... || تدن في اخصوس من الرمل قنره ١٠٠ سم . وعقته ٣٠ تضع فيه من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر من ٤٢ الى ٤٨ يوما .

٢٨٩٧٣ - نمرعة امريكية

Nandou (F).

هي الروحاء ، اطباها .

٢٨٩٧٤ - نمرامى

Vent du sud (F).

South wind (E).

النعامى ريح الجنوب لانها ابل الرياح واربطها .

٢٨٩٧٥ - نمراميات

Struthionidae (S). Struthionidae (E).

فصيلة طير من رتبة العوادي ، اجناسها المعروفة ثلاثة النعام والروحاء والامو . جميعها سريعة العدو ، كبيرة القد ، مستطيلة العنق الدقيق الازغب الريش . ارسافها رفيعة قوية تقبى باصبعين او بثلاثة اصابع . اجنحتها صغيرة ضيقة لا تمكنها من الطيران . ارسافها رهلة متهدلة لا مباسكة . تعيش من ٢٥ الى ٣٥ سنة . موطنها المناطق الحارة من افريقية وامريكية واستراليا .

٢٨٩٧٦ - نمبول

Spilornis (S). Buse huppée (F).

جنس طير من السقاوات وفصيلة الصقريات . انواعه عديدة جميعها من اوابد المناطق الحارة . اجسامها ريمة ، انواها مختلفة الالوان التركية . تتميز برومها المنحوتة بكشفة قنينة الارتكاز . || تعيش في الجبال الجرداء وفي القيات الفاحشة . قوتها القروام والزحافات والافاعي والحشرات . اشهر انواعها نمبول باشا .

٢٨٩٧٧ - نمبول باشا

Spilornis bacha (S).

Buse huppée bacha, Bacha (F).

طائر من النمبول ، طولها نحو ٦٥ سم . وريسلته ١٥٠ سم . ثوبه اطحل اللون ، عاقب الظهر والسقط ، اغبر البطن ، يعلوه توشم ابيض مستدير . كشته ببيض الانتشاب سوداء الطوف . حدقة عينه جزوية اللون . مخالبه صفر ، منسر ازرق اللون اغبر المواج || موطنه قسم الارباء بين من افريقية الجنوبية الى الشرقية فاهند فالصين . يدن وكته في شخايف الصخور الناتئة ، اثناء تقص من رفة الى ثلاث رفات تحضنها وسدها نحو خمسة اسابيع .

٢٨٩٧٨ - نمبول

النمبول هو الذئب : الذكر من الصباغ .

٢٨٩٩٥ * **نُعْلُول** Otiorynchus (S).
Otiorynchus (F). Weevil, Broad-nosed weevil (E).
Schwarzer Rüsselkäfer, Dickmaulrüssler (D).

جنس حشرات رابطة من فصيلة البوسيات. أنواعه عديدة، أعطانها العالم أجسامها صغيرة القد. رؤوسها وأنتاكها مستطيلة. قرونها الاستشعارية مكبرة منفرجة الزوايا تنتهب في مقدمة المتناك. أعناقها صلبة. سيقانها مسنة. أرسافها رباعية. ألوانها تراوح من الخشن إلى الأسود. قشائرها دقيق السهف والحلب تملؤا أحاديدي وتزايو في مختلفة. جميعها تسرح في الليل وترقد في النهار. رقاتها تعيش في التربة على المواد العضوية ومنها تقضم الجذور كما هو الحال في نملول السكك. || أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٢٨٩٩٦ * **نُعْلُول أَحْمَر السَّاقِ** Otiorynchus lugdunensis (S). Otiorynchus à pattes rouges (F).
نوع من النملول، مرتمه الاشجار المشرفة ومشاكلها. يكثر في المناطق الجبلية. طوله يراوح من ١٠ إلى ١٤ سم. ثوبه إلى السواد اللامع. سيقانه حمراء اللون. قشائرها عديم السهف، عشاري الاخاديد. || يسرح في الليل. قوته النملول الأوراق وأشهرها ما يلي.

٢٨٩٩٧ * **نُعْلُول الزَيْتُون** Otiorynchus cribricollis (S). Otiorynchus de l'olivier (F).
نوع من النملول، مرتمه الاول شجرة الزيتون ثم الدراق والوز. طوله يراوح من ٧ إلى ٨ سم. جسمه يضيي الشكل. ثوبه إلى السمرة السوداء. متكه مخروطي قصير. زبائنه مستطيلة منفرجا الزاوية. سكبته رافعة الطرف. مقدم جوشه بالغ التحصين. قشائرها عشاري شديد. اخاديد مبهدة الحروف، منتظمة التقيط. || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية يلتهمها بشراهة.

٢٨٩٩٨ * **نُعْلُول السَّكِك** Otiorynchus rugosostriatus (S). Otiorynchus des cyclamens (F).
نوع من النملول. مرتمه الورد وبعض نباتات الزينة. طوله يراوح من ٦ إلى ٧ سم. ثوبه إلى السمرة السوداء. زبائنه إلى الجؤوة. متكه يبدو كأنه استطالة الرأس. ظهرانه كثير التحديد الطولي، كثيف الركيات السهفية، مبهر اللمل || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية. اذاه الاكر يأتي ن رقاته التي تعيش في التربة وتلتهم جذور السكك فتفشي عليه.

٢٨٩٩٩ * **نُعْلُول الكاشن** Otiorynchus ligustici (S). Otiorynchus de la livèche (F). Lovage weevil (E). Liebstöckelrübler (D).
نوع من النملول، مرتمه الكاشن والتفل ومعظم القرنيات وبعض الاشجار المشرفة. طوله يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. ثوبه إلى السمرة الريداء. متكه استطواني الشكل. مقدم جوشه منتظم التحصين. ظهرانه سهي القشار، متين المخطوط || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية.

٢٩٠٠٠ * **نُعْلُول الكَرْمَة** Otiorynchus sulcatus (S). Otiorynchus de la vigne (F). Vine weevil (E). Gefurchter Lappenrübler (D).
نوع من النملول، مرتمه الكرم ولا يفت من الاشجار الشجرة والخرجية. طوله يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. جسمه

الخردشة والثار الناضجة المطبوقة. اما انثاها فتقوتها قوت الذكور يضاف اليه الدم الذي تمتصه من الحيوان لانها لا تستغني عنه في تكوين المكن. مكنتها وشي الشكل تمتصه الاثان صفوفا متتابعة متراسة فينتف بعد متحه بمدة وجيزة تراوح من ٢٤ إلى ١٢٠ ساعة || رقاتها دودية الشكل، غبراء اللون او صفراء. يملؤها تجذيع اسود وهي تعيش في الماء والثريل والوسل والرمال الرطبة والاعبال الكيفية المنحلة.

٢٨٩٩٨ * **نُعَصَّة** Fagne (F). Upland moss-hug (E).
هي الارض الرطبة كثرت اعشائها الطوية التي تترادها الهم.

٢٨٩٩٩ * **نُعُص** Flacourtia (S). Flacourtie (F).
الوحيدة نصفة. جنس اشجار ونجيرات برية وزراعية من فصيلة النصفيات. انواعه المعروفة ١٢ مهدا الهند وسائر بلاد الشرق. جلدها معتدلة السوق. اغصانها فارشة. اوراقها متعاقبة. انزعارها ثنائية المسكن. انزعارها سنبل التجميع، تاجي الازنكاز. ثمارها مأكولة، كرزية الشكل صغيرة القد، كثيرة العدد، تتوال نحو ثلاثة اشهر. اعرف انواعه وأشهرها ما يلي.

٢٨٩٩٠ * **نُعَصَّة سَرَحَة** Flacourtia inermis (S). Flacourtie inermis (F). Lovilovi (E).
نوع من النعص، شجرته تملو من ٤ إلى ٥ اثار. ساقها اغصانها سرسة. ثمارها كرزية الشكل ولقد تتوال من ٨ إلى ٩ اشهر، لونها إلى الحمرة الزاهية، سوقها قليل الحموصة، غزير العصارة، يؤكل ويربب.

٢٨٩٩١ * **نُعَصَّة مَدْعَسَكِر** Flacourtia ramontchi (S). Prunier de Madagascar, Ramontchi, Marronne (F). Governor's plum, Madagascar plum (E). Achte Flacourtie (D). Pruno del Madagascar (I).
نوع من النعص، جنبته تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها سرسة. اغصانها فناء قليلة الشوك. ثمارها كروية الشكل قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى الجؤوة اللامعة، سوقها مستحب الحموصة يكثر استعمالها في المربيات. لحاء ساقها حولي القلافة. قلعه دباغي المادة شائع الاستعمال.

٢٨٩٩٢ * **نُعَصَّة هِنْدِيَّة** Flacourtia cataphracta (S). Flacourtie de l'inde, Prunier malgache, P. de l'inde (F). Indian plum, Rumeala plum (E). Flacourtie (D). Pruno d'india (I).
نوع من النعص شجرته تملو من ٥ إلى ٦ اثار. ساقها اغصانها شائكة. انزعارها صغيرة القد فتستقي اللون. ثمارها غروخية الشكل، كشمشية القد، كرزية اللون، جامدة السوق، ظاهرها الحموصة، تستعمل قريبا، قلافة لحاء سوقها اغصانها دباغية المادة.

٢٨٩٩٣ * **نُعُصِيَّات** Flacourtiaceae (S). Flacourtiacées (F). Flacourtiaceae (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القعالات. اجناسها وانواعها عديدة، منها الاشجار والشجيرات، معظمها بري وبعضها زراعي مأكول الثار. || اشهر اجناسها النعص والايبريه والعطر والمرجانية والريسة.

٢٨٩٩٤ * **نُعَصَّة** هي المقدة الفاسدة في اللحم.



نملول احمر الساق



نملول الزيتون



نملول السكك



نملول الكاشن



نملول الكرمة

مَهَا بَيْضِيَّة وَالْوَسْطَى قَلْبِيَّة وَالْعَالِيَا رَحْمِيَّة مَدْبِيَّة أَوْ مَقْطُونَةٌ الطَّرَف . نَصْلُهَا نَاشِرُ الْأَعْصَاب ، قَلِيلُ الْخَمْل ، أَزْهَارُهُ سَبِيلِي التَّجْمِيع ، طَرَفِي الْأَرْتَاكَاز . أَزْهَارُهُ مَرْتَاكِبة ، لَبْدَةٌ ، حَمْرَاءُ اللَّوْنِ || أَوْرَاقُهُ وَأَزْهَارُهُ لَيْمُونِيَّةُ الْعَرَف . نَقِيشُهَا يَطُورُ الْمَعْدَةَ وَيَذْهَبُ بِالْمَفْسِ || تَنْوِيرُهُ يَسْتَمِرُّ طَوَالَ فَصْلِ الصَّيْف .

٢٩٠١٩ - نَعْتَع مُسْتَدِيرُ الْوَرَقِ

Mentha rotundifolia (S). *Menthe à feuilles rondes* (F).

نوع من النعنع البري المبدول . ساقه منتصبه زبده متقاربة الفروع تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقه شبه مستديرة . نصلها ناشر الأعصاب ، رافخ السنج المنممع ، خلي الصفحة السفلى || أزهاره سبيلي التجميع ، طرفي الارتكاز . أزهاره كثيرة العدد غيراء اللون صفراء المواج || تنويره يستمر من تموز إلى أيلول .

٢٩٠٢٠ - نَعْتَعَة

Jabot (F). النعنة هي الحوصلة ، اطلبها .

٢٩٠٢١ - نَعُور

النعور هي الريح التي تواجلك ببرد وأنت في حر أو بحر وأنت في برد .

Croasement (F). *Croaking, Cawing* (E). هو صوت الغراب ويدعى أيضاً زعيب .

٢٩٠٢٣ - نَعِيم

نعم وصليب الجنوب اسمان لكوكبة نجوم واحدة مركزها الجنوب . اطلب صليب الجنوب .

٢٩٠٢٤ - نَعِيم

هو الأغبرانتوس ، اطلبه .

٢٩٠٢٥ - نَعِيمَة

هي السج ، اطلبه .

Pedionomus (S). *Pédionome* (F). **نَعَاش**

طائر وحيد الجلس والنوع من فصيلة النعويقات . واحده نعاشة . وهي سفيرة الجفنة طويلاً نحو ١٧ سم . ثوبها الى الصهبة يعلوها تأذير وتوشم اصفر واجر واسود . رأسها مخطط بالاحمر || قوتها الحبوب والحشرات . تألف الاساكن القليلة الاشجار ، الكثيرة الشب العالي || تنثر في الخوص تدبره بين الاعشاب . تعيش من ٨ من ١٠ بيضات تحضنها سعدوا نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٠٢٧ - نَعَاض *

Meconopsis (S). *Méconopside, Méconopsis* (F). *Flaming poppy, Wind poppy* (E). *Mohling, Mohn-gescht* (D). *Papavero cimbrico, Meconopsis* (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة النعواشيات . انواعه عديدة ، اعطائها العالم ، معظمها بري وبعضها تربي . سوقها منتصبه . اوراقها كاملة او مفرصة . أزهارها مستحبة . منها الاصفر والازرق والبنفسجي . عصارها لبينة دقة صفراء اللون جعالية المادة || اعرف انواعه واهمها ما يتبع .

٢٩٠٢٨ - نَعَاض رَفِيع

Meconopsis grandis (S). *Méconopside élevée* (F). نوع من النعناض المعمر . ساقه مزينة بالحاء منتصبه تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه ضمية التجميع طرية الارتكاز

٢٩٠١٣ - نَعْتَع بَرِّي * ، ظَفِيرَة ، ظَفَرَاء

Mentha sylvestris (S). *Menthe sauvage, M. sylvestre* (F). *Wild mint* (E). *Wilde Minze* (D). *Mentastro, Menta salvatica* (I).

نوع من النعنع البري الشائع الاستعمال الطبي . ساقه فروع تملو من ٢٥ إلى ٥٠ سم . أوراقه اهليلجية ذرية نصلها ناشر الأعصاب غايق الخصار يطول من ٢ الى ٣ سم . أزهاره ضمية التجميع ابطية الارتكاز فواحة العرف الاخاذ .

Mentha crispa (S). *نَعْتَع جَعْدِي*
Menthe crépue (F). *Curled mint* (E). *Krause Minze* (D). *Menta crispa, Mentone* (I).

نوع من النعنع البري المبدول . ساقه منتصبه متباعدة الفروع الزبده تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . أوراقه اهليلجية الشكل ، نصلها ناشر الأعصاب متممع الصفحة المشارة الحافة || أزهاره سبيلي التجميع طرفي الارتكاز . أزهاره صغيرة ، دقيقة ، غيراء اللون يعلوها مواج ليكي || تنويره يستمر من تموز الى أيلول .

٢٩٠١٥ - نَعْتَع زَرَاغِي * ، نَعْتَع بُسْتَانِي

Mentha piperita (S). *Menthe poivrée* (F). *Peppermint, White mint* (E). *Pfefferminze, Pfeffer-Wassermünze* (D). *Menta prima, M. peperina, M. pepe, M. piperita* (I).

نوع من النعنع الزراعي البقي الشائع الاستعمال . ضروره المشهورة لثلاثة : الحزني والابيض والاسود . سوقها متوسطة الانتصاب فروع تملو من ٣٠ إلى ٩٠ سم . اوراقها معتقة . اذنية ، لاطلة الاذنيات . نصلها سنانية الشكل ، مديبة العقصة ، ناشرة الأعصاب ، مبعرة الزغب ، عايقة الخصار ، خشنة للمس . أزهارها سبيلي التجميع طرفي الارتكاز . أزهارها وردية اللون او بيضاء || مادته الفعالة تنبه المعدة وتقدر الأعصاب وتفتح الانتفاخ وتقيد الصدر وتقضي على البلغم .

٢٩٠١٦ - نَعْتَع صَعْتَرِي ، نَعْتَع يَابَانِي

Mentha arvensis (S). *Menthe des champs, M. du Japon, Pouliot thym* (F). *Corn mint, Field mint* (E). *Feldminze* (D). *Menta campestris, M. coltivata* (I).

نوع من النعنع الزراعي المشهور مهد اليابان . ساقه منتصبه فروع تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . فروعها متراكبة جلفة . أوراقه اهليلجية الشكل تطول من ٤ الى ٩ سم . نصلها خلي الصفحة ، ناشر الأعصاب ، سنن الحافة . أزهارها وردية اللون ، ابطية الارتكاز ، ضمية التركيب ، صيوانية الشكل || يزرع لاستقطار المتول .

Mentha canadensis (S). *نَعْتَع كَنَدِي*
Menthe du Canada (F).

نوع من النعنع الصناعي يزرع لاستقطار عطره . مهد كندا وهو يزرع في جميع الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الباردة . ساقه فروع تملو من ٢٥ إلى ٧٥ سم . أوراقه معتقة سنانية الشكل . نصلها زغب البشره ، ناشر الأعصاب ، سنن الحافة ، يطول من ٥ الى ٨ سم . ويعرض من ١٢ الى ٢٥ سم . || أزهارها وردية اللون ، ضمية التجميع ، ابطية الارتكاز || يزرع ويحوي في جميع الاربية الفنية الرطبة المتوسطة الاندماج . يستقطر عطره من الوراق والازهار .

Mentha citrata (S). *نَعْتَع لَيْمُونِي*
Menthe citronnée (F).

نوع من النعنع التريبي . ساقه فروع مستقيمة تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . أوراقه معتقة لا نظامية الشكل ، السفلى



نعنع بري



نعنع زراعي



نَعَاض

٢٩٠٣٥ - نُغَاصُ وَلِيْش (S). *Meconopsis wallichii* (S).
Méconopsidé de Wallich (F).

نوع من النغاص المحول . ساقه فروع متشعبة تعلو من ٨٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه ملتصقة ريشية مخزومة . ازهاره زرقاء اللون متدلية ، قطرها براوح من ٣ الى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة رباعية الحروف النافرة المحددة الجانب || ساقه وفروعها مزينة البهاء ، زغبها هليبي الشكل اسمر اللون ، عديم الصلابة || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٠٣٦ - نُغَاصَات (F). *Amiboides* (F). *Amazoboida* (E).

رتبة كائنات حيوانية دينا من الجليات .

٢٩٠٣٧ - نُغَاصَة (F). *Amibe* (F).

هي الاسب ، اطلبه .

٢٩٠٣٨ - نُغَاف (F). *Hypodermose* (F).

مرض يحدث نفث النبر في الخيل والبقر والضأن .

٢٩٠٣٩ - نُغَاف * ، أَم شِقُونَة (F). *Buphaga* (S). *Buphage*, *Pique-bœuf* (F). *Beefeater*, *Ox-pecker* (E).

جنس طير من فصيلة الزروريات ، انواحه قليلة . طوله براوح من ٢٤ الى ٢٧ سم . راسه وعنقه وصدره وبطنه وظهوره الى الجؤرة . سقاطه وذنبه الى السرعة المايقة . زكاه الى الصهبة . منقاره غليظ الشكل والقذ ، اصفر القاعدة والجسم ، احمر الملتقط . عيناها الى الحمرة الجؤرية ، رساه ومخالبه سمر || يعيش برقة الحمر والمخبرات من ابقار وابل وغنمها يلتقط ما عليها من قراد وذباب ويستأسل من جلودها النبر والتلف وما اشبه .

٢٩٠٤٠ - نُغَب (F). *Turnix* (S).

نغب الطائر : حسا من الماء ما يكفيه .

٢٩٠٤١ - نُغُبُون * (F). *Turnix* (S).

جنس طير من فصيلة النقبونيات ، انواعه قليلة العدد ، جميعها صغيرة القذ طويلا براوح من ١٦ الى ١٨ سم . اثلوها الى الصهبة المايقة الموشمة والمؤذرة بالاصفر والاسود . رؤسها موشمة بثلاثة خطوط صفر || اناته تدن بين الاشباب والادغال ترصع افاحيصها بالخليش . ينقص من ١٠ الى ١٥ بيضات مخضها وحدها نحو ثلاثة اسابيع || قوته الحبوب والحشرات على اختلاف انواعها وانخصها التسل . يألف اللياني والاراضي المنحاة || اعرف انواعه واشهرها النقبون الافريقي والنقبون القتال .

٢٩٠٤٢ - نُغُبُونِيَّات (F). *Turnicidae* (S).

فصيلة طير من رتبة الدجاجيات . اجناسها خمسة . شكلها بين الحجل والحبارى . تتميز بشفة امتار والرقاق . باستطالة قوادم السقط وبقصر الانثى || اجناسها خمسة : النقبون والتنبور والحقم والشونس والتناش .

٢٩٠٤٣ - نُغُبُون (F). *Trachycarpus* (S).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة النخلات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جذوعها اسطوانية مستقيمة تعلو من ٥٠ سم . الى عشرة امتار . اوراقها مستطيلة الزناد ذرفية الشكل او مرسية قطرها براوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . لونها الى الخضار الالامس الازرق الموج يعلو بمشبع فضي .

يعلوها ازهار مركب من ثلاثة ازهار جؤرية اللون سباعية او تساعية البتلات قطرها براوح من ٨ الى ١٠ سم . تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٢٩ - نُغَاصُ شَائِك (S). *Meconopsis aculeata* (S).
Méconopsidé épineuse (F).

نوع من النغاص الممر . ساقه شائكة منتصبة تعلو نحو ٦٠ سم . شوكها هربي الشكل ذرب الحمة . اوراقه قليلة الشكل ، كبيرة القذ ، خاسية التفصيص . ازهاره ارجوانية اللون ، صفر الاسدية ، متوسطة القذ ، قطرها نحو ٥ سم . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠٣٠ - نُغَاصُ عُقُقُودِيَّ (F). *Meconopsis racemosa* (S).
Méconopsidé à grappes (F).

نوع من النغاص الممر . ساقه شائكة منتصبة تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه كاملة عادمة التشرم . نصلها الى الخضار الاسفر الموج . ازهاره عقنودي التجميع . ازهاره بنفسجية اللون قطرها براوح من ٣ الى ٤ سم . بتلاتها لا نظامية التركيب والبد الذي براوح من ٥ الى ٨ || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٣١ - نُغَاصُ كَامِلِ الْوَرَق (F). *Meconopsis integrifolia* (S).
Méconopsidé à feuilles entières (F).

نوع من النغاص المحول . ساقه منتصبة تعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم . فروعها متباعدة لا منتصبة . زغبها هليبي الشكل ، اسمر اللون ، متوسط الصلابة . اوراقه سنانية النصل مستطيلة . ازهاره صفراء اللون ، مزدوجة البتلات ، كبيرة القذ ، قطرها براوح من ٧ الى ١٥ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٣٢ - نُغَاصُ كَمْبَرِي (F). *Meconopsis cambrica* (S).
Méconopsidé de Cambrie (F).

نوع من النغاص الممر . ساقه فروع متشعبة تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه ملتصقة ريشية مخزومة . ازهاره متوسطة القذ تعرض من ٣ الى ٤ سم . تيلو كبريتي الصفار ثم تنحرف نحو البرتقالي . ثماره حفية الشكل . حقاقة صقية ، مستطيلة . رباعية الحروف الحادة ونها سداسية . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٠٣٣ - نُغَاصُ مُشْتَرَم (F). *Meconopsis sinuata* (S).
Méconopsidé sinuée (F).

نوع من النغاص الحولي . ساقه شائكة منتصبة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . فروعها متباعدة لا منتصبة . اوراقه لا قياسية التفصيص والتشرم ، نصلها كبر القذ عابق الخضار . ازهاره عقنودية التجميع ، زرقاء اللون ، رباعية البتلات ، قطرها براوح من ٥ الى ٧ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٣٤ - نُغَاصُ هَاتِك (F). *Meconopsis heterophylla* (S).
Méconopsidé à feuilles variables (F).

نوع من النغاص الحولي . ساقه فروع متشعبة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه لا قياسية التفريغ والتشرم . ازهاره جراء اللون ، قطرها براوح من ٤ الى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة سداسية الحروف النافرة || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .



نغاف



نقبون

قليلة العدد . جميعها وسيدة الجبل الحولي . تظهر في أوائل الربيع ثم تمتع مكانها الذري على نصال ومدايق بعض النباتات المرصودة فينتف عن رقات تقضي على الأوراق . أشهرها نغريل الفصّة .

٢٩٠٥٣ - نَغْرِيلُ الْفَصَّة ٥

هو سويد الفصّة ، الحليّة . (F). Négril de la luzerne

٢٩٠٥٤ - نَغْضِيَّات
Gymnoscaecae (S).
Gymnoscaecae (F). Gymnoscaecae (E).
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزئيات تتميز بأوراقها المرعاطة . أجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاث فصائل : الخثرات والمجيدات والوقسيات .

٢٩٠٥٥ - نَغْفَة

Varon (F). Bot, Bott (E).
برقة الثبر أي دموعه . ج نف . تنف على ظهور الخيل والأبال واليقر التي تلحسها وتنقلها بالسنبا إلى افواها فحلقها فامساها حيث تستقر بعض الوقت ثم ترق مع النسج إلى الجلد أو تمكث بين طيات المدة إلى أن تخرج مع الروث .

٢٩٠٥٦ - نَغْل
Hybride (F). Hybrid (E).
هو في الحيوان من كان أبوه من غير جنس أمه كالبل الذي يتولد من الحمار والفرس .

٢٩٠٥٧ - نَغْغ

Crétillon (F). Comb (E).
سن عرف الديك .

٢٩٠٥٨ - نَغِيْظَةُ ٥ ، سَبْثَوِيَّة ٥
Septoria (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السبثيات . يكتسبها كروية أو بيضية تنشأ محصورة في الطبقة الادمية . منها شارب الاذنكاز . جوبا مثل النسج دقيقة . بويغها مستطيلة أو عيطية . مستقيمة أو منقطة ، شفافة ، شفعية الانقسام المرضي . تحمله البؤرة ٥ ٥ أنواع عديدة . قدرها نحو ٩٠٠ منها سيحودة لا ضرر فيها ومنها مؤذية وبعضها شديد الاذى . أشهرها ما يلي .

٢٩٠٥٩ - نَغِيْظَةُ الْأَزْلِيَّة ٥ ، نَغِيْظَةُ الْجُلْسَان ٥

Septoria azalae (S). Septoriose de l'azalée (F). Leaf scorch (E).

فطر مجهرى يركب الأوراق الفتية عند قاعدة عروقها الأولى فيسبب احمرار النسج وإسمرار ثم ييبس ، فتسقط الأوراق ويشتو النبات . وقد يكون أذاء شديداً فيؤثر على النمو ويمنع الإزهار ٥ ٥ يكافح عند ظهوره بمركبات النحاس أو الزنك ويحرق الأوراق الساقطة لأنها تحافظ على بوع الفطر .

٢٩٠٦٠ - نَغِيْظَةُ الْأَقْحُون ٥

Septoria callistophi (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق معظم أنواع الاقحوان الزراعي فيعطب النبات ويؤثر في نموه وإزهاره ٥ ٥ مظهره الخارجي يقع لاقياسة الشكل والحجم تركيب نصل الأوراق بين الاعصاب والورق . تبدو حنطية ، غبراء اللون ثم تحبل نحو البصرة التي يعقبها اليباس والانحطاط . يكافح بقتلاع النباتات الموصية وبطحن التربة بالكلس أو بسلقات النحاس .

٢٩٠٦١ - نَغِيْظَةُ الْبُرْتَقَال ٥ *

Septoria tibia (S).
فطر مجهرى عادم الاذى يركب البرتقال والخامض واليوسني

كرها شالك الحافة ، شوكه صلب النسج ، حاد الحمة . ثماره عذقية التجميع ، عنبة الشكل والقذ ، ليفية اللباب الناشف اللاماكل ٥ ٥ والنغول يعيش أبنا زرع وفي أي ربة كانت شرط لا تنخفض الحرارة الدنيا عن ثلاث درجات مئوية . ٥ ٥ اعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٩٠٤٤ - نَغْبُولُ أَزْعَب

Trachycarpus nana (S).
Palmier à tige rudimentaire (F).
نوع من النغبول الزبني السبروتي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية قصيرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . أوراقه دقيقة الشكل لامعة النصل الاخضر اللامس . ثماره جزؤية اللون ، عنبة الشكل والقذ ٥ ٥ وهو يعطي النمو ، جميل الشكل ، يزرع في المراكن والحدائق .

٢٩٠٤٥ - نَغْبُولُ الْفَيْب

Trachycarpus excelsa (S). Palmier à fibre, Palmier-chavre (F). Fibre palm (E). Faserpalme (D). Palma de fibra (I).
نوع من النغبول السبروتي الصناعي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية رفيعة تملو نحو ١٠ أمتار تطوقها شياك من ليف متركبة الحياك حنطية اللون . أوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم . وزنادها يطول نحو ٥٠ سم . ٥ ٥ ثماره عنبة الشكل والقذ لونها الى الزرق العايق ٥ ٥ اللياف مرغوب فيها تستعمل في صناعة الاكياس والحبال .

٢٩٠٤٦ - نَغْبُولُ خَرْبَازَا

Trachycarpus khasiana, T. martiana (S). Palmier de Martins (F).
نوع من النغبول السبروتي الزبني . ساقه ناشرة الخيد ، مبصرة الالياف الرطبة ، تملو من ٣ الى ٥ أمتار . أوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وزنادها يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . نصلها عابق الخضار اللامس يطلو بمشيع فضي . ثماره عنبة الشكل والقذ لونها الى الصفار البرتقالي .

٢٩٠٤٧ - نَغْث

Aune (F).
هو المثلث ، الحليّة .

٢٩٠٤٨ - نَغْر

Pycnonote (F).
هو اللبل ، الحليّة .

٢٩٠٤٩ - نَغْر
Serinus (S). Serin (F). Canary (E).
نفرج . نغران . جنس عصافير غريسة من فصيلة الشرشوريات . أنواعه عديدة جميعها صفيرة القد . اثوابها الى الصفرة والصفرة الترفيعة والموشة . جميعها تألف النقص وتفتيس ادب التفريد ٥ ٥ أشهر أنواعه النفر الكناري المعروف بالكناز .

٢٩٠٥٠ - نَغْر سُوْرِي

Serin de Syrie (F).
هو النمار ونوع من النفر تنمي اللون حسن التفريد يألف البلاد اللبنانية السورية .

٢٩٠٥١ - نَغْرَة

Serine (F). She canary (E).
انثى النفر . جسمها اصفر قدأ من جسم الذكر ورأسها اقل استدارة وثوبها أقل لمة وخصيباً .

٢٩٠٥٢ - نَغْرِيل ٥ *

Colaspidae (S).
Colaspidème, Négril (F).
جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة النضاريات . أنواعه



نغريل



نغيطه البرتقال



نفل ابيض

ويعتبر النفط في الوقت الحاضر من اهم وسائل الوقود التي تستخدم في تحريك الالات المختلفة من الطائرات والسفن الى السيارات واجهزة المصانع. || اهم البلاد المنتجة للنفط هي الولايات المتحدة وروسيا وأمريكا الجنوبية والبلاد العربية وإيران.

٢٩١٠٣ - **نُفْطُور** ^٥
Micro-organisme (F).
Microorganism (E).

اسم يطلق على كل عضو مجهرى نباتي أو حيواني. ج. فطائير. ومنهم من قال عضمكري. ج. عضمكريات.

٢٩١٠٤ - **نُفْصِيَّة**
Utilitarisme (F).
Utilitarianism (E).

النفعية مذهب فلسفي يقول بان المنفعة ان خاصة او عامة هي سة العمل البشري.

٢٩١٠٥ - **نُفْصَات**
Impenses (F). Expenses (E).
هو ما ينفقه المرء على عين ثابتة قابلة للاسترداد والنقعات قد تكون :

نفقات ترفيه
Impenses voluptuaires (F).
Voluntary expenses (E).
نفقات ضرورية
Impenses nécessaires (F).
Necessary expenses (E).

نفقات مفيدة
Impenses utiles (F).
Useful expenses (E).

٢٩١٠٦ - **نُفْصَاة ، مَعَاش**
Pension (F).
Pension, Allowance (E).
النفقة او المعاش دين يوفى بدفعات دورية وقد تكون عصرية لقولم المعيشة او التقاعد او بسبب زمانة.

٢٩١٠٧ - **نُفْصَل ، شَبْدَر**
Trifolium (S).
Trèfle (F). Clover (E).

جنس نباتات عشبية من القرنيات القرأشية. انواعه المعروفة زهاء ١٥٠ معظمها بري مرعوي وبعضها زراعي علي ونسها الحولي والحوول والممر. جذورها جنية تنور في التربة. سوقها فراء. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات مستطيلة الزناد. ازهارها رويحي التجميع او سنبل. ازهارها مثرية مختلفة الالوان. ثمارها سفية. زورها كلبية الشكل، صغيرة القد، سمراء اللون. || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩١٠٨ - **نُفْصَل اَبْيَض ***
Trifolium repens (S).
Trèfle blanc, T. rampant, T. d'agneau (F).
نوع من النفل المرعوي. تكثر زراعته في الاربة. ازراره ساقه مادة فراء. وريقاته بيضية مستطيلة. ازهاره رويحي التجميع. ازهاره ابيض. بذوره كلبية الشكل حنطية. || يجدد في جميع الاربة اخصها المتدبة ولا يخشى الكلسية. علفه جيد الصنف مرغوب فيه يكثر استعماله لبقير الحلوب.

٢٩١٠٩ - **نُفْصَل اِسْكَنْدَرَانِي** هو البرسيم، اطلبه.

٢٩١١٠ - **نُفْصَل البَرِّ * ، رَجُلُ الرُّبِّ**
Trifolium arvense (S). Trèfle des champs, Pied de lièvre (F). Field clover, Hare's foot clover, Stone clover (E). Feldklee, Hasenpötschenklee (D). Mosci-no maggiore, Erba lepre, Piè di lepre (I).
نوع من النفل البري المرعوي الممر. ساقه وقروره زباء



نفل البرِّ

٢٩٠٩٢ - **نَفْث الدَّم**
Hemoptysie (F).
هو يسق الدم، اطلبه.

٢٩٠٩٣ - **نَفْج**
Ecllosion (F). Hatching (E).
هو النفث والتفقيص. تقول نفج القلوب او الصمص او الكتكتوت اي خرج من البيضة.

٢٩٠٩٤ - **نَفْجِيَّة**
Pneumatologie (F).
Pneumatology (E).

النفعية مذهب فلسفي لاهوتي يبحث في كل ما هو خاص او منوط بالكنائس الوسيطة بين البشر والاله او الآلة.

٢٩٠٩٥ - **نَفْثَرُوب**
Néphrops (F).
دوية من القشريات تدعى يرغوث البحر، اطلبه.

٢٩٠٩٦ - **نَفْثَرُود**
Nephrodium (S).
Néphrodie (F). Nephrodium (E).

جنس نباتات جذمورية معمرة من السراخس وفصيلة السباجيات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اوراقها مستطيلة، مركبة، وترية التجميع، حيلة الخضار الالاس. مزاجها ريشية او مفرصة. سدائها كلبية الشكل. زكاتها شبه ملحوة || بعض انواع الثفرد يزرع في المراكن للترزين.

٢٩٠٩٧ - **نَفْثَرِيد**
Néphridies (F).

نفرديدج نفاثريد اعضاء الافراز عند بعض الحيوانات الدنيا كاللوارات وعضديات الارجل والديدان. وهي عبارة عن انابيب مسككة، مهدبة الجدران الداخلية تحترق الجسم وتنتهي الى الخارج.

٢٩٠٩٨ - **نَفْض**
النفس : ما تساقط من الورق والثر.

٢٩٠٩٩ - **نَفْض**
Gaulage (F). Beating (E).
هو القوط او الخبط اي جني الثار بواسطة الضرب بالمصا.

٢٩١٠٠ - **نَفْض**
Egrenage (F). Picking (E).
فصل الحبوب او البذور عن السنابل والمطر وما اشبه.

٢٩١٠١ - **نُفْصَاة**
المطرطة تصيب بقعة من الارض وتغطى بقعة.

٢٩١٠٢ - **نُفْط ، نَفْطُول**
Pétrole, Naphte (F).
Petroleum, Naphtha (E).

زيت معدني يوجد في جوف الارض مركب من عنصرى الكربون والهيدروجين الاصليين. انواعه عديدة ومختلفة الاعراض من لون ورائحة وصفاء ولزوجة. ومنه ما يكون مصفراً قليل العناصر الثانوية وهو اجدوده ومنه ما يكون مخفراً كذا ومنه ما ينفجر الى الحفرة او السواد ويكون بعضه شفافاً وبعضه الآخر كدراً كثيفاً. ثقله النوعي يراوح من ٧٨٠ الى ٨٣٠، || يستخلص منه بالتقطير المواد التالية :

س٧٠
اثير البترول
من ٧٠ الى ١٢٠
من ١٢٠ الى ١٥٠
من ١٥٠ الى ٢٨٠
من ٢٨٠ الى ٤٠٠
من ٤٠٠ وما فوق
الغازولين
البزين
زيت الانارة المعروف بالبترول
الزيت الثقيلة والشم المديني
البرافين والغازولين
واثير المازوت الذي يعتبر راسب التقطير

٢٩١١٦ - نفل بلقاني ، نفل دلماسي

Trifolium pannonicum (S). Tréfle pannonien, T. de Dalmatie (F).

نوع من النفل المرعوي المعمّر . ساقه زياء منتصبه فراءه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهاره رويسى التجميع غروطى الشكل . ازهاره كبرية القذ عاجية اللون يعلوها مواج اصفر . وريقاته كبرية تملو من ٤ الى ٥ سم. تصلها ازغب البشرية باثت الخفصاء || وهو من النباتات السبروتية التي تمشي حتى ارتفاع ١٨٠٠ م. وتوجد في جميع الارربة العميقة الغور.

٢٩١١٧ - نفل ثرؤسي
Trifolium lupinaster (S). Tréfle à feuilles de lupin, T. faux-lupin (F).

نوع من النفل الزبني المعمّر . ساقه منتصبه قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه خماسية او سباعية الورقات، نصلها سنانية ذرية تملو نحو ٤ سم. ازهاره مستطيل الشكل . ازهاره ارجوانية اللون تملو نحو ٢ سم. تنوره يستمر من حزيران الى آب.

٢٩١١٨ - نفل قرمزي
Trifolium incarnatum (S). Tréfle incarnat, T. anglais, T. du Roussillon (F). Scarlet clover (E). Incarnat-Klee (D). Trifoglio incarnato (I).

نوع من النفل المرعوي الزراعي العلي المعمّر . ساقه فراءه زياء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. وريقاته ملوكة الشكل . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره قزمية اللون . يزور الى الصفار المذهب المواج || يحود في جميع الارربة الصالحة . يكثر استعماله كنبات حولي لانه سريع النمو وجيد الانتاج في اول عهده . ضره المشهورة حسة فوارقها التلاوت بسرعة الادراك وصلحها الى اربة معينة .

٢٩١١٩ - نفل
صفة الضرع الذي لا يحس لبنه . فتقول ضرع نفوح . والبقرة النفوح تلك التي يخرج لبنها من غير حلب .

٢٩١٢٠ - نقيده
Usable (F).
Liable to wear out (E).
صفة ما يمكن استفادته او ما يمكن ان يفنى .

٢٩١٢١ - نقيده
Terebratula (S).
Térébratule (F). *Terebratula* (E).

جنس حيوانات من الرخويات عضديات الارجل وفضيلة النفيديات . انواعه المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الديفونية والبعض الآخر ، اي المعاصر ، منتشر في جميع بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شبه غروطية الشوزن ، لامتساوية المضارب المائلة || تعيش لاصقة بالصخور المنفورة .

٢٩١٢٢ - نقيده
Terebratulidae (S).
Térébratulidés (F). *Terebratulidae* (E).

فصيلة من الرخويات المفصليّة عضديات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها من اجافير الاباح القدم والحقة الديفونية . اما اجناسها المعاصرة فتنتشر في معظم بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شبيهة الاشكال والاروان || اعراف اجناسها واشهرها النفيده والتقيشة والمغاس والفسيث والداليمه .

٢٩١٢٣ - نقيير
Stramoine (F).
هو الداتوره الشائكة ، اطبلها .

تملو من ١٠ الى ٢٥ سم. وريقاته ثلاثية التركيب قلبية الشكل . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره وردية اللون.

٢٩١١١ - نفل الماء *

Menyanthes trifoliata (S). Mélianthe, Méyanthe, Tréfle d'eau, T. des marais (F). Bog-bean, Buck-bean, Marsh trefoil (D). Bocksbohne Fiebersklee, Sumpffiebersklee (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua, T. caprino (I).

نبات عشبي جذموري منقعي فصيلة الجنطيانات. اوراقه مركبة ثلاثية تشبه اوراق النفل وهي متعاقبة ، معنقة ، حاشية . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صفيرة القذ يضاء اللون موشية بالوردي || اوراقه طيبة عديدة المنافع الصحية وقد تستعمل استعمال الجنجل . راجع اطريفل .

٢٩١١٢ - نفل المُرُوج * ، نفل بتفسجي ، برسيم احمر ، رطبة

Trifolium pratense (S). Tréfle commun, T. des prés, T. violet, T. rouge, Tramène, Triolet, Lucotte (F). Red clover, Purple clover, Meadow clover (E). Klee, RoterKlee, WiesenKlee (D). Trifoglio rosso, T. dei prati, Moselno (I).

نوع من النفل المرعوي العلي السبروتي المعمّر الشائع الزراعة . ساقه منتصبه فراءه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات البيضية الشكل . نصلها مالم الصفحة يملو عند قاعدته تجذيع ابيض على شكل ٨ . ازهاره رويسى التجميع . ازهاره بنفسجية اللون تعلوها ماجة ارجوانية . يزور بنفسجية القلب الغليظ ، صفر القلب الدقيق || يحود في جميع الارربة الوافرة المواد العضوية اخصها المتدنية ، العميقة الغور ، الرقاب || متطلباته الخاصة الكلس والبوتاس .

٢٩١١٣ - نفل اثنى
Trifolium elegans (S).
Tréfle élégant (F).

نوع من النفل المرعوي المعمّر . ساقه كثيرة الفروع ، متوسطة النمو ، زياء . وريقاته ملوكة النصل ، عاقبة الخفصاء . رؤيسات الزهرية متوسطة القذ ، كثيرة العدد . ازهاره الى الحرة الوردية السوية || يحود في جميع الارربة ولا يحس الفقيرة والخفيفة والرملية .

٢٩١١٤ - نفل اهنج *

Trifolium hybridum (S). Tréfle hybride, T. de Suède, T. d'Aisne, T. bâtard (F).

نوع من النفل المرعوي الشائع الزراعة في المناطق الباردة الرطبة . ساقه دقيقة فراءه تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. وريقاته بيضية مستطيلة . رؤيساته الزهرية كبيرة القذ . ازهاره وردية اللون مختلطة المواج الذي راو من الالبيض الشاحب الى الاحمر الزاهي || علفه جيد الصنف مرغوب فيه .

٢٩١١٥ - نفل برتقالي

Trifolium aurantiacum (S). Tréfle orangé (F).

نوع من النفل الزبني الحولي . ساقه فراءه مشية تملو من ١٥ الى ٢٥ سم. وريقاته سنانية النصل المسنن . ازهاره رويسى التجميع ، يضي الشكل ، يملو من ٥ الى ٧ سم. ازهاره صغيرة القذ برتقالية اللون || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .



نفل الماء



نفل المُرُوج



نفل اهنج



نفل قزمية



نقيده

٢٩١٢٩ - نَقِيطَةُ الْأَرَزْ *

Mycosphaerella oryzae (S).



نقطة الاجاص

فطر مجهري يركب عصف الارز في مهري تموز وأب
نؤذيه ويسمي الى اسبالة || مظهره الخارجي يقع بمبشرة
لاقياسية الشكل والترتيب تملو نصال المصنف بقع مبشرة
ذوبها ويباسها الباكر ما يؤدي الى سوء الاسبال وتدني
الانتاج || اعسانه نودلية الشكل. بويغاته ثنائية الخلية
تطول من ١٤ الى ١٥ م. وتعرض نحو ٤ م. || اضراره
الحققة حتى الآن لا تستوجب المكافئة لانها لم تتجاوز
٢٪.

٢٩١٣٠ - نَقِيطَةُ الْبَزِيلَةِ *

Mycosphaerella pinodes (F). Ascochyta pisi (S). Anthracnose des pois (F). Blight of peas, Leaf spot of peas (E). Brennfleckenkrankheit der bohnen und erbsen (D).



نقطة الاراشيد

فطر مجهري يعترى اوراق وسف البزيلة والبقان
والخمر والترمس || مظهره الخارجي يقع لاقياسية الشكل
والترتيب لوها الى المثلعة يحقها حنار اسمر، تركب الارواق
والسنت والسوق فتشوهها وقد تسبب ذبول القرون ويباسها
قبل اكتمال الحب || وهو من الفطور الزهية التي لا تتكاثر
الا في ظروف بيئية محدودة تساندعا عوامل مناخية خاصة
قوامها تدني الحرارة وقللة الضرع وكثرة الرطوبة الجوية
النسبية.

٢٩١٣١ - نَقِيطَةُ الْبَطِيخِ *

Mycosphaerella citrullina, Dipodina citrullina, Ascochyta cucumis (S).



نقطة الاراز

فطر مجهري يركب البطيخ والتام والخيار والكوسى وغيرها
من القرعيات فيؤذيها اشد الاذى || مظهره الخارجي يقع
سحر لاقياسية الحجم والترتيب تعيب نصل الارواق فتسبب
يباس النسيج ثم تصيب السوق فتسقطها بيثور قرعية
تحول دون وصول كامل التسفع الى الفروع والاوراق
فتسبب اسودادها ويباسها || بكنيداته نودلية الشكل،
حنتلية اللون، مبسة المقي، تطول نحو ١٦٥ م. بويغاته
شفافة، ثنائية الخلية، شبه اسطوانية الشكل تطول من
١٠ الى ١٨ م. وتعرض من ٣ الى ٥ م. يكافئ عند
ظهوره باستعمال احد الادوية الفاطورية الفعالة تعقبها على
النبات والربة.

٢٩١٣٢ - نَقِيطَةُ التَّلَاح *

Mycosphaerella pomi, Cylindrosporium pomi, Phoma pomi (S). Fruit spot, Brooks' fruit spot (E).



نقطة البطيخ

فطر مجهري يركب ثمار التلح. مظهره الخارجي يقع
دقيقة قطرها نحو ٥ م. تصيب بشرة الثمرة تسبب حنتلية
اللون او خضراء عابقة او اسراء. يركب التلح في آب
ويستمر في نشاطه حتى الخزن بالبراد حيث يتوقف ويركن
الى ثبات البياض || اعسانه التي تعيش على الارواق السالطة
والتي براوح قطرها من ٧٠ الى ١٠٠ م. تحضن بعض
الأتراق التي لا يقل عددها عن ٣. بويغاته شبه اسطوانية
طولها ١٩ م. وعرضها ٣ م. || اما بكنيداته التي
تركب الثمار فهي تلتف المديد من الكنانة الخيطية
المستقيمة او المموجة التي تطول من ٥ الى ٨ م. وتعرض
من ١ الى ٢ م. || اضراره محدودة تنحصر بعدم نفاذة
البشرة لانها قلما تملأ السوق اذ لا تدخل فيه اكثر من
مليمتين || يكافئ مكافئة التسفع.

نقطة التلح

٢٩١٢٤ - نَقِيطُص Labile, Caduc (F). Deciduous (E).

قابل اليعبال أي السقوط .

٢٩١٢٥ - نَقِيطَةُ *

Mycosphaerella (S).
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات .
اعسانها بسيطة ، كنانتها مدبغة النكة ، بويغها شفافة
او زيتوني اللون يحمل وثيرية معترضة تقصصه الى خليتين
متفاوتتين القدر . منها هامي الاركانز في انتفاع شبه
ثعلولي ، انواعه الفارة عديدة اعربها ما يتبع .

٢٩١٢٦ - نَقِيطَةُ الْجَنَاصِ *

Mycosphaerella sentina, Sphaerella sentina, Sphaerella pyri, Septoria pyri, Septoria piricola, Septoria nigerrima (S). Septoriose du poirier (F). Leaf spot of pears (E). Weibfleckenkrankheit der birne (D).

فطر مجهري يعترى اوراق الاجاص وقد يصيب الثار .
مظهره الخارجي يقع صغرية مبشرة ، قطرها من ١ الى
٤ م. لونها الى الخطي يحقها اطار احمر اللون يتنسجي
المواج ، تركب نصل الارواق فتؤذيها وتمتعه عن القيام
بوظيفتها على الوجه الاكل || بكنيداته نائنة نودلية تطول
من ١٥٠ الى ١٨٠ م. بويغاته اسطوانية مقوسة شفافة
مستتة الاطراف ثنائية الانقسام ثلاثية الخلايا تطول من
٣٣ الى ٤٣ م. وتعرض نحو ٣ م. || تكاثره مشروط
بالموالم الجوية الموافقة || يكافئ كسائر فطور جنسه.

٢٩١٢٧ - نَقِيطَةُ الْأَرَاشِيدِ *

نَقِيطَةُ الْفُسْتَقِ

السُّودَاكِي *

Mycosphaerella arachidicola, Cercospora arachidicola, C. arachidis (S).

فطر مجهري يركب اوراق النبات وسوقها . مظهره الخارجي
يقع زيتية ثم حنتلية لجووية قطرها براوح من ١ الى ١٠ م
تعلو نصال الارواق على صفحاتها السفلى ثم تنتشر على
السوق والمعالق فتؤذيها وتمتعه عن القيام بوظيفتها على الوجه
الاكل || كوانبه ربادية اللون ملتوية الاطراف . كنانته
صغرية الشكل مستقيمة الجسم او مقوسة ، طولها براوح
من ٢٧ الى ١٠٨ م. وعرضها من ٣ الى ٥ م. انفصامها
شديد التباين براوح من ضعف الى ٣ اعصاف || يكافئ
باستعمال الادوية الفاطورية التي لا يخفى من تراكم
عناصرها الفعالة . ومن المستحسن تطهير البذار قبل
استعماله بمحلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ مدة ساعة
من الزمن .

٢٩١٢٨ - نَقِيطَةُ الْأَرَاشِيدِ الْمُسْتَدِيرَةِ *

نَقِيطَةُ بَرَكِي *

Mycosphaerella berkeleyi, Cercospora personata, Cylindrosporium personatum, Septogloeum arachidis (S).

فطر مجهري يركب سوق الاراشيد واوراه فتؤذيها وقد
يسبب ذوبها ويباسها || مظهره الخارجي يقع مستدرة
تبدو حنتلية اللون ثم تسمر وتقتني باليباس والانفتات .
كوانبه نودلية الشكل جووية اللون . كنانته اسطوانية
الجسم ، مستتة الاطراف ، حنتلية ، تطول من ١٨
الى ٦٠ م. وتعرض من ٥ الى ١١ م. انفصامها بشرطها
بنفسه ضميمين الى ٩ اعصاف . اعسانها وإزاقها ريمية
شكلية . بويغاتها ثنائية الخلايا لا متساوية الشكل والحجم .
يكافئ مكافئة نقطة الاراشيد .

يقع حنطية تركب العصف قسب ذوبله ثم تصيب عصفيات الحب فتوشها بنقط سود. وقد ركب البرة في نطيلها فينبو كنقطة سودا داكنة || كوابنه بسيطة التركيب لاقياسية الحجم والاستطالة لونها الى السمرة. كئاده طرية الارتكاز بوفياته بيضية الشكل، حنطية اللون، فردية او ثنائية الخلية تطول من ١٨ الى ٢٤ مي. وتعرض من ٧ الى ١٠ مي. || اضراره قليلة لا تستوجب المكافحة المكلفة.

٢٩١٣٩ - نَيْطَةُ الزَّرْبَقِينِ

Mycosphaerella millegrana, *M. microscora* (S). فطر مجهرى يصيب الزربون في اوراقه فيؤذيها وفي قضبانته الفتية فيقرحها ويعطها. || مظهره الخارجي يقع بكثرة سمراء اللون، مستديرة الشكل، قطرها براوح من ٣ الى ٤ مم. تركب فصل الاوراق قسب يباس السنج وانتقابه. وهو على القضبان يقع مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم تركب بشرة اللحاء قرب ابط الورقة فتقرحها وتحرقها باطار رافع جوي اللون. || كوابنه ضمية التجميع متصبة. كئاده سوطية صفراء اللون تطول من ٣٠ الى ٤٦ مي. وتعرض من ٣ الى ٥ مي. اسنانه كروية الشكل لقلرها براوح من ٥٥ الى ١٠٠ مي. ائاقها وشية تحضن اربعة ازرار من البيوانات الشفافة التي براوح طولها من ١٦ الى ٢٠ مي. وعرضها من ٣ الى ٤ مي.

٢٩١٤٠ - نَيْطَةُ السُّوسَنِ

Mycosphaerella macrospora, *Didymella macrospora*, *Heterosporium gracile*, *Scolecotrichum cladosporioideum* (S). فطر مجهرى يصيب اوراق السوسن والدليلوث فيؤذيها ويؤذيها ويبيب يباسها || مظهره الخارجي ينور صغيرة كثيرة مبعثرة تبدو يباسها اللون ثم يبداء وتنتهي بالسمرة واليباس || اسنانه تتكاثر على صفحتي التصل. ائاقها تطول من ٥٥ الى ٦٠ مي. وتعرض نحو ١٤ مي. بوفياته ثنائية الخلية تطول من ١٦ الى ٢٠ مي. وتعرض نحو ٥ مي. اضراره لا تتبدى الاوراق.

٢٩١٣٨ - نَيْطَةُ الثَّوْتِ

Mycosphaerella morifolia, *Cylindrosporium mori*, *Septoria mori*, *Septogloeum mori*, *Chellaria mori*, *Phleospora mori* (S). Fausse-rouille du mûrier (F). فطر مجهرى يركب اوراق الثوت. مظهره الخارجي يقع مزاوية سفاه اللون، سمراء الاطار، تعمرى نصل الاوراق وتيب جفاف السنج || اضراره محصورة بمنى العطب الذي يحل بالسنج وقد يصل في بعض المواقع انتظلية والظروف المناخية الملائمة الى نحو ٥ ٪ من مساحة النصل. هذا مع العلم ان دود القز يمرض اكل السنج الشاذية. يكافح بنضج الاشجار قبل ايراقها باحد المركبات النحاسية.

٢٩١٣٤ - نَيْطَةُ التَّيْنِ

Mycosphaerella bolleana (S). فطر مجهرى يركب التين في اوراقه فيؤذيها. مظهره الخارجي يقع مزاوية تملو التصل على صفحته السفلى ضمن حدود العروق والاعصاب، تبدو عابقة اللون الى ان يكتمنها الخمل الاطمل فتقايها اذ ذلك على الصفحة العليا يقع سمر رافضة مقرقنة || كئاده وشية الشكل زيتونية اللون تطول من ٣٥ الى ٤٥ مي. وتعرض من ٧ الى ٨ مي. انتساقها براوح من ضعفين الى ٦ اضعاف. اضراره تأنه لا تستوجب المكافحة.

٢٩١٣٥ - نَيْطَةُ الثُّومِ

Mycosphaerella alliacea (D). فطر مجهرى يركب اوراق الثوم والكراث فيوشها وقد يؤذيها ويبيب يباسها || مظهره الخارجي ينور صغيرة كثيرة مبعثرة تبدو يباسها اللون ثم يبداء وتنتهي بالسمرة واليباس || اسنانه تتكاثر على صفحتي التصل. ائاقها تطول من ٥٥ الى ٦٠ مي. وتعرض نحو ١٤ مي. بوفياته ثنائية الخلية تطول من ١٦ الى ٢٠ مي. وتعرض نحو ٥ مي. اضراره لا تتبدى الاوراق.

٢٩١٣٦ - نَيْطَةُ الْحِمِصِ

Mycosphaerella rabiei, *Ascochyta rabiei*, *Phylloticta rabiei* (S). Anthracnose du pois chiche (F). فطر مجهرى يصيب الحمص في جميع اعضاءه الهوائية. مظهره الخارجي يقع بيضية الشكل او مستديرة تركب السوق والاوراق والسلف. تبدو حنطية اللون ثم تنحرف الى البقرة البيضاء يحرقها اطار اخر. وعند اشتداد اذهاا تفرح السوسن وتبدل الاوراق وتيب اتمام السلف. بوفياته اسطوانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٤ مي. وتعرض نحو ٤ مي. || يكافح اما بتطهير الحمص قبل بدو ذلك بنقته نحو خمس دقائق في محلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ او بنضج زراعته توأ بعد ازهارها بمحلول بودرو المركز ١ ٪.

٢٩١٣٧ - نَيْطَةُ الْحَبَّوْزِ

Mycosphaerella populicola, *M. populatorum* (S). فطر مجهرى يركب الحور في اوراقه فيوشها. مظهره الخارجي يقع مزاوية صغيرة القند حنطية اللون تملو النصل فتقرحها || تشوبه لا يستوجب المكافحة.

٢٩١٣٨ - نَيْطَةُ الزَّرُّوعِ

Mycosphaerella tulasnei, *Cladosporium herbarum*, *Hormodendron cladosporioides* (S). Noir des céréales, Mouchetage, Moucheture (F). Black point, Dark, Brow-tip (E). Schwärze des Getreides (D). فطر مجهرى يمرض عصف الزرع وعصفيات السنايل في الخنطة والشعير والشوفان والتيلم || مظهره الخارجي



نَيْطَةُ الثَّوْتِ



نَيْطَةُ الزَّرُّوعِ



نَيْطَةُ السُّوسَنِ



نَيْطَةُ الثَّوْتِ



نَيْطَةُ الشَّيْثَانِ

٢٩١٤١ - نَيْطَةُ الشَّوْتَرِزِ
Mycosphaerella tabifica, *Sphaerella tabifica* (S). Pourriture du cœur de la betterave, Pied noir de la betterave (F). Dry heart rot of beets (E). Herzfäule der Runkelrübe (D).

فطر مجهرى يصيب اوراق الشوترز وجذوره فيعطها. مظهره الخارجي يقع مستديرة تبدو مطحاة اللون ثم سمراء تركب الاوراق، في اواسط الصيف، على صفحات نساها العليا قسب اسفراها وذوبها ثم تنتقل بواسطة الاوعية الشبكية الى داخل الجذور فتعطها وتوقع بها اشد الاذى || يكافح باستعمال محلول بودرو مع مرين او ثلاث مرات ابتداء من اول تموز.

٢٩١٤٢ - نَيْطَةُ الشَّيْثَانِ

Mycosphaerella fragariae, *Sphaerella fragariae*, *Stigmatae fragariae*, *Septoria fragariae*, *Ascochyta fragariae*, *Cylindrosporium grevilleanum*, *Ramularia tulasnei* (S). Maladie des taches rouges du fraisier, Taches brunes des feuilles du fraisier (F). Leaf spot of strawberry (E). Weißfleckenkrankheit der Erdbeerblätter (D).

فطر مجهرى يصيب الشيك باراوقه فيؤذيها. مظهره



نقطة القرتل



نقطة القطن



نقطة الكرز



نقطة الكتنة



نقطة الملفوف

مستطيلة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٣ الى ١٢ .
بويغاته ثنائية الخلية . || اضراره زعيدة لا تستوجب
المكافحة .

٢٩١٤٧ - نَقِيطَةُ الْكُتْنَةِ *

Mycosphaerella maculiformis, *Phyllosticta maculiformis*, *Cylindrosporium castaneicolum* (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكتنة والبنلق وبعض الانجار
الحرجية كالاسفندان والمث والبيلوا والشم والسديان .
مظهره الخارجي يقع صغيرة مزوانية تصيب نصل اوراق
على صفحاتها السفلى فتبدو بيضاء اللون ثم سراد .
بكثيداته مبعثرة التجميع لا قياسية الترتيب لونها الى السمرة .
بوغه اسطواني الشكل رباعي الانقسام او خاسيه . بويغاته
تطول نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي . || اضراره تنحصر
بما يلحقه من اذى بالاوراق وما يسببه من نقص في الغذاء
يعود الى الاجبال الباكر .

٢٩١٤٨ - نَقِيطَةُ الْكُشْمَش *

Mycosphaerella ribis, *M. grossularia*, *Septoria ribis*, *Phyllosticta grossularia* (S), *Septoriolose du grossellier* (F), *Septoria leaf spot* (E).

فطر مجهري يركب اوراق الكشمش . مظهره الخارجي
يقع نسبية مزوانية الشكل تظهر في نموز واب لونها الى
الصهبة الحمراء المالح ثم تيميل الى البنية وتستقر على اللون
الاطحل يعلو توشج اسود . || بويغاته خيطية مستطيلة
شفافة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٢ الى ٥ .
اضراره زعيدة . يكافح كسائر فطوره جنسه .

٢٩١٤٩ - نَقِيطَةُ الْمُرَّان *

Mycosphaerella fraxini (S).

فطر مجهري يركب المران في اوراقه فيسبب بياها .
مشيجه يتكاثر بمستوى الخلايا بين النسيج الحليكي والفجوي
مظهره الخارجي يقع مستديرة حطية اللون ارموازية اختار .
كتائده خيطية الشكل ، مستقيمة او مقومة الاطراف
تطول من ٣٠ الى ٤٠ مي . وتعرض من ١ الى ٢ مي .
اضراره لا تستوجب المكافحة .

٢٩١٥٠ - نَقِيطَةُ الْمَنِيَهُوت *

Mycosphaerella brassicicola, *Sphaeria brassicicola*, *Dothidea brassicae*, *Phyllosticta brassicae*, *Asteroma brassicae*, *Phoma oleracea* (S), *Ring-spot* (E).

فطر مجهري يصيب الملفوف في اوراقه الخارجية فيقطعها
ويسبب الى النمو فيؤخره وقد يؤذيه . مظهره الخارجي
يقع مستديرة رمداء اللون سود المحور تطرها يراوح من ٥
الى ١٠ سم . تركب النصل تقسب اصفرار وذبوله .
اعنائه وبكثيداته تراكب وتتشابك في البقعة الواحدة
فتحطم الى بقرة سوداء تتلار من مقامها اللون البوريفات
الديقة الشفافة التي تلو نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي .
اضراره الى تهيج عليها عوامل الرطوبة تراوح من ١ الى
٢٥ % يكافح بتطهير البذار وتطهير تربة الماشاتل او
باستعمال مائل جديدة .

٢٩١٥١ - نَقِيطَةُ الْمَنِيَهُوت *

Mycosphaerella manihotis, *Cercospora cassavae*, *C. manihotis*, *C. henningii*, *Septogloeum manihotis* (S).

فطر مجهري يصيب المنيهوت في اوراقه فيشوهها ويؤذيها .
مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل ، رمداء اللون ،
تركب نصل اوراق تقسب بياها .
كتائده طول من ٢٠ الى ٧٥ مي . وتعرض من ٥

الخارجي يقع صغيرة لا قياسية الترتيب والشكل والحليم
تركب نصل اوراق على صفحاتها العليا ولا تمتع عن
المعالق . تبدو صغيرة اللون بنفسجية المالح ثم تنحرف
الى السمرة وتستقر على البنية يحرقها اطار اخر داكن .
كوائده فارشة ، كتائده مستقيمة او مقومة وهي شفافة
اسطوانية مستعدة الاطراف . بويغاته لا قياسية الانقسام
تطول من ٢٥ الى ٥٥ مي . وتعرض من ٢ الى ٣ مي .
اضراره محصورة بمطبع التسج وحرمانه من القيام بعمله
الجسموري على الوجه الاكل . || يكافح قبل الانزهار
وبعد التعلل . وقد يحسن تملطس جذول الشيك قبل زرعها
بحلول الحامض الكبريتي المركز ٢ % الذي يقضي على
هذا الفطر وغيره من الفطوره الضارة .

٢٩١٤٣ - نَقِيطَةُ الْعَلِيق *

Mycosphaerella rubi, *Septoria rubi* (S).

فطر مجهري يركب اوراق العليق والموج البري والوجي .
مظهره الخارجي يقع مزوانية صغيرة القد ضلها يطول من
٢ الى ٣ مي . لونها الى الحطلة تملوها شحة سراد تركب
نصل اوراق عند انتشاب العروق تسبب بياها التسج
ثم انفثاته وسقطه . || ككثرة يحصل عادة بعد جني البذر
وهو اذا لامت العوامل الجوية يحش اوراق الفينة
فيحبها ويونها . || يكافح كسائر فطوره جنسه .

٢٩١٤٤ - نَقِيطَةُ الْقَرْتَل *

Mycosphaerella dianthi, *Didymella dianthi*, *Heterosporium echinulatum*, *Helminthosporium echinulatum* (S).

فطر مجهري يصيب القرتل بجميع اعضائه الهوائية .
مظهره الخارجي يقع مستديرة الشكل او بيضية ، حطية
اللون ، مهدبة بطار اخر او بنفسجي تركب الاوراق في
السوق وتعد الى تويج الزهرة وبتلاتها . || كوائده نسبية
التجميع ، معوجة القوام ملتوية . كتائده اسطوانية الشكل
لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ضعف الى اربعة
اعضاف . بويغاته تطول من ٣٥ الى ٤٥ مي . وتعرض
من ١٢ الى ١٦ مي . || يكافح باستعمال سائل بورديو
المركز ١ % قبل الانزهار .

٢٩١٤٥ - نَقِيطَةُ الْقُطْن *

Mycosphaerella gossypina, *Cercospora gossypina* (S), *Cercosporiose du cotonnier* (F).

فطر مجهري يركب اوراق القطن فيؤذيها دون ان يسي
الى النمو والانتاج . || مظهره الخارجي يقع صغيرة سراد
اللون مهدبة بالاحمر تملو اوراق القطن القريبة من التربة
الي لا تحللها اشعة الشمس . || كوائده هريبة الشكل
تعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ مي . كتائده شفافة تطول من
٧٠ الى ١٠٠ مي . وتعرض نحو ٣ مي . وهي سداسية او
سباعية الاجزاء . اعنائه حطية الشكل تطرها يراوح من
٦٠ الى ٩٠ مي . انتاقها اسطوانية تطول من ٤٠ الى
٥٠ مي . وتعرض من ٨ الى ١٠ مي . بويغاتها وشية ،
ثنائية الخلية تطول من ١٥ الى ١٨ مي . وتعرض من ٣
الى ٤ مي . || اذاه لا يستوجب المكافحة .

٢٩١٤٦ - نَقِيطَةُ الْكَرْزَة *

Mycosphaerella cerasella, *Cercospora cerasella* (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكرز والحلب . مظهره الخارجي
يقع صغيرة مستديرة حطية اللون مهدبة بالاحمر تنص
نصل اوراق ثم تيبس . وقد ينفضها الريح فيبدو النصل
كالغربال المبعثر الثروب . || كتائده صغية الشكل

والانثى تمتنع المكن محبداً في بطون الاثراش || البرقة عنه بلوفها الادراكه التام تطول نحو ٦ سم. ثوبها في اول عيدها الى الجلوثة ثم ينحرف الى البنفسجي الفاتح تملوه خطوط قاطبة من النقط السود .

Humerus

٢٩١٥٦ - نَقَّاذ

النقا هو عظم العنق .

Purété (F). Purity (E).

٢٩١٥٧ - نَقَّاء ، طَهْر

هو غلو الشيء من العناصر الغريبة عنه .

Picoide tridactylus (S).

Picoide tridactyle (F).

٢٩١٥٨ - نَقَّاب *

طائر من فصيلة النقايات ورتبة المتسلقات . موطنه يشمل المناطق الجبلية من الشرق الادنى واروبه || جسمه معتدل القدر يطول نحو ٢٠ سم . بسطته نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السواد الفحشي الملبق بالابيض في العنق والايثار . صدره وبطنه الى البياض المشرب بالبنسي . جبهة وقفنه وصخره الى السواد البلاع . قنة رأسه ذهبية اللون يعلوها تشيز نفضي . حدة عينه زرقاء اللون . منقاده وساقاه الى السمرة السوداء . ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر الا بخضاب القنة الفضي المشرب بالاصفر || ويتميز النقباب بكونه ثلاثي الاصابع غسلاً لسانه اجناس النقايات الرباعية الاصابع || قوته الحشرات واساريمها وبعض البذور البرية || يفتن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

Syndicat (F). Syndicate (E).

٢٩١٥٩ - نَقَابَة

هي جمعية أشخاص يقتنون الى مهنة واحدة او مهن متشابهة للدفاع المشروع عن مصالحهم المهنية .

٢٩١٦٠ - نَقَابَة

Charrue défonceuse, Défonceuse (F). Trenching plough (E). سكة ضخمة مقنطرة تستعمل لفلج التربة او حفرها واتزاع حجانها على اعماق تراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم .

Coccothraustes (S).

Gros-bec (F). Hawfinch (E).

٢٩١٦١ - نَقَّاذ ، نَقَّاذ

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها من عصافير المناطق الحارة والمعتدلة . مسرهم العالم القديم والجديد . تتميز بمناقيدها الضلعية التي تمتلئها من كسر عجمة اللوز واللوح والكرز . قوتها الثمار والحبوب والخحرات . تكثر في الاجنار الفناء اناتها تنقع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها متباعدة الذكر نحو ١٥ يوماً . اعرف انواعه واشهرها النقااذ المبدول .

Coccothraustes vulgaris (S).

Gros-bec commun (F). Common hawfinch (E).

٢٩١٦٢ - نَقَّاذ مَبْدُول *

طائر من فصيلة النقايات ورتبة المتسلقات . موطنه القدر يطول نحو ٢٠ سم . بسطته نحو ٣٠ سم . رأسه كسني اللون وقفنه الى الصبغة الرمداء . زقاده وزروره سود . ظهره وصدره الى الصبغة الحمرة . بطنه ابيض . جناحه سود القاعدة ومنظم الاطراف . بيض الريسط وبعض الاطراف . ذنب اسود اللون ينهي بقمة بيضاء . يغتنق الى الزرق العالقة . حلقه عينه وردية . ساقاه الى الحمرة الطلحة . || يألث

الى ٦ م . انقسامها لا نظامي الترتيب يراوح من ٢ الى ٩ . اصنافها سطحية الاركانكاز . كروية الشكل قعرها يراوح من ٩٠ الى ١١٠ م . انزاقها ريمية تحفن اربعة ازواج من البويغات الشفافة الثنائية الخلية .

٢٩١٥٢ - نَفِيطَةُ الْمَوْزِ *

Mycosphaerella musicola, Cercospora musae (S). Cercosporiose du bananier (F). Sigatoka disease (E). فطر مجهرى يركب الموز في اوراقه فيعطبها ويسبب ذبولها ويسمى الى الكياسات ان لم يندبها . || مظهره الخارجي نقاط دقيقة زيتية اللون تظهر في اوائل الصيف على الاوراق الجديدة ثم تنقع وتسترق نهائياً على شكل مستطيلات يراوح طولها من ٣ الى ١٠ م . وقد تتصل ببعضها فتصبح بقعاً فسيمة مستطيلة لا قياسا الحجم . اما لونها فيستب على الصبغة الخلفية يحقها اطار اسمر اللون . اطحل البتديد . كوابيه ضمية التجميع . ككائه وسطية الشكل تطول من ٢٠ الى ٨٠ م . وتعرض من ٢ الى ٦ م . انقسامها يراوح من ٣ الى ١٨ م . واصفات . بويغاتها شفافة ثنائية الخلية تطول من ١٤ الى ١٨ م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . اغزاره منطلة بمدى انتشاره لانه يسبب يساس الارواق وتثني الكيسة او اخذاجها وعدم تكوينها . يكافح يستمال سائل يورده المركز ٢ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الدبس و ٥ ٪ من الفشا .

Canalicule (F). Canaliculus (E).

٢٩١٥٣ - نَفِيق

Nephila (S).

Néphile (F). Nephila (E).

جنس رقيلات من العناكب الكبيرة القد . انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في معظم المناطق الحارة من المالحين القديم والجديد || ذكورها اصفر قدماً من اناتها . اوثها متراكبة الالوان يلبق فيها الاصفر والاحمر والاسود . جرامها سمر الاطراف || يربونها في بعض البلاد الاسيوية والامريكية لاستخراج نواصها الحريري الاصفر اللون || اشهر انواعها الصالحة للترية :

N. chrysogaster (S).

نفيلة ذهبية اللون

N. clavipes (S).

نفيلة لوزيانه

N. madagascariensis (S).

نفيلة مدغسكير

٢٩١٥٥ - نَفِيقُوس كَرْدِيَّيَالِي *

نَفِيقُوس كَرْدِيَّيَالِي *

Novius (Macronovius) cardinalis, Vedula cardinalis (S).

Novius cardinal (F). Vedula cardinalis (E).

حشرة خاتلة من فصيلة الدصيقيات ورتبة منعدات الاجنحة تألف بساتين الحفصيات والمباقل والحادق . خنافتها ويرقاتها تعيش على الاثراش الذي يفتك بالحفصيات والورد والليموزا ... || جسمها صغير القدر يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها احمر يعلو تقيج اسود . رأسها صغير الحجم . اسود . عينها صغيرتان . زباناها صقيان . صغيران . فكاهها نضبان . ظهرها شديد الاحدياب . مستدير المؤخر اللائح . غداها كليفنا الحمل . ارساغها رباعية العقل || ايجالها الحولية ستة . تخرج الحشرة الجمالنة من بياتها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في النهار . جبلها يستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً باستثناء الجيل السادس . اي الشتوي ، الذي يستمر نحو ٦٠ يوماً || تساق بعد ظهورها باسبوع



نفيلة الموز (١) نفيلة الموز (٢)



نفيلة



نفيس كربياني



نقَاب



نقَّاذ مَبْدُول



نقار احمر الرأس

٢٩١٦٩ - **نقار كبير** * **نقاروية الصنوبر**
Picus major (S). Pic épéche (F). Great spotted woodpecker (E).

نوع من النقار موطنه فسيح الارباع يمتد من اواسط الشرق الى اطراف اوروبا الغربية. || جسمه يطول نحو ٢٤ سم. ثوبه متباين الالوان الزاوية. ظهره واعلى جسمه الى السواد اللامع. عنقه ومخراجه ورجلاه مبقعة بالابيض. رأسه اسود. قفنه ومؤخر بطه الى الحمرة. صدره وبطنه الى البياض الاخير. حذقة عينه جزئية اللون. منقاده ورجلاه الى الكهبة الرصاصية. انشاء سمراء القفن. يألف ارجاج الصنوبريات ولا يقرب من الحادق والجائش الا عند سبب الحاجة الى الطعام.



نقار اسود

٢٩١٧٠ - **نقاريات**
Picidae (S). Picidés (F). Picidae (E).

فصيلة طير من رتبة المتسلقات اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ثلاث عمارات. اشهر طيورها النقار والواو.



نقار صغير

٢٩١٧١ - **نقاز** *
Penelope (S). Pénélope (F).

جنس طير من فصيلة الترناسيات. انواعه قليلة، جميعها مستطيلة الشكل الرشيق. قوة المنقار الاجنح. رؤسها قزمية الريش المستطيل الناعم، عماره ملط. اجنحتها مستديرة، اذيالها طويلة. اظفارها الى السمرة الداكنة يعلوها وتوشم وتوشح || تألف الارجاج. تعيش اسراب كبيرة قوتها الثمار والحبوب والحشرات. || تدن اثعاشها في الارجاج. اناثها يبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها اربعة اسابيع.



نقار كبير

٢٩١٧٢ - **نقاص** *
Drosophyllum (S). Drosophylla (F).

نبات معمر مقترن وسيد الجنس ولون من فصيلة اليزيمانيات. ساقه مقرية. اوراقه عصفية مستطيلة منتصبية تحنئة التصل للمدروز بازديع الدايق الصبي الشكل الذي يشمر كل حشرة تقترب منه فيضي عليها ويمتصها. ازهاره صفراء اللون، غلظية التجميع، هابة الارتفاع، تقوم على شراخ موزق قوسي الانتشاب.

٢٩١٧٣ - **نقاطة، سحاحة** (Burette).
Burette (F). Curet (E).

٢٩١٧٤ - **نقاق**
Bombina, Bombinator (S). Bombinateur, Sonneur (F). Bombinator (E).

جنس صفادع من فصيلة الصفاجيات. انواعه المروقة قليلة العدد، مهدا البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد. اطولها تراوح من ٥ الى ٧ سم. جلودها مثاقلة تفرز عند المس رغو بضاء تثير المعاس والتدعيم. اظفارها العلوية الى السمرة تلوها سرجة قائمة. اظفارها السفلية تراوح من الصفرة الباهتة الى الحمرة تملوها رشفة طحلاء زرقاء الموالج || تعيش في المنقع ويجاري الماء تركها في الليل وتعود اليها عند الفجر || اجرية دعيها وشية الشكل تحوي من ٢٠ الى ٤٠ دعيمة مبطنة تنقف بد الترتبة بنحو ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه النقاق الاسفر البطن والنقاق الناري البطن.



نقاز

٢٩١٧٥ - **نقاق أصغر البطن**
Bombina salsa (S). Bombinateur à ventre jaune, Sonneur à ventre jaune (F). Bombinator (E).

نوع من الصفادع النفاقة ينتمي الى فصيلة الصفاجيات. موطنه يمتد من الشرق الاذلى الى اطراف اوروبا. يألف



نقاص

الارجاج والغابات انحصا ارجاج الصنوبر والصنوبر ولا يقرب من الحادق والجائش الا في فصل الشتاء وعند الحاجة القاهرة الى القوت.

٢٩١٦٣ - **نقار، قزاع، نقاروية**
Picus (S). Pic (F). Woodpecker (E).

جنس طير من فصيلة النقاريات. انواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء استراليا. جميعها متسلقة تركب جذوع الاشجار فتقرعها وتقرع قشورها وتقبب شكيرها لاستخراج ما فيها من اساريع وديدان. اجسامها مستوية القد، اظفارها ملونة. مناقرها قوية، مستطيلة، محددة، اجنحتها منفرجة الاطراف. اذيالها متوسطة الطول. ارباعها قصيرة. جزئية التسرول. قوتها الحشرات وريقاتها واساريها وديدانها من النمل الى العناكب والجنادب ولا تمتع عن الثمار والجلوز والصنوبر عند الحاجة. || تدن في تجاويف الارجاج انماها تقع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها من ١٤ الى ١٧ يوما. تعتبر من الطيور النافقة التي تستحق الحماية. || اشهر انواعها واعرفها ما يتبع.

٢٩١٦٤ - **نقار أحمر الرأس** *
Picus medius (S). Pic mar, Pic à tête rouge (F). Middle spotted woodpecker (E). Mittlerer Buntspecht (D).

نوع من النقار. موطنه الشرق الاوسط واروبه. جسمه يطول نحو ١٨ سم. ثوبه ثوب النقار الكبير الا انه احمر الرأس. || يألف ارجاج السنديان دون سواها. اثناء تحضن بمناوبة الذكر من ٥ الى ٧ بيضات.

٢٩١٦٥ - **نقار أخضر**
Pivert (F). هو الشنسة الخضراء، اطليه.

٢٩١٦٦ - **نقار أسود** * **نقاروية سوداء، دركوب**
Dryocopus martius (S). Dryocope noir, Dryopie noir, Pic noir (F). Black woodpecker (E). Schwarzspecht (D).

طائر من النقاريات. موطنه جبال الشرق واروبه. جسمه يطول نحو ٤٧ سم. وبطنه ٧٧ سم. ثوبه الى السواد السوي القاتم الداكن يستثن منه قة الرأس القرمزية. جناحه متوسط القد، ذاق الطرف. حذقة عينه صفراء اللون. يألف الغابات والارجاج. قوته الحشرات والذناير والثمار العنية ويضف الحبوب والصنوبر. || الاثنى تحضن بمناوبة الذكر من ٣ الى ٤ بيضات نحو ١٥ يوما.

٢٩١٦٧ - **نقار الشوك** هو الحسون، اطليه.

٢٩١٦٨ - **نقار صغير** * **نقاروية السنديان**
Picus minor (S). Pic épéchette (F). Lesser spotted woodpecker (E).

نوع من النقار. موطنه يشمل الشرق الاوسط واروبه باستثناء المناطق النائية. || جسمه يطول نحو ١٥ سم. ثوبه الى السواد المايق اللامع يعلوه تجميع ابيض مقترن ومستطيل. جبهته ومخراجه الى البياض الاخير. قة رأسه قزمية اللون. يتوسط صدره سيالة سوداء تمتد من قاعدة المنقار الى اواسط الجوش. حذقة عينه حمراء اللون. مناقرها ورجلاه الى السمرة الرصاصية. اثناء لا حرة في رأسها. يألف الارجاج على اختلاف انواع اشجارها انما يفضل ارجاج السنديان والزان. || قوته الحشرات واساريها وريقاتها وبكها. اثناء تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر ١٤ يوما.

ه يبيضات لونها الى البياض الناصع تملوه رقشة جزوية .
أعرف أنواعه وأشهرها ما يليج :

نقشاة الحدائق Phyl. trochilus (S). Pouillot fitis (F).
نقشاة الشمال Phyl. borealis (S). Pouillot boréal (F).
نقشاة زرقاة Phyl. sibilatrix (S). Pouillot siffleur (F).
نقشاة صنايية Phyl. rufa, Phyl. collybita (S).
Pouillot vélocé (F).

٢٩١٨٥ - **نَقْص**
Déficiency (F).
Deficiency (E).
خلو بعض العناصر. الغذائية او عجز في عيها الادق
يؤدي إلى خلل ملموس .

٢٩١٨٦ - **نَقْصُ الْقِيَمَةِ**
Moins-value (F).
Decrease in value (E).
نقص القيمة او النقص هو انخفاض قيمة الشيء بين زمني .

٢٩١٨٧ - **نُقْطَة**
Point
٢٩١٨٨ - **نُقْطَةُ الْإِرْتِكَاز**
Point d'appui (F).
Support-Point (E).

٢٩١٨٩ - **نُقْطَةُ الْإِسْتِصْرَاد** ، **نُقْطَةُ الْجَلِيد**
Point de congélation (F). Congelation-Point (E).
٢٩١٩٠ - **نُقْطَةُ الْإِنْصِهَار**
Point de fusion (F).
Fusion-Point (E).

٢٩١٩١ - **نُقْطَةُ الْإِنْطِلَاق**
Point de départ (F).
Starting-Point (E).

٢٩١٩٢ - **نُقْطَةُ الْإِنْخِلَاب**
Point d'inflexion (F).
Inflexion-Point (E).

٢٩١٩٣ - **نُقْطَةُ الْبُخَار**
Point d'ébullition (F).
Boiling-Point (E).

٢٩١٩٤ - **نُقْطَةُ الْبُرُوز**
Point d'émergence (F).
Emergence-Point (E).

٢٩١٩٥ - **نُقْطَةُ الْجَدْم** ، **نُقْطَةُ التَّقَاع**
Point de section (F). Section-Point (E).

٢٩١٩٦ - **نُقْطُور** ٥
Necturus (S). Necture (F).
جنس حيوانات قازبة من السرفوتيات وفصيلة القطر وسيات.
أتوافع المعروفة قليلة المدد موطنها أمريكا الشمالية .
تألف المنافع وصفات مجاري الماء || أجسامها شبه اسطوانية
الشكل ، طولها من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها شبه
مخروطية الشكل . عيونها شديدة الصغر . قوائمها قصيرة ،
رباعية الاصابع || أتوافعها الى السرة المرقوشة بالاسود ||
قوتها البديدان والدوبيات الصغيرة .

٢٩١٩٧ - **نُقْطُول** ٥
Noctule (F).
نوع من الخفافيش المفيدة يدعى غُشَّافُ الحَقِّق ، اطلبه .

٢٩١٩٨ - **نَقْب** ، **نَقْبِيص**
Ecllosion (F).
Hatching (E).
هو في الطير زمن انفلاق البيض عند اكتمال الخلقة وهو
في السمك زمن انبجاج السرة اما في الحشرات فهو زمن
نقب المكن .

٢٩١٩٩ - **نَقْلُ الْحَقِّ**
Transfert (F).
Transfer, Conveyance (E).
هو ان ينقل المرم سقاً له الى غيره . وفي القانون التجاري

المنافع ومجاري الماء . مسرعه دجوي . يعيش نحو عشر
سنوات . قوته الحشرات الصغيرة والبديدان والذباب || جسمه
صغير القد يطول نحو ٥ سم . عند الذكر ونحو ٦ سم .
عند الانثى . رأسه صغير الحجم : عيناه جاحظتان . حنكه
مستعرضة الشق ، مسن الفك العلوي . قائمتا الايمانين
قصيرتان ، رباعيتا الاصابع الطليقة ، اما الخلفيتين
فمتطيلتان ، خاصيتا الاصابع المفيدة بحظاب كامل .
جلده مغطى القشار يفتر عنه لمسه رغبة بيشاء نافطة
تثير العكاس والدسوس . ثوبه العلوي الى السرة الخطية
السماح الموج تملوها نمشة قائمة ورسنجة خضراء . بطنه
وسائر صفحته السفلى الى السرة الناعمة تملوها مشحة
صفراء ورقشة زرقاء خفيفة || بيائها الشدي يستمر نحو
اربعة اشهر . يتميز ببلغته الصوتية الرائعة الجزوية
الشكل والقدر . نقيقه قصير النغمة ، متتابع الايقاع ،
شديد الازعاج .

٢٩١٧٦ - **نَقَّالَة**
Brouette (F). Wheelbarrow (E).
عجلة يدوية بمجزة واحد بدولاب يستعملها الانسان لنقل
الاياع الخفيفة .

٢٩١٧٧ - **نَقَب**
Défonçage, Défoncement (F).
Subsoil ploughing (E).
كري التربة الزراعية لقلبها وتفتيت مدرها وتنظيفها
واعدادها للزراعة القابلة .

٢٩١٧٨ - **نَقَّح**
Silice pure (F). Pure flint (E).
الخالص من الريل .

٢٩١٧٩ - **نَقْدًا ، عَدًا**
Comptant (F).
Spot cash, Ready (E).
طريقة دفع ثمن مبيع عند تسلمه او اجرة عمل عند نهايته .

٢٩١٨٠ - **نَقْدَة** ٥
هي النعفة ، اطلبها .

٢٩١٨١ - **نَقْدَة**
هي الكروياً (الانزوي) والكزبرة (ابن الاعرابي) .

٢٩١٨٢ - **نَقْرَة مَرَّة**
Taches amères (F).
Bitter pit or stippen (E).

عارض يصيب ثمار التفاح الخزونة في البراد ، اسبابه المروقة
حتى الآن تعود الى الشفوذ في التغذية والري والى مناخ بعض
المناطق || عظهوه الخارجي يقع مسندة منخفضة السطح
قطرها من ٣ الى ٦ م . وبعها الداخلي يغور من ٢ الى
١٠ م . فيسبب تغير لون اللباب المطوب ويكسبه مرارة
المذاق .

٢٩١٨٣ - **نَقْرُوس**
Simulle (F).
هو التجرس والقرس ، اطلبها .

٢٩١٨٤ - **نَقْشَارَة** *
Phyllopeuste, Phylloscopus (S). Pouillot (F). Wil-
low warbler (E).

جنس طير من فصيلة الدخليات . انواعه المعروفة عديدة ،
اعطاهها العالم القديم ، منها الارباد والقواطع التي تجوب الشرق
والغرب . جميعها صغيرة القد ، مزركبة الالوان بكث
فيها الاسفر والاشقر . قوتها الحشرات والمهورم . تألف
الحادق والجنتان القريبة من العمران . تدن في الشجيرات
والانجار المتفرقة . اعشاشها مخروطية الشكل جانبيه المداخل
تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حصفنتها نحو



نقشاة



نقون

ياروح من ٨ الى ١٢ سم. ثوبها رصاصي اللون لامع المواجه. يكثر وجودها في الصيف. تمتع مكها على دود القطن فينتفخ عن رقات ذرية دقيقة تدسل وتنتقل في جسم العائل ونمته.

٢٩٢١٠ - نُقْرِيَّة فَضِيَّة * *Gonia capitata* (S).

ذبابة نافعة من النقرات طويلة راسها من ١١ الى ١٣ سم. رأسها فضي اللون. جسمها رصاصي اللون تملوه خلة فضية وشعوط سم. تمتع مكها على الدودة القارضة فينتفخ عن رقات نهمة تنتقل في جسم العائل ونمته.



نقير اصفر الجناح



نقير اهل

٢٩٢١١ - نُقْرِيَّة مَيْدُول * *Phryxe vulgaris* (S). *Phryxe vulgaire* (F).

حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة النقرات. جسمها بطول من ٦ الى ٩ سم. قشورها متكاثف الحمل والهلل. ثوبها الى الطحلة الموشجة بالابود. رأسها كبير، احمل اللون. غطها مستدل الطول. زباناها صغيران، نحيلان. عينهاا ناضرتان، ارجوانيتان. روشاها كيرتان، اصفر القاعده. قوائمها الى السرة السوداء. تظهر الحشرة الجلجلة من نيسان الى تشرين الثاني. وهي مبدولة في كل مكان تكثر فيه الازهار || يرقاتها تتطفل على اساريع الحشرات من مختلف الفصائل.

٢٩٢١٢ - نُقْرِيَّة مَدْمَلَك * *Gymnosoma rotundatum* (S). *Gymnosoma arrondi* (F).

حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة النقرات. جسمها صغير القد، متكاثف الحمل، بطول من ٥ الى ٧ سم. رأسها كبير الجرم، اصفر اللون، مدفع المواجه. غطها مستدل الطول. زباناها دقيقان، صغيران. عينهاا كيرتان، ارجوانيتان، صدرها الى الصفار المذهب. بطنها شبه مكور الشكل، اصفر اللون، صناعي المواجه. تملوه، في نغمه، ثلاث نقط سود. روشاها موشجان بالاصفر. قوائمها الى السرة السوداء. تظهر الحشرة الجلجلة من ايار الى آب. سرسوها البراري حيث تكثر النباتات الصيوانية الازهار || يرقاتها تتطفل على نصفيات الاجنحة.



نقير رصاصي



نقير فضي

٢٩٢١٣ - نُقْرِيَّات *Tachinidae* (S). *Tachinidae* (F).

فصيلة حشرات ذبابة نافعة من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها كثيرة العدد مختلفة الالوان والاحجام. تحمل على بطونها مستوى حيلتها الطرية بعض الهلل الشاك القاسي. قوتها مفر الازهار وارقاها || يرقاتها طفيلية تركب اكثر الحشرات انحصا مستقيبات الجناح ونصفيات الاجنحة والنشائيات والحشغيات واللمعدات. وهي لا تفرق بين الحشرة والاسروع والخادسة.



نقير مدلول

٢٩٢١٤ - نُقْرِيَّات *Bothrioccephalidae* (F). *Bothrioccephala* (S). *Bothrioccephale* (F).

فصيلة دود من المنطقيات العريضات تتميز بملقاتها المسرقة العادمة الحجيرات التناسلية.

٢٩٢١٥ - نُقْرِيَّة * *Bothrioccephalus* (S). *Bothrioccephale* (F).

جنس ديدان قدية مستطيلة من نصية النقرات. انواعها عديدة جميعها مؤذية تتطفل على الحيوانات الفقارية.



نقير مدملك

هو نقل ملكية السند الاسمي من اسم البائع الى اسم المشتري.

٢٩٢٠٠ - نُقْلُ الْمَلِكِيَّةِ *Mutation* (F). *Transfer* (E). هو كل عمل قانوني ينقل من شخص الى آخر ديناً او حقاً عينياً.

٢٩٢٠١ - نُقْم *Point de pivot* النقطة المحورية التي تركز عليها قياسات المدار.

٢٩٢٠٢ - نُقُوس * *Copernicia* (S). *Copernicie* (F). *Wax palm* (E). *Carnaubapalme* (D). *Copernicia* (I).

شجرة من فصيلة النخلات، اعطائها الاقاليم الحارة الرطبة. جذعها مالم السماء بطول نحو ٨ امتار. اوراقها مامية الاركناز مريحة الشكل مستطيلة الزناد المدام الشكل. فصلها جامد الصفصه، مالم البشرة، جبل الشفار الزاهي. نسيجه مرغوب فيه يستعمل في صناعة القيمات. ثماره زيتية المادة يستخرج منها دهن النقوس الشائع الاستعمال.

٢٩٢٠٣ - نُقُوسِي، عَصْدِي *Huméral* (F). *Humeral* (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنقا.

٢٩٢٠٤ - نُقْبِيَّة *Lacunelle* (F). *Lacunula* (E).

٢٩٢٠٥ - نُقِير *Hile* (F).

٢٩٢٠٦ - نُقِير *Auge* (F). *Trough* (E).

جرن مستطيل يستعمل لاحكام الماشية او لاسقاطها.

٢٩٢٠٧ - نُقِيرِ اصْفَقِ الْجَنَاح * *Phasia crassipennis* (S). *Phasie crassipenne* (F).

حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة النقرات. جسمها متوسط القد، متكاثف الحمل والهلل القصير، بطول من ٨ الى ١١ سم. رأسها كبير، افس، اصفر اللون. غطها مستدل الطول. زباناها نحيلان، صغيران. عينهاا كيرتان، ارجوانيتان. صدرها قديمي الشكل، اصفر اللون، بنفسي الحمار والقاعدة والتدليع. بطنها بنفسي الشكل. اصفر اللون، تملوه بقعة بنفسية. روشاها كيرتان، متساكان، ابيضان، اصفر الحمار الاسامي. قوائمها الى الخنطي الصناعي. ارساها سود || تظهر الحشرة الجلجلة من حزيران الى ايلول. سرسوها البراري وكل مكان تكثر فيه الازهار || يرقاتها تتطفل على مستقيبات الجناح ولا تفرق عند الحاجة عن نصفيات الاجنحة.

٢٩٢٠٨ - نُقِيرِ اَهْلَب * *Mintho* (S). *كَلَا* (S).

ذبابة نافعة من النقرات. طولها نحو ١٠ سم. رأسها وصدرها الى الزرقة اللامعة. بطنها اجر اللون يعلوه حلب كفيف اسمر || يرقاتها تعيش على مكن غديات الاجنحة. ج. انقرة.

٢٩٢٠٩ - نُقِيرِ رَصَاصِي * *Eutichinus larvarum* (S).

ويدعى تاكيننا كبيرة. ذبابة نافعة من النقرات. طولها

انها تبض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٨ يوماً || اعرف انواعه واشهرها النكات الاسود الذيل .

٢٩٢٢٥ - نَكَاتٌ اَسْوَدُ الذَّيْلِ *

Recurvirostra avocetta (S). *Récurvirostre avocette*, *Avocette* (F). *Avocette* (E).

طائر من النكات طوله براوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. ثوبه الى البياض الناصع باستثناء منقاره ورأسه وظهوره وذنبه وكل جناحيه واباهرهما السود || يحوب العالم القديم في طلب المصيف والمشق. يرتاد الشطوط والايوار والمناقع وبحاري الماء || يعيش اسراباً كبيرة براوح عددها من ٥٠٠ الى ٥٠٠٠ .

٢٩٢٢٦ - نَكَاتِيَّاتٌ

Récurvirostridae (F). *Recurvirostridae* (E).

عمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض وسيدة الجنس قليلة الانواع تتميز باسطالة ودقة منقائدها المدببة الملائق المنعكسة الى العلاء . اجنحتها مستطلة ذلقة تلحف الذنب . ارساغها رفيعة ، مستدقة ، سرديّة البشرة . اصابعها كفية ، حطائها كامل موصّل .

٢٩٢٢٧ - نَكَاسٌ

النكاس والانكاس نوع من السلك عظيم جداً (التاج) .

٢٩٢٢٨ - نَكَافٌ

Parotidite (F). *Parotitis* (E). النكاف ويُدعى التهاب الكفة هو التهاب الغدة الكفية .

٢٩٢٢٩ - نَكْبَاءٌ

هي الريح التي تدر دون ان يتبين لها مهب .

٢٩٢٣٠ - نِكْتِيبٌ جَبَّارٌ *

Nyctibius grandis (S). *Ibijau géant* (F).

طائر راس من فصيلة السبديات . موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية . يألف الاجراع الكثيفة البعيدة عن كل عرآن . يسرح في الليل ويبعث طوال النهار جاثماً على غصن شجرة لا يتحرك البتة || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٥ سم. بسطته نحو ١٣٠ سم. ريشه شديد التمعبة متوسط اللون . ثوبه الى الطلحة الصفراء المراج يعلوها تجنّيع اسمر وتشيز اشقق ورقة ريداء . رأسه مستعرض الجرم . عيناه كبيرتان كسنتينان . رموش عينيه طويلة . سباله كثيف مستطيل . منقاده قليل الاستداد الخارجي . عتقه محجن البهرة ، غريض القاعدة ، عظيم الشدة . عتقه بالغ القصر . جناحه رحب مستطيل . ذنبه مستدير الطرف . رشفاه قصيران . اصابعه مستطيلة قوية || طيرانه خفيف الحركة ، سريعها . سميح على الارض احرق . قوته الحشرات من جميع الفصائل والترتب ومن جميع الاحجام || يلدن عشه في تجاويف الاجمار . الاثني تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٢٣١ - نِكْتِيلٌ *

Noctilio (S). *Noctillon* (F). جنس غفاقيش من عمارة الرماصات يتميز باسطالة رأسه وفوطيته ، بانشارم شفته العليا المتجمعة وبطول جناحه . له نوعان موطنها جزر الانتيل || يعيش جماعات قليلة العدد . يسرح من الفسق الى الفجر . قوته الحشرات على اختلافها والاسماك الصغيرة . يألف المداور وواقاب الصخور البحرية .

تميش حياتها البدائية في الماء حيث تنطفل على بعض الاسماك وتنقل معها الى معدة الانسان || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٩٢١٦ - نُقَيْرِيَّةٌ عَرِيضَةٌ

Bothriocephalus latus (S).

اكبر انواع الديدان النقرية القدية التي تنطفل على الانسان طولها نحو ١٠ امتار . رأسها ثنائي الوافض ، عادم الكلايب ، مغروطي الشكل ، مقطوم المقدم . جسمها عديد السكم المستعرضة الضيقة . يعتقد ان ملقوحاتها المهدية التي تميش في الماء وتنطفل على بعض الاسماك منها السلمون والثرثرة ، تنطفل بذات الاسلوب على بعض الناس الذي يتسبحون في بعض المياه المذبة .

٢٩٢١٧ - نُقَيْشَةٌ * ، قُبْعَةُ الْأَمْبَرَاطُورِ

Spirifer (S). *Spirifère*, *Chapeau de l'Empereur* (F). *Spirifer* (E).

جنس حيوانات من الرخويات عضديات الارجل وفضيلة النقيشيات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الطبقة الدفونية . انواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة القد ، شوزنها قريب الشبه بالقيمة التي كان يرتديها الامبراطور نابوليون . جيمهما نظامية التركيب ، متساوية المصارع الا ان اليسارية منها اقل احديداً من اليمينية || تعيش لاصقة بالصخور المنورة .

٢٩٢١٨ - نُقَيْصٌ *

Imperfecti تمت ترميزي توصف به الفطور الناقصة التركيب او الشاذة الخرومة من بعض مراحل التطور .

٢٩٢١٩ - نُقَيْشِيَّاتٌ ، نُقَيْشَاتٌ

Infusorios (F). *Infusoria* (E). صف حيوانات دنيا من الاولى تشمل السوطيات والمهديات وعدة رتب وفضائل .

٢٩٢٢٠ - نُقَيْشَةٌ *

Neonate (F). *Neonate* (E). تمت ترميزي يطلق على الحشرة المستجدة النقف .

٢٩٢٢١ - نُقَيْقٌ

Coassement (F). صوت الصفدع . نق الصفدع : صات .

٢٩٢٢٢ - نُقَمٌ

Ligne médiane de la route (F). خط وسط الطريق .

٢٩٢٢٣ - نَكَاةٌ *

Paraphyse (F). اخلية المستطيلة في نكة الفطور الزقية والدعامية .

٢٩٢٢٤ - نَكَاتٌ

Recurvirostra (S). *Récurvirostre* (F). جنس طير من النكاتيات . انواعه اربعة جميعها كبيرة القد طولها براوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. منقائدها مستطيلة ، منعكفة الى العلاء ، تشبه السيف . ألوانها بلقاء اللون يكثر فيها الابيض || تجوب السبلاد الاسيوية والاروية والافريقية . يرتاد غشاف الانهار وشطوط البحار والمناقع والايوار . قوتها القشريات والرخويات والديدان والدعاميص والحشرات . تنكت الحما والخز والرمال في طلبها || تدن اعشاشها في التراب ، افاحيصها مستطيلة الشكل قليلة المعق .



نقيرة



نقشة



نكات اسود الذيل



نكيب جبار



نكروبة

أوراقه كبيرة فارشة قطر تفصلها براوح من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهارها صفراء اللون قطرها براوح من ١٠ إلى ٢٥ سم. معاليقها تطول من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. || جذاميره نشوية المادة، سكرية الطعم، مأكولة. تنوره يستمر من تموز إلى آب.

٢٩٢٤٦ - **نَلْمِبُو الشَّرْقِيّ * ، نَلْمِبُو قُرْبِيّ**
بَقْلِي قُرْبِيّ ، جَامِسَة

Nelumbo nucifera, Nelumbium speciosum (S). Nélumbo d'Orient, Fève d'Egypte, Lis rose des Egyptiens, Rose du Nil (F). Nelumbo, Egyptian bean (E). Nelumbo, Nussmummel (D). Nelumbo (I).

نوع من النلبو البروتي المبدول. مهد مياه الهند وافريقية الشرقية. يكثر في مياه النيل. أوراقه كبيرة القذ مستديرة النصل قطرها براوح من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. اعتاقها شائكة. أزهاره وردية اللون أو عاجية، مستديرة العرف القلح، كبيرة القذ، قطرها براوح من ٢٠ إلى ٣٥ سم. معاليقها تطول من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. || ثماره نشوية المادة، مأكولة. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٩٢٤٧ - **نَم**
Philoptère (F).
هو القردو جالس جلدية ذرية القذ من التمنيات. انواعه عديدة منها نم البط والجوام والحمام والزنج والتسور.

٢٩٢٤٨ - **نَمَآة**
Trichodectes (F).
هي النمة، من الحشرات الجلدية التي تتركب الحيوانات اللادجة.



نلبو اصفر

٢٩٢٤٩ - **نَمَاسَة ٥**
Platystoma (S).
Platystome (F). Platystoma (E).

جنس حشرات من فصيلة الناسيات ورية ذوات الجناحين. انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اقطار العالم اخصها البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول م ٥ إلى ٨ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستعارية قصيرة، ثلاثية الفصل، تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطائها معتدلة الطول. ملاسها صغيرة. كواسلها شبه بيضية الشكل. بطونها يرمية تنتهي بمزات ذرية. رواشها مبقجة. قوائمها نشطية يعلوها في اقتخاذها هلب دقيق || جميعها واسعة. تألف الحراج والغابات وكل مكان تكثر فيه الازهار. يرقاتها خاضلة او دامت.

٢٩٢٥٠ - **نَمَاسِيَّات ٥**
Platystomidae (S).
Platystomidés (F). Platystomidae (E).

فصيلة حشرات من رية ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها متفارقة القذ، تطول من ٤ إلى ١٢ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستعارية قصيرة، ثلاثية الفصل. كواسلها شبه بيضية الشكل. بطونها يرمية. رواشها مبقجة. قوائمها قياسية || الحشرة الجملانة واسعة اما البرقة خاضلة وبعضها دامن ومنها التي تمش على البصل وفي دوفص الزنايق || اشهر اجناسها النامشة.



نلبو الشرق

٢٩٢٥١ - **نَمَاشَة**
Odontoglossum (S).
Odontoglosse (F). Odontoglossum (E).

جنس نباتات اممية برية وتريتين من فصيلة السحليات. انواعها المعروفة تقارب السنين جميعها من نبوت جبال

٢٩٢٣٢ - **نَكْشَة** قلة عشب المرعى أو البرية .

٢٩٢٣٣ - **نَكْرُوبَة ٥**
Necrobia (S).
Nécrobie (F). Necrobia (E).

جنس حشرات خنفسية من فصيلة الزوجيات. وربة غديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد || اجسامها صغيرة القذ. اطوالها تراوح من ٤ إلى ٧ سم. اقواسها وحيدة اللون او ثنائية. الوجبة اللون زرقاء. اما الثنائية فزرقاء وحمراء || مسرجها بجوي. تعيش على المواد العضوية والجلود الجافة والفراء.

٢٩٢٣٤ - **نُكْرُور الشَّط**

حشرة تدعى ذقة الشامل، اطلبها.

٢٩٢٣٥ - **نَكْش ، نِكْاش**
Plochage (F).
Digging (E).

اصلاح التربة للزراعة واقتلاع الدغل منها أو اصلاح التربة المخرسة وتفتيت مدرها وتنظيفها من الاشاب.

٢٩٢٣٦ - **نَكَمَة**
Hyménium, Chapeau (F).
Hymenium, Pileus (E).

هي غلفة الفطر اي بجنبته التي تحوي جهاز الاخصاب والذكائر.

٢٩٢٣٧ - **نَكَمِيّ**
Hyménial (F).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة خاصة بالنكمة.

٢٩٢٣٨ - **نَكَمَة**
Parotide (F). Parotid gland (E).
هي الغدة النكفية اي بنت الاذن.

٢٩٢٣٩ - **نُكْلُون ٥**
Nucléon (F). Nucleon (E).
التكلون نامة تؤول نواة اللدريه (يوجد نكلونات اجابية تدعى بروتون ونكلونات حيودة تدعى نرون).

٢٩٢٤٠ - **نُكْلُونِي ٥**
Nucléonique (F).
Nucleonic (E).

نمت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالنكلون.

٢٩٢٤١ - **نَكْمِي ٥**
Nécomien (F).
ساف حصيلي يعتبر قاعدة سافات الطبقة العلباشيرية السفلى.

٢٩٢٤٢ - **نَكِيب** النكيب : دائرة الحافر والخف.

٢٩٢٤٣ - **نَلْكَ**
Aubépine azérolier (F).
هو الزعرور العادي، اطلبه. الواحدة نلكة.

٢٩٢٤٤ - **نَلْمِبُو**
Nelumbo (S).
Nélombo (F). Nelumbo (E).

جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النيلوفرديات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها مياه البلاد الحارة. جذاميرها معادة. اوراقها مستطيلة الاعناق مستديرة النصل. أزهارها كبيرة القذ. ثمارها كروية الشكل مغسمة في طست مستعرض الاطار. بزورها نشوية المادة المأكولة || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٩٢٤٥ - **نَلْمِبُو اصْفَر * ، نَلْمِبُو اصْفَر**
Nelumbo lutea (S). Nélombo jaune (F). Yellow nelumbo (E).

نوع من النلبو البروتي. مهد البلاد الامريكية.



نماشة كبيرة الزهر



نمت الغنم



نمة البقر



نمة الخيل



نمة الحصان



نمة المئزر



نمة الكلب

أمركة الاستوائية. بعضها جميل الازهار كبيرها شائع الزراعة التريبيية المركبة في المصاري والمنازل || اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة، قليلة العدد. ازهارها عقدية التجميع، تتركز على شاربغ ليلية مصمتة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي :

٢٩٢٥٢ - نَمَاشَةُ كَثِيرَةِ الزَّهَر *

Odontoglossum grande (S).
Odontoglosse à grandes fleurs (F).

نوع من الناشة. اوراقها سنانية النصل، مستطيلة، قليلة العدد، تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. شراخها يحمل من ٤ إلى ٩ ازهار. قطر الزهرة يراوح من ١٠ إلى ١٨ سم. لونها الى الصفرة البرتقالية يعلوها تمشيش جوزي. شيفيات الازهار تبتية اللون صفر الحواج || تنويرها يستمر طوال فصلي الخريف والشتاء.

٢٩٢٥٣ - نَمَاشَةُ مُشْتَجَّة

Odontoglossum crispum (S).
Odontoglosse crispé (F).

نوع من الناشة. اوراقها عصفية الشكل تطول نحو ٤٠ سم. شراخها يحمل من ١٥ إلى ٢٠ زهرة. قطر الزهرة يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. بتلاتها وفصلها متواجبة النصال لونها الى البياض العاجي تعلوها نقطة كستنية سفعا لانظامية الترتيب. شيفيات الازهار صفراء اللون، اهليجية الشكل، مدبية الاطراف || تنويرها يستمر من اوائل شباط الى اواخر نيسان.

٢٩٢٥٤ - نَمَاص
Fil fin (F). Fine thread (E).
غيط الامة من اي مادة كان.

٢٩٢٥٥ - نَمَاشَةُ
Vertex
الناغة : اعل الرأس وتعرف بالنافوخ.

٢٩٢٥٦ - نَمَال
Myrmécophile (F).
نمت تعريبي يطلق على النبات الذي يواي النمل ويعوله.

٢٩٢٥٧ - نَمَام، نَمَام المَلَك
Thym glabre (F).
هو الستر الامرط، اطلبه.

٢٩٢٥٨ - نَمَامَة
Pigamon (F).
هي التليب، اطلبه.

٢٩٢٥٩ - نَمَامِيَّة
Anabolisme (F). Anabolism (E).
علم يبحث في دور شموخ الكائنات الحية.

٢٩٢٦٠ - نَمَت
Hippocrepis (S). Hippocrépide (F).
جنس نباتات برية من فصيلة القرنيات الفرائشية. انواعه المبرقة ١٢ منها الجنيات والجنيات والاعشاب. اوراقها مركبة مشطية مستطيلة الاعناق. ازهارها صفراء اللون، صبوانية التجميع طويلة المالحق. ثمارها قرن مفلطحة رقيقة غمرمة الاطراف || اشهر انواعه واكثرها انتشاراً نمت الغنم.

٢٩٢٦١ - نَمَت الغنم *

Hippocrepis cornosa (S). Hippocrépide à toupet, Hippocrépe à toupet, Fer à cheval (F). Tufted horse-shoe vetch (E). Schopfhufeisenklee (D). Ferro di cavallo, Mandorlo dei boschi (I).

نوع من النمت الطبي البري المرعوي. تمتلغ الغنم بشهوة

ويجود عليه درها. عشبته معمرة فروع. اوراقه مركبة ريشية وريّة التجميع. وريقاته بيضيه النصل، داكنة الخضار. ازهاره طرفي، صيواني، رباعي التركيب او خاسية. ثمار قرن مفلطحة، مقوسة، غمرمة الخار. اوراقها وازهاره وبودره طيبة، مرة المذاق، قابضة، تغيد المعدة وتقويها، تدمل الجراح وتغني اثرها.

٢٩٢٦٢ - نِمَّة البَقَر
Trichodectes scalaris (S).
Trichodecte du bœuf, Petit pou du bœuf (F).

حشرة من النيمات. تركب الانبشار وتعيش على فوف واوساخ جلودها. طولها يراوح من ١ الى ٢ م. لونها الى الصفرة واسودها متساويا الغرض. تحمل في وسط كل سكة من سكم بطنها نقطة سمراء بيضاء. تكثر على الظاهر والباطل والفخذ. تسبب تمقيصاً يقود الى الحكاك.

٢٩٢٦٣ - نِمَّة الخَيْل

Trichodectes vestitus (S). Trichodecte du cheval, Petit pou du cheval (F).

حشرة من النيمات تركب الخيل وسائر الدواب. طولها نحو ٢ م. ثوبها الى الصفرة اسودها قصير مستعرض. تحمل في اواسط السبع سكم الاول من بطنها تجذيع متعرض اسمر. تعيش على فوف الاكتاب والمعا في فتصايق الدواب وتحملها على الحكاك.

٢٩٢٦٤ - نِمَّة الضَّان *

Trichodectes sphærocephalus (S). Trichodecte du mouton, Pou du mouton (F).

حشرة من النيمات تركب الأغنام فتؤذيها. طولها نحو ١ م. وخمسة عخطوط. لونها الى البياض الاغبر يعلوها موج اسفع. تعيش على فوف الجلد وتقرض الصوف وتقلق راحة الغنم وترعبيها.

٢٩٢٦٥ - نِمَّة العَنَز *

Trichodectes climax (S). Trichodecte de la chèvre, Pou de la chèvre (F).

حشرة من النيمات تركب الماعز. طولها نحو ١ م واربعة عخطوط. لونها الى الصفار الخشن يعلوها تجذيع اسود. تعيش على فوف الجلد وتقرض الشعر فتؤذيها وتسبب حكاكا مزعجاً يهيج الجلد وقد يدميه.

٢٩٢٦٦ - نِمَّة الكَلْب *

Trichodectes latus, T. canis (S). Trichodecte du chien, Gros pou du chien (F).

حشرة من النيمات تركب الكلاب الفتية والحرة. طولها يراوح من ١ الى ٢ م. لونها الى الصفار الفاتح الباهت يعلوها توشيح اسمر. تعيش على الفوف وتقرض الورب وتسبب الحكاك الدامي.

٢٩٢٦٧ - نَمِر، نَمِر
Felis pardus (S).
Panthère, Léopard (F). Panther, Leopard (E).

حيوان مفترس من فصيلة السنوريات وريّة اللباس. يقال انه وحيد النوع عديد الضروب فوارق ضروبه تقوم على قدر الجسم ولون الثوب ورطنته || جسمه منسوب التقاطع، اهيف القد، مستدير الرأس، جميل الشكل، مرقط الثوب، مائج اللعة. يطول من ١٥٠ الى ٢٤٥ سم. بما في ذلك الذنب الذي يراوح طوله من ٦٥ الى ٩٠ سم. مزاجه كراجل الأسد الا انه اقهر واخيب واعنف، لا تروعه سلقه احد. رغم ضعف حزمه وشديد حرصه || كنيته ابو الابرء وابو الاسود وابو جمدة وابو جهل وابو غطاف



نمر أسود



نمر الأطلس



نمر الحبشة



نمر الشرق



نمر الهند



نمر ملطخ



نمرود صومرا

٢٩٢٧٨ - نَمْرُ
Cirro-cumulus هي النشاص ، نوع من النجوم العالية .

٢٩٢٧٩ - نَمْرُ
Nemorrhæus (S). Nemorrhæus (F). Nemorrhæus (E).

جنس حيوانات لبونة عاشية بمجرة من فصيلة الإيليات . أنواعه المعروفة ستة موطنها يمتد من الهند إلى الصين وصومرا واليابان . تألفت غابات الغضاب والجبال ، ملجأها الحيواني جامعي . جماعاتها إجمال قليلة العدد || أجسامها متوسطة القد . قرنوها صغيرة ، مخروطية الشكل ، متتامة الحد ، منعطفة الى الوراء . ضرووع أتاها ثنائية الإخلاف . يحمل الإناث يودم نحو ستة أشهر تنضع في تمامه يعفوا واحداً || أشهر أنواعه التالية :

٢٩٢٨٠ - نَمْرُ
Nemorrhæus bubalinus (S).

Némorrhède bubalin, Chamois de l'Himalaya (F). نوع من النمرود . موطنه يمتد من كشمير إلى حلايا وشان . يسرح من ارتفاع ١٨٠٠ الى ٣٦٠٠ م . عن سطح البحر || جسمه ربة يطول نحو ١٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه ٩٣ سم . وزنه نحو ١٠٠ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٣ سم . عند الذكر ونحو ١٧ سم . عند الإناث . رأسه معتدل الجرم . عيناه واذناه كبيرتان . قوائمه شديدة اللشظ ، ثوبه الى الكهبة السوداء رأسه وثنيج ظهره الى السمره المتباينة . عنقه وصدره الى الشققة . ذنقه ويطع الى البياض الاغبر || اجله يد سبعة انفار ، ذكر مانع وثلاث اثبات وثلاثة شواند .

٢٩٢٨١ - نَمْرُ
Nemorrhæus sumatrensis (S).

Némorrhède de Sumatra (F). نوع من النمرود . موطنه يمتد من شرقي حلايا الى برمانيه والسيام وصومرا . يسرح من ارتفاع ١٣٠٠ الى ٣٠٠٠ م . عن سطح البحر || جسمه يطول نحو ١٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه ٨٥ سم . وزنه نحو ٨٥ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٠ سم . عند الذكر ونحو ١٥ سم . عند الإناث . رأسه معتدل الجرم . عيناه كبيرتان مكحلتان . اذناه مستطيلتان . ثوبه الى الشققة السوداء يقيق في الرأس والظهر ويغير في البطن || اجله يد سبعة انفار .

٢٩٢٨٢ - نَمْرُ
Rancissement (F). Rancidity (E).

فساد في المواد الدهنية يمي الى ملاقتها ورائحتها .

٢٩٢٨٣ - نَمْرُ
Herpestes (S). Mangouste (F). Mongoose (E).

جنس حيوانات لبونة لامة من فصيلة الزباديات . انواعه المعروفة ٢٠ جميعها مستطيلة الجسم والذنب ، قصيرة القوائم ، حادة الأظافر . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل . اذناها صغيرة مستديرة . عينوها حر . اقاربها الى الكذرة . موطنها يشمل العالم القديم . تألف المناطق الحارة . تعيش قرب مجاري الماء في المقاصب والناسل والقياس . قوتها الافاعي والجربذان والعفاه وكل ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والمير . تدجن بسهولة تربى للقضاء على الفأر والجربذان والحيات || اناثها تنضع من جربون الى اربعة جراه . محاجرها أنفاق منخفضة ، ضيقة ، مستطيلة ، فردية الدعايز || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

وايو الصمب وابو رقاس وابو سهل وابو عمرو وابو المزال والاني نمره والجمع انمار ونمو ونمار || موطنه فسيح الارباء ، يشمل معظم البلاد الاسيوية والافريقية || يعيش منفردا الا في زين الكرم وقد يستمر على الفة الانثى ما بعد وضعها بثلاثة اسابيع . يقال ان يحمل الانثى لايغوق ٩٠ يوما تنضع عند تمامه ثلاثة جراه او اربعة تبصر بعد وضعها وبسبوعين وتمييز برقة امها نحو ٦ اشهر . اعرف ضروبه واشهرها ما يتبع .

٢٩٢٦٨ - نَمْرُ
Irbis (F). هو البريبس ، اطليه .

٢٩٢٦٩ - نَمْرُ
Felis pardus melas (S). Panthère noire (F). Black leopard (E).

ضرب من النمر ، متوسط الجثة اسود اللون كشمير الرقطة الكاملة . يكثر في جنوب الهند وفي جزر الزابج .

٢٩٢٧٠ - نَمْرُ
Tigre du poirier (F). حشرة مؤذية تدعى ببر الاجناس ، اطليه .

٢٩٢٧١ - نَمْرُ
Felis panthera (S). Panthère de l'Algérie, Grande panthère (F).

ضرب من النمر ، يقال انه اكبر النمرود جثة ، صغير الرقطة ، كامل الحلقة التي تنسع مع ابتعادها عن ثنيج الظهر واقترابها من البطن . موطنه يشمل كامل افريقية الشمالية اخصها جبال الأطلس .

٢٩٢٧٢ - نَمْرُ
Felis pardus nimr (S). Panthère de l'Afrique (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة اسود الرقطة امغر الحلقة الناقصة . موطنه الحبشة والصومال .

٢٩٢٧٣ - نَمْرُ
Felis pardus orientalis (S). Panthère de l'Amour (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة جزوي الرقطة الصنائية اختار . موطنه حوض نهر الامور وجباله .

٢٩٢٧٤ - نَمْرُ
Felis pardus chinensis (S). Panthère de la Chine (F).

ضرب من النمر . متوسط الجثة اسود الرقطة الكبيرة والمتقطعة . موطنه الصين والمنديل .

٢٩٢٧٥ - نَمْرُ
Felis pardus antiquorum (S). Panthère de l'Inde (F). Leopard (E).

ضرب من النمر ، كبير الجثة امغر الرقطة الصغيرة اللانقاسية الشكل . موطنه الهند .

٢٩٢٧٦ - نَمْرُ
Felis pardus tialiana (S). قَبِلَان .

ضرب من النمر متوسط الجثة ، اسود الرقطة ، اصعب الخمار ، منتشر الحلقات المفتوحة . موطنه يشمل الفرس وسوريا وركيا .

٢٩٢٧٧ - نَمْرُ
Felis nebulosa (S). Panthère longibande, Diardi (F). Clouded leopard (E).

ضرب من النمر ، يتميز باستطالة رقطة وصلقاته اللانقاسية الحجم . موطنه جبال الهند وبرمانيا وبلق وجزر الزابج .

٢٩٢٩١ - نمّشة الزيتون * Aonidiella malei (S). Cochenille vermillon de l'olivier (F).

حشرة دسوسية من القرميزات تعمرّي الزيتون في أوراقه قسّية إلى حله. موطنها بلاد المغرب. يكثر وجودها في مراکش والجزائر || جلبها الرّسّي عند الاثنى مستدير الشكل، قزمي اللون، نودلي السرة المركزية النّعم، ظهره براوح من ٢ م. إلى ٢ م. وثلاثة خطوط. وهو عند الذكر بيضي الشكل، قطبي السرة، قزمي اللون، يطول نحو ١ م. وأربعة خطوط || لها جيلان في الحول. انثاها تضع من ٤٠ إلى ٦٠ مكنة يظرف ثلاثة أسابيع. اضرارها لاقاسية لانها منطوة بكثرة وجودها على الأوراق. وهي تركب التصل على صفحتيه تنقص عصارة الخلايا وتسبب بالنتيجة بياض الأوراق || تكافح باستعمال احد الحواشِر الفعالة مزوّجا بالزيت المعدني الأبيض أو بالزيت النباتي.

٢٩٢٩٢ - نمّشة الليمون الحامض * Chrysomphalus dictyospermi (S). Pou rouge des oranges (F).

حشرة ناهمة من القرميزات، تركب الكثير من النباتات الشجرة والأزبيبية اغصانها الحشيشات || يقال ان موطنها الاصل كان الشرق الاقصى وقد انتشرت في معظم اقطار العالم واصبحت من آفات حوض البحر المتوسط وبلاد القرم بعد الصين واليابان وزيلندا الجديدة وأستراليا والانتيل وجاباكا والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة ... جلبها الرّسّي بيضي الشكل ثلاثي التّخذيد نودلي الطرف القطبي الاوسط لونه الى الحمرة المفرّاة القائمة يحفظها اطار اطحل الاثنى طول نحو ٢ م. والذكر ١ م. وثلاثة خطوط. والحشرة عند تجميدها عن رّسها ذكرًا كانت او انثى تبدو ريمية الشكل صفراء اللون خضراء المواج اللازم || ايجيالا الحولية براوح من ٢ م. إلى ٤ م. وهي تتحمل الحرارة القصوى المطلقة حتى ٤٥ م.غ. والحرارة الدنيا المطلقة حتى ١٠ درجات تحت الصفر || اضرارها في الحشيشات والاعلام || جلبها الاثنى تركب الاوراق والافانثا تنقص العصارة وتسبب الذبول وتركب الثّار فتعيق نموها وقد توقفه وتسبب جفاف الالباب وتعمس الحصوص || تكافح باستعمال التبخير السيانيدريكي ومنهم من استعمل الزيوت البيضاء عن احد الحواشِر الفعالة غير ان نتائج التبضخ لا توازي التبخير || وهناك عدة حشرات خائلة تقضي على هذه النمّشة اغصانها من الصفريرات اي بنات النقا ومن الدسوقيات اي بنات العيد.

٢٩٢٩٣ - نمّشة فلوريدا Chrysomphalus aonidum, C. ficus, Aspidiotus ficus (S). Pou de Floride (F). Black scale (E).

حشرة ناهمة من القرميزات تركب الكثير من النبات اغصانها الحشيشات والنخل والاهوكاتيه والنّوفا والخروع والغار والدفل واللباب والمضاض || يقال ان موطنها الاصل كان فلوريدا وقد انتشرت في معظم مناطق الليمون من اليابان الى الصين وفرموزا والهند وسريلند وب الى الانتيل وكوبا والمكسيك والبرازيل وبلاد افريقيه. وهي شديدة الاذى في مراکش والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا || جلبها رّسّي وهو عند الاناث مستدير الشكل قطره براوح من ٢ م. إلى ٢ م. لونه الى السرة الصفبسية المواج تنوصه سرة مركزية جوقية اللون ثلاثية الخطوط الدائرية. وهو عند الذكور بيضي الشكل يطول من ١ م. وضلعين الى ١ م. وأربعة خطوط. والحشرة عند

٢٩٢٩٤ - نمّشة أشعل * Herpestes albicaudus (S). Mangousté à queue blanche (F).

نوع من النمّس كبير القد طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٥ وهو ارفع قائمة من المصري وأعل منه. ثوبه الى الغبرة يعلوها تآذير حطلي. ذنبه ابيض اللون الاشمل، جتل الور. موطنه الحبشة والتاتال وغينيا والسنغال.

٢٩٢٩٥ - نمّشة بني * Herpestes fuscus (S). Mangousté brune (F). Brown mongoose (E).

نوع من النمّس متوسط القد والارتفاع طوله نحو ٤٢ سم. وذنبه ٤٥. ثوبه الى البني يعلوه تجلجج معترض اسمر. رأسه حالك السرة. قوامه سود.

٢٩٢٩٦ - نمّشة فارسي * Herpestes persicus (S). Mangousté à points dorés, M. de Perse (F). Persian mongoose (E).

نوع من النمّس صغير القد جيل الثوب المرقط بالايض والاصفر الذهبي. موطنه العراق وبلاد فارس وجورما يكثر وجوده في احواش النخل وقرب ضفاف الأنهر.

٢٩٢٩٧ - نمّشة مصري * Herpestes ichneumon (S). Mangousté ichneumon, Ichneumon, Rat des Pharaons (F). Egyptian mongoose, Ichneumon (E).

نوع من النمّس موطنه حوض البحر المتوسط. يكثر في البلاد المصرية حيث كانوا يجلونه في زمن الفراعة. جسمه مستطيل الشكل، قصير القوائم، طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٠. ثوبه الى الصفار الاشهب يعلوه توشم اطحل. رأسه وظهروه اميع لونًا من سائر جسمه. قوامه سود.

٢٩٢٩٨ - نمّشة هندي * Herpestes griseus, H. mongo (S). Mangousté mongo (F). Indian mongoose (E).

نوع من النمّس متوسط القد والعلو طوله نحو ٤٠ سم. وذنبه ٣٥ ثوبه الى الصفار الخطي المواج يعلوه توشم اطحل ونمّشة بياض. رأسه عايق اللون. قوامه الى السرة. موطنه الهند والافغان.

٢٩٢٩٩ - نمّشات Ichneumonidae (S). Ichneumonidae (F). Ichneumonidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المخصورة. اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠٠٠ جميعها مستنقة الاجسام. اطولها تراوح من ٥ الى ٢٠ م. ألوانها عابقة يكثر فيها الاسود وبعضها عرز البطن بالاسود والاصفر || رققاتها طفيلية تمشش باكثر يها على عوائلها من حرششيات الاجنحة والندليات.

٢٩٢٩٠ - نمّشة * Ichneumon (S). Mouche vibrante (F).

جنس حشرات صغيرة من النمّشيات انواعها المعروفة زهاء ٥٠٠ جميعها مستنقة الاجسام المستطيلة. اطولها تراوح من ١٠ الى ١٦ م. ألوانها مختلفة الالوان يكثر فيها التحرز بالاصفر والاسود. ورافشا ثنائية الزوج شفافة تحمل مشعة خفيفة من الالوان الزاهية || رققاتها تنطفل على الكثير من الحشرات اغصانها الثابتة الى حرششيات الاجنحة ومنها المذفوف والكزبيبي والانتونوم والصلمل الخ ...



نمّس اشعل



نمّس فارسي



نمّس مصري



نمّس هندي



نمّشة



نمّشة الزيتون

٢٩٢٩٩ - نَمَص ، نِمَص (F). *Jonc des nattiers* (F).
هو الاسل المري لين العود تصنع منه الاطباق والعلف .

٢٩٣٠٠ - نَمَشَة
Apex, Sommet (F).

Apex, Summit (E).

النمفة هي ذروة كل عضو من الاعضاء في الحيوان او في النبات . والدورة من كل شيء اعاده .

٢٩٣٠١ - نِمْفُولَة البَشِين *
Nymphula nymphaeata (S).

Nymphule du nénuphar, Teigne du nénuphar (F).

Nymphula nymphaeata (E).

حشرة من فصيلة الناريات حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . فراشها واسمة قوتها رحيق الازهار وظلمها . رفقها خاضعة تمش على اوراق البشينة وعراسن الماء وكلمها الماء || جسمها يطول نحو ١٢ سم . بسطها تراوح من ٢٦ الى ٣٠ سم . رأسها معتدل الجرم ، قصير الحنط . عينها صغيرتان . زباناها غيطيان . ملاسها قصيرة . مرشفتها معتدل الطول . جوشنها يعلوها في الزوج الامامي زراكش بنية وصنابية ويعلوها في الزوج الخلفي تجذيع معترض وتقيع بني صنابي . اهدابها قصبية || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة

من ٢ الى ٣ ملين . وهو عند الذكر يضيء الشكل يطول نحو ١ سم . ولثلاثة خطوط . والحشرة عند تجهدها من نمرها ذكرًا كانت او انثى تبدو نضوية الشكل حنطية اللون || اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٥ هـ . انانها نبيض من ٥٠ مكنة متنها يستر نحو تراوح من شهر الى شهرين || اضرارها شديدة الاذى لانها تركب كامل اعضاء النبات المواتية اخصها الاثنان التي تجمعتها والاوراق التي تذهبها والبار التي تعطها وتصلب لهاها . تكافح اكاشمة النمشة الحمراء .

نمشة الحفصيات



نمفولة البشينة

Fourmis (F). Ants (E).

٢٩٣٠٢ - نَمَلْ

جنس حشرات من فصيلة النمليات . انواعه عديدة منتشرة في اكثر اصقاع العالم . معظمها صغير القد . تألف الحياة الجماعية ، مجموعتها تدعى جالية ودية تقم في زرية او قرية مؤلفة من عدة سراديب وانفاق ومغائر وسرير ورداء . والنمل كالنحل يقسم الى ثلاثة اقسام ، الذكور والاناث والخنات . الذكور لاملح لاسوى كرم الاناث وهي تاكل ما تجنيه العاملات . والاناث بعد كويها ورجوعها الى القرية تستقبلها العاملات بالترحاب فتخلصها من اجنحتها ثم تغذيها وتقودها الى الخاضن لبنع المازن . اما العاملات اي الخنات فهي التي تقوم بجميع الاعمال : تغيد القرية وتحي الطعام وربي الدبا والذر وتبشر على سلامة القرية تقودها غزيرة البقاء والحياة الجماعية المنتظمة في سبل مصلحة عامة لا تتعرف الى غيرها || ذكروها وانانها مجتمة باصرة . عاملاتها عادمة الجناح والبرص تتعرف على نظراتها وعل الاشياء بواسطة قوتها الاستشعارية المرفعة الاحساس . رؤسها مسلحة بفكين حادين قاضمين . قوامها دقيقة رشيقة مستطيلة تمكها من السير السريع . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .



نمل احمر

٢٩٣٠٣ - نَمَلْ أَحْمَر * ، سُمْسَمَة ، جَمِينِي

Myrmica rubra (S). Fourmi rouge (F). Red ant (E).

تجهدها من ترسها ذكرًا كانت او انثى تبدو صفراء اللون زاهية المالح . اما ذكروها المجنحة فمرتقاة اللون ، ثنائية الجناح الابيض || اجيالها الحولية تراوح من ٤ الى ٥ هـ انانها نبيض نحو ٥٠ مكنة متنها يستر نحو اسبوع . اضرارها في الحفصيات شديدة الوقع والاذى لانها تركب الاوراق فتتمصص عصارة خلاياها وتسبب اصفرارها وذيوبا وتركب البار فتصنها من النمو وقد تسبب جفاف لهاها وتوسع حصوصها || تكافح بيشي الحواشير الغدالة للمزوجة بالزيت البياض وقد يحسن استعمال التبخير السيانيدريكي لانه افضل من النسخ اذ يدخل في جمع غبايا الانجار .

٢٩٢٩٩ - نَمَشَة نَارِيَة ، نَمَشَة نَضْوِيَة

Chrysophalus aurantif, Aspidiotus aurantif, Aonidiella aurantif, A. taxus (S). Pou fer à cheval (F). Citrus yellow scale (E).

حشرة ناعمة مارة من القرميزات تركب الكثير من النباتات اخصها الحفصيات وقد تفضل الليمون الحامض على البرتقال وتركب السلق والخروب والياسمين والتوت والموز والزيتون والنخل والورد والصفصاف والالاث والخروع . موطنها فصح الاجزاء يشمل جميع اقاليم الليمون الاسيوية والافريقية والامريكية والاروبية || جلبهاها الترسى عند الانثى مستدر الشكل قليل الاحديداب مركزي السرة لونه الى السمرة النارية الباهية يحوقها اطار سبق اختار اكبه اللون قطره براوح من ٢ م . وعطرين . وهو عند الذكر يضيء الشكل يطول نحو ١ سم . ولثلاثة خطوط . والحشرة عند تجهدها من نمرها ذكرًا كانت او انثى تبدو نضوية الشكل حنطية اللون || اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٥ هـ . انانها نبيض من ٥٠ مكنة متنها يستر نحو تراوح من شهر الى شهرين || اضرارها شديدة الاذى لانها تركب كامل اعضاء النبات المواتية اخصها الاثنان التي تجمعتها والاوراق التي تذهبها والبار التي تعطها وتصلب لهاها . تكافح اكاشمة النمشة الحمراء .

٢٩٢٩٥ - نَمَشِيَة

Sporotrichum (S).
جنس فطور مجهرية من الطليسات وفضيلة المولحيات . انواعه قليلة العدد والاذى . هيغه مداد زخرف على سطح العائل . جواربه الكندي يسط التركيب قصير القد . كشافه يضيء الشكل تركز على اطراف الشغيرات وهي شفافة او ملونة ونها الفردية التجميع والقصبية || اعرف انواعه الثلاثة التالية :

٢٩٢٩٦ - نَمَشِيَة النُفَاح

Sporotrichum malorum (S).
نطر مجهرية ركب البار المحفوظة الملوثة او المخرصة ، فيغن البشرة ديان او يتندى حدود اللب .

٢٩٢٩٧ - نَمَشِيَة الحَفْصِيَّات *

Sporotrichum citri (S).
نطر مجهرية عادم الاذى يركب اوراق الحفصيات على اختلاف اجناسها وانواعها فيرشها ببيغ حلية صغيرة لا قياسية الشكل لونها كالرصاص .

٢٩٢٩٨ - نَمَشِيَة الصُوفَان

Sporotrichum mycophilum (S).
نطر مجهرية يركب الصوفان ينسلفه بوشاح من الخمل اللبد البرتقالي اللون يقضي على نموه .

ومصباتها || كلاليتها قوية ، سوقها وأوراقها شبه مستديرة
هلاسية المادة حمراء اللون .

٢٩٣١٨ - نَمْتَامُ البَطِّ *

Dacophorus icterodes (S). *Dacophore bilieux* (F).
حشرة جلدية من النمناميات طولها نحو ١ م. ثوبها الى
الحمرة الجلوية . رأسها مثلث الزوايا . بطنها يبيضي الشكل
مبهر المقلب الدقيق القصير || تركيب البط . تكافح
بمستحضرات الفريدب .

٢٩٣١٩ - نَمْتَامُ التَدْرُجِ *

Goniodes dissimilis (S). *Goniodie dissemblable* (F).
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من ٢
م. الى ٢ م. وخمسة خطوط . جسمها يرمي الشكل .
عرض رأسها يفوق طولها . هلبا ضمي التجميع . ثوبها الى
البياض الاخير يعلو بتقيج اصفر . || تركيب التدرج
والحجل والدجاج . تكافح بالفريدب .

٢٩٣٢٠ - نَمْتَامُ الحَمَامِ *

Gonicotetes compar (S). *Gonicotete compaignon* (F).
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من مليمتر واحد
الى مليمتر وخمسة خطوط . ثوبها حطفي اللون اصفر المواج .
بطنها يبيضي الشكل مبهر المقلب الدقيق المستطيل .
تركيب الحمام فضضيه . تكافح بمستحضرات الفريدب .

٢٩٣٢١ - نَمْتَامُ الدَّجَاجِ *

Gonicotetes gigas (S). *Gonicotete géant* (F).
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م.
ثوبها الى الصفار الحطفي المواج . بطنها يبيضي الشكل
قصير المقلب الضمي التجميع || تركيب الدجاج تقؤذيه .
تكافح بالفريدب .

٢٩٣٢٢ - نَمْتَامُ الغِرْغِرِ *

Goniodes stylifer (S). *Goniodie stylifère* (F).
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م.
جسمها اجاصي الشكل . رأسها كالقبة الثانية القرون .
هلبها كثيف التجميع . ثوبها الى السعرة السعفاء || تركيب
الغرغر والحلش . تكافح بالفريدب .

٢٩٣٢٣ - نَمْتَامِيَّاتِ *

Phloopteridae (S). *Phloopteridés* (F). *Phloopteridae* (E).
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات . اجناسها وانواعها
عديدة جسمها صغيرة القد ، مفلطحة الجسم ، كثيرة
المقلب ، واخصرة القرون الاستعمارية الحماشية العقل . ارساغها
خادشة ثنائية المقاطع . تميش على اوساخ جلود الطير
وريشه . اشهر اجناسها النمنام والقرود والقرودع .

Ride (F). *Ripple* (E).
هو الاثر الذي تخلفه الريح على التراب والماء .

٢٩٣٢٥ - نَمُورَةٌ *

هو العلوك ، اطليه .

٢٩٣٢٦ - نَمُورٌ ، شَبَاحٌ *

Accroissement, Végetation (F). *Increase, Vegetation* (E).
هو استمرار دور النشوء والنضارة وازدياد الحجم في النبات .

٢٩٣٢٧ - نَمُورَةٌ *

Nemura (S). *Némura* (F). *Nemura* (E).
جنس طير من الجوامئ سنيات المناخير وفصيلة الدخليات .

Lasius niger (S).
٢٩٣٠٤ - نَمْلٌ أَسْمَرٌ

Fourmi brune (F). *Dun ant* (E).

Formica rufa (S).
٢٩٣٠٥ - نَمْلٌ أَكْثَفُ

Fourmi fauve (F). *Drab ant* (E).

Lasius flavus (S).
٢٩٣٠٦ - نَمْلٌ أَفْطَرٌ ، سَمَامٌ

Fourmi rousse, F. jaune (F). *Yellow ant* (E).

Formica animosa (S). *Fourmi féroce* (F). *Bold ant* (E).

٢٩٣٠٧ - نَمْلٌ جَسُورٌ * ، قَعَصٌ

Formica nigra (S). *Fourmi noire* (F). *Black ant* (E).

٢٩٣٠٨ - نَمْلٌ حَبَبِيٌّ ، جَقْلٌ ، دُعَايَةٌ ، دُعُوبٌ

Formica sanguinea (S). *Fourmi sanguine* (F). *Robber ant* (E).

٢٩٣٠٩ - نَمْلٌ حَصَادٌ * ، جَقْلَةٌ

Fourmis de Salomon (F).
٢٩٣١٠ - نَمْلٌ سُلَيْبَانٌ

هو الحق ، نمل احمر صغير ، اطليه .

Formica flava (S).
٢٩٣١١ - نَمْلٌ قَارِصِيٌّ

Fourmi blonde (F). *Golden ant* (E).

٢٩٣١٢ - نَمْلٌ مُدَمِّىٌّ * ، جَقْلَةٌ

Formica nigra (S). *Fourmi noire* (F). *Black ant* (E).

٢٩٣١٣ - نَمْلَةٌ ، نَمْلَةٌ

النملة واحدة النمل الذكر والانثى ج . نمل ونمل ونمل .

وارض نملة ذات نمل وطعام منقول اذا اصابها النمل . ويبض

النمل يدعى مازنا ويبيضا وصغيره يدعى ذرا وكثيته ايشوشول

وكثية النملة ام مازن وام نوية . وميت النملة نملة لتنتحل

وهو كثره حركتها وقلة قوايتها || ومن شعر الامام تاج الدين

البيهي في منزل فيه نمل قوله :

مالي ادرى منزل المولى الاديب به

نمل تجمع في اربابته زمر

فقال لا تمجن من نمل منزلنا

فالنمل من شأنها ان تتبع الشرا

٢٩٣١٤ - نَمْلَةُ الْأَرَجَسْتِينِ

Fourmi de l'Argentine (F).

هي الزرقق ، نملة مهذبا بلاد الارجنتين وقد انتشرت في

جميع اقطار العالم .

٢٩٣١٥ - نَمْلَةُ فِرْعَوْنَ

نوع من النمل يدعى حَذَالٌ ، اطليه .

٢٩٣١٦ - نَمْلِيَّاتِ

فصيلة حشرات . من رتبة شحاتيات الاجنحة . انواعها

المعروفة زهاء ١٢٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم .

اعتادوا وكبرها قدا الانواع التي تميش في المناطق الاستوائية

٢٩٣١٧ - نَمْلِيَّاتِ *

Nemalion (S). *Némale, Némalion* (F). *Nemalion* (E).

جنس نباتات مائية من الخفيات الحمر . انواعها المعروفة

عديدة . يكثر وجودها عند شلالات الانهر ومداسق الاسداد



نمل جَسُور



نمل حصاد



نمل مدسى



نملون



نمنام البط



نمنام الحام



نمنام الدجاج

منها في اواسط العصر البلياسي ، وقد تطور القسم الآخر الذي اختلف ، على ما يبدو ، الاجناس المعاصرة .

٢٩٣٢٤ - **نُمُولِيَّات** (S). Nummullitidae (F). Nummullitidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من المنخربات الجذريات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها الساحق من متحجرات الحقبة الجوروية . اما المعاصر منها تعيش في بحار البلاد الحارة || اعرف اجناسها النَمُوْلَة .



نَمُوْلَة

٢٩٣٢٥ - **نَمِيَّات** (S). Trichodectidae (F). Trichodectidae (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القملليات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، بيضيه الشكل ، مفلطحة البطن ، كثيرة الهلب . قربها الاستشارية ثلاثية العقل . ارساها عاشرة ، تركيب المقاط || تركيب الحيوانات البزنية كالتليل والبقير والعزّز والغنم والكلاب والسرابيب والثاليد والابايل ...



نَمُوْزَة

٢٩٣٣٦ - **نَمِيْمَة** (S). Oogone

خلية نباتية تخمض وتربي الاجرام الانثوية . ج نَحْمَا .

٢٩٣٣٧ - **نُمِيْرَة مَلَطَّحَة** (S). Venilia macularia, Pseudopanthera macularia (S). Vénille maculée, Pseudopantère maculée, Panthère (F). Venilia macularia, Pseudopanthera macularia (E).

حشرة من الاريايات حشرقيات الاجنحة . موطنها الاصقاع المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اربوة . فراشها واحة قوتها مغر الازهار . سرفها تميش على اوراق الشفويات وازهارها || جسمها قصيف ابيض بطول نحو ٩ م . بسطها نحو ٣٠ م . رأسها اسمر . عينها صغيرتان . زناها مشطيان عند الذكر ، عظيماني عند الانثى . مرشها معتدل الحجم والطول . جوشها وبعثها الى السمرة . يعلوها ولج اكثف || رشناها الاماميان الى الصفار الباهت تملو رشفة كستنية . رشناها الخلفيان الى الصفار الاكثف المالح تملو نَمْرَة كستنية تمتد حتى المختار اهداها الى الشفحة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بط ظهورها بنحوسة اسابع وتتمتع المكن لطلعا على لء الحاء السوق وتصلح الارواق || السرعة عند بلوغها اكثال تطول نحو ٢١ م . جسمها اسطواني الشكل ، ملس القشار ، يعلو ثلاثة ازرار من النَمُول الصغيرة المتقابلة . قوتها يمان البيته التي تعيش فيها لذلك فهو غالبا بلون الارواق . رأسها ونمولا وشرجها الى الكستني . شرشها ينتهي بزاثلتين صغيرتين || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي ضمن صلجة تحميها السرعة بين الارواق التي تلاس التربة .



نَمُول الصمغ

٢٩٣٣٨ - **نَمِيْزَة** (S). Nemesia (S). Némésie (F). Nemesia (E).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الخنازيريات . مهدها بعض المناطق الافريقية الحارة والمعتدلة الحارة . سقها هزيلة . اوراقها متقابلة . ازهارها لينة ، مزدوجة . مجهزة بمهاميز قصيرة || تزرع القترين في الماكن والحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .



نَمِيْزَة مَلَطَّحَة

انواعها المعروفة سبعة ، ستة منها اسيوية وواحد افريقي || جميعها مصافير صغيرة القد ، رشيقة الحركة ، ثنائية اللون . يكثر فيها الرداء والاطحل والبطن الابيض التبي الموالج || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوم || تدفن في الاذغال البلية . حصفها من ٤ الى ٥ بيضات يتناوب عليها الذكر والانثى نحو ١٣ يوما .

٢٩٣٢٨ - **نَمُوْزَة** (S). Némose (F).

جنس طير من الجوامخ مغرويات المناير وفصيلة التسنريات . انواعها المعروفة نحو ١٠ موطنها المناطق الاستوائية الامريكية . تألف الغابات وضفاف مجاري الماء . ملجها الحيائي جامعي . جامعاتها متوسطة العدد الذي يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجا . قوتها الحشرات والبيور والثار العنقية البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٥ سم . متناقروها مغروية الشكل . اوقاها متباينة الالوان جميعها زاهية انخضب عند الذكور باعثة عند الاناث || تدفن اعشاشها في الاذغال . اناها تخضع بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوما .

٢٩٣٢٩ - **نَمُوس** (S).

Noméus (F). Nomeus (E).

جنس اسماك بحرية من شاكسكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . زعانفها الظهرية فارقة . زعانفها الصدرية تنتشر وتنتهي ، عند الانقباض ، في مجايف خاصة . اوقاها الى الريدة القفصية يعلوها تبقج اسمر لاقياسي التوزيع انما يكثر ويقيم عند الرأس والظهر || لحوها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٩٣٣٠ - **نَمُوش الصمغ** (S).

Turanana baton (S).

حشرة فراشية من فصيلة القلتيات . جسمها يطول نحو ٢٢ م . رواشك ذكورها الى الزرق الرمادية الموالج يعلوها حثار اسود اطار ابيض الهذب تقطعه الاعصاب السود . رواشك اناها حطية اللون اسمر الموالج تملوها تنميش بنفسجي ويعلوها اطار ابيض الهذب تترشده الاعصاب السود . يرقاها تركيب اوراق الصمغ فثقبها .

٢٩٣٣١ - **نَمُول** (S).

نبات يدعى لقمة الحمل ، اطلبها .

٢٩٣٣٢ - **نَمُولَة** (S).

Nummullite (F). Nummullites (E).

جنس حيوانات بحرية من المنخربات الجذريات وفصيلة النَمُوليات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاحساب الجوروية والطباشيرية . اما المعاصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة || اصداها كبيرة ، مستديرة ، قوسية الشكل ، عديدة الحجيرات الثنائية او الثلاثية التجويل الانثي .

٢٩٣٣٣ - **نَمُولِي** (S).

Nummullitique (F). Nummullite (E).

نمت تعريفي يطلق على الحقبة الاولى من الاباج الثالثي المعروف ايضا بالاباج الحديث . وهو يشمل العصر البليوساني والعصر البلياسي والمصر الاوليغوساني || تتميز هذه الحقبة بوجود الكثير من احافير النَمُول في جمراتها الرئيسية . ويظهر بعض الثدييات التي افترض تم

٢٩٣٤٦ - نَمِيَّةٌ عَصْفِيَّةُ الْوَرَقِ

Moltkia graminifolia (S).

Moltkie à feuilles de graminées (F).

نوع من النَمِيَّةِ. ساقها زبابة تعلو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. أوراقها متعاقبة عصفية اتصال المسنة الحافة. ازهارها عنقودي متبدل. ازهارها الى الزرقا البنفسجية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٣٤٧ - نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ

Nandou (F).

هي الروساء ، اطليا .

٢٩٣٤٨ - نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ ٥

Nandus (S).

Nandus (E).

جنس اسماك نهريه من شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها من اسماك المناطق الاسيوية الحارة والاستوائية || اجسامها متوسطة القد . شكلها قريب الشبه بالفرخ . ظهورها محدودة . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . زعانفها الشرجية مقطوعة || اذنيها الى السمره السفاه المواجه يعطوها بتقريب اسود متباين الزخابة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٩٣٤٩ - نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ ٥

Nandina (S). Nandine (F).

جنية مشرة معمرة ابيدة الاوراق من فصيلة البرابريسيات . مهدها الشرق الاقصى . تعيش وتكثر في الاقاليم المعتدلة المنخفضة نحو الحارة . جنبها قليلة الفروع تعلو من متر الى مترين . أوراقها متعاقبة مركبة . وريقاتها اهليلجية النصل وريدة التجميع . ازهارها عنقودي التجميع طرقي الارتكاز . ازهارها عابجة اللون فواحة العرف المطري . ثمارها عنبية حراء اللون مأكولة .

٢٩٣٥٠ - نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ

Paraffine (F). Paraffin (E).

هو البرافين، نوع من الشمع الابيض الجامد المكرستخرج من النفط . راجع نفط .

٢٩٣٥١ - نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ

نوع من الودع

٢٩٣٥٢ - نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ ٥

Méthodologie (F).

Methodology (E).

التهاجة قسم من علم المنطق يبحث في مقضييات ونتائج المناهج المختلفة .

٢٩٣٥٣ - نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ

Outardeau (F). Young bustard (E).

فرخ الجبارى . قالت العرب احمق من نهار . وقد اختلف اللغويون في النهار فقال قوم هو فرخ القنقاء وقال قوم انه ذكر البوم والاثنى صيف . وقيل انه ذكر الجبارى والاثنى ليل . ج اهرة وهر .

٢٩٣٥٤ - نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ ، هَيْدُوسُ ، هَيْدُوسُ

Diurne (F). Diurnal (E).

نعت تعريفي يستعمل للدلالة على الشيء الخاص بالنهار او الذي لا يحصل الا في الفياض اي النهار .

٢٩٣٥٥ - نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ ، نَمِيَّةٌ هَيْدُوسُ

Rapaces diurnes.

Diurnes (F). Diurnal birds of prey (E).

اسد قسني جوارح الطير المعروفة بجوارح او كواسر النهار يقابلها جوارح او كواسر الليل .

٢٩٣٤٩ - نَمِيَّةٌ حَدِيدَةٌ

Nemesia strumosa (S).

Némésie gibbeuse (F).

نوع من النَمِيَّةِ. عشية تزيينية حولية . ساقها خلية السحاء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. أوراقها اهليلجية مسوطاة ، الجذعية منها لاطة ، منشارية الخار . ازهارها حراء اللون ، منها شروب بيضاء اللون وزرقا ووردية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٣٤٠ - نَمِيَّةٌ كَثِيرَةُ الزَّهْرِ

Nemesia floribunda (S). Némésie floribonde (F).

نوع من النَمِيَّةِ. عشية تزيينية حولية . ساقها تعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم. أوراقها الدليا لاطة ، سنانية . أوراقها السفلى منقطة ، بيضيه . ازهارها عابجة اللون يعطوها موج بنفسجي . عرفها عطر فواح || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

٢٩٣٤١ - نَمِيَّةٌ قَانَمَةٌ *

Nemesia suffisa (S).

Némésie fumigée (F). Nemesia (E).

دوبية من النماكب القانصة الساعية رباعية الروايا والمشاتن تنتمي الى فصيلة الخدقيات || جسمها متوسط القد يعطو نحو ١٤ م. عند النماكب ونحو ١٨ م. عند النماكة . عيناها كرهات اكلب اللون يعطو تسنج وتزويق سود . عيناها زنجيات . شيفهاها ضليمان . فكها منقشان . جراسها شطية ، مستطيلة الزوج الخلفي . يعطها اهليلجي الشكل ينتمي برزالتين تخيلتين ، ثوبه الى الكهية الخطية يعطوها خط طراشيد اسود وسببه خطوط منقرضة || تألف البراري والمزارع . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات واسارها وريقاتها || عكديتها ييش في التربة انبوي الشكل ، عمودي الفور ، متوسط العمق ، روقي القعر ، تحفره تحت حجر كبير || ملجئها الحياتي كلجن سائر النماكب . تعيش نحو ثلاث سنوات . لسنتها مؤيدة وقد تكون بيته في بعض الظروف الخاصة || تعتبر من الدوبيات المؤذية الضارة .

٢٩٣٤٢ - نَمِيَّةٌ تَمِيصُ

اول ما يبدو من النبات .

٢٩٣٤٣ - نَمِيَّةٌ تَمِيصُ

Moltkia (S). Moltkie (F).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الجسحميات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها الشرق الاوسط || سوقها زبابة فروعها ابيرة الشكل تعلو نحو ١٥ الى ٦٠ سم. أوراقها متعاقبة عصفية الشكل او ابيرة . ازهارها عنقودي التجميع ابطي الارتكاز || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٩٣٤٤ - نَمِيَّةٌ الصُّخُورُ *

Moltkia petraea (S). Moltkie des rochers (F).

نوع من النَمِيَّةِ. ساقها زبابة تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. أوراقها ابيرة الشكل تعلو نحو ٤٠ م. وتعرض نحو ٤ م. ازهارها عنقودي منتصب . ازهارها ارجوانية اللون في اول عهدا ثم تنحرف الى الزرقا البنفسجية فالزرقا الباهتة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٣٤٥ - نَمِيَّةٌ زَرْقَاءُ

Moltkia coerulea (S).

Moltkie bleue (F).

نوع من النَمِيَّةِ. ساقها زبابة قليلة الفروع تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. أوراقها متعاقبة سنانية اتصال الدقيقة التسنين . ازهارها عنقودي . ازهارها زرقاء اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .



نَمِيَّةٌ قَانَمَةٌ



نَمِيَّةٌ الصُّخُورُ

٢٩٣٥٦ - نَهَّاس

Lion (F).

هو الاسد ، اطيه .

٢٩٣٥٧ - نَهَّام *

Nyctala funerea (S).

Nyctale, Chouette pattue (F).

طائر من البويبات وجماعة الغداديات . جسمه صغير القد يطول نحو ٢٦ سم . رأسه معتدل الحجم . منبره نازح القوس . منبره شديد الانحناء اسود اللون تعلوه مشعة صفراء . ذنبه مستطيل الريش تعرضه خسة خطوط بيض . ارساغه كاسية لبدية || موطنه فسيح الارباح يشمل البلاد الاسيوية والاروروبية والامريكية . يألف الاحراج والصور والتنبو والمزلا . يقتر بابدأ من الاماكن الآهلة . يلتصق قوته في الليل ، يصيد الجرذ والقنار والزباب والحشرات . يذئ عشه في صديق الاجنار وبين فروعه . انتفاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ٢٥ يوماً .

٢٩٣٥٨ - نُهْبُوع ، زَقْرَاق مُسَلَّح

Hoplopterus (S), Hoploptère (F).

Hoplopterus (E).

جنس طير من طول الساق وفصيلة الزقراقيات . انواعه المعروفة ١٠ واحد .ها امريكي موطنه يمتد من الارجنتين الى البرازيل ونسبة اسبوية وافريقية || جميعها قريبة الشبه من الزقراق المطلق . اصحابها صغيرة . اذنانها قصيرة . اجنتها مسلحة بمناعش قرنية المادة ، مدبة ، ناعسة . ارساغها دقيقة مستطيلة . اصابعها ثلاثية || قوتها الحشرات والديدان والحمار || انثاها تذبذب في افاحيص تحفرها في رمال شفاف الانهر والبويبات . وفي تحضن رسدها من ٣ الى ٤ بيضات || اعرف انواعه واشهرها النُهْبُوع الناعس .

٢٩٣٥٩ - نُهْبُوع ناعس * ، زَقْرَاق ناعس

Hoplopterus spinosus (S).

Hoploptère épineux, Vanneau à éperon (F).

Hoplopterus spinosus (E).

طائر من التبويع الضارب القواطع . اعطانه تمتد من الحيشة الى السودان وبصر والجزيرة العربية والعراق وسائر اقطار الشرق الاوسط حتى تركيا واليونان يحوي بعض اصنافها كل عام في طلب الرزق والمصيف والمشتق || جسمه متوسط القد . طوله نحو ٣٠ سم . ظهره وجناحاه الى الصهبة السمر . رأسه وجيشته الى السواد الفحشي . منبره وعنقه وكفاه وبلطه والافنيكه واوراسط جناحيه الى البياض الناعس . اطراف قوادمه سود || يألف الاغوار وصفات الانهر والبحيرات ، سربه متوسط العدد . قوته الحشرات والديدان والحمار .

٢٩٣٦٠ - نَهْدَة ، نَهْدَة ، نَهْدَة

Beurre (F), Butter (E).

من اسماء الزبدة . وقد تستعمل للدلالة على مقدار غني الابان بالزبد فتقول نهدة هذه الابان ... نهدية هذا اللبن .

٢٩٣٦١ - نَهْر

Fleuve (F), River (E).

يجري من المياه العذبة ينساب على الارض ويصب مياهه في بحر او بحيرة . يعتمد اللبن على البنانيب والامطار والثلوج الذائبة وهو يتألف من مياه عادية من مجرى رئيسي تغذي السواهد والقرود . وان صغر وكثرت مياهه فهو الطبع (Rivière) ج اطباع وساعده يذبح جداول . جداول . وان كبر فهو النهر وساعده يدعى راج . روافد .

٢٩٣٦٢ - نَهْر ، أَرِيدَانُوس

Eridan (F).

Eridanus, Eridanus (E).

النهر او اريدانوس كوكبة نجوم جنوبية الموضع . مجريها اربعة وثلاثون . شكلها كالنهر ، تبتدئ عنه قدم الجزاء فتمر في المغرب على تربع الى قرب صدر قيطس ثم تمر في الجنوب على ثلاثة انجم ثم تنطف الى الشرق فتمر على ثلاثة انجم ايضا ثم تنطف الى الجنوب فالجنوب فتمر على كوكاب عديدة وتنتهي بنجم نير يدعى آخر النهر || اشهر نجوم هذه الكوكبة : الثلاثة التي في المنطف الثاني وتدعى «منطف النهر» ، ثم خمسة في الشرق في المنطف الرابع وتدعى «ادسي النعام» . والكواكب التي حولها تدعى «الببيض» . ثم «نير الزروق» . ثم «الترية» ثم «الظلم» ، وهو اشهرها ، ويدعى ايضا «آخر النهر» . وبين هذا الظلم والظلم الذي لم يمتد الحوت كوكب كثيرة تدعى «الزئال» .

٢٩٣٦٣ - نَهْرَة إِصْبَادِيَّة

Conjonction économique (F).

Economic situation, Trend (E).

النهزة اتفاق الظروف في وقت ما .

٢٩٣٦٤ - نَهْس

Pie-grièche écorcheuse (F).

Red-backed shrike (E).

هو الصرد الأغر . ج . نهسان .

٢٩٣٦٥ - نَهْسُور *

Enneoctonus (S).

Ennéoctone (F).

طائر من الصرب ينتمي الى فصيلة الصرديات . يألف الغابات والروج والمراعي . قوته الحشرات والبوبيات والنمات والمقارب والمناكب ... جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . رأسه مستفخم الجرم . منقاده غليظ وضيح . ثوبه الملوي الى الشحنة السمر بعلها شمشيح اسود . جبته وعصره الى البنية . عيانه مكشلتا بالاسود الذي يمتد حتى القنن . زوره وصدره وبلطه الى الشبه الغبراء . جناحاه معتدلا الطول . ذنبه مستطيل الشكل مقطوع الطرف || يذئ عشه في الاجنار الرقبة . الانثى تحضن رسدها من ٤ الى ٥ بيضات بينها الذكر يئذن لها الغذاء .

٢٩٣٦٦ - نَهْن

Cathetus (S).

Cathète, Talégalie, Dindon des bulsons (F).

جنس طير من فصيلة الشقيانيات . انواعه قليلة العدد جميعها كبيرة القد طولا يراوح من ٧٥ الى ٩٠ سم . تتميز برووسها الصلواة القليلة الزغب . مناقيدها قوية حادة . اعناقها سرحة . عادمة الريش . جوار الجلود الجمدة المسترخية . اجنتها مستديرة ضميعة . اذنانها متوسطة القد . ارساغها قوية . غنابها كبيرة . اثارها الى السرة يعولها مواج حشطي وتأذير نفسي . || تألف الاحراج . تعيش ذكرا وأني كالجمام . سربها يعد من ١٥ الى ٢٥ زوجا . قوتها الحبوب والحشرات . انثاها لا تحضن البيض بل تقضم في حاشن خاصة تشيدها بالتراب والقصباس والافنات والقش والورق تجعلها هرية الشكل مستديرة القاعدة قلها يراوح من ٣٨ الى ٤٢٠ سم . وارتفاعها من ١٢ الى ٢٠٠ سم . || ولائي تقع في موسم الحولي من ١٨ الى ١٥ بيضة بين الواحدة والواحدة ١٢ او ١٤ يوما . اما البيسة فتتفك بعد وضعها ياسويين عن فرخ نشيط اذبح الريش يذبح امر نفسه بدون عناء .



نهام



نيجع ناخس



نهر



نهن

نحو ١ م. ثوبها الى الخنطي الاسمر . رأسها اسود . نمدها الى الصلبة الزاهية . || تعيش تحت الحجارة والاشخاش في البراري وقرب البيوت وبينها . قوتها المواد العضوية ويرقات الحشرات وتلات الازهار .

٢٩٣٧٦ - نَهْمِيْكُ الحَقْلُ الكَبِيرُ *

Labidura riparia (S). Labidure (F).
نوع من النمل الكبير القدد ، حشرته تطول نحو ٢٥ م. زباناها مستطيلة محجنة كثيرة العقل التي راوح عددها من ٢٧ الى ٣٠ اعمادها ذلقة . اجنحتها بارزة . ملاقط ذكورها منجلية الشكل متراكبة الاطراف تطول نحو ١٢ م. ملاقط اناثها مستقيمة تطول نحو ١٠ م. || ثوبها الى الخنطي الاصعب المواج . تعيش تحت الحجارة في الحقول وفي الرمال وقرب مجاري الماء . قوتها يرقات الحشرات وبعض المواد النباتية || جمعها نفق بعيد الغور طوله راوح من ٢٠ الى ٣٠ سم . وعقد نحو ١٢ سم .

٢٩٣٧٧ - نَهْمِيْكُ مَبْدُولُ * ، قَائِبُ الْأَذْنُ

Forficula auricularia (S). Forficule commune (F). Common earwig (E). Gemeine Ohrwurm (D).
نوع من النمل المبذول الشائع في معظم اقطار العالم . حشرته مستطيلة الجسم المبطط . طوله راوح من ١٠ الى ١٥ م. زباناها مركبة من ١٥ عقلة . ظهرها قصيرة مقطوعة صفدية التركيب . رواشها بارزة . ملاقط ذكورها كلاية الشكل مسننة الاطراف تطول من ٣ الى ٥ م. ملاقط اناثها شبه مستقيمة تطول من ٤ الى ٧ م. || ثوبها كسني اللون اسفج المواج اصعب الطرف والجوانب . وهو يالفت الاماكن الآفلة . يعيش تحت الحجارة والاشخاش . يسرح في الليل ويبيت في النهار . انشاء تضع نحو ٦٠ مكنة تحتها عند اوائل الربيع في قروموس مستطيل تدبره في التراب تحت الحجارة . مكنتها يضيئ الشكل ابيض اللون بطول نحو ١ م. ويتفقد بعد مئته بنحو ١٠ ايام من يرقات نهمه تلهم ما وصلت اليه من بوادر النباتات العشبية . اما الحشرة الكاملة فقوتها المواد العضوية والحيوانية والنباتية اخصها بوادر البذور الناتشة والثار السكرية . اضرارها زعيدة الا في بعض الظروف . تكافح كثيرها من الحشرات الترية الدجوية المرسح .

٢٩٣٧٨ - نَهْمِيْكِيَّاتُ ، قَائِبَاتُ الْأَذْنُ

Forficulidae (S). Forficulides (F). Forficulidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جلدليات الاجنحة الرواكض . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها الاقطار الاستوائية . جميعها من حاملات الملاقط الشرجية المتباينة الاشكال والاحجام || اشهر اجناسها النمليك .

٢٩٣٧٩ - نَهْمِيْكُ ، قَائِبَاتُ الْأَذْنُ

Barrissement (F), Trumpeting (E). نَهْمِيْكُ .
هو صوت القليل في جميع ظروفه .

٢٩٣٨٠ - نُؤْ *

Connochaetes (S).
Gnou (F), Gnu, Wildebeest (E).
جنس حيوانات لبونة من بقر الوحش ذوات الظلف . انواعها ثلاثة . اشكالها مزيج من خلفة الماهة والثور والحصان . اجسامها كبيرة القدد شديدة النشط . حواركها رفعية . رؤوسها غليظة مستعرجة . معارفها مستطيلة السبيب . اللب . بلادها رحية . اذنانها كاسية مستطيلة السبيب . كا في الخيل . قرونها غليظة ، مستعرجة القواعد ، قوية التصجين ، مننقة الى العلاء || اناشها تقصع ارباً واحداً

٢٩٣٦٧ - نَهْمَةٌ - Roquette sauvage (F).

عشبة برية حولية مشهورة باسم ايققان وجرجير بري . ج نيق .

٢٩٣٦٨ - نَهْمَةٌ

النَهْمَةُ ، طائر طويل المنقار والرجلين والرقبة ، اغبر اللون || (السان) .

٢٩٣٦٩ - نَهْمِيْكُ

Troque (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم عنتيل ، اطلبه .

٢٩٣٧٠ - نَهْمِيْكِيَّاتُ

Trochidae (S).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات تدعى ايضاً عنتيليات ، اطلها .

٢٩٣٧١ - نَهْمِيْكُ ، قَائِبُ الْأَذْنُ ، أُوْ مَقْصَصْ

Bralmont (F). Bray of an ass (E).
صوت الخير . والهاق كذلك .

٢٩٣٧٢ - نَهْمِيْكُ ، قَائِبُ الْأَذْنُ ، أُوْ مَقْصَصْ

Forficula (S). Forficule, Perce-oreille, Pince-oreille (F). Ear wig (E). Ohrwurm (D).
جنس حشرات مباشرة صغيرة من فصيلة النمليكيات . انواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . اجسامها مفلطحة مستطيلة سداسية القوام . قرونها الاستشعارية خطية الشكل لا قياسية الطول والتركيب راوح عدد عقلها من ١٠ الى ٣٤ . كواسلها مثلفة الزوايا مهمة الحمار الخارجي . اعمادها قصيرة مقطوعة . رواشها متباينة الاشكال والاحجام ، جالسة الاذكار . تحمل في مؤخر بطونها ملاقط لا نظامية الشكل ، مقوسة كلاية في الذكور ، مستقيمة في الاناث . يزعم اهل الغرب ان القرب الاذن وزعم غريم انها تمض اطر الرقيق وقوف الجواوي . || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٩٣٧٣ - نَهْمِيْكُ الْأُزْعَبُ *

Forficula pubescens (S). Forficule pubescente (F).
نوع من النمليك ، حشرته ذقيقة الجسم الازغب تطول من ٦ الى ١٢ م. قرونها الاستشعارية مركبة من ١٢ عقلة . ثوبها الى الخنطي الاسفج المواج . ملاقط ذكورها كلاية الشكل دائرية التفويص . ملاقط اناثها مستقيمة . تعيش على الاشباب والجنبات الصغيرة . قوتها مكن الحشرات ويرقاتها ورحيق الازهار وتلاتها .

٢٩٣٧٤ - نَهْمِيْكُ الْأَشْجَارِ *

Forficula decipiens (S). Forficule des arbres (F).
نوع من النمليك ، حشرته تطول من ٧ الى ١٣ م. قرونها الاستشعارية مركبة من ١٣ عقلة . كوسلها ونمدها الى الصفار الخنطي . ثوبها الى السمرة الخنطية المواج . رأسها اصعب . ملاقط ذكورها كلاية الشكل تطول نحو ٥ م. ملاقط اناثها مستقيمة تطول نحو ٣ م. تعيش على الاشجار . قوتها مكن الحشرات ويرقاتها والافرازات النباتية السكرية .

٢٩٣٧٥ - نَهْمِيْكُ الحَقْلِ الصَّغِيرِ *

Labia minor (S). Lable (F).
نوع من النمليك ، حشرته تطول من ٦ الى ٦ م. قرونها الاستشعارية ذقيقة مركبة من ١٠ او ١٢ عقلة . نمدها ورواشها مستطيلة . ملاقط ذكورها كلاية الشكل قليلة التفويص ، تطول نحو ٢ م. ملاقط اناثها مستقيمة تطول



نَمِيْكُ أَزْبُ



نَمِيْكُ الْأَشْجَارِ



نَمِيْكُ الحَقْلِ الصَّغِيرِ



نَمِيْكُ الحَقْلِ الكَبِيرِ



نَمِيْكُ مَبْدُولُ



نُؤْ

ترضعه نحو ٦ أشهر || موطنها فسح الارباع يشمل كامل إفريقيا الشرقية والجنوبية وبعض البلاد الاسيوية .

٢٩٣٨١ - تَوَاشِعُ الذَّبَابِ

Connochaetes gnou (S). Gnou à queue blanche, Antilope gnou (F).

نوع من التَوَاشِعِ الجثة طوله نحو ٢٥٠ سم. وأرتفاعه ١٣٥ ثوبه الى السرة الكتستية . ذنبه ابيض اللون . الاثنى اصغر قدماً وقرباً من الذكر . اجله يعد من ١٠ الى ٥٠ نفراً || موطنه يشمل ضفاف الاورنج وسهوله .

٢٩٣٨٢ - تَوَاشِعُ الحَبِيبَةِ

Connochaetes albojubatus (S). Gnou à barbe blanche (F).

اكبر انواع التَوَاشِعِ جثة واقفا غلاظة واطولها عفرة ولحية . جسمه بطول نحو ٢٨٠ سم. ويرتفع نحو ١٤٠ . قرنه اقنى الانتشاب مدبب الطرف الاحجج . ثوبه الى السرة الخطئية الصهباء المواج . عفرته شديدة السرة يتخللها سيب ابيض . لحيتة يضاء اللون ومنه غرب اسود الحبية . اجله يعد من ٨ الى ٤٠ نفراً . موطنه افريقية الشرقية حتى بحيرة فيكتوريا نيارزا .

٢٩٣٨٣ - تَوَاشِعُ

Connochaetes taurinus, C. gorgon (S). Gnou taurin, G. rayé (F).

نوع من التَوَاشِعِ كبير الجثة غليظها، طوله نحو ٢٢٠ سم. وأرتفاعه ١٢٠ . ثوبه الى السرة الخطئية يعلموا تسليج اشهب . اجله يعد من ١٥ الى ٦٠ نفراً . يعيش برفقة النعام وجير الزرد || موطنه يشمل معظم اقطار افريقية الجنوبية .

Noyau (F). Nucleus (E).

هي عضو الاستمرار في الخلية تركب من شبكة مكونة من القتب السامعة في السائل النووي .

Noyau (F). Stone (E).

هي العجسة ، اطليها .

٢٩٣٨٦ - تَوَاشِعُ الثَّقَلِ ٥

Barysphere (F). Barysphere (E).

نواة الثقل اسم يطلق على كتلة الارض المركزية ذلك لان جميع مركباتها من المعادن الثقيلة الماثمة .

Nucléine (F). Nuclein (E).

هي عناصر نواة اُحليمة وقد تكون اُزوتية ودهنية وصفورية وكبريتية ومنهم من دعاهما نكليين .

٢٩٣٨٨ - تَوَاشِعُ

اقصى الاضرار وفي اربعة في اقصى الانسان بعد الارباع . وتسمى فرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكال العقل . وقيل التواجد التي تلي الاتياب . وقيل هي الاضرار كلها نواجذ . قال الجوهري : وقد تكون النواجذ للفرس . وفي الاتياب من الخف والسوالف من الظلف .

Eperons (F). Spurs (E).

حلب مؤلفة تملو سوّ بعض الحشرات .

Anthophore (F).

نمت وصلي يطلق على كل عضو نباتي يعمل زهرة او علة زهور .

٢٩٣٩١ - تَوَاشِعُ أُبَيْصَ هو الياس ، اطليه .

٢٩٣٩٢ - تَوَاشِعُ اللَّيْلِ هو شب الليل ، اطليه .

٢٩٣٩٣ - تَوَاشِعُ صَيْبِي، كَرِيْرَة Carriera (S). Carrière (F).

شجرة برية وزينية من فصيلة النعشيات . مهددا الصين . ساقها منتصبه نزعاه تملو من ١٥ الى ١ م. افانها وافنانها حر اللحاء . اوراقها عابلة معقنة متعاقبة . نصلها اهليلجي الشكل لامع البشرة على صفحتيه . ازهارها سدرة القد ، عادمة القعالات ، خماسية الفصل البيض ، كثيرة الاسدية . ثمارها جرداء وشمية الشكل ، ثلاثية المصاريح || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

Eutoca (S).

Eutoque (F). Eutoca (E).

جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة النعشيات . انواعها المعروفة ١٢ . جميعها امركية المهد ، بعضها شائع الاستعمال الزينيني || سوقها غنائية . اوراقها صغيرة ، متعاقبة زياه النصال . ازهارها جيلة ، خافتة السرف ، ملونة ، منها الازرق والاريجاني والايض || أشهر انواعها الزراعية الزينية توارية يورنجليلانا (Eutoca Wrangeliana)

٢٩٣٩٥ - تَوَاشِعُ ٥ Anthophora (S).

Anthophore (F). Anthophora (E).

جنس حشرات جارية لاقعة من غشائيات الاجنحة المحويات وفصيلة التواريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحارة والحارة . قوتها رقيق الازهار وطلها . ملجها الحياتي انغزالي || جسمها متوسط القد قريب الشبه بحجم ذكر النحل . تتميز بكثافة الزغب الذي يكتنفها من قة الرأس الى طرف البطن || غتلها غشاء تينبه بالطين في المواقع المحجورة اغصها الحيطان الخربة .

٢٩٣٩٦ - تَوَاشِعُ ٥ هو اسطرغالوس نوايس ، اطليه .

٢٩٣٩٧ - تَوَاشِعَاتِ ٥ Anthophoridae (S).

Anthophoridés (F). Anthophoridae (E).

فصيلة حشرات جارية لاقعة من غشائيات الاجنحة المحويات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستانها المناطق الباردة || ملاجئها الحياتية تخلف مع اختلاف الاجناس ، بعضها جامعي والبعض الآخر انغزالي . والجامعي منها قليل العديد . الذكور والانات تمل في سبيل الحياة والبقاء اذ لا يوجد علامات كا في النحل || أشهر اجناسها التوارية والغثارة .

Fil d'araignée (F).

خيط العنكبوت ونسجه . وفي المثل اوبى من نواس العنكبوت .

٢٩٣٩٩ - تَوَاشِعُ جَوِّيَّة Perturbations atmosphériques (F).

هي التقلبات الجوية العارضة غير المألوفة . والنوعية هي الزوبعة من الرياح . ج نوج .

٢٩٤٠٠ - تَوَاشِعُ مُسَلَّحِ ٥

Neoborus ornatus (S). Néobore armé (F).

سمكة نهريه ييوس من مفتوحات المائة . موطنها بحيرات ومنطقات نهر الكنفو . تعيش بين الاعشاب المائية



تَوَاشِعُ



نَوَيرُ مُسَلَّحٍ

٢٩٤٠٦ - نُوتِيرِيَات ٥

Noteridae (S). Noteridés (F). Noteridae (E).

فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٦ الى ١٢ م. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة ، عيونها صغيرة ، تأشيرها وتكونها قياسية. قرونها الاستشعارية شبه وشعية الشكل ، مركبة ١١ فصلة. كواسلها محدبة ، مستعرضة ، اغدادها لاحقة ، عديمة التخديد. قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للوم || جميعها مفرسة. تعيش في المياه الراكدة او الجارية البطيئة الانسياب || اشهر اجناسها النوتيرة .

٢٩٤٠٧ - نُوتِدْ ٥

Calodon (S). Calodon (F).

جنس فطور من فصيلة الابريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . جميع انواعها كاعنة الصنف لاماكلة . تتميز ببوطها الشهي التسجيع الملون ، وبسوطها القصيرة الضفحة ، وبشكلها الحدودية المجددة شبه ليلية المادة || اعرف انواعها واشهرها الاربية التالية .

٢٩٤٠٨ - نُوتِدْ بُرْتَقَالِيّ اللون ٥

Calodon aurantiacum (S). Calodon orangé (F).

نوع من التوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه غليظة ، قصيرة ، صفراء اللون ، برتقالية المواج . نكته خضروفية الشكل ، كثيرة الحداب الاستشعارية ، قطرها نحو ٨ م. سطحها جلّي برتقالي اللون . لحمية كالفلين ، صفراء اللون ، كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٩٤٠٩ - نُوتِدْ حَدِيدِيّ اللون ٥

Calodon ferrugineum (S). Calodon ferrugineux (F).

نوع من التوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة شبه مخروطية الشكل ، لامتدادية السطح الخشن ، لونها الّي الكستني الاسمر . نكته ريمية الشكل قطرها نحو ٨ م. سطحها خلي البشرة ، متتابع الحداب ، لونه الّي الشقمة السمراء يعلوها تنقيط احمر يطقه الابيض || لحمية قاسية كالجلد ، كاعنة الصنف ، لا تؤكل .

٢٩٤١٠ - نُوتِدْ رَمَلِيّ ٥

Calodon geogenium (S). Calodon terrestre (F).

نوع من التوتد . يسيد في الغابات . يعيش في المواقع الرملية المشاة بالطحالب . ساقه شديدة القصر تؤلف مع النكته شكلًا شبيهًا بالقصع الثلاثي الاحاديد . قطر النكته نحو ٢ م. لونها كالكساق الّي الصفار الكبريتي || لحمية كاعنة الصنف ، لا تؤكل .

٢٩٤١١ - نُوتِدْ عَدَبْ ٥

Calodon suaveolens (S). Calodon suave (F).

نوع من التوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة ، مخروطية الشكل ، رباحية الحداب المستطيلة ، لونها الّي الزرقعة السمراء . نكته قمية الشكل ، كبيرة الحداب الجانبية والبطيحية ، قطرها نحو ٤ م. لونها الّي الصهبه يعلوها تشبيح ازرق ومواج اسف || لحمية جلدية المادة ، كاعنة الصنف ، غزامية الرائحة العذبة ، لا تؤكل .

قوتها الاسماك والدوبيات والدمايعس والديدان || جسمها مسطط الجرم ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ٣٥ م. رأسها مخروطي . غطتها مستطيل كالجلد . فكها مسلحان بآسنان قوية ذرية . عيناها ماسحتان . زعنفتها الظفيرة الاولى كبيرة القد شرعية الشكل . الثانية جذعة . زعانفها الصدرية والحوضية والشرجية متصلة القد . الذيلية كبيرة ، فاخرة . ثوبا الّي الشبهة البنفسجية المواج . جانبها الّي الخضر الزيتي الموشح بالفضي . يلبها الّي العبرة العاجية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٩٤٠١ - نُوتوسيرَة ٥

Notoceras (S). Notocère (F).

جنس نباتات خشبية برية ، حولية ومحولة وبعمرة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة عديدة اعطائها فسيحة الاربعاء تمتد من البلاد الحارة الّي الباردة || سرقها زهاب متصببة او مستلقية ، فراءه او قليلة الفروع . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، ستانية النصال . ازهارها صغيرة بيضاء اللون او تينية او صفراء .

٢٩٤٠٢ - نُوتِيلِيَات ٥

Nautilidae (S). Nautilidés (F). Nautilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات وآسيات الاربل رباحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المنقرضة الغابرة كثيرة العدد ، أما المعاصر منها فجنس واحد موطنه المحيط الهندي والبحار المحاورة . يدعى نُوتِيلَة .

٢٩٤٠٣ - نُوتِيلِيَة ٥

Nautilus (S). Nautilé (F). Nautilus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات وآسيات الاربل ، رباحيات الخياشيم وفصيلة النوتيلات || انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اعطائها المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصداها كبيرة ، شبه قرصية الشكل ، متتلة التبطيط . اجسامها مخروطية ، صغيرة الرءاء . رؤوسها صغيرة . عيونها كبيرة جاحظة . لؤسها عديدة ، فسيحة ، ومنها اثنتان مجهزتان بما يشبه الهاجم . اعطائها نشيطة وقوية || اشهر انواعها وأكثرها انتشارًا النوتيلة الماعة .

٢٩٤٠٤ - نُوتِيلَة لَمَاعَة ٥

Nautilus pompilius (S). Nautilé flamé (F).

نوع من النوتيلة يكثر وجودها في بحار الهند . اصداها لامة ، للؤلؤة الصفحات الداخلية ، لونها الّي البياض المهدج بالصناني || لحومها مأكولة . اصداها مرغوب فيها شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٩٤٠٥ - نُوتِيرَة ٥

Noterus (S). Notère (F). Noterus (S).

جنس حشرات مائية مفرسة من فصيلة النوتيريات وربة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من اليابان الّي اربوة . تألف المناطق والياه الراكدة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٧ الى ١٠ م. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشور . عيونها صغيرة ، بارزة . تأشيرها وتكونها وملاسها قياسية . قرونها الاستشعارية وشعية الشكل . كواسلها مستعرضة . اغدادها لاحقة ، عديمة التخديد . قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للوم . ألوانها سوية الخضر الكستني او الجلوي || الجملة قانصة والبرقة ايضًا .



نوتِيلَة لَمَاعَة



نوتِيلَة



نوتِدْ بُرْتَقَالِيّ اللون



نوتِدْ حَدِيدِيّ اللون



نوتِدْ رَمَلِيّ




نوتِدْ عَدَبْ



نوري



نوسة الاجاص



نوسة الاجاص



نوسة الحفصيات



نوسة

مظهره أخارجي يقع رادية اللون أو يبيض لا قياسية الشكل والحجم تركيب نصل الإوراق وسافات الهواء الادبية تغطيتها بعد ان تقضي على النجس والحلايا . وقد يركب البُار الناجية فيشود البشرة ببقعه السمر دون ان يؤذي لياح السوخذ . يكالغ كثيره من الفطور التي تصطب الكبريت والنحاس .

٢٩٤٢٣ - نَوْسَة الحُفْصِيَّات * Oospora citri-aurantii (S).

فطر مجهرى عيم الانتشار يركب ثمار الحفصيات المدركة والمحفظة على اختلاف انواعها || يصيب القشور فيفسدها بعد ان يطب النجس والحلايا التي تنمل وتنفذ خاصة البُارك || يكافح بتطهير البُار المدة للحفظ او للتصدير وباجتناب الاماكن الحارة المشبعة الرطوبة .

٢٩٤٢٤ - نَوْسَة * Nasiterna (S). Nasiterne (F).

جنس طير من التسلفات وفصيلة الببغاوات . انواعها المروفة ١٢ موطنها غينية الجديدة وجزر سليمان . تألفت الغابات الكثيفة الاجار والمواقع القريبة من الماء . ملجئها الحياتي جماعي . قوتها البُار واسارع الحشرات . تسلك الاشجار كالتقار وتطير بحقة الهوري || اجسامها صغيرة ، ربة ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . اجنتها لاسفة . اذناها قصيرة مستترة الاطراف . الثوباها تختلف مع الانواع ، جميعها زامرة الالوان || اشهرها النوسة القزمية .

٢٩٤٢٥ - نَوْسَة قزمية Nasiterna pygmaea (S).

Nasiterne pygmée (F). طائر من النوسة . جسمها صغير القد يطول نحو ٨ سم . ثوباها الى الخضار المتفاوت المجات . رأسها ومقننها صفر . رقال ذنبها الجانية الى السواد اللامع باستثناء الزام الاخير فانه اصفر ، اما الرقال اصفر فرقوا اللون .

٢٩٤٢٦ - نَوْسَل * Métamère (F). Metamere (E).

٢٩٤٢٧ - نَوْسَلَة * Métamérie (F). Metamerism (E).

Oosporées (F). Oosporae (E). نَوْسِيَّات * عارة فطور مجهرية من فصيلة الطحيات . اجناسها ستة : الابداد والخنج والسداد والسيلندريوم والموتليه والنوسة .

٢٩٤٢٩ - نَوْسَادِر * Rhinocheros de Sumatra (F).

هو كركدن سومترا ، اطله .

٢٩٤٣١ - نَوْص * Imbiber (F).

To Imbibe (E). رطب الشيء بالماء أو ياي سائل آخر .

٢٩٤٣٣ - نَوْصَرَة Diopsis (S).

Diopsis (F). Diopsis (E). جنس حشرات من فصيلة النوصريات ورثة ذوات الجناحين انواعها المروفة ستة اعطانها البلاد الحارة || اجسامها مخصورة ، هيفاء ، تطول من ٨ الى ٨ سم . رؤوسها مكورة والميون . عيونها بارزة صغيرة . قوتها الاستعمارية صغيرة ، تحيلة ، تشيق الميون . اخطاها وملاسها صغيرة . كولها

٢٩٤١٢ - نَوْجَل * Hétéropogon (F). Heteropogon (E).

جنس نباتات عشبية حولية ركوبية من فصيلة النجيليات انواعها المروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الحارة والمتدلة الحرارة . سوقها جامدة تحيلة عاصمة الفروع . اوراقها عصفية . ازهارها سنبل التجميع سنابلها فردية . بعضها ينبت طويلاً في بعض مواقع الساحل اللبناني والوسط .

٢٩٤١٣ - نَوْخَة * Ecade

نتيجة البيئة الرطوبية في التكيف أو التبدل . كقولك نوخة الظل والشمس والجفاف والرطوبة ...

٢٩٤١٤ - نَوْر * Corymb (F). Corymb (E).

النورة والمذق شكل من اشكال الازهار سيولي التركيب عديد الازهار المتساوية البعد عن المحور الرئيسي . يكثر في الفصيلة الوردية || والنورة هي الزهرة .

٢٩٤١٦ - نَوْرَج * Mouette (F).

هو نزع الماء ، اطله .

٢٩٤١٨ - نَوْسِيَّات * Laridae (S).

Laridés (F). Laridae (E). فصيلة طير من كليات القدم ، طويولات الریش . اجناسها وانواعها المروفة عديدة || اجسامها متباينة الحجم . اجنتها مستطيلة ذقنة الاطراف . متاقدها عادمة الزقد . اصابعها ناصية الخطاب . قصاصها مجهزة بزويين من الفراض لاجية الإرتكاز تقابل الشرجية . اشهر اجناسها النورس ونزع الماء والمجهوم .

٢٩٤١٩ - نَوْرِي * Nuria (S).

Nurie (F). Nuria (E). سمكة نهرية ربيدة الجنس والنوع من فصيلة الشبوبيات . موطنها انهر الهند || جسمها وشعي الشكل يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . رأسها معتدل الجرم ، مقطوم الخلف . شذقها معتدل الانفراج ، رباعي الذبابت المستطيلة . عيناها ماحتان . زعنفتها الظهرية خلفية الإرتكاز تقابل الشرجية . الذليعية مقعرة الطرف . ثوباها الى الخضار البحري يغير وتعلو ماجة وردية في البطن ويسمر ويبقى في الظهور || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٩٤٢٠ - نَوْرِيَّة * Pétale (F). Petal (E).

هي بتلة الزهرة عامة وقد تستعمل تخصيصاً للدلالة على البتلة المستقلة .

٢٩٤٢١ - نَوْسَة * Oospora (S).

جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة الطحيات تتميز بمشجيتها النجيل الثراس المتشابك التراكب الذي يضمن النجس المنحارة ويتكاثر خارجياً . جراثيم الكندي مثذاتي الشكل . كثالده سبعية التجميع || انواعها عديدة ، معظمها دمي يعيش على المواد الغذائية المحفظة وعلى الاخشاب اليابسة وفي التربة || اعرف انواعها المؤذية ما يلي .

٢٩٤٢٢ - نَوْسَة الاجِصَاص * Oospora piricola (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الاجاص واقلاده وثماره .

٢٩٤٤٢ - نُؤْفَر أَزْعَب (S). *Nuphar pumilum* (S).
Nufar nain (F).
 نوع من النوفر المبلول . اعطاه مياه البلاد المحتلة الحارة .
 أوراقها بطول من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٤ الى ١١ سم .
 ازهاره صفراء اللون صغيرة القد ، قطرها يراوح
 من ٢ الى ٣ سم . || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٤٤٣ - نُؤْفَر أَصْفَر
Nuphar luteum (S). *Nufar jaune*, *Lis jaune des étangs*, *Plateau* (F). *Yellow water-lily*, *Brandy-bottle* (E). *Gelbe mummel*, *G. wasserrose* (D). *Ninfea gialla*, *Erculeas gialla* (I).
 نوع من النوفر المبلول في مياه البلاد الحارة . أوراقه كبيرة
 النصل الاخضر الباهت ، بطول من ١٥ الى ٣٠ سم .
 وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره صفراء اللون متراكبة
 الثلاث العديدة الصفوف قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم .
 ثماره اجاصية الشكل . بلوره ويهدأ به مأكولة || ينور
 من حزيران الى ايلول .

٢٩٤٤٤ - نُؤْفَر سَهْمِي
Nuphar sagittaeifolium (S). *Nufar sagittal* (F).
 نوع من النوفر الامريكي ، أوراقه سهمية الشكل بطول
 من ٢٠ الى ٤٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ . ازهاره صفراء
 اللون متوسطة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . || تنوره
 يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٤٤٥ - نُؤْفَر يَابَانِي
Nuphar japonicum (S). *Nufar japonais* (F).
 نوع من النوفر البروتي الوافر النشط والنبو . مهدد
 اليابان ، أوراقه أهليلجية الشكل ، نصلها اخضر الصفحة
 العليا ، احر السفلى بطول نحو ٣٠ سم . ازهاره متراكبة
 القد صفراء اللون تعلوها نجمة حمراء . اسديها وبآبرها
 ابرجوانية || تنوره يستمر طويلا فصل الصيف .

٢٩٤٤٦ - نُؤْقَس
Bronze
 سبيكة ، متفاوتة اللب ، من النحاس والقصدير والزنك .

٢٩٤٤٧ - نُؤْقَصِيَّات *
Dibamidae (S). **Dibamidae** (F). **Dibamidae** (E).
 فصيلة حيوانات زحافة من العظائيات قصيرات الالسن .
 انواعها المعروفة ثلاثة يجمعها جنس واحد . اعطائها بعض
 اقالم افريقية الاستوائية || جميعها جاسة تسرح في الليل
 وتبيت في النهار || اجسامها دودية الشكل بطول من ٢٠
 الى ٢٨ سم . وهي عادمة القوائم الامامية ، مائعة الخلفية .
 عيونها طامسة تلحفها اغشية مغشية .

٢٩٤٤٨ - نُؤْكَلَة *
Nucula (S). **Nucule** (F). **Nucula** (E).
 جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الحياشيم
 وفصيلة التوكليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
 منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداها
 شبه مخروطية الشكل ، متساوية المصاريح ، لامتساوية
 الاصلع . الوانها عديدة ينفذ فيها الاغبر في النبي الفاتح .
 اصفاها للؤلؤة المادة من الداخل || تعيش منعزلة في
 الرمال المتوسطة الغور .

٢٩٤٤٩ - نُؤْكِيَّات *
Nuculidae (S). **Nuculidae** (F). **Nuculidae** (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الحياشيم .

شبه أهليلجية ، مجهزة باربعة مناخس ذرية . بطونها شبه
 مدقية الشكل . رواشتها شغافة يعلوها بعض البقع السمر .
 قوائمها مستطيلة || الجمالنة واسعة اما البرقة فخاضعة
 ترغب في عصف التجليات .

٢٩٤٣٤ - نُؤْضَرِيَّات *
Diopsidae (S). **Diopsidae** (F). **Diopsidae** (E).
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
 المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة ||
 اجسامها صغيرة بطول من ٨ الى ٨ سم . رؤوسها معتدلة
 الجرم مجهزة بزوائد سنمية الارتكاز ، منفرجة ، مستطيلة ،
 تحمل الميون في اطرافها . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية
 صغيرة تنشب في الزوائد قرب محيط العين . كراسلها شبه
 بيضيه . بطونها مستعرضة المؤخر . اجنتها شغافة يعلوها
 بعض البقع السمر . قوائمها مستطيلة || يرقاتها خاضعة
 تتركب عصف التجليات || اشهر اجناسها النوفرة .

٢٩٤٣٥ - نُؤْطَة
Ventricule succenturié (F).
 احد اجزاء جهاز الهضم عند الطير . اوها الحوصلة ثم
 النوبة ثم القاصصة ثم الامعاء || فالخوصلة هي الجراب الاول
 الذي يلي المريء يجتمع فيه الطعام بعض الوقت ثم ينتقل
 الى النوبة (البطن المصغري) وفي جراب مستطيل يفرز
 العصارة الخاصة على الاطعمة من حب وغيره التي صار
 تليينها بالخوصلة ثم ينتقل الطعام من النوبة الى القاصصة
 حيث يسحق مع الحصى والزمل ويدخل في الامعاء حيث
 يتم الهضم والغذاء .

٢٩٤٣٦ - نُؤْطَر
Nothure (F).
 طائر يدعى تطوره . اطلبه .

٢٩٤٣٧ - نُؤْع
Espèce (F). **Species** (E).
 النوع هو جماع الفرووب اي جملة الافراد المتشابهة التي
 تحدت من اصل واحد او جود مشتركة .

٢٩٤٣٨ - نُؤْعَم *
Cystoseira (S). **Cystoseira** (F). **Cystoseira** (E).
 جنس نباتات بحرية من الحيات السمر . انواعها المعروفة
 نحو ٢٠ اعطائها معظم بحار العالم || كلالها قصيرة .
 سوقها فراء . أوراقها خطيطة ، صغيرة . كثيرة العدد ،
 متراكبة . تتميز بمحورياتها الشبه بيضيه الشكل ،
 السبيعية التجميع .

٢٩٤٣٩ - نُؤْعِي
Spécifique (F). **Specific** (E).

٢٩٤٤٠ - نُؤْكَ
Cardiosperme (F).
 هي اليكث ، اطلبه .

٢٩٤٤١ - نُؤْفَر *
Nuphar (S). **Nufar**, **Nuphar** (F).
 جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النبلوريات .
 انواعها المعروفة ١٥ اعطائها مياه اناهار واهوار وبعض
 بحيرات البلاد الحارة والمعتدلة . جذمورها مدادة . أوراقها
 مستطيلة الاعناق طافية . ازهاره عديدة الثلاث المتشابهة
 الصفوف . ثماره جواء ربعية الشكل ، بزورها ثشوية
 المادة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



نوعم



نوفر



نوكلة

اما انواعها فكثيرة . اعطائها بلاد امريكا الجنوبية . نباتاتها عشبية وجنية ، معظمها بري وبعضها ترابي . اشهر اجناسها النولان .

٢٩٤٥٦ - نُولِيْنَا (S). Noline (F).

جنس نباتات من فصيلة الزنبقيات معقودة التعريف على اسم البوتاني الفرنسي "نولان". انواعها المعروفة قليلة ، منها بلاد المكسيك . سوقها ليفية التركيب ، لغنية الجثث والقاعدة ، دقيقة الجذع . اوراقها عريضة النصل ، مستطيلة متعقبة . ازهارها جرسية الشكل ، صفراء ، هامة الارتكاز || ترطب في الاثرية الفنية المتوسطة الاندماج والمادة الكلوية . تخشى المواقف الباردة والرطوبة المستحكة . اشهر انواعها الزنبقية ما يتبع .

٢٩٤٥٧ - نُولِيْنَا مُعْتَبَرَة (S). Noline recurvata (F).

نوع من النولينا الزنبقية ، ساقها تعلو من ٤ الى ٦ اذتار . اوراقها جميلة الخضار تعلو نحو ١٠٠ سم . وتعرض ٢ سم . ازهارها هامة يكتل الساق بعقوده المتشعب الكبير الحجم . ازهارها بيضاء اللون . تنورها يستمر طوال الصيف .

٢٩٤٥٨ - نُولِيْنَا مُسْتَعْمِلَة الرَّق (S). Noline à longues feuilles (F).

نوع من النولينا الزنبقية ، ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها شديدة الخضار العابق تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها هامة الارتكاز يتفرع الساق بعقوده المتشعب الكبير القد . ازهارها بيضاء اللون ، غبراء المواج . تنورها يستمر طوال الصيف .

٢٩٤٥٩ - نُولْمَان ، حَشِيشَة الفَتَق (S). Herniaria (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النونيديات . انواعها المعروفة ثمانية تكثر في الاماكن الرملية الجافة . سوقها فراء اوراقها متعاقبة لاطلة صغيرة القد . ازهارها ابطية الارتكاز او تاجية . ثمارها بذور نشوية المادة || اشهر انواعه النولمان الامرد .

٢٩٤٦٠ - نُولْمَان اَمْرَد * ، حَشِيشَة الفَتَق (S). Herniaria glabra (F).

نوع من النولمان العشبي البري الطبي المعمر . ساقه فراء مرط ، اوراقه صغيرة القد ، متعاقبة ، لاطلة ، بيضية النصل ، مائلة البشرة . ازهاره ابطية وتاجية الارتكاز ، نورية التجميع ، صغيرة الحجم || كان شائع الاستعمال في علاج الفتق .

٢٩٤٦١ - نُولْمَانِيَات (S). Illecebrae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديمة القملات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . نباتاتها اعشاب حولية وعمره تعيش في المراض الحارة وفي الاثرية القليلة الرطوية . اوراقها كاملة . ازهارها ضمية التجميع لا قياسية الارتكاز . ثمارها بذور نشوية المادة . || اشهر اجناسها النولمان والحربط والشعير وحشيشة القنابيل .



نولان



نولمان امرد

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . انواعها الغابرة من متحجرات اقدم التكاوين الجيولوجية . اما المعاصرة فتنتشر في معقل بحار المال || اصداها شبه غروطية الشكل ، متساوية المصاريح ، لامتناهية الاصلح . اصفاها خشفة ملوثة من الخارج ، مائلة للؤلؤة من الداخل . حيواناتها ماحصة اللصاع ، كبيرة الاجل الاحليلجية المستطيلة || اعرف اجناسها المعاصرة واشهرها النوكلة .

٢٩٤٥٠ - نُولَان * (S). Nolana (F).

Nolana, Chilean bell-flower (E). Glockenwinde (D). Nolana (I).

جنس نباتات برية وزراعية تربينية من فصيلة النولانيات . انواعه عديدة منها العشبي والجنيبي والحولي والجوهر والمعمر . سوقها لا نظامية الجلوس منها المتشعبة والمستطيلة والمداقة . اوراقها كاملة معقبة متعاقبة او توتابية . ازهارها فردية مجعنة ، محورية الارتكاز ، جرسية الشكل ، فارشة الاطراف كالبرق . ثمارها نووية لا قياسية الشكل والحجم . بلورها خشبية المادة . شديدة الصلابة || اعرف انواعه الزنبينية واشهرها ما يتبع .

٢٩٤٥١ - نُولَان سِرْمِيَّة الرَّق (S). Nolana atriplicifolia (F).

Nolana atriplicifolia (F). Nolana à feuilles d'arroche (F).

نوع من النولان الزنبقية الحولي . موطنه الاصل بلاد كولومبيا . ساقه مستطيلة مدادة زياء اللحاء . اوراقه الجذعية كبيرة القد سمرية الشكل . اوراقه العليا مسوطة جميعها خلية النصل . ازهاره زرق الابواق ، صفر الانابيب والفجاج || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٤٥٢ - نُولَان سِنَانِي الرَّق (S). Nolana lanceolata (F).

نوع من النولان الزنبقية الحولي . موطنه بلاد الشيلي . جذعه جني الجذر . ساقه مسطحة زياء . اوراقه لاطلة ، ساعدة ، سنانية النصل ، خلية البشرة || الجذعية منها ضمية التجميع والاخرى توتابية . ازهاره كبيرة القد سمانجونية الابواق ، صفر الفجاج والانابيب المسجلة بالنفسي . تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٩٤٥٣ - نُولَان مُتَنَاقِص (S). Nolana paradoxa (F).

نوع من النولان الزنبقية الحولي السبروتي . موطنه الاصل بلاد البرازيل . ساقه متشعبة فراء ، زياء اللحاء ، تعلو نحو ٣٥ سم . اوراقه توتابية ساعدة ، نصلها مسوطة الشكل ، خلي البشرة . ازهاره بنفسجية الابواق ، صفر الانابيب ، حر الفجاج || تنوره صيفي يستمر نحو ٤٥ يوما .

٢٩٤٥٤ - نُولَان مُسَطَّح (S). Nolana couchée (F).

نوع من النولان الزنبقية الحولي السبروتي . موطنه الاصل بلاد البرو . ساقه مستطيلة مدادة . اوراقه معقبة متعاقبة ، نصلها اهليلجي الشكل ، مائل الصفحة ، جبل الخضار الزاهي . ازهاره زرقاء اللون ، مسنجة بالنفسي كورسها هروية الشكل ، خاسية الفصوص المتساوية الرعية الاطراف . تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٤٥٥ - نُولَانِيَات (S). Nolanaceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها قلية العدد .

2٩٤٦٤ - نُون النون هو الحوت. ج نينان وأنون.

2٩٤٦٣ - نُون بَحْرِيّ (F). Anguille de mer
سمكة بحرية تدعى زرقوبة مبلولة ، أغلبها .

2٩٤٦٥ - نِيَاهَه (F). Zoogenie (F). Zoogeny (E).

النياه فرع من الزوولوجية يبحث في نشوء الانواع الحيوانية وفي مدارج نموها .

2٩٤٧٦ - نِيَه (F). Animus (F).

هي الدافع الباطني الحقيقي للعمل .

2٩٤٧٧ - نِيَه التَدَلّيس ، نِيَه الغش

Consilium fraudis (F).

هي نية اجرامية يستدل عليها من معرفة المدين مدى الضرر الذي يلحق به اذا ثبته عند قيامه بعمل يجعله معسراً او يزيده في اعصاره .

2٩٤٧٨ - نِيَه التَمَتُّك (F). Animus domini (F).

هي ان يتصرف المرء في المال كتصرف المالك له سواء كانت ملكيته حصصية ام غير حصصية .

2٩٤٧٩ - نِيْتَرَات (F). Nitrate (F).

النترات ، كايوا ، ملح يحصل من تآكس الحامض النيتريكي مع احد الاجسام . وهو من الامسدة الازوتية المشهورة الشائعة الاستعمال نظراً لسرعة انفعاله في التربة وقرب متناوله من النبات الذي يغطها دون جهد او عناء . النترات او الامسدة النيتراتية عديدة مختلفة التراكيب والمصادر اعرفها واشيعها استعمالاً ما يتبع .

2٩٤٨٠ - نِيْتَرَات الامُونِيَاك ، نِيْتَرَات الشُكَّار

Nitrate d'ammoniaque (F).

احد اهم الامسدة الازوتية التركيبية يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع الامونياك . يحوي نحو ٣٥٪ من الازوت الصافي منها ١٧.٥٪ ازوت نيتريكي و ١٧.٥٪ ازوت امونياكي . لذلك فهو يجمع بين سرعة انفعال وتمثيل النترات وبين بطء انفعال وتمثيل الامونياك الذي يرافقه القسم الاكبر من دورة النبات الشولية او الحولية .

2٩٤٨١ - نِيْتَرَات البوتَاس (F). Nitrate de potasse (F).

سماد ازوتي بوتاسي يستحضر من تكرير ملح الباريوم وتصنيعه مع البوتاس . يتميز بفعالية نسبة رطوبته التي لا تفوق ٤٪ وهو يحوي من ١٢ الى ١٤٪ من الازوت النيتريكي ومن ٤١ الى ٤٦٪ من البوتاس . || مظهره الخارجي ملح متبلور ابيض اللون . ارتفاع نمته يجعل استعماله محصوراً بـزراعات الازهار .

2٩٤٨٢ - نِيْتَرَات الجير ، نِيْتَرَات الكلس

Nitrate de chaux (F).

سماد كايوي مركب من تآكس الحامض النيتريكي مع الكلس . وهذا الحامض النيتريكي يستحضر اما مباشرة بتسليط القوس الكهربائي على الازوت الجوي او باكسدت الغاز الامونياكي بحسد استحصاله من ازوت الجو . وهو يحوي ٥٥٪ من الازوت النيتريكي ونحو ٢٨٪ من الكلس . تألفه مع الكلس يجعله اسرع الامسدة انفعالاً وتمثيلاً واكثرها ملائمة لجميع الاربع . || اما محاذيره فهي سرعة تمثيله وتقلصه من التربة ، ارتفاع نسبة رطوبته التي تبلغ ٥٥٪ . عدم قابليته للزجج مع الامسدة الاخرى

2٩٤٦٥ - نَوَهَه (F). Phytogénésie (F).

النوة نمو النبات وشماخه .

2٩٤٦٦ - نَوَرَات (F). Pleosporaceae (F).

فصيلة الفطور الثورية من رتبة الزقيات .

2٩٤٦٧ - نَوَرِيّ (F). Nucléaire, Nucléal (F).

2٩٤٦٨ - نَوَرِيّ (F). Any stone-fruit (E). Drupe (F).
كل ثمرة لحية ذات نواة اي عجمة كالشمشة والوزة يكون فيها السويق اي الجزء المتوسط الكائن بين القشرة والمجمعة لحبي التركيب ، ويكون الجزء الداخلى الذي يحيط بالزرة قابلاً سلباً كما في عجمة الزيتون والخوخة ...

2٩٤٦٩ - نَوَرِيّ (F). Oospore (F). Oospore (E).

النوية بوفعة غقيات الوليج .

2٩٤٧٠ - نَتِيم (F). Oospore (F). Oospore (E).

هو الفسج اي صوت البوم . قال الاعشى يصف فلا :
« لا يسمع المرء فيها ما يؤنسه
بالليل الا نعيم اليوم والضوضا »

2٩٤٧١ - نِيَادَات (F). Unionidae (F). Unionidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرغويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحيرات وانهار العالم || اصداؤها نظامية ، متساوية المصارع ، لامتساوية الاصلع ، ملونة ، ينشأها ادمة غشراء . اجسامها مائحة المسطح ، مستطيلة الاربعيل الصفيحية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها النيسادة والدردية والمربقة والمهرية والوثينة والمولرة .

2٩٤٧٢ - نِيَادَقَة (F). Unio (S). Mulette (F). Unio (E).

جنس حيوانات مائية من الرغويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النبادات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع انهر العالم وبحيراته || اصداؤها كبيرة القد او متوسطة ، بيضية الشكل ، متساوية المصارع ، ينشأها من الخارج ادمة يكثر فيها اللون الاخضر وينشأها من الداخل طبقة صميكة لؤلؤية شائعة الاستعمال الصناعي || تعيش منتفخة في الاسمال والريال .

2٩٤٧٣ - نِيَاط (F). Nibatt (F). Nibatt (E).

النباط نجمان نيران من كوكبة برج العقرب موقعها قدام القلب وخلفه .



نِيَادَة

٢٩٤٩١ - نَيْتْرُون شبر متن .

٢٩٤٩٢ - نَيْتْرَة
Curure (F), Dirt, Muck (E).
وحل مستخرج من فتاة او خندق .٢٩٤٩٣ - نَيْتْرِيَّات *
Phrynomeridae (S). Phrynomeridae (E).

فصيلة حيوانات درداء قارضة شائعة من لمة الخديجيات ومرتبة السوفيات ورتبة البترات اي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها قليلة العدد مهدها بلاد افريقية الشرقية والجنوبية . جميعها من الصفاعد الصغيرة القذ . تتميز بمساوات سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها وتتبدد التنوات العظمية الجانبية في فقرة العنبر . رؤوسها صغيرة . فكوكها العليا مستنة . اصابع قوائمها الامامية والخلفية طويلة من كل صلبان تحمل في اطرافها طباب محمية تمكئها من تعلق الطلع المائل ، جلودها مائلة ، عادمة الشعر ولكنها تفرز ، عند القبض عليها ، مادة كاوية تعمل في اليد ما يفعله نبات القراص المحرق || اثنائها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر الداكن والرقشة الصفراء وبعض الخطوط القاطبة || معظم اوتها يعيش على النباتات والاشجار القريبة من الماء .



نيل

٢٩٤٩٤ - نَيْتْر *
Propagule (F).

النثر جهاز التناسل عند العلحالب . وهو مركب من عدة حبيرات زئبدية ، وشبة الشكل او عسبة . يسقط عند الادراك التام فينتش في التربة ويميد الدورة الحياتية .

٢٩٤٩٥ - نَيْدِيَّة *
Melanargia galathea (S). Mélanargie galatée, Demi-deuil (F).

Melanargia galathea (E).
حشرة من فصيلة الهانيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم الاقطار الاروبية . فراشها واسعة قوتها مشفر الازهار . سرتها تعيش على عصف الذكيتل والرغول والعصوية والتف وجسمها متوسط القد يعطو نحو ١٨ م . سقطها نحو ٢٨ م . رأسها الى الربعة . حينها كبيرتان . زباناها صولجانيان اسودان . جوشها الى الربعة السراء . يعطها الى الربعة || رواشها ، عند الشقين ، الى البياض الاغبر يملو تبيج وتزويق وتتميق اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح من اللغوش الى فحة الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو تسعة اسابيع وتنتع المكن لطحاً على الصفحات السفلى من نصلان الصف || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . قشورها ناعم الخمل القصير . ثوبها الى الربعة الخضراء يعلوا غطان جانبيين اصفران وسط بجبي اسود . رأسها اسود . شرجها ينتهي بزايدة مفلوكة . منها ودراجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة ضمن غلاف عضوي المادة .



نيدبة

٢٩٤٩٦ - نَيْدِيَّة *
Neda (S), Neda (F), Neda (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عديمات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعيش لاصقة بالصخور القريبة من الشواطئ || اصداها داخلية ، مستديرة ، رقيقة ، شديدة الصغر . اجسادها نحيلة ، مستطيلة ، مدببة المقدم والمؤخر . اعطائها

اجصها السورفوسفات ونترات الصودا وسلفات الامونيك والاسمدة العضوية .

٢٩٤٩٣ - نَيْتْرَاتُ الشَّيْلِي ، نَيْتْرَاتُ الصُّودَا الطَّبِيْعِي
Nitrate de soude de Chili, Nitrate de soude naturel (F).

سماد ازوتي يستخرج من كلش مناجم الشيلي بعد تدويبه وترسيبه ويخبر مائه . مظهره الخارجي ملح ابيض اللون يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي وبعض التي ازيد من عناصر اليود والبروم واليورك والمناز يضاف اليها بعض تواله الاكدار الثانوية . || وهو سريع الانفعال في التربة قريب التشثيل من النبات غير انه ينشط تماسك ذرات التربة الذي يجد من رفايتها . لذلك ينصح باستماله في الارربة الخفيفة القليلة الاندماج وبعدم استعماله في الارربة المندمجة او الحامضية الدالفة لانه يجمد تفاعليها نتيجة لتجمد تماسك ذراتها .

٢٩٤٨٤ - نَيْتْرَاتُ الصُّودَا التَّرْكِيْبِي
Nitrate de soude synthétique (F).

سماد كبري ازوتي سريع الانحلال والتشليل ، يستحضر من ازوت ملح ، يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي . يقال فيه ما قيل بنترات الشيلي من حيث نتائجها الحكيمة والكياوية على ذرات التربة وانفعالاتها .

٢٩٤٨٥ - نَيْتْرَاجِين
Nitragine (F).
مستحضر ازوتي سائل المادة ينتج من تكثير جرثائم التربة صناعياً . || يستعمل حقناً بالترية لمدها بجرثائم النيترومين .٢٩٤٨٦ - نَيْتْرُوبَتَاس
Nitropotasse (F).
سماد كبري يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع البوتاس . تركيبة ٢٥ ٪ بوتاس و ١٦,٥ ٪ ازوت نصفه تماماً نيتريكي والنصف الآخر امونياكي . يعتبر من الاسمدة الجليظة النفع والفايدة غير انه يشكو من ارتفاع نسبة وزنه التي تبلغ ٣,٤ ٪ .٢٩٤٨٧ - نَيْتْرُوجِين ، نَيْتْرُوجِين
Nitrogène (F). Nitrogen (E).

هو الازوت ، اطلبه .
٢٩٤٨٨ - نَيْتْرُوسُفَات
Nitrophosphate
سماد كبري يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع السلفات المهدق . تركيبة ١٤ ٪ من الحامض السلفوري الذي يلوب في الماء و ٧,٥ ٪ من الازوت النيتريكي السريع الانفعال . يعتبر من الاسمدة النشطة التي تحسن النبات على الازهار .

٢٩٤٨٩ - نَيْتْرُوفِيل *
Nitrophile (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يرغب في الارربة الغنية بالنترات وقد يطلق على التربة ايضاً فتقول تربة نيتروفيلية .٢٩٤٩٠ - نَيْتِيل *
Nitel (S), Nitéle (F).

جنس حشرات نافعة من الصغريات الفاشقية الاجنحة المحصورة . انواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٢ الى ٥ م . اثنائها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسود والاصفر الصنابي . قوتها الاستشعارية عجيبة منفرجة الاطراف . مرآتها شاذية الحمة الحادة . || قوتها الزبديات من اي نوع كانت تعطيها بشذامها فتخدر اعصابها وتثقلها الى حيث تلتقيها .

غروطة متوسطة الطول. لوانسا ثنائية، انبوية مغلوقة السطوح الخارجية.

٢٩٤٩٧ - نَيْدَس قَمَصِي ٥

Nelides tipularius (S). *Nélide tipulaire* (F).

حشرة خاملة من فصيلة البرتوسيات ورتبة غخلفات الاجنحة. جسمها صغير القد ي طول نحو ١٠ سم. شكلها وسرعاتها في انتقالها شبيهة بشكل القمص وحركاتها || ثوبها الى الخطي الاسمر. رأسها مكور، مستطيل الحظ. عيناها جانبيتان، صغيرتان. زباناها دقيقان، مستطيلان كوسلهما شبه غروطي الشكل. حجبها ضيقة، صغيرة. ظهورها ضيق لاحق. قوائمها مستطيلة. الصفحة السفلى من بطنها وصدرها الى السرة السوداء || تألف البراري والمواقع التي تكثر فيها الاعشاب اخصها الجراب. قوتها الاوراق.

٢٩٤٩٨ - نَيْدَمَان * ، نَيْدَمَان ، وَرْد الشَّمْس
Drosera (S). *Drosère, Rosée du soleil, Rossolis* (F). *Sundew, Lustwort* (E). *Runder Sonnentau, Roséil-kraut* (D). *Drosera, Rosolida, Erba da gottasi* (I).

جس نباتات عشبية مفترسة معمرة من فصيلة النيدمانيات. انواعها المعروفة زهاء ١٠٠ جميعها مغيافة تعيش في المناطق والمطارب والمواقع الرطبة. سوقها مقررة. اوراقها قرمية الانتساب مستطيلة الاعناق. ازهارها خاسية الاجزاء تقوم على شاربين دقيقة منتصبة تتوسط الاوراق. || اقتباسها الحشرات يتم بواسطة اوراقها المستترة، المقررة التصل المدروز بالولاس الدافقة التي تشع كل حشرة تقرب منها ثم تقضي عليها وتمتصها بعد ان تفرز لوانسا المعارة الحامضية الهامضة اللازقة. وعند نهاية عملية الامتصاص يعود التصل الى ما كان عليه وتعود اللوانس الى الانتصاب وفرز المواد الدافقة بانتظار فريسة جديدة.



نيدمان

٢٩٤٩٩ - نَيْدَمَانِيَات

Droseraceae (S).

Droséracées (F). *Droseraceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القمالات مرتفعات المبيض. انواعها المعروفة عديدة تجتمع الى ستة اجناس اشهرها النيدمان والتفاض والديونه. جميعها اعشاب مقررة معمرة ترطب في المناطق وفي الارربة الطرية الرطبة. اوراقها قرمية الانتساب. ازهارها خاسية الاجزاء. ثمارها جراء بيضيه الشكل. بزورها آحية الصلام. مغلف انواعها من النباتات المفترسة التي تحول اجسام الحشرات الى مواد منهضة تمتصها بلوانسها.

٢٩٥٠٠ - نَيْر

Joug (F). *Yoke* (E).

عشبة مختلفة الاشكال والاحجام توضع في علق الثور او على رأسه يستعمل بواسطتها من جر الاثقال والحراث وما اشبه.

٢٩٥٠١ - نَيْر ٥

Lucicole (F).

نمت ترميزي يلقب على الحشرات التي تبس في الظلام.

٢٩٥٠٢ - نَيْر التَوَامِين

نجم نير من برج التوأمين. مركزه قبالة رأس التوأم المأخوذ. يبعد عن الارض نحو ٢٨ سنة ضوئية.

٢٩٥٠٣ - نَيْر الحَمَامَة

نجم نير مزدوج من كوكبة الحمامة، يدعى الفاختة، اطالها.

٢٩٥٠٤ - نَيْر الرَاس

نير الراس نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة.

٢٩٥٠٥ - نَيْر الزَوَرْق

نير الزورق نجم نير من كوكبة النهر.

٢٩٥٠٦ - نَيْر السُرَة

نير السرة نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة.

٢٩٥٠٧ - نَيْر السَرَطَان

نير السرطان نجم نير من كوكبة السرطان.

٢٩٥٠٨ - نَيْر الفَكَة

نير الفكة نجم من كوكبة الاكليل الثمالي، يوجد خلف السالك الرابع ويدعونه قصعة المساكين.

٢٩٥٠٩ - نَيْر القَدَم

نير القدم نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة.

٢٩٥١٠ - نَيْر قَنْطُورُوس

نير قنطورس نجم من كوكبة قنطورس يدعى حضار، اطله.

٢٩٥١١ - نَيْر نُعِيم

Alpha de la Croix du Sud (F). *Crux* (E).

نير نعم نجم نير من كوكبة صليب الجنوب المعروفة ايضا بنعيم. يبعد عن الارض نحو ١٠٠ سنة ضوئية.

٢٩٥١٢ - نَيْرَة

Nerea (S). *Nérée* (F). *Nerea* (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل غلفيات الحياشيم وفصيلة السيليات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر || اجسامها عرياطة حلالية مستطيلة محببة الظهور الثنائية الاغاديذ، رباعية الزوائد الجناحية الشكل. رؤوسها صغيرة مكورة، ثنائية اللوانس الدوبوية. غياشيمها انبوية الشكل تطلق الزوائد.

Sui generis

٢٩٥١٣ - نَيْرَج ٥

لكل زهرة او ثمرة او مادة عضوية او جسم حيواني راحقة خاصة فارقة مميزة. فالنرج هو تلك الرائحة الخاصة المميزة

٢٩٥١٤ - نَيْرَمْبِيرْجِيَة

Nierembergia (S).

Nierembergie (F).

جنس نباتات عشبية مدادة معمرة من فصيلة الباذنجانيات. معقوفة التعريف على اسم العلامة «نيرميرج». سوقها تطول من ٢٠ الى ٩٠ سم. اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام. ازهارها بيضاء اللون او ليلية. انايبها مستطيلة. بتلاتها فارقة. منهايا بعض مناطق امريكا الجنوبية || انواعها المعروفة، متوسطة المدد اشهرها التالية.

٢٩٥١٥ - نَيْرَمْبِيرْجِيَة كَدَنَة

Nierembergia frutescens (S).

Nierembergie frutescens (E).

منهايا الشيل. ساقها كدنة خلية اللحاء تطول من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها صغيرة معتدلة العرض. نصلها خلية

Avril (F), April (E).

٢٩٥٢٤ - نيسان

يعرف أيضاً بأبريل. الشهر الرابع من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع التي تنتفع فيها بنشاط طاقة النشو الطبيعية. مدته ثلاثون يوماً.

تقومه الزراعي : الاعمال الزراعية الواجب تبنيها في هذا الشهر أو الممكن إنجازها فيه منوعة وعديدة اخصها .

في الزراعات العامة الموصية

— بلر القطن بعد تحضير التربة وتوزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة لانه من النباتات المشككة التي تستدرف خواص التربة والتي تتطلب الكثير من المواد الغذائية .

— متابعة تحضير التربة ونثر الاسمدة الكيماوية المعدة لزراعة التبغ قبل انقضاء الوتيرة الاولى من هذا الشهر .

— متابعة الاعتناء بمشاكل التبغ وراقبتها من الحشرات والأمراض الفطرية .

— توزيع آخر وجبة من الاسمدة الازوتية النيرانية على زروع القمح المتأخرة .

— الاسراع في زرع البصل المتأخر قبل حلول الوتيرة الثانية من الشهر .

— مباشرة زرع الشولدر السكري بعد تحضير التربة ومدها بالاسمدة اللازمة مع العلم ان الشولدر يرغب في التربة الغنية بالمواد العضوية .

في الاشجار المثمرة

— متابعة التعميم في المناطق المتأخرة .

— السهر على حياة الاشجار المثمرة من صقع بعض الليالي الصافية الايام وقد يتم ذلك باستعمال غيوم اصطناعية من الدخان الكثيف .

— متابعة جمع اعمال مكافحة الحشرات والاصنام النباتية .

— مباشرة مكافحة ديدان الثمر في التفاح والاجاص والخوخ .. على اثر سقوط ثمرات الزهرية .

— الابتداء بحرق التربة أو ركاشها مع طمر الاشباب التي كانت فيها شرط ان يكون العقد قد جاوز حجم حبة الحمص .

في الحفصيات

— حرق تربة البساتين واقتطاع جميع الاعشاب وطمرها .

— تشذيب الاشجار واقتطاع الفروع الزائدة أو الانتجانسة .

— متابعة توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة .

— حفض المطاعم الجديدة حوقاً عليها من لفحة الشمس .

— عدم تأخير قطف الاشجار التي بشرت بالانزهار .

— مباشرة مكافحة ذبابة البحر المنوش .

في الموز

— اقتلاع جميع الشتل الغتية الضعيفة أو الزائدة عن الحاجة .

— توعين النشوب القريبة من الكباس بقليل من الاسمدة السريعة التمثيل .

في الزيتون والكرمة

— متابعة حراثة الزاوين وانجازها قبل ابتداء الثل .

— حرث الكرمة حفظاً على رطوبة تربها ولقضاء على الاعشاب الضارة .

— تغدير اوراق الكرمة بالكبريت الميكروفي ، على سبيل الحيلة ، في المواقع المعرضة للانزهار .

في الخضار

— بلر وزرع جميع الخضار الصيفية التي تملأ زرعها في الشهر الماضي نظراً لموقع التربة ونوعيتها .

البشرة لونها الى الخضار الباهت . ازهارها ليلكية اللون قطرها نحو ٢٥ م. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٩٥١٦ - نيرمبرجيه نهريه

Nierembergia rivularis (S).

Nierembergia des ruisseaux (F).

منبتها ضفاف نهر البلاتا . ساقها مسطحة تطول نحو ٤٠ سم. اوراقها مسطحة الشكل . نصالها عادة املح ، حيلة الخضار المايق ، تطول نحو ٣ سم. ازهارها عاجية اللون ، فواحة العرف . قطرها نحو ٤ سم. طولها ٣ الى ٥ سم. || تنويرها يستمر طول شهر تموز .

٢٩٥١٧ - نيرمبرجيه هزيلة

Nierembergia gracilis (S).

Nierembergia grêle (F).

منبتها الاربعين . ساقها هزيلة مسطحة تطول نحو ٥٠ سم. اوراقها ضيقة ، شبه خطية الشكل . ساقها واوراقها كثيفة املح والزيغ . ازهارها ليلكية اللون يعلوها موالج بنفسجي . تزيجها الى البياض الازرق الموالج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٥١٨ - نيرولي

Nérôli (F), Neroli (E).

هو عطر القنداق أو دهن القنداق المستقطر من زهر النارج المروف بالقنداق .

٢٩٥١٩ - نيرول الزيتون * Phloeotribus oleae (S).

Néiroun, Rongeur de l'olivier, Scolyte de l'olivier (F). Phloeotribus oleae (E). Ölbaumborkenkäfer (D).

حشرة من الكرشيات الغدييات الاجنحة . طولها نحو ٢ م. ثوبها الى السود اللامع يعلو تجذع خلي اغبر . زيانها دقيقة صغية الاطراف . || تركب الزيتون والبليل والمراش . انثاها تنجح الممكن في اللحاء وقد تخلع الانثان عند انتشاب السنايل الزهرية . يتغذى الممكن عن ريقات غاشية تخلع الشكير تضعليه . || يكافح باقتطاع وحرق الاجزاء المصابة في غضون شهر نيسان .

٢٩٥٢٠ - نيرينة *

Nerinea (S).

Nérinée (F), Nerinea (E).

جنس حيوانات من الرخويات معدييات الارجل وفصيلة النيرينيات . انواعها المروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاقحاب الثانوية || اصداها مرديية مستعيلة قريبة الشبه بالسرينيات .

٢٩٥٢١ - نيرينيات *

Neriniidae (S).

Neriniéides (F), Neriniidae (E).

فصيلة من الرخويات معدييات الارجل . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاقحاب الثانوية || اعرف اجناسها النيرينة .

٢٩٥٢٢ - نيريزب

النيريزب هو قصب ذكور الاغنام والظباء .

٢٩٥٢٣ - نيرولك

Bolide

جسم صلب اللد شاردي في الغشاء يعبر الاجواء الارضية وقد يستقر على الارض .



نيرول الزيتون



نيرينة

Désinsectisation (F).

٢٩٥٣٣ - نَيْسَبَة °

في الزهور

Arête d'une montagne

٢٩٥٣٤ - نَيْسَب

Ridge, Crest (E).

أعلى نقطة أو موقع في قمة جبل . ج نَيْسَبَات وأَيْسَبَات وَيُسُوق .

Petricola (S).

٢٩٥٣٥ - نَيْسَب °

Pétricole (F). Petricola (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النيكيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة القد . متعاشية بارزة طليقة . أصدافها شبه مظلمة الشكل . تعيش في انفاق تنقبها في الصخور المغمورة بالماء . ليفتها غزير المادة .

Petricolidae (S).

٢٩٥٣٦ - نَيْسَبِيَّات °

Pétricolidae (F). Petricolidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ، تنتمي إلى مرتبة النوتيات . أجسامها وأنواعها الغالبة عديدة إما الماصرة فقليلة جميعها مصفدة رباعية الإعضاء كالحياشيم والمتعاشية واللاذنبات . أعطانها معظم بحار العالم . تعيش في انفاق تنقبها في الصخور المغمورة بالماء || أعرف أجسامها وأشهرها النيقب والتارانيش .

Nika (S). Nika (F).

٢٩٥٣٧ - نَيْسَبَة °

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل وفصيلة النيكيات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || ملجبات الحياتي جماعي . تسرح قرب الجاحض والشطوط جميعها جيدة الصنف مأكولة كالغبار .

Nickel

٢٩٥٣٨ - نَيْكَل

معدن كذهب ألون الفاتح اللامع ، شديد الصلابة ولثامته ، ريزه (في - Ni) وزنه الذري ٥٨,٩٩ ثقله الذري ٩ ينصهر في ١٤٥٠ °س . || وهو قليل التأثير بالهواء الجوي ، قابل للتسقط والطرز والسحب . يدخل في تركيب أكثر السبائك لانه يكسبها من صلابة ومتانة ويزيدها من قابليته للسحب . وهو يستخدم أيضاً بكثرة في عملية طلاء المادون .

Nicotine (F).

٢٩٥٣٩ - نَيْكُوتِين

وبهم من قائل تبين . مادة قلوية جعالية شديدة النقط والفتالة تستخرج من التبغ . || وهي تستعمل تحت شكل سلفات النيكوتين في القضاء على بعض الحشرات الزراعية

Nicotianées (F).

٢٩٥٤٠ - نَيْكُوتِيَّات

Nicotianae (E).

هي النيكيات ، راجعها .

Nikidae (S).

٢٩٥٤١ - نَيْكِيَّات °

Nikidés (F). Nikidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل ، طويولات الذيل . أجسامها وأنواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || أجسامها صغيرة قريبة الشبه بالغبار . متعاشية قصيرة . الزوج الامامي من قوائمها مجهز بملاقط صغيرة . الزوج الثاني مجهز بمقاط ذرية || ألوهاها جملة الألوان القسطنطينية الزاوية || أشهر أجسامها النيكية .

— بذلر الأنواع المتخارة ونقل الشتول الصالحة إلى مستقراتها
— المحافظة على النباتات والورود من عبث الحشرات
— التخلص من الآورام الفطرية .
— الاعتناء بالتسميد والتنقيل .

في الدجاج والنحل

— متابعة حفرن وترعيم البيض والعناية بالصيصان .
— تحميص القفران أو الخللايس اللازمة لانتاج الالوان الجديدة .
— البدء بنقل الناحل إلى الاماكن الموصوفة بمجودة مرتعها المفترى .

٢٩٥٢٥ - نَيْسَب ، نَيْسَبَان

طريق النمل إلى زيتيه .

Event (F). Blow-hole (E).

٢٩٥٢٦ - نَيْسَب °

مخرج بخار الماء عند الحيتان وبعض الاسماك . ج نَيْسَب .

Nysson (S).

٢٩٥٢٧ - نَيْسُون °

Nysson (F). Nysson (E).

جنس حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة الحمويات . وفصيلة النيسونيات . أنواعها المعروفة نحو ٩٠ منتشرة في جميع اقطار العالم القديم || أجسامها صغيرة محصورة . رؤوسها مستعرجة . تأثيرها نشيط ، حادة . عيونها كبيرة ، ناشرة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . اجنحتها شبه شفافة . بطونها اهليلجية . ألوهاها إلى السرة المتفاوتة السواد يعلوها في بطونها تجذيع طوي يراوح من التبي إلى الاصفر الذهبي .

Nyssonidae (S).

٢٩٥٢٨ - نَيْسُونِيَّات °

Nyssonidés (F). Nyssonidae (E).

فصيلة حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة الحمويات . أجسامها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم || جميعها جابهة تقم عشاواتها في التربة . أجسامها صغيرة ، محصورة ، ملونة . اجنحتها وقوائمها نشيطه . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة ، مدققة الاطراف . تسلس طرائدها فتخدها وتنقلها إلى عشاواتها || أشهر أجسامها النيسون والفوريت .

Epi (F). Tuft (E).

٢٩٥٢٩ - نَيْسَان

هو الدائرة من الشعر .

Porc-épic commun (F).

٢٩٥٣٠ - نَيْسَب

هو الشيم المبدول ، اطلبه .

Chilostomates.

٢٩٥٣١ - نَيْسَبِيَّات °

Chilostomés (F).

رئيسية من الحيوانات الطليعية الفسكليات . فصائلها وأجسامها عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر معاصر . جميعها منزلة ضمن حجيرات قرنية المادة أو كلسية تعلوها اسفاط ناشرة كالشفاة تنضم وتنفصل حسب الحاجة .

Relation nutritive (F).

٢٩٥٣٢ - نَيْسَبَة غذائيَّة

Nutritive relation (E).

هي النسبة الغذائية أي نسبة المواد الارزوية إلى غيرها من المواد الغذائية القابلة الانهزام في كل علف .



نيقب



نيكة

٢٩٥٤٢ - نِيل* ، نِيلَتِج ، حِلَّة

Indigofera (S). *Indigotier*, Anil (F). *Indigo plant* (E). *Indigopflanze*, Anilpflanze (D). *Indaco*, *Endaco* (I).
جنس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القرنيات الفراشية. أنواعه زهاء ٢٠٠ منها الحلوي والفلو والمعر. سوقها فراء غشوشة. اوراثها/ محتافكة مركبة رية الترتيب. ازهارها قياسي التجميع ولا قياسي التجميع ولا ارتكاز. ازهارها صغيرة القد تكثر فيها الالوان الوردية والحمراء. جميعها من نباتات المناطق الحارة. معظمها بري وبعضها صناعي يستخرج من اوراثه وسوقه صباغ نيلي اللون. || اشهر انواعه الزراعية والتربوية ما يلي.

٢٩٥٤١ - نِيل هِنْدِيّ

Indigofera indica (S). *Indigotier hirsute* (F).
نوع من النيل الزراعي. يجلبه تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فناء. اوراثها كثيرة عديدة الورقيات اللانطانية الترتيب التي يراوح عددها من ١١ الى ٣٣، نصلها ساني الشكل، خلي البشرة، اصعب المواج. ازهارها عقودي التجميع كبير القد محوري الارتكاز. ازهارها الى الحمرة الزاهية البنفسجية المواج. || انتاجه الخضابي واقر المادة متوسط الصنف.



نيل

٢٩٥٥٠ - نِيلَة

Indigo
خضاب أزرق يستخرج من ورق النيل وسوقه.

٢٩٥٥١ - نِيلَة صِينِيَّة

هي البطاط النيل، اطبله.

٢٩٥٥٢ - نِيلَتِج

هو البيلك، اطبله.

٢٩٥٥٣ - نِيلَتِك*

Dryobalanops aromatica (S). *Dryobalanops aromatique* (F).
شجرة حرجية وصناعية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة التوتيليات. اعطائها تمتد من الهند الى الهند الصينية وجزر الزايب || هيكلها جبل القالب. ساقها لمساء. اوراثها متعاقبة منعقة. نصلها جامدة، سانية الشكل، شديدة الخفسار الزاهي. ازهارها عقودي التجميع. ثمارها قنطرة وقينة بطولها تفروق خاصي الفصل المستطيلة، المنيئة || وعندما يبلغ عمر الشجرة نحو ١٥ سنة تنشق ساقها طولا ويرشح منها دهن كالنوري فاخر الصنف يدعى كافور بورنيو او بونيل.



نيلك

٢٩٥٥٤ - نِيلَتِين

Nylon
مصد نيسيبي تركيب شائع الاستعمال.

٢٩٥٥٥ - نِيلَتِج

هو النيل، اطبله.

٢٩٥٥٦ - نِيلُورُ ، نِيلُورُ ، بَشْتِين

Nymphaea (S). *Nénufar*, *Nénuphar* (F). *Water-lily* (E). *Seeros* (D). *Ninfea* (I).
جنس نباتات عشبية جلمورية مائية من فصيلة النيلوريات. انواعه المعروفة ٢٥ اعطائها مياه البلاد الحارة والمعتدلة. جلمويرها مبددة. اوراثها وازهارها مستطيلة المعالين طافية. ثمارها جراء كروية الشكل. يزدها نشوية المادة. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.



نيلور ابيض

٢٩٥٥٧ - نِيلُورُ اَبْيَضُ* ، بَشْتِين اَبْيَضُ ، عَرَايس النيل ، حَفِيَّة السَمَك

Nymphaea alba (S). *Nénufar blanc*, *Lis des étangs*, *Blanc d'eau*, *Lune d'eau*, *Volet* (F). *Flatter dock*, *White water-lily* (E). *Weisse Seeros* (D). *Ninfea bianca*, *Nénufaro*, *Luna d'acqua*, *Regina dei laghi* (I).
اشهر انواع النيلور واشيها. جلمويره غليظة متباددة. والقد. اوراثه كثيرة القد تعرض من ١٠ الى ٣٠ سم. نصلها اخضر البشرة حل صفحتي. ازهاره يضاء اللون، عادمة الورد، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. ثماره وجلمويرها مأكولة. || تنوره يستمر من حزينان الى ايلول.



نيلور ازرق

٢٩٥٥٨ - نِيلُورُ أَزْرَق* ، بَشْتِين أَزْرَق ، كَرْنَب الماء

Nymphaea coerulea (S). *Nénufar bleu*, *Lotus bleu* (F). *Blue water-lily* (E). *Blaue Seeros* (D). *Ninfea celeste* d'Egitto (I).
نوع من النيلور البرقي الشائع في مياه بحيرات وانهار

٢٩٥٤٣ - نِيل الصَّبَاغِين

Indigofera tinctoria (S). *Indigotier des teinturiers* (F).
نوع من النيل الزراعي المشهور. جنبته تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فراء. اوراثه سابية او تساعية الورقيات الريشية. ازهاره عقودي التجميع محوري الارتكاز. ازهاره وردية اللون يملوسا مواج اسف. انتاجه الخضابي واقر المادة جيد الصنف.

٢٩٥٤٤ - نِيل اَنْثِيّ

Indigofera decora (S). *Indigotier élégant* (F).
نوع من النيل التربي. يجلبه تملو نحو ١٠٠ سم. اوراثه لا قياسية التركيب منها الخامية الورقيات والسابية والتساعية. وريقاته اهليجية النصل الامر المالس. طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. وعرضها نحو ٣. ازهاره عقودي التجميع، محوري الارتكاز. ازهاره وردية اللون المايق. || تنوره يستمر من ايار الى آب.

٢٩٥٤٥ - نِيل بَحْرِيّ

Indigofera glauca (S). *Indigotier glauque* (F).
نوع من النيل الزراعي. جنبته متوسطة القد تملو نحو ١٥٠ سم. ساقه فراء. اوراثه مستطيلة، عديدة الورقيات البحرية اللون، الخلية البشرة. ازهاره عثوكلي التجميع محوري الارتكاز. ازهاره الى الحمرة الفاتحة. || انتاجه الخضابي واقر المادة متوسط الصنف.

٢٩٥٤٦ - نِيل عَرَبِيّ

Indigofera arabica, *I. anil* (S). *Indigotier anil* (F).
نوع من النيل الزراعي. يجلبه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. ساقه فناء. اوراثه عديدة الورقيات البيضية النصل الصغيرة القد. ازهاره عثوكلي التجميع. ازهاره الى الحمرة الزاهية. || انتاجه الخضابي متوسط المادة والصنف.

٢٩٥٤٧ - نِيل فِضِيّ

Indigofera argentea (S). *Indigotier argenté* (F).
نوع من النيل الصناعي والتربي. يجلبه صغيرة القد تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراثه ثلاثية او خاسية الورقيات. وريقاته خلية النصل الغضبي، بيضية الشكل، مغشوشة الطرف. ازهاره عقودي التجميع. ازهاره وردية اللون بنفسجية المواج. انتاجه الخضابي قليل المادة فاخر الصنف. تنوره يستمر من تموز الى آب.

٢٩٥٤٨ - نِيل قَرْمِزِيّ

Indigofera atropurpurea (S). *Indigotier cramolsi* (F).
نوع من النيل التربي. يجلبه تملو نحو ١٢٠ سم. اوراثه مركبة من ١١ وردية. وريقاته اهليجية الشكل، خلية النصل المتجم اختار. ازهاره عقودي التجميع. ازهاره قمرزية اللون المايق. || تنوره يستمر من تموز الى آب.



نيلوفر أصفر



نيلوفر العروس



نيلوفر عطر

افريقية الشرقية. أوراقها مستطيلة القد تعرض من ١٠ الى ٢٥ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا احر السفلى. ازهارها الى الزرقاء يعلموا موجا وردي. ثماره وجذاميره مأكولة. || تنوره يستمر من حزيران الى اواخر آب.

٢٩٥٥٩ - نِيلُوفَرُ أَصْفَرٌ * Nymphaea flava (S). Nénufar jaune (F).

نوع من النيلوفر التريبي. مهد اهورا فلوريدا وبجرباتها. جذاميره نجيلية مستدقة. أوراقها مستطيلة القد تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٩ الى ١٢ سم. نصلها يحزز الحار، اخضر الصفحة العليا، اسفع السفلى. ازهارها مستطيلة القد لونها الى الصفار الكبريتي. || تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٩٥٦٠ - نِيلُوفَرُ الْعُرُوسِ * Nymphaea lotus (S). Lotus, Nénufar blanc d'Egypte, Lotier d'Egypte (F). Egyptian lotus, White lotus, Sacred lotus (E). Agyptische Lotusblume, Weisses Lotus (D). Loto, L. sacro, L. egiziano (I).

نوع من النيلوفر السبروتي المبدول في مياه البلاد الحارة. مهد حوض النيل. أوراقها مستطيلة القد تعرض نحو ٢٠ سم نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى. ازهاره كبيرة الحجم، بيضاء اللون. ثماره وجذاميره واعناق أوراقه مأكولة. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٩٥٦١ - نِيلُوفَرُ عَطَر * Nymphaea odorata (S). Nénufar odorant (F).

نوع من النيلوفر التريبي. أوراقها مستدقة كبيرة القد قطرها يراوح من ١٢ الى ٣٠ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا، احر السفلى. ازهارها عطرية العرف، كبيرة القد، قطرها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. لونها الى اليبان العاجي. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٩٥٦٢ - نِيلُوفَرُ مَعْدَد * Nymphaea tuberosa (S). Nénufar tubéreux (F).

نوع من النيلوفر التريبي. مهد البلاد الامريكية. ضروره عديدة. جذاميره متقاربة القد الغدية الدرية الشكل. أوراقها كبيرة مستدقة قطرها يراوح من ١٥ الى ٣٠ سم. نصلها يبدو احر اللون ثم يتصرف شيئا فشيئا الى ان يستقر على الاخضر المايق. ازهاره كبيرة القد، عادمة العرف، متباينة الالوان، منها الابيض والوردي والاجر والقرمزي. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٩٥٦٣ - نِيلُوفَرُ هِنْدِيّ، أَوْسِيد * Nymphaea indica (S). Nénufar des Indes (F). Water-lily, Water nymph (E). Nymphenblume, Seeros (D). Ninfea Indica (I).

نوع من النيلوفر السبروتي المبدول في معظم مياه انهار الهند. أوراقها كبيرة القد قلبية الشكل، نصلها اخضر الصفحة العليا حطلي السفلى. ازهاره كبيرة الحجم، خافتة العرف، تبينة اللون. ثماره وجذاميره مأكولة. || تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٩٥٦٤ - نِيلُوفَرَاتٌ، بَشَشِيَّاتٌ Nymphaeaceae (S). Nymphaeacées (F). Nymphaeaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القائلات. اجناسها خمسة، انواعها عديدة. جميع نباتاتها جذمورية

مائية. أوراقها مستطيلة الاعناق، كبيرة النصل الفارض. ازهارها كثيرة البتلات مستطيلة الممايلق تنطق على سطح الماء || اما اجناسها الخمسة فهي النيلوفر والتوفر والتلمبو والقداسة والكبيبه.

٢٩٥٦٥ - نِيلِينٌ، نِيلْتَجِين * Indigotine (F). Indigotin (E).

هي المادة الملونة في النيل وهي رباعية التركيب بيضاء اللون تتأكسد في الهواء وتزرق. الصناعة الحديثة تستخرجها من النفتلين.

٢٩٥٦٦ - نِيْمَكُسْتِيل * Nematostylis (S). Nématostyle (F). Nematostylis (E).

جنس نباتات عشبية دوفصية سبروتية من فصيلة السويديات. منبتها بعض مناطق امريكية الشمالية. شاربها منتصبة، معتدلة الارتفاع. أوراقها صغيرة، ضيقة النصال. ازهارها مستطيلة الاذن تتركز في اباط الشرايف || تزرع للتزيين في الحدائق. ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج المنسوبة التركيب العنصري الزاخرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة مستطيلة العدد، اشهرها التالية.

٢٩٥٦٧ - نِيْمَكُسْتِيلُ أَرْجَوَانِيَّة * Nematostylis purpurea (S). Nématostyle pourpre (F).

عشبة تزيينية دوفصية جادحة. منبتها التماسكاس ولوبيزبانانا. شراخها يرتفع نحو ٢٥ سم. أوراقها صغيرة القد، ضيقة النصال، زيتية الخضار. ازهارها معتدلة الحجم، ارجوانية اللون. اسديتها ملتحة القواعد. متاكها منتصبة الخيوط الجالسة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٥٦٨ - نِيْمَكُسْتِيلُ سَمَآوِيَّة * Nematostylis caelestina (S). Nématostyle céleste (F).

عشبة تزيينية دوفصية جادحة. شراخها يرتفع من ٥٠ الى ٦٠ سم. أوراقها صغيرة، ضيقة النصال، زاهية الخضار. ازهارها كبيرة زرقاء اللون. اسديتها ملتحة القواعد. متاكها حلزونية الخيوط || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٥٦٩ - نِيْمَكُسْتِيلُ سَمَرَاء * Nematostylis brunnea (S). Nématostyle brun (F).

عشبة تزيينية دوفصية سبروتية. منبتها المكسيك. شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. أوراقها صغيرة الحجم، ضيقة النصل، جميلة الخضار الزاهي. ازهارها سمراء اللون بتفسجيه الموج. بتلاتها الداخلية موحدة بالاصفر. متاكها جالسة الخيوط || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٩٥٧٠ - نِيْمَسْبُورَة * Nemospora (S).

جنس تطور مجهرية من فصيلة الرففيات. انواعه قليلة العدد والاذى تتميز بسرافلها الزرقبة الملوقة المشج. كنانها اسطوانية، منقطة، هليبة الاطراف.

٢٩٥٧١ - نِيْمُوْرُوْمَا مُسْتَطِيْلَةٌ Nemosome elongé (F).

حشرة تدعى اسطوية اللحم، اطلها.



ثِيُوت مبدول

Néogène (F).

٢٩٥٧٣ - ثِيُولِيْثِي

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الثالثي المعروف أيضاً بالاباج الحديث. وهو يشمل العصر الميساني والعصر البيساني || تتميز هذه الحقبة بتطور الثبوت وبارتقاء العظم، بوجه عام، الى الحالة الحاضرة. كما وانها تشهد، في الزمن الاخير منها، ظهور اول انسان على الارض او اول شبيه بالانسان.

Neovossia (S).

٢٩٥٧٤ - ثِيُولِيْثِي

جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات. بوفه يحمل في اطرافه خيوط مشيحية شفافة. انتاش بوفه يتميز بدعيات مخروطية الشكل تحمل العديد من البويضات اهلوية الضمية التجميع || انواعه المؤذية قليلة الضرر لا تستوجب العناية

Néolithique(F). Neolithic(E). ٢٩٥٧٥ - ثِيُولِيْثِي

ثيوليْثي او العصر الثيوليْثي هو زمن الحجر المصقول.

٢٩٥٧٢ - ثِيُوت مَبْدُول*، مَبْدُول المَاء المَبْدُول، سَمْبَدُول مَبْدُول، سَمْبَدُول مَبْدُول

Molge vulgaris, Triturus vulgaris (S). Triton vulgaire, Triton punctué (F). Smoot Newt (E).

حيوان زحاف قاذب بيوض من فصيلة السمندليات ورتبة السرفوقيات. موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا || جسمه مستطيل الشكل بطول من ١٤ الى ١٦ سم. الذكر اصفر من الانثى. رأسه مخروطي الشكل. عيناه صغيرتان. حنكه كامل التسنين في الفكين. قاتمته الاماميتان رباعيتا الاصابع اما الخلفيتان فخاسيتها. جلده مائل القشار. ثوبه البلوي، مدبج وزركش وصنّيع بالاسمر والاخضر والاصفر والاسود. مدبه الى الكلبة العلواء تتوسطها جفدة حراء تمتد من الزور الى المزرق || يتميز بفقل الهمة. يألف الناييح والمناقع. قوته الحشرات والتغشريات والرخويات || يعتبر من القواذب المفيدة النافعة.



٢٩٥٨٣ - هاذة قلبية الورق

Ampelopsis cordata (S). Vigne vierge à feuilles en cœur (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنبته مدادة عارشة تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها قلبية الشكل، قليلة التفصيص تطول وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم. نصلها رقيق الصفحة، أخضر اللون، عادم الخمل || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٩٥٨٤ - هاذة كبيرة الورق *

Ampelopsis megalophylla (S). Vigne vierge à grandes feuilles (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنبته دغلية الشكل تملو من ٣ إلى ٤ أمتار. أوراقها ريشية التركيب. وريقاتها كبيرة القذ يقضي الشكل تطول من ٦ إلى ١٠ سم. نصلها مائل الصفحة العليا، خلي السفل، أحر المروق والأعصاب. أزهارها صيدانية التجميع. يزورها سود. أزهارها يستمر طول شهر تموز.

Ampelopsis arborea (S). هاذة شجيرة Vigne vierge arborescente (F).

نوع من الهاذ التريبي. شجيرة متبصية تملو نحو ٥ أمتار. أوراقها ريشية التفصيص، نصلها مائل الصفحة العليا خلي السفل. أزهارها خماسية الأجزاء || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٩٥٨٦ - هاذة هاتكة

Ampelopsis heterophylla (S). Vigne vierge à feuilles variables (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنبته عارشة تطول من ٥ إلى ٦ أمتار. ساقها وفروعها جوفية الهواء. أوراقها هاتكة لاقياسية التفصيص الذي يراوح من ٣ إلى ٥، نصلها مائل الصفحة العليا، خلي السفل. بذورها إلى الزرقعة الزاهية. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٩٥٧٦ - هابط، وأبط

Descendant (F). *Descending* (E).

هو نفيس الصاعد.

Hétérophylle (F).

Heterophyllous (E).

نعت تعريفي يوصف به كل نبات لانظامي الاوراق تركيباً وشكلاً وارتكازاً.

Grenouille femelle (F).

She-frog (E).

الصفدة الانثى. ج. حاجات. تصغيرها هويمة وهبيجة.

Méridien (F). *Meridian* (E).

الخط الرئيسي الذي يرتكز عليه قياس درجات الطول.

٢٩٥٨٠ - هاجنة الهاجنة هي النخلة تحمل صنفرة.

Ampelopsis (S).

عتر من الجلفة المزارع. أنواعه المعروفة ١٢ تتميز بمحاورها البسيطة الحالية من الاطياب المحجمية وبمحاور منيفس ازهارها القدسية الشكل. وأحدته هاذة. || أشهر انواعه التريبية ما يتبع.

٢٩٥٨٢ - هاذة شرقية

Ampelopsis orientalis (S). *Vigne vierge du Proche-Orient* (F).

نوع من الهاذ التريبي. مهد الشرق الاوسط. جنبته دغلية الشكل تملو من مترين إلى ثلاثة أمتار. أوراقها ريشية. وريقاتها تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٤. نصلها مائل البشرة على صفحته. أزهارها رباعية الأجزاء. أزهارها يستمر طول شهر آب.



هاذة كبيرة الورق

٢٩٥٨٧ - هَادَّةُ هَلَاهِيَّةِ الْوَرَقِ

Ampelopsis aconitifolia (S). *Vigne vierge à feuilles d'aconit* (F).

نوع من الهاذ الزنبقي . جنبته عارشة تطول نحو ٥ الى ١٠ امتار. فروعهما دقيقة ، جذوية اللحاء في اول معدها . اوراقها اصبعية الشكل لاقباسية التفريغ الذي يراوح من ٣ الى ٥ ولا متساوية التسكيم الذي يطول من ٥ الى ٨ سم. نصالحا ماله الصلصة ، عابقة الخضار ، مسننة الحافة . يزورها برتقالية اللون || انزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٨٨ - هَادَّةُ يَابَالِيَّةِ .
Ampelopsis japonica (S). *Vigne vierge du Japon* (F)

نوع من الهاذ الزنبقي . جنبته عارشة تطول نحو ٧ امتار. جلدها رافع السنن والاروم . اوراقها كبيرة القند ، لاقباسية التفريغ السكسي ، الذي يراوح من ٣ الى ٥ ، نصالحا عابق الخضار اللامع || انزهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٩٥٨٩ - هَارِبِ
Déversoir (F). *Overflow* (E).

النفرة المدة لتصريف الفائض من المياه .

٢٩٥٩٠ - هَارَبَا ، هَارَبِي
Athérine (F).

هو الحساس ، سمكة صغيرة القند مأكولة ، اطلبه .

٢٩٥٩١ - هَارَجَة

Acrocephalus, Calamoherpe (S). *Rousserolle* (F). *Sedge warbler* (E).

جنس طير من فصيلة اللعليات . انواعه المعروفة كثيرة . احدى جميعها صغيرة القند تتميز بانجنتها المستطيلة الذرية الاطراف . اذنانها رتاجية الريش غرومية الشكل . مناقيرها مستعرضة القاعدة ، مدببة للملاقط || تألف المنافع والضفاد والمقاصب والرياح . قوتها الحشرات والحوام اعصها الياسبب والنعر والبومض || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٩٥٩٢ - هَارَجَة الْبَطْلَانِجِ *

Acrocephalus palustris, Calamoherpe palustris (S). *Rousserolle verderolle, Verderolle* (F). *Marsh warbler* (E).

نوع من الموارنج ، صغيرة القند تطول نحو ١٤ سم . ظهرها الى الطحلة اللزنية المراج . يعلها الى الصفرة . زورها الى البياض الاكدر . تألف الاماكن الرطبة والمخانة وضفاد الماء . تدن في الدغل وفي الشجيرات المثقولة . قوتها تراوح من ٤ الى ٥ بيضات ترخمها بمناوبة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوما .

٢٩٥٩٣ - هَارَجَة السُّدِّ

طائر من الموارنج يدعى ام نوع ، اطلبها .

٢٩٥٩٤ - هَارَجَة الْقَصْبِ *

Acrocephalus arundinaceus, Calamoherpe turdois (S). *Rousserolle turdoise, Grive de rivière* (F). *Great reed warbler* (E).

طائر من الموارنج . طوله يراوح من ١٩ الى ٢٠ سم . ظهرها الى الصهبة الصفراء المراج . يعلها الى البياض الاشعث . زورها ابيض اغبر . جرشها الى الكهبة المسنجة بالاسمر . تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي . تألف المقاصب والالاجام . تدن عنها على القصب . تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٩٥٩٥ - هَارَجَة الْمَاءِ *

Acrocephalus paludicola (S). *Phragmite aquatique* (F). *Aquatic warbler* (E).

طائر من الموارنج ، صغير القند طوله نحو ١٣ سم . ظهره اغبر اللون مجلج بالاسمر . يعلها الى البياض الخفي يعلو تسنيج اكهب || يألف ضفاف الانهر والبحيرات ويجوب البلاد في طلب المصيف والمشي .

٢٩٥٩٦ - هَاصَّة
Ceil de l'éléphant (E).

هي عين الفيل .

٢٩٥٩٧ - هَاضُوم ، هَضَام

Digestif (F).

Digestive (E).

هو ما له قوة الهضم التي تحول الاطعمة وتجعلها قابلة للتشيل كالنصارات الهضامة ...

٢٩٥٩٨ - هَاف

هاف ورق الشجر : سقط .

٢٩٥٩٩ - هَاقِل * ٥

Alactaga (S). *Alactaga* (F).

جنس حيوانات لكونة قانصة من فصيلة البربوعات . انواعه عديدة موطنها الشرق العربي ومصر وايران والتركستان والبيت || شكله شكل الجرذ . طوله نحو ٢٠ سم . ذنبه ٢٧ . رأسه صغير القند . عيناه كيرتان . اذناه مستطيلتان . طول جزمزه الخلفية يبلغ اربعة اضعاف الامامية || قوته الى الصفرة الرملية يعلوها مراج اسهب . يعلها الى البياض . ذنبه صناعي اللون اما الحصلة لبقاع || يألف الاراضي الطينية . جحره فسحة رحية يجفها من عمق ٦٠ او ٧٠ سم . يبغي فيها بياته الشوي ؛ مدخلها قنط طويل متعرج اما جحرها نفق مستقيم معتدل الانحدار || قوته المواد النباتية على اختلاف أشكالها وانواعها || اناء تحمل ثمانية اطباء وتضع من ٤ الى ٦ ادراس على ثلاث مرات في السنة .

٢٩٦٠٠ - هَال ، هَيْل ، هَيْلَوَا ، قَالَتَّة

Amomum (S). *شَوْشَمَر* (F).

Amome (F). *Cardamoms* (E).

جنس نباتات جذودية طيبة عطرية برية وزراعية من سبط الهاليات وفصيلة الزنجبيلات . انواعه عديدة جميعا من نباتات المناطق الحارة || جذاميرها لوبية التركيب . سوقها منتصبة عادمة الفروع . اوراقها عذوية الانتساب متناقبة . انزهارها سنيلية التجميع او عكوكلية . ثمارها جراء لثائية الاخضبة . بذورها تدعى ببال الحال يستخرج منها ادهان عطرية طيارة كانت فيما مضى من اشهر الطيوب المستعملة في التحنيط || لبوب جذاميرها وبذورها وادهانها هاضمة ومنبهة للقلب ولقوة الجنسية ، مفادة للتشنج ، طاردة للرياح ، سكنة للمضغ ومدرة للطمث .

٢٩٦٠١ - هَال جَاوَا ، قَالَتَّة مُجْتَمِعَة

Amomum maximum (S). *Cardamome allé de java* (F). *Java cardamoms* (E). *Java Cardamomen* (D). *Cardamomo di Giava* (I).

نوع من الحال التابل الشائع الاستعمال تكثر زراعتة في بلاد جاوا . ساقه رقيقة ، اوراقه كبيرة القند ، بذوره جيدة الصنف وافرة الادهان العطرية الطيارة .



هازجة البطانج



هازجة القصب



هازجة الماء



هاقل

الفصيلة الباذنجانية، ساقه غليظة جؤوية اللون. ازهاره كبيرة القذ متراكبة اللون فيها الالوان الاصفر والبرتقالي والاحمر والازرق. بؤره ذبذبة القذ مستديرة الشكل سنطلية اللون تحفظ بقوى انباتها نحو عشر سنوات.

٢٩٦١١ - **هَالِيَاتٌ ، قَالِيَاتٌ** (E). Amomées
سبط من فصيلة الزنجبيليات، اشهر اجناسه الهال .

٢٩٦١٢ - **هَالِيْزَة * ، هَالِيْزِيَّة ، تَعْل**
Halesia (S). Halésie, Halésier (F). Silver bell-tree, Snowdrop tree (E). Schneeglöckchenbaum (D). Alesia (I).

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الاسطركيات. انواعها ستة جميعها اشجار وشجيرات متوسطة القذ. ساقها منتصبه متقاربة الفروع. اوراقها عابله ، معتقة ، متعاقبة. نصلها بيضي الشكل مستن الحافة. ازهارها محورية الارتكاز ، غصية التجميع ، عديدة الاسدية مستطيلة الزناد. ثمارها جراء مجتمعة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٩٦١٣ - **هَالِيْزَة ثُنَائِيَّة الْجَنَاح**
Halesia diptera (S). Halésie à 2 ailes (F).

نوع من الهاليزة التريبية . ثمرتها تملو نحو ١٥ سم. اوراقها بيضيه الشكل تملو نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ١٠ سم. نصلها جامد اللون ، اخضر الصفحة العليا ، خلى السفلى . ازهارها بيضاء اللون تملو من ٢ الى ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. ثمارها جراء ثنائية الجناح وشبهه الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم. || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٩٦١٤ - **هَالِيْزَة رُبَاعِيَّة الْجَنَاح**
Halesia tetraptera (S). Halésie à 4 ailes (F).

نوع من الهاليزة التريبية ، ثمرتها تملو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها ايليبسية الشكل سنائية الزايم الاخير . نصلها جامد اللون الدقيق ، اخضر الصفحة العليا خلى السفلى . ازهارها متدليه ، ثلاثية التجميع ، بيضاء اللون ، صغرة القذ . ثمارها جراء رباعية الجناح مخروطية الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم. || ازهارها يستمر من اذار الى ايار .

٢٩٦١٥ - **هَامَة**
Effraie commune (F).

هي البعثة ، اطلبها ج. هام وهامات . قال ذو الرمة :
قد أصفت النازح المجهول مصفه
في ظل اخضر يدعوه هامة هوم

٢٩٦١٦ - **هَامِرَة ، مِهْمَرَة**
Trayeuse mécanique
عدة مجهزة باربع شفاطات تستخرج الحليب من ضرع البقرة وتقله الى رماء الحفظ احكم السد .

٢٩٦١٧ - **هَامِن**
Marcescent (F).
Marcescent, Withering (E).

نمت تعريفي يطلق عل كل نبات او جزء من النبات يكون في حالة الهمن .

٢٩٦١٨ - **هَامِي**
Apical
نمت تعريفي يوصف به كل عضو مركزة الذروة .

٢٩٦١٩ - **هَامِيلِيَا ***
Hamelia (S). Hamélie (F).
جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة ١٠ ، اصطناعها المناطق الاستوائية الامريكية . ساقها فروع . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنائية النصل . ازهارها

٢٩٦٢٠ - **هَال حَبَشِي * ، قَالِيَّة حَبَشِيَّة**
Amomum angustifolium (S). Amome de Madagascar (F). Madagascar cardamoms (E). Madagascars Cardamomen (D). Cardamomo maggiore, C. massimo (I).
نوع من الهال الزراعي الشائع الاستعمال في جزيرة مدغشكر. اوراقه عصصية النصل الضيق . لبوب جذابه تابل مشهور . بطوره وافر المواد الدھنية العطرية المتوسطة الصنف .

٢٩٦٢٣ - **هَال حَسَام * ، حَسَامَة ، قَالِيَّة عُنُقُوْدِيَّة ، اُمُون**

Amomum cardamomum (S). Amome cardamome (F). Cardamon (E). Cardamomen (D). Cardamone, Cardamomo, Amomo (I).
ويعرف ايضا بالمال المنقودي . نوع من الهال الجيد الصنف . تكثر زراعته في الهند الصينية . ازهاره عنقودي التجميع . بطوره جيدة الصنف شائعة الاستعمال وافر المواد الدھنية العطرية .

٢٩٦٢٤ - **هَال ذَكْر * ، قَالِيَّة ذَكْرِيَّة ، خَبِرُوا**
Amomum melegueta (S). Méleguette, Méléguette, Graines de paradis (F). Melegueta-pepper, Grain of paradise (E). Malaguettapeffer (D). Grana paradisi, Semi di paradiso (I).

نوع من الهال ، تكثر زراعته في بعض مناطق افريقية الشرقية والوسطى . اوراقه مستطيلة النصل الضيق . بطوره متوسطة الصنف والمواد العطرية .

٢٩٦٢٥ - **هَال صَغِير ، قَالِيَّة صَغِيرَة ، حَبْهَان**
Eleteria cardamomum (S). Cardamome petit (F). Bastard cardamon, Lesser cardamon (E). Kleine Kardamomen (D). Cardamomo minore (I).

نوع من الهال الجيد الصنف ، تكثر زراعته في سرديب وبيلار . ساقه واوراقه صغرة القذ . ازهاره سنبل التجميع . بطوره وافر المواد الدھنية العطرية الفاعلة الصنف .

٢٩٦٢٦ - **هَالَة**
Halo
دائرة مضبة تحيط بالقمر سبها انكسار النور الذي يخترق بلورات الجليد المتعلقة في اليوم العالية البعيدة . اما الدائرة التي تحيط بالشمس فتدعى طفاوة .

٢٩٦٢٧ - **هَالُوْجَة ، قُرْنِيَّة**
Halogeton (S).
Halogète, Halogeton (F). Saltwort (E). Salzkrout (D). Alogeton (I).

جنس نباتات برية وزراعية من السرايات وفصيلة السرمقيات . انواعه ستة منها الاشباح والجنبيات . ساقها وفروعها زباه الصماء . اوراقها خليه متعاقبة . ازهارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز جميلة الشكل || اشهر انواعها الهالوجية الزراعية المأكولة .

٢٩٦٢٨ - **هَالُوْكَ وَيْجِي**
Phélipée d'Egypte (F).
هو الطرثوث المصري ، اطلبه .

٢٩٦٢٩ - **هَالُوْكَ شَرْقِي**
Clandestine du Levant
هو الطرثوث الاحمر ، اطلبه .

٢٩٦٣٠ - **هَالُوْكَ لُصْبِي**

Orobancha caryophyllacea (S). Orobancha du gaillet (F). Clove scented broom-rape (E). Nelkenschmerz (D). Erba scalogna, Succiamelle garofanato (I).

نوع من الجعفل يتغفل على الفايون وعمل معظم نباتات



هال حَبَشِي



هال حَسَام



هال ذَكْر



هالِيْزَة



هَامِيلِيَا

- هبار القم
S. obscurus (S).
S. obscur (F).
هبار بودن *
S. Budeng (S). S. maure, Budeng (F).
هبار جرمان
S. Germani (S). S. de Germain (F).
هبار جوني
S. Johni (S). S. des Nilagiris (F).
هبار دني
S. ursinus (S). S. ourson (F).
هبار شاب
S. senex (S). S. blanchâtre (F).
هبار متوج
S. mitratus (S). S. mitré (F).
هبار ملافلو
S. melalophus (S). S. mélaploph (F).



هبار انتلوس

- ٢٩٦٢٥ - هَبَارَة *
Scolecotrichum (S).
جنس فطور مجهرية من حمارة الزناخيات وفصيلة الطحيات.
جربه الكنديسة أسطوانية قصيرة تعلوها كنانة صوبانية
صفيفة اللباسك ثنائية الخلية || أنواع قليلة المسد
والأذى اعرفها هبارة النجيليات .

- ٢٩٦٢٦ - هَبَارَة النجيليات *
Scolecotrichum graminis (S).
فطر مجهرية يركب بعض النجيليات البرية والكلالية
فيشوا الأوراق دون أن يؤذيها || مظهره الخاضعي بقع
صغيرة تركب نصل المصفر ثم تتسع وتنتد فيبلغ طوله
نحو ٣٠ سم. تبدو شقراء اللون أو سمره ثم يمتد بياض يبيض
ستارها .



هبار بودن

- ٢٩٦٢٧ - هَبَارِيَّات ، رَحِيصَات
Semnophthecidae (S). Semnophthécidés (F).
Semnophthecidae (E).
فصيلة قرد من سفليات المنخرين تشمل أربعة أجناس :
الهبار والحوبر والزيك والقنطروب .

- ٢٩٦٢٨ - هَبَاش *
Homola (S).
Homola (F). Homola (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل
قصيرات الذيل وفصيلة الهَبَاشيات . أنواع المعروفة عديدة
منتشرة في جميع بحار العالم || أجسامها شبه مجنبة الشكل ،
تطول من ٤ إلى ٨ سم. قوائمها مستطيلة ، قليلة الغلاظ
باستثناء الزوج الأول للمقطي الأطراف ، الكبير التسنين
الشائك والزوج الأخير الذي يتمركز في كنفه الظهر
والذي يتميز بالصغر واللقه والبراء الأطراف . أولها دائما
حراء اللون يعلوها موانج يراوح من العنابي إلى الأزرق
لحموها مأكولة .



هَبَاش

- ٢٩٦٢٩ - هَبَاشِيَّات
Homolidae (S).
Homolidés (F). Homolidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل
قصيرات الذيل ، حاملات القوائم . أجناسها وأنواعها
عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || جميعها مستطيلة القد
الذي يراوح من ٤ إلى ٨ سم. تتميز بصغر وقعر الزوج
الأخير من القوائم الذي يتمركز في كنفه الظهر || أشهر
أجناسها وأعما انتشارا الهَبَاش .



هبال

- ٢٩٦٣٠ - هَبَال * ، وسنغي ، مَرْمُوزَة *
Hapale (S). Oulisti, Marmoset (F). Marmoset, Oulisti (E).
جنس قردة أمريكية من فصيلة القردة الدبية . أنواع ٧
موطنها حوض الأمازون والبلاد المجاورة || أجسامها
صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم

كبيرة القد ، جميلة الشكل ، سفلية التجميع ، تاجية
الارتكاز . ثمارها نووية غير مأكولة || أشهر أنواعها
المغالبية الزيادة الورق ويسمونها قاتلة الجراد. إزهارها
حراء اللون ، ثمارها جميلة المادة تقضي على الجرادات .

- ٢٩٦٢٠ - هَبَار ، رَحِيص ، قِرْد مَقْدَس
Semnophthecus (S). Semnophthèque (F). Solemn
apes, Simpal (E).
جنس قرد من فصيلة الهباريات تدعى القردة المقدسة
لأن الهندي لا يسمونها وقد يجلونها || أنواع كثيرة العدد .
أجسامها رفيقة ، نحلة ، متوسطة القد . أذنانها مستطيلة .
أولها ناعمة الشعر . جباهها مكلفة يختار من الهلب الأسود .
موطنها الهند وجوارها . أقليمها يمتد من الشط إلى ارتفاع
٤٠٠٠ م. || تعيش على الأشجار . قوتها المواد النباتية
والثمار والبزور والجذور والبراعم والنواحي || أنثاها
تضع من جرول إلى جرولين || أشهر أنواعها ما يتبع .

- ٢٩٦٢١ - هَبَار أَنْتِلُوس * ، قِرْد الهند المقدس
Semnophthecus entellus (S). Semnophthèque en-
telle, Entelle, Singe saint des Hindoux, Houleman,
Houneman, Mandi, Mabus (F). Hanuman, Hoonu-
man, Entellus (E).

نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٦٥ سم. وذنبه ٩٦ سم.
ثوبه أغص اللون ، مستطيل الشعر . وجهه أسود البشرة .
خثار جهته أسود الهلب المنتصب || موطنه شمال الهند
حتى حدود الهند والبنيجاب . يعيش جماعات متوسطة العدد .
يفضل النباتات والأعراج الظليلة على مجاري الماء .
يقترب من المساكن والبيوت الآهلة || قوته الثمار والحبوب
أكلهاها إنما كانت .

- ٢٩٦٢٢ - هَبَار حَمَلَايَا
Semnophthecus schistaceus (S). Semnophthèque de
l'Himalaya, S. ardois (F).

نوع من الهبار . جسمه بطول نحو ٦٥ سم. ثوبه إلى الرديئة .
شعره كثيف وطويل . ظهره عايق اللون يعلو موانج جودي .
وجهه أسود البشرة . خثار جهته أسود الهلب المنتصب .
أذناه صغيرتان . ذنبه بطول نحو ١٠٠ سم. ويتهني بتغصلة
جلطة . موطنه حلايا وبلاد الكشمير . أقليمه يمتد من
ارتفاع ٢٠٠٠ إلى ٣٦٠٠ م.

- ٢٩٦٢٣ - هَبَار دُولُ ، هَبَار نِينَس ، دُولُ
Semnophthecus nemaeus (S). Semnophthèque douc,
Douc (F).

نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٥٠ سم ، ثوبه متباين
الألوان . رأسه وأطراف يديه ورجليه سود . وجهه أصفر .
عنقه وساعده وفخذه إلى الجؤرة . ذقنه وصدره وذنبه يبيض .
بلته أغبر . ظهره إلى الرديئة || موطنه غابات الكوشنشين
جماعاته كثيرة العدد ، مؤذية ، تلتف كل زراعة
تصل إليها .

- ٢٩٦٢٤ - هَبَار فَيْرِي
Semnophthecus phayrei (S). Semnophthèque de
Phayre (F).

نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٥٨ سم . ثوبه رمادي
اللون ، عايق الظهر . رأسه عربي الشعر الأصفر . بقله
ويطامن يديه ورجليه إلى البياض الأغبر . كنفاه إلى
القنصة . ذنبه أبيض اللون ، اسمر الطرف . بطول نحو ٧٦
سم || يألف النباتات الكثيفة الأشجار وأجام الخيزران .
قوته الثمار والحبوب والبزور والجذور .
ومن أنواع الهبار المعروفة قمص بالذكور :

يلوهو تبيعج تبنى وزركشة كستنية ورقشة حلاهل. روشنها الخلفيات الى الخطي الاطحل. حناها اكلت. اعداها الى الشقة ا لها جبل واحد في الحول. تظهر القرفشة في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتبع المكن لطحا لا تاتل على الحجر على الصفحات السفلى من نصال الارواق الى السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٧ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل مستطال المقدم، مستدق المؤخر. ثوبا الى الطحلة السمره يعلوها تجنيز معترض اخضر اللون يمتد على الجانبين من السكة البطنية الثالثة الى التاسعة. رأسها شديد السمرة وبديها ورجليها الى طور الاكمال الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٢ ايوما ينقضي ضمن غلاف رقيق شفاف في الجنالة او تحت الارواق الساقطة.

Hoplopteronus (S). **هَبْرَس** - ٢٩٦٤١

Hoplopteron (F). Hoplopteronus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات بمدليات الارجل وفصيلة الاوليبات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار الصين ا اصداها صغيرة لناعمة، مردنية الشكل، مخزنة، مجنعة القلوب، زاهية الالوان الفاتحة.

Matthiola graeca (S). **هَبَس** - ٢٩٦٤٢
Matthiolo maritime (F).

نوع من المنشور البري، نبات عشبي بري معمر من فصيلة الصليبيات. منته تها حوض البحر الابيض المتوسط، من اليونان الى لبنان الى ساقه متصبية قراء تلو من ٣٠ الى ٧٥ سم. اوراقه متعاقبة، سنائية النصال الضيقة الزياه. ازهاره عقودية التجميع، طرفي الارتكاز. ازهاره ذكية العرف عديدة الالوان منها الاحمر والبنفسجي والوردي والابيض والاصفر الى تنويره يستمر من اذار الى تموز

Hypsipetes (S). **هَبَسِيَت** - ٢٩٦٤٣
Hypsipète (F). Hypsipetes (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكتيبات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها يمتد من الهند الى الصين وبعضها يعيش في الحيشة وندفسكر. ملجنها الحيائي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. تألف الغابات وضفاف مجاري الماء. قوتها الحشرات المختلفة والهوام ا اجسامها صغيرة قريية الشبه بالبالبل. اطولها تراوح من ١٧ الى ٢١ سم. رؤوسها معتدلة الحجم. مناقيرها مخزنية ذرية. اجنتها ذلقة. اذناها مستطيلة، فارقة الاطراف. اوقها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود الاسم الاصع والكسني الاشعث والرمادي الازرق المواج ... تدن اشعاشا في الاشجار الرقيقة القريبة من مجاري الماء. اناها تحفن من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحول. الذكر متناب مع الاناث في الحفن.

Ane noir (F). Black ass (E). **هَبَع** - ٢٩٦٤٤
هو الحار الاسود.

Strelitzia (S). Stréltzie (F). **هَبَل** - ٢٩٦٤٥
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات. انواعه المعروفة ٦ جميعها من نباتات البلاد الحارة. سوقها ليغية متراكبة الانابيب. اوراقها معتقة، كبيرة القد، ثنائية التصفيف، متعاقبة النصال. ازهارها خشوية. زرر للزئين ا اشهر انواعه ماي.

الثير. رؤوسها مستديرة. اذناها مرودية الور. اذناها مستطيلة جللة ا جميعها شاجرة تألف الغابات والاحراج البعيدة والقريبة من الممران. قوتها الثار والحشرات. اخلاها هنية، رضية. تألف حياة الدين وتتملق باصحابها.

٢٩٦٣١ - **هَبَال**
شجر تمثل نسل السهام. الواحدة هالة.

٢٩٦٣٢ - **هَبَايَة** (E). Dry peels (F). Ecorces sèches (F).
هباية الشجر: قشرها الناشف.

٢٩٦٣٣ - **هَبِيَة** (E). Legacy, Bequest (F). Legs (F).
هو كل موهوب في وصية مكتوبة.

٢٩٦٣٤ - **هَبَج** (F). Broussin (F).
ورم يمتري لحاء سوق واغصان وافناد الشجر، سببه الصقيع او بعض الجراثيم.

٢٩٦٣٥ - **هَبِيدَة** (F). Graines de coloquinte (F). Hébide (F).
هو حب الحنظل الواحدة هبيدة.

٢٩٦٣٦ - **هَبُر** (F). Filasse (F).
هو المشاقه، اطلياها.

٢٩٦٣٧ - **هَبَر** (S). Diacope rivulata (S).
سمكة من الشطف وفصيلة الفرشيات. جسمها كبير القد مبطل الشكل. طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. وعرضها من ٤٠ الى ٤٨ سم. ثوبا الى الزرقه البنفسجية الموالج. عتها مستحب العلم مرغوب فيه. اعطائها فسيحة الاجزاء تمتد من البحر الاحمر الى بحار استراليه.

٢٩٦٣٨ - **هَبَرِيَة** (S). Haberlea (S).
Habérle (F). Haberlea (E).

عشبة صغيرة معمرة من فصيلة الجسيرييات. منتهيا يمتد من الشرق الادنى الى البلقان. ترشب في المواقع الصخرية. ساقها جذعة. عفرها الزهري يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقها اهلالية مقنطرة. نصالها جلدية مسننة الحثار. ازهارها ليلية تطول نحو ٥ سم. قطرها ٤ سم. بتلاتها خلية ا تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٩٦٣٩ - **هَبَرُوِيَة** (F). Habrosia (S). Habrosie (F).
جنس نباتات عشبية حولية برة من فصيلة النوانيات. اناها المعروفة قليلة العدد منتهيا بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط ا سوقها تحلة قراء. اوراقها صغيرة، متعاقبة، شبه مخروطية الشكل. ازهارها صغيرة وردية اللون. تنويرها رديي.

٢٩٦٤٠ - **هَبَرُوِيَن أُسْبَد** - ٢٩٦٤٠

Habrosyne derasa (S). Habrosyne rasé (F).
Habrosyne derasa (E).

حشرة من فصيلة الشروقيات ورية حشرغيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروب. فراشها جارة قوتها رقيق الازهار. سرقها تعيش على اوراق الموصج ا جسمها وشي الشكل يطول نحو ١٢ سم. بسطتها نحو ٣٨ سم. رأسها اسمر اللون. عينها كيرتان. زباناها مرشفها مستطيل ملتف. جوشها وبعطها الى الحنطي الاسمر ا روشنها الامانيان الى الحنطي الاسمر



هَبَالَة



هَبُونِ اسْبَد



هَبَب



هَبَل



هبلر



هبتق



هبنس

وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات وناح
وأهوار البلاد المتعددة الحرارة || أجسامها صفراء ، شبه
بيضية الشكل ، مدبة المؤخر ، تطول من ٢ الى ٥ سم .
رؤوسها صفراء ، مستعرضة . عيونها ناشرة . قرونها
الاستثمارية غيطية مركبة من عشر فصل . كواسلها
محدبة ، مستعرضة . اغدادها لافحة ، نحيلة التخديد .
قوائمها نشطة || جميعها مفترسة وعضائية . تعيش بين
النباتات المائية قرب الشطوط وعلى الضفاف في فصل
الصيف || أشهر اجناسها الهبلر .

٢٩٦٥٣ - هَيْبَنَارِيَّة (F). Habenaria (S).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السحليات . انواعه
نحو ٤٠٠ معظما امريكي المنبت . اقاليمها المناطق الحارة
والمعتدلة . بعضها زراعي زينة . اشهرها الهبنارية الثنائية
النصل .

٢٩٦٥٤ - هَيْبَنَارِيَّة ثَنَائِيَّة النصل ، وَكَوَأُوْدِي
أَيْبَنَس
Habenaria bifolia (S).
Habenaria bifolia, Orchis blanc (F). Butterfly
orchis, Fringed orchis (E). Kleine Stendelwurz
(D). Orchide bianca (I).
نبات عشبي زينة معمر . جذوره درنية سترابية الشكل .
اوراقه قرصية مقلقة ثنائية النصل . ازهاره جميلة الشكل ،
بيضاء اللون ، سنطيلة التجميع ، ترتكز على ستراخ قرصي
الانتشاب .

٢٩٦٥٥ - هَيْبَنَس *
Hypnum (S).
Hypnum (F). Feather moss (E). Astmoss (D). Ipne (I).
جنس نباتات طحلبية من الصرخيات . انواعه المعروفة
نحو ٢٠٠ ، سوفها نحيلة مدادة متفرعة . اوراقها دقيقة
متراصة متناوبة تلحف السوق بكاملها || وهي تعيش
وتتنمو في التراب وعلى الصخور وولوج الانحجار .
تتمسك للترتين وتتمسك خاصة في صر الآلية الخزفية
والبلورية لواقبتها من الكسر .

٢٩٦٥٦ - هَيْبَنَس *
Hipponyx (S).
Hipponyx (F). Hipponyx (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدبات الارجل
اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة وفصيلة الهينيسيات .
انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض مناطق المحيط
الحادي . بعضها يعيش على الاصداف المجهرية والبعض
الآخر على الصخور || اصداها مخروطية وحيدة المصارع
قرنية الشبه بالقرن القصير المدب الطرف . اجسامها
بيضية الشكل . رؤوسها مكورة . لواسها مخروطية .
عيونها كبيرة ترتكز على قواعد اللواس . غياشيمها نظامية .
ارجلها وحيدة كبيرة محمية .

٢٩٦٥٧ - هَيْبَنَسِيَّات *
Hipponycidae (S).
Hipponycidae (F). Hipponycidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدبات الارجل
اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها
الماصرة المعروفة قليلة المدد . اعطائها بعض بحار البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش قرب الشطوط || اصداها
قرنية الشبه بالخافر وبالقرن القصير . سقاط الصدقة
يتطور مع العمر فيصبح كالنفوسه || اعرف اجناسها
واشهرها الهينيس والمرولة .

٢٩٦٦٦ - هَيْبَلِ الْمَلَكَةِ
Strelitzia reginae (S).
Strelitzia de la reine (F).

نوع من الهبلل الزينة ، يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم .
اوراقه سنطيلة الاعتناق . نصلها جامد الصلصة التسمية
الاطراف ، لونه الى الخضار البحري . ازهاره كبيرة
القد ، ذمية الفصل ، سنطيرية النبات .

٢٩٦٦٧ - هَيْبَلِ صَغِيرِ الْوَرَق
Strelitzia parvifolia (S).
Strelitzia aux petites
feuilles (F).

نوع من الهبلل الزينة ، يطول نحو ١٢٠ سم . اوراقه اسلية
الشكل ، عادمة النق ، عاقبة الخضار . ازهاره متوسطة
القد ، ارجوانية الفصل ، بنسجية النبات .

٢٩٦٦٨ - هَيْبَلِ قَبْصَرِيَّ
Strelitzia augusta (S).
Strelitzia augusta (F).

نوع من الهبلل الزينة ، يطول من ٣ الى ٦ امتار اوراقه
كبيرة القد معتقة . اعتناقها تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .
ونصلها من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وهي اهليلجية الشكل ،
قلبية القاعدة ، شديدة الخضار العابق . ازهاره كبيرة
القد ، بيضاء اللون .

٢٩٦٦٩ - هَيْبَلِ
Lévrier (F). Greyhound (E).
هو الكلب السلوي او السلاقي ، مستطيل الجسم الدقيق
الاهيف . يتميز بخفته وبسرعة عوده . يستعمل في صيد
الزئال .

٢٩٦٧٠ - هَيْبَلِد *
Hapaloderma (S).
Hapaloderma (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من المستطقات وفصيلة الطرغويات
موطنه بعض مناطق افريقية الحارة . يألف الغابات الرطبة .
ملجته الحياتي زويي . قوته الحشرات على اختلاف انواعها
وبعض الثار العنينة || جسمه متوسط القد ، يطول نحو
٣٢ سم . ثوبه الى الخضار الذهبي المواج . زوره وردي
اللون . بطه الى الشهية . يتميز بكثافة سياه وبكبر ذنبه
الذي يشبه المروحة . جناحاه معتدلا الطول ، ذلقا
الاطراف || يدئن عشه في صدور الانجار الهربة . الاثنى
تحفن نحو اربع بيضات على ثلاث مرات في الحول .
الذكر ينح لها الغذاء .

٢٩٦٧١ - هَيْبَلِيد
Halipius (S).
Halipius (F). Halipius (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة الهليلديات ورتبة
غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في
معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها
صفراء ، شبه اهليلجية الشكل ، مدبة المؤخر ، تطول
من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صفراء ، مستعرضة . عيونها
ناشرة . قرونها الاستثمارية غيطية . تأشيرها وكوكها
لافحة ، شبه مجنبة الشكل ، نحيلة التخديد . قوائمها
نشطة . اثارها مبقجة || تألف المناطق والبحيرات التي
تكثر فيها الاغشاب المائية . قوتها كل ما تستطع قصه
من دويبات .

٢٩٦٧٢ - هَيْبَلِيد *
Haliplidae (S).
Haliplidae (F). Haliplidae (E).

فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة . اجناسها

Hétéroplode (F).
Heteroploid (E).

Anthrozoïdes (F).
Antherozoïdes (E).

Rainette (F).

Cercopithecus (S).

Cercopithèque (F). Tailed apes, Lasiohyga (E).

جنس قرود ذيلية من فصيلة الهجربيات . أنواعه المعروفة ٤٤ ، موطنها اسراج وغابات القارة الأفريقية . جميعها صغيرة القد ، رشيقة القوام ، مستطيلة الأذنان ، قصيرة الأيدي ، وسية الأضواء . اثناها زاهية الألوان يكثر فيها التوشيح . تعيش على الأشجار ، قوتها الثمار والحبوب والجنود . جماعاتها متوسطة العدد . أثنائها تقنع جرواً واحداً رضعه نحو ٦ شهور || أعراف أنواعه وأشهرها :

٢٩٦٩٦ - هِجْرَسُ أَحْمَرُ *
Cercopithecus patas, C. ruber (S). Cercopithèque patas, Singe rouge (F). Patas (E).

موطنه بعض اسراج وغابات أفريقية الشمالية . ظهره وإبطاه وفخذه وباعده وذنبه إلى الصبغة الجوزية . بطنه وبواطن قوائمها إلى البياض الأملح . وبهه وأذناه سود .

٢٩٦٩٧ - هِجْرَسُ أَخْضَرُ *
Cercopithecus callitrichus (S). Cercopithèque callitriche, Singe vert (F). Green monkey (E).

موطنه ضفاف النيجر . جماعاته كثيرة العدد . ثوبه إلى الخضار الزيتوني . بطنه إلى البياض الاصفر . وبهه أسود اللون ، حمار جبهة أبيض . ذنبه أصفر الملب .

٢٩٦٩٨ - هِجْرَسُ أُخْفَرُ
Cercopithecus pygerythrus (S). Cercopithèque veret, Vervet (F). Vervet (E).

موطنه أفريقية الجنوبية . جماعاته متوسطة العدد . ثوبه إلى الخضار الأصفر يطولو موج اصفر . بطنه وحمار وجهه إلى البياض الاصفر .

٢٩٦٩٩ - هِجْرَسُ أُسْتَيْلُ ، أَبُو شَتَب
Cercopithecus cephus (S). Moustac

موطنه الغابات القائمة بين الغابون والكنغو . ثوبه إلى الصبغة ، رأسه زيتوني اللون ، وجهه إلى الزرقعة السوداء ، حماره أبيض . كفه أسود . ذنبه أربد اللون ، اسمر الملب والطرف || أخلاقه رضية هنية . وهو سريع الالتباس والتمسك .

٢٩٧٠٠ - هِجْرَسُ الْبَحِيرَات
Cercopithecus brazzae (S). Cercopithèque de Brazza (F). Brazza monkey (E).

موطنه مناطق بحيرات الكونغو . جسمه رشيق القوام يطول نحو ٧٠ سم . وذنبه ٧٥ سم . ثوبه إلى الصبغة . حمار وجهه تاجي الشكل سناني المقدم ، أسنخ المتوسر . يذاه ويدناه سود . طرف فخذيه الخارجيين أبيض اللون . يياضه يمتد من حدود الساق إلى الجاعرة . ذنبه أسود لامع .

تخلدها على ضفاف مجاري الماء . قوتها المواد العضوية المنحلة والديدان وكل ما تستطيع قصه .

٢٩٦٨٧ - هَتَلَى *
Abolboda (F).

جنس نباتات جذمورية برية وزراعية تزيينية . أنواعها المعروفة قليلة ، منها مناطق البلاد الحارة . أوراقها أسلية الشكل ، جذعية الانتصاب . أزهارها شراخي ينتهي بزهرة خشوية ، ثلاثية التويجات وثلاث . مبيضا ثلاثي المسكن . عديد البويضات . بتلات أزهارها بياض اللون أو وردية .

٢٩٦٨٨ - هُوتُونِيَّة
Hottonia (S). Hottonie (F).

جنس نباتات مائية من فصيلة الربيقيات . أنواعها قليلة . أوراقها مركبة ريشية مستطيلة الاعتناق تومع على صبغة الماء . أزهارها عقديرة التجميع طرفي الارتكاز . أزهارها خاسية التركيب || أشهر أنواعها وأعمها زراعة المختوية المتعمية .

٢٩٦٨٩ - هُوتُونِيَّةُ مَتَقِيَّةُ *
Hottonia palustris (S). Hottonie des marais, Mille-feuilles aquatique, Plumeau, Girofée d'eau (F). Featherfol, Water gillflower, Water violet (E). Vasserfeder, Feder-Garbe (D). Garofano d'acqua, Erba militare, Penne d'acqua (I).

نوع من المختوية . يكثر ويوجد في المنابع والمياه الراكدة . تزور في أحواض الماء لقرنين . أزهارها بحيلة الشكل . بتلاتها حر الصبغة صفر القاعدة .

٢٩٦٩٠ - هُوتُونِيَّةُ
Houttuynia (S). Houttuynie (F).

جنس نباتات طبية جذمورية زخافة من فصيلة السرويات . معقدة التعريف على اسم العلامة الدائري هوتوين .

أنواعها المعروفة قليلة ، منها بعض أصناف آسية الشرقية ، تعيش على ضفاف مجاري الماء . سوتها تحيلة حولية تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها معتقة متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل . مدبب المقصعة ، بارز المروق ، حارشي المقصعة السفلى . أزهارها سنيلي التجميع . أزهارها صغيرة القد غبراء اللون ، عصاره جنودها حريفة الطعم . أوراقها مطعنة .

٢٩٦٩١ - هُتِيرِيَّةُ * ، سَكَنْدُونُ *
Sphenodon punctatus (S).

Sphenodon, Hatteria (F).

حيوان بيوض وحيد النوع والجنس والفصيلة من رتبة مغطويات الرؤوس . موطنه جزر زيلندا الجديدة || شكله شبيه بالظفاد ، إنما التبايز الثوري والجنسوري يكتمان في التركيب وفي القد . جسمه يطول نحو ٧٠ سم . جلده مبعثر الثعلب ويملو في قد رأسه وفي ثبج ظهره وذنبه عرف غفروني التركيب مسن كالنشار . رأسه مكل . المنطقة الصدغية من الرأس عظمية التركيب . بطنه محفوف بالاضلع . مدبه مملوء بزغف جلدي . ذنبه مستطيل ، قابل التجديد عند الانفصام . قوائمها نشيطة ، خاسية الأصابع المتقدمة يحظاظ قاعدي . مخالب حادة الأطراف المحجنة . أسنانه شارقة ، مرترزة في الحافة الخارجية من الفك الأمامي الثاني اسن قدماً من الذكر وأصغر بطناً منه . تلقى من ١٠ إلى ١٢ شلقة في حفرة بين الصخور التي ترتادها برفقة طيور البحر . ينفث الشلق بعد وضعه بنحو ٤ أسبوعاً || يسرح في الليل . انتقاله سريع الحركة في البر وفي الماء . قوته العظام والصفاد والديدان والقواقع الصغيرة .



هتل



هتونية متقية



هتيرة



هجرب اسمر



هجرب أخضر

٢٩٧٠١ - هجريس الغاب *، تسنسان

Cercopithecus pyrrhonotus (S). *Cercopithèque nisanis*, Nisanas (F).

موطنه افرقية الشرقية اصحابها الصوبال وكردفان ودفور. ثوبه سوي اللون الاصهب الصنالي. حنار وجهه الى البياض الاخير || وهو من القردة الشديدة الحذر المكيدة، التي تقتبس العلم ببطء ولا تنسى .

٢٩٧٠٢ - هجريس ديانا *

Cercopithecus diana (S). *Cercopithèque Diane* (F). *Diana monkey* (E).

موطنه ليبريه والكنغو . ثوبه جميل الالوان . ظهره ارجواني. يطله الى البياض الاخير . ساعده وفخذه سود الفاهر ، صفر الباطن . اما الذكر فيتميز بختار جبهته الاسود وبلمحيته وسباله البياض .

٢٩٧٠٣ - هجريس سبا *، شادي، عبتنج، طوت

Cercopithecus sabaues (S). *Cercopithèque de Saba, Grivet, Tota* (F). *Grivet* (E).

موطنه افرقية الشرقية يكثر في الحيشة وسنار وكردفان . جسمه صغير القدرع التقاطيع . ثوبه الى الخضار العايق. قوامه يذنيه موشمة بالابيض . وجهه واذناه سود .

٢٩٧٠٤ - هجريس سنكسار ، سنكسار

Cercopithecus talapoin (S). *Talapoin, Mitopithèque* (F).

موطنه الغابون . ثوبه كثيف الشعر الناعم . ظهره الى الخضار الاسفر . يطله الى البياض الاخير . حنار وجهه تقري الشكل ، ابيض اللون || اخلاقه هنية رضية . يقتبس العلم بدون نفور وازعاج .

٢٩٧٠٥ - هجريسيات ، قروء ذبالة، قروء

Cercopithecidae, *Laslopygidae* (S). *Cercopithécidés* (F). *Cercopithecidae, Laslopygidae* (E).

الهجريسيات والهجرايس فصيلة قرد من صفليات المنخرين تشمل ستة اجناس الهجريس والحوول والمكاك والشم والقفه والقرودح .

٢٩٧٠٦ - هجين

Métis (F). *Cross-bred* (E). هو في الحيوان نتاج التجين اي الاسفاد بين حيوانين من نوع واحد ولكن من سلالتين مختلفتين .

٢٩٧٠٧ - هجين

Hybride (F). *Hybrid* (E). هو في النبات نتيجة تنبغ زهرة بطلع زهرة اخرى من نوعها اما من غير ضربها او صرهما . وهو يدعى هجلاجا

٢٩٧٠٨ - هذاب *

Parnassius (S). جنس حشرات فراشية من عمارة اللذانبايات . اكلواه عديدة جميعها متوسطة القد، بسطها تراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . اجسامها اسطوانية مهذبة . رواشتها مستعرضة مستديرة، لوها الى البياض الاخير يملوها بتمشيح ليليكي وتتمتع الحبل بتبقيج اسود وافر || تظهر في اوائل الصيف تمتع مكثها على نباتات فصيلة الهذلات تفتت عن رقات مفلمطة ضمة جوزية اللون حلبة الجسم مهذبة بالهلب التفسير ومنقطعة بالاحمر .

٢٩٧٠٩ - هذاب الجرود *

Parnassius montivagus (S). *Parnassien des montagnes* (F). *Mountain Butterfly* (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها بئس جبال الشرق الادنى . فراشتها واثمة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق التفطريون والحللات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ سم . بسطها نحو ٥٤ سم . رأسها اكهب اللون . عينها نازرتان . زياتانها صولطانيان . جوشنها الى الشبهة السراء المراج . بطنها الى الشبهة الرصاصية الغصبة البياض || رواشتها عند الشقين الى البياض الاخير يملوها بتمشيح اريد ويليكي وتتمتع اسمر وتبقيج اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواخر الربيع تسرح في النهار . تماثل يمد ظهرها بنحو اربعة اسابيع وتمتج المكن مباحدا على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ سم . جسمها مقلع الشكل . ثوبها الى السرة الجوزية تملوها ثلاثة غطوط سود قاطبة وتقطيع جانبي احمر واصفر . قشارها كيف الحبل والهلب القصير . رأسها اسود . فكها نشيطان . رواشتها وبديها الى الزبدة السراء || طول الاكامل التي يستمر من ٣٢ الى ٣٤ اسبوعا يتقضى ضمن صلجة متينة التسج .

٢٩٧١٠ - هذاب

Filaridés (F). *Filaridae* (E). ردف من الديدان السليكية الوردية . تتميز باجسامها الدقيقة التحيلة الحيطية الشكل . انواعها عديدة تعيش في الاجسام الحية فتؤذيها وقد تميتها . اطلب هذابة .

٢٩٧١١ - هذابة *، فيلارية، عركة

Filaria (S). *Filaira* (F). جنس ديدان سليكية من الهذاب . انواعها كثيرة العدد تصيب الانسان والحيوان . جميعها دقيقة الجسم التحيل ، عيطية الشكل، مستطيلة، تعيش في الجهاز الدوري وفي التسج الضام تسبب اضطرابات عتلة واختلالات داخلية قد تكون سبب الوفاة || اعرف انواعها ما يتبع .

٢٩٧١٢ - هذابة الخيل

Filaria equina (S). *Filaire du cheval* (F). نوع من الهذاب تطول من ٤ الى ١٢ سم . تصيب الخيل والبال والحير . تتمركز في اغشية المعدة . تسبب بعض الاضطرابات الداخلية فلما تكون وشية العاقبة .

٢٩٧١٣ - هذابة الدمع

Filaria lacrymalis (S). *Filaire lacrymale* (F). نوع من الهذاب تطول من ١٠ الى ٢٥ سم . تركب البقر وتعيش في مجاري غدد الدمع تسبب التهاب المتحممة . يقضى عليها باستئصالها .

٢٩٧١٤ - هذابة الظبياء

Filaria cervina (S). *Filaire des cervidés* (F). نوع من الهذاب تركب الظباء والايالي في نسجها الضامة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ سم .

٢٩٧١٥ - هذابة الكلب

Filaria immitis (S). *Filaire cruelle* (F). نوع من الهذاب تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تركب الكلب فقير في الجهاز الدوري وتسفر في بطن القلب الايمن . يكثر وجودها في الصين واليابان وفي ايطاليا واليونان .



هجريس الغاب



هجريس ديانا



هجريس سبا



هذاب



هذاب الجرود



هذابة

Clopeotte commun (F).

٢٩٧٢٥ - هَدَبَة

راجع حمار قبان .

Fulcre

٢٩٧٢٦ - هَدَبَة

هي غيوط جهاز التناسل في فطور الارماديات .

٢٩٧٢٧ - هَدَبَة طائر (السان) .

Tigre mâle (F). He-tiger (E).

٢٩٧٢٨ - هَدَبَس

الهَدَبَس البر الذكور عند بلوغه كامل النشاط .

Ciliés (F). Cilia (E).

٢٩٧٢٩ - هَدَبِيَّات

شعبة من التقيحيات من الحيوانات الدنيا الالوي .

Thysanoptéroïdes

٢٩٧٣٠ - هَدَبِيَّات الجناح

طبقة حشرات من شعبة العليات تشمل رتبة واحدة تدعى هديية الاجنحة ، اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ تجمعها عدة فصائل .

Thysanoptères (F).

٢٩٧٣١ - هَدَبِيَّة الاجنحة

Thysanoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة هدييات الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها صغيرة دقيقة يصعب تمييزها بالعين المجردة . اضطلامها مخروطية الشكل . اناكها ثنائية ماصة . قرونها الاستشعارية عديدة المقل التي تراوح ٦ الى ٩ . اجنحتها عند وجودها هديية التركيب مستطيلة . اناكها سوية الالوان منها الاسفر والاسمر والكستني والاسود || حشراتها الكاملة ويرقاتها تركيب العديد من النبات . قوسها الخفيف والنفس وعصارة الخلايا || اشهر بشراتنا الترييس .

Thysanoures (F).

٢٩٧٣٢ - هَدَبِيَّة الأذُناب

Thysanura, Bristle-tails (E). Borstenschwänze (D). طائفة من الحشرات المذبة المدعمة الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى ريتين رتبة لاطات الملك ورتبة ظاهرات الملك .

Hydraires (F).

٢٩٧٣٣ - هَدَرَات

هي العذارا ، رتبة حيوانات مائية من المحرفات .

Hydre (F). Hydra (E).

٢٩٧٣٤ - هَدَرَة

الهدرة هي العذار ، جنس حيوانات مائية من العذاريات .

Hydrogénation (F).

٢٩٧٣٥ - هَدَرَجَة

المزج بالهيدروجين .

Hydrostatique (F).

٢٩٧٣٦ - هَدَرَسَة

Hydrostatics (E). علم توازن السوائل وضغطها .

Hydrobia (S).

٢٩٧٣٧ - هَدَرُوب

Hydroble (F). Hydrobia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الارجل وفصيلة الهدروبوات . انواعه المعروفة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم . يكثر وجودها عند مصبات الانهر || اصنافها صغيرة ، ماصة ، مذبذبة الاعقاب ، قزينة الاسقاط .

Filaria caprae (S).

٢٩٧١٦ - هُدَابِيَّة الماعِز

Filaire des caprins (F).

نوع من الهداب طوطا يراوح ٢ الى ٥ سم . تركيب الماعز في نسبها الفصاة فتفرح جلودها وتقصيها .

٢٩٧١٧ - هُدَابِيَّة المَدِينَة ، عِرْقِي مَدَنِي

Filaria medinensis (S). Filaire de Médine, Ver de Médine (F). Guinée-worm (E).

نوع من الهداب تكثر في البلاد الحارة . تعيش تحت الجلد في لسج الجسم الفصاة عند البشر والخيول واليقر وسائر الهم . اناكها طولون من ٥٠ الى ٨٠ سم . وقد يصل طوطا في بعض الاحيان الى ٤٠٠ سم . تستقر في اي مركز كان اما تفضل اسفل الساق فتصيب دملة تنتهي بخراج مقروح . يقال ان كيشها يدخل المعدة مع الماء . فاجتباها يكون اما بطل الماء او بتقطيره .

٢٩٧١٨ - هُدَابِيَّة بِاسُورِيَّة

Filaria haemorrhagica (S). Filaire des boutons hémorragiques (F).

نوع من الهداب طولون من ٣ الى ٧ سم . تركيب الخيل والبال والحبر . تتركز في العنق والكنتف والخالرك . تسب دمايل تتر القبح والدم .

٢٩٧١٩ - هُدَابِيَّة الأَرْجُل

Cirripèdes, Cirropodes (F). Cirropoda (E).

رتبة حيوانات دنيا من القشريات . فصائلها واجناسها كثيرة العدد جميعها صغيرة القند تعيش مقليلية على الاسماك والحيوان وكل شيء تستطيع الالتصاق به . قرونها الاستشعارية بمجهره يحاجم تمكها من الالتصاق .

٢٩٧٢٠ - هُدَاكَة

Frigidité (F). Frigidity (E). حالة مقاومة سليبة او فتور في وظائف الاعضاء التناسلية تجعل المرأة تنفر من النكاح او لا تفتيط بممارسته لانها قلما تتحسس الحبور الجنسي .

Viscum album (S).

٢٩٧٢١ - هُدَاكُل *

Gui, Gui blanc, Morvé (F). Common mistletoe (E). Gemeine Mistel (D). Visco quercino, Vischio comune, Pania (I).

نبات طفيلي معمر من فصيلة التمنيات . يعيش على اغصان الأشجار الشجرة والحرجية اخصها التفاح . فيقام عائله النسخ ويؤديه . بزره تنشق في السج الذي يلصقه بالنسج . جلوره تشبب في لجاء المائل . فروعه ثنائية التركيب . أزواره وحيدة الشق ، ضمية التجميع ، ابليّة الارتكاز . ثماره نوبوية الشكل ، بيضاء اللون ، دايقة المادة . بزورها دقيقة مقلطعة || ثماره مأكولة من بعض انواع الطير اخصها السنان التي تنقل البزور مع لسها الى اي شجرة كانت || والهدال يستعمل ضد الربو والشقاق ويستخرج منه نوع من الدقيق جيد الصنف . الواحدة هدالة .

٢٩٧٢٢ - هُدَاهِد هو المهدد ، اطليه .

Cueillir (F). To gather (E).

٢٩٧٢٣ - هُدَبِيَّة

هدب الشرة : اجتباها وهدب واعتدب ايضاً .

٢٩٧٢٤ - هَدَبِيَّة ، هُدَبِيَّة

Aiguille (F). Needle (E). هَدَبِيَّة ، هُدَبِيَّة ج هذب وهذب واهداب . كل ورقة ابرية الشكل لا غير لها ولا عرض كورق الصنوبر والاثل ...



هدال

الملس، سواء اللون، فنية المواج، تعتبر من افخر وأنجح الفراء.

٢٩٧٤٦ - هيدروبيات *
Hydraena (S). Hydraena (E).
جنس حشرات من فصيلة الهيدروبيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة، اهليجية، هيفاء، تطول نحو ٣ م. رؤوسها مستعرضة. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية غيطية. تأثيرها قصيرة. ملابسها مستطيلة. منمنقة. كواسلها شبه مكورة الشكل. اغمارها لاحفة. قواطمها مستطيلة. اثوابها سوية اللونان تكثر فيها الصرة السداة والحلوة ثم البني والكستني || تألف مجاري الماء. تعيش تحت الحجارة المغمورة.



هيدريس

٢٩٧٤٧ - هيدروبيات *
Hydraenidae (S). Hydraenidae (E).
فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة، اهليجية الشكل، متعلة الاحديداد، تطول من ٣ الى ٥ م. رؤوسها متعلة الجرم. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية غيطية، سباعية الفصل. تتميز باستطالة ملابسها الفكية المنمنقة. كواسلها نظامية. اغمارها لاحفة. قواطمها مستطيلة || تعيش في المناطق والبحيرات ومجاري الماء تحت الحجارة المغمورة او بين اوراق النبات. ومنها انواع تعيش تحت طحالب الصفقات. يرقاها مغترسة || اشهر اجناسها الهيدرية.

٢٩٧٤٨ - هيدريس *
Myrte (F). هو الاس، اطلية.

٢٩٧٤٩ - هيدريس، هيدريس *
Frigide (F). Frigid (E). الهذك والمهدوك من تميز بالهداك.

٢٩٧٥٠ - هيدريس *
Leptostroma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الهديكات. انواعه عديدة جميعها روية لا مؤذية. بكينداتها فارشة، طبائية الشكل، سوداء اللون، فريحة الانفلاق. يوبقها غشاء اللون مخلفة الاشكال، منها البيضاء والخروطية والمنمنقة.



هيدرية

٢٩٧٥١ - هديكات *
Leptostromataceae (S). Leptostromataceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزويات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد، بكينداتها مجنحة، فحية اللون، شاربة الارتكاز او محصورة. يوبقها مخلفة الاشكال، متبانية التركيب. || اعرف اجناسها الهائية التالية: اتوسويديوم (غشاء)، يوفويه، ديسكوزيه غلوس ليتيويوم، لبريلا، ملسيه، هديكة.

٢٩٧٥٢ - هيدليق *
Fertilité (F). Fertilité (E).
الهذ هو الحصب في الانتاج.

٢٩٧٥٤ - هيدليق *
Upupa (S). Upupa (F). Upupa (E).
جنس طير من الهدهديات. انواعه المعروفة ستة، جميعها

٢٩٧٢٨ - هيدروبيات *
Hydrobiidae (S). Hydrobiidae (F). Hydrobiidae (E).
فصيلة حيوانات مجهرية من الرخويات مديات الارجل امانيات الخياشيم المشطية. اجناسها المعروفة ٢٢ وانواعها بعض المئات منتشرة في معظم بحار العالم وخاصة عند مصبات الانهر لانها ترغب في الماء الاجاج || اعرف اجناسها واشهرها الهديروب.

٢٩٧٢٩ - هيدروبيات *
Hydroscaphidae (S). Hydroscaphidae (E).
فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها منافع ومجبرات البلاد المتتلة الحرارة || اجسامها شبه بيضية اللون، معتلة التبيطيل، تطول من ٨ الى ١٤ م. رؤوسها مستعرضة، مخروطية. عيونها بارزة. تأثيرها وتكونها نظامية. - قرونها الاستشعارية سباعية الفصل. كواسلها شبه مربعة الشكل. اغمارها لاحفة || تعيش على النباتات المائية في البحيرات والمنافع || اشهر اجناسها الهديروس.

٢٩٧٤٠ - هيدروبيات *
Hydroides
هي العناريات من الهيدويات تشمل ثلاث رتب. العناريات والعدرات المرجانية والجلدييات.

٢٩٧٤١ - هيدروبيات *
Hydroméduses (F).
صنف حيوانات من الهيدويات يشمل العناريات والديديات والمصصيات.

٢٩٧٤٢ - هيدروبيات *
Hydrocorallaires
رتبة حيوانات مائية من الهيدويات.

٢٩٧٤٣ - هيدروبيات *
Heldreichia (S). Heldreichia (F).
جنس نباتات عشبية، معمرة، برية، من فصيلة الصليبيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتبها جبال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سورها زحافة فراء. اوراقها متعاقبة، متقاربة لحية النصال. ازهارها طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها غريقات وحيدة البزرة || اشهر انواعه الهديريخ الحلبياني الورق.

٢٩٧٤٤ - هيدروبيات *
Heldreichia bupleurifolia (S).
Heldreichia à feuilles de bupleurif (F).

عشبة معمرة برية من فصيلة الصليبيات. منتبها جرد لبنان. ساقها زحافة فراء. فروعها منتسبة. اوراقها لحية ملقية النصال. ازهارها طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها غريقات وحيدة البزرة || اشهر انواعه الهديريخ الحلبياني الورق.

٢٩٧٤٥ - هيدريس *
Enhydria marina (S). Enhydria marina, Grande loutre de mer (F). Kalan, Sea otter (E). Kalan, Grosser Seeotter (D).
حيوان بحري لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرعوبيات. قوته الاسماك والقشريات. اعطائه مجاح مفيق بحرين. طولها نحو ١٦٠ سم. يتميز باستدارة راسه ومخاطب قائمته الخلفيتين الذي يكتشف كامل البراش دون الاظافر. فروته قصيرة الورب الناعم الكثيف، خلية

٢٩٧٦٠ - هَدِيَّاتٌ (F). Flagellés (F). Flagellates (E).
قفة من الاولاي ، غالباً مجهرية ، مجهزة بأهداب دقيقة قابلة الانخزاز تدعى هدبيات تحمكها من العوم والانتقال في الماء . بعضها فسفوري اما اكثريتها تستمتع بالغضيب . ومنها انواع عطليية تعيش على الحيوان .

٢٩٧٦١ - هَدِيف ٥ (F). Allergène (F).
نعت تعريفي يطلق على كل مادة قد تسبب الانهداف .

٢٩٧٦٢ - هَدِيل (F). Pigeon mâle (F). Dove male (E).
الهديل هو ذكر الحمام . قال فيه جرمان العود .

كان الهديل الطالع الرجل وسطها
من البهي شرب يغرد مسنرف
والهديل صوت الحمام من هدل . والهديل كما جاء في الديميري
« فرخ كان له عهد نوح فصاده جارج من الطير فليس
من حامة الا وتبكي عليه الى يوم القيامة . قال نصيب :
فقلت اتيكي ذات طوق تذكرك
هديلاً وقد اوى اوى ونسا كان تبع »

٢٩٧٦٣ - هَدِيم (F). الهديم : باقي نبات العام السابق .

٢٩٧٦٤ - هَدِيَّةُ الْفَيْلَمِ * ، عَسْفِيَّةُ السَّلْتِ

Hadena scalis, Hadena didyma (S).
Hadenè du seigle, Noctuelle du seigle (F).
Hadena scalis (E).

حشرة مؤذية من فصيلة العسفيات حرشفات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا وبقية الشالية . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاضعة تركيب التعجيلات البرية والزراعية || جسمها مستطعم الجرم يطول نحو ١٣ م . بسطها تراوح من ٣٠ الى ٣٥ م . زباناها مستعرض الشكل . عيناها صفيرتان . عريطان . ملاسها صفيرة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الخنطي || راشتها الى الخنطي الاسمر تعلو في الزوج الامامي زراکش معترضة وزخارف تراوح بين الكسني والجزوي . وتعلو في الزوج الخلفي ماجة قاعدية سماء لا تتجاوز حدود الزام الاول || لها جيل واحد في الخول . تغلف الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل يمد ظهورها بنحو سبع اسابيع وتتمتع المكان في عطوط مستقيمة على عصف النبات العائل || الطور الاسروي الذي يستمر نحو ٤٠ اسبوعاً ينشقي على النبات والسرقة عند بلوغها الادراك تغلظ من ٢٥ الى ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، باعت الحفصار يعلو غطان ثيجيان اممران يمتدان من الكول الى الشرج . رأسها اممر اللون ، مبهر الخلب الثقيل . مذهبها ورواجها الى الخنطي || طور الاكمال الذي يستمر من ٢١ الى ٢٨ يوماً ينشقي في التربة حيث تنمدن السرقة وتصلنق بجلباب من العن .

٢٩٧٦٥ - هَدِيَّةٌ مُشَبَّهَةٌ *

Hadena reticulata (S). Hadenè reticulée (F).
Hadena reticulata (E).

حشرة من العسفيات حرشفات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق العلوك والقرنفل البري والزراعي وتقتب الكماير وتلتهم البذور

من طور العالم القديم . اجسامها رشيقة ، رؤوسها متوجة بقنازع مروحية الشكل . اثوابها جميلة الالوان المترامية الزاهية يعلوها تجديع وتنسج . || حكي القزويني ان الهدد قال لسليان اريد ان تكون في سفاتي قال انا وسدي قال بل انت واهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا فنصر سليان بمجنوده فطار الهدد فاصطاد جرادة فضنقها ورمى بها في البحر وقال كلوا يا نبي الله من فاته اللحم ناله المرق فضحك سليان ورجنوده من ذلك حولا كاملاً وفي ذلك قيل :

« جاءت سليان يوم العرض هدهدة
اهدت له من جراد كان في فيها
وانشدت بلسان الحال قائلته
ان الهدايا على مقدار مهديها
لو كان يهدي الى الانسان قيمته
لكان يهدي لك الدنيا وما فيها »
اعرف انواعه واشهرها الهدد الشائع .

٢٩٧٥٥ - هَدُودُ شَائِع * ، دُودُكُ الْجَبَلِ

Upupa epops (S). Huppe commune, H. vulgaire (F). Common hoopoe (E).
نوع من الهدد الميزول في لبنان وفي سائر الشرق الاوسط . كنيته ابو الاخبار وابو ثمامة وابو قامة وابو الربيع وابو درج وابو مجاهد وابو عباد . ج هدهد وهدهيد . الواحدة هدهدة . || وهو طائر اخرج الثوب متوسط الجسم طوله تراوح من ٢٧ الى ٢٨ سم . منقاره دقيق مستطيل . قزقته كبيرة القد سوداء الاطراف . ثوبه الى الصلبة الطحلاء . جناحاه وظهوره الى الصلبة القائمة يعلوها تسليج اسود وابيض يتخلله الاصفر . ذنبه مقطوع الطرف اسود اللون ابيض الجانبين والوسط . || يأنف الاماكن المليمة الاجبار . قوته الحشرات والديدان . يئن عشه في تجاويف الاجبار . الاثنى تحضن وحدها من ٤ الى ٧ بيضات نحو ١٦ يوماً . الذكر يئن لما الاكل . || يعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها .

٢٩٧٥٦ - هَدُودُ يَمَاتُ

Upupidae (S).
Hupupides, Upupides (F). Upupidae (E).
فصيلة طير من الجوامث الرقيقات المناقير . انواعها عديدة تتجمع الى جنسين الهدد والهدير . اجسامها رشيقة . اجنحتها ذلقة . السنبا قصيرة . اسراعها قوية . اثوابها جميلة الالوان الزاهية .

٢٩٧٥٧ - هَدُودِيَّةٌ ٥ (F). Hédobie (F).
جنس حشرات خاشبة من فصيلة الغفرات . انواعها المرفقة ١٠ ، اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، اثوابها مزركشة مختلفة الالوان . يرقاقها تركب الاشخاب الميتة فتسخرها وتعلها . اشهرها الهدوبية الامباطورية .

٢٩٧٥٨ - هَدُودِيَّةٌ امِبَاطُورِيَّةٌ *

Hedobia imperialis (S). Hédobie impériale (F).
نوع من الهدوبية طولاً من ٤ الى ٥ م . ثوبها حنطي اللون اسمر المزاج تعلو زراکش مختلفة جليلة التركيب طملاء زاهية . || يرقاقها تركب اغصان الاجبار الميتة من اي نوع كانت .

٢٩٧٥٩ - هَدِيَّةٌ ٥ (F). Flagelle (F). Flagellum (E).



هدد شائع



هدوبية امباطورية



هدية الفيل



هدية مشبكة

إذا ازدحت هوم الصدر قلنا
عسى يوماً يكون لها انفراج
ندمي هرقى وأيس نفسي
دفاثر لي ومعشوق السراج

٢٩٧٧٢ - هَرَاكْس Acacia blanc (F).
هو السط الابيض . الواحدة هراسه .

٢٩٧٧٣ - هَرَامِسَة Astrologues (F). Astrologers (E).
المراسمة علماء النجوم . النجميون والمتنجنون .

٢٩٧٧٤ - هَرَب Harp. الحرب . ثوب البطن .



هذاب

٢٩٧٧٥ - هَرَبُغُود Harpagodus (S). Harpagode (F). Harpagodus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات بمديات الارجل
وفصيلة الكبشيات . انواعه المرفوعة قليلة العدد اعطاهها
بعض مناطق المحيط الاطلسي المراجعة لاربيكة الثانية ||
اصداؤها متوسطة القد وشبيهة عملاقة جزوية اللون . فوهاها
معتدلة الانفراج ثلاثية الفلق التي تبدو كرجل البش شكلاً
وحطاباً .

٢٩٧٧٦ - هَرَبَق Harpactes (S). Harpacte,
Courouc flamboyant (F). Harpactes (E).
جنس طير من فصيلة الطرغويات . انواعه المرفوعة نحو
١٠ موطنها يشمل معظم مناطق آسيا الشرقية والجنوبية .
جميعها متوسطة القد . مناقبها قوية بحدية الاطراف ،
مقمرة الحاطم العليا . اجنتها متوسطة الطول ، ذلقة
الاطراف ، رتاجية الريش . اذناها مستطيلة ، رتاجية
التركيب . اقواها جميلة الالوان المتناسقة || فوهاها الحشرات
على اختلاف انواعها وبعض الدويبات || اعرف انواعه
واسمهاها الهريق المطوق .

٢٩٧٧٧ - هَرَبَقْ مَطُوق * Harpactes fasciatus (S).

Harpacte à bande, H. kondea (F).
نوع من الهريق . اصطانه بلاد الهند وصوتراً . يألف

الغابات الكثيفة || جسمه متوسط القد بطول نحو ٣٠ سم .
ثوبه جبل الالوان الصافية . رأسه وضعه الى السواد الفصحي
اللامع . صدره وبطنه الى الحمرة القرمزية الشديدة البعان
وكذلك عصبه تطوق رأسه من العين الى العين . سواد عنقه
واحجار صدره مفصولان بطق ابيض كاللج . ظوره
وافتيحه وعزالان ذنبه الى الجروة تطوقها حاشية سوداء
يغلغها حنار مستعرض ابيض . جناحه الى السواد المسج
بالابيض . مناقده ورصاه الى الزرقه || طيرانه المعادي
قصير الشوط يكثر فيه التصعيد والتهبيط . قوته الحشرات
والدويبات اعصها المتناكب || يذئن عنه في صدوع
الاشجار الهربة . الاثني تبين من ٤ الى ٥ بيضات
تحضنها بمنارة الذكر نحو ١٥ يوماً .



هرب مطوق

٢٩٧٧٨ - هَرَبُلُوس Harpalus (S).
جنس حشرات من فصيلة الهربلسيات . انواعه كثيرة
العدد جميعها صغيرة القد ، دجوية المسرح ، تعيش تحت
الحجارة والاعشاب والارواح اليابسة . قوتها البزور
والحيوب وبعض الثار . رقتها خاضعة تعيش على اوراق
النبات . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

الفنية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ سم . بسلتها
نحو ٤١ سم . رأسها الى الخطي الاسمر المواج . عينها
كبرتان . زباناها خضيان . جوشها وبعثها الى الخطي
الاسمر || روشها الاماميان الى الخطي الاشجع المواج
تعلمو شبكة من الخطوط الكستنية . روشهاا الخلفيان
الى الخطي التبيي المواج يسر عنه الاطراف الخارجية .
اهدابها الى الشقمة الصنائية || لها جيل واحد في الحول .
تظهر الفرائشة في اواسط ايار وتبقى حتى تموز . تسرح
في الليل . تناظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع
المكن لطعاً مرببة على الصفحات السفلى من نصال
الارواح || السرعة عند بلونها الكمال تطول نحو ٤٠ سم .
جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى
الريكة تبعث في الظهر وتبعث في الجانبين ويعلوها غطان
جانبيا احمران وتسعة خطوط ممتدعة صفراء اللون . رأسها
الى الجفوة . مدبها الى الطلحة الغبراء . رواجها الى السرة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في
التربة ضمن جلباب من العين لتتلفه السرعة .

٢٩٧٧٩ - هَدْيُوتِيْس Hedyotis (S).
Hédýotis, Hédýote, Hédýote, Hédýote (F). Dog-
wood (E). Süsohr (D). Edolide (I).
جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة الفويات .
انواعه قليلة احمران وتسعة خطوط ممتدعة صفراء اللون .
ازهارها محورية الاكازار او تاجية . ثمارها جراء ثنائية
اللفة . || اعرف انواعه واسمهاها ما يلي .

٢٩٧٨٠ - هَدْيُوتِيْس سَرَكْدِيْب Hedyotis auricularia (F).
نوع من الهديوتيس . اصطانه سرنديب . جنته معمرة .
اوراقها حاضنة ذكية العرف الطري . ازهارها تاجية
الاكازار شائعة العرف . يستخرج من اوراقها بالتقطير
عطر الهديوتيس .

٢٩٧٨١ - هَدْيُوتِيْس هِنْدِي Hedyotis à ombrelle (F).
نوع من الهديوتيس . اصطانه الهند . عشته عمولة . جلورها
صباغية يسمنها "شي" غصاهها احمر اللون شائع الاستعمال

٢٩٧٨٢ - هَدَاب Mesites (S). Mésite (F).
واحدته هدابة . جنس طير من فصيلة الهذابيات . انواعه
قليلة العدد . اجسامها متوسطة القد ، طولها براوح من ٢٧
الى ٣٥ سم . جوارحه وارسافها وغالبها مستطيلة . ازفادها
عريانة . جوارحه لامعة ذلقة . اذناها قصيرة مخروطية .
اقواها الى الصهبة المايقة يعلوها توشيم خفيف . جواشها
وبطنها الى الصفرة الموشة بالاسود . اعناها بقية اللون .
قوتها البزور والحيوب والحشرات على اختلاف انواعها .
تنش عشها في انصوص بين الادلغال والاعشاب الرفيعة .
حضانها من ٨ الى ١٢ بيضة .

٢٩٧٨٣ - هَدَابِيَات Mesitidae (S). Mésitidae (F). Mesitidae (E).
فصيلة طير وحيدة الجنس من رتبة الدجاجيات . انواعها
المرفوعة قليلة ، جميعها من طيور مدغسكر . قوتها البزور
والحيوب والحشرات .

٢٩٧٨٤ - هَر Chat (F).
هو السنور ، اطله . ج هرة والاثنى هرة . قال احد بن
فارس صاحب المجمل في اللغة :

٢٩٧٨٧ - هَرَبُلُوسْ رَقِيع * Scutellaria altissima (S).

Toque élevée (F). نوع من الهربون التريبي الممر. ساقه متصببة تعلق من ٥٠ الى ١٠٠ سم. أوراقه معتقة اهليلجية الشكل ؛ نصلها جامد الصفحة ، مسن الحافة ، ازغب البشرة . ازهاره سنبلية التجميع ، متقابلة الاركان ، تطول نحو ٢ سم. شفيراتها العليا بنفسجية اللون ، شفيراتها السفلى عاجية . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٧٨٨ - هَرَبُلُوسْ كَثِير الزُهْر Scutellaria macrantha (S). Toque à grandes fleurs (F).

نوع من الهربون التريبي الممر. ساقه تعلق من ٢٠ الى ٣٠ سم. أوراقه لاطئة ، بيضبة الشكل ، نصلها قليل التحمل ، مسن الحافة . ازهاره سنبلية التجميع ، متقابلة الاركان تطول نحو ٣ سم. لوها الى الزرة الزاهية تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٧٨٩ - هَرَبِيلَة نَيْكَة * ، قَوْبَة اخْصَب Harpella forficella (S). Harpelle perce-bois, Teigne du bois mort (F). Harpella forficella (E).

حشرة من فصيلة القربيات حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها خاشبة تعيش على جنود الاشجار اليابسة والاعصان والافانك || جسمها قصيف يطول نحو ٧ سم. بطنها تراوح من ٢٢ الى ٢٤ سم. رأسها مكور الشكل . عينها صغريتان . زيانها غيطيان . ملاسكور دقيقة . مرشفا معتدل الطول . جوشها ويطنها الى النبي الصنابي المواج || روشنها الانبياء الى الصغار القتام يعلو تشيح بني . روشنها الخلفيان الى الصلبة السمره المواج . اهدائها شقراء اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكن محاديا في شقوق الخشب وتحت القشور اليابسة || السرعة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٦ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستدق المقدم والمؤخر ، ميمر الحلب القصير . ثوبها الى الخنطلي الاسمر رأسها شديد السمره . مدبها ورواجها الصدرية والبطنية الى الخنطلي الباهت || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي بخارج الفلق الخشبي ضمن صلجة تنسجها السرعة تحت القشور او بين الشقوق .

٢٩٧٩٠ - هَرْتَمَة الرمحة : السواد بين منخري الكلب وساثر الحيوانات من ذوات الغنطية .

٢٩٧٩١ - هَرَجْ Clitorie de Ternate (F).

هو المازريون الهندي ، اطلبه .

٢٩٧٩٢ - هَرَجَة ، كنج Exotype

احدى سلالات جبل النيب الهابط . يعبر عنها علمياً بحرف ٧ يتيم رقم السلالة . فاذا اودت التبرير عن السلالة الاولى كتبت ١ ٧ دلالة على السلالة الثالثة كتبت ٣ ٧ على السلالة السادسة ٦ ٧ الخ ...

٢٩٧٩٣ - هَرَجْرَج Talin (F).

هو التالينوم ، اطلبه .

٢٩٧٩٩ - هَرَبُلُوسْ أَصْهَبْ * Harpalus rufus (S).

نوع من الهربولوس . حشرته تطول من ١١ الى ١٣ سم. ثوبه الى الصبغة الخنطية الفاتحة . يألف الاثربة الرملية . قوة البزور والحبوب والآبار الجافة الساقطة . رقاته خاضلة قليلة الاذى .

٢٩٧٨٠ - هَرَبُلُوسْ أَطْحَل الظَهْر * Harpalus distinguendus (S).

نوع من الهربولوس . حشرته تطول من ١٤ الى ١٦ سم. ثوبه الى السمره السفعاء المراج . ظهره اطحل اللون ، اسمر التخطيط المستطيل . يركب جملال الشبلك لالتهم بزورها الدقيقة فيسطب الشامل ويشوبها .

٢٩٧٨١ - هَرَبُلُوسْ مَلُون * Harpalus aeneus (S).

نوع من الهربولوس . حشرته تطول من ٧ الى ١٠ سم. ثوبه الى الأخضر الاسفع تملو مشعة جوية . زيانها وجرارمز الى الحمرة . يعيش تحت الحجارة والاشخاب . قوة البزور والحبوب . رقاته خاضلة قليلة الاذى .

٢٩٧٨٢ - هَرَبُلُوسِيَّات Harpalidae

فصيلة حشرات من عُمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطائها العالم . معظما رابل وبعضها مفترس . رقاتها خاضلة ناهمة ومنها المفترسة التي تمتص البيدان القارضة || اشهر اجناسها الهربولوس والمروس والياح والديتوس .

٢٩٧٨٣ - هَرَبُلُون * Pseudope

جنس عظام من فصيلة الحنجويات العاديات القوام . انواعه قليلة ، اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . اجسامها اسطوانية تطول من ٤٠ الى ١٠٠ سم. رؤوسها مقلطحة . اذنانها دقيقة . حراشفا مربعة متتامة . قوتها الحشرات تعتبر من الزحافات المفيدة .

٢٩٧٨٤ - هَرَبُون * ، دَرَكَة Scutellaria (S).

Scutellaire, Toque (F). السرعة عن الامير مصطفى الشهابي الماعا الى مصدر الاسم العلمي . جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة ، ينبتا الشرق الادنى وافريقية الشمالية . سوقها خشبية نحيلة . اوراقها صغيرة القد لاطئة او معتقة . ازهارها سنبلية التجميع ، مختلفة الالوان . بزورها دقيقة خنطية اللون || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٩٧٨٥ - هَرَبُونْ أَبْيَض Scutellaria albidia (S).

Toque blanche (F). نوع من الهربون التريبي الممر . ساقه زيا اللحاء تعلق من ٤٠ الى ٨٠ سم. أوراقه معتقة اهليلجية الشكل ، نصلها جامد الصفحة ، خلى البشرة ، مسن الحافة ، دبق المسام . ازهاره سنبلية التجميع تطول نحو ٢ سم. لوها الى البياض العاجي || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٧٨٦ - هَرَبُونْ أَبْيِي Scutellaria alpan (S).

Toque des Alpes (F). نوع من الهربون الجبل البري الممر . ساقه تعلق من ١٠ الى ٣٠ سم. أوراقه لاطئة بيضبة النصل تطول من ١ الى ٢ سم. ازهاره بيض الانابيب ، زرق الاطراف ، سنبلية التجميع . تنوره يستمر من حزيران الى آب .



هربولوس اصهب



هربولوس اطحل الظهر



هربولوس ملون



هربول



هربون



هربلة نيكة

٢١٧٩٤ - هَرْجُود ٥*

Heterogynis (S).

Hétérogynis (F). Heterogynis (E).

حشرة من فصيلة الهرجوديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطائها بعض مناطق البلاد المتعددة الحرارة . تألف البراري واخراج المبيضة الاثنيار || جسمها صغير ، نحيل ، كثيف الخمل الناعم . يسلطها نحو ٢٠ م . رأسها صغير . عيناها صغيرتان ، بارزتان . خطمها وملامسها شديدة القصر . زباناها مشطيان ، مستطيلان . اجنتها كبيرة || الاثني مرقلة وعادة الانحاج ، السرفة شبه اهليلجية الشكل ، مبطلة ، خاضعة ، تعيش على اوراق فصيلة القرنيات الفراشية ونسبا الزوال ، مرتها المفصل .

٢١٧٩٥ - هَرْجُودِيَّات ٥

Heterogynidae.

Epincopterygidae (S). Hétérogynidés, Epincoptérygides (F). Heterogynidae, Epincopterygidae (E). فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها شلالية الاعطان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، يلفها خل ناعم . يسلطها تراوح من ١٨ الى ٢٢ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . انطامها وملامسها شديدة القصر . قرونبا الاستمارة مشطية . اجنتها خضيفة الانتشاب . مستعرضة الطرف . اوثاها الى السمرة الخطيئة المتفاوتة الماحبات || اناثا معار مرقلة . اساريها شبه اهليلجية الشكل ، مبطلة || أشهر اجناسها الهرجود .

٢١٧٩٦ - هَرْجُوم (F).

Damalsque du Sénégal.

Korrigum (E). هو حذلولو السنغال، موطنه يمتد من السنغال الى افريقية الشرقية والجنبة .

٢١٧٩٧ - هَرْد

Curcuma (F).

هو الكركم الصباغي . اطبله .

٢١٧٩٨ - هَرْدَاء ، هَرْدَان (F).

Thamnocalamus (S). Bambou (F). Bambou (E).

جنس نباتات قصيبة برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعه قليلة العدد ترغب في الاربة الخفيفة العميقة الغور الوافرة المواد المضوية .

٢١٧٩٩ - هَرْدَاء هَنْدَسِيَّة

Thamnocalamus hindi (S). Bambou de Hinds (F).

نوع من الهراء يطول من القرنين الى الخمسة اذبار . سلاجاته شديدة الخضار . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ١٠ م . نصلها جلدي التسنج ، صفحة العليا خضراء اللون طلعها الموج ، صفحة السفلى بيضاء اللون زياه . يرغب في الاربة البدالية الرطبة .

٢١٨٠٠ - هَرْدِيَّات ٥

Phalagides, Opilions.

Faucheurs (F). Phalagides, Opilions (E).

رتبة من صف النكبيات . اجناسها وانواعها عديدة تنقسم الى اربع فصائل منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، ملحونة الصدراس بالطن ، خيشومية التنفس ، عادمة المشاق ، مستطيلة الجرامز الدقيقة . أشهر فصائلها الكهوليات .

٢١٨٠١ - هَرْدِي

Hourdia (F).

الحردى او الحردى ، كلمة عربية اصيلة تستعمل الآن للدلالة على المجارة الموقفة من الباتون (اطلب حردى) .

٢١٨٠٢ - هَرْدِيْب مُبْتَج ٥*

Chlorophorus varius (S). Chlorophore tacheté (F). Chlorophorus varius (E).

حشرة واثمة خاضعة عاشبة من فصيلة القرنيات ورتبة نمذات الاجنحة . تألف البراري القريية من الممران . خنافسها تعيش على ازهار الصيوانيات ولا تمتع عن الازراق . يرقاتها تركب الجذوع والاصنان والقصبان المقطوعة اليابسة وقد تسردب ساميك الكرمه وازواح الاثنيار المثمرة وسامناها || جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٤ م . ثوباها الى الصفار الكبريتي تعلو يبقع وتذروق سود . رأسها مستدل الجرم . عيناها كبيرتان ناشرتان . زباناها خيطيان دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، ضيق المؤخر المستدير الفارق . غذاءها نمذات الصلابة ، متتابعات التحيزيز النجيل القاطب . اسرارها خاسية العقل || الاثني ابيز قدأ من الذكر واكد ثوبا منه واقتصر زبانا || جيلها ثنائي الخول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في التبار وتبيض في الليل || البرقة عند تمام ادراكها تطول من ١٨ الى ٢٤ م . جسمها محذوب الظهر ، مبط ، المدب ، قصير الرواجب الشكل . ثوباها الى الصفرة الزيتية يملوها تنقيط اسمر . رأسها احمر .

٢١٨٠٣ - هَرْدِيْب مُعَصَّب ٥*

Chlorophorus trifasciatus (S). Chlorophore trifascié (F). Chlorophorus trifasciatus (E).

حشرة واثمة خاضعة من فصيلة القرنيات ورتبة نمذات الاجنحة . تألف الموامق التي تكثر فيها نباتات الفصيلة الصيوانية . خنافسها تعيش على الازهار . يرقاتها تركب اوسام النباتات الحولية والهولة وتسردب لحاء جذوع الاثنيار باستثناء الصنوبريات || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ م . ثوباها متمدد الالوان فيه الاسود والاحمر والاسمر الخفي والبيج الاصفر المواج . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان ، ناشرتان . مستدير خيطيان ، دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، مستدير الطرف الفارق ، اسود اللون كاليلطن . غذاءها متتابعات التحيزيز الخفيف القاطب . اسرارها خاسية العقل || الاثني ابيز قدأ من الذكر واقتصر زبانا منه واطول مرأا || لها جيل واحد في الخول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل آب . تسرح في التبار وتبيض في الليل || البرقة ، عند الادراك التام ، تطول من ١٦ الى ٢٠ م . جسمها محذوب الظهر ، مبط المدب ، نودلي الرواجب . ثوباها الى الصفرة الصنابية المواج يملوها تنقيط احمر . رأسها جؤوي اللون .

٢١٨٠٤ - هَرْدِيل ٥

Haridelle (F). Steed, Nag (E).

الحرديل الصفائح الضيقة من السبور . الواحدة هرديلة .

٢١٨٠٥ - هَرْزَان ، هَرْزُون (F).

Autruche mâle (F). هو الظلم ، اطبله .

٢١٨٠٦ - هَرْشَان ٥*

Caragana (S).

هرشان تعريب الاسم التركي . جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنيات الفراشية . مهدا بعض بلاد الشرق الاقصى وبعض مناطق سيرييه . انواعه عديدة . جميعها معمرة . معظمها جنبي وبعضها بجلي . اوراقها عابله مركبة ،



هرجود



هرديب مبّج



هرديب معصّب



هرشان

٢٩٨١٣ - هَرَشَانْ كَدَن ٥
Caragana frutex (S).
Caragana frutescent (F).
نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ٢٥٠ سم. أوراقها
رباعية التركيب. وريقاتها لاقبائية الشكل والحجم تطول
من ١ إلى ٣ سم. وتعرض من ٤ إلى ١٢ م. نصلها بيضي
الشكل، أذنياتها حادة شائكة. أزهارها كبيرة القد،
فردية التجميع، لونها إلى الصفار الزاهي || تنوره يستمر
طوال شهر أيار.

٢٩٨١٤ - هَرَضِ
Clous (F).
بشور صنديرة جامدة تملو النسيج النباتية.

٢٩٨١٥ - هَرَصَّة
Ver (F). Worm (E).
هي الدودة. ج. هَرَضِ.

٢٩٨١٦ - هَرَضِ
Polymnatus (S).
جنس حشرات فراشية من فصيلة الحمرشيات. أنواعه عديدة،
أعطانها معظم اصقاع العالم. أجسامها صغيرة القد كييفة
الحراشفت المستقلة الحليمة الاطراف. اثوابها ملونة.
قربونها الاستعمارية مستطيلة دبوسية الشكل || تسرح في
النهار. قوتها طلع الازهار وريحها || ريقاتها غاصلة
وقامرة تركب أوراق النبات وتمارها || أعرف أنواعه وأشهرها
ما يلي.

٢٩٨١٧ - هَرَضِ الباقية *
Polymnatus amandus (S).
فراشة من الحرض، جسمها احمر اللون رصاصي المواجه.
طولها نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها إلى الزرقعة البنفسجية
الزاهية يطوقها حنار اسود وأطار أبيض المذهب. رواشن
اناثها حنطية اللون يعلوها رقعة سمراء وأطار أبيض التهديد.
ريقاتها صغيرة القد، خضراء اللون، تركب الباقية في أوراقها
وقربوها.

٢٩٨١٨ - هَرَضِ البُقُول *، أْبُو دَقِيقِ الأَزْرَقِ
أْبُو دَقِيقِ البُقُولِ

Polymnatus baeticus (S).
فراشة من الحرض، جسمها حنطى اللون احمر المواجه يطول
نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها إلى الزرقعة الجميلة الزاهية
يطوقها اطار أبيض التهديد. رواشن اناثها غبراء اللون
يعلوها تنميش اسود. ريقاتها خضراء اللون تشوبها كدرة
غبراء || تركب البُقُول وتقرض الحبوب قبل ادراكها
أخصها الفول واللوبيا والترمس.

٢٩٨١٩ - هَرَضِ التُّرْمُسِ *
Polymnatus damon (S).
فراشة من الحرض. جسمها يطول نحو ٣٥ سم. رواشن
ذكورها إلى الزرقعة الخضراء المواجه يطوقها اطار اسمر
وتهديد. أبيض. رواشن اناثها حنطية يعلوها تنقيط اسود
ونقط اوسط أبيض وحنار اسمر وأطار مهدب أبيض.
ريقاتها تركب معظم النباتات القرنية انقصها الترمس.

٢٩٨٢٠ - هَرَضِ الرُّمَانْ، قَرْمُكُولَة، دَوْدَة
الرُّمَانْ

Virachola livia (S).
فراشة من الحرض. جسمها حنطى اللون اخضر المواجه يطول
نحو ٣٠ سم. رواشن ذكورها برتقالية الصفحة العليا،
رءادية السفلى، كستنية الطوق المذهب. رواشن اناثها
بنفسجية الصفحة العليا سمراء السفلى، حنطية الطوق

ريشية، شفعية، متفائلة، تنتهي بأذنبة شائكة مكونة
من امتداد الضلع. أزهارها خمسية التجميع أو فردية يكثر
فيها اللون الاصفر. ثمارها قرنية. بزورها بيضية الشكل.
أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢٩٨٠٧ - هَرَشَانْ أَزْعَب ٥
Caragana pygmaea (S). Caragana pygmée (F).
نوع من الهرشان. جنبته تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. فروصها
متدلية. أوراقها رباعية التركيب نصلها ضيق الصفحة
السناينة الشكل يطول نحو ٢ سم. ويعرض نحو ٣ سم.
أزهارها فردية، لونها إلى الصفار الزاهي || تنوره يستمر
من نيسان إلى أيار.

٢٩٨٠٨ - هَرَشَانْ الصَّيْنِ ٥
Caragana chinensis (S). Caragana de la Chine (F).
نوع من الهرشان جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها رباعية
التركيب. وريقاتها بيضية الشكل تطول من ١ إلى ٣ سم.
وتعرض من ٦ إلى ١٥ م. نصلها مائل البشرة على صفحتيها
أذنياتها شائكة. أزهارها فردية التجميع، كبيرة القد،
متدلية لونها إلى الصفرة يعلوها تسليج أرجواني أزرق المواجه.
تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٢٩٨٠٩ - هَرَشَانْ صَغِيرِ الرُّوقِ ٥
Caragana altagana, C. microphylla (S). Caragana à
petites feuilles, Acacia de Sibérie (F).
نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ٢٠٠ سم. وريقاتها تعد
من ١٢ إلى ١٨ وهي بيضية الشكل مستديرة الطرف. نصلها
يطول نحو ١٠ سم. وهو خالي البشرة على صفحتيها. أزهارها
فردية أو ثنائية التجميع، لونها إلى الصفرة الجميلة. تنوره
يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٩٨١٠ - هَرَشَانْ بُرْتَقَالِي ٥
Caragana aurantiaca (S). Caragana orangé (F).
نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فراء.
فروصها متدلية. أوراقها رباعية التركيب ضيقة النصل
الذي يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ٣. أزهارها فردية،
برتقالية اللون || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٢٩٨١١ - هَرَشَانْ شَالِك ٥
Caragana spinosa (S). Caragana épineux (F).
نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فراء،
أوراقها لاقبائية التركيب منها الرباعية الاصبعية الشكل
ومنها السداسية والثمانية الوريقات. نصلها يطول نحو ٢٥
سم. ويعرض نحو ٥ سم. صفحتيها العليا خضراء اللون،
صفحتيها السفلى خالية البشرة حملاء. راشات أوراقها شائكة
تطول من ٣ إلى ٤ سم. أزهارها إلى الصفار الكبيرتي.
تنوره يستمر من نيسان إلى أيار.

٢٩٨١٢ - هَرَشَانْ كَبِير ٥، شَجَرَة الحَمْصِ

Caragana arborescens (S). Caragana arborescent,
Arbre aux pois (F).
نوع من الهرشان. جنبته تملو من مترين إلى خمسة أمتار.
وريقاتها لاقبائية العدد الذي يراوح من ٦ إلى ١٢
نصلها تطول من ١٥ إلى ٢٠ م. وتعرض من ٢ إلى ٥ م.
أزهارها خمسية اللون، ثلاثية التجميع أو فردية. بزورها
ماكولة وهي كالحصص شكلاً وقداً وطعماً || تنوره يستمر
من أيار إلى حزيران.



هرض الباقية



هرض البقول



هرض الترمس

هَرَضُ الشَّيْلَك - هَرِثَّة



هرض الشيلك



هرض الصعر



هرض العرن



هرض القصة



هرض القطنيات



هرضة الكوباي



هرغ

من نصال الازراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٥ م. جسمها محبب الشكل، مستنق المقدم والمؤخر. ثوبها الى الخضار الانس تملوه ثلاثة خطوط صفر وخطان اسودان ويجتمع سلمي غير. رأسها اسود. مذهبها ورواجها الى السفرة الداكنة || طول الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقضيها الحادرة متدلية برجلها متعذدة الحصىفة.

٢٩٨٢٦ - هَرِثِيَّات

فصيلة حشرات قراضية تعرف بالقنيتان، اطلها.

٢٩٨٢٧ - هَرِط، هَرِطَة

علم الحيوان المهزول اخصها علم النجعة الكبيرة المهزولة.

٢٩٨٢٨ - هَرِطَام، غُودِيَا

Gaudinia (S). Gaudinie (F). Gaudinia (E).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم الملائكة "غودين". وهي نباتات عشبية، برية، حولية، من فصيلة النجيليات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها حوض البحر الابيض المتوسط || جميعها شطبية، سوقها مائلة او خلية. عصفها مسطح النصال الباهة الخضار. انهارها سنبل. سنبلاتها منتصبة.

٢٩٨٢٩ - هَرِطَمَان

هو الخراط البري، اطله.

٢٩٨٣٠ - هَرِثَة الكُوبَاي *

Gyropus ovalis (S). شجرة جلدية دقيقة من فصيلة الحمريات. طولها نحو ١ م. جسمها مبسط الشكل. زياتها واثيرها رباعية التركيب. مقاطها عديدة الاطراف الحادة || تركيب الكوباي وتؤديه.

٢٩٨٣١ - هَرِثِيَّات ٥

Gyropidae فصيلة حشرات جلدية من رتبة القطنيات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد مغلفة الجسم مقعنة الارصاد تنطقل على الحيوانات اللبونة من ذوات الور الجمل التام.

٢٩٨٣٢ - هَرِفِس، مَهْرِفَس

Improlifque (F). المقم من النبات.

٢٩٨٣٣ - هَرِفِغ *

Nyctea nivea (S). Harfang des neiges (F). طائر من البويات وعامرة القديديات. موطنه جيم الاصقاع الشمالية الباردة. طولها نحو ٧٠ سم. ويسطه لا تقل عن ١٥٤ سم. ثوبه الى البياض الناصع في الطائر البالغ وهو منش وموشم بالسرعة في الطائر الفرخ. رأسه صغير القد. محصره نافر القرقص. مندره اسود الجسم والبهرة. عنباه الى الحمرة الصنائية. ذنبه مستطيل الريش. ارساه وغالبه قصيرة القد كاسية. || يدن عشه في تخاليف الصخور. انناه تنصع من ه الى ١٠ يضايت تحضنها بمناوبة الذكر. قوته الجرد والغار والدين والمروم والسلك.

٢٩٨٣٤ - هَرِثَلِيَّة

Heracleum (S). Berce (F). جنس نباتات عشبية كبيرة القد من فصيلة الخيميات. انواعها المعروفة قليلة لا تتعدى الثمانية. مذهبها جبال الخيشة والهند والشرق الاوسط واروبة وامريكية الشمالية. منها النباتات المعمرة والمحولة. اوراقها ريشية مغلقة. كفية النصل. يستخرج من سوقها واوراقها وازهارها

المهدب || ريقها صغيرة القد سوداء الرأس تبدو في اول مذهبها خضراء الجسم كيفية الحلب الاسود ثم ينفخ عليها ويحول لونها الى الحمرة ويبلغ طولها نحو ١٢ م. تركيب ثمار الزمان والدولة وقد تنمر في اليسر.

٢٩٨٢١ - هَرَضُ الشَّيْلَك *

Polyommatus icarus (S). فراشة من الهرض. جسمها اسطواني الشكل محصور الوسط اطحل الثوب يطول نحو ٢٢ م. رواشن ذكورها الى الزرقعة البنفسجية يطوقها حنار اسود واطار من المذهب الابيض. رواشن اناثها حنطية اللون صفراء المواج يطولها تنميش اسود وايض واجر، اطارها ابيض الهديب || ريقها تركيب اوراق مختلف النباتات اخصها الشيلك.

٢٩٨٢٢ - هَرَضُ الصَّعْتَر *

Polyommatus mealeger (S). فراشة من الهرض، تطول نحو ٣٦ م. رواشن ذكورها الى الزرقعة النارية الالامعة يطوقها حنار اسود وتهديب ابيض. رواشن اناثها الى الطحلة الصفراء المواج يطولها تنقيط اسود وتنقيج اسمر. قواعدا زرق الانتشاب اطرافها غير الهديب || ريقها ناهمة تركيب الصعتر وسائر النباتات البرية.

٢٩٨٢٣ - هَرَضُ العَرْن *

Polyommatus dolus (S). فراشة من الهرض. جسمها يطول نحو ٢٥ م. رواشن ذكورها الى الزرقعة النارية المواج يطوقها حنار اسود واطار من المذهب الابيض. رواشن اناثها الى الحنطية الاصعب المواج يطولها تنقيط دقيق اسود ويطوقها حنار مهدب اغير. || ريقها تركيب اوراق وسنت العرن والقصة.

٢٩٨٢٤ - هَرَضُ القَصَّة *

Polyommatus eros (S). فراشة من الهرض. جسمها يطول نحو ٣٠ م. رواشن ذكورها الى الزرقعة النارية المواج يطوقها حنار اسمر يتخلله بنض النقط اسود واطار مهدب ابيض. رواشن اناثها حنطية اللون زرقاء المواج يطولها تنميش وتنقيط وتنقيج واطار من المذهب الابيض. || ريقها تركيب معظم نباتات المراعي اخصها القصة.

٢٩٨٢٥ - هَرَضُ القَطَنِيَّات ٥ *

Polyommatus coridon (S). Polyommatus coridon, P. des légumineuses (F). Polyommatus coridon (E). حشرة من فصيلة القنيتان ورتبة حرشيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فراشتها جارية قوتها رقيق الانهار. سرتها تعيش على اوراق القطنيات وجوبها قبل ان تبلغ الادراك التام || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م. بسطها نحو ٣٤ م. رأسها معتدل الحجم. عينها كيرتان. زياتها صرطانية. جوشها ازرق اللون عند الذكر، كستنية عند الانثى. بطنها كستني اللون عند الشقين || رواشن الذكر الى الزرقعة يطولها مواج فضي وبنق كستنية وخطوط سود. رواشن الانثى الى السرة الكستنية يطولها في الزوج الالامي تهديب ابيض تبرزه خطوط حنطية، ويكتنفها في الزوج الخلفي حزام نصفي اللون من النقط احمر يتوسطها الاسود || لها جبل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في النهار: تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكن ميجاديا على الصفحات السفلى

ثوبه الى الزرقاء السمراء المواج، يطلع اقل مرة واكثر يياضاً. يتميز بفكيه المستطيلين وزعانفه الصدرية المستعرضة. قوته الاسماك والقشريات. || موطنه جنوب المحيط الاطلسي بين امريكة وافريقية.

٢٩٨٤١ - هرْكُولُ القُطْبُ

Balaenoptera borealis (S). Rorqual boréal (F).
نوع من الهراكلة. طوله نحو ١٥ م. يتميز بصغر زعانفه الظهرية والصدرية. يعيش اسراباً كبيرة العدد. قوته السمك والقشريات والرخويات والحث. || موطنه القطب الشمالي وقد يقترب، في بعض فصول السنة، من شطوط ايسلندا والرويج.

٢٩٨٤٢ - هرْكُولُ حَبْرَوَسِي

Balaenoptera rostrata (S). Rorqual à rostre (F).
اصغر انواع الهراكلة. طوله يراوح من ٧ الى ١٠ امتار. ظهره الى الكهية السمراء المواج. يطلع الى البياض الكدر. زعانفه الصدرية سمير القواعد والاطراف يبيض القسم الاوسط. قوته الاسماك دون سواها. || موطنه شمالي المحيط الاطلسي وبحار الروج وقد شوهد في المتوسط.

٢٩٨٤٣ - هرْكُولُ مَعْرُوفٌ * ، مَتَارَةٌ

Balaenoptera musculus (S). Rorqual commun (F). Finback, Finner (E).
نوع من الهراكلة. طوله يراوح من ١٨ الى ٢٠ م. ظهره ابيض اللون، رصاصي المواج. يطلع الى البياض الكدر. موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد في المتوسط. يعيش جماعات. سره يبعد من ١٥ الى ٢٠ نفراً. قوته السمك والقشريات يرافق اسراب الزنكة حيث تتجه.

٢٩٨٤٤ - هرْكُولِيَّاتٌ °

Balaenopteridae (S). Balaenopteridés (F). Balaenopteridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة فصليحات الاذنك ورتبة الحويّات || انواعها المعروفة عشرة، جميعها كبيرة الجرم ضخمة. اشهرها الهرْكُولُ الازرق والهرْكُولُ الحزوي وهرْكُولُ القطب والهرْكُولُ المعروف الذي يدعى منارة وكعبة الجنوب وكعبة الخليج وكعبة القطب المعروفة بجمل البحر.

٢٩٨٤٥ - هَرَمٌ

الهرم : ضرب من الحفص فيه ملحوة وهو اذله واشده انبساطاً على الارض واستطاحاً. ا. م.

٢٩٨٤٦ - هِرْمِلَةٌ

Traite (F).
هي التربة، من اسماك المياه العذبة. اطلها.

٢٩٨٤٧ - هِرْفُوسٌ °

Hemipterous (S). Hémiptère (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القديات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها وشعيبة الشكل، مستحججة، تقطن من ٤٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة طولها زخارف واطراف متبانية الاشكال عديدة. اشداها كبيرة. زعانفها الظهرية والصدرية والشرجية كبيرة، كثير الناحس الحادة. زعانفها الخلفية صغيرة والذيلية مقطوعة. اذواها الى الربعة الرصاصية الملاج يملوها في ظهورها تبتجج اسمر. رؤوسها حفراء اللون مفصلة بالخطي الاسمر || لحوها كاعنة الصفن.

نوع من الكحول جيد الصنف. وقد تستعمل اوراقها في صناعة مشروب خاص قريب الشبه من الجعة || اشهر انواعها ما يلي.

٢٩٨٣٥ - هِرْقَلِيَّةٌ اِيْرَانِيَّةٌ *

Heracleum persicum (S). Berce de Perse (F).
نوع من الهرقولة المعمرة القواعد العرف المستحب. مهدا بلاد ايران. يجلبها تملو من مرتين الى ٣ امتار. اوراقها مركبة. فصوصها ذرية. نصلها عابق الخضار الالسن. ازهارها كبيرة القد، يضاء اللون. اوراقها وتمازها صناعية يستفطر منها عطر فاخر الصنف ويستخرج منها مشروب شائع الاستعمال. || تنورها يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٨٣٦ - هِرْقَلِيَّةٌ زُغْبِيَّةٌ ، هِرْقَلِيَّةٌ صَمْغِيَّةٌ

Heracleum pubescens, H. gummiferum, H. speciosum (S). Berce douvete, B. pubescente (F). Downy cow-parsnip (E). Flaumiges Herkuleskraut (D). Panace (I).
نوع من الهرقولة المعمرة العامة العرف. مهدا بلاد القفقاز. يجلبها تملو من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. ساقها زغبية السهام. اوراقها مركبة. وربانها كبيرة القد. نصلها شائك الحافة، اخضر الصفحة العليا، خلى السفلى. ازهارها الى البياض الكدر. || سويها تنضج عند حرها او تلفها مادة سكرية مأكولة يقال انها جزية النفع. ويستخرج منها ومن اوراقها مادة كحولية شائعة الاستعمال. تنورها يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٨٣٧ - هِرْقَلِيَّةٌ صُرْبِيَّةٌ

Heracleum lanatum (S). Berce laineuse (F).
نوع من الهرقولة المعمرة. مهدا امريكة الشمالية. يجلبها تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها وفروعها زغبية السهام. اوراقها قلبية الفصوص المسننة الحافة. نصلها اخضر الصفحة العليا، ازغب السفلى. ثمارها صغيرة القد. تنورها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٨٣٨ - هِرْقَلِيَّةٌ نَافَعَةٌ * ، سَقَنْدَلِيُونٌ ، غُطْلٌ

Heracleum sphondylium (S). Berce branche-ursine, Patte d'ole (F). Meadow parsnip, Cow-parsnip, Hogweed (E). Heilkrut, Weisenherkuleskraut (D). Spodillo, Panace erculeo, Zampa d'oca (I).
اشهر انواع الهرقولة واكثرها انتشاراً. تعتبر من النباتات الضارة لان عناصرها الطبيعية جحالية تؤذي المواشي التي تاكل اوراقها. ومع ذلك فزراعها شائعة ويستخرج منها كحول جيدة الصنف ويصنع من اوراقها مشروب مستحب الطعم قريب الشبه من الجعة.

٢٩٨٣٩ - هرْكُولٌ

Balaenoptera (S). Balénoptère, Rorqual (F). Rorqual, Fin whale (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة من الحويّات. انواعها المعروفة اربعة ومنهم من قال ١٢. جميعها كبيرة القد وشعيبة الشكل، ضخمة الرأس الذي لا يقل طوله عن الزام الاول من الجسم. اعناقها مستطيلة التضخيد. زعانفها الظهرية محببة الى الورد. زعانفها الصدرية ذرية الاطراف. موطنها جميع البحار تجوبها في طلب المصيف والمشي.

٢٩٨٤٠ - هرْكُولٌ اَزْرَقٌ

Balaenoptera sibbaldi (S). Baleine bleue, Rorqual de Sibbald (F).
اكبر انواع الهراكلة واخصها جنة. طوله نحو ٢٦ م.



هرقولة إيرانية



هرقولة ناعمة



هرْكُولُ معروف



هرموس



هرنة الشروشور



هرندي



هرنوع اسفغ



هرنوع برتقالي



هرنوع جامد



هرنوع خيبنت

٢٩٨٦٠ - هَرْنُودِيَّات (S). *Hernandiacae* (F). *Hernandiacae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة العائلات منخفضة المبيض. اجناسها وانواعها قليلة العدد، اعطائها بعض المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || نباتاتها اشجار كبيرة، فروعها، اوراقها معنقة، متعاقبة، جامدة النصال القلبية الشكل او البيضية. ازهارها عثكولي التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة صفراء اللون او نيتية. ثمارها مسهلة. اغشائها صناعية.

٢٩٨٦١ - هَرْنُوع، هَرْنُوع، هَرْنُوع، بُولِيْطُس *Boletus* (S). *Bolet* (F). *Boletus* (E).

جنس فطور من فصيلة السميات الفشالية. انواعه كثيرة العدد تألف الغابات والاحراج الظليلة اغصها حراج السنديان. بعضها مأكول مستحب الطعم وبعضها جحالي ضار او كثير الاذى. اشكالها واجناسها والوانها مختلفة، جميعها قلنسوية المسائل الجامدة اللادة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٨٦٢ - هَرْنُوع اسفغ * *Boletus aereus* (S). *Bolet bronzé* (F).

نوع من الهرنوع المأكول. يعيش ويتكاثر في التربة. ساقه غليظة القد، وردية اللون. عسقلانه كبير القد، فارش القلنسوة، كسني اللون، اسفغ المواج. مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكده من الهواء.

٢٩٨٦٣ - هَرْنُوع البقر *Boletus bovinus* (S). *Bolet des bœufs, Albarelle* (F). *Boletus bovinus* (E).

نوع من الهرنوع ينتمي الى فصيلة السميات الفشالية. يعتبر من الفطور المأكولة. يعيش على اشجار الحور والكستناء || جذعه اسطوانية الساق المنصبة. عسقلانه كبير، فارش، جامد اللحمية، حنطي اللون، اصفر المواج. مكسره الى البياض التي ينحرف الى الوردي عند تأكده من الهواء.

٢٩٨٦٤ - هَرْنُوع بُرْتَقَالِي * *Boletus aurantiacus* (S). *Bolet orangé* (F).

نوع من الهرنوع المأكول المستحب الطعم. يعيش على جذور السنديان. ساقه غليظة. عسقلانه كبير القد، برتقالي اللون، وزن من ٦٠٠ الى ١٠٠٠ غرام. مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكده من الهواء.

٢٩٨٦٥ - هَرْنُوع جَامِد * *Boletus scaber* (S). *Bolet rude, Roussille* (F).

نوع من الهرنوع المأكول المستحب الطعم. يعيش على جذور السنديان. جذعه ييشي الشكل. عسقلانه كبير القد، جامد اللحمية، حنطي اللون، اطبل المواج. مكسره ابيض اللون يبقى على حاله او ينحرف قليلاً الى الوردي عند تأكده من الهواء.

٢٩٨٦٦ - هَرْنُوع خَيْبَت * *Boletus luridus* (S). *Bolet pernicieux, B. bième* (F).

نوع من الهرنوع الجحالي اللادة، حريف الطعم، مر المذاق. ساقه غليظة حراء البشرة. عسقلانه كبير القلنسوة القارشة، حنطي اللون، اسمر المواج. مكسره ابيض اللون ينحرف الى الزرقه عند تأكده من الهواء.

Pyramidal (F).

٢٩٨٤٨ - هَرَمِيّ

نمت وصني يطلق على ما كان شكله يشبه الهرم.

٢٩٨٤٩ - هَرَمِيْس

هر الكركدن الابيض، اعطيه.

٢٩٨٥٠ - هَرَمِيْسِيَّة

اثنى الحيقطان.

٢٩٨٥١ - هَرَمِيْسِيُوم

جنس فطور مجهرية من الدغيات وفصيلة الطحيسيات. سميجها موقور التركيب. جبرها الكنديية سميجية الانظام، منعقة الاطراف، ملونة اللادة. || انواعه قليلة العدد تعيش على المواد العضوية والتبائية السائرة الى الانحلال.

٢٩٨٥٢ - هَرَمِيْلَّة

Hermella (S). *Hermelle* (F). *Hermella* (E).

جنس ديدان حلقيه قسامة من فصيلة الهرمليات انواعها المعروفة عديدة تعيش في رمال الشواطئ التي لا تنقطع عنها المياه، ضمن انايب عرودية الارتكاز تصم فروعها بملاحسا الرأسية الكثيفة المسد.

٢٩٨٥٣ - هَرَمِيْلِيَّات * *Hermellidae* (S). *Hermellidés* (F). *Hermellidae* (E).

فصيلة من الديدان الحلقيات القصابة. اجناسها المعروفة قليلة المدد موطنها رمال الشواطئ البحرية في الاقاليم الباردة والمعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها الهرميلة.

Hermine (F).

٢٩٨٥٤ - هَرْمِين

هو القاقم، حيوان من السراعيب.

٢٩٨٥٥ - هَرْمِيَّة

مشي الدودة.

Ricinus (S).

٢٩٨٥٦ - هَرْنُوع

الواحدة هرمنة. جنس حشرات جلدية من فصيلة الهرمليات. انواعها عديدة تركب الطيور الجوامع. جميعها ذرية القد، مستطيلة الجسم والرأس، دقيقة الارياغ، متباعدة الهلب النظامي الارتكاز. || اعرف انواعها هرمنة الشروشور.

٢٩٨٥٧ - هَرْنُوعَة الشروشور *

Ricinus fringillae (S).

حشرة جلدية من الهرنوع. طولها نحو ٣ م. رأسها مبط المقدم. تأكلها قوية، زياناها جدعة. بطها بيضي الشكل. || تركب الشراشير والعصافير الفريدة فتؤذيها وقد تضيها.

٢٩٨٥٨ - هَرْمِيْعِيَّات * *Ricinidae*

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات. انواعها عديدة. اجسامها دقيقة، مستطيلة الشكل، مفلطحة، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. تعترى الطيور الجوامع اغصها الشروشور والعصافير الفريدة || اشهر اجناسها الهرنوع.

٢٩٨٥٩ - هَرْمِيْئِيّ

Hernandia (S). *Hernandie* (F).

جنس نباتات مجهرية من فصيلة الهرندديات. انواعه المعروفة سبعة جميعها من اشجار المناطق الاستوائية. اوراقها متعاقبة، منعقة، قليلة النصل الجامد المحذب الصفحة. ازهارها عثكولية التجميع، طريقة الارتكاز. ثمارها مسهلة. اغشائها صناعية. تقع اوراقها منشط شايق يستعمل حقناً بالسرم.

٢٩٨٧٤ - هَرَيَّاتٌ ، قِدَيَّاتٌ (F). Amentacées (F).
Amentaceous plants (E).

هي النباتات التي تكون أزهارها الذكرية على شكل حريرة
أو قِدَّة لذلك فالجوزيات والبقيصيات والسندانيات إلى
آخره جميعها من الهريات .

٢٩٨٧٥ - هَرَيَّاعٌ (F). Feuilles mortes (F).
Dead leaves (E).

الورق تنفضه الريح فيتناثر على الأرض .

٢٩٨٧٦ - هُرَيْرَةٌ ، قِدَّةٌ (F). Chaton (F).
Setting of a gem (E).
نظام هجرة قوامه سنبلة مركبة من أزهار وسيدة الشق .

٢٩٨٧٧ - هَرِيصَةٌ (F). Mare d'eau stagnante (F).
Pool (E).
مستنقع الماء الساكن .

٢٩٨٧٨ - هَرِيصَةٌ (F). Peltaria (S). Peltaire (F).
جنس نباتات برية حولية أو معمرة من فصيلة السيلبيات .
أنواعها المعروفة أربعة أعطانها الشرق الأوسط وأروبة
الشرقية . أوراقها متعاقبة . أزهارها عنقودية التجميع ،
طولية الأذنكاز . ثمارها خريدلية مبطلة || أشهر أنواعها
هريصة الثوم .

٢٩٨٧٩ - هَرِيصَةٌ الثُومُ * (F). Peltaria alliacea (S).
Peltaire alliaire (F). Sheldwort (E). Knoblauchsch-
heibenkraut (D). Peltaria (I).
نوع من الهريصة المبدولة للمعمر . أوراقها متعاقبة بيضية
الشكل حاشنة ، تفصلها عايق الخضار البحري ، ناشر
الاصباح . أزهارها بيضاء اللون || أوراقها ذبوبة الرائحة
عند المس . يقال أنها طلية تغيد المعدة وتطهر الأمعاء .

٢٩٨٨٠ - هَزَارُ (F). Luscinia, Philomela (S).
Rossignol (F). Nightingale (E).
جنس طير من فصيلة الغدليات . أنواعه ثلاثة الهزار
الأشرق والغدليل والمزقة . أجسامها صغيرة القند مستطيلة
الشكل . مناقيرها دقيقة مدنية الملاحظ . أجنتها وأذنانها
متوسطة الحجم . أرساغها طويلة . أصابعها بخلة . أطافرها
ضخيفة . ألوانها جميلة الألوان المتخالفة المتراكبة || جميعها
غريزة تألت المواقع الربطية . تجوب البلاد في طلب الحضيف
واللشش . تدن في الإذفال وقد تركز عشها على الحضيف
بين الشب . قوتها الحشرات .

٢٩٨٨١ - هَزَارُ أَشْرُقُ * (F). Philomela major, Luscinia luscinia (S). Rossignol
progné (F). Sprosser, Thrush nightingale (E).
نوع من الهزار . نقرته قريبة الشبه من نقرعة الغدليل إلا
أنها لا تضاهيها بالبرقة وبجس الناحان وتعداها || طولها
نحو ١٨ سم . ثوبه إلى الخطي الأصهب الموج . صدره
وبطنه إلى البياض الأكدر . أجنته منقطة بالأسمر . مناقره
حنتلي الملقط الأعلى . أصفر الأسفل . ساقه وأصابعه
إلى الصفرة الخطية || قوته الحشرات . يدن في الإذفال .
إنثاء تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

٢٩٨٨٢ - هَزَارُ غُرِيدٌ (F). Luscinia luscinia (S).
Nightingale (E).
هو الغدليل ، اطليه .

٢٩٨٨٣ - هَزَاوَجَشَانٌ هو نبات الفاشرين ، اطليه .

٢٩٨٦٧ - هُرُونُوعٌ لَدِيدٌ * ، بُولِيطُسُ كَمَاةٌ

Boletus edulis (S). Bolet comestible, Cèpe, Ceps
(F). Esculent boletus, Polish mushroom (E). Edel-
röhrling (D). Boletus comestibile (I).

أشهر أنواع الهرونوع المأكول . لذيق الطعم ، مستحب
المذاق يعيش ويتكاثر على التربة في ظل الأشجار الحرجية
أخصها السديان . عقلائته قلنوسى الشكل ، كبير القد ،
جامد اللحمية ، لونه إلى البياض الأكدر الأصفر الموج .
مكسره أبيض اللون ينحرف إلى الوردي عند تأكده من
الحواء .

٢٩٨٦٨ - هُرُونُوعٌ نِيلِيٌّ * (F). Boletus cyanescens (S). Bolet indigotier, B. bleuis-
sant (F).

نوع من الهرونوع الجمالي المؤذي المر المذاق . ساقه غليظة
حراء اللون . عقلائته كبير القند قريب الشب من عقلائن
الهرونوع الأسفع . مكسره أبيض اللون ينحرف إلى الزرق
النيلية عند تأكده من الحواء .

٢٩٨٦٩ - هُرُونُوعٌ * ، هُرُونُوعَةٌ (F). Apera spica-venti (S). Agrostide des champs, Joue
du vent, Epi du vent (F). Corn grass, Silky bent
grass, Wind grass (E). Windhalm, Echter Wind-
halm (D). Spica venti (I).

نبات عشبي بري مرعوي معمر من فصيلة النجيليات .
يكثر بين الزروع وفي الأراضي البرية الملساة .

٢٩٨٧٠ - هَرِيئِسٌ * (F). Heliornis fulica (S).
Héliorne (F). Heliornis (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة التفلقيات . قريب
الشبه بالقطاس وبالفرقة . يألف المستنقعات والبحيرات
وضفاف الأنهر . قوته الحشرات والنباتات المائية ||
جسمه متوسط القند ، يطول نحو ٣٠ سم . يتميز بطول
عنقه ويقصر ذنبه المستدير . رأسه معتدل الحجم . مناقده
ضليخ مدب الطرف . جناحا فارشان ، لائحان . ساقه
قصيرتان . أصابعه مستطيلة عظيمة تمكنه من السير على
الغضاب المائية . ثوبه العلوي متداخل الأسود والأسمر .
ثوبه السفلي إلى البياض الأصفر . رأسه وعنقه بلون الصفير
تملوهما جذة سواء أول تمتد من قاعدة المنقاد إلى الرءاء .
وجدته ثانية تمتد من طرف العين إلى الظهر || يدن عشه
على ضفاف الماء بين القصب والألال . الانثى تحضن
سجدها نحو ١٢ بيضة بينا الذكر يؤين لها الغذاء . الترغيم
يستمر نحو ثلاثة أسابيع .

٢٩٨٧١ - هَرَهَرَةٌ (F). Bèlement (F). Bëatement (E).
صوت الفأن .

٢٩٨٧٢ - هَرِهِيرٌ (F). Pemphérider (F).
جنس أسماك بحرية من شائكات الزعانف . أنواعه المعروفة
قليلة العدد ، أعطانها بمجاو البلاد الحارة . أجسامها صغيرة
القند مفلطحة . عيرتها مستديرة كبيرة ، أثوابها إلى السمرة .
ظهورها بنفسجية الموج . بطونها فضية . حومها مأكولة
تعتبر من الأصناف العادية .

٢٩٨٧٣ - هُرَيٌّ (F). Grenier (F).
Granary, Corn-loft (E).

هو الأتبار ، مستودع رحب الجوانب تجمع فيه الحبوب . ج.
أهراء .



هرونوع لديد



هرونوع نيلي



هرونو



هريس



هريصة الثوم



هزار أشرق



هَرَّان



هَسَّاس جِلِي



هِسِير الْحَبَايَات



هِسِير الشَّلِك



هِسِير الْعَوْسَج



هِسِير الْقَرَايِين



هِسِير الْقَرْظُم

٢٩٨٩٠ - هِسِير ٥

Hesperia (S). جنس حشرات من فصيلة الهسيرييات. أنواعه المعروفة كثيرة العدد أما الصارة فقليلة. فراشاته صغيرة القذ طولها براوح من ٢٣ إلى ٣٣ سم. أجسامها مزرقة الشكل. أوتابها إلى السرة. رواشها مزرقة وبقيعة. مكها كروي الشكل تمتعه على صفحات الأوراق السفلى. أشهر أنواعها وأضرها ما يتبع.

٢٩٨٩١ - هِسِير انْخَبَازِيَّات ٥

Hesperia malva (S). Plain-chant (F). حشرة من الهسير. فراشها صغيرة القذ طول نحو ٢٣ سم. نوها إلى السرة السوداء تعلوها ماجة غفيرة. رواشها ذكورها وأناثها قريبة للشبه لا يفرقها سوى اتساع التبييض الأبيض في الذكور. يكثر وجودها في نيسان وآيار وفي تموز وآب. يرقاها مؤذية تركب الحبايات والدياسيات والشيك والموسج.

٢٩٨٩٢ - هِسِير الشَّلِك ٥

Hesperia serratae (S). حشرة من الهسير. فراشها تطول نحو ٢٦ سم. نوها إلى السرة الخنطية. رواشها ذكورها إلى الخنطية يطولها تبييض وتبييض أخضر. رواشها أناثها كستنية اللون يتخللها تبييض وتبييض أبيض. يكثر وجودها في تموز إلى آب. يرقاها مؤذية تركب أوراق الشيك.

٢٩٨٩٣ - هِسِير الْعَوْسَج ٥

Hesperia des ronces (F). *Hesperia sao* (E). حشرة من فصيلة الهسيرييات ورثة حشرقيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فراشها واسعة نوها رقيق الانزعاج. سرقها تعيش على أوراق الموسج والبلان. جسمها صغير القذ يطول نحو ١٠ سم. بسطها نحو ٢٣ سم. رأسها كستني اللون. عيناها كيرتان. زباناها صولجانيان. جوشها وبطنها إلى الكستني القاتم. رواشها الذكر إلى السرة الكستنية تعلوها رشة بيضاء. رواشها الانثى أقل لمة وتزويقا. لها جيلان في الخول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في النهار. تماطل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتد المكان مباحدا على اهان الأوراق ونصالحا. السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٠ سم. جسمها أسطواني الشكل. مائل للشار، أحمل اللون، أصفر المواج، جوي الرأس، اسمر اللبد والرواجب. في طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو ١٥ يوما، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ اسبوعا وينتضي ضمن صلبة تحميها السرة بين الأوراق.

٢٩٨٩٤ - هِسِير الْقَرَايِين ٥

Hesperia proto (S). حشرة من الهسير. فراشها تطول نحو ٣٠ سم. ذكورها وأناثها متساويان في القذ. نوها اسمر اللون كستني المواج. رواشها مزرقة وبقيعة وهي في الذكور زاهية الالوان المركزة على الخنطية الاخرى. يكثر وجودها من حزيران إلى تموز. يرقاها تركب القرايين وسائر النباتات الخبازية.

٢٩٨٩٥ - هِسِير الْقَرْظُم ٥

Hesperia carthami (S). حشرة من الهسير. فراشها تطول نحو ٣٠ سم. نوها إلى

٢٩٨٩٤ - هَرَّان * *Opisthocomys* (S). Hoazin (F).

جنس طير من فصيلة الغرائسات. أنواعه قليلة تتميز بالحنها المستحقة التي تشبه راحة التيس. جميعها مستطيلة القذ الرقيق، قوية المتفاز، قزعية الرأس، نحلة المتق، مستدرة الاجنحة، مستطيلة الذليل، أوتابها إلى السرة السوداء يعلوها نأزير أبيض وتوشج وتوشج. عنقها وجوشها إلى البياض البتي. تألف الاحراج. تمشي اسراب كبيرة. قوتها النار. تدرش عشا، في الاغسال والاشجار المنقبة، فرق الماء. أناثها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وسدها اربعة اسابيع.

٢٩٨٩٥ - هَرَّان

من اسماء الاسد المشهورة.

٢٩٨٩٦ - هَرَّوُج *Pied du champignon* (F).

هو ساق الفطر.

٢٩٨٩٧ - هَسَّاس *Pelidna* (S).

Pelidna (F). *Pelidna* (E). جنس طير من دجاجيات الارض. أنواعه المعروفة قليلة العدد. جميعها من القوط. أجسامها صغيرة القذ، قريبة الشبه من الجهلول. أوتابها إلى الربة الخنطية، تيق وتقرش بالاسمر في الظهر والجناح، وتقرش وتيق في المتق والجوش والايطل والبطن. متألها مستطيلة، دقيقة. اذنانها قصيرة. اجنحتها لاسفة. قوتها الحشرات والديدان والحلزون والرخويات. اعراف أنواعه وأشهرها الحساس الجيلي.

٢٩٨٨٨ - هَسَّاس جَبَبِي * *Jehhoul el-sharq*

Pelidna alpina, *Tringa subarctica* (S). *Pelidna alpina*, *Bécasseau corcori* (F). *Curlew-Sandpiper* (E). طائر من الحساس. اعطانه فسيحة الارواء تمتد من اليابان إلى اوروبية. مصيفه جبال البلاد المعتدلة الحرارة. مشتتة ساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر ويصر والدوان والخنطية. جسمه صغير القذ. طوله نحو ١٦ سم. ثوبه إلى الربة الخنطية. ظهره عايق اللون يعلو تميم اسمر وأخضر. عنقه وجوشته وبطنه إلى البياض الاخر يقيق بعض التي في الصدر. متقاده اسمر اللون، رصاصي المواج. عيناها إلى السرة الكستنية. يبدن في اقحوص قليل المتق، صاحي الشكل، يبطه بانهم الحائش. حشسته من ٣ إلى ٤ بيضات ترخلها الانثى دون الذكر نحو ١٧ يوما.

٢٩٨٨٩ - هِسْبَة ٥ *Hispa* (S).

Hispe (F). *Hispa* (E). جنس حشرات غاشلة من غديات الاجنحة وفصيلة النصاريات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحرارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. أجسامها صغيرة القذ تطول من ٧ إلى ١٠ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها بارزة. قزونها الاستشعارية خيطية منتصبة. كواسلها وانقادها وحواشي بطونها مدرزة بالشوك اللدقيق الخاد. اتحادها شبه نجية الشكل مستدرة المؤخر الاذن. أوتابها متباينة الالوان والماجات، يكثر فيها الاسود وشفتها ثم الجروي ثم الكستي والتي.

(١٦٩٥-١٧٢٣) أنواعها عديدة تنتمي الى فصيلة الفويات. أعطائها البلاد الامريكية. جميعها اشباب سريوية ممره. اوراقها متقابلة. ازهارها قمية الشكل، مستطيلة المالحق || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٩٩٠٣ - هسپيرنته أرجوانية

Houstonia purpurea (S). *Houstonie purpurine* (F).
نوع من الهسپيرنته. ساقها ضمية تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضيه النصل، صغيرة القد، ثلاثية أو خماسية الفلوع. ازهارها ارجوانية اللون، هامة الارتكاز. تنورها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٩٩٠٤ - هسپيرنته ترشاهية

Houstonia coerulea (S). *Houstonie-bleue* (F).
نوع من الهسپيرنته. ساقها ضمية تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها بيضيه أو اخلاصية النصل، صغيرة القد، فردية الفلوع. ازهارها الى الزرقه البنفسجية المواج. ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

٢٩٩٠٥ - هسپيرنته صغريه الورق

Houstonia serpyllifolia (S). *Houstonie à feuilles de serpolet* (F).
نوع من الهسپيرنته. ساقها ضمية تحيلة تملو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها كاوراق الصغر البري شكلا وقد ولوا. ازهارها زرقاء اللون، فردية التجميع. تنورها يستمر من ايار الى آب.

٢٩٩٠٦ - هسپيرنته

Hister (S).
جلس حشرات مقترنة من فصيلة الهسپيريات. انواعها عديدة، جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٥ الى ١٥ م. الوها الى السواد الاعم يملو تنقيط وتبييض اخر || يرقاها قانصة مقترنة لا تمتع من كل حشرة تستطيع اليها سيلا. اشهر انواعها :

Hister purpurascens (S). هسپيرنته احمر الغمد

Hister uncinatus (S). هسپيرنته احمر النقطة

Hister quadrimaculatus (S). هسپيرنته رباعي النقط

Hister inaequalis (S). هسپيرنته لا متساوي الفك

٢٩٩٠٧ - هسپيرنته أحمر الغمد

Hister purpurascens (S). *Hister pourpré* (F).
Hister purpurascens (E).

حشرة نائلة جاسة من فصيلة الهسپيريات ورتبة غدييات الاجنحة. تألف المراعي وجوانب الطرقات والمزارع القريبة من العمران وكل مكان يكثر فيه الروث والزبل والقمامة || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ م. ثوبا الى السواد العايق غمداه الى الحمرة الارجوانية. راسها صغير الجرم. عينها صغيرتان. زباناها صولجانيان. ظهرها سداسي التخديذ الممدي، يلحف ثلاثة ارباع البطن. ارساغها خماسية النقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الاجلانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تصاد في اوائل آب وتحت المكن في اكرام الزبل ... || اليرقة عند كمال نموها تقول نحو ١٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، اغبر اللون، كسني الرأس والشرج والرواجب، مثل الجانبيين، مهدب الفلوع.

السمة السوداء المواج. رواشن ذكورها غراء اللون، خضر الزراكش والتبايع والتجاذيع. رواشن اناثها الى السمة يملوها تبييض ابيض. يكثر وجودها من ايار الى آب. يرقاها تركيب القرطم وسائر الخيازيات.

٢٩٩٩٦ - هسپيرنته، زهرة الخبيث

Hesperantha (S). *Hespérante* (F).
Hesperantha (E).
جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السوسنيات. منبتها بعض مناطق افريقية الجنوبية. اوراقها ثنائية الصف، ضيقة النصل. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، فواحة العرف المعطري تفتتح عند غروب الشمس || انواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية :

٢٩٩٩٧ - هسپيرنته زباء

Hesperantha pilosa (S). *Hespérante velue* (F).
نوع من الهسپيرنته. ساقها شراخية ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها خلية ومزغبة. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، بيضاء اللون من الخارج والداخل || تنورها يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٩٩٨ - هسپيرنته قرفية العرف

Hesperantha cinamomea (S).
Hespérante à odeur de cannelle (F).
نوع من الهسپيرنته. ساقها شراخية ترتفع من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها جرداء مخددة السطح. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، قرفية العرف. بتلاتها الاخلاصية الى الحمرة الخمرية. بتلاتها الداخلية يضاء اللون || تنورها يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٩٩٩ - هسپيرنته منحنية

Hesperantha recurvata (S).
Hespérante recourbée (F).
نوع من الهسپيرنته. ساقها شراخية نشيطة ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مقعرة السطح، جرداء النصل. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها كبيرة القد مجننة الانابيب، حر البتلات الخارجية، بيض الداخلية || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٩٠٠ - هسپيريات

Hesperilidae (S).
Hespéridés, Hespéridés (F). *Hesperilidae, Common*

Skippers (E). *Dickkopfläuter* (D).
فصيلة حشرات من سرخشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. جميعها صغيرة القد. رؤسها غليظة. قريبا الاستعمارية دقيقة متفرجة. ارجلها الامامية تامة النمو. بطونها كبيرة. مكها قلنسوي الشكل. يرقاها عارية او مبشرة الحلب، مستدقة الاطراف، ضخمة الوسط. خادراتها تلحف بقلاف رقيق الصفحة متين الحياك شبه الشرفة تنسج بين الاوراق المتشابكة || اشهر انواعها واصرها باللاتصااد الدرامي الهسپير والتزيين والياروز واليانوف والكركرود.

٢٩٩٠١ - هسپيرنته

Funkie (F).
هي الفكنة، نبات من الزنبقيات. اطلبها.

٢٩٩٠٢ - هسپيرنته

Houstonia (S).
Houstonie (F).
جنس نباتات مقنودة التعريف على اسم العلامة هسپير



هسپيرنته



هسپير



هسپير احمر الغمد



هليوتريل

الاصفر . ثماره جزوية اللون . اغاليجه مستطيلة ، قلبية الشئانة ، ذكية الطعم ، فاقرة الصنف .

٣٠٠٠٧ - هَلِيُوتِر عَارِش

Asparagus scandens (S). *Asperge grimpante* (F). نوع من الهليون التربي السرح . ساقه متسلقة . فروعها تحيلة افقية الانتشاب متدلية . رديئاته ثلاثية التجميع ، نصلها مبسط الصفحة يطول من ٦ الى ١٣ سم . ازهاره الى الخضار العابق . ثماره حراء اللون وحيدة البزرة .

٣٠٠٠٨ - هَلِيُوتِر مَعْرُوف * ، هَلِيُوتِر يَمَع

Asparagus officinalis (S). *Asperge commune* (F). *Common asparagus*, *Sparrow-grass* (E). *Echter Spargel*, *Asparagen* (D). *Aspargo comune*, *Sparago coltivato*, *Asparago* (I).

هو الهليون البقلى المشهور . ضروريه واصرامه الزراعية عديدة جميعها مأكولة الاغاليج . اروتته قهقرية . اغاليجها غليظة . ساقها سرسة فراء تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . رديئاته حزبية التجميع تمد من ٣ الى ٦ نصلها خطي الشكل يطول من ٦ الى ١٥ سم . ازهاره خضراء اللون . ثماره الى الحمرة المابقة .

٣٠٠٠٩ - هَلِيُوتِرِيَّات ، هَلِيُوتِرِيَّات

Asparagées سبط من فصيلة الزنبقيات ، اشهر اجناسها الهليون .

٣٠٠١٠ - هَلِيُوتِرِيْن ، آسْفَرَجِيْن ، آسْبَرَجِيْن

Asparagine (F). *Asparagin* (E). مادة حيوية قابلة التبلور عادمة الريف نافية الطعم لاتذوب في الكحول ، تذوب في الماء الغالي وفي الحوامض والقلل . توجد في عصارة معظم النباتات تكثر نسبها في اغاليج الهليون . تستعمل لدر البول .

٣٠٠١١ - هَمَاشِيَّة ٥

Platypaze (S). *Platypezze* (F). *Platypeza* (E).

جنس حشرات من فصيلة الهاشيات رتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها مستضخمة . عيونها متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، تنتهي بنسيلة دقيقة . اعظامها قصيرة . ملاسها حبيبة العقلة . كواسلها شبيهة شبيهة ، مبرمة . مبرمة الحلب . بطونها بارزة الحلب ، مبرمة الحلب . رواشها كبيرة ، قسطانية التخفيف ، قوائمها نسيطة || تألف المواقع الدفلة والحراج البمجرة الانحجار . يرقاتها عاردة تعيش على الفطور .

٣٠٠١٢ - هَمَاشِيَّات ٥

Platypexidae (S). *Platypezidae* (F). *Platypezidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراعي والمروج والفايات || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها مستضخمة . عيونها متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . ملاسها وحبيبة العقلة . اعظامها قصيرة . شفاهاها السفلى لاقعة او ثاقبة ، كواسلها شبيهة مبرمة الشكل ، مبرمة الحلب الدقيق . رواشها كبيرة ، شفاقة . بطونها مردنية ، خلية القشار . قوائمها قياسية || يرقاتها مبطلة تعيش على بعض انواع الفطور وعلى المواد النباتية الجزئية الانحلال || اشهر اجناسها الماشة .



هليون معروف

اوراقها عصفية . يكثر وجودها في المناطق وفي الموائع الرطبة .

٣٠٠٠٠ - هَلِيُوتِر ٥

Héliomètre (F). *Heliometer* (E). هو الجبرام ، جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الأجرام السماوية .

٣٠٠٠١ - هَلِيُوتِر ، هَلِيُوتِر

Asparagus (S). *Asperge* (F). *Asparagus* (E). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ جميعها اشباح قهقرية ممرمة . معظمها بري وبعضها زراعي وتربي . ساقها منتصب وعارضة ومتدلية . اوراقها ردينية . ازهارها تحيلة خضراء اللون ، ثمارها عنية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٠٠٢ - هَلِيُوتِر اجْعَد

Asparagus crispus, *A. decumbens* (S). *Asperge crépue* (F). نوع من الهليون التربي . ساقه دقيقة متسلقة مترعة كثيرة التفرع المنتبسة المتدلية العادية الشكل . رديئاته ثنائية او ثلاثية التجميع ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٤ الى ٧ سم . ثماره حراء اللون مداسية البزور .

٣٠٠٠٣ - هَلِيُوتِر بَرِّي ، هَلِيُوتِر شَالِك

Asparagus acutifolius (S). *Asperge piquante*, *A. sauvage* (F). *Wild asparagus* (E). *Strauchspargel* (D). *Asparago salvatico*, *Sparagio agreste*, *Corrudo* (I). نوع من الهليون البري يكثر في المناطق الجبلية . ساقه تحيلة مستطيلة متقلبة . فروعها قليلة متبادلة . رديئاته ضمية التجميع ، حزبتها تمد من ٤ الى ١٢ نصلها جامد الصفحة ، شالك القصص ، يطول من ٥ الى ٦ سم . ازهاره عطرية الريف . ثماره سوداء اللون . اغاليجه صغيرة القدر تحيلة القدر مأكولة .

٣٠٠٠٤ - هَلِيُوتِر رِيْشِي *

Asparagus plumosus (S). *Asperge plumueuse*, *A. plumée* (F). *Asparagus fern*, *Feather asparagus* (E). *Zierspargel* (D). *Asparago filiforme*, *A. plumoso* (I). نوع من الهليون التربي الدائم الاخضرار . ساقه فراء شاككة . فروعها مبرمة الركب غزوية الشكل ، رديئاته حرشقية دقيقة شاككة تطول من ٣ الى ٦ سم . حزبتها تمد من ٦ الى ١٢ || ضروريه واصرامه عديدة جميعها تربيئية تزور في المراكن .

٣٠٠٠٥ - هَلِيُوتِر سَرَحْشِي

Asparagus filicinus (S). *Asperge fougère* (F). نوع من الهليون التربي السرح . ساقه منتصبه تملو نحو ١٠٠ سم . فروعها افقية الانتشاب والجلوس شكلها كالسرخس . رديئاته مجنحة لاقسية الطول حزبتها تمد من ٣ الى ٥ . ازهاره الى الخضار الاصفر . ثماره ودية اللون .

٣٠٠٠٦ - هَلِيُوتِر ضَمِي

Asparagus verticillatus (S). *Asperge verticillée* (F). نوع من الهليون البقلى . مهدد القفاز . اقليمه البلاد الباردة . ساقه ليلية مخشوشية تملو نحو ٣٠٠ سم . رديئاته ضمية التجميع حزبتها تمد من ٣٠ الى ٣٠ نصلها جامد الصفحة يطول من ١٢ الى ٢٥ سم . ازهاره الى الخضار

٣٠٠٢١ - هَمَدَارِيَّات ٥
Haemodoraceae (S).
Hémodoracées (F). Haemodoraceae (E).
فصيلة نباتية من وحدات اللقمة . اجناسها ٢٠، انواعها زهاء ١٠٠٠، معظمها جذموري معمر وبعضها عشوي . اوراقها باغليبتها مزدوجة الصصيف . ازهارها نظامية . اسديتها ثلاث أو ست . مذاقتها لا قياسية الارتفاع لذلك فستوى سطحها قد يكون ارفع أو اسفل من مستوى الاسدية . أشهر اجناسها الهدار .

٣٠٠٢٢ - هَمَدَكَة Folletage
Apoplexie de la vigne، هَمَدَكَة
وصم فجائي شديد الوقع مجهول الاسباب يصيب الكرمة فيقبل اوراقها ويسم سرورها في تجف في بضع ساعات .

٣٠٠٢٣ - هَمَرُوفِيلَة الْوَزَال ٥
Hemerophila abruptaria (S).
Hémérophile à ailes dentelées, Phalène des genêts (F). Hemerophila abruptaria (E).
حشرة من فصيلة اللافيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والاقليم الداخلية المتاخمة . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الوزال والزنان ... || جسمها ابيض الشكل يطول نحو ١٢ سم . بسطتها نحو ٣٨ سم . رأسها كبير الجرم . ضيقها كيرتبان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الخطي الكلف المواج || روشناها الاساميان الى الخطي الاكلف تملو سرجة معترضة سمراء وزراکش وتزاورق كستية . روشناها الخلفان الى الخطي الاشجع يملو تشيظ اسمر وسرجة كستية . تسليتها خاوي القروش اسمر الحنجر . ادهابها الى الشقصة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في اواخر آذار وتظهر فراشة الجبل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتع المكن ميحادي على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٠ مم . جسمها شبه وشي الشكل . ثوبها الى الشبهة الخطية المواج يملوها في كل سكة ابتداء من الرابعة زوج من النقط جانبية الازرناكز ، سمراء اللون . رأسها شديد السمرة . رواجبها البطنية الوسطى ماصحة بما يجعلها تقفوس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن صلجة تحبكهما السرعة في كل مكان باستثناء التربة .

٣٠٠٢٤ - هَمَق الصغير من الفباء .

٣٠٠٢٥ - هَمَق
Herbes tendres (F).
الكلام الحش اللين .

٣٠٠٢٦ - هَمَق
Boreava (S). Boréave (F).
نبات عشبي حولي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصليبيات . منته بعض اصقاع الشرق الاذن || ساقه مالة فرعاء منصبة تملو نحو ٦٠ سم . اوراقها متناقبة ، طري ، ازهارها صغيرة ، لونها الى الصفار الباهت . تنويره ديني .

٣٠٠٢٧ - هَمَقَى
Hammatolobium (S).
Hammatolobion (F).
جنس نباتات عشبية بوية معمرة من فصيلة القرنيات .

٣٠٠١٣ - هَمَاق مَرَقُوش *
Cinclosoma punctatum (S).
Cinclosome ponctué (F).

طائر من الجوارث سنيات المنساقير ينتمي الى فصيلة الشحروبديات يألف الغابات والاسراج القريبة من الحدائق والجنائن . قوته الحشرات الصغيرة والثار على اختلاف اجناسها باستثناء الموز والبرتقال || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٤ سم . ثوبه الى الطحلة يملوها مواج اشجع ورقشة سوداء . رأسه مجعد بالابيض . محسراه الى البياض الماجي . زوره الى الجؤرة . بطنه الى الغيرة المنمشة بالصبهة . ذنبه معتدل الطول ، ضيق الطرف . قائمتها رفيعة دقيقتان ، لونها الى السمرة الزرقية || يدثن عشه في الاشجار الزينة الوارفة الظل . الانثى تحضن وحدها من ٣ الى ٥ بيضات بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٣٠٠١٤ - هَمَامَلِيس
Hamamèle (F).
هو المشتركة ، اطلبها .

٣٠٠١٥ - هَمِثِيَّت ٥ ، حَجَر الدَّم ، شَادَنَج
Hématite (F). Haematite (E).
معادن حديدية اديس اللون يعرف كياويا باسم اكسيد الحديد الطبيعي . انواعه عديدة شهرها واكثرها انتشارا اليونيت . راجع حجر الدم .

٣٠٠١٦ - هَمِثِيَّت أَسْمَر ٥
Hématite brune (F).
هو اليونيت ، اطلبه .

٣٠٠١٧ - هَمَجَة
Drosophila (S). Drosophile (F).
جنس حشرات من فصيلة الحميجيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها صغيرة القد ، سوية الثوب ، شفاقة الجناح التائر الاصصاب || يرقاتها مياضاة ، نيرة ، هواكة ، نائلة ، تعيش على جمع المواد المختصرة أو السائرة نحو الاغيار والاختلال .

٣٠٠١٨ - هَمَجَة الْاَبْحَاث *
Drosophila melanogaster (S). Moucheron des caves (F). Common fruit fly, Pomace fly (E).
Taufiege, Essigfliege (D).
نوع من الحمجة . طولا نحو ٢ مم . ثوبها الى الصفرة البرتقالية . تركيب جميع انواع الثار الساقطة المطوية وتجنبد بنشاي مختلف الاختبارات الكحولية والمضوية . تمتع مكها او تلقية حيث تعيش يتقشف عن رفات دقيقة طولا نحو ٦ مم . لونها الى الغيرة || كزودها كستنية اللون ، قصيرة القد ، غليظة الشكل ، تقضي طورها البذري في نفس المحيط || وهذه الحمجة هي التي يستخدمها علماء الوراثة والورث في اجابهم الحياتية والتناسلية .

٣٠٠١٩ - هَمَجِيَّات
Drosophilidae
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ جميعها صغيرة القد بطينة الفلران تعيش على المواد النباتية المختصرة || يرقاتها نيرة هواكة ونائلة تعيش ايضا على مختلف العصارات والانتاجات النباتية .

٣٠٠٢٠ - هَمْدَار ٥
Haemodorum (S).
Hémodore (F).
جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة الهداريات . انواعه عديدة جميعها ترابية . ازهارها هامة الازرناكز . عشوية التجميع أو سنيلية ، حيلة الاشكال والالوان الزاهية .



هَمَاق مَرَقُوش



هَمَجَة الْاَبْحَاث



هَمُوفِيلَة الْوَزَال

٣٠٠٣٦ - هَمَيْتْسُ الصُّفُور

Haemanthus rupestris (S). *Haemanthe des rochers* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته ثنائية الساق القطبية الانتشاب: ساق قصيرة تحمل من ورتين إلى أربع ورتات وساق شمرخاية تحمل الأزهار. أوراقها أهليجية جميلة الأخضر. نصلها يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ١٠ سم. شراخه يملو نحو ٣٠ سم. يتوجه صيوان قفزه نحو ٨ سم. يضم من ٦٠ إلى ٧٠ زهرة قرمزية اللون، فارقة البتلات. تنوره يستمر طوال شهر أيار.



هَمَيْقِي

٣٠٠٣٧ - هَمَيْتْسُ بَهِي

Haemanthus magnificus (S). *Haemanthe magnifique* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستطيلة الشكل. أوراقها طرفية الانتشاب تركز على ساق جذعة، نصلها يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. ويعرض من ٨ إلى ١٠ سم. عروقه شععية الترتيب بارزة، ثمانية أو عشارية الأزواج. شراخه الزهري يملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. صيوانه كبير القفزه يراوح من ٢٠ إلى ٢٥ سم. أزهاره كثيفة التجميع لوها إلى البرتقالي الأرجواني الموالج. || تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.

٣٠٠٣٨ - هَمَيْتْسُ زُجْجَرِي

Haemanthus cinnabarinus (S). *Haemanthe cinabre* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقها قرصية الانتشاب، شععية العدد الذي يراوح من ٤ إلى ١٦؛ نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. شراخه الزهري يتوسط الأوراق ويملو نحو ٣٠ سم. صيوانه يد من ٣٠ إلى ٤٠ زهرة جملة اللون الأحمر الباقى الأصفر الموالج. تنوره يستمر طوال شهر نيسان.



هَمَيْقِي

٣٠٠٣٩ - هَمَيْتْسُ كَثِيرُ الزَّهَر

Haemanthus multiflorus (S). *Haemanthe multiflore* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته وحيدة الساق الشمرخاية. أوراقها ورتية، ثلاثية أو خماسية. نصلها بارز العروق السداسية أو الثمانية الأزواج، يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. شراخه الزهري يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. يكمله صيوان قفزه يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. يضم من ٧٠ إلى ١٢٠ زهرة قرمزية اللون، محجنة البتلات. || تنوره يستمر طوال شهر نيسان.

٣٠٠٤٠ - هَمَيْتْسُ لِيْندِن

Haemanthus lindenii (S). *Haemanthe de Linden* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته كالاروية. أوراقها عميقة دائمة الخضار. نصلها أهليجي الشكل، سنائي الزام الأخير، يطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ١٠ إلى ١٢ سم. شراخه الزهري يملو نحو ٤٥ سم. يتوجه صيوان قفزه نحو ٢٠ سم. يضم نحو ١٠٠ زهرة أرجوانية اللون. تنوره يستمر طوال شهر أيار.

٣٠٠٤١ - هُمُوش أَخْضَر

Chironomus tendens (S). *Chironome vert* (F).

حشرة من الهُمُوش طويلا يراوح من ٧ إلى ٨ سم. ثوباها من الخضار الأصفر الموالج. قربها الاستشعارية مركبة إلى ٤٠ عقلة عند الذكر ومن ٧ عقل عند الأنثى. إرساها الامامية مهدية مستطيلة || رقبها تلم أوراق النباتات المائية.



هُمُوش أَخْضَر

انواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض اصقاع الشرق الاسط وافريقية الشرقية والشمالية || سوقها مذبذبة مستطيلة متدلة الانشباب. أوراقها مركبة ورتية التجميع. وريقاتها صغيرة بيضية النصال المستطيلة. أزهارها ذهبية اللون و أرجوانية. تنويرها ريمي.

٣٠٠٤٨ - هَمَيْقِي *

Tiareella (S). *Tiarele* (F).
جنس نباتات جذموية معمرة من فصيلة الفلييات. انواعها المعروفة قليلة العدد. سوقها خشوشة منتصبة فراء. أوراقها مركبة، مستطيلة الاضلاع، لا قياسية التفريش والتسكين. نصلها إلى الخضار الزاهي. أزهارها عشقودية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون أو صفراء. ثمارها جراء لا متساوية المصارع. || تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار.

٣٠٠٤٩ - هَمَلِاج

Hybride (F). *Hybrid* (E).
هو الهجين النباتي. ج. هالاج.

٣٠٠٣٠ - هَمَلِجَة، رَهْوَكَة

Amble (F).
ضرب من سير الدواب.

٣٠٠٣١ - هَمَم *

Marcescence (F). *Marcescence, Withering* (E).
حالة كل زهرة أو نبات في طور الذبول أو التحاتمة.

٣٠٠٣٢ - هَمَيْتْس *

Haemanthus (S). *Haemanthe* (F).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة الزجسيات. انواعها عديدة. مهدها البلاد الحارة والاستوائية. سوقها شمرخاية تنتهي بانزهار مستديرة التجميع يرتكز على شراعين عديد المصارع. ثمارها فردية الخدر. عنبة الشكل، وسيدة البرية. || اعرف انواعها وأشهرها ما يتبع.

٣٠٠٣٣ - هَمَيْتْسُ أَبْيَض

Haemanthus albus (S). *Haemanthe blanc* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة صغيرة القد. أوراقها رباعية العدد، خمسة التركيب، صفعية الشكل؛ نصلها يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ٦ إلى ٨ سم. حثاره مهدب الخافة. شراخه الزهري يملو نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم قفزه نحو ٧ سم. أزهاره كثيفة التجميع بيضاء اللون. || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٠٣٤ - هَمَيْتْسُ أَحْمَر

Haemanthus coccineus (S). *Haemanthe ponceau* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته صغيرة القد، ثنائية الأوراق الكبيرة التي تطول من ٥٠ إلى ٦٠ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم. شراخه الزهري يملو نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم، قفزه نحو ٨ سم. أزهاره كثيفة التجميع حمراء اللون. || تنوره يستمر من آب إلى تشرين.

٣٠٠٣٥ - هَمَيْتْسُ أَرْجَوَانِي *

Haemanthus puniceus (S). *Haemanthe écarlate* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقها قرصية الانتشاب شحيتة العدد. نصلها جميل الخضار الزاهي، ضيق الصفحة، يطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. ويعرض من ٥ إلى ١٢ سم. شراخه الزهري يتوسط الأوراق ويملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. صيوانه يحمل من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة جملة اللون الأرجواني. || تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.



هُمُوش ريشي



هبة صينية



هيلية البن



هبة

٣٠٠٤٢ - هَمُوش ريشي*
Chironomus plumosus (S). Chironome duvetoux (F).
حشرة من الهموش طولها يراوح من ٩ الى ١٣ م. ثوبها اطلال اللون يقطعه خط اسود ويعترضه تجذيع اصفر. سيقانها صفراء اللون. ارضائها الامامية مهدبة مستطيلة. رقبته حراء اللون تعيش على النباتات المائية وقد تلثم اوراق بعضها.

٣٠٠٤٣ - هَمُوشِيَّات*
Chironomidae, Tendipedidae (S). Chironomides (F). Midge (E). Zuckmücken (D).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القدر قريبة الشبه من البعوض. اجسامها عادمة الخراف. قرونها الاستشعارية ريشية. رؤوسها صغيرة. اغطالها وتوابيعها قصيرة لا تمكنها من امتصاص الدم. تكثر على الاعشاب المائية وعلى المواد العضوية المختصرة قرب مجاري الماء. تعتبر من الهوام المزعجة غير الضارة.

٣٠٠٤٤ - هَمِيد
Dette non réglée (F).
كل دين لم يدفع بتاريخ استحقاقه.

٣٠٠٤٥ - هَمِيدَة صَيْفِيَّة*
Hemitea aestivaria (S). Hémichée estivale (F). Hemitea aestivaria (E).
حشرة من فصيلة الاقربيات حرشقيات الاجنحة. موطنها بعض الاسواق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والاندلس واوربة. فراشها جارية قوتها رقيق الانزاع. سرفتها تعيش على اوراق السديان. جسمها قصيف يطول نحو ١٠ م. بسطها نحو ٣٠ م. رأسها معتدل الحجم. عينها نازستان. زباناها مطشيان عند الذكر، غيطيان عند الانثى. جوفها وبطنها الى الخصار الزيتي الحطلي المواج. رواشتها عند الشقين الى الخصار الزيتي الاسمر المواج يتوسطه خط متعرج حطلي ويملوه عند الذكر تسع نقط حثارية سماء اللون، وسبع نقط حثارية عند الانثى. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في الليل. تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكن لقطعاً صغيرة مربعة على الصفحات السفلى من نصال الارواق. السركة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطوانتي الشكل، مقوس المؤخر. ثوبها الى السمرة الزيتية المواج تعلوها رشفة غراء وسبع خطوط متعرجة جذوية. رأسها الى الجوزة. رواجبها لبطنية الوسطى ماسحة مما يحملها تقفوس عسند الانتقال. طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي تحت القشور وبين قشور السحابة ضمن صلجة خاوية تحببها السركة باقلم من اربعة ايام.

٣٠٠٤٦ - هَمِيلِيَّة*
Hemileia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات. تتميز بدعماها الاقواسية التي تلبق فيها الاشكال المردنية والبرمية. مشيها يعيش ويتكاثر في السنج النباتية السطحية. هيها مجهز بمراشف خضمة. نكاتها حزنية التجميع، اسطوانية الشكل او صوانية. انواعها المعروفة ٢٣ جميعها من فطور البلاد الحارة والاستوائية. اعرفها واشهرها هيلية البن.

٣٠٠٤٧ - هَمِيلِيَّة الْبِن*
Hemileia vastatrix (S).
فطر الْبِن.

فطر مجهرية يصيب اوراق البن فيعطها ويشل عملها التضميري الواجب فيؤدي الشجرة ويهيء الى حملها وانتاجها. مظهره الخارجي يقع صغيرة مستندرة قطرها يراوح من ١ الى ١٥ م. تركيب نصال الارواق على صفحاتها السفلى. تبدو مبدرة رتقالية اللون ثم تتكاثف وتتسبح بفشاء خلي الشكل، لزج المادة، يسبب جفاف السنج ويهائس. يكافح باستعمال سائل بوردو المركز من ١ الى ٢ ٪ على ثلاث او اربع مرات ابتداء من نهاية فصل الشتاء.

٣٠٠٤٨ - هَمِين
Marcescible (F).
الحمين ما كان قابلاً للذبول.

٣٠٠٤٩ - هَمِينَة*
Haminea (S). Haminée (F). Haminea (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وفصيلة الطائيات. انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة المدد، منتشرة في معظم بحار العالم. اصداها شبه بيضيه الشوزن، شفاقة، ماسة، متساوية الالوان الوحيدة الخضاب. اجسامها فضفاضة الرداء اللامح.

٣٠٠٥٠ - هَمِينُون
Hémione (F).
هو فراء التبت، نوع من الحمر الوحشية وفصيلة الخيليات.

٣٠٠٥١ - هَمِينُولِيَّت
هي السباج الشبكي، اعطيه.

٣٠٠٥٢ - هَمَاء
Péduncle (F). Peduncle (E).
هو ملاقق الثمرة ويقال له إهان. ج. أمن.

٣٠٠٥٣ - هَمَاجِل*
Sirens (F). Sirens (E).
رتبة حيوانات قازية من صف الضفدعية. لها، حتى الآن، فصيلة واحدة تشمل ثلاثة انواع. جميعها من مستقرات الخياشيم. اجسامها مستطيلة ثنائية القوائم، رباعية الاصابع. تعيش على ضفاف المستنقعات وبجاري الماء. بلاعيطها مائية. قوتها الديدان والوديات الصغيرة.

٣٠٠٥٤ - هَتَان
Lavande spic (F).
هو الخزامى الذكورية، اعطها.

٣٠٠٥٥ - هَشِير
Anon (F).
هو الجشش ابن الاثان.

٣٠٠٥٦ - هَشِير*
Moqueur (F). Mocking-bird (E).
جنس طير كان في التصنيف الماضي ينتمي الى فصيلة الحديديات وهو في التصنيف الحديث ينتمي الى فصيلة مستقلة تدعى هيريات. انواعه المعروفة ١٢ اعطاتها المناطق الاستوائية. مظهرها افريقي وبعضها اسويي وامريكي. تتميز بطول مناقيدها المحدودة وباستطالة اذنانها الرتاجية الريش. اجنتها قصيرة تكاد لا تلمح. قاعدة الافليك. جميعها تألف الغابات والحراج. قوتها الحشرات اغصها الخنافس والارض والديدان والجراد والنمل والذغذخيات والناكبات وبعض الثآير البرية. اشهر انواعه المختبر الاحمر المتقاد.



هَبْرَ أَحْمَرُ الْمِقَار

المحب الدقيق الشالك، ترتفع من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها حافسة متعاقبة تطول من ١٠ الى ١٥ سم. تصالها سنانة، ذرية، مزينة الصفحات العليا. ازهارها بيضاء اللون مرقوشة بالبنفسجي، قطرها نحو ٣ سم. تنويرها ربيي أو غريفي.

٣٠٠٦٥ - هَبْرَ أَحْمَرُ مَرْغَبَة (S). *Tricyrtis pilosa* (S).

Tricyrtide velu (F).

نوع من الهنداء. منبتها الهند. ساقها خلية اللحاء، قليلة الفروع، ترتفع من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها حافسة متعاقبة، خلية اتصال السنانة الشكل || ازهارها الى اليباض العاجي، قطرها نحو ٢ سم. تنويرها يستمر طوال شهر ايار.



هنداء شاككة

٣٠٠٦٦ - هَبْرَ أَحْمَرُ مُسْتَطِيلَة الزُّنَيْدَة

Tricyrtis macropoda (S).

Tricyrtide à long pédicelle (F).

نوع من الهنداء. منبتها الصين. ساقها قليلة الخيل والزغب ترتفع من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متعاقبة معقبة؛ تصالها اهليجية ماسلة تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. || ازهارها مستطيلة الزنيد، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى اليباض العاجي يعلو تمسح برقالي ينصرف نيا بعد الى الاصفر || تنويرها ربيي.



هندب

٣٠٠٦٧ - هَبْرَ أَحْمَرُ *، طَرَحَقُون

Taraxacum dens leonis, *T. officinalis*, *T. vulgare*, *Leonodon taraxacum* (S). *Pissenlit officinal*, *P. commun*, *Dent-de-lion* (F). *Dandelion*, *Blow-ball*, *Canker-wort* (E). *Echte Kuhlmann*, *Löwenzahn* (D). *Tarassaco*, *Tarassaco*, *Dente di leone* (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات. ينبت في جميع الاراضي المزروعة ويعبر من النباتات الكاسحة الصارة. جذوره غليظة اسفنجية. اوراقه قرصية الانتشاب ضمية. ازهاره رؤسية التجميع. اوراقه الفتية مأكله عديدة المنافع الصحية || ضروبه الزراعية البقلة المشهورة نحو ٨. يتكاثر بالبزر. تيزر مشالته من اوائل الربيع الى اواسط الصيف. تدرس الشتول في مستقرا على ابعاد تراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم.



هندب

٣٠٠٦٨ - هَبْرَ أَحْمَرُ *، هَبْرَ أَحْمَرُ

Cichorium endivia (S). *Chicorée endive*, *Endive* (F). *Endive*, *Batavian endive* (E). *Endivie*, *Endivienwegwarte* (D). *Endivia*, *Cicoria degli orti* (I). نبات يقل من فصيلة المركبات السبئية. اصرامه عديدة تتجمع الى ضربين الهندبا الجعدة والهندبا الخسية. جذوره غليظة حزامية الشكل. اوراقه قرصية الانتشاب. ازهاره الى الزرقه السانجورنية.

٣٠٠٦٩ - هَبْرَ أَحْمَرُ بَرَّةَ *، هَبْرَ أَحْمَرُ مَرْغَبَة، شَيْكُولِيَة

Chichorium intybus (S). *Chicorée sauvage*, *Ch. amère* (F). *Succory*, *Wild chicory* (E). *Zichorienwegwarte*, *Cichorienwurz* (D). *Cicoria*, *C. amara*, *C. da toglio*, *Radichio* (I).

نوع من الهندباء وهو نبات يقل بري وزراعي. ضروبه المشهورة عديدة فوارقها الممزجة شاككة، خواصها الصحية والطبية واحدة، جميعها ناتي الدم. جذورها حزامية مستطيلة. سوقها فراءا تعلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها



هندباء برية

٣٠٠٧٠ - هَبْرَ أَحْمَرُ الْمِقَار *

Iris erythrorhynchus (S). *Moqueur à bec rouge* (F).

نوع من الهببر. موطنه اواسط افريقية. جسمه اهيف القد يطول نحو ٤٥ سم. ثوبه الى الزرقه السفماء يعلوها مواج يراوح من الازرق الى الاخضر اللامس. جناحاه وذنبه مبقعة بالابيض. عيناه عسلتان. منقاره وساقاه الى الحمرة || يالفت الثابات والاراج الكثيفة. سر به يعد من ٤ الى ١٠ ازواج. قوته الحشرات والديدان وتلثل الحنجر || يدين شته في تجاوير الاشجار. انشاء تحضن ٨ بيضات نحو ١٦ يوما.

٣٠٠٥٨ - هَبْرَ أَحْمَرُ * (S). *Mimidae* (S).

Mimidae (F). *Mimidae* (E).

فصيلة طير من لافقات النمل ورثة الجواثم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة. معظمها من طيور القصرة الامريكية وبعضها افريقي واسيوي || القسم الذي يستوطن امريكة الجنوبية ابد في مناطقه. اما القسم الذي يستوطن امريكة الشمالية فانه من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الحصيد والمشي || اشهر اجناسها الهببر.

٣٠٠٥٩ - هَبْرَ أَحْمَرُ * (S). *Siren* (F). *Siren* (E).

Siren (F). *Siren* (E).

جنس حيوانات قازية من فصيلة الهنجلديات. انواعها المعروفة ثلاثة. موطنها بعض مناطق امريكة الشمالية وكندا. تألفت ضفاف مجاري المياه العذبة. تعيش معظم حياتها في الماء || اجسامها شبه قريشة الشكل تطول من ٣٥ الى ٧٥ سم. رؤوسها قصيرة. اسفنجية. اعطائها مستعرضة الاشداق. عينها شديدة الصغر. اعانقها مجهره باطافن مجمدة وشرومة. وهي مجهره ايضا بقامتين فقط. قامتها صغرتان. اماميتا الارتكاز || قوتها الديدان والديدويات الصغيرة.

٣٠٠٦٢ - هَبْرَ أَحْمَرُ * (S). *Sirenidae* (S).

Sirenidae (F). *Sirenidae* (E).

فصيلة حيوانات قازية من ربة الهنجل. كانت، قبل التصنيف الاخير الذي يعود الى ١٩٦٥، تنتمي الى ربة السرفقيات. اما الآن فهي الفصيلة الوحيدة التابعة الى ربة الهنجل || انواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق امريكة الشمالية وكندا.

٣٠٠٦٣ - هَبْرَ أَحْمَرُ * (S). *Tricyrtis* (S).

Tricyrtide (F). *Tricyrtis* (E).

جنس نباتات جذمورية جادحة معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعها المعروفة سبعة مهددا الشرق الاقصى || سوقها غشائية مرققة. اوراقها حافسة متعاقبة سنانة التصل. ازهارها طوقية يضاء اللون او مرقوشة بالبنفسجي || تزور للزئين ولا تخشى البرد. ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج، المساوية التركيب العنصري، الغنية بالمواد الضوئية والازوت || اشهر انواعها الهنداء الشاككة والمزينة والمستطيلة الزنيد.

٣٠٠٦٤ - هَبْرَ أَحْمَرُ شاككة * (S). *Tricyrtis hirta* (S).

Tricyrtide hérissée (F).

نوع من الهنداء. مهددا اليابان. ساقها منتصبه كثيفة

Genie rural (F). **هَنْدَسَة رِبْعِيَّة** ٣٠٠٨١
Rural engineering (E).
علم يتناول التشييد الزراعي على اختلاف أنواعه من الابنية الى الاقنية .

Genie agricole (F). **هَنْدَسَة زَرْاعِيَّة** ٣٠٠٨٢
Agricultural engineering (E).
علم يتناول التربة والنبات والحيوان والاستثمار .

Géométrie plane (F). **هَنْدَسَة سَطْحِيَّة** ٣٠٠٨٣
Plane geometry (E).
علم يبيحث في السلوح ذات البعدين ويشمل دراسة خصائص الخطوط والزوايا والأشكال من مثلثات ومربعات ودوائر .

Géométrie dans l'espace (F). **هَنْدَسَة قَرَاعِيَّة** ٣٠٠٨٤
Geometry of space (E).
علم يبيحث في الاشكال ذات الابعاد الثلاثة اي الاجسام كالكرة والمكعب والمهرم .

Genie électrique (F). **هَنْدَسَة كَهْرَبَائِيَّة** ٣٠٠٨٥
Electric engineering (E).
علم يتناول انتاج طاقة الكهرباء واستثمارها .

Genie civil (F). **هَنْدَسَة مِعَارِيَّة** ٣٠٠٨٦
Engineering (E).
علم يتناول البناء باشمل مآنيه .

Genie mécanique (F). **هَنْدَسَة مِيكَانِيكِيَّة** ٣٠٠٨٧
Mechanic engineering (E).
علم يتناول الميكانيكا وما ينطق منه من آليات .

Connaissance (F). **هَنْدُس** ٣٠٠٨٨
Counolisseur (E).
الهندس من كان علمه او اختصاصه يمكنه من تحليل ومعرفة الشيء المطلوب . ج هندسة .

هَنْعَة ٣٠٠٨٩
الهنعة منزل من منازل القمر الشامية وهي مجموعة من خمسة كواكب يقال لأربعا الرز والثاني الميسان . وهي تشبه بشكلها الألف الكوفي في رقيب الهنعة يدعى النام .

Volvula (S). **هَنْيَك** ٣٠٠٩٠
Volvule (F). **هَنْيَك** (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الباغيات . انواعها المعاصرة المرفوقة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة اصدافها شبه اسطوانية الشكل ، صغرة القد ، وحيدة الالوان السوية . فوهاتنا مستطيلة الفلوج القاطية .

Paroplia scamica (S). **هَيْكَةُ المَرْجُوح** ٣٠٠٩١
Paroplie des prairies (F).
حشرة من فصيلة اليزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يطول من ٣ الى ٤ مم . || ثوبها حنطلي اللون تملوه رقشة سوداء تمتد من الرأس الى اواسط الظهران . رأسها عريض . خطمها ممتد الطول . عيناها صغيرتان . زباناها شديدة الصغر والدة . كوسلها يلحف القسم الاكبر من الرأس . سمفيتها بحمرة . ظهرانها كابل

مستطيلة مفرسة . اذهارها الى الزرقاة الزاهية || زراعها تستوجب بعض العناية اخصها الطمر بالقش او بالمواد الدبالية للحصول على اوراق عادمة الخصب .

Chicorée frisée (F). **هَنْدَبَاءُ جَعْدَة** ٣٠٠٧٠
ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة . اوراقها قرصية لينة مجمدة النصل الكثير التشرم والتسنين .

Escarole, Scarole, Scariole (F). **هَنْدَبَاءُ حَسِيَّة** ٣٠٠٧١
Endive (E).
ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة . اوراقها فائضة مستعرضة متراكبة . نصلها متجمع الصفحة ، مفرس الحمار .

٣٠٠٧٢ **هَنْدَبَاءُ زَرْعَاء** هي الطليسية ، اطلبها .

Witloof, Chicorée de Bruxelles (F). **هَنْدَبَاءُ وَتْلُوف** ٣٠٠٧٣
Witloof (E).
نوع من الهندباء الزراعية تتميز بجنودها الحمرلية الشكل والقد وباوراقها الضمية المنتصبة . راجع وتلوف .

Hendersonula (S). **هَنْدَرْسُونُولَة** ٣٠٠٧٤
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . انواعها قليلة لا مؤذية . ونباتها سمراء اللون تحضن القصاصات البكتيرية التي تخترقها فتقوب الحق . بونياتها اهليلجية الشكل ، عديدة الخلايا حنطية اللون .

Hendersonia (S). **هَنْدَرْسُونِيَّة** ٣٠٠٧٥
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . انواعها المرفوقة زهاء ٢٠٠٠ ؛ معظمها يبي علم الاذى او قليله || يكندباتها كروية الشكل او مغلطة ، محصورة الارتكاز او شارفة . جودا لحمي التسج اسمر الصفحة الخارجية . بونياتها وشعبة ، مؤثرة ، حنطية اللون || اشهر انواعها ما يتبع .

Hendersonia acicola (S). **هَنْدَرْسُونِيَّة اِبْرِيَّة** ٣٠٠٧٦
فطر مجهرى من الهندرسونية يركب اوراق الاجاص فيوشها برقشة حنطية لا نظامية الشكل والحجم والترتيب تشي الى النصل اذا لامتها العوامل الطبيعية وتسبب الاعبال الباكر .

Hendersonia picicola (S). **هَنْدَرْسُونِيَّة اِبْجَاصِيَّة** ٣٠٠٧٧
فطر مجهرى من الهندرسونية يركب اوراق الاجاص والسفرجل والتفاح فيوشها برقشة مزوانية الشكل سمرراء اللون تسبب تميم نسيج النصل والاعبال الباكر .

Hendersonia canina (S). **هَنْدَرْسُونِيَّة وَرْدِيَّة** ٣٠٠٧٨
فطر مجهرى من الهندرسونية يصيب اغصان الورد وثمار . مظهره الخارجي يقع صغرة مزوانية مبهمة سوداء اللون تملو الاغصان والتآرد دون ان تقع بها شديد الاذى .

Genie électronique (F). **هَنْدَسَة اَلْكَتْرُونِيكِيَّة** ٣٠٠٧٩
Electronic engineering (E).
علم يتناول الالكتر ونيك وتجهيزاته .

Géométrie analytique (F). **هَنْدَسَة حَلِيلِيَّة** ٣٠٠٨٠
Analytic geometry (E).
علم يبيحث في تطبيق القواعد الجبرية على الهندسة .



هَيْك

Aérobique (F).
Aérobic (E).

٣٠٠٩٨ - هَوَالِيَّة ، أَيُّوِيَّة
نمت تعريف يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء.



هَوَك

Exorhize

٣٠٠٩٩ - هَوَافِي الْجُدُر

نمت تعريف يطلق على كل نبات ينشعب جذبه في الهواء اي خارج التربة.

Aérobic (F).
Aerobe (E).

٣٠١٠٠ - هَوَالِيَّة ، أَيُّوِيَّة

صفة الكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع العيش منقطعة عن الهواء.

Pulsatile (F).

٣٠١٠١ - هَوَالِيَّة

هي شقيق النبال ، اطليه.

Rhinopithecus (S).
Rhinopithèque (F).

٣٠١٠٢ - هَوَبَر * ، طَنَج

جنس قرد من فصيلة الهباريات . انواعه قليلة العدد ، موطنها بلاد التبت . تعيش في الاسراج الجبلية التي ينمرها الثلج نحو اربعة اشهر || اجسامها متوسطة الحجم تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم. وجوهها الى الخضار الاسفر . منامها رقيقة الابنية . اذنها طويلة الشعر المزعري الشكل والقد، لونه الى الوردية الصنائية ، اكبه القاعدة اصفر الطرف يعلو موج فضي . اذنانها جللة تطول نحو ١٠٠ سم. || تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٦٠ الى ١٠٠ || قوتها الثار والاشباب والجوار والبرام والتواهي . اناها تنضج جرواً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور.



هَوَبَر

٣٠١٠٣ - هَوْتَة الارض المنخفضة .

Hutchinsia (S).

٣٠١٠٤ - هَوْتَسْتَرَا *

Hutchinsia (F). Hutchinsia (E).

نبات معقود التعريف على اسم العائلة الايرلندية السيدة هوتستر . عشية صغيرة معمرة من فصيلة الصليبيات . اعطائها تشمل بعض اقالم البحر الابيض المتوسط || ساقها فراء قصيرة ، تملو نحو ١٠ سم. اورقها متعاقبة مركبة ، وثرية العدد ، لحامية او سباعية او تساعية الورديات السنانية الصغيرة . ازهارها منعقودية التجميع . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

Hotinus (S).

٣٠١٠٥ - هَوْتِين *

Hotine (F). Hotinus (E).

جنس حشرات واشمة من نصفيات الاجنحة المشجاسة وفصيلة البراقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها تمتد من الهند الى الصين . تألف الغابات والحلائق قوتها وحرق الازهار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣٠ الى ٣٦ سم. رؤوسها صغيرة . عيونها صغيرة ناشرة . قربوها الاستشعارية دقيقة ، شديدة الصغر ، سفلية الانتساب ، مركزها تحت العين . جباهها ناتئة تمتد كالقرون المتسلسلة الشفافة . اذنها بيضاء اللون تكثر فيها السمرة الصنائية الموج . رواشها لاحقة مبقجة بالاعصر والاصفر .



هَوَجَل

Hugonia (S).

٣٠١٠٦ - هَوَجَل *

Hugone, Hugonie (F). Hugonia (E).

جنية طيبة برية معمرة من فصيلة الكنائيات . مهدا

الحنجية ، لاحف ، حنطلي اللون ، اسمر العروق . رواشها غشائيان ، شفافان . بطنها الى الحنطلي ، يسمر في الصفحة السفلى ويصفر في العليا . قوامها حنطلية سمراء || مسرحها المروج والمراعي . قوتها النسخ .

٣٠٠٩٢ - هَوَيْلُوك ، هَوُوِي *
Heniochus (S). Hénioque, Cocher (F). Whip-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكاكات الزعانف وفصيلة السحليات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجسامها مبططة ، رقيقة الظهور ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. بطنها دالقة المتضر . زعانفها الظهرية تنتهي بعرق غضروفي المادة يشبه سوط الحوذي . اذنها الى الوردية الخضراء او الوردية الفضية يعلوها تجديع معترض اسود || فوهها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٣٠٠٩٣ - هَوَاك

هو ما يستنشقه كل حي لحياته . وهو مادة غازية مركبة تغلف سطح الكرة الارضية فتكون السكاك او السحاح ، وتقل كثافتها كلما ارتفعت عن سطح البحر . ومن المسلم به ان نصف مجموع الهواء الارضي يقع في المنطقة الكائنة بين مستوى سطح البحر او مربي الموج وارتفاع ٦٠٠٠ م. اما العناصر التي يتكبد منها الهواء ونسبها فهي :
ازوت نحو ٧٨ جزءاً
اكسجين نحو ٢١ جزءاً

ثم التزير من الازوين وغاز الكربون والازون والنيون والكربتين والهليوم ، الخ . وهو يحتوي ايضاً على بخار مائي يعرف بالرطوبة النسبية .

Sylviadés (F).

٣٠٠٩٤ - هَوَاكُج

هي الدخليات ، اطلها .

Saprophage (F).

٣٠٠٩٥ - هَوَاكَة

Saprophagous (E).

الحشرات المهاوكة هي التي تعيش على المواد النباتية للمحلة .

٣٠٠٩٦ - هَوَاك *
Caloramphus fuliginosus (S).

Caloramphie fuligineux (F).

طائر من المتسلقات وفصيلة البقاقيات . موطنه بعض اصقاع الهند والبلاد المحررة . يألف الادغال والخراج البيمرة الانجرار ولا يستقر في مكان اكثر من خمس دقائق . ملجئه الحياتي جماعي ، فوره قليل العدد لا يتجاوز خمسة ازواج || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم. رأسه كبير الجرم . منقاده شبه مخروطي الشكل ، كبير الحجم ، ارتفاعه عند القاعدة يفوق عرضه . جناحاه صغيران ، ذقان . ذنبه معتدل الطول ضيق العرض ، مقطوم الطرف . ثوبه الى السمرة الساجية المتفاوتة المائج . منقاده وقامتساة الى السمرة الزرقية || صوته مزيج طنان . قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها والثار النسية البرية || يدن عشه في تخاليف الانجرار . الانثى تحضن رسدها من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر يؤين لها الغذاء .

Aérhydrique (F).

٣٠٠٩٧ - هَوَامَانِي *

نمت تعريف يطلق على ما يتنقل بالهواء والماء او يسمل بالهواء والماء .

الهند. جذورها ولحاء ساقها وفاندها مرققة وتدر البول. ساقها فروع تملو نحو ثلاثة أمتار. أثمارها فردية أو ثنائية الخواص. أوراقها متعاقبة، متعقبة، نصلها صغرة الحنجرة، الشكل، سنانية الاطراف. ازهارها عذقي التجميع، عمودي الاذنكاز وطرفي. ازهارها صغرة الحجم خاصة البتلات، وردية اللون. ثمارها صؤفكية تلحف عجمة صغرة ععدة السطح. ازهارها وجذورها عطرية العرف المحتسب الشبيه بالبفسنج.

Phaeostillibaceae

٣٠١١١ - هُوْدَانِيَا *
عارة فطور مجهرية من فصيلة الكحيبيات. تتميز بأعضائها الخواصية المباشرة اللون. تشمل عدة أنواع تنتمي إلى ثلاثة أجناس: الأزاروبسيس والسيزانوس والشلفة.

Ranella (S).

Ranella (F). Ranella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معليات الأرجل وفصيلة البسويات. أنواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة أعصها المحيط الهندي || أعضائها شبه أهليجية الشكل محاذية يعلوها جذاران جانبيين محددان أو مائلان أو شاككان يكتنفانها من طرف الفوعة إلى العقب.

Stigmatopélie (F).

٣٠١١٣ - هُوْدَكَة *
طائر من فصيلة الحاميات قريب الشبه بالترغلة. مهدد المناطق الحارة من العالم القديم يجوبها في طلب المرتع والمصيف والشتى || جسمه متوسط القد، يطول نحو ٢٧ سم. ثوبه إلى الطحلة الصنابية المقد تسمر في الرأس والظهر والجناح والذنب، وتغير في المحصر والعنق والصدر والبطن والافتيك. متفادع حنطلي اللون. رجلاه إلى السمرة || يدخن عشه في الأشجار المتوسطة الارتفاع. حضنته بيضتان. الانثى تقوم بالترنيم اما الذكر فيؤتي لها القوت.

Surnia funerea (S).

Surnie, Chouette-épervière (F).

٣٠١١٤ - هُوْدَكَة *
طائر من البويات وعماراة القاديات. ثوبه إلى البياض الكاهب يملو تسنج اسمر يطوق العين والاذن. رأسه عادم القترعة مستعرض وقصير. محصره لاطي. القورس منسره قوي البهرة. سقطه كبير القد منفرج الزاوية. ذنبه منسد الريش، مستطيل. أرساغه ومخالبه قصيرة كاسية. موطنه فسح الارعاء يشمل معظم المناطق المعتدلة. يألف أحرار الصنوبر والمزر. يسرح في النهار وفي الليل يستريح من الساعة العاشرة إلى الرابعة من بعد الظهر ومن العاشرة ليلاً إلى الثالثة بعد نصف الليل. || يدخن عشه في تجاويف الأشجار ومخالبه الصنوبر. الانثى تضع من ٤ إلى ٨ بيضات تحضنها بمنوبة الذكر. || قوته الجرذ والفأر والحشرات على اختلافها. ج. هؤ.

Monstruosité (F).

Monstrosity (E).

٣٠١١٦ - هُوْدَكَة *
الابتعاد المسهبين عن الشكل المألوف ان في الحيوان أو في النبات.

Etang naturel (F).

Natural pond, N. pool (E).

٣٠١١٧ - هُوَر *
بحيرة صغرة تفيض بها مياه غياض وأجام فتسع. ج. أهور.

Haworthia (S).

Haworthia (F). Haworthia (E).

٣٠١١٨ - هَوَزيَا *
جنس نباتات لحمية مرققة معمرة من فصيلة الزنبقيات.

Heodes phlaeas (S).

Culvré de l'oseille (F). Heodes phlaeas (E).

٣٠١١٧ - هُوْدِ البَطْبَاط *
حشرة من فصيلة القنقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها يمنة من الشرق الاوسط إلى اروبة. فراشها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرقتها تعيش على اوراق البطاطا والمبيض جسمها صغير القد يطول نحو ١١ م. بسطها نحو ٢٨ م. رأسها صغير الجرم. عينها ناشترتان. زباناها نحو صوبليان. جوشها حنطلي اللون كسنتي المراج بسطها كسنتي اللون || روشنها الامانيان إلى الصهبة المنعفة يملوها سبع نقط كسنتية وشعار خارجي من اللون نفسه. روشنها الخلفيان إلى السمرة الكسنتية الغبراء المراج يملوها قرب الطرف الخارجي جدة مذبذبة الاطراف لونها إلى الصهبة المنعفة || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. تسرح في البهار. تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتنتج الممكن ميحاديا ل نصال اوراق المائل || السرعة عند بلوغها التكال تطول نحو ١٥ م. جسمها أهليجي الشكل، المحسد الظاهر، كيف الحمل القصير. ثوبها إلى الخضراء الاسود يملو غط قاطب احمر ورسعة اطواق كسكية جزوية اللون. رأسها ارجواني اللون. مذهبها ورواجها إلى الطحلة السمره || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً.

Heodes virgaureae (S).

٣٠١١٨ - هُوْدِ الحَمَاص *
فراشة من فصيلة القنقيات. طولها نحو ٣٣ م. ذكرها اسمر الجسم غليظ الصدر مستند البطن. رواشته إلى الصفرة الحمراء المراج يطوقها حنار اسمر ويملوها تنقيط لا قياسي الحجم والبهره. أثمارها عراء الجسم غليظة الصدر والبطن رواشها إلى الصفرة الخنطية يطوقها حنار كاهب ويملوها تنقيط اسمر اسود || يألف المناقع والمراعي. يسرح من حزيران إلى آب. يرقته غصاة تركب اوراق الحمص.

Heodes chryseis (S).

٣٠١١٩ - هُوْدِ التَنَاق *
فراشة من فصيلة القنقيات. طولها نحو ٣٢ م. ذكرها أصهب الثوب يملو مواج مذهب. رواشته إلى الحمرة الصنابية يملوها تنقيط اسمر وتمشج أزرق، حنارها عابن اللون، أبيض الطرف. أثمارها عراء الجسم، حنطية الراوشن الموضحة بالأصفر والأخضر يملوها تنقيط اسود ويملوها حنار اسمر || يألف المناقع والمواقع الرطبة. يسرح من حزيران إلى تموز. يرقته تركب اوراق معظم النباتات المنعفة.

Heodes dorilis (S).

٣٠١١١٠ - هُوْدِ الوَرَّال *
فراشة من فصيلة القنقيات. جسمها مخروطي الشكل اسمر اللون يطول نحو ٣٠ م. ذكرها كسنتي الراوشن المنقطه بالاسود. أثمارها خضمة الشكل، رواشها إلى الصهبة الخضراء



هود البطاط



هود الحامص



هود التناقع



هودعة



هودلة



هودة

مهدا بعض مناطق أفريقية الجنوبية. سوقها مندسة لا أثر لها. أوارقها صغيرة الجرم، خمية النصل. أزهارها بيضاء اللون || تزرع للزيت ضمن البيوت. ترفع في الأتربة المعتدلة الانتماع، || الوافرة الخصب، الغنية بالمواد الغذائية العضوية والمعدنية || أنواعها عديدة أشهرها التالية :

٣٠١١٩ - هَوْرِيَا جَامِدَة (S). Haworthia rigida (F). Haworthie rigide (F).

نوع من الهورثيا. أوارقها مشققة، خسمية الصفوف، عمودية الارتكاز، تطول من ٧ إلى ١٢ سم. نصلها شديدة الصلابة، بحرية الخضار، يطولها موج اسمر. أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠١٢٠ - هَوْرِيَا سَوْدَاء (S). Haworthia atrovirens (S). Haworthie noire (F).

نوع من الهورثيا. أوارقها منتصبية، ضيقة النصل، عرجزية الشكل، تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. وتعرض من ٨ سم. نصلها مثالثة، منشارية الخفاف. لونها إلى الخضار الألس الشديد السمرة. أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠١٢١ - هَوْرِيَا لَوْرَجَة (S). Haworthia viscosa (S). Haworthie visqueuse (F).

نوع من الهورثيا. أوارقها مشققة، ثلاثية الصفوف النظامية الترتيب، عمودية الارتكاز، تطول من ١٠ إلى ٢٠ سم. وتعرض من ٢٠ إلى ٣٥ سم. عفتها شائكة. عصارة نصلها لزجة. أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠١٢٢ - هَوْرِيَا مُرْدَدَة (S). Haworthia fasciata (S). Haworthie zébrée (F).

نوع من الهورثيا. أوارقها مشققة أفقية الارتكاز، تطول من ٣ إلى ٤ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم. نصلها مائل الصفحة العليا، لؤلؤي الخطوط المتعرجة النظامية الشكل والترتيب، عشن الصفحة السفلى. أزهارها بيضاء اللون، تبينة الموج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠١٢٣ - هَوْرِيَا مُشَبَّكَة (S). Haworthia reticulata (S). Haworthie réticulée (F).

نوع من الهورثيا. أوارقها مشققة، أفقية الارتكاز، مقطعية الرؤوس، تطول نحو ٢٥ سم. وتعرض نحو ٧ سم. نصلها محدودة الصفحات العليا، محددة السفلى. لونها إلى الخضار الزاهي تملوه خطوط متشابكة سمراء اللون. أزهارها تبينة اللون يطولها موج اغبر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠١٢٤ - هَوْرَس (S). Rhacophorus (F). Rhacophore (E).

جنس حيوانات قازية شجرة من الصفادح وفصيلة الموريات. أنواعه المعروفة نحو ٣٠ أعطانها تمتد من الهند إلى الصين واليابان وجزيرة مدغسكر || أجسامها متباعدة القد يكثر فيها الحجم الوسط. أطوارها ثمان البيئة التي تعيش فيها. أصابع قوائمها مقيدة بحظب رعية تمتد

٣٠١٢٥ - هَوْرَسِيَّات (S). Rhacophoridae (F). Rhacophoridae (E).

فصيلة حيوانات دوداء قازية شجرة من لم الحديديات ومربية السنويات وربة البرأوات. أجسامها وأنواعها المعروفة نحو ٨٠ مهدا البلاد الآسيوية والأفريقية ومدغسكر. جميعها من الصفادح المعتدلة الحجم || أجسامها متوسطة القد. أطوارها مختلفة الألوان يكثر فيها الأخضر. تنسج بجامة البيئة التي تعيش فيها وتتميز أيضاً بمسارها سطح ضلبي قوسها الصدري في مركز قناتها، وتخلو فقرة العجز من التواءات العظمية الجانبية. فكلها العليا مسنة. أصابع قوائمها مقيدة بحظب متباعدة الرحابة والامتداد. أطراف أصابعها بمجزة بلبب محمية تمكثها من تسلق السطوح المائلة || تعيش معظم حياتها على الأشجار وتختلف النباتات || أناثها تترأ في مخاض خاصة تخلدها بمأزرة الذكور على شفاف المنافع والقدان فوق مستوى الماء ينحو ١٠ سم. ثم تخلد نفقاً ثانياً منحدراً من المخضن إلى سطح الماء. الإناث عند التفرقة تفرز أولاً مادة رغوية فوّارة تمسكها شلة الدليل المؤلفة من ٤٠ إلى ٦٠ ديلة. ويبقى الدليل ضمن هذه الرغوة التي توفن له الرطوبة حتى التفت فيزلق أذاك على سطح المنحد ويغوص في الماء.

٣٠١٢٦ - هَوْرَسَة (S). Aphomia sociella (S). Aphomie sociale (R).

فراشة من فصيلة التاريات وربة حرشيات الاجنحة. الاثني اكبر قدماً من الذكر. يسطها نحو ٣٥ سم. وبسطة الذكر ٢٦ سم. جسمها إلى البياض الخططي الموج. روثاها الامامية إلى البنية الشبها في الزاين الأولين ثم إلى الطحلة الخضراء. تمتزجها خطوط سمرة فقط سود تنامح الاعصاب. روثاها الخلفية إلى البياض الاغبر. اهداب رواشها فضية تركز على جده سوداء قليلة العرض || يرقها إلى الطحلة الصفراء تملوها ثمل سم. رأسها جويوي اللون || تعيش في عشاء بعض الحشرات من غشائيات الاجنحة وقد تدغل المنازل والمكاتب وتستودعات الورق ففرض الورق والكذب والقلين ...

٣٠١٢٧ - هَوْرَس، لَاهِر (F). Falaise (F). Cliff (E).

حدود مجداحي ملتف من ارتطام أمواج البحر. ج. هوراع ولواهر.

٣٠١٢٨ - هَوْرَن (F). Huron (F).

حيوان لاحم مفترس يدعى غرزون، اطلبه.

٣٠١٢٩ - هَوْرَسَة (S). Hura (S).

Hure, Sablier (F). Sandbox, Possumwood (E). Sandbückenbaum (D). Sablier blanca (I).

جنس اشجار برية وعرجية من فصيلة الفربيونيات. أنواعها المعروفة ٥ أعطانها البلاد الاستوائية والحارة. أوارقها منفقة متناطية نغيفة. نصلها قلبية الشكل، مدببة القصعة. ثمارها مجموعة من الفصوص الثنائية الغلغة تحضن زوراً لبها جعالي المادة الفعالة. والجار عند الغلظة بعد الادراك التام تحدث دورياً يشبه دوري الانفجار يستخرج من عصارة سوقها ومن لباب ثمارها مادة قلبية جعالية شديدة التلشط.



هورس



هورة

٣٠١٣٦ - هُوشِيرَا مُدَمِّمَةٌ

Heuchera sanguinea (S). *Heuchère sanguine* (F). *Coral bells*, *Crimson bells* (E). *Alranwurz*, *Rote Alunwurz*, *Purpurglöckchen* (D). *Eucera sanguina* (I).

نوع من الهوشيرا ، شارينغا تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اورانها مدارة خماسية او سباعية الفصوص المسنة المهدبة. نصلها مائل البشرة على صفحتيه . ازهارها عشوية التجميع ، لوها الى الحمرة الدامية || تنورها يستمر من ايار الى تموز .

Hovenia dulcis (S).

٣٠١٣٧ - هُوفِينِيَّة

Hovénie, *Hovène sucré* (F). *Japanese raisin tree*, *Ground squirrel*, *Gopher* (E). *Hovenie*, *Zieseln* (D). *Ovenia* (I).

نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة البقيات . مهدد الشرق الاقصى من اليابان الى الصين . ثمرته تملو حتى ٢٠ م. اورانها معتقة متعاقبة عابلة؛ نصلها قلبي الشكل يطول ١٦ سم. ويعرض نحو ٩ سم. صفحته مائلة البشرة ، مسنة الحافة. ازهارها عشوية التركيب ، صغيرة القند ، ريجالها وقناياتها لبانية الماددة ، حمراء اللون ، مأكولة ، سكرية المذاق، طعمها كالزبيب . ويستخرج منها ومن الاوراق عطر مرغوب فيه شائع الاستعمال || تنورها يستمر طول فصل الصيف .

Spermophilus (S).

٣٠١٣٨ - هُوقِل

Spermophile (F).
جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة السنجابيات، انواعه نحو ٦٠، منها ١٥ موطنها العالم القديم و٥٥ موطنها امريكا الوسطى والجنوبية . جميعها صغيرة القند طولا يراوح بين ٢٠ و٢٥ سم. واذنانها من ٦ الى ٨ سم. || اجسامها مستطيلة رشيقة . رؤوسها احشوية الشكل . عيونها كبيرة . اذنانها مستديرة . جمرانها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فمخنثية . اذنانها قصار جيلات الصوف . اثوابها سوية اللون رؤوسها واطراف جمرانها الى الجفوة الصنانية . ظهورها الى الريدة . بطونها الى الصفار الشبي . وفي بعض الانواع الامريكية الثوب مخططة ومنها مؤذرة . تألف الادغال والحقول المزروعة . تنسلق الانجار بحفة ، لكنها تقضي حياتها على الخفيض . ججورها حشرات فسيحة مستديرة عديدة الاتفاق تمرزها في الهواء على اعماق تراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ سم. قوتها البزور والحبوب والجنود والغار والوزغ والطير . انائها تقع من ٣ الى ٦ ادراس تبصر وتكتسب بعد اسبوع .

Semnopithèque (F).

٣٠١٣٩ - هُولَان

نوع من القرود المقدسة يدعى هبار ، اطلبه .

Sphingidae (F).

٣٠١٤٠ - هُولِيَّات

هي فصيلة الصمليات من حرشفيات الاجنحة .

Protoparce (S).

٣٠١٤١ - هُولِيَّة

Protoparce, *Sphinx d'Amérique* (F). *Horn worms*, *Horn blowers* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصمليات او الهوليات . انواعه المعروفة خمسة . جميعها فراشات كبيرة القند لا يقل طولا عن ٦ سم. وبسطةا تراوح من ١٠ الى ١٢ سم. اثوابها مخططة عابطة المواج يملوها بتجميع وتبيح اسمر . رؤوسها الامامية . والخلفية مزرققة ومزركشة بالاسمر والاحضر

Horia (S).

Horie (F). *Horia* (E).

جنس حشرات منغطة طلية من غمديات الاجنحة وفصيلة الفراشيات . انواعه المعروفة قليلة المدد منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من المالحين القديم والجديد . الجملانة منها غاشلة واثمة ، اما البرقة فقائصة وبعضها يتطفل على غشائيات الاجنحة || اجسامها كبيرة تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها كبيرة ناشزة . ملاحها الشفوية قاضية . قرونها الاستعمارية صولجانية مقوسة . كوسلها اضيق من الرأس والبطن . اغمادها بجنية الشكل . الثوبا متباعدة الاوان يكثر فيها الاحمر الحمرى والجفوي ، بعضها ملون القند بطوقين ، قاعدي وطرفي || جميعها نافطة تستعمل استمال الذراع .

Gyps des Indes (F).

٣٠١٣١ - هُوزَب

هو الغشام الهندي ، اطلبه .

Ketupa

جنس طير من البويات وحمارة البويات . انواعه المعروفة اربعة . موطنها يمتد من الصين الى الهند وبلاد فارس. جميعها كبيرة القند ، قريبة الشبه من البو . طولا يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. اثوابها الى الطحلة يملوها رقعة سوداء . تألف الدابات الظليلة القائمة على مجاري الماء . مسرحها جدوي يمتد من النسق الى الفجر . قوتها المستحب الاسماك والقشريات || تدن في تجاوب الانجار . حفنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات || اشهر انواعه هوزن جابا وهوزن سرتديب .

Heuchera (S).

٣٠١٣٢ - هُوشِيرَا

Heuchère (F). *Heuchera* (E). *Alunwurz* (D). *Eucera* (I).

نبات معقود التعريف على اسم الطبيب النساوي هوشير (١٦٧٧-١٧٤٧) وهو جنس نباتات عشوية برية ويزينة من فصيلة القليات . انواعه نحو ٤٢٠ جميعها جذسورية معمرة . اورانها جذعية الانتشاب لا قياسية الاشكال . والتفصيص . ازهارها صغيرة القند لا نظامية التجميع ، منها العشوية والنسيلية والشكلية . جميعها تركز على شاربعية منتعبة رقيقة .

٣٠١٣٤ - هُوشِيرَا امْرِيكِيَّة

Heuchera americana (S). *Heuchère d'Amérique* (F).

نوع من الهوشيرا . شارينغا تملو نحو ٥٠ سم. اورانها مدارة خاسية او سباعية الفصوص المسنة الحافة . نصلها مثل البشرة على صفحتيه . ازهارها عشوية التجميع ، صغيرة القند ، تبلى الى الخضار الباهت ثم تنحرف الى الحنطلي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٣٥ - هُوشِيرَا صَغِيرَةُ الزَّهَر

Heuchera micrantha (S). *Heuchère à petites fleurs* (F).

نوع من الهوشيرا . شارينغا تملو نحو ٦٠ سم. اورانها مدارة خاسية الفصوص المسنة . نصلها مائل البشرة على صفحتيه . ازهارها عشوية التجميع يبيض البتلات ، خضر الكؤوس ، هو المابر || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .



هوري



هوزن



هوشيرا



هوفينية



هوقل



هوليّة

٣٠١٤٩ - **هُومِيرَة الحُصَاب** (S). *Homeria collina*
Homerie des collines (F).

نوع من الهوميرة. منبتها الحُصَاب المشرفة على البحر. ساقها شراخية ترتفع من ٤٥ إلى ٦٠ سم. ورفتها وحيدة مستطيلة النصل. أزهارها تطلق الشرعاف وهي إلى الحمرة السفعاء أو الحمرة الموحشة بالبرتقالي في تنويرها صفبي.



هومية أنيقة

٣٠١٥٠ - **هُومِيرَة أَنْيَقَة** (S). *Homeria elegans*
Homerie elegante (F).

نوع من الهوميرة. ساقها شراخية ترتفع نحو ٣٠ سم. ورفتها وحيدة مستطيلة. أزهارها تطلق الشرعاف وهي إلى الصغار الكبرى تعلو رفقة زرقاء في تنويرها صفبي.

٣٠١٥١ - **هُومِيرِيَّات** (S). *Humiriaceae* (F). *Humiriaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات، رفقة المبيض. اجناسها ثلاثة وأنواعها نحو ٤٠ أعطانها البلاد الاستوائية اخصها امريكة الجنوبية || نباتاتها شجيرات ونباتات. أوراقها بسيطة، متعاقبة، عادية الزينات، جلدية النصال. أزهارها عشكولي التجميع، طرفي الارتكاز. أزهارها خنثوية، نظامية، خاسية الاجزاء. ثمارها نوية || اشهر اجناسها الهومير.

٣٠١٥٢ - **هُوَهُو، كُوكُو مَذْهَب**

Chrysococcyx auratus (S). *Chalcite doré, Coucou doré* (F). *Gilded cuckoo* (E).

طائر من القوقايات وفصيلة القيقوبيات. أصله افريقية الشرقية من البحر الاحمر إلى الموزنيك. يألف الغابات الكثيفة. يحمله الاغصان الاقنية الارتكاز في الانجبار البائقة || وهو من الضوارب التي تجوب الغابات في طلب الرزق. جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٥ سم. نوبه إلى السمرة الخنطية يملؤها مزاج اسفع في الجناحين وماجة ذهبية في ريش سائر الجسم || قوته الخشراة والاساريع اثناء كاش القوق لا تحضن البيض بل تقعه في شاش غيرها من الطير اخصها عشاش العصافير الحاضرة.



هويا

٣٠١٥٣ - **هُوَيَا** (S). *Hoya* (S).

Hoya, Hoyer, Quadrille (F). *Fleshy leaved, Wox flower plant* (E). *Fleischige Hoya, Porzellanblume* (D). *Fior di cera, Fiore della cera* (I).

جنس نباتات زربية معمرة من فصيلة الصقلابيات. جميعها جنبات مستطيلة عارشة قرواء. أوراقها متعاقبة منقطة بضيئة الشكل. نصلها جامد الصفحة، قائم الخضار. أزهارها صيواني التجميع قنوسوي الشكل ايلي الارتكاز. أزهارها صغيرة القد عاجية اللون يتوسط بتلاتها دائرة حمراء. تنويرها يستمر طوال الربيع والصيف.

٣٠١٥٤ - **هُوَيْسَة** (F). *Lophiomyx d'Inhaux* (F).

حيوان لبون قاصم يدعى لفيوم، اطليه.



مياد

٣٠١٥٥ - **هَيَاد** *، **هَيَاص** (S). *Hyas* (S).

Hyade (F). *Hyas* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات مشاريات الاجرل قصيرات الذيل المحرمات وفصيلة المماحيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية || اجسامها محرمة، معتدلة التسطيط، مثلثة الصفحة العليا، تطول من ٥ إلى ١٠ سم. ملاقطها نشطة. قوائمها

والاصفر والاخر المجزوي. || تظهر الفراشات وهي وحيدة أو ثنائية الجليل الحولي في اوائل حزيران فتتماثل ثم تمتع مكبها على أوراق التبغ وسائر نباتات الفصيلة الباذنجانية فينتفخ بعد متعته خمسة ايام ويكون ذلك عند اواخر الوتيرة الثانية من حزيران. يرقها تدعى الدودة القرنية || يرقها غفرار اللون، سمره الملب، كبيرة القد، مجعدة الجوانب، تحمل في اعل مؤخرها زائدة صفنية التركيب تشبه القرن. وهي تبلغ حجمها النهائي بعد نفقها بأربعة اسابيع فيراوح اذ ذلك طولا من ٨ إلى ٩ سم. || اغرارها كبيرة لانها تلتهم النصال من عروقها ولا تلبى الا على الاصلاح الشخينة || تكافح تغيرا أو نضجا باستعمال اخضر باديس او زرينخات الرصاص او الكربوليت او الاندريدن.

٣٠١٤٢ - **هُوم** (F). *Sous-sol* (F). *Subsol* (E).

الحوم هو بطنان الارض لا يظاله حرث او قنب.

٣٠١٤٣ - **هُومُ الجُوس**

» شجرة شبيهة بالياسمين فيها بعض الحلاوة الحدة وأجود زهرها الاخير الذي يملو صفرة ويكون حديفاً وصحيت هوم الحوس لأن عدة النار يستعملونها في عبادتهم ويسندون لها منافع عجيبة.

٣٠١٤٤ - **هُومَات** (S). *Humate*

ملح يتأتى عن الحامض الدهالي.

٣٠١٤٥ - **هُومُس** (S). *Humus*

هو الدبال، اطليه.

٣٠١٤٦ - **هُومِيَة أَنْيَقَة** * (S). *Humea elegans* (S).

Humée élégante (F).

مجلة سبروتية زربية معمرة من فصيلة المركبات. مهدها استرالية. ساقها قرواء معلو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها متعاقبة خاسنة. نصلها اهليجلي الشكل، جميل الخضار، خلى الصفحة، يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. رائحته، عند اللمس، هوموية العرف. أزهارها رؤسية التجميع، صغيرة القد، كثيرة العدد، تطول من ٥ إلى ٨ سم. لوناً يختلف مع الفرب، منها القرمزي والياقوتي والاشقر الخنطي والابيض. أزهارها هرمي الترتيب. تنويرها يستمر من حزيران إلى تشرين. تتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاثرية المعتدلة الاندماج والرطوبة.

٣٠١٤٧ - **هُومِير** (S). *Humirum* (S).

Humirie, Houmiris (F).

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الهوميريات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ مهدها امريكة الاستوائية. سوقها معتدلة التفنيد. أوراقها بسيطة، نظامية، متعاقبة، جامدة النصال. أزهارها عشكولي التجميع، طرفي الارتكاز. أزهارها بيضاء اللون أو ثنية او وردية.

٣٠١٤٨ - **هُومِيرَة** (S). *Homeria* (S).

Homerie (F). *Homeria* (E).

جنس نباتات عشبية ووفسية برية وزراعية زربية معقودة التعريف على اسم هوميرس. منبتها بعض اصقاع الشرق الاذن وافريقية الشمالية. سوقها شراخية. أوراقها فردية ضيقة النصال المستطيلة. أزهارها جملة الشكل، متساوية البتلات، ملتصقة الاسدية التي تصبح كالانبوب || وهي من فصيلة السوسنيات. انواعها قليلة العدد اشهرها التالية.



هَيْبَال



هَيْبَر الْجَزَاب



هَيْبَر الْقَرْفَل



هَيْبَر الْقَطَانِيَّات



هَيْبَر مُتَلَوِّن



هَيْبَقُون

كبيرة . اثوابها الى المغرة الصفراء المواج || تألف المواقع التي يكثر فيها الخث او الايفنج او الحيوانات الطحلبية حيث ترتب طرائدها بامشاطن || اشهر انواعه الهيايد المنكبوتي (H. arancus) .

٣٠١٥٦ - هَيْبَار (E). Ebouls (F). Fallen rocks (F). هي المواد المنهارة من حفور وغيرها .

٣٠١٥٧ - هَيْبَاط (F). Marée montante (F). Flood-tide (E). هو اندفاع مياه البحر ودونها من الشط . ويدعى المد ذلك لان العياجة عند ارتفاعها واندفاعها نحو اليابسة تنتشر وتمتد وتقرب .

٣٠١٥٨ - هَيْبَب (S). Hippa (S). Hippe (F). Hippe (E). جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الاذناب وفصيلة الهيببات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من قشريات بحار المناطق الحارة || اجسامها صغيرة القد ، محبة الظهور ، تطول من ٢ الى ٤ م . تتميز بقرونها الاستعمارية المشاربة التركيب المستطيلة المحجبة وبمعاليقها العينية المستطيلة وبارجلها القصيرة المستعرضة الاطراف التي تمكنها من الانتقال بسرعة . اثوابها تراوح بين الزرق والبركة يطولها الى السرة .

٣٠١٥٩ - هَيْبَبَال (S). Hybalus (F). Hybalus (E). جنس خنافس من غدييات الاجنحة صفحيات القرون وفصيلة الخنافس . انواعه المعروفة ١٢ اعطائها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والجزيرة العربية || اجسامها شبه بيضية الشوزن تطول من ١٠ الى ١٥ م . كواسلها وانحادها متدلة الاحديداب . رؤوسها مخروطية . متاكها ناشرة مدبية . عيونها صغيرة ماصحة . قرونها الاستعمارية مذكورة الاطراف الصفيحية . قوائمها نشيطة متكاثفة الحلب الذي يطوق ايضا الرأس والجزء الاسامي من الكوسل . اثوابها تراوح من الشفحة . السمر الى الجفوة . انحادها لاحفة ، مستديرة الاطراف || جميعها جامدة تعيش على المواد العضوية والنباتية المنحلة .

٣٠١٦٠ - هَيْبَر (S). Hypera (S). جنس حشرات من السوسيات . انواعه كثيرة العدد جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٣ الى ٧ م . اثوابها مختلفة اللون يكثر فيها الخنثي الاسمر . قرونها الاستعمارية مرفقة منفردة الزوايا || اعطائها البلاد المعتدلة الحرارة . مسرهما دجوي . اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠١٦١ - هَيْبَر الْجَزَاب (S). Hypera fasciculata (S). نوع من الهيب . طولها يراوح من ٥ الى ٧ م . ثوبه حنطي اللون تملوه مشعة رمدية وتغطى قاطب اسود . يألف الارربة الرملية . يركب جميع انواع الجزاب وبمظم النباتات الزرقية التي يقضم اوراقها || يرقاته مؤذية تنخر البزاعم وقد تسبب تلفها .

٣٠١٦٢ - هَيْبَر الْقَرْفَل (S). Hypera arator (S). نوع من الهيب . طولها يراوح من ٥ الى ٧ م . ثوبه الى

السرة الخنطية يملوها توسيع قاطب قليل السرة والدكانة . يرغب في الارربة القليلة الاندماج والرطوبة . يركب اكثر القرفليات يقضم الازراق ويؤذيها .

٣٠١٦٣ - هَيْبَر الْقَطَانِيَّات (S). Hypera nigrirostris (S). نوع من الهيب . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . ثوبه الى الخضرة الزاهية ، خطمه اسود . يرغب في المواقع القليلة الرطوبة . يركب القطانيات يقضم الازراق ويؤذيها . يرقاته تلهم البزاعم والازهار تنفض عليها .

٣٠١٦٤ - هَيْبَر مُتَلَوِّن (S). Hypera variabilis (S). نوع من الهيب . طولها نحو ٥ م . ثوبه الى الصفار الخنطي يملوه مواج اسفج . يركب اوراق البرسيم فيعملها كالغزال . يرقاته صغيرة القد فستقية اللون تعيش على البزاعم والازراق الناشئة .

٣٠١٦٥ - هَيْبَر سَيْسِيَّة (S). Hibbertia (F). Hibbertia (E). جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الدلانيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع جزر الزايج واوقيانية واورالية وتبانية || نصف نباتات شجيرات صغيرة والنصف الآخر سرعي او مستلق وعارض . اوراقها متعاقبة ، كبيرة النصال ، معنقة او حاضنة . ازهارها محورية الاوتكاز او البطية ، كبيرة القد ، خماسية البتلات المنسطة ، يسود فيها الابيض التبي المواج ، ومنها الصفراء والناارية والاريجوانية والمروقة .

٣٠١٦٦ - هَيْبَر سَيْسِيَّة (S). Hibbertia (F). Hibbertia (E). جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الدلانيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع جزر الزايج واوقيانية واورالية وتبانية || نصف نباتات شجيرات صغيرة والنصف الآخر سرعي او مستلق وعارض . اوراقها متعاقبة ، كبيرة النصال ، معنقة او حاضنة . ازهارها محورية الاوتكاز او البطية ، كبيرة القد ، خماسية البتلات المنسطة ، يسود فيها الابيض التبي المواج ، ومنها الصفراء والناارية والاريجوانية والمروقة .

٣٠١٦٧ - هَيْبَقُون ، اَفِيْقُون ، جُهَيْرَة (S). Hypocum procumbens (S). Hypocum, Hypocoon, Cumin cornu (F). Procumbent hypocum, Horned cumin (E). Pfefferkummel, Hornkummel (D). Cornacchia (I). نبات عشبي بري حولي من فصيلة الخشخاشيات . اوراقه بحرية اللون كثيرة التفريش والتشريح . ازهاره فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ، رباعية البتلات المزدوجة التركيب . محار قرون مستطيلة منجلية الشكل .

٣٠١٦٨ - هَيْبُوب (S). Hippopus (F). Hippopus (E). جنس حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم وفصيلة الجربانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض بحار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر والخليج الهندي || اصدها لامتصاص المصارع والاضلع والتخديد الطولي ، ملونة ومبجبة بالاحمر والاسفر || تعيش بمنمنمة في الرمال وفي الاسمال على اعماق تراوح من مترين الى خمسة امتار .

٣٠١٦٩ - هَيْبِيَّات (S). Hippidae (F). Hippidae (E). فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، طويلات الاذناب . اجسامها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ || اعطائها بحار البلاد الحارة . تألف المواقع الكثيرة الامات والتي لا يزيد عمقها عن ٣٠ متراً || دعاميها قريبة الشبه بدعاميصر السرطان الا ان اذنابها عادية الحمة || اعرف اجناسها الهيب .

٣٠١٧٠ - هَيْبَر (S). Hypera (S). جنس حشرات من السوسيات . انواعه كثيرة العدد جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٣ الى ٧ م . اثوابها مختلفة اللون يكثر فيها الخنثي الاسمر . قرونها الاستعمارية مرفقة منفردة الزوايا || اعطائها البلاد المعتدلة الحرارة . مسرهما دجوي . اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠١٧١ - هَيْبَر الْجَزَاب (S). Hypera fasciculata (S). نوع من الهيب . طولها يراوح من ٥ الى ٧ م . ثوبه حنطي اللون تملوه مشعة رمدية وتغطى قاطب اسود . يألف الارربة الرملية . يركب جميع انواع الجزاب وبمظم النباتات الزرقية التي يقضم اوراقها || يرقاته مؤذية تنخر البزاعم وقد تسبب تلفها .

٣٠١٧٢ - هَيْبَر الْقَرْفَل (S). Hypera arator (S). نوع من الهيب . طولها يراوح من ٥ الى ٧ م . ثوبه الى



هيبي

السرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٦ سم. جسمها اسطواني الشكل. ثوبا الى الحلقة الفراء يملؤها تمشيش اسود وعظوظ قاطبة ومترسة صفراء اللون وثعلو جانبيه مهدية. رأسها شديد السرة. تحمل في اعل عنقها زائدة صغيرة فيجأة نارية اللون تنتشر عند الانقضاء وتقوم منها رائحة حريفة مزجية. وراحتها ومدها الى السرة || طور الاكمال يستمر نحو ٢٨ اسبوعا تحضيا الحادرة متدلية برابط المشتن تقضده الحاصية.

٣٠١٧٦ - هَيْمَة Aglon (F). Eaglet (E).

هو فرخ العقاب لا يزال بحاجة ابيه واه.

٣٠١٧٧ - هَيْمَة بقلة من النجيل (اللسان).

٣٠١٧٨ - هَيْمَة Etiolement (F). Etiolation (E). اصفرار النبات وتحوله. راجع قضاة.

٣٠١٧٩ - هَيْمَة * Nycticebus tardigradus (S). Nycitébée tardigrade, Loris tardigrade (F). Kukang Loris, Slow-paced Loris (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة البومريات موطنه يمتد من الهند الى صومال. يألف الغابات والارحاج المبهمة الاشجار التي يتسلقها بحقة مدعشة. جلته الحياتي جامعي. جماعته قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٢٠ سره دجوي يستمر من لعمه الليل الى فجر العميق. قوته اوراق الاشجار وزمعاتها والرائحة البانعة والغرثات والعصافير ويضيها || يعتبر من الحيوانات الشاذة لانه يغطي معظم حياته على الاشجار. جسمه قصيف صغير يطول نحو ٣٨ سم. يتميز بالعدم الذنب. رأسه شبه مكور الشكل صغير الخطم والاذن. عيناه كبيرتان مستديرتان. اذناه صغيرتان، مستديرتان، كاسيتان. شعره جمل بالغ النوية خلي للمس. ثوبه الى الصهبة الصفراء المواج يملؤها تمشيش ادهس في الايطان يملوهو خط قاطب كسني يمتد من الحاجبين الى قة الرأس فتج الظهر فالسرم. عيناه مطوقتان بالاسود ادهس. قصبه انفه غبراء اللون. وثوبه هذا يتحور مع العمر اذ تملوه نمشة فضية تزداد مع مرور الاعوام || الانثى تتحل ينوب الذكر الا انه اهتم ماجة وهي ثنائية الثدي. يحملها يستمر نحو سبعة اشهر تقفع في تمام جروا واحدا.

٣٠١٨٠ - هَيْمَة Cumulus هو الصير، نوع من الغيوم الماطرة المتوسطة الارتفاع.

٣٠١٨١ - هيدرات Hydrate جزيء ماء استبدلت منه ذرة الهيدروجين القاعدية بذرة اخرى موجبة الكهربائية.

٣٠١٨٢ - هيدرات الكربون، مَوَاد هيدروكربونية Hydroates de carbone, Matières hydrocarbonées (F). Hydrocarbon (E).

مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين، منها الخلاصات غير الاثرية كالنشا والسكر ومنها المواد اللعنية وغيرها.

٣٠١٨٣ - هيدروبيكليات ° Hydroptilidae (S). Hydroptilidés (F). Hydroptilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملنيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد

٣٠١٧٠ - هَيْمَة Fibigia (S). Fibigie (F). Fibigia (E).

جنس نباتات نجمية او عشبية معمرة برية من فصيلة الصليبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد، جميعها من ثبوت حوض البحر الابيض المتوسط || سورها فراء. اوراقها متعاقبة، سنانية النصال. ازهارها شبه سنبل التجميع. ازهارها صغيرة صفراء اللون. ثمارها سنكية، شبه بيضبة الثوزن، مبطنلة الجرم. خلية السداة، ثنائية الزور والمقلطة المستديرة || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية:

٣٠١٧١ - هَيْمَة جُوبِيَة Fibigia clypeata (S). Fibigie à bouclier (F).

نوع من الهيمية، نعمة صغيرة. اوراقها الجلدية سنانية النصال المستطيلة، اوراقها العليا غيطية. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٢ - هَيْمَة صُورِيَة النَمَر Fibigia eriocarpa (S). Fibigie laineux (F).

نوع من الهيمية. عشبة معمرة. اوراقها الجلدية ريمية النصال المستطيلة المسنة الحمار. اوراقها العليا عصفية الشكل قصيرة. ثمارها مستطيلة الحمل الذي يبدو كالصوف تنويرها صيفي.

٣٠١٧٣ - هَيْمَة مَنَحْشِيَة Fibigia rostrata (S). Fibigie éperonné (F).

نوع من الهيمية. عشبة معمرة. اوراقها كاوراك الجلوبية. ثمارها كثيفة الحمل المتوسط الطول، تنتهي بنمخش حادة. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٤ - هَيْمَة * Zerynthia (S).

جنس حشرات فراشية من عمارة المذانيات. انواعه عديدة جميعها متوسطة القد، بسطها تراوح من ٤٦ الى ٥٢ سم. اجناسها اسطوانية الشكل، حنطية اللون. بطونها ملوثة يكثر فيها الاحمر والخطوط القاطية. رواشها الى الصفرة تملوها زركشة سوداء وتقيح احمر وارزق || تظهر في اوائل الربيع، تمتع مكثها على مختلف النباتات البرية. يقيف عن رقات خاضلة تعيش على اوراق النبات. يرقاتها اسطوانية الشكل غبراء اللون نمشة بالاسود.

٣٠١٧٥ - هَيْمَة الزَرَاوَنْد °، هَيْمَة السَّوَالِح °

Zerynthia polyxena - creusa (S). Zerynthie du littoral, Thais, Cassandre (F). Zerynthia polyxena - creusa (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات ورتبة عرشيات الاجنحة. موطنها البلاد الحارة وبعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها وراشمة قوتها مغر الانزعاج، سرتها تعيش على اوراق النباتات البرية واخصها الزراولة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٩ سم. بسطها نحو ٤٨ سم. رأسها كسني اللون. عيناه كبيرتان ناشرتان. زباناها صرغانيان. جوشها كسني اللون. بطنها الى الخنطى العاني يملوه تنقيط جانبي اصفر وعظوظ قاطبة ومترسة كسنتية || رواشها، عند الشقين الى الصفرة تملوها زراکش وتزاورق سود ويغق ونقط حر وزرق || لها جيل واحد في الحمل. تظهر الفرائشة في مطلع الربيع تسرح في النهار. تعاقل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع للمكن ميحاديها || تعصال اوراق النباتات البرية واخصها الزراولة ||



هيام



هشام الزراوند



هيج

Hydrologie (F).
Hydrology (E).

٣٠١٩٢ - هيدرولوجية

علم خصائص المياه وتوابعها .

Hydromys (S).
Hydromys (F).

٣٠١٩٣ - هيدروميس *

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات . أنواعه قليلة موطنها أستراليا . جميعها قاذية . أجسامها مسطيلة . طولها الكامل يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم . رؤوسها مدوية الشكل . زلاقيها مقنونة . أذنانها مستديرة . جرابها قصيرة ، أصابعها خاسية غشائية القاعدة || تألف شطوط البحر وغفاف الأنهر والبحيرات ، تسبح وتغطس بسهولة فائقة . قوتها المواد النباتية والاسماك الصغيرة والقشريات .

Nectria (S).

٣٠١٩٤ - هيدكة *

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات . أنواعه عديدة بعضها شديد الازدى || يوهها الخارجي اهليلجي الشكل ، صغير القد ، رمعي الارتكاز . اصنافها فخذة ، نودلية السطح ، مرجانية اللون ، ترتكز على وثنية نائقة || بوغ نكتاتها ثنائي الحياء تشطره وثيرة متعرجة الى جزئين لا متساويين العلوي اكبر من السفلي || اعرف انواعه واضرها الست التالية .

٣٠١٩٥ - هيدكة حمراء *

Nectria cinnabarina, Tubercularia vulgaris (S). Nécrose du bois (F). Coral spot (E). Rotpustelkrankheit (D).

فطر مجهرى يمتري بعض الانجبار المشمرة والحرجية اغصانها الاجاص والتبلا والبنقد والنبوت والجوز والحور والخلاف والحنان والوخوخ والدرادر والزان والزيزريق والشرم والصفيراء والصنوبر والعنبر والغيراء والقرونس والقيقب والكستة والبلابل والمران والملث والتيق والهدال الخ ... فيغطها وقد يسبب يسهها || مظهرها الخارجي بنور جوية اللون لا قياسية البعثة تركب الاغصان والافنان من الربيع الى الشتاء تنشط البشرة واللحاء وتقضي على الشكير عند انتشار البزاعم فيديو الخشب عارياً من القشور تملو كسعة سمراء || يكافح في الانجبار المشمرة مكافحة الهيدكة الحنطية .

٣٠١٩٦ - هيدكة حنطية * ، آكلة التفاح

Nectria galligena, Cylindrocarpum mali (S). Chancre du pommier, Ch. des arbres fruitiers à pépins (F). Apple canker (E). Apfelbaumkrebs, Nectriakrebs (D).

فطر مجهرى يصيب التفاح والاجاص فيسبب الوص المعروف بآكلة التفاح || مظهره الخارجي بنور مقرصة لا قياسية الشكل والحجم تركب الاغصان والافنان والثمار || يبدو على الافناد والافنان يقع جوية تركب بشرة اللحاء ، عند انتشار البرعمة ، فتجدها وتقتضي عليها وعلى ما دونها من اللحاء حتى الشكير . وقد تمتد الى البرعمة فتغطها || وهو على الثمار يقع غفينة تركبها قبل الادراك وعندها وبعدة فتغط السدق وتمجعه بعد البشرة والقشرة . يذبل الشمر ويسقط او يقصر ويبقى كالموياء . تكتنفه طيقة غروية لجزبة لا تخلو من بعض التجاويف الخملية . يكافح اولاً بقطع الاغصان المصابة ويتبهر الجروح إما بسلقات الحديد المخلول ٢٪ وإما بالمركب التالي : سلفات النحاس ١ ، كلس بايخ ٢ ، زيت كتان محروم ٢ . ثانياً باستعمال سائل بورود المخلول من ٢ الى ٣٪ او غيره من الفواطير الفعالة على ان تنفض الانجبار في الخريف

المعتدلة الحرارة || اجسامها شديدة الصفر ، سمراء اللون . بسطة اجنتها تراوح من ٦ الى ٨ م . اجنتها الامامية كثيفة الخدل مبقجة || ملجها الحيائي جماعي . افواجها كثيرة العدد . طيراتها سريع الحركة . تخلق فوق مجاري الماء من العصر الى فحة الليل || اساريمها تعيش في المياه الراكة ملحوة بمجاليب مبطلة او قنعية الشكل ، حريرية التسج || اشهر اجناسها :

Hydroptila (S).

الهيدروبتلا

Agrylea (S).

الافريلا

Oxyethira (S).

الاكسيثيرا

٣٠١٩٤ - هيدروبيسيكيات *

Hydropsychidae (S). Hydropsychidés (F).

Hydropsychidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلوديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، وبداء اللون . بسطة اجنتها تراوح من ٢٠ الى ٣٢ م . اجنتها قليلة الزاويين ، شبه شفافة ، مهدبة الحوافي الخلفية . ملابسها الفككية مسطيلة عند الشقين || اساريمها طليقة ، تعيش في المياه الجارية بين الاعشاب المائية والصخور . بعض اجناسها مقترس يصطنع شبك يحكمها بين الاعشاب فيقترب من يلقن من حويينات || اشهر اجناسها :

Hydropsyche (S).

الهيدروبيسك

٣٠١٩٥ - هيدروجين ، هيدروجين ، هيدروجين

الهيدروجين. Hydrogen (E). Hydrogène (F).

مولك الماء . غاز شديد الاحتراق عادم اللون والطعم والرائحة يوجد في الماء وفي جميع المواد العضوية . رمزه (H-يد) . وزنه الذاتي ١.٠٠٨ - راجع ايدروجين .

Hydrographe (F).

هيدروغراف

Hydrographer (E).

العالم بالياه السطحية وياصولها .

Hydrographie (F).

هيدروغرافية

Hydrography (E).

علم المياه السطحية ووصفها .

٣٠١٩٨ - هيدروبيات *

Hydrophidae (S). Hydrophidés (F).

فصيلة حيات خبيثة سامة من اماميات الاحاديد . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها تقرب الشطوط في زمن التساقط لأنها تظلم يضيها في الرمل . ومنها انواع تقسم الاغوار وتسير بعيداً في الأنهر || اعرف اجناسها واشهرها الهيدروبيس المعروف بحية الماء والقمام والبرداس والتجافة .

Hydrophis (F).

هيدروفيس

اطلب حية الماء .

Hydrocarburum (F).

هيدروكربور

Hydrocarbon (E).

الهيدروكربور تألف الكربون والكربون والهيدروجين .

Hydrocotyle (F).

هيدروكوتيل

Pennywort (E).

هي قصعة الماء ، اطليها .



هيدروبيس



هيدكة حمراء



هيدكة حنطية

اصقاع العالم . سوقها فردية تلشعب عند القمة . اوراقها جذرية الانتشاب . ازهارها رؤسية صغيرة ملونة || اعراف انواعها واشهرها ما يلي .

٣٠٢٠٤ - هيراسيوم اُرْغَب ، طَقْرَة

Hieracium pilosella (S). Piloselle, Vélutée, Orelle de rat (F). Mouse ear hawkweed, Mouse ear (E). Kleines Habichtskraut, Mausohrchen (D). Pelosella, Pelosetta (I).

نوع من الهيراسيوم البري . جذوره طيبة يقال انها تستعمل في بعض العلاجات الصدرية . ساقه مزنية تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها جذرية الانتشاب ، بيضيه الشكل ، نصلها ازغب البشرة على صفيحتيه . ازهارها فردية ، صفراء اللون . ذهبية المواج .



هيدكة سوداء



هيدكة صئوبية



هيدكة قمرية



هيدكة مرجانية



هيراسيوم



هيرادان



هيمية

٣٠٢٠٥ - هيراسيوم بُرْتَقَالِيّ

Hieracium auranticum (S). Epervière orangée (F). نوع من الهيراسيوم التّزييني . ساقه تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها جذرية الانتشاب باستثناء واحدة او اثنتين . نصلها اعليجي الشكل ذلك الزام الاخضر لونه الى الخضرة الداكنة . رؤسياته الزهرية برتقالية اللون ، عابكة المواج ، كثيرة العدد الذي يراوح من ٥ الى ١٥ || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٣٠٢٠٦ - هيراسيوم صُفْلِيّ

Hieracium villosum (S). Epervière à toison (F). نوع من الهيراسيوم التّزييني . ساقه تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها الجذرية منمقة ، سنانية الشكل ، تطول من ٧ الى ١٠ سم . وتعرض من ١ الى ٢ سم . اوراقها الجذعية لائقة ، قلبية الشكل ، صغيرة القند ، جميعها بحرية اللون يطولها مواج ازرق . نصلها مستطيل الزغب المبعثر . رؤسياتها الزهرية فردية التجميع او ثنائية ، لونها الى الصفراء الزاهي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

Falcaria (S). *Falcaire*, *Critame* (F). *Falcaria* (E). *Sicheldolde* (D). *Falcaria* (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الحبيبائيات . انواعها المعروفة اربعة ، منهاها الحقل والبراري . سوقها فراء متشببة . اوراقها كفية مستطيلة الاثنا والعشرون نصفية . ازهارها صيولي . ازهارها صغيرة القند ودية اللون او ليلية .

٣٠٢٠٨ - هيرية *

Hyria (S). *Hyrie* (F). *Hyria* (E). جنس حيوانات مائية من الرغويات صفيحيات الحياشيم وفصيلة التبادات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها انهر وميجرات امريكية الجنوبية واعضها نهر الايازون || اصداها كبيرة القند ، متساوية المصارع الاذنية ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . غشاء اصفاها من الداخل معتدل السكاكة للؤلوي المادة || تعيش في اسماك الصفاف ومنها انواع تقترب من الاغوار || لحوها مأكولة ، متوسطة الصفت .

٣٠٢٠٩ - هيس

Age (F). *Plough-beam* (E). هو السلب اي الجزء الجامع لاثار اجزاء الحشرات .

بعد الاعبال || هذا مع العلم ان التفاح او الاجاص المعرض لهذا الوسم هو الموجود في الموانع الرطبة والمغروس على اعماق تقفوق ٥٠٠ سم . وفي تربة كنوم او تربة كثرت فيها نسبة المادة الكلسية .

٣٠١٩٧ - هيدكة سَوْدَاء * ، اَكَلَة الزان

Nectria ditissima, *Cylindrocarpon willkommii*, *Fusicladium candidum* (S). Chancr du hêtre (F). فطر مجهري يصيب الزان بانفاته الفتية فيطعها . مظهره الخارجي لملع قدية الشكل سواد اللون دائرية الانتشار يراوح طولها من ١ الى ٢ سم . تصيب بشرة الانسان وتنتشر عرضاً الى ان تطوقها تنفضي على اللحماء وعلى التبادل التنسي . وقد تسبب قروصاً نائفة تملعب الخشب كما في التفاح والاجاص والحور .

٣٠١٩٨ - هيدكة صَنْوَرِيَّة * ، اَكَلَة الصَنْوَرِيَّات

Nectria cucurbitula, *Cylindrocarpon cylindroides tenue* (S). Chancr des conifères (F). فطر مجهري يركب بعض الاشجار الصئوبية اخصها الصئور والتوب || مظهره الخارجي يقع مهدية الخار لا قياسية الشكل والحجم لونها الى الحمرة الغراء . اهدائها بيض قصار لا متساوية الانتشار والكثافة ، تتعري الاثنا المجروحة وتكثر في الاغصان المقطوعة المطروسة على التربة الرطبة || اضراره زهيدة لا تستلزم المكافحة .

٣٠١٩٩ - هيدكة قِرْمِزِيَّة * ، اَكَلَة الحَوَر

Nectria coccinea, *Cylindrocarpon candidum* (S). Chancr du peuplier (F). فطر مجهري يصيب الحور فيصيب الوسم المعروف بأكلة الحور وقد يصيب القيقب والاسفندان والزان والزان والسندبان . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم ، قمرية اللون . تركب بشرة القصبان والاثنان فطعها بعد ان تقرح اللحاء والشكبر . وبض الخشب || يكافح في الحور مكافحة الهيدكة الخطيفة ومن المستحسن تخفيض التربة لتخفيف رطوبتها .

٣٠٢٠٠ - هيدكة مَرَجَانِيَّة *

Nectria ribis, *Tubercularia confluens* (S). فطر مجهري يركب الكشش والاجاص والزيتون والورداد . مظهره الخارجي بياس فبالي يحل بعض افاد الشجرة ثم يعقب ظهور بثور منتفخة لا قياسية الحجم لونها الى الوردى ثم يتحرف الى المرجاني || يكافح بقطع الاعضاء المصابة عند ظهور البياس وباستعمال الطرق المذكورة في مكافحة الهيدكة الخطيفة .

٣٠٢٠١ - هيسرول

حيوان لاسم مقترى يدهى غرزون ، اطليه .

٣٠٢٠٢ - هيراماج

هو التمتع الجمعي ، اطليه .

٣٠٢٠٣ - هيراسيوم * ، حَشِيْشَة الغُرَاب

Hieracium (S). *Epervière*, *Orelle de souris* (F). *Hawkweed*, *Hawk's eye* (E). *Habichtskraut*, *Distelkraut* (D). *Ieracio*, *Orecchio di topo* (I). جنس نباتات عشبية معمرة برية ويّزينية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة زهاء ٢٠٠ منتشرة في معظم

Choléra des poules (F). **هَيْفَةُ الطير** ٣٠٢٢٠
هي كوليرا الدجاج ، اطلها .

٣٠٢٢١ - **هَيْفَمَان *** ، **فُجُلُ الخَبِل**

Cochlearia armoracia (S). Ralfort, Grand ralfort, Ravelle, Cran des Anglais, Cranson, Radis à cheval, Moutarde des Allemands, Armoracia (F). Common horse-radish (E). Meerretich Löffelkraut, Meer-Rettig (D). Ramolaccio, Armoraccia, Erba forte, Barba forte, Rafano (I).

جنس نباتات عشبية طيبة برية معمرة من الهيفانيات وفصيلة الصليبيات . جنورها غليظة مستطيلة يضاء اللون خردلية العلم . اوراقها متعاقبة منقطة سنانية الشكل . ازهارها صغيرة القد ، يضاء اللون ، سنبلية التجميع ، هامة الارتكاز . ثمارها خريبات دقيقة مستطيلة . بزورها مستدرة سمراء اللون ، يعتمر منها زيت طيار يشبه زيت الخردل ، يذوي زيت خردل الزهوان او الخردل الالماني . وهو مضاد لداء الحفر ، يدر للصاب والبول . ويقيد الامراض العصبية المزمنة .

Raphanées (F). **هَيْفَمَانِيَّات** ٣٠٢٢٢
سبط من فصيلة الصليبيات يشمل بعض الاجناس اشهرها الهيفان والفجل .

Oryx de Nubie (F). **هَيْطَلَة** ٣٠٢٢٣
هي الارخ السوداني ، اطلها .

Molossinés (F). **هَيْعَرَات ٥** ٣٠٢٢٤
عمارة من فصيلة الرمسيات . اجناسها اربعة ، تتميز باذنانها المنفصلة عن الفشاء الجلدی || أما اجناسها الاربعة فهي : الزغاب والصفوح والغور والهيرة .

Molosse (F). Molossus (E). **هَيْعَرَة *** ٣٠٢٢٥
جنس غفافيش من عمارة الهيريات . موطنه البرازيل والاقبال . انواعه عديدة . اجسامها صغيرة القد رمية . رؤوسها غليظة . فراطيسها مستعرضة رافعة . اذانها كبيرة ، قليلة الشكل || يعيش جماعات متوسطة العدد . يسرح في اوائل الليل واواخره . قوته الحشرات . يألف تجاوب في الانحجار الحرجية والمغاور والكهوف .

Vent du Nord-Est (F). **هَيْف** ٣٠٢٢٦
North-East wind (E).
رياح مهبها بين الشمال والشرق وجهها بين الجنوب والغرب . وهي رياح حارة نكباء تهيج النبات وتؤذيها .

Hyphales (F). **هَيْفَانِيَّات ٥** ٣٠٢٢٧
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويجات . تتميز بهيئتها السطحي الارتكاز ، التدني الشكل . كائناتها تعمل كرمياتها الزوانية || فصائلها اربع : الكنتيات والكحيبيات واللصحيات واللصحيات .

Hyph (F). Hypha (E). **هَيْفَة ٥ ، غُرْل** ٣٠٢٢٨
ج . هيف . مجموعة خيوط نباتية عادمة الخضيف يتألف منها هيكل الفطر والحزاز .

٣٠٢٢٩ - **هَيْفَل ، جَرِيَع**
Forsythia (S). Forsythie (F). Golden bells (E). Glockenstrauch, Forsythie (D). Forsythia (I).

جنس جنبات برية وزيينية من فصيلة الزيتونيات . انواعه

Histogenèse. **هَيْسْتُوجِنِيَة** ٣٠٢١٠
Histogénie (F). Histogeny (E).

الهستوجنية علم يبحث في تكوين الانسجة العضوية .

Histographie (F). **هَيْسْتُوجْرَافِيَة** ٣٠٢١١
Histography (E).

الهستوجرافية وصف الانسجة العضوية .

Histon **هَيْسْتُون ، هِسْتُون** ٣٠٢١٢
عنصر فرضي يقال انه اساس المواد النووية الحليوية .

Ronceraie (F). **هَيْشَة** ٣٠٢١٣
Brake, Brambly ground (E).

هي دغل الباليق او منيته وكل ارض كثر فيها هذا النبات .

٣٠٢١٤ - **هَيْشَر** هو الحشف ، اطلها .

٣٠٢١٥ - **هَيْشَرِيَّات**
Carduacées, Carduinées, Cynarées, Cynarocéphales, Flosculeuses (F).

سبط من فصيلة المركبات ، اجناسه وانواعه كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي || اشهر اجناسه : الارضي شوكي والقرقرم والقنطريون والصفهيا والكاريين والارتقطين وربي الايل والورطة .

٣٠٢١٦ - **هَيْشَمَ هَرَمِيّ ، كُوشِيَة هَرَمِيَة ، مَكْنَسَة الحَنَة**

Kochia trichophylla (S). Kochia-cyprès (F). Mock-cyprès, Summer-cyprès (E). Sommer-Cypresse (D). Cipresso d'estate (I).

نوع من الهيشم وهو عشبة حولية تريينية هرية الشكل . ساقها فروع فناء . اوراقها مشرمة خطية لينة تبدو حيلة الخضار الاصفر الزاهي ثم تنحرف الى الصنابي وتستقر على الاحمر الى ان تلوي في اواسط الحريف .

٣٠٢١٧ - **هَيْشُور**

الهيشور والحشوم واحد . قيل « نبات رغو فيه طول على رأسه برعوصه كانه عتق الرأل » . وقال ابو حنيفة : « من العشب وله ورقة شاكه منها شوك ضخم وهو يسقم ، وزهرته صفراء وتطول ، له قصبه في وسطه حتى تكون اطول من الزبل » (اللسان) .

٣٠٢١٨ - **هَيْص ، هَيْص ، ذَلْق** Fiente (F).
Dung, Droppings (E).

هو رجيع الطير من اي جنس كان وهو من الاصدمة العضوية النشطة التي بالمادة الازوتية || يقال هاص وهاض وذلق والطار : ربي برجيته .

٣٠٢١٩ - **هَيْصُور *** Sisor

سمكة بحرية مستطيلة وحيدة الجنس والنوع من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . اعطائها المياه الهندية . تتميز بغرابة جسمها المردني الشكل الدقيق الطرف . رأسها مقطوم الخطم . تحمل في فكها عذبتان مستطيلتان ، زعانفها كبيرة القد . زعنفتها الشرجية تتهي بذيل دقيق كالناس طولها يعادل طول الجسم .



هيصور



هيفان



هيرة



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي

ساقه معتدلة الجرم ، ناشرة الطوق بيفاض اللون . نكته كالتوبيع قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار الاسفع اللامع . اطراسه الى الوردي العايق .

٣٠٢٢٦ - هَيْكَلُ عَظَمِي * Hypholoma fascicularis (S). Hypholome fasciculé (F).

نوع من الهيفلوم . يعيش على لحاء الجلود المقطوعة . ساقه رفيعة ، دقيقة ، معوجة ، صفراء اللون . نكته قلنسوية الشكل ، رهلة ، قطرها نحو ٤ سم . لونها لونه الساق . اطراسه دقيقة ، نحيلة ، زيتونية اللون . لحيتها صفراء اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٢٧ - هَيْكَلُ عَظَمِي زَنْجَارِي * Hypholoma aeruginosum (S). Hypholome vert de gris (F).

نوع من الهيفلوم . يوجد في غابات السنديان والمثلل . ساقه لزجة ، مستطيلة ، رمادية اللون ، رقيقة الطوق . نكته دقة ، مظلية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الرمادي الزنجاري المواج . اطراسه الى البني الزنجاري .

٣٠٢٢٨ - هَيْكَلُ عَظَمِي قَرْمِيدِي * Hypholoma sublateralium (S). Hypholome brique (F).

نوع من الهيفلوم . يعيش على الارياض والجلود النخرة . ساقه معوجة معتدلة الارتفاع والفلاحة ، قليلة الاستدارة ، شبه مبطلطة . نكته صوبانية الشكل ، قريبيية اللون ، قطرها نحو ٨ سم . لحيتها بيفاض اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٢٩ - هَيْكَلِيَّات * Hyphomycetes (F). Hyphomycetes (E).

فلور مجهرية فزلية ، عارية الزود ، ظاهرة الخيط الكفائية التجميع ، تترى لحاء الاشجار والجلود والورق وفيها ... فتسبب نوعاً من المغن القفار .

٣٠٢٤٠ - هَيْكَلِيَّة * ، شَجَرَةُ المَطَاطِ ، مَطَاطِ Hevea (S). Hévé, Arbre à caoutchouc (F). Caoutchouc tree (E). Kautschukbaum (D). Eves (I).

جنس اشجار حرجية وزراعية من البنوعيات السوبيات . انواعه قليلة العدد . اوراقها مستعاقية ، معتقة ، اهليجية ، مستطيلة التصل الجادة . يستخرج من سوقها بالخر عصارة لزجة مطاطة لها استعمالها الصناعي || اشهر انواعه هيفية البرازيل وهيفية النويان .

٣٠٢٤١ - هَيْكَلِيَّات ، هَيْكَلِيَّات ، هَيْكَلِيَّات الحيق والحيقم : ذكر النعام . يقال أشم من هيق وأهدى من يحمل .

٣٠٢٤٢ - هَيْكَلِيَّات * Ossature (F). Framework (E).

مجموعة الاعضاء الجادة الصلبة الرئيسية التي يرتكز عليها الجسم والتي .

٣٠٢٤٣ - هَيْكَلُ عَظَمِي Squelette (F). Skeleton (E).

مجموعة العظام التي يرتكز عليها الجسم الحيواني .

المروعة ٦ ، مهدا يمتد من البياض الى الزوية . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة عابلة . ازهارها رباعية الفسل ، خماسية البتلات المندمجة القاعدة ، ثنائية السداة ، بجلة الشكل ، ذهبية اللون ، تنور قبل انبلاج الورق .

٣٠٢٣٠ - هَيْكَلُ عَظَمِي الشُّرُوعِ Forsythia viridissima (S). Forsythie vert franc (F).

نوع من الهيفل التزييني ، جنيته تملو من مرتين الى ثلاثة اثمار . ساقه فرعاء . فروعها مجوفة السلاحيات ، منتصبه ، خضراء اللون . اوراقها معتقة سنائية الشكل ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٦ الى ١٥ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ . ازهارها الى قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، لونها الى الصفرة الباهتة || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

٣٠٢٣١ - هَيْكَلُ عَظَمِي اُرُوبِيَّةِ Forsythia europaea (S). Forsythie d'Europe (F).

نوع من الهيفل التزييني ، جنيته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه فرعاء . فروعها منتصبه صماء اللون . اوراقها معتقة قياسية الشكل ، نصلها جامد الصفحة متعاقبة التسنين يطول من ٤ الى ٨ سم ، ويعرض من ٤ الى ٦ سم . ازهارها لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، يتلاها ملتفة الاطراف ذهبية اللون || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

٣٠٢٣٢ - هَيْكَلُ عَظَمِي اَزْهَارِ Forsythia suspensa (S). Forsythie à fleurs pendantes (F).

نوع من الهيفل التزييني ، جنيته تملو من ٢ الى ٤ م . ساقه فرعاء . فروعها مجوفة السلاحيات ، نحيلة اللون ، تشبه مستقيمة منتصبه من تنطط وتندلل . اوراقها مركبة ثلاثية التصريح ، وريقاتها جامدة التصل مشاربية الحافة . ازهارها معتدلة ، لونها الى الصفار المذهب العايق . تنوره يستمر من شباط الى اذار .

٣٠٢٣٣ - هَيْكَلُ عَظَمِي * Hypholoma (S). Hypholome (F).

جنس فلور من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض غابات المناطق المعتدلة الحارة والحارة . تعيش على جذوع الاشجار واريوماتها وعلى الزبل والدبال . معظم انواعه كاعن الصنف غير مرغوب فيه . اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية :

٣٠٢٣٤ - هَيْكَلُ عَظَمِي مُعْطَف * Hypholoma depilectum (S). Hypholome pelé (F).

نوع من الهيفلوم . يوجد في حراج الصنوبر . ساقه غليظة ، مضغمة ، دقة ، تنتهي بطوق مستعرض الحاشية ، لونها الى الطعلة يملوها تشيح ازرقة . نكته كبيرة ، شبه مستديرة ، لزجة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الطعلة الصفراء . اطراسه تبدو ليلكية ثم تحمر نحو الحمرة الاربوانية .

٣٠٢٣٥ - هَيْكَلُ عَظَمِي تُونُجِي * Hypholoma coronillum (S). Hypholome petite couronne (F).

نوع من الهيفلوم . يوجد على الزبل في المواقع الرطبة .

٣٠٢٤٤ - هَيْكَلَة

Scélotographie (F).
Sceleotography (E).

الهيكلة علم يبحث في الهياكل العظمية ، من حيث التركيب والشكل ، عند الإنسان والحيوان .

٣٠٢٤٥ - هَيْل ، أَنْقُرْد ، نَقِير

Hile (F).
Hilum (E).

نفرة صغيرة في البزرة لا قياسية الشكل والموقع تكون عادة نقطة الاتصال بأغشية الثمرة .

٣٠٢٤٦ - هَيْلَانِيُوم * ، هَيْلَانِيَة

Helenium (S). Hélénie (F).

جنس نباتات عشبية سبوتية من فصيلة المركبات . أنواعه عديدة معظمها أمريكي المنبت . أوراقها متعاقبة ساذجة . أزهارها رؤسية مستعرضة للسينات المسنة . مخزئها قضيبية الشكل . بلورها خماسية الشذور المهدبة أو المسنة . اعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع .

٣٠٢٤٧ - هَيْلَانِيُوم أَمْرِيكِي

Helenium nudiflorum (S). Hélénie nudiflore (F).

نوع من الهيلانيوم المعمر . ساقه مزغبة فراء تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . أوراقه حاشنة ساذجة سنائية النصل . رؤسياته الزهرية جوية اللون عادمة للسينات || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٢٤٨ - هَيْلَانِيُوم خَرِيفِي

Helenium autumnale (S). Hélénie d'automne (F).

نوع من الهيلانيوم المعمر . ساقه سرحة فراء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . أوراقه حاشنة ساذجة سنائية النصل المسن الخار . رؤسياته الزهرية مذهبة القراص ، كبيرة السينات الثلاثية أو الخماسية التفريص || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٤٩ - هَيْلَانِيُوم تَحِيلِ الْوَرَق

Helenium tenuifolium (S). Hélénie à feuilles grêles (F).

نوع من الهيلانيوم الحولي أو الحول . ساقه فراء تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . أوراقه خيطية النصل الذي يعرض نحو ١ م . رؤسياته الزهرية عتوكلية التجميع ، صفر الاقراص ، يفض السينات الشارفة المقرفة || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٥٠ - هَيْلَسْت الصَنْوِير * ، هَيْلَسْت أَسْوَد

Hylastes ater (S).

Hylaste des pins (F).

حشرة من الكراشيات ، طولها نحو ٤ م . جسمها مستطيل الشكل اسود اللون ، تركب مع ريقاتها بطور الصنوبر فتلتهمها وتؤذيها .

٣٠٢٥١ - هَيْلَسْت النَقْل *

Hylastinus obscurus (S). Hylaste du trèfle (F).

حشرة صغيرة من الكراشيات ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م . قوتها الى السمرة الفحمة يعلوها خل الحبل . مرتعها يختلف من مرتع سائر أنواع جنسها لأنها تعيش على النباتات العشبية بدلا من الاثمار . يعي مع ريقاتها تركب النفل في جذوره فتلتهمها وتقضي عليها .



هيلانيوم



هيلست الصنوبر



هيلست النفل



هيلوت سداسي الخطوط



هيلود

٣٠٢٥٢ - هَيْلَمَة الْقَمَح *

Hylemyia coarctata (S). هي ذبابة الحنطة ، اطليها .

٣٠٢٥٣ - هَيْلَمَة الْمُخْفُوف *

Hylemyia brassicae (S). هي ذبابة المخفوف ، اطليها .

٣٠٢٥٤ - هَيْلَمَة خَاضِلَة *

Hylemyia cana (S). هي الذبابة الغبراء ، اطليها .

٣٠٢٥٥ - هَيْلَمَة رَصَاصِيَة *

Hylemyia brunescens (S). هي ذبابة الخرنفل ، اطليها .

٣٠٢٥٦ - هَيْلَمِيَّات *

Anthomyidae (S). عائلة حشرات من فصيلة الذبابيات ورتبة ذوات الجناحين . اجناسها وأنواعها عديدة جميعها ضارة تؤذي النبات . راجع ذبابيات .

٣٠٢٥٧ - هَيْلُوبَات *

Hylobate (F). هو الجبون ، اطليه .

٣٠٢٥٨ - هَيْلُوت سُدَاسِي الْخَطُوط *

Helotes sexlineatus (S). Hérote à six lignes (F).

سمكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القرشيات . اعطائها تمتد من الهند الى استراليا || جسمها شبه وشعي الشكل ، مستدل التبطيع ، يطول نحو ١٧ سم . قوتها الى الربة الزرقاء المواج ، تشتد زرقته عند الظهر وتتفلس في البطن الفضي المواج ويعلوها ستة خطوط سود قاطبة تمتد من الرأس الى الذنب . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، القسم الاول منها هرمي الشكل ، ذرب المناخس ، القسم الثاني عادم المناخس . زعنفتها الذيلية مقعرة || لحها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٣٠٢٥٩ - هَيْلُوتُرُوب *

Hylostrepe (F). هو زعنوق الاعمدة ، اطليه .

٣٠٢٦٠ - هَيْلُود *

Hylodes (S).

Hylode (F). Hylodes (E).

جنس صفادع شاجرة من فصيلة الكدمايات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها امريكية الاستوائية || اجسامها صغيرة القذ تطول من ٤ الى ٥ سم . عند الذكور ومن ٥ الى ٦ سم . عند الاناث . رؤوسها مستدلة الطول والعرض . عينها مستديرة جاحضة . فكوكها السفلى عادمة الانسان . اصابع قوائمها الامامية والخلفية عادمة الخطاب بحمزة يطباب محجمة تتحكم من تساق السلوح المائلة || تعيش كامل حياتها التي لا تقل عن عشر سنوات منتقلة من نبات الى نبات ومن شجرة الى شجرة . قوتها الحشرات والاساريع والحوام || الانثى تترأ ديلها احاديا ولا تطرحه في الماء بل في المواقع الرطبة تحت النباتات المسطحة وتحت الاوراق وبين الحجارة . صغارها عند التقف لا تخلو من القوام الدقيقة النحيلة ولكنها تتميز بوجود الذنب الذي لا يتفصم قبل مرور اربعة اسابيع .

٣٠٢٦١ - هَيْلُوفِيلَة ثَنَائِيَة الْلَوْن *

Hylophila bicolorana (S). Hylophile bicolore (F).

Hylophila bicolorana (E).

حشرة من فصيلة النسيقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة . فراشها واسعة

الجنس والنوع من فصيلة القرنيات . منبتة بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه مزغبة اللحاء ، منتصبه ، قليلة الفروع ، تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مركبة ، وثرية التجميع ، متناحية النصال . ازهاره صفراء اللون ، زنادية ، مستطيلة المالحق المزغبة || ثويروه ربيعي .

٣٠٢٦٥ - هَيْتَمِيَّات ٥
Spirillaceae
نصيلة من البكتيريات تتميز بشكلها الحزوني . خلاياها وحيدة الاتجاه عمودية الانقسام .

٣٠٢٦٦ - هَيْوَلَارِيْقُون
Millepertuis (F).
هو الداذي ، اطلبه .

٣٠٢٦٧ - هَيْوَلَارِيْقُونِيَّات
Hypéricacées (F).
فصيلة نباتية جاء وصفها في داذيات .

٣٠٢٦٨ - هَيْوَلِيَّات
Protides (F). Protid (E).
هي الاجسام التي تدغل في تركيب وذف حبيبرات الانسجة الحيوانية والخلايا النباتية . وتقسّم الهويليات الى :

هويليدات
Protéides (F). Proteid (E).
وهويلينات
Protéines (F). Protein (E).

٣٠٢٦٩ - هَيْتَة
Configuration
هي الشكل الخارجي .

قوتها رقيق الانهار . سرقها تعيش على نصل اوراق السنديان || جسمها متدل القه يطول نحو ١٥ م . بسطتها نحو ٢٢ م . رأسها يرمي الشكل ، اخضر اللون . عيناها كبيرتان . زياناها غطيات . جوشنها اخضر . بطنها الى الطحلة الغبراء المواجه || ورشناها الاماميان الى الخفصة الجميلة يطولها حنار ابيض ويملوها : غطان ابيضان . مغرضان يقسمان الصفحة الى ثلاثة اقسام شبه متساوية . ورشناها الخلفيان الى الطحلة الغبراء تعمق عند الذكر وتثبت عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٠ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مائل القشار . ثوبا الى الطحلة الخفراء المواجه . رأسها اسود . مدنها ورواجبها الى الطحلة السمره || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في الجثالة او في التربة حيث تنفخ السفة ملتصقة بجلباب من الطين .

٣٠٢٦٢ - هَيْم
Spirochétose aviaire (F).
هو زهري الطير ، اطلبه .

٣٠٢٦٣ - هَيْمَج
شجرة المدد (اللسان) .

٣٠٢٦٤ - هَيْمَنُوكَرِيْس
Hymenocarpus (S).
Hyménocarpe. (F).

ويدعى ايضاً شمردس . نبات عشبي برزي حولي وحيد



هويليلة ثنائية اللون



Dressé (F). Erect (E).

٣٠٢٧٥ - **وَالِد**

هو الشيء القائم العمودي الانتصاب ، يقال قرن وائد وساق وائدة .

Descendant (F).

٣٠٢٧٠ - **وَابِطٌ، هَابِطٌ**

هو نقيض السَّاعِد . Descendant, Descending (E).

٣٠٢٧١ - **وَابِلٌ**

هو المطر الشديد الغصم القطر ، والربيل ايضاً .

Watsonia (S). **وَانْسُونِيَّةٌ، وَطْصُونِيَّةٌ**.
Watsonie (F). Bugle lily, Watsonia (E). Watsonia (D). Watsonia (I).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم الطبيب البريطاني واتسون (١٧١٥-١٧٨٧) وهي عشية دوقسية من فصيلة السوسنيات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ مهدها افريقية الجنوبية . سوقها قرصية الانتشاب . اوراقها عصفية النصل . ازهارها جميلة الشكل متعددة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

Watt

٣٠٢٧٢ - **وَاتٌ**

وحدة مقياس قوة التيار الكهربائي .

Xylopia (S).

٣٠٢٧٣ - **وَاتٌ، جَوْزَةُ الشَّرَاكِ**

Xylopie (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القشديات . انواعها المعروفة قليلة، مهدها الحبيشة، وقد انتشرت في اكثر المناطق الافريقية . اوراقها متعاقبة معنقة كاملة ، نصلها جامد الصفحة قصير الزناد . ازهارها ابطية او محورية الانكاز عذبة التلات البيض . ثماره عنية . بزوره حريفة العلم فكهة مقوية تستعمل استعمال البهارات . اشهر انواعه وات الحبيشة .

٣٠٢٧٧ - **وَانْسُونِيَّةٌ اَرْجَوَانِيَّةٌ**

Watsonia coccinea (S). Watsonie écarlate (F).

نوع من الواتسونية البرية . شراخها الزهري يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها عصفية النصل . ازهارها سنبلية التجميع يمد من ١٠ الى ١٦ زهرة . ازهارها ناشزة القصاب المستنقة . لوئها الى الارجواني الزاهي || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٢٧٤ - **وَاتٌ الْحَبِشَةُ*، فِلْفَلُ السُّودَانِ**

Xylopia aethiopica (S). Xylopie d'Ethiopie, Poivre d'Ethiopie (F). African pepper tree (E). Athiopischer Pfefferbaum, Mohrenpfeffer (D). Pepe d'Ethiopia (I).

نوع من الوات الزراعي يكثر في الحبيشة وقد تمت زراعته معظم الاقطار الافريقية الحارة . شجرته متوسطة القد . اوراقها متعاقبة معنقة . نصلها اهليجي الشكل جامد الصفحة . ازهاره فردية التجميع ، ابطية الانكاز . ثماره عنية مستطيلة تلتف صفاً واحداً من البزور الاجانية الشكل || ثماره وبزوره من التوابل المنشطة الشائعة الاستعمال .



وات الحبيشة

٣٠٢٧٨ - **وَانْسُونِيَّةٌ قَصِيْرَةُ الْوَرَقِ**

Watsonia brevifolia (S). Watsonie à courtes feuilles (F).

نوع من الواتسونية الزينية ، شراخها الزهري يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها عصفية الشكل قصيرة النصل . ازهارها سنبلية التجميع يمد من ٨ الى ١٢ زهرة . ازهارها محبنة القصاب القمية الاطراف . لوئها الى البياض الموشع || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٢٧٩ - وَأَسْتَوِيَّةٌ كَثِيفَةُ الزَّهْرِ

Watsonia densiflora (S). *Watsonie à épi dense* (F). نوع من الواتسونية الزيبينية البريوتية. شراخها الزهري يعلم من ٦٠ إلى ٩٠ سم. أوراقها عسقية النصل تطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. وتعرض نحو ١٢ م. حناها سميكة الحاشية تبني اللون. أزهارها سنبل التجميع كثيف الترتيب يعد من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة. أزهارها محجنة القصائب المستطيلة، قصيرة البلات، لونها إلى الوردي ومنها غروب بيض || تنورها يستمر من أواسط أيار إلى أواسط حزيران.

٣٠٢٨٠ - وَأَسْتَوِيَّةٌ مِرْيَالِيَّةٌ

Watsonia meriana (S). *Watsonie mérane* (F). نوع من الواتسونية البريوتية. شراخها الزهري يعلم من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سيفية الشكل تعرض نحو ٣ م. أزهارها سنبل التجميع، بعلى الترتيب، يعد من ١٢ إلى ٢٠ زهرة. أزهارها محجنة القصائب مستطيلة البلات. لونها إلى البياض الناصع ومنها غروب وردية وموهجة || تنورها يستمر طوال شهر أيار.

٣٠٢٨١ - وَأَسْتَوِيَّةٌ مُنْتَصِبَةٌ الزَّهْرِ

Watsonia strictiflora (S). *Watsonie à fleurs dressées* (F). نوع من الواتسونية الزيبينية. شراخها الزهري يعلم من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها عسقية النصل المستدق. أزهارها سنبل التجميع يعد من ١٢ إلى ١٨ زهرة. أزهارها مستقيمة القصائب المنتصبة التي تطول نحو ٤ سم. بتلاتها معتدلة القد جراء اللون تتوسط كل منها نجمة بنفسجية اللون قرمزية الملوحة || تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٢٨٢ - وَأَسْتَوِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ

Watsonia rosea (S). *Watsonie rose* (F). نوع من الواتسونية الزيبينية البريوتية. شراخها الزهري متشعب الفروع يعلم من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقها عسقية النصل. أزهارها محجنة القصائب. قصائبها وبتلاتها متساوية في الطول، لونها إلى الوردي الزاهي || تنورها يستمر من تموز إلى أيلول.

٣٠٢٨٣ - وَأَلِينٌ

Alizé (F). *Trade-winds* (E). اسم يطلق على الرياح السائدة المنتظمة التي تهب بين دارتي الانقلاب من الشرق إلى الغرب. وهما واتان، وآن الشمال الذي يهب من الشمال الشرقي ويتهجه نحو الجنوب الغربي وواتان الجنوب الذي يهب من الجنوب الشرقي ويتهجه نحو الشمال الغربي. والواتان تستعمل أيضاً بمعنى الصفة أو التمتع.

٣٠٢٨٤ - وَأَلَجٌ *Zoophagous* (F). *Zoophagous* (F). الواجه ويدعى اللحم ما كان قوته اللحم حيواناً كان أم دويبة أم حشرة.

٣٠٢٨٥ - وَأَجِيبٌ *Débet* (F). *Debit* (E). هو ما يلزم دفعه بعد الحاجة.

٣٠٢٨٦ - وَأَجِيبُ الْأَدَاءِ *Exigible* (F). *Demandable* (E). هو ما كانت المطالبة به ممكنة.

٣٠٢٨٧ - وَأَحَاةٌ

Oasis بقعة خضراء نضرة توفر لها الماء ونصب التربة في وسط صحراء قاحلة.

٣٠٢٨٨ - وَأَحِيفٌ

جناح كثير الريش.

٣٠٢٨٩ - وَأَاحِلٌ

Limicole (F). تمت تعريفه يطلق على الديدان والحويوانات الدنيا الشاملة التي تعيش في الطمي والأوساح.

٣٠٢٩٠ - وَأَرْثٌ

Héritier, Holr (F). *Heir* (E). هو أحد اقرباء الميت الذين يحق لهم شرعاً أخذ نصيب معين من تركته.

٣٠٢٩١ - وَأَوْشٌ

Hétérotrophe (F). *Heterotroph* (E). هو كل نبات يعيش طفلياً على المواد الغذائية التي يحرمها ويغفلها النبات الشاح.

٣٠٢٩٢ - وَأَرْفٌ

Verdoyant (F). *Verdant* (E). ورف النبات: نضر وأهزر فهو أرف أي ملتح أو ناضر.

٣٠٢٩٣ - وَأَرْقٌ

Frondicole (F). الوارق ما كانت حياته مستمدة من الورقة أو أنه يعيش عليها.

٣٠٢٩٤ - وَأَزْعٌ

Chien de berger (F). *Shepherd's dog* (E). الوازع هو كلب الراعي لانه يزغ الوحش عن النعم.

٣٠٢٩٥ - وَأَشَعٌ، وَأَشَعَةٌ

هي الجارسة، الحشرة التي تعيش على الأزهار.

٣٠٢٩٦ - وَأَشَعٌ

Anthophage (F). *Anthophagus* (E). من يعيش على الأزهار ومنها، راجع جابس.

٣٠٢٩٧ - وَأَشَلٌ

Cryptandre (F). تمت تعريفه يطلق على كل ذكر من الحيوان طلاس الشقي.

٣٠٢٩٨ - وَأَشْنُورِيَّةٌ

Wachendorfia (S). *Wachendorfia* (F). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الهمديريات. أنواعها المعروفة أربعة. مهدها منطقة رأس الرجاء الصالح في اطراف افريقية الجنوبية || جميعها تزيبينية. أوراقها لاطة، كبيرة، مستطيلة النصال الحادة المدبة الأطراف. شاربها الزهرية تنتهي بمجموعات من الأزهار سنبلية التركيب. أزهارها سداسية البتلات، مستحبة العرف الخالفت، حيلة الألوان الزاهية.

٣٠٢٩٩ - وَأَشْنُورِيَّةٌ

Washingtonia, *Pritchardia* (S). *Washingtonie*, *Pritchardie* (F). جنس اشجار زيبينية من فصيلة النخلات معقودة التعريف على اسم واشنطن رئيس الولايات المتحدة || أنواعها



واشنورية



واشنورية

٣٠٣٠٧ - وَاقِ الشَّجَرِ* ، غُرَابِ اللَّيْلِ

Nycticorax nycticorax (S). Bihoreau, Héron bihoreau (F). Night heron (E).

طائر من البشونيات ، جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٦ سم. ثوبه متباين الألوان ، أسود الرأس والرقبة ، أخضر الظهر ، أخضر العنق والذنب . يجعل على رأسه بعض الريش الدقيق الطويل الشبيه بالبيض .

٣٠٣٠٨ - وَاقِ صَغِير* ، مِلْبَحَّة

Ixobrychus minutus (S). Blongios nain (F). Little bittern (E).

طائر من البشونيات ، جسمه صغير القد يطول نحو ٣٧ سم. ثوبه متراكب الألوان ، ظهره اسمر يلعب بالأخضر ، بطنه الى الصهبة ، باطن جناحه ابيض ، منقاره اصفر الجسم اسمر المشمش . ساقه الى الخضار البحري .

٣٠٣٠٩ - وَاقِعَةٌ

Événement (F).

الواقعة هي الحادث ، اطلبه .

٣٠٣١٠ - وَاقِل

Balaena japonica (S).

Baleine du Japon (F). Whale of the Japan (E). نوع من البال ، موطنه شمال المحيط الهادي وقد شوهد قرب كاليفورنيا وجزر ألوشيا . جسمه كبير القد ، رمي كاليفورني وجزر ألوشيا . يقيم مع اقترابه من ثوبه فني اللون ، الشكل ، يطول من ١٤ الى ١٨ م . ثوبه فني اللون ، رصاصي الموج ، يقيم مع اقترابه من ثوبه الفهر ويغير عند البطن . انشاء تضع جرواً واحداً ترضعه نحو الحول .

٣٠٣١١ - وَاقِيَّة

Talles (F). Suckers (E).

الواقية هي فراخ الزرع الناتجة من الاشطاء ، راجع شطه واشطاء .

٣٠٣١٢ - وَالْبَرِيَّانُ أَخْرَ

Valériane rouge (F).

هو الوشمة الحمراء ، اطلها .

٣٠٣١٣ - وَاقِم

Serre (F).

هو المصري ، اطلبه .

٣٠٣١٤ - وَاقِلَك

الواكك والواكك : نعت تمريني يطلق على كل طائر حاضن .

٣٠٣١٥ - وَاقِيف

Verdoyant (F). Verdant (E).

النباتات الواقفة المهترئة من كثرة الأوراق الخضراء .

٣٠٣١٦ - وَاهِنَاتُ الشَّاقِيرِ

Lévirostrés (F).

Levirostrate (E). مرتبة من الطيور الجواثم التي تتميز بضعف منقارها الكبيرة . فصائلها واجناسها عديدة . اشتهر فصائلها الخضاريات والشرقيات والاركوبيات .

٣٠٣١٧ - وَاقِي

Chacal (F).

هو ابن آوى ، اطلبه .

٣٠٣١٨ - وَبَاءٌ ، مَوْتَان

Epidémie, Epiphytie, Epizootie (F). Epidemic, Epizooty (E).

كل مرض شبيه العدوى سريع الانتشار يصيب الانسان او الحيوان او النبات وينتقل من مكان الى مكان ومن

المعرفة حمة جميعها اسطوانية السوق الليغية المائلة المنتصبة . اوراقها مروحية الشكل جميلة الخضار القستي ، كرتها مستطيل العمود دقيق شائك ، شوكة صندب القد محجن . ازهارها متكوي التجميع ، كبير القد ، كثير التشعب . ازهارها خشوية التركيب . ثمارها ثنوية جامدة اللب الماد القالدة . زهورها خشوية صلبة لا تصلح لثي || مهدها كاليفورني وجزر ألوشيا والهادي . اشتهر انواعها ، والاشطونية القوية والاشطونية الليغانية .

٣٠٣٠٠ - وَاشْطُنِيَّةٌ قَوِيَّةٌ

Washingtonia robusta (S). Washingtonie robuste (F).

نوع من والاشطونية . جذعها عمودي الانتصاب ، غليظ القاعدة ، مستند الطرف ، يطول من ٦ الى ١٠ أمتار . اوراقها ذرية مروحية قطرها نحو ٢٠٠ سم. لونها الى الخضار القستي الالسن الموج . كرتها شديدة الخضار يطول نحو ١٠٠ سم. شوكة اصفر اللون صغير القد شديدة التحجيج || مهدها شواطئ نهر سكرمنتو في كاليفورنيا . تعيش ويجود اينما زرع بشرط ان لا تنخفض الحرارة عن ست درجات ستيفراد وان يؤمن لها الري الوافي عند الحاجة .

٣٠٣٠١ - وَاشْطُنِيَّةٌ لَيْفَانِيَّةٌ

Washingtonia filifera, Pritchardia filifera (S). Washingtonie filamenteuse (F).

نوع من والاشطونية . جذعها اسطوانى مستقيم يرتفع من ٤ الى ٦ أمتار . اوراقها ذرية مروحية قطرها نحو ١٥٠ سم. لونها الى الخضار القستي الزاهي بعلما خيوط ليفية شقراء اللون تشبه الشعر . كرتها دقيق متين شائك طوله نحو المتر || مهدها كاليفورني ، تتحمل الحرارة المنخفضة حتى الست درجات ولا تحتمل العطش . تعيش في جميع الارضية لكنها تفضل الحارة حيث تجود وتنمو بسرعة .

٣٠٣٠٢ - وَاقِسَم

Pathogène (F). Pathogen (E).

كل ممرض او كائن حي يسبب مرضاً ما .

٣٠٣٠٣ - وَاقِدَةٌ

Grippe (F). Influenza (E).

هي الانفلونزا ، مرض معد يصيب الحيوان ولا سيما الخيل .

٣٠٣٠٤ - وَاقِي

Préventif (F). Preventive (E).

٣٠٣٠٥ - وَاقِي*

Botaurus stellaris (S).

Butor étoilé (F). Bittern, Common bittern (E).

طائر من فصيلة البشونيات ، طويل العنق والمنقار والرجلين والاطراف ، قصير الزنكي ، اصفر الزنكي المرقش المشوش . يحب العزلة فيختفي في النهار بين الامل ويكثر الصباح في الليل . قال الشاعر مرقش السدوسي :

ولقد عدت لكنت لا اعدو على واق وسام
فاذا الاشام كالآيا من واليا بين كالآسام
وكذاك لا خير ولا شر على احد بدائم

٣٠٣٠٦ - وَاقِ أَبْيَضُ ، سَيْبَةِ

Ardeola rallioides (S). Héron crabier (F).

Boatbill (E).

طائر من البشونيات ، صغير القد طوله نحو ٤٢ سم. ثوبه الى البياض الاخير يحمل على رأسه طرة من الريش المستطيل الدقيق الابيض والاسود . منقاره الى الزرق ، اسود المشمش والقاعدة .



واق



واق الشجر



واق صغير

٣٠٣٣١ - وَبِيلَةٌ ٥ Calonectria (S).

جنس فطور مجهرية من النساخيات وفصيلة الشوفيات .
أعضائها خضنة ، محبة السطح ، مرجانية اللون ، تتركز
على ونبية ناتئة . تكاثفها صفية الشكل . وبؤها عديد
الخلايا المؤثرة بالانقسام المتوازي || أنواعها المؤذية قليلة
أعرفها وبلة الزرع .

٣٠٣٣٢ - وَبِيلَةُ الزَّرْعِ ٥

Calonectria graminicola, C. nivalis, Fusarium nivale, F. miniutulum, F. loliae (S). Moisissure nivale des céréales, Fusariose des céréales (F). Snow mould of cereals (E). Schneeschimmel (D).

فطر مجهرى يركب الزرع وأعضائه السليل والخططة والشوفان
وبعض التجيليات البرية || مظهره الخارجي يكون على
شكلين : الأول عندما يصيب الزرع في أبان خبه فيبدو
ككتلة من القطن المنفوش تلحف نواحي الزرع وعصفه
كالخلقة || والشكل الثاني عندما يصيب الزرع بعد خبه
فيبدو أن ذلك لطحاً خلية لا قياسية الشكل والحجم ، لونها
الى الغبرة تملو الصفص واللأحاد والسلايات || أضراره
منوطة برطوبة التربة والعوامل الجوية الملائمة || يكافح
بتطهير البذار بواسطة أحد الفوطير الناجمة منها املاح
الذئبق .

٣٠٣٣٣ - وَبِيرَةٌ ٥ Phacelia (S).

Phacelia (F). Phacelia (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « حزة » . جنس نباتات
عشبية ، حولية أو محولة من فصيلة البطيبيات . أنواعها
المعروفة عديدة منتهية المناطق الحارة من العالمين القديم
والجديد || بعض أنواعها الحولية مرعوية تزرع للإبقار
والأغنام . سوقها خلية السحاء ، فرعاء . أوراقها متعاقبة ،
وريشية . أزهارها سنبل التجميع . أزهارها رחاقية يجبرها
النمل وهي زرقاء اللون أو بنفسجية أو ليلية أو بيضاء ||
أشهر أنواعها التالية .

٣٠٣٣٤ - وَبِيرَةٌ جُرُوسِيَّةٌ ٥

Phacelia campanularia (S). Phacélie campanulée (F).
نوع من الويرة التريينية . عشية حولية تملو من ١٥ الى
٣٠ سم . أوراقها اهليلجية الشكل مفرسة ويسنن . أزهارها
بيضاء اللون . توجعها متعرة جريسية الشكل ، لونها الى
الزرقه المائقة يعلوها عند قواعدها خمس نقط سود ||
تنويرها يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٣٣٥ - وَبِيرَةٌ لَبْدَةٌ ٥ Phacelia congesta (S).

Phacélie dense (F).
نوع من الويرة التريينية . عشية حولية تملو من ٣٠ الى
٥٠ سم . ساقها وفروعها مزينة بالحاء . أوراقها ثلاثية
او خماسية أو سباعية التشرم القدي . أزهارها كبيرة القد
قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الزرقه الجليمة . توجعها خلية
البشرة ، فصلها سنانية الشكل . اسديتها قليلة النشور ||
تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٣٣٦ - وَبِيرَةٌ لَرَجَةٌ ٥ Phacelia viscosa (S).

Phacélie visqueuse (F).
نوع من الويرة . عشية حولية تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
أوراقها شبه قلبية الشكل ، تطول نحو ٦ سم . نصلها
لزنية ، مسننة الحنار . أزهارها معتدلة الحجم ، قطرها
نحو ٣ سم . لونها الى الزرقه تتوسطها بقعة أرجوانية ||
تنويرها يستمر من تموز الى آب .

منطقة جغرافية الى اخرى . وهو بذلك يتنبر عن الامراض
المعدية التي لا تقتل من منطقة جغرافية الى اخرى .

٣٠٣٣٩ - وَبَاءٌ مُؤْصِيٌّ ٥ Enzootie (F). Enzooty (E).

هو الوباء المحدود الانتشار الذي لا يتجاوز المزرعة او
المنطقة الجغرافية .

٣٠٣٣٠ - وَبَاءَةٌ ٥ Epidémiologie (F). Epidemiology (E).

الوباءة علم يبحث في ماعية الامراض الوبائية وفي اسبابها .

٣٠٣٣١ - وَبَاتٌ ٥ Adaptation

من وبات بالمكان : اقام . الوبات هو الالاب الموقف
الناجم .

٣٠٣٣٢ - وَبَاكٌ ٥ Tridax (S). Tridace (F).

مجلسة عشبية حولية برية من فصيلة المركبات . ساقها
حزمية الفروع تملو نحو ٩٠ سم . أوراقها متقابلة مثلبة
الفصوص المدببة الشائكة . أزهارها كثيف التجميع .
رويساتها الزهرية صفراء اللون ، شائكة السينات المثلبة
الحسك . بزورها ريشية التهديب . تنويرها يستمر طوال
شهر حزيران .

٣٠٣٣٣ - وَبَاتٌ ٥ Rabougrissement (F).

Stunteding (E).
هي حالة كل حيوان أو نبات شذ مجتمته وقلة نموه عن
معدل نوعه || أما الحيوان أو النبات الذي يشذ يصغر
جسمه عن معدل نوعه فهو ازعب وهي زعباء .

٣٠٣٣٤ - وَبَدٌ ٥ Disproportion

الويد هو النقص الجسوري العائب ، ج . أوباد .

٣٠٣٣٥ - وَبَرٌ ٥

هو الزلم ، حيوان من الدمانيات ، اطلبه .

٣٠٣٣٦ - وَبَرٌ ٥ Poil, Duvet (F). Hair, Down (E).

الوبر هو لدابل واللامه والألارب ونحوها كالصوف للتم .
وهو إحدى خامات النسيج المشهورة يستخدم في صنع
للمسوجات المختلفة وسبور آخرركات التي تتعرض للرطوبة .

٣٠٣٣٧ - وَبَرَكَةٌ ٥ Cathcartia villosa (S).

Cathcartie velue (F).

نبات عشبي حولي بري وترييني من فصيلة الخشخشيات .
ساقها فرعاء كثيفة الزغب المستطيل تملو نحو ٣٠ سم .
أوراقها بيضيه الشكل مستعرضة . نصلها خشن الصفحة ،
خلى البشرة ، مهدب الاطراف . زغبها وأهدابها جذوية
اللون . أزهارها تاجية فردية كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم .
لونها الى الصفراء الكبريتي الزاهي || تنويرها يستمر
طوال شهر حزيران .

٣٠٣٣٨ - وَبَرِيٌّ ، زَغْبِيٌّ ٥ Tomenteux (F).

Tomenteous, Downy (E).

نعت تعريفي يطلق على اجزاء النبات والحيوان المغلفة
وبر قصير نام .

٣٠٣٣٩ - وَبَسٌ ٥

وبس الجرو : فتح عليه .

٣٠٣٣٠ - وَبَلَةٌ ٥ Rut, Chaleurs (F). Rut, Heat (E).

طلب الفسان أو بالآخرى التناج للسفاد .

مفتول، اما اذا انبسط فيدعى الصفاق كما في عضلات الظهر. أما وظيفته فهي التوسط بين اطراف العظام والمضلات او بين العضلات نفسها.

٣٠٣٤٧ - **وَتْر** (Impair (F), Odd, Uneven (E).
الوتر ما لم يتشقق من العدد.

٣٠٣٤٨ - **وَتْر التماس** (Corde de contact (F).

٣٠٣٤٩ - **وَتْر الزاوية القائصة** (Hypoténuse (F).
Hypotenuse (E).

٣٠٣٥٠ - **وَتْرِيَة ، فَرْدِيَة** (Imparité (F).
Imparity (E).
كون الشيء غساً او فرداً .

٣٠٣٥١ - **وَتْرِيَة التركيب** (Imparipennée (F).
نمت وصفي يطلق على الاوراق المركبة المنتهية بورقة فردية واحدة .

٣٠٣٥٢ - **وَتْر** (Waltzia (S), Waltzie (F).
جنس نباتات حولية برية وتربيتين من فصيلة المركبات .
انواعه المعروفة نحو ١٢ شكلها شكل السرق . سويها
فراء . اوراقها متعاقبة جامدة التصل . ازهارها رؤسية .
يزورها مجهرة بانتداد متقادي الشكل || اعرف انواعه
واشهرها ما يلي .

٣٠٣٥٣ - **وَتْرَة بَيْضَاء** (Waltzia nivea (S).
Waltzie blanche (F).

نوع من الوتر ، عشبته تعلو نحو ٥٠ سم . رؤسياتها
الزهريّة كثيرة العدد . ازهارها الى الصغار الكبريتي ،
قناياتها مدببة الاطراف ، بيضاء اللون || تنورها يستمر
طوال فصل الصيف .

٣٠٣٥٤ - **وَتْرَة عَشْكَلِيَة** (Waltzia corymbosa (S).
Waltzie en corymbe (F).
نوع من الوتر ، عشبته تعلو نحو ٦٠ سم . ازهارها عشكولي
التجميع ، لبد الترتيب . رؤسياتها الزهرية كثيرة العدد .
ازهارها وريدة اللون قناياتها مستطيلة لسة بيضاء اللون .
تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٣٥٥ - **وَتْرَة مَهْدَبَة** (Waltzia aurea (S).
Waltzie dorée (F).

نوع من الوتر ، عشبته تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم .
ازهارها عشكولي التجميع ، وهل الترتيب المتتابع . رؤسياتها
الزهريّة كبيرة القليلة العدد . ازهارها وقناياتها ذهبية
اللون || تنورها يستمر من آب الى ايلول .

٣٠٣٥٦ - **وَتْلُوف *** (Cichorium intybus (S).
Witloof, Chicorée à grosse racine (F). Witloof (E).
نوع من المهندباء الزراعية الخضرية . وهي بقلة مأكولة
الجذر والاوراق تكثر زراعتها في البلاد الاروروبية .
ترغب في الاثربة الخوارة المتوسطة الانتعاج الفنية بالمواد
المعضوية . زراعتها تتطلب بعض العناية اخصها طمر
الاوراق عند ازدياد الاربعة الاولى منها || أما الوتلولف
فهو يحوي ما قدره :

| | |
|---------------------|---------|
| من الماء | ٩٣,٠٠ % |
| من المواد الازوتية | ١,٢٢ % |
| من المواد الدهنية | ٠,٤٧ % |
| من المواد المستخلصة | ٥,٣١ % |

٣٠٣٢٧ - **وَيْبَرَة مُهْدَبَة** (Phacelia purshii (S).
Phacélie frangée (F).

نوع من الويبرة . عشبته حولية تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم .
اوراقها السفلى مفتحة تطول نحو ١٠ سم . وتنقسم الى ١٥
سكفة . اوراقها الدليا لاطئة ، خاسية السك . ازهارها
صغيرة القند قطرها نحو ١٥ سم . لونها يراوح بين الازرق
والبيكلي . فلق توجعها مهدة الاطراف || تنورها يستمر
من ايار الى حزيران .

٣٠٣٢٨ - **وَيْبَلَة ، وَيْبَل** (Fagot (F), Faggot (E).
حزمة الخطب الدقيق العيدان .

٣٠٣٢٩ - **وَت** (Cri du palombe (F).
الوت والوت : صياح الورشان .

٣٠٣٤٠ - **وَتَح ، كَبْنُود** (Capnodium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرتحيات . انواعه عديدة ،
منتشرة في معظم اقطار العالم ، تركب الحفصيات والزيوت
والصفصاف والسنديان الخ... اعسانها مكورة ترتكز على
اهن دقيقة تنشب في وثبات المشج . ابرواغها الزقية مؤنورة
التركيب ثنائية الشكل سمراء اللون || وهو ركب لحاء
السوق والاضغان وبشرة الاثنان ولا يعترى الاوراق .
منظهره الخارجي وشاح كالسقام لا قياسي الكثافة والسك ،
لزوج للملس ، اسمر اللون .

٣٠٣٤١ - **وَتَح المَهْلِيُون *** (Zopfia rhizophila (S).
فطر مجهرية وهي من الرتحيات ركب جذور المهلين
والسندر فيؤذيها وقد يقضي عليها . اعسانه سود كروية
الشكل . رقه يضي مدبب الرأس والمقب ، مشدود الوسط
يخشن ٨ ابرواغ ثنائية البويغات المائلة .


٣٠٣٤٢ - **وَتَحِيَّات *** (Capnodiaceae, Perisporiaceae (S).
Périssporiacées, Capnodi-
cées (F). Perisporiaceae, Capnodiaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى رتبة الرتحيات . اناقتها
محصونة متراكبة منفصلة سمراء اللون . بويغها يتحدر عند
فنج الاثعان ، من مرق رأسي لا نظامي الانشقاق
وهو كثير العدد اسطواني الشكل او يبيضي ، غيراته
لا قياسه العدد || اجناسها وانواعها كثيرة اما التي
تركب النبات وتطفل عليه فقليلة ، اشهرها التوح والعثان .

٣٠٣٤٣ - **وَتَد** (Pilot (F), Pile, Stake (E).
عمود من خشب متوسط الغلاظة والطول يستعمل للفرز في
المنافع .

٣٠٣٤٤ - **وَتَدَة** (Tragus
هنة مثلفة الزوايا مركزها عند فوغة صياح الاذن .

٣٠٣٤٥ - **وَتَر** (Corde (F), Chord (E).
جسم خيطي مرن يستعمل في بعض الآلات الموسيقية
المعروفة بالآلات الوترية . تصنع الاوتار عادة من امعاء
بعض الحيوانات ومن اسلاك معدنية . ويجب ان يكون
الوتر منسوب الغداء والكثافة في كامل طوله .

٣٠٣٤٦ - **وَتَر** (Tendon (F), Tendon, Sinew (E).
الوتر ضفيرة من الالياف تتكون من الحبيرات العضلية
التي لم تتحول نهائياً الى نسج عضلي . وهو عادة مستدير



وتح المهلين



وتلوف



وتنجي



وتنجي



وتنجي

٣٠٣٧١ - وتنجي * Ampullacera (S).

Ampullacère (F). Ampullacera (E).
جنس حيوانات بحرية من الزحويات معديات الارجل .
انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من عطر زيلندا الجديدة ||
تألف الخلدجان حيث تكثر التوتير البحرية التي تعيش
عليها || اصداؤها شبه اجاصية الشوزن ، شمانية الحجوم ،
كبيرة القفوة ، ملونة ، يكثر فيها الجفوي والكسني
الثاني الموج || جعلها مأكول ، مرغوب فيه .

٣٠٣٧٢ - وتنجي Structure الوتر هو البنية ، راجعها .

٣٠٣٧٣ - وتنجي Sélectionner (F). To improve (E). وتنجي وتنجي وتنجي : أصله ويمكن فيه مباداة الاستنخاب .

٣٠٣٧٤ - وتنجي Parenchyme (F). Parenchyma (E). وتنجي هي نسيج الاعتناء والخضيب في نصل الورقة من كل نبات .

٣٠٣٧٥ - وتنجي وكيم المكثتر لحماً من المواشي .

٣٠٣٧٦ - وتنجي * غلطارية Gauthéria (S). Gauthérie (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الخلدجان . انواعه عديدة ،
مهدا بلاد الشرق وامريكا . معظمها جنات صغيرة القند
مثنوية . اوراقها متعاقبة ، بيضيه ، عروية . ازهارها كروية
الشكل . ثمارها لحمية ، مأكولة ، حبة القالب والتركيب ،
خاصية الخدور || اشهر انواعه ما يتبع .

٣٠٣٧٧ - وتنجي شكلون Gauthéria shallon (S). Gauthéria shallon (F).

نوع من الوتر وهو جنبة منصبة قراء تملو نحو ١٠٠ سم .
اوراقها كبيرة القند تملو من ٨ الى ١٠ سم . نصلها جلدي
الصفحة سنن الختار . ازهارها عنقودية التجميع ، تاجي
الارتكاز . ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون او وردية .
ثمارها الى السمرة الزرقاء الموج . كما برها لحمية مأكولة .
تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٣٧٨ - وتنجي مداد ، غلطارية كتندية ، عنب القطا Gauthéria procumbens (S).

Gauthérie couchée, Thé de Terre-Neuve, Thé de montagne (F). Checker berry, Winter-green (E). Canadischer Tee, Wintergrün (D). Tè di Terranova, Tè del Brasile (I).

نوع من الوتر وهو نبات عارض مداد . اوراقه تملو نحو
٥ سم . وتعرض نحو ٣ ، نصلها جلدي الصفحة سنن
الختار . ازهارها فردية الترتيب ، ابطية الارتكاز ، لوناً الى
البياض الموشم بالورد . اوراقها تشتمل استعمال الشاي
لانها عطرية الرائحة ولا تملو من بعض المنافع الصحية وقد
يستخرج منها عطر « النطالان » || تنوره يستمر طوال
فصل الصيف .

٣٠٣٧٩ - وتنجي وتنجي Gauthéria velitchiana (S). Gauthérie de Veitch (F).

نوع من الوتر وهو جنبة منصبة قراء تملو نحو ١٠٠ سم .
اوراقها اهليجية مذبية القاعدة تملو نحو ٨ سم . نصلها
جامد الصفحة سنن الختار ، حليبي التنين ، خلي العروق .
ازهارها عنقودية التجميع . ازهارها بيضاء اللون ،
صغيرة القند ، ثمارها حنطية اللون برتقالية الموج . كما برها
لحمية مأكولة || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٣٨٠ - وتنجي Autocthone (F). Autocthonous (E).

نعت تعريفي يطلق على من كان مقيماً في وطن اسلافه .

٣٠٣٨١ - وتنجي وتنجي وتنجي : داء ولم ينقطع .

٣٠٣٨٢ - وتنجي الوتر هو بروز الخلود عند الولادة في وضع خاص يختلف عن الوضع الطبيعي .

٣٠٣٨٣ - وتنجي Mèat (F). Meatus (E). الفتحة بين خلايا النسيج النباتية . ج وتنجي وتنجي .

٣٠٣٨٤ - وتنجي Pal, Pleu (F). Pale, Stake (E). ما رز في الأرض او الحائط من خشب .

٣٠٣٨٥ - وتنجي Rosier blanc (F). هو الوردة الابيض ، اطلبه .

٣٠٣٨٦ - وتنجي Décade (F). Decade (E). اسم لعقد العشرة .

٣٠٣٨٧ - وتنجي * Mycetopus (S). Mycétope (F). Mycetopus (E).

جنس حيوانات مائية من الزحويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة الثيادات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها
من عطر انهر وبحيرات امريكا الجنوبية || اصداؤها شبه
بيضية الشكل ، زرقية التحديد ، تملو من ٦ الى ١٢ سم .
وهي متساوية الصاريح ، لا متساوية الاصلع . تتميز
باستطالة الارجل المثنية باقراص كتنكاف الفطور تنشب
في حمور البحيرات والانهر وفي الحصى ايضاً || تعيش
مجموعات كبيرة العدد . لحمها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٣٠٣٨٨ - وتنجي وكناكة كثرة اللحم .

٣٠٣٨٩ - وتنجي وكناكة كثرة الشحم .

٣٠٣٩٠ - وتنجي وتنجي في الياس ، اطلبه .

٣٠٣٩١ - وتنجي Tectologie (F). Tectology (E). الوثالة البحث الشوزي الصرف الهيكلية العضوية .

٣٠٣٩٢ - وتنجي Colladonia (S). Colladonia (F). Colladonia (E).

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخياشيم .
انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد
الحارة والمعتلة الحرارة || سورها قراء متغاوية الارتفاع
اوراقها متعاقبة ، لابتامية الشكل ، منها الزجعية المستطيلة
والقالبية والمنقصية والريشية . ازهارها صيدلي التجميع ،
طرني الارتكاز . ازهارها صفراء اللون . اشهر انواعها :

٣٠٣٩٣ - وثامة صغيرة الثمر C. microcarpa (S).

٣٠٣٩٤ - وثامة مجنحة C. alata (S).

٣٠٣٩٥ - وثامة مشرمة C. crenata (S).

٣٠٣٩٦ - وتنجي الوتر الذي خلا من الحيوانات المثوية .

٣٠٣٩٦ - وَجِين - الوجين هو شط الوادي المزدرع .

٣٠٣٩٧ - وَحَاف - Banc (F). Layer bed (E).

هو الطبقة من الرمل أو الساف من الصخر أو الرصيف من المرجان الخ...

٣٠٣٩٨ - وَحَال - Terrivome (F). Terrivomous (E).

الوحال قاذف الوحل أو التراب . بركان وحال .

٣٠٣٩٩ - وَحْدَانِي - Sporadic (F). Sporadic (E).

هو من النبات من ألف العيش منفرداً .

٣٠٤٠٠ - وَحْدَة - Unité (F). Unity, Unit (E).

اصطلاح يستخدم في العلوم الطبيعية أساساً لقياس . في النظام الفرنسي لمقاييس الاطوال والمساحات والاجسام ، يعتبر المتر والمتر المربع والمكعب وحدة هذه المقاييس ومن اجزائه ومضاعفاته أشقت المقاييس الأخرى . وفي الاوزان يعتبر الغرام واجزائه ومضاعفاته وحدة القياس . وفي النظام الانكليزي يعتبر البرد وحدة لقياس الاطوال والمساحات والاجسام ، والباوند وحدة الاوزان || وفي الهندسة تعتبر الدرجة وحدة القياس وهي الزاوية الناتجة عن تقسيم الدائرة الى ٣٦٠ قسماً متساوياً || وفي علم الحرارة تعتبر السرعة وحدة القياس ويبر عنها بكمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة غرام واحد من الماء النقي من درجة ١٥ الى ١٦ مئوية || وفي الكهرباء يعتبر الاامبير وحدة التيار ويعتبر الاوم وحدة المقاومة || وفي الضوء ، وحدة القياس هي الشعة . وفي علم الصوت فوسدة القياس هي اليل .

٣٠٤٠١ - وَحْدَة غِذَائِيَّة - Unité nutritive (F). Nutritive unity (E).

هي عنصر الغذاء الرئيسي او القيمة الغذائية القابلة للتشيل الموجودة في مادة معينة او شكدة مقرر . لذلك نقول ان التشكيم الصحيح يجب ان يركز على محوى العناصر الغذائية وما ينتجم عنه من وحدات . راجع جدول العلف .

٣٠٤٠٢ - وَحْرَة * - Nycteris (S). Nyctère (F).

جنس حيوان من فصيلة الخواريات . انواعه سبعة ، تتميز بتجويف قصبة الأنف وبالزوائد الجلدية التي تعمل حشائر التجويف الايمن واليسار || اجسامها صغيرة القد . طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ٣ الى ٤ سم . انواها الى الصهبة الخطية المختلفة المواج ، بطونها زاهرة || موطنها افريقية الشرقية والحبيشة والسودان ومصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش . تألف الكهوف والمغاور والبيوت الخربة . تعيش جماعات قليلة العدد . قوتها الحشرات والدوديات والمهلوم .

٣٠٤٠٣ - وَخْرِيَّات - Nycteridae (S). Nyctéridés (F).

فصيلة من الخفافيش مركزها بين الخفافيش والمماشيات . انواعها ١١ ينتمين الى جنسين الوخرة والمطالاب || من ميزاتها الخاصة زوائدها المنخرية المزركشة وكبر آذانها الوتيدية القاعدة المحمية || اناتها تضع جرراً واحداً تحمله دائماً حتى بلوغه . موطنها افريقية الشرقية وبسلاد الحبيشة .

٣٠٣٨٠ - وَكِيْرَة - Cloison (F).

هي الحاجز الخليوي . Dividing membrane (E).

٣٠٣٨١ - وَكِيْئَة ، مُسْتَنْدَة - Document

هي في القانون التجاري كل معاملة خاصة بالمسافر المسافرة ان صادرة او واردة .

٣٠٣٨٢ - وَكِيْئَة التَّامِيْن - Police d'assurance (F). Insurance policy (E).

هي المقد المحرر الذي يثبت انعقاد التأمين وشروطه .

٣٠٣٨٣ - وَكِيْئَة - Pierre à briquet (F). Flint (E).

حجر القداحة . « لا والذي اخبر النار من الوتيمة » .

٣٠٣٨٤ - وَكِيْئَة مُحَدَّدَة * - Acilius sulcatus (S).

Acilius silloné (F).

حشرة مائية قانصة من فصيلة المكنوزيات ورتبة غديات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المتدلة الحرارة . تألف المنائق والغدران . تعيش في الماء . تنفترس كل ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والارالي ولا تترك الماء الا في زين الكوم والتمكنة لانها تمتع المكن على الصفحات السفلى من تصال الاوراق التي تلبس سطح التربة || جسمها شبه بيضي الشكل بطول نحو ١٨ سم . ثوبها الى الخشنى الاسمر المواج . ظهرها مائل للصفحة عند الذكر ، مخدعها عند الانثى || لها جبل واحد في الحول . وقتها تسعى الى الماء بعد التفت بنحو اربعة ايام وهي قانصة كاششرة الجملانة .

٣٠٣٨٥ - وَجْ - هو عود الوج ، اطلبه .

٣٠٣٨٦ - وَجَار - Chenil (F). Dog-Kennel (E).

الوجار . ج ابرة وجير . هو مأوى الكلب ويكون عادة من خشب . وفي الاصل هو سرب الفصيح والذئب والعلب ونحو ذلك .

٣٠٣٨٧ - وَجَب - الوجب هو انعقاد البيا في الضرع .

٣٠٣٨٨ - وَجْبَة - Cure, Fournée (F). Batch, Baking (E).

ما يستوصيه الخباف من تبخ على دفعة واحدة .

٣٠٣٨٩ - وَجَر ، وَكْر - Garenne (F). Warren (E).

هو مأوى القواقع .

٣٠٣٩٠ - وَجْن - Moraine (F).

صخر على طانية جليدية .

٣٠٣٩١ - وَجْه - Face (F).

٣٠٣٩٢ - وَجْهِيَّ - Facial (F).

٣٠٣٩٣ - وَجُوبِ الأَدَاء - Exigibilité (F). Exigibility (E).

هو ان يصحح الدين واجباً ادارته الى الدائن .

٣٠٣٩٤ - وَجِيَّات - Acorées (F).

سبط من فصيلة الفلقاسيات .

٣٠٣٩٥ - وَجِيد - Terrain plat (F). Level ground (E).

ما استوى من الارض . ج وجدان .



وَيْزَة مُحَدَّدَة



وَحْرَة

Monopétale (F). - وَحِيد البَتَلَة ٣٠٤١٧

Monopetalous (E).

نمت تمريني وصني يدل على التوزيع الوحيد البتلة .

Monorchide (F). - وَحِيد الخِصْبَة ٣٠٤١٨

Monorchid (E).

من الحيوان ما كان ذا خصية واحدة .

٣٠٤١٩ - وَحِيد الخَلِيَّة

Monocellulaire, Unicellulaire (F). Monocellular, Unicellular (E).

مركب من خلية واحدة ، او ذو خلية واحدة .

Monoatomique (F). - وَحِيد الذَرَّة ٣٠٤٢٠

Monatomic (E).

Uniflore (F). - وَحِيد الزَهْرَة ٣٠٤٢١

Uniflorous (E).

ذو زهرة واحدة .

Unicaule ٣٠٤٢٢ - وَحِيد السَّاق

Monandre (F). - وَحِيد السَّدَاة ٣٠٤٢٣

Monandrous (E).

من النبات ما كان ذا عضو تدكير واحد .

Monostigmaté (F). - وَحِيد السِّمَة ٣٠٤٢٤

Monostigmatous (E). ذو ميسم واحد أو اعْلوية واحدة .

Unilabé (F). - وَحِيد الشِّفَة ٣٠٤٢٥

Unilabiate (E).

ذو شفة واحدة .

Unisexué (F). - وَحِيد الشَّيْء ٣٠٤٢٦

Unisexual (E). ذو اعضاء تناسلية ذكورية او انثوية .

Monoploid ٣٠٤٢٧ - وَحِيد العِشْرَة

هو كل نبات قوام تركيبه العلائي عترة بسيطة .

Unilobé (F). - وَحِيد الفِصْل ٣٠٤٢٨

Unilobate (E).

نمت تمريني يطلق على كل نصل ورقة وحيد الفص .

Monosépale (F). - وَحِيد الفِصْلَة ٣٠٤٢٩

Monosepalous (E).

Monocotylédone (F). - وَحِيد الثَّلَاثَة ٣٠٤٣٠

Monocotyledonous (E).

اسم او صفة كل نبات من ذوات الفلقة الواحدة . والنباتات وسيدات الفلقة تولد احد قسمي مستورات البزور .

٣٠٤٣١ - وَحِيد القَرْن هو الكركدن الهندي ، اعظمه .

Monocéros, Licorne (F). - وَحِيد القَرْن ٣٠٤٣٢

Monoceros (E).

كوكبة نجوم جنوبية المنقع مركزها بين الكلب الاكبر والكلب الاصغر والجبار والشجاع الاثني . وهي تمثل حيوان غرابي له جسم الفرس وفي رأسه قرن واحد || نجوميها متفاوتة الاشكال والالوان والرتب عددها ٣١ .

Unipolaire (F). - وَحِيد القُطْب ٣٠٤٣٣

Unipolar (E).

Bête sauvage (F).

Wild animal (E).

٣٠٤٠٤ - وَحْش

Bête féroce (F).

Carnivorous animal (E).

٣٠٤٠٥ - وَحْش غَنَار ، سَبُع

Férin (F).

٣٠٤٠٦ - وَحْشَتِي ٥

نمت تمريني يطلق على كل ما هو متصل بالحيوانات الوحشية .

٣٠٤٠٧ - وَحْشِي

الوحشي الجانب الخارجي او الايمن من الرشفة ومن كل شيء يقابله الاثني اي الجانب الداخلي او الايسر .

Pustule (F).

Pustule, Pimple, Blotch (E).

٣٠٤٠٨ - وَحْشَة

هي البثرة تركيب النسيج الحيواني والنباتية . ج وسمن .

٣٠٤٠٩ - وَحْف

الوحن : النبات الريان من اي فئة كان .

Terre noire (F). Black soil (E). - وَحْفَاء ٣٠٤١٠

التربة السوداء وتدعى البتيجور .

Rocher noir (F). Black rock (E). - وَحْفَة ٣٠٤١١

هي الصخرة السوداء .

Fange, Boue, Bourbe (F).

Mud, Mire, Silt (E).

٣٠٤١٢ - وَحْل

مزيج من الطين وبعض المواد المعوية يرسب في المنافع وحل فضلات مجاري الماء .

٣٠٤١٣ - وَحْن ٥ ، لُؤْس

رواسب طينية رملية عادمة الاحماض تغشي بعض الارربة في مواقع معينة . أما كلمة لوس فن وضع الامير مصطلقي الشهابي .

Chalcopelia afra (S).

Chalcopélie africaine (F).

٣٠٤١٤ - وَحْوَخ *

طاير من الزغل . اعطاه تتمد من افريقية الشرقية الى الشالية || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٠ سم . رأسه الى الصهبة الرمادية . ظهره وذنبه الى السمرة الكستنية الموراج . انفيه اسود . جوشنه احمر . بطنه الى البياض الاغبر . جناحاه الى السمرة السوداء . حدقة عينه كالقوتور . منقاده اسود . رجلاه الى الجوزة || ملجنه الحياتي جماعي . سربه يمد عشرات الازواج . يالفت البياض وضفاف مجاري الماء . قوته البزور والجويوب || يدان عشه في الادغال الاثنية . الاثني تقصع من يفتين الى ثلاث ييضات تحضنها بمنابرة الذكر .

Monocarpien (F).

Monocarpous (E).

٣٠٤١٥ - وَحِيد الإِزْهَرَار

Monobasique (F).

Monobasic (E).

٣٠٤١٦ - وَحِيد الأسَّاس



وَحْش

أنواعها المعروفة نحو ١٥ أعطائها تمتد من الجزيرة العربية إلى أوروبا الجنوبية وإفريقية الشمالية || تأثف الرمال والفياني . قوتها الذباب والحمام والحشرات والديدان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، رشيقة ، تطول من ١٨ إلى ٢٢ سم . انوثاها بلون الرمال وقد تمتاز البيئة التي تعيش فيها .

Osmia (S).

Osmie (F). Osmia (E).

جنس حشرات جارية من الحمويات غشائيات الاجنحة وفصيلة المشيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة ، قريبة الشبه من النحل ، تطول نحو ١٥ سم . انوثاها قائمة تكثر فيها السمرة السوداء المواج والسمرة السفاه . قشارها كثيف الملبب اللينق الناعم اشفق اللون او اخضر || ملجتها الحياتي انزالي . تشيد غشائياتها في جذوع الاشجار النخرة وفي حيطان الخراب . قوتها رحيق الازهار والطلع وما يجمعه من عسل في تخاريبها المسدسة الاصلع . الواحدة ورشاة .

Cerceris (S).

Cerceris (F). Cerceris (E).

جنس حشرات قانصة وانجمه ناعمة من الحمويات غشائيات الاجنحة المصورة وفصيلة الالقيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطه القد معتدلة الحيات . انوثاها ملونة يكثر فيها الاسود المخلع بالاصفر والاسود المخلع بالابخر || تصفر في المواقع الرملية . اصفاها رداء فسيحة متركبة الخلايا المحجورة المنفصلة || قوتها بعض غديات الاجنحة اغصها السوس والزرقون وتقتصمها تخندرها وتنقلها الى اصفاها زادا لها وليرقاتها .

Fluctuation

حالة عدم الاستقرار الشوزي التي تتعرض لها الحجن في طور استنسابها .

٣٠٤٥٢ - وَخَفْ ، وَتَوَخَّيفٌ ، نَقْعٌ

Macération (F). Maceration (E).

مرث الشيء بالماء لاستخلاص مواده .

Ochina (S). Ochine (F).

جنس حشرات غاشية من فصيلة التفريات . انواعها قليلة جميعها صغيرة القد طويلا يراوح من ٢ إلى ٤ سم . انوثاها حنطية اللون يملوها تجلجج اسود || رقاتها همة تركب لهاء وشكير مختلف النباتات المتسلقة العارضة اغصها اللبالب .

Sphaerostilbe (S).

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات . يتميز باعسانه الجامعة الانتشاب المرتكزة على ونية دموية لاجولية . يوغها ثنائي العدد ، ثنائي الخلية ، يجمعه تكات صقية الشكل || له نوعان مؤذيان وشميش المؤر وشميش مفاجي .

٣٠٤٥٥ - وَخَيْشُ الْمُؤَرِّ

Sphaerostilbe musarum, Calostilbella calostilbe (S).

Unipétale (F).

Unipetalous (E).

اسم يطلق في علم النبات على كل زهرة توحيها وحيد البتلة او القعالة .

Monostylé (F).

Monostylous (E).

Monochrome

Homocentrique (F).

Homocentric (E).

Monotique,

Uniloculaire (F). Monocleous, Unilocular (E).

كل نبات تكون ازهاره وحيدة الشق والحمل اي ان النبتة الواحدة لا تحمل سوى ازهار جنسية واحدة ان ذكرية او انثوية .

Univalve

وحيد المضراع
ويدعى وحيد الصمام . هو ما كان ذا مصراع او صمام واحد .

Monovalent

Monotocardes (F).

رتبة من الرغويات مديات الابلج . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . بعضها من متشجرات الازمنة الغابرة والبعض الآخر معاصر . جميعها من الرغويات الوحيدة الخيشوم والاذنية والكلية .

Monotogrades (F).

رتبة حيوانات من الرغويات المديدة الاماميات الحياش .

٣٠٤٤٣ - وَحِيدَاتُ الْأَصْدَافِ

Monoaplacophores (F).

شعبة من الرغويات صفحيات الحياش تتميز باصداها الفردية . انواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز العشرة .

Monomyaires (F).

شعبة من الرغويات صفحيات الحياش . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها وحيدة الفصلة القافلة .

Monotremes (F).

Monotremata (E).

رتبة من الثدييات الالامشييات ، تعبر ادى رتب اللبوانات منها خلد الماء والتمنضاض .

Monosperme (F).

Monospermous (E).

صفة كل نبات مآره احادية البذرة .

Monogyne (F).

Monogynous (E).

اسم تعريفي يطلق على كل زهرة وحيدة الحياء او الكربلة .

Eremias (S).

Erémie (F). Eremias (E).

جنس حيوانات بيوضة من الغطاء وفصيلة الضبابيات .

٣٠٤٣٤ - وَحِيدُ الْقَعَالَةِ

٣٠٤٣٥ - وَحِيدُ الْقَعْمِ

احادي خيط عضو الثأثيث .

٣٠٤٣٦ - وَحِيدُ اللَّوْنِ

٣٠٤٣٧ - وَحِيدُ الْمُرَكَّزِ

٣٠٤٣٨ - وَحِيدُ الْمَسْكَنِ

٣٠٤٣٩ - وَحِيدُ الْمِضْرَاعِ

٣٠٤٤٠ - وَحِيدُ الْمَكَافَا

٣٠٤٤١ - وَحِيدَاتُ الْأَجْهَرَةِ

٣٠٤٤٢ - وَحِيدَاتُ الْأَذْيَنِ

٣٠٤٤٣ - وَحِيدَاتُ الْأَصْدَافِ

٣٠٤٤٤ - وَحِيدَاتُ الْقَفْصَالِ

٣٠٤٤٥ - وَحِيدَاتُ الْمَسْلِكِ

٣٠٤٤٦ - وَحِيدَةُ الْبُزْرِ

٣٠٤٤٧ - وَحِيدَةُ الْخِيَاءِ

٣٠٤٤٨ - وَحِيرَةٌ



وَخَاش



وَخَاش



وَخَنَة

خاصة بتحويل الدواف واكثره وباستنفاض الايلاع والشهوة الجنسية .

٣٠٤٦٢ - وَدَاقِي، وَدَقَان، وَدُوقِي

Rut des solipèdes (F). *Rut of the solipeds* (E).

شهوة أنثى ذات الحافر أو التلعل أو الزين الذي تطلب فيه الاناث تحوطا للسفاد .

٣٠٤٦٣ - وَدَج

Mobile, Motif (F).

Mobile, Moving (E).

هو السبب والوسيلة .

٣٠٤٦٤ - وَدَح، قَانَانِيَا، قَوْلِيَّة، عَوْدُ الصَّليب

Paeonia (S). *Pivoine, Peonie* (F). *Peony* (E). *Paeonie* (D). *Peonia* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشقاريات. أنواعه نحو ٢٠، معظمها بري وبعضها تزييني. جذورها خزنية، لحمية، غليظة. أوراقها متناقية، انزعاجها كبيرة القد، لحسية الفصّل، عديدة البتلات، لا قياسية الكرايل. أشهر أنواعه ما يلي .

٣٠٤٦٥ - وَدَحْ جِلْدِي الْوَرَق

Paeonia coriacea (S). *Pivoine à feuilles coriaces* (F).

نوع من الودح، ساقه عشبية جؤرية اللون تملو من ٤٠ إلى ٧٠ سم. أوراقه قليلة التفريش المستعرض، نصلها جلدي الصفحة، عايق العليا بحري السفلى. زهرته هامية الارتكاز وحيدة، تعرض من ١٠ إلى ١٢ سم. لونها الوردى أو الأبيض || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٤٦٦ - وَدَحْ شَاذْ

Paeonia anomala (S).

Pivoine anomale (F).

نوع من الودح التزييني، ساقه عشبية تملو من ٦٠ إلى ٧٠ سم. أوراقه كبيرة القد كثيرة التفريش والتشريح والعروق والتشرايين. عروقها وشرايينها خلية البشرة. زهرته هامية الارتكاز وحيدة، تعرض نحو ١٠ سم. لونها الوردى . تنوره يستمر من أيار إلى حزيران .

٣٠٤٦٧ - وَدَحْ شَجَرِي

Paeonia moutan (S).

Pivoine en arbre (F).

نوع من الودح التزييني، ساقه خشبية تملو نحو ١٥٠ سم. أوراقه كبيرة القد ثلاثية أو لحسية التفريش، نصلها عايق الصفحة العليا بحري السفلى. انزعاجها كبيرة القد تعرض من ١٥ إلى ٢٥ سم. لونها يختلف مع الضروب، منها الأبيض والوردى والاحمر والقرمزي || تنوره يستمر من اوائل أيار إلى اواخر حزيران .

٣٠٤٦٨ - وَدَحْ صَغِير الْوَرَق

Paeonia tenuifolia (S). *Pivoine à feuilles menues* (F).

نوع من الودح . ادمته ركوبية . ساقه عشبية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقه قليلة متبادعة تعد من ١٠ إلى ١٢، جميعها صغيرة القد كثيرة التفريش والتشريح . زهرته هامية الارتكاز وحيدة، تعرض من ٨ إلى ١٠ سم. لونها الوردى والقرمزي العايق الملاج || تنوره يستمر من اواسط أيار إلى اواسط حزيران .

٣٠٤٦٩ - وَدَحْ صِيْثِيْ *، وَدَحْ عَطِر

Paeonia albiflora (S). *Pivoine odorante, P. de Chine, P. à odeur de rose* (F).

نوع من الودح، ضروبه التزيينية عديدة . ساقه عشبية جؤرية اللون تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد

Maladie de Bonnygate du bananier (F).

فطر مجهري يصيب الموز من جذوره الى اوراقه فيعطيه ويميته || يبدو على الاوراق عصابات شبيقة مستطيلة لونها اللمعة الداكنة تغطي التسج وتسبب يباسه . ويبدو على انحاء الامورة لطخ عشبة لونها الى السمرة تحمقها اهداب حر تحوي مشج الفطر الذي ينخر التسج ويرقى انقيا من نمد الى نمد يلحفه حتى القلب || وهو في الجذور عند انتشارها بؤرة عفن تقود التسج الى الانحلال . وإذا أعترها عند أطرافها أو بعيداً عن زاوية انتشارها فهو بقعة سمراء اللون مهدبة بالأحمر || يكافح باقتلاع وطمر الموز الموبوء بعد تنغيره بالكلس الحراق ومن الواجب تطهير البش ايقاً قبل طمره .

٣٠٤٦٩ - وَغَيْشْ مُفَاجِيْ

Sphaerostilbe repens, Stilbum (S).

فطر مجهري شديد الاذى يسبب عفن الجذور في بعض الانواع النباتية انحصار المطاط واللباية والمزقة والاهوكراتية، وقد شوهد على جذور الليمون الحامض || مظهره الخارجي عفن خلى الشكل ليد التجميع لونه الى الجؤوة السمراء وهو كثير العرصات الفسيحة الحجم || اغمراره جسيمة لانه يمت الاشجار بعد ان يقضي على جرادة جلورها . يكافح باقتلاع وحرق الاشجار الموبوءة وتطهير مواقعها وتخفيض التربة . ومن الانسب اجتناب التربة الرطبة الكثوم لانها تلام انتشار هذا الوسم .

٣٠٤٧٠ - وَدَا، وَدَا، فَدَنْ

Aplanir, Niveler (F).

To smooth, To level (E).

ودأ الارض أو فدنها : بسط سطحها وسواه انقيا .

٣٠٤٧١ - وَدَاب

Alcadium (S).

Alcadium (F). *Alcadium* (E).

الوداب فطر ينمو على جذوع واعصان الاشجار اليابسة .

النخرة، المحفة .

٣٠٤٧٢ - وَدَاج، وَدَحْ، شَرِيَانْ سُبَانِي

Carotide (F). *Carotid* (E).

شريان في العنق وهما وداجان أو ودجان: شريانان غليظان عريضان عن بين ثغرة النحر ويسيرا .

٣٠٤٧٣ - وَدَّاسْ

Enoploteuthis (S).

Enoploteuthis (F). *Enoploteuthis* (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات رأسيات الايل، مزدوجيات الخياشيم، عشاريات الجرامز وقصيلة الطردوسيات. انواعها المعروفة ستة، اعطاهن معظم المناطق المعتدلة الحرارة من المحيط الهادي والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها اسطوانية متباينة الاستطالة التي تزيد الى النوع . اصفر الانواع وهو وداس المتوسط يعطو نحو ثلاثة امتار . اما الانواع الكبيرة كوداس اقيانية فيعطو نحو عشرة امتار . ووداس جزر الزايج يعطو نحو ١٢ متراً || رؤوسها كبيرة وعيونها كذلك . زعانفها طرفية الارتكاز، منها قليلة الشكل ومنها زوانية . جرامزا محجمة ، متساوية الطول باستثناء الزوج القفيف فانه شديد الطول ، ينتهي برحى ستانية الشكل تملوها الهامم الكبيرة والكلايب القزينة المادة .

٣٠٤٧٤ - وَدَاقِي

Spermatopé (F).

نمت تعريفية توصف به الاغلبية الخاصة أو المزموم انها



ودح صيْثِيْ

Mouillage (F).
Soaking, Wetting (E).

٣٠٤٧٩ - وَدْن

٣٠٤٨٠ - وَدْن الْأَسَد

هو الصلج، نبات عسقلي من البرباريات .

٣٠٤٨١ - وَدْن الصَيْل

شجيرة برية تدعى ككولوب كينو، اطلبه .

Pousse (jeune) (F).
Shoot (young) (E).

٣٠٤٨٢ - وَدِيَة

هي القثيث جاز اقتلاعه . ج. ودي .

Ophiorhiza (S).
Ophiorhize (F).

٣٠٤٨٣ - وَدِيَة *

جنس نباتات عشبية من فصيلة الفويات . أنواعها المعروفة نحو ٥٠ منها الخولية والحولة والمعمرة . أعطانها بعض مناطق البلاد الحارة معظمها من ثبوت الهنـد وماليزية وبعضها الآخر من ثبوت أمريكا الجنوبية || سوقها متباينة الارتفاع . أوراقها متقابلة ، منقطة ، سنائية النصال . أزهارها ضبي التجميع ، محوري الارتكاز وطرفي . أزهارها مستطيلة الكؤوس خاصة البتلات ، مختلفة الألوان يكثر فيها الاصفر ثم الوردى ثم الأبيض . ثمارها جراء ثنائية الخدر . بزورها سوداء اللون مكدرة تستعمل كدافعة للحمى . ومنها نوع هندي المشب يدعى ودية ترياقية (Ophiorhize mitréole) جلوه ترياقية تستعمل ضد سم الافاعي .

٣٠٤٨٤ - وَدَيْس يبيس العشب من أي جلس كان .

٣٠٤٨٥ - وَدَيْشَة ٥ Triosteum (S). Triostée (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجانيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منها البرية والتريبينية . سوقها فروعاً تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . أوراقها متقابلة ، سنائية النصال . أزهارها سنائين الاشكال . أزهارها عديدة الألوان || أشهر أنواعها التريبينية الثلاثة التالية :

٣٠٤٨٦ - وَدَيْشَة تَحَلِيَا ٥

Triosteum Himalayanum (S).
Triostée de l'Himalaya (F).

نوع من الوديشة التريبينية . ساقها كثيرة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها حاضرة ملتصقة الاذنين ، سنائية النصل ، تطلو من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . || أزهارها سنبل التجميع . أزهارها صغيرة ، فسقية اللون . ثمارها عنبية صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٤٨٧ - وَدَيْشَة ضَبِقَة الْوَرَقْ ٥

Triosteum angustifolium (S).
Triostée à feuilles étroites (F).

نوع من الوديشة التريبينية . ساقها تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . أوراقها حاضرة ، سنائية النصل ، تطلو من ٨ الى ١٤ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . أزهارها محورية الانتساب ، فردية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من أيار الى آب .

قليلة التفريش المستعرض . نصلها متمعج الصفحة جبل الخضار الباقى ، خلي البشرة السفلى . أزهارها هامي الارتكاز يعد من ٣ الى ٥ أزهار . زهرته فواحة العرف المعطري ، كبيرة القند ، يبيض اللون او مخضبة || تنويره يستمر من أيار الى اواخر حزيران .

٣٠٤٧٠ - وَدَحْ مَخْرُفِي * Paeonia officinalis (S).
Pivoine officinale, P. des jardins, Rose de Sérane, R. de Notre-Dame (F).

نوع من الودح التريبي ، ساقه عشبية جذوية اللون تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . أوراقه كبيرة القند ثلاثية او خماسية التفرع ، نصلها مائل الصفحة المتمعجة مضرب العروق . أزهارها كبيرة القند تعرض نحو ١٥ سم . بتلاتها مهدبة الاطراف ، لونها الى الحمرة المختلفة المواجه || تنويره يستمر من أيار الى حزيران .

٣٠٤٧١ - وَدَحْ مَرَجَانِي Paeonia corallina (S).
Pivoine corail (F).

نوع من الودح ، ساقه عشبية جذوية اللون تملو نحو ٧٠ سم . أوراقه قليلة التفريش المستعرض ، نصلها جامد الصفحة جبل الخضار . زهرته هامية الارتكاز وسيدة ، تعرض نحو ١٥ سم . لونها كالمرجان . كرابلها خلية القشور . بزورها تبدو قرمزية وتنتهي عند تمام الادراك ، بالسواد اللامع . تنويره يستمر من نيسان الى حزيران .

٣٠٤٧٢ - وَدَرّ Trier (F). To pick (E).
نحى ما لا يلجم مع غيره .

٣٠٤٧٣ - وَدَسْ Défaut (F). Flaw (E).
العيب البين ان في الحيوان او في النبات .

٣٠٤٧٤ - وَدَعَة * ، مَسَقَلَة Porcelaine (F).
ج. ودع . الودع ، اصداق بحرية ونهرية من ذوات الصراع الواحد تكون لبعض الحيوانات الرسوة كالفواقم وغيرها . وهي صغيرة القند مختلفة الاشكال والألوان يكثر فيها الشكل الحلزوني .

٣٠٤٧٥ - وَدَعِيَّات Cypridae (S).
Cypreides (E). Cypridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل اُميات الحياض المشطية . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة وبعض البلاد المتدلة الحارة || جميعها مفترسة ، يبيضه الاصداق الصغيرة القامة . فواطمها مستطيلة مقعرة الجوانب اليسرى . محدبة اليمنى المسنة الخمار الداخلي ، المنقطة الخمار الخارجي || أشهر اجناسها الودع .

٣٠٤٧٦ - وَدَفْ Sperme (F). Sperm (E).
الودف والوداف هو من الحيوان .

٣٠٤٧٧ - وَدَلْكَ Lard (F). Bacon (E).
هو الشحم الذي يتكون تحت جلد بعض الحيوانات كالفئير مثلاً ...

٣٠٤٧٨ - وَدَلْكَ Animaux ruminants (F).
Ruminant animals (E).

الودك ما يجترّ من الحيوان الوحشي ، وما لا يجترّ فهو الزُغم .



ودح مخرفي



ودعة



ودبة

٣٠٤٨٨ - وَدَيْشَة مُتَقَوِّبَة الْوَرَق (S).

Triosteum perfoliatum (S).

Triostée perfoliée (F).

نوع من الوديشة الأريينية. ساقها تعلو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها حافسة ملتصقة الإزديات تبدو كالشقوقية. نصالها بيضية الشكل تطول من ١٠ إلى ٢٢ سم. وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم. أزهارها محورية الالتشاب، ضمية التجميع، صغيرة القند، أرجوانية اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى تموز.

Dépôt (F). Deposit (E).

عقد يتسلم به شخص متقولا بملكه شخص آخر ليحفظ عيناً كما يحفظ ماله الخاص ويرد متى طلبه صاحبه.

٣٠٤٩٠ - وَدَيْشَة مَبْدُولَة * (S).

Liparis nostras (S).

Liparis commun (F).

سكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الشحطاريات موطنها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها شبه وشي الشكل، ضخم المقدم، دقيق الخصر، بطول نحو ١٦ سم. مسكها أدام السهف، لزج. رأسها مستطيل الجرم، قصير الخط، كبير الشفق. عيناها ماحتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة تمتد حتى قاعدة الذيلية. الشرجية تقابل الظهرية وتماثلها. زعانفها الصدرية والخصوية مندعة تتأخر الرأس عند فكها. زعنفتها الذيلية صغيرة من مزوانية الشكل. ثوبها إلى السرة الحنفية الملوحة بالأسود. بطنها إلى الغبرة الزرقاء المواج || لحمها متوسط الصنت، مأكل.

٣٠٤٩١ - وَدَيْشَة * (S).

Odontites (S). Odontite (F).

جنس نباتات شبيهة بيرة، حولية من فصيلة الخنازيريات. أنواعها المعروفة قليلة العدد منبتها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها قليلة الفروع. أوراقها متعاقبة. نصالها اهليلجية متجمعة. أزهارها صغيرة حراء اللون || تنويرها ربيعي.

٣٠٤٩٢ - وَدَيْشَة جَمِيلَة * (S).

Enidella speciosa (S).

Enidelle élégante (F).

حشرة من فصيلة الدلفاسيات ورتبة متجانسات الأجنحة. جسمها صغير القند يطول من ٦ إلى ٧ مم. || ثوبها إلى الحنفلي الاشعق المواج يطولو بتبيج في الظهران. رأسها معتدل العرض، ناضج البافوخ الذي يبدو كالقرن. عيناها كبيرتان. زبابانها مستطيل الفصّل الاول والثانية. كويلها قصير. حجبها بحرمة. ظهرانها كامل الحنجبة. شارب، بين المروقة. روشانها غشائيات، شفافان. بطنها معتدل التبطيط. الزوج الخلفي من قوائمها مجهز كسائر الدلفاسيات || سرسها غشاف مجاري الماء.

٣٠٤٩٣ - وَدِين * (S).

Mouillable (F). Wetable (E).

٣٠٤٩٤ - وَدَيْشَة التَنَوُّب * (S).

Glischrochilus quadripunctatus (S).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند بيضية الشكل، طولها براوح من ٥ إلى ٦ مم. ثوبها إلى السواد اللامع يطولو في كل من عهديا تربية ونقطة يرتقالية اللون، زبابانها وأرجلها شقر. تعيش تحت لحاء التنوب. قوتها ما تقتصر من الكراشيات.

٣٠٤٩٥ - وَدَيْشَة النَّيَّارِ الْجَفَاءَة *، كَرْبُفِيل

النَّيَّارِ الْجَفَاءَة

Carpophilus hemipterus (S). Carpophile des fruits secs (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند، تطول نحو ٣ مم. عُمداها لا يطغيان كامل ظهرها. ثوبها إلى البني اللامع. تركيب النيار الناضجة الساطعة ثم الجافة اصعبها التين والشمش.

٣٠٤٩٦ - وَدَيْشَة السَّلْجَم *، مَلْشِيَتِ السَّلْجَم

Meligethes viridescens (S). Mélégèthe du colza (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند، طولها براوح من ٢ إلى ٣ مم. ثوبها إلى الخضار الأزرق المواج. زبابانها وأرجلها شقر. تركيب مع ريقها جميع النباتات الصليبية وأصعبها السلجم.

٣٠٤٩٧ - وَدَيْشَة المَلْفُوف *، مَلْشِيَتِ المَلْفُوف

Meligethes aeneus (S). Mélégèthe du chou (F). Pollen beetle (E). Rapskollkäfer (D).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند، طولها نحو ٣ مم. ثوبها إلى الخضار الزرجدي، زبابانها وأرجلها سود. تركيب هي وريقها معظم النباتات الصليبية اصعبها الملفوف.

٣٠٤٩٨ - وَدَيْشَة حَنْطِيَّة *، كَرْبُفِيل حَنْطِي

Carpophilus dimidiatus (S). Carpophile brune (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القند، طولها نحو ٣ مم. ثوبها إلى الحنفلي الاسمر المواج. تركيب النيار الجافة قنصرها مع ريقها وتنطها.

٣٠٤٩٩ - وَدَيْشَة غَبْرَاءَة *، صُرُونِيَّة رَسَادِيَّة

Soronia grisea (S). Soronie grise (F).

حشرة من الوديشات، طولها براوح من ٢ إلى ٥ مم. ثوبها حنفلي اللون يطولو بتبيج ويتجمع اسمر. زبابانها وأرجلها حنفية. تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية والمثمرة.

٣٠٥٠٠ - وَدَيْشَات

Nitidulidae (S).

Nitidulidés (F). Nitidulidae, Sap-feeding beetles,

Sour bugs (E). Glanzkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة عُمديات الأجنحة. اجسامها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القند بيضية الشكل مغلطة. قربونها الاستثمارية صولجانية مركبة. ١١ فاصلة. ارسافها خاسية أو مختلفة الاجزاء. تعيش على الاغذاء وتحت لحاء الاشجار وعلى المواد العضوية الحيوانية والنباتية الجافة.

٣٠٥٠١ - وَدَيْشَة *، وَدَيْشَة

Protoplasme (F). Protoplasm (E).

هي البروتوبلازما، المادة التي تتكون منها حبيرة أو خلية الاجسام الحية.

٣٠٥٠٢ - وَدَيْشَة

Protoplasmique (F).

Protoplasmic (E).

ما هو متعلق بالوديشة اي بالمادة الاولية الحجرية أو الخلية.

٣٠٥٠٣ - وَدَمَاء

Bréhaïne (F). Barren (E).

الودماء العاقر. نعت تعريفي يطلق على كل انثى عاقر من الحيوان.

٣٠٥٠٤ - وَدَمَة

Edème (F). Edema (E).

هي الاوذما اي الاستسقاء اللوزني.



وديشة مبدولة



وديشة التنوب



وديشة النيار الجافة



وديشة السلجم



وديشة الملفوف



وديشة حنطية



وديشة غبراء

* وَرْدَةٌ صَبَاحِيْن ٣٠٥١٤

Serratula tinctoria (S). *Sarrette des teinturiers* (F). نوع من الورخ ، ساقها منتصبه سرحة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها لا قياسية التفريص . رؤيساتها الزهرية عثكولية التجميع ، كثيرة العدد ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهارها متساوية القد قريزية اللون . قنايات قلافاها خضر الصفحات الخارجية حر المواج || وهي نبات خضابي يستخرج من ازهاره وسوقه وجذوره صباج يفتق اللون مرغوب فيه || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٣٠٥١٥ وَرْدَةٌ خُحَاسِيَّةُ التَّفْصِيسِ

Serratula quinquefolia (S). *Sarrette à 5 folioles* (F). نوع من الورخ ، بجملته فروع الساق تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. فروعها منتصبه زياه اللحاء . اوراقها خماسية التفصيص . فصوصها المتقابلة سنانية الشكل صغيرة القد ، فصها الاخير كبير القد مستدق القاعدة . نصلها ماس الصفحة مسنن الحافة . رؤيساتها الزهرية طرية الارتكاز ، فردية || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٣٠٥١٦ وَرْدَةٌ شَعَاعِيَّةُ

Serratula radiata (S). *Sarrette radiée* (F). نوع من الورخ ، بجملته صغيرة القد فروع تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. فروعها منتصبه زياه اللحاء . اوراقها خطية التفريص ، فروعها تعد من ١٩ الى ٢١ ، جميعها مسنة الحافة . رؤيساتها الزهرية طرية الارتكاز ، فردية التجميع ، شعاعية التركيب والشكل . ازهارها حراء اللون قريزية المواج . تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٣٠٥١٧ وَرْدَةٌ عُرُطِيَّةُ

Serratula centauroides (S). *Sarrette centaurée* (F). نوع من الورخ ، بجملته تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ساقها فروع . فروعها سرحة . اوراقها كبيرة القد عرطية الشكل ، كثيرة التفصيص . نصلها مسنن الحافة ، اخضر الصفحة العليا المماسية ، اطحل السفلى المزغفرة . رؤيساتها الزهرية طرية الارتكاز ، فردية التجميع ، كبيرة القد ، قطرها براوح من ٦ الى ٧ سم. لونها الى البياض الناصع . قنايات قلافاها حنطية اللون مهذبة الخطار || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٥١٨ وَرْدَةٌ مُتَوَجِّعَةُ

Serratula coronata (S). *Sarrette couronnée* (F). نوع من الورخ ، بجملته منتصبه قليلة الفروع تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. فروعها سرحة . اوراقها مفصصة لا قياسية الترتيب . نصلها ماس الصفحة ، مسنن الحافة . رؤيساتها الزهرية طرية الارتكاز فردية التجميع . ازهارها قريزية اللون ، الخارجية منها اطول من الوسطى والوسطى اطول من المركزية . قنايات قلافاها زغبية البشرة عل صفحتها الخارجية || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٣٠٥١٩ - وَرْدٌ هو القطيع من الطير .

٣٠٥٢٠ وَرْدٌ

Lion du Guzerat (F).

هو اسد الهند ، اعليه .

٣٠٥٢١ وَرْدٌ ، جُلٌّ

Rosa (S).

Rosier (F). Rose-tree, Rose-bush (E). Rose (D). Rosa, Rosajo (I).

جلس نباتات جنينة معمرة من فصيلة الورديات . انواعه

Ultra-violet

٣٠٥٥٥ وَرَاءَ الْبَيْتِ سَجِي

Hérédité (F). *Heredity* (E). وَرْدَةٌ هي انتقال صفات الآباء الى انسالهم وسلالاتهم الى الحيوان والنبات تباً لنظام خاص يعرف بقانون الوراثة . وتعتبر الوراثة من العلوم الحديثة التي احتلت مكاناً هاماً في ديس الاحياء ويميزى الففضل في لفت الانتظار اليها الى اباحت العلماء « مندل » .

٣٠٥٥٧ وَرْدَاشَةٌ

Bembex (S).

Bembex (F). Bembex (E).

جنس حشرات قانصة وانجبة نافعة من الحويوات غشائيات الاجنحة المحصورة وفضيلة الانليات ، انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتندلة الحارة || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . اثارها ملوكة يكثر فيها الاصفر المخلج بالاسود ثم الاصفر الاخضر البليج بالاسود || جميعها تصفن في التربة . اصفاها رداء قميصية . متراكبة الخلايا المسدسة السطوح تغور من ٣ الى ٧ سم. مداخلها انبوبية منحرفة نحو سطح التربة || قوتها الذباب والحمام والصغير من ذوات الجناحين تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصفاها زادا لها وليرقاتها .

٣٠٥٥٨ - وَرَاقٌ

Feuillaison (F). Folliation (E).

وقت خروج الورق .

Urania (S).

Uranie (F). Urania (E).

جنس حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة وفضيلة الورديات ، انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها يمتد من تهام البحر الاخر الى بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر || جميعها كبيرة القد ، مذنبية الراوش الخلفية ، جميلة الزخارف والالوان البنية المتداخلة || ريقاتها الى البياض الكبريتي المواج تعلوه نمشة سوداء . رؤوسها صفراء اللون او حراء . اجسامها الحولية ثلاثة .

٣٠٥١٠ وَرْدَانِيَّاتٌ

Uranidae (S).

Uranidés (F). Uranidae (E).

فضيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر || جميع انواعها كبيرة القد ، متراكبة الالوان الزاهية اللامعة || اعرف اجناسها واشهرها الوران .

٣٠٥١١ - وَرْبٌ الورب : وجار الوحشي .

٣٠٥١٢ وَرَّةٌ

Trou de plantation (F).

الوردة : الحفرة الصغيرة المعدة لاقتبال الفرس .

Serratula (S).

Sarrette, *Serrate*, *Serratule* (F). *Saw-wort*, *Dyer's savory* (E). *Färbescharte* (D). *Serratola*, *Sarretta*, *Serretta* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة ، معظمها بري وبعضها تربيني . اوراقها شوكية لا قياسية التفريص . رؤيساتها اسطوانية . ازهارها انبوبية . يزورها ذنعية الغنط . تعيش في جميع الارربة الزراعية وتكثر بالبذر . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



وردة الصباحين

الخضار الأزرق . أزهاره عكوكلي التجميع . أزهاره عادمة العرف ، حراء اللون ، صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. || تنوره يستمر من حزيران إلى آب .

٣٠٥٢٦ - وَرْدْ أَصْفَرْ * ، وَعَاط

Rosa lutea (S). Rosier jaune (F). Austrian briar (E). Gelbe Rose (D). Rosa canina lutea, R. c. fetida (I). نوع من الورد البروتي . جنبته مدادة تطلو من ٢ الى ٤ أمتار . ساقه وفروعه متبادعة المناخس الجالسة أو القليلة الإحديداب . أوراقه لا قياسية التركيب تتألف من ٥ او ٧ أو ٩ وريقات . وريقاته أهليجية الشكل . نصلها مستن الحافة بارز المروق . أزهاره صفراء اللون كرية الرائحة ، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز .



ورد احمر

٣٠٥٢٧ - وَرْدْ الْبَنَفَسَج

Rosa Banksiae (S). Rosier de Banks (F). قرع من الورد الجادح الذي يتطلب موائل خاصة ، مرضها الجنوب . جنبته تطلو من ٣ الى ١٠ أمتار ، فروعه نحلة عادمة الشوك . أوراقها خماسية أو سباعية التركيب غرزية الزينات . وريقاتها مائلة لامعة . نصلها مستن الحافة خلي الضلع . أزهارها غمي التجميع . أزهارها صغيرة القد ، بنفسجية العرف ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران إلى تموز .

المعروفة زهاء ٥٥ ، ضروبه وأصرامه وجهته لا تقل عن ٧٠٠٠ ، سوقها شائكة منتصبة أو مدادة ، شوكة او مناخسها غمرولية الشكل مدبية الحمة المحجنة . أوراقها مركبة متناقبة . أزهارها طولية الارتكاز ، فدية أو عكوكلية التجميع . كؤوسها لا قياسية التفصيص يكثر فيها الخميس . بتلات توجيحاتها لا نظامية العدد منها الرباعية والخامسة والكثيرة العدد . أسديتها عديدة . خدورها طليقة وحيدة المساكين . بزورها بيضبة صغيرة خلية البشرة . يعتبر الورد من أشهر النباتات التزيينية وأجسها للانسان وأرقاها . يحوي في جميع الأثرية القليلة الاندماج . يرغب في الخصبية ولا يصمر كثيرا في الرمية . يتكاثر بالفسائل والمقل والبذور والتعلم . يستخرج من زهر بعض أنواعه ، بالتقطير ، دهن الورد وماء الورد || أشهر أنواعه ما يتبع .

٣٠٥٢٨ - وَرْدْ أَبْيَضْ

Rosa sempervirens (S). Rosier toujours vert (F). نوع من الورد الرف ، جنبته مدادة تطلو من ٤ الى ٦ أمتار . فروعه سريعة مستطيلة . أوراقه ابيدة ، خاسية أو سباعية التركيب . وريقاتها جلدية النصل اللامع العادم الحمل . أزهاره عطرية العرف ، كبيرة القد ، قصيرة النصل ، يبيضاه اللون أو قشدية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران .

٣٠٥٢٩ - وَرْدْ أَبْيَضْ ، وَتِير

Rosa alba (S). Rosier blanc (F). White rose, Single white rose (E). Weisse Rose, W. Gartenrose (D). Rosa bianca, R. angiola, R. carnica (I). نوع من الورد البروتي . جنبته تطلو من ٢ الى ٤ أمتار . ساقها منتصبة ، فروعه متدلية . مناخسها لا قياسية الترتيب والحجم والتجسين . أوراقها سباعية التركيب . وريقاتها بيضبة الشكل ، نصلها أخضر اللون ، مالم الصفعة العليا ، خلي السفل . أزهارها نورتي التجميع . أزهارها كبيرة القد ، يبيضاه اللون ، مستحبة العرف || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٥٣٠ - وَرْدْ أَحْمَرْ * ، حَوْجَم

Rosa gallica (S). Rosier de France, R. de provins, R. rouge (F). French rose, Common rose (E). Gallic Rose (D). Rosa domestica, R. incarnata, R. d'orto (I). نوع من الورد البروتي . أصرامه وجهته كثيرة العدد . سوقها وفروعها مستطيلة . مناخسها كثيفة التجميع لا قياسية الارتكاز ، حادة الحمة المحدودية . أوراقها ثلاثية أو خماسية التركيب . وريقاتها كبيرة القد مستطيلة ؛ نصلها غشخ الملس مستن الحافة . أزهارها كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم. || تنوره يستمر من أيار إلى تموز .

٣٠٥٣١ - وَرْدْ أَحْمَرُ الْوَرَقْ

Rosa rubrifolia (S). Rosier à feuilles rouges (F). نوع من الورد البروتي الميائل . ساقه تطلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . مناخسها متساوية القد ، ميمرة التجميع . فروعه موزوية اللون ، خلية اللحاء ، متبادعة المناخس الجالسة أو القليلة الإحديداب . أوراقه خماسية أو سباعية التركيب وريقاته حر الزخات والأهن والفسلوع ، نصلها مالم الصفعة ، خلي الضلع الناشزة ، لونه إلى

٣٠٥٣٢ - وَرْدْ الْحَمْلُ ، وَرْدْ مَدَّاد

Rosa arvensis (S). Rosier rampant, R. d'Ayrshire (F). نوع من الورد الجادح . جنبته مدادة تطلو من ٢ الى ٤ أمتار . فروعه دقيقة مستطيلة ، مناخسها متوسطة التحديق . أوراقه ثلاثية أو خاسية أو سباعية التركيب ، وريقاتها أهليجية ستانية ؛ نصلها عاكب اللون ، متوسط اللعة ، خلي الضلع . أزهاره متوسطة القد ، قليلة العرف ، حراء اللون أو وردية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران .

٣٠٥٣٣ - وَرْدْ الْحَبَّارْ

Bupthalma fétide (F). نوع الريد النتن ، اطليه .

٣٠٥٣٤ - وَرْدْ الزَّوْكَانِي

Ketmie de Syrie (F). هو الخطي السوري ، اطليه .

٣٠٥٣٥ - وَرْدْ السَّمَاءْ

هو اللخيس ، اطليه .

٣٠٥٣٦ - وَرْدْ السَّجَاجْ

Rosa agrestis, R. sepium (S). Rosier des haies (F). نوع من الورد البروتي الميائل . جنبته تطلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها وفروعها كثيفة المناخس المتساوية القد ، القليلة الإحديداب . أوراقها خماسية أو سباعية التركيب ، وريقاتها ثنائية التستين ؛ نصلها مالم الصفعة عاكب الخضار . أزهاره صغيرة القد ، يبيضاه اللون أو وردية ، مستحبة العرف العطري || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٥٣٧ - وَرْدْ الشَّاهِي

Rosier thé (F). هو ورد الهند ، اطليه .

٣٠٥٣٨ - وَرْدْ الشَّمْسْ

هو الديدمان المستدير الورق .



ورد اصفر

منها دهن الورد ودم الورد. || تنوره يستمر من الربيع الى الآخر الخريف .

٣٠٥٤٣ - وَرْد حَرِشْ *

Rosa rugosa (S).
Rosier rugueux (F).
نوع من الورد السبروتي. اصراعه كثيرة العدد، ساقها منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. مناخسها متباعدة، ثنائية الترتيب، قليلة التجميع. فروعها زياء السماء متقاربة المناسخ اللانسياسية الحجم. اوراقها لا نظامية التركيب، ورتية التجميع، تتألف من ٣ الى ٩ ورديات فصلها متممع الصفحة، باث اللون، خلي البشرة السفلى. ازهارها فردي او ثلاثي التجميع. ازهارها عطرة متفاوتة اللد تختلف باختلاف الاصرام، قطرها يراوح من ٦ الى ٩ سم. ثمارها كروية الشكل كبيرة اللد لها الى الحفرة الزاهية. تنوره يستمر من ايار الى حزيران.

٣٠٥٤٤ - وَرْد تَحْلِي

Rosa villosa, R. pomifera (S). Rosier velouté (F).
نوع من الورد السبروتي المبدول. جنبته مدادة تطول نحو ٤ امتار، ساقها وفروعها متباعدة المناسخ المتساوية اللد قليلة الاحدياد. اوراقها مركبة تتألف من ٧ او ٩ وريقة، فصلها خلي البشرة على صفحته. ازهارها عطرية العرف حراء اللون، قطرها يراوح من ٦ الى ٩ سم. فصلها وثمارها هلبية البشرة || تنوره يستمر من سزيان الى آب.

٣٠٥٤٥ - وَرْد صَغِيرِ الْوَرَقِ

Rosa microphylla (S). Rosier à petites feuilles (F).
نوع من الورد، ساقه منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعها عادمة الزغب، ثنائية المناسخ المستقيمة المراسا اللون. اوراقها ابيدة، مركبة، تتألف من ١١ او ١٣ وريقة. فصلها جامد الصفحة اخضر اللون. ازهارها وردية اللون او بيضاء، قطرها يراوح من ٦ الى ٧ سم. || تنوره يستمر من آب الى تشرين.

٣٠٥٤٦ - وَرْد عَجَمِي

Rosa persica (S).
Rosier à feuilles d'épine-vinette (F).
نوع من الورد السبروتي، بجته تملو نحو ٦٠ سم. ساقه وفروعها قليلة المناسخ المتباعدة. اوراقها كاملة بسيطة، فصلها مسن الحافة، بحري اللون على صفحته، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ويرض من ٥ الى ١٥. ازهارها طرفية فردية، لها الى الصغار الموشع بالاحمر || تنوره يستمر طول شهر حزيران.

٣٠٥٤٧ - وَرْد فِيرْجِينِيَّة

Rosa virginiana, R. fraxinifolia, R. blanda (S). Rosier de Virginie (F).
نوع من الورد السبروتي. مهد البلاد الامريكية. جنبته تملو من ٢ الى ٣ امتار. ساقها وفروعها جزوية اللحاء، مناخسها لا قياسية الحجم والترتيب والتجسين. اوراقها خاسية او سباعية التركيب، وريقاتها صغيرة اللد اهليجية الشكل، فصلها جامد الصفحة، متباعد التنسين، قليل الزغب على الجهة السفلى. ازهارها كبيرة اللد حراء اللون لا نظامية التجميع || تنوره يستمر من حزيران الى تموز.

٣٠٥٤٨ - وَرْد فِينِي

Rosa phaenicia (S).
Rosier de Phénicie (F).
نوع من الورد البري المبدول في جبال لبنان والمولوين.

Rose de Chine (F).
٣٠٥٤٥ - وَرْد الصين
هو الأجره الهندي، اطلبه.

٣٠٥٤٦ - وَرْد المَرَايِ

Rosa setigera (S).
Rosier de la prairie (F).
نوع من الورد السبروتي. جنبته مدادة تطول من ٣ الى ٦ امتار، فروعها سريعة، مناخسها غليظة جالسة. اوراقه ثلاثية او خاسية التركيب. وريقاته اهليجية مسنة، فصلها اخضر الصفحة العليا، خلي السفلى الغبراء اللون. زيمتا اوراقه واعناقها هلبية الحمار. ازهارها عشكولي التجميع. ازهارها عادمة العرف بيضاء اللون او وردية. تنوره يستمر طول شهر تموز.

٣٠٥٤٧ - وَرْد النَيْسِلْ

Pastel des teinturiers (F).
هو وسمة الصباغين، اطلبها.

٣٠٥٤٨ - وَرْد الهِنْدِ، وَرْد الشَّاي، عُرْشِي

Rosa indica (S). Rosier de l'Inde, R. thé (F).
نوع من الورد السبروتي الشائع الزراعة. اصراعه وجهته كثيرة العدد. ساقه منتصبه تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه ثلاثية او خاسية او سباعية التركيب. وريقاته اهليجية مدبية، فصلها لامع البشرة عايق الخصار. ازهارها متوسطة اللد قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم. الوانها تختلف باختلاف الصرم والمخلج، يكثر فيها الاصفر والبرتقالي والاحمر ومشتقاتها. || تنوره يستمر طول فصل الربيع والصيف والخريف.

٣٠٥٤٩ - وَرْد بَرِّي

Eglantier (F).
هو التسنين، اطلبه.

٣٠٥٥٠ - وَرْد بِلَانِي

Rosa pimpinellifolia (S).
Rosier pimprenelle (F).
نوع من الورد السبروتي. جنبته تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقها وفروعها كثيرة المناسخ والمحب. اوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ او ٧ الى ٩ وريقة. وريقاتها ثلاثية الشكل، فصلها خلي الصفحة السفلى، وفي المراج. ازهارها صغيرة اللد قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. لها يختلف باختلاف الصرم منه اليباض والوردي والاصفر. تنوره يستمر من ايار الى حزيران.

٣٠٥٥١ - وَرْد جَبَارِ

Rosa gigantea (S).
Rosier géant (F).
نوع من الورد السبروتي العارش. جنبته تطول من ١٠ الى ١٢ م. ساقه وفروعها عادمة الشوك. اوراقه خاسية او سباعية التركيب. وريقاته اهليجية الشكل فصلها ماس اللون البشرة على صفحته. ازهارها كبيرة اللد قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. لها الى اليباض التني او الصغار الباهت. تنوره يستمر طول شهر ايار.

٣٠٥٥٢ - وَرْد جُورِي، وَرْد بَلَدِي، وَرْد شَامِي

Rosa damascena (S). Rosier de Damas, R. des quatre saisons (F). Damask rose (E). Damaszenerrose (D). Rosa damaschina, R. delle quattro stagioni (I).
نوع من الورد السبروتي المبدول. جنبته تملو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة الشوك. مناخسها حادة الحمة المجنبة. اوراقها خاسية او سباعية التركيب وريقاتها بيفية الشكل، جامدة التصل المسن الحافة. ازهارها وردية اللون، كبيرة اللد، فواصة العرف المعطري، يستقر



ورد حرش

لونها الى الازيس او الوردي ؛ فصلها تنتهي برؤائد وريقة .
تنوره يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٥٤ - **وَرْدَ مَسْكِيَّ***
Rosa moschata (S).
Rosier musqué (F). *Muskatrose*,
Bismarose (D). *Rosa muschata* (I).

نوع من الورد . ساقه منتصبه تملو نحو ٣ امتار ، فروعه
مستطيلة مثدية . اوراقه خماسية او سباعية او تساعية
التركيب . وريقاته فضية سناينة ؛ فصلها مائل للصفحة
العليا ، خلي السفلي . ازهاره عتكرولي التجميع . ازهاره
مسكية العرف ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم . لونها الى
البياض الاصفر || تنوره يستمر من تموز الى تشرين .

٣٠٥٥ - **وَرْدَ كَانِي**
Colombi-moineau (F).
جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه قليلة المدد جميعها
ربعة الجسم ، صغيرة الرأس ، قصيرة العنق ، معتدلة
الجناح ، مستديرة الانفيك القصير ، نحيلة المنقار ، عارية
الرسم || اشهر انواعه الورداني المطروق .

٣٠٥٦ - **وَرْدَ كَانِي مَطُوق**
Chamaepelia passerina (S). *Colombi-moineau pas-*
sarine, *Pigeon de terre* (F). *White-throat* (E).
نوع من الورداني وهو طائر متوسط القد . طوله نحو ١٨ سم .
ثوبه الى الصهبة الزرادية . رأسه وقرنيه وصفه زرق المراج .
عنقه مطوق بالابيض . جناحه اغمر الزرقه تملو وشمه
سمراء صفراء المراج . قوادمه واباهره حر الالوان الحارجر .
بيض الداخل . عيناه برتقالية اللون ، منقاره وساقاه حر .
يألف المراعي والسهول المزروعة والحدائق والبساتين . سره
يعد من ١٠ الى ١٦ . قوته الحبوب والبزور على اختلافها .
يدشن في الجنيات والادغال . انشاء تحضن سنوياً من مرتين
الى ثلاث مرات ، حضنتها ييشتان .

٣٠٥٧ - **وَرْدَ الْيَتَات**
Blattopteroïdes (F).
طبقه من الحشرات تنتمي الى شعبة البرقائيات وطلافة
المنحنيات اصل . رئيسها الحالية ثلاث : السرغائيات
والعفغائيات والسرغائيات . اشكالها واحجامها عديدة ومختلفة .
تتميز بارساغها المركبة التي يلب فيها التحشيش .

٣٠٥٨ - **وَرْدَة**
Rose (F).
زهرة الورد . اشكالها واحجامها وعدد بتلاتها والوانها وعرفها
تختلف باختلاف النوع والرم .

٣٠٥٩ - **وَرْدَة اُرْبَحَا** هي كف العذراء ، اطلبها .

٣٠٥٩ - **وَرْدَة التيل** هي لوسل التيل ، اطلبه .

٣٠٥٦١ - **وَرْدَة الحيند** هي الخفلية المنتصبه ، اطلبها .

٣٠٥٦٢ - **وَرْدَة السيان** هي الكاكيله ، اطلبها .

٣٠٥٦٣ - **وَرْدِيَّات**
Rosaceae (S).
Rosacées (F). *Rosaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين مدلية خاصة معرضها
المعروفة زهاء ١٠٠٠ تنتمي الى ٧٠ جنساً تجمعها عدة
اسباط . نباتاتها بمجموعة كاملة من الاشباب والجنابات
والشجيرات والاشجار . اوراقها متشابهة مختلفة الاشكال
والترتيب . ازهارها نوري التجميع . ازهارها خشوية .
ثمارها متجانسة الاشكال والاجسام والالوان . وهي تشمل

يرغب في المواقع الربطية . جنبته منتصبه حزمية الفروع
تملو من ٨٠ الى ٢٥٠ سم . مناسخها متينة مجتمعة مبرنة
لا قياسية التجميع . اوراقها ثلاثية او خماسية التركيب .
وريقاتها اهلجية الشكل . فصلها ازغب البشرة على
صفحتيه . ازهارها عتكرولي التجميع . ازهارها صغيرة القد
بيضاء اللون خابطة العرف || تنوره يستمر من ايار الى
آب .

٣٠٥٤٩ - **وَرْدَ قَيْنَانِي**
Rosa bracteata (S).
Rosier bractéolé (F).

نوع من الورد الجادح الذي يتطلب مواعع معينة معرضها
الجنوب . جنبته تقوّل من ٣ الى ٤ امتار . ساقه وفروعه
مزغرة اللحاء ، مبرنة المناسخ المجتمعة . اوراقه تساعية
التركيب ، زخماها مفروسة مهدية الخمار . وريقاته اهلجية
الشكل ، فصلها لامع الصفحة العليا خلي السفلي الصفراء
اللون . ازهاره كبيرة القد ، مشمشية العرف ، بيضاء
اللون ، مطوقة بقلادة من القناب || تنوره يستمر طوال
شهر تموز .

٣٠٥٥٠ - **وَرْدَ كَثِير الزهر ***

Rosa multiflora (S). *Rosier multiflore* (F).
نوع من الورد البروتي المداد . جنبته تقوّل من ٤ الى
٦ امتار . فروعه سريعة مستطيلة . اوراقه خماسية او
سباعية او تساعية التركيب . وريقاته اهلجية الشكل ؛
فصلها مائل للصفحة العليا خلي السفلي . زخماها مهدية
التسعين المشطلي . ازهاره هرمي المنقود . ازهاره متوسطة
القد ، كثيرة المدد ، بيضاء اللون او وردية || تنوره
يستمر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

٣٠٥٥١ - **وَرْدَ كَرْوَلِيْشَة**
Rosa carolina (S).
Rosier de la Caroline (F).

نوع من الورد البروتي ، يرغب في المواقع الربطية . جنبته
منتصبه الساق تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه وفروعه
جزوية اللون ، ثنائية المناسخ المجتمعة . اوراقه لا قياسية
التركيب منها الثلاثية والخماسية والسباعية والتساعية . وريقاته
اهلجية الشكل ؛ فصلها منشاري الحافة خلي البشرة السفلي .
ازهاره فردية ، وردية اللون ، كثيرة المدد ، قطرها يراوح
من ٤ الى ٧ سم . || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٣٠٥٥٢ - **وَرْدَ لَمَاع**
Rosa nitida (S).
Rosier brillant (F).

نوع من الورد . جنبته صغيرة القد ، ساقها تملو من
٤٠ الى ٦٠ سم . مناسخها ثنائية ، متفرقة ، جالسة
الانتصاب ، كثيرة الهاب . اوراقها لا قياسية التركيب ،
وردية التجميع ، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات ؛ فصلها
مائل البشرة على صفحتيه ، شديد الزهراء واللحمة ، مسن
الحافة . ازهارها عادمة العرف ، قطرها يراوح من ٣ الى
٦ سم . لونها الى الحمرة الزاهية البراقة || تنوره يستمر
طوال فصل الصيف .

٣٠٥٥٣ - **وَرْدَ مَعْتَلَّ الْأُورَاق**
Rosa laevigata (S). *Rosier trifoliolé* (F).

نوع من الورد الجادح الذي يتطلب مواعع خاصة معرضها
الجنوب . جنبته مستطيلة تقوّل نحو ٤ امتار ساقها وفروعه
كبيرة الشوك ، غليظة المناسخ المجتمعة . اوراقها ثلاثية
التركيب ، مخززية الزنات . وريقاتها سناينة مستطيلة
المقصنة المدية . فصلها مسن الحافة لامع البشرة السرسه
على صفحتيه . ازهارها قليلة العرف قطرها نحو ٧ سم .



ورد كبير الزهر



ورد مسكي

des bois (F). Wood pigeon, Ring-dove (E). Ringeltaube (D).

نوع من الحمام البري ، كبير الجثة ، طولوه نحو ٤٥ سم . رأسه وعنقه وزنكاه الى الرمادي الأزرق . ظهره وجناحاه الى الرمادي الاسمر . زوره وصدره وبطنه متراكبة الا لوان فيها الرصاصي والرمادي والازرق والاحمر والاشقر . جميعها سفاه المواج || ضرابه عديدة معظمها من القواطع يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي . اوابده قليلة اعطاه البلاد الحارة . وهو يائث الاحراج والغابات . يعيش اسراباً كبيرة العدد . قوته الثار والحبوب والبزور . يدثن في الاشجار . يبيض ويبيض من مرة الى مرتين في السنة . ج وراشين وورشان .

Epilatre de Germanie (F). **وَرْدِيَّة** - ٣٠٥٧١
هي السطاس الجرماني ، اطلبه .

وَرَق - ٣٠٥٧٢
ورق النبات : نسر واهتر فهو وارث اي ناسر راف شيد الخصرة .

Sideroxylon (S). **وَرَق** *
Sideroxyle, Bois de fer blanc, Bois de sable (F). Iron wood (E). Eisenbaum (D). Bumelia, Legno ferro (I).

جنس نباتات حرجية وزراعية من فصيلة الطلحيات . انواعه زعم ٨٠ منها الاشجار الكبيرة الشائعة والمتوسطة القد والصغيرة . اوراقها متعاقبة مستطيلة جلدية التصل . ازهارها ابضية الارتكاز ، صغيرة القد ، قصيرة الزناد ، صفراء اللون . ثمارها لوزية الشكل والقصد ، بعضها مأكول او دهي المصارة الصناعية وبعضها لا يصلح لشيء . اخشابها شديدة الصلابة ، تبنية اللون ، يدعونها غشب الحديد الأبيض . قشورها طيبة مضادة للحميات .

Morceler, Partager (F). **وَرَق** - ٣٠٥٧٤
To parcel out, To divide (E). ورق الارض : قسمها .

Urvillea (S). **وَرْدِيَّة** *
Urvillée (F). Urvillea (E).
جنس نباتات عارشة ، معمرة ، برية وتزدينية من فصيلة السابنديبات . انواعها المعروفة ثمانية ، مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية الحارة || سوقها مزينة للسما ، فراء . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات الكفكية المحرفة . حوائطها مستطيلة ، متشعبة . ازهارها عنقودي التجميع ، ابلي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، رباعية البتلات المستقلة ، متباينة الالوان ، منها الابيض والاصفر والوردي والاحمر المختلف الماهجات || تزويرها ربيعي او صيفي .

Papiers (F). Papers (E). **وَرَق** - ٣٠٥٧٦
صعائف ورقية رقيقة مصقولة تصنع من مختلف المسواد النباتية ، اخصها الخشب ، بمد تحويلها الى عجينة يمكن مدها وتوطيدها وصقلها .

Effeuillage (F). **وَرَق** ، **مَشَق** - ٣٠٥٧٧
Stripping of the leaves (E).
ورق الشجرة : انزع ورقها .

اكبر مجموعة من الاشجار الزراعية المثمرة وما لا يستهان به من النباتات العطرية والطبية . اسباطها ما يتبع :

Pirées, Pomacées (F). **نفاحيات**
Chrysobalanées (F). **إيكاكيات**
Potérilées (F). **بلاليات**
Rosées (F). **جليات**
Dryadées (F). **دندميات**
Spirées (F). **عراويات**
Rubées (F). **علقيات**
Fragarilées, Potentillées (F). **فراويات ، شيلكيات**
Quillaées (F). **كلاجيات**
Amygdalées, Prunées (F). **لوزيات**
Neuradées (F). **نورديات**

وَرْدِيَّة - ٣٠٥٦٤
هي العسل ، اطلبه .

وَرَس - ٣٠٥٦٥
ورس النبات اخضر . وورس الصخرة في الماء : ركبها الخث .

وَرَس * ، **غُمرَة** - ٣٠٥٦٦
Memecylon tinctorium (S). Mémécyle tinctorial (F). Ceylon cornel tree (E). Safranbaum, Beerenbaum (D). Corniolo (I).
شجيرة برية وزراعية من الورسيات وفصيلة القرانيات . اوراقها منعقة متقابلة . نصلها سناني الشكل ، جامد الصفعة . ازهارها ضمية التجميع محورية الارتكاز متقابلة التصفيح . اوراقها غضائية مشهورة يستخرج منها صباغ احمر اللون .

وَرَس مَلَوْتَا - ٣٠٥٦٧
هو القنبيل ، اطلبه .

وَرَسِي * - ٣٠٥٦٨
Pelopus (S). Pellopa (F).
طائر من الحمام الوحشي شبيه بالترفة . موطنه يمتد من الهند الى جزر اقيانية . يعتنر من الضروب التي تجرب البلاد في طلب الرزق . ملحنه احيائي جامعي . جماعته متوسطة العدد . قوته البزور وبعض الحشرات || جسمه معتدل القد يطول نحو ٣٢ سم . ثوبه اخضر الرأس والرداء والجناح والذنب ، صنابي الصدر المؤتم بالاحمر ، اصفر البطن المشع بالوردي || يدثن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين الى ثلاث مرات في المحل . حفصتها بيشتان . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

وَرَسِيَّات - ٣٠٥٦٩
Mémécylées (F).
سبط من فصيلة القرانيات . اجناسه وانواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنبات . جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها سنانية منعقة متقابلة . ازهارها شكلوية التجميع ، محورية الارتكاز ، متقابلة الترتيب ، صغيرة القد . ثمارها غنية التكوين بعضها مأكول مستحب العلم . منها انواع صناعية صبغية الالوان اشهرها الورس .

وَرَشَان * - ٣٠٥٧٠
Columba palumbus (S).
Colombe ramier, Grand ramier, Palomba, Pigeon



ورس



ورسي



ورشان



ورق



ورقة



ورواق

Feuille crépue
Feuille alguë
Feuille auriculée
Feuille curvinervée
Feuille verticillée
Feuille linéaire
Feuille peltée
Feuille peltinervée
Feuille pétiolée
Feuille lyrée
Feuille mucronée
Feuille pennée
Feuille penninervée
Feuille pennatifide
Feuille pennatifidite
Feuille pennatifidulée
Feuille lancéolée
Feuille sagittée
Feuille spinuleuse
Feuille entière
Feuille hastée
Feuille engainante
Feuille roncinée
Feuille décurrense
Feuille palmée
Feuille palmatinervée
Feuille palmatifide
Feuille palmatifidite
Feuille palmatifidulée
Feuille sessile
Feuille spiralee
Feuille connée
Feuille alterne
Feuille opposée
Feuille déscussée
Feuille boursofflée
Feuille perforlée
Feuille dentée
Feuille subulée
Feuille composée
Feuille rectinervée
Feuille laciniée
Feuille pétiolée
Feuille crénelée
Feuille séquée
Feuille émarginée
Feuille tronquée

ورقة جعداء، مجمدة
ورقة حادة، مدببة
ورقة حاصنة
ورقة حدياء العروق
ورقة حلقية
ورقة خطية
ورقة درقية
ورقة درقية العروق
ورقة دوارية
ورقة رباعية
ورقة رهاية
ورقة ريشية
ورقة ريشية العروق
ورقة ريشية مخرومة
ورقة ريشية مشرمة
ورقة ريشية ملفقة
ورقة سنانية
ورقة سهمية
ورقة شوكية
ورقة صحفية، كاملة
ورقة طبرزينية
ورقة غمدية
ورقة فأرية
ورقة نقفاء
ورقة كفية
ورقة كفية العروق
ورقة كفية مخرومة
ورقة كفية مشرمة
ورقة كفية ملفقة
ورقة لاطنة
ورقة لولبية
ورقة متحدة
ورقة متعالية
ورقة متقابلة
ورقة متقاطعة
ورقة متجمعة
ورقة مثقوبة
ورقة مخززة، مسننة
ورقة مخززية
ورقة مركبة
ورقة مستقيمة العروق
ورقة مشرشرة
ورقة منقطة
ورقة مفروضة
ورقة ملفقة
ورقة مفروقة
ورقة مقطوعة

Billet de banque (F).

Bank-note, Bank-bill (E).

هو من السندات التي تصدرها مصارف الإصدار وتلتزم بها أن تدفع نقداً لحاملها لدى الإطلاع مبلغاً معيناً فيها .

Papier filtre (F).

Filter paper (E).

٣٠٥٧٩ - رَوَقُ شَائِلٍ

Chalcophaps (S).

Chalcophaps (F).

طائر من الفصائل ينتمي إلى فصيلة الحماميات . موطنه يمتد من الجزيرة العربية إلى الصين واليابان . ينتقل مع فصول السنة من مكان إلى مكان . ملجئه الحياتي زويبي الأ في زمن الرحيل . يألف الإحراج والبراري . يعدو على الأرض بصفعة ويظهر بسرعة فائقة . قوته الحبوب والبرور البرية وبضغ الحشرات || جسمه معتدل القد ، يطول نحو ٤٢ سم . قوته متداخل الشبهة والريدة والكهبة ، جميعها سفهاء المراج ، ويعمل في أواخر الظهور خطان أغبران . ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف . متقاد وقائمته إصابعه إلى السمرة الزيتية || يدن عشه في الأشجار الرقيقة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في العام . حضنتها ببضتان فقط .

Chape (F).

Cope (E).

٣٠٥٨١ - رَوَقَة ، إَصَاد ، شَيْد

هو ما طلي به الحائط ونحوه .

Feuille (F). Leaf (E).

٣٠٥٨٢ - رَوَقَة

هي في النبات عضو التشثيل والتنفس والتيح الذي يستمد طاقته الفعالية من الضوء والهواء . تتركب الورقة من ثلاثة اجزاء : النصل والعنق والقاعدة . فالنصل هو الصحيفة الخضراء التي يملؤها الخشب ، يتكون هيكله من ضلع وعروق وأصابع يختلف وضعها وتوازنها وشبكها باختلاف الفصيلة والجنس والنوع . أما العنق فهو امتداد الضلع وهو صلة الوصل بين النصل والفرع والنصل . ومن الأوراق ما كانت عادمة النصل وتعرف باللاطنة والجالسة والحاصنة الخ ... وأما القاعدة فهي موضع اتصال العنق أو النصل بالساق أو الفروع وقد تكون هذه القاعدة ثعلولية كما في الكروية أو لاسفة الساق كما في التنجيليات أو قرصية مخترزة كما في البصل . وقد تنمو من القاعدة زوائد ورقية تدعى الاذنيات || وتنقسم الأوراق إلى ابيدة أو عروية أي دائمة الخضرة وإلا عابدة أو نافضة وهي التي تسقط في الخريف . أما أشكال الأوراق وتزييناتها فعديدة تخص منها بالذكر أشيعها وهي التالية :

Feuille aciculaire

ورقة إبرية

Feuille cunéiforme

ورقة إسفينية

Feuille oblongue

ورقة أهليلجية

Feuille pédalée

ورقة رلنية

Feuille simple

ورقة بسيطة

Feuille ovale

ورقة بيضبة

Feuille obovale

ورقة بيضبة منكسة

Feuille trifide

ورقة ثلاثية التفرع

Feuille tripartite

ورقة ثلاثية التفرع

Feuille bifide

ورقة ثنائية التفرع

Feuille bipartite

ورقة ثنائية التفرع

Wistaria (F). ٣٠٦٥٦ - **وِسْتَارِيَه**
هي البلبعة ، نبات عارض تزيتي ، اطلبها .

Oulstifti (F). ٣٠٦٥٧ - **وُسْتِي**
هو الهبال ، من القردة الدبية ، اطلبه .

Billonner (F). To ridge (E). ٣٠٦٥٨ - **وَسَد**
وسد التربة توسيداً : اقام فيها الاتلام .

Médius (F). Middle finger (E). ٣٠٦٥٩ - **وُسْطَى**
الوسطى من الاصابع ما بين السبابة والبصير .

Décortiquer (F). ٣٠٦٦٠ - **وَسَف**
To decorticate (E).
قشر . الثمار الموصفة هي الثمار المقشرة وقد يكثر استعمال التوسيف في اللوز والصنوبر والجوز .

Pelure (F). ٣٠٦٦١ - **وَسَف**
Peel, Skin, Paring (E).
الوَسَف القشرة الخارجية التي تلحف لب بعض الثمار كالجوز واللوز والبطاطا والبندورة ... اما قشرة الدراق والتفاح والاباجوس والخوخ الخ ، فتدعى حشاة . اطلبها .

Whisky (F). Whisky (E). ٣٠٦٦٢ - **وِسْكِي**
مشروب كحولي مسكر يصنع من متشث الشعير والخمطل والشميل . تكثر صناعته في بلاد الانكليز . يقال ان القليل منه يفيد الجسم البشري .

Ferrade (F). Branding (E). ٣٠٦٦٣ - **وَسَم**
كَي الحيوان بعلامة فارقة ، منماً لمرقة .

Etiqueter (F). ٣٠٦٦٤ - **وَسَم**
To ticket, To label (E).
وسم النبات : وضع له سمة من خشب او غيره من المواد كتب عليها التعريف المميز .

Isatis (S). Pastel (F). ٣٠٦٦٥ - **وَسَمَة ، وَسِمَة ، عَظْلِيم**
جنس نباتات عشبية محولة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والعتلة . معظمها بري وبعضها صناعي وعلمي . اوراقها كاملة مستطيلة . ازهارها حامي . ازهارها صفراء اللون . رُغِب في الاراضي الجصية . اشهرها وسمة الصباغين .

Isatis tinctoria (S). Pastel des teinturiers, Guède (F). Wood, Ash of Jerusalem, Dyer's weed (E). Färber wald, Wilder Indigo (D). Pastello, Glastro, Guado (I). ٣٠٦٦٦ - **وَسَمَة الصَّبَاغِين * ، وَرْد النيل**
نوع من الوسمة ، يملو نحو المتر ، يزرع لاستخراج مواد الصبغة الموصوفة في اوراقه . اوراقه متعاقبة ، السفلى منها اهليلجية والعلوية سهمية . نصلها جامد الصفحة عاكس الخضار || ينبت في اوائل الربيع . تنتزع اوراقه تباعاً ، عند ازدياد نصالها ، وتجفف في الظل ثم تسحق وتحصر .

Mycelia sterilia (S). ٣٠٦٦٧ - **وَسَيَات ، فُسْتِيَات عَاقِرَة**
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويعيات . انواعها عديدة تجمعها خمسة اجناس : الازوتوم ، الرودودوم ، الريزوكتونيه ، السليروسوم والمونيليوبسيس || معظمها

Gynécée (F). Gynaecium (E). ٣٠٦٦٧ - **وَرِيم**
جاء اخية الزهرة ، يشمل المبيض والسمة والقلم . راجع منفحة .

Botte (F). Bundle, Truss (E). ٣٠٦٦٨ - **وَرِيمَة**
ما حزم من البقول والئن على اختلافها .

٣٠٦٦٩ - **وَرِين**
حب الحنظل المطحون .

Wasabi (F). ٣٠٦٥٠ - **وَسَابِي**
نبات بقلي مشهور باسم يريوه ، اطلبها .

Pelor (S). Pélor (F). ٣٠٦٥١ - **وَسَاجَة ***
سمكة من الجلاخ الشاذكات الزعانف . اعطائها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر . جسمها مخروطي الشكل صغير القد ، ينتهي زعنفة مستديرة مجذعة بالاسم الجؤوي . زعانفها كبيرة ملونة وسنن كاللشار . الظهري منها تمتد من الرأس الى الذنب . رأسها مخروطي الكسم تملوه التزويق النافرة المستديرة . عينها ناشزتان مستديرتان متقاربتان . ثوبها الى السمرة الطحلاء تعرضه بعض الخطوط الجؤوية وهو يقيم مع اقربائه من الظهر ويبيض عند البطن .

Empodium ٣٠٦٥٢ - **وَسَادَة**

Stenops gracilis (S). ٣٠٦٥٣ - **وَسَان ***
Loris grêle (F). Slender loris (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الليموريات موطنه سرنيديب والهند . يألف الاحراج والغابات ويتسلق الاشجار بشفة . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد قلما يتجاوز خمسة . سرسحة دجوي يستمر من النفضة الى الفير العميق . قوته الجنادب والجراد وجميع انواع الحشرات والثار السكرية والعسل والصافير الصغيرة ويبيضه وبعض الاعشاب وورق الاشجار || جسمه قصيف صغير يطول نحو ٢٢ سم . يتميز باستدارة الرأس وبصر الانف ويخلو مؤخره من الذنب . عيناه كبيرتان مستديرتان . اذناه صغيرتان ، مستديرتان الاطراف المرءاء النامدة الوبر . شعره ناعم ، لبد التجميع ، حريري الملمس . ثوبه الى الصخرة الشهباء يملوها مواج ادعش في الظهر وقفي في سائر اقسام الجسم . حينها مطوختان بالاسود . قصبة انفه ومقدم خطمه الى البياض الاغبر . نحرة واطراف قوائمها الى الربعة القلواء || الالثنى ثنائية الشدي ، رباعية الحملات الصغيرة الدقيقة . محبلها يستمر نحو سبعة اشهر تقص في تمامه من جروين الى اربعة جراء .

Flaveria (S). Flavérie (F). ٣٠٦٥٤ - **وَسَب**
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها اعشاب حولية . سوقها سرسحة اوراقها مفترقة متعاقبة مائسة البشرة . ازهارها رؤيسية نورية التجميع || اشهر انواعه وسب الحنث .

Flaveria contrayerba (S). Flavérie du Pérou (F). Peruvian dyers weed (E). Flaverie (D). Flaveria (I). ٣٠٦٥٥ - **وَسَب الحَنَث ***
نوع من الوسب وهو عشبة برية طيبة يقال انها تستعمل كسفادة لسم الااعي . ساقها منصبة فراء . اوراقها مفترقة ، غطية التشرثم ، بحرية اللون . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد . ازهارها انبوبية الشكل بيضاء اللون .



وساجة



وسان



وسب الحنث



وسمة الصباغين



وسم



وسم



وشاعة



وشاعة



وشاعة

قصيرة ، ثلاثية الفصل . كوالها شبه اسطوانية . بطونها غروطية ، تنتهي بمرزات ذرية . كوالها وبطونها مبعثرة الحلب الاسمر . رواشها باعثة الخفاب ، مجذعة بالاسمر || الحشرة الجملانة واثمة اما البرقة فذاتة او ثائلة || خاضلة || اشهر اجناسها الوسية .

من الفطور الرمية التي تعيش في التربة على المواد النباتية المتحللة وبضعها قليل يعيش على النباتات المائلة فيعطب النج ويقرسها دون ان يقع بها شديد الاذى .

٣٠٦٦٨ - وسيط Catelyseur (F). Catelyser (E).
هو المسحاح ، جسم يحدث التحليل بالملامسة .

٣٠٦٦٩ - وسيط Remisier (F).
Half-commission man (E).
هو من يتوسط في انعقاد صفقة بين العميل والسمسار او بين البائع والمشتري .

٣٠٦٧٠ - وسيطة ، متفككة Milieu de culture (F). Medium culture (E).
الوسط الملائم لزراع الميكروبات والفطور .

٣٠٦٧١ - وسيلة Moyen (F). Plea (E).
هي السبب او الوجه القانوني او الفعلي تبنى عليه الدعوى ويدل على امام المحكمة .

٣٠٦٧٢ - وسيم Callista (S).
Calliste (F). Calliste (E).

جنس طير من فصيلة الترنيرات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ . جميعها من طيور امريكة الوسطى والجنوبية . تألف الغابات والحراج التي يكثر فيها الدغل . نظامها الحياتي جاني . اسرارها متفاوتة العدد ، تكثر فيها القلة || اجسامها صغيرة اللد ، وشيقة القوام ، تطول من ١٤ الى ١٧ سم . مناقيدها غروطية الشكل تنتهي بمقاطع صغيرة ذرية . اجنتها معتدلة الحجم ، اذناها متوسطة القد ، مقطوعة الاطراف . اسرارها رفيعة دقيقة . اصابعها معتدلة الحجم . اثوابها جميلة الالوان الساطعة فيها الازرق والاخضر والاصهب والاسود || جميعها تعيش على البذور وبعض الثمار العنينة || تدفن اعشاشها في الادغال على ارتفاع بعض الاندما عن سطح التربة . اناتها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الاكور نحو ١٤ يوماً .

٣٠٦٧٥ - وسينة * Anisophylla (S).
Anisophyllée (F).

جنس اشجار وشجيرات حرجية من فصيلة القراصيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض الاصقاع الاستوائية الاسيوية والاريفية || اشجارها كبيرة ، رفيعة ، متباعدة الفروع . اوراقها منعقة ، متعاقبة ، سنانية الاتصال . ازهارها ابطي الارتكاز ، سبلي التجميع . ازهارها صغيرة يبيضه اللون او صفراء . ثمارها عنينة ، بزورها عادمة الآح || اخشابها صناعية ، متوسطة الصلابة .

٣٠٦٧٦ - وشاعة * Radiolites (S).
Radiolite (F). Radiolites (E).

جنس حيوانات بحرية من الغرويات صفيحات الحياشيم وفصيلة الرشاعات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصداها شبه خدرورية الشكل ، لامتساوية المصارع ، العلوي منها صغير اللد ، جلوني الشكل ، مسقط الصفحة المخذدة ، اما السفلي فغروطي مشوح .

٣٠٦٧٧ - وشاعات * Radiolittidae (S).
Radiolittidae (F). Radiolittidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الغرويات صفيحات الحياشيم ، عادات الروس . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || تتميز انواع هذه الفصيلة بالتباين القائم بين مصرعها اصداها اذ ان المصراع الايسر سقاطي الشكل في حين ان الايمن شبه غروطي || اعرف اجناسها واشهرها الوشاعة .

٣٠٦٧٨ - وشاعة * Asticot (F). Maggot (E).

هي دعوسة ذبابة اللحم . تركيب النج الحية فتؤذيها لانها مقنونة لاحة .

٣٠٦٧٩ - وشاعة * Exostemma (S).
Exostème (F).

جنس اشجار وجنبات برية ، طيبة ، من فصيلة القويات . انواعها المعروفة ١٢ مهدها البلاد الاستوائية || اوراقها متقابلة ، منعقة . نصلها يبيض في الشون او اهليلجية او سنانية . ازهارها طرفي او محوري الارتكاز ، عتيق التجميع . ازهارها انبوية التويج ، يبيضه اللون او وردية . ثمارها حقية ، ثنائية الخدر . تحوي العديد من البذور الصغيرة المغلطة || اشهر انواعها الاثنان التاليان :

٣٠٦٨٠ - وشاعة كبيرة الزهر Exostemma grandiflora (S).
Exostème à grandes fleurs (F).

نوع من الشاعة . منبتها فزويلا . ساقها ترتفع نحو عشرة امتار . قشورها مرة المذاق دافعة للحس وسيلة للعد .

٣٠٦٧٣ - وسيمة * Palloptera (S).
Palloptère (F). Palloptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الوسيميات وذرية ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطاها بعض مناطق البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، شهباء اللون او صفراء ، تطول من ٣ الى ٤ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها صغيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل الدقيقة . اخطامها معتدلة الطول . ملامستها صغيرة . كوالها شبه اسطوانية بطونها غروطية تنتهي بمرزات ذرية . رؤوسها وكوالها وبطونها وانحاذها مبعثرة الحلب الدقيق . رواشها باعثة الخفاب مجذعة بالاسمر الجفوي || جميعها واثمة تألف كل مكان تكثر فيه الازهار . يرقاتها خاضلة او دامتة .

٣٠٦٧٤ - وسيمات * Pallopteridae (S).
Palloptéridés (F). Palloptéridés (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراعي والبراري والحراج || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول من ٣ الى ٦ م . رؤوسها شبه مكورة ، عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية

٣٠٦٨٧ - وَشَعَّةٌ ضَيْقَةُ الْوَرَقِ

Centranthus angustifolius (S). *Centranthe à feuilles étroites* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ضيقة، طويلاً يراوح من ٨ إلى ١٥ سم. وعرضها من ٢ إلى ٥ سم. نصلها شريك الصفحة بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع. أزهارها وريدية زائفة، متوسطة الدائرة || تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٦٨٨ - وَشَعَّةٌ غَلِيظَةُ السُّوقِ

Centranthus macrosiphon (S). *Centranthe à grosses tiges*, *Valériane à grosses tiges* (F).

عشبة سبروتية حولية عديدة الاصرام. ساقها غمية غليظة مجوفة كثيرة الفروع تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة لاطئة، نصلها بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع، فارش القمة. أزهارها وريدية اللون أو بيضاء أو موحشة في بعض الاصرام || تنورها يستمر من حزيران إلى آب.

٣٠٦٨٩ - وَشَعَّةٌ نَحِيلَةٌ

Centranthus calcitrapa (S). *Centranthe chaussetrappe* (F).

عشبة سبروتية حولية نحيلة الساق تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ريشية مخرمة. أزهارها عتق التجميع، هامي الاكناز. أزهارها وريدية اللون قصيرة الدائرة. تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٦٩٠ - وَشَعِيٌّ

Fusiforme (F). *Fusiform* (E). نمت وصني يذل على الشكل للغزلي المسكوب الجسم المذهب الطرفا.

٣٠٦٩١ - وَشَقِيٌّ

Lynx (F). *Lynx* (E). الشوق كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين الدب الأكبر والعناز || عدد نجومها ٤٦ معظمها من المراتب الخامسة والسادسة والسابعة ونها نجم من المرتبة الرابعة مركزه في اواسط الذنب.

٣٠٦٩٢ - وَشَقِيٌّ

Lynx جنس حيوانات مفترمة من فصيلة السنوريات ورتبة اللوامس. انواعها عديدة بعضها اصفر قدماً من الفهد، بجلة الشكل، متناسبة التكوين، قصيرة الذنب مخروطية الاذن، يملو طرف اذنانها جم من الزبر الاسود. قوتها ما استطاعت اليه سبيلاً من الحيوان والطيور || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٣٠٦٩٣ - وَشَقِيٌّ أَخْمَرُ

Lynx rufus (S). *Lynx rouge* (F). *Red lynx* (E). نوع من الشوق الامريكي. جسمه متوسط القد يملو نحو ٨٥ سم. وذنبه ٣٠. ثوبه امغر اللون احمر يعلو توشم امسح وتوشيع اسمر.

٣٠٦٩٤ - وَشَقِيٌّ أُرُوِيٌّ *، وَشَقِيٌّ مَبْدُولٌ

Lynx vulgaris (S). *Lynx vulgaire*, *L. d'Europe* (F). *Common Lynx*, *European lynx* (E).

نوع من الشوق، كثير القنص، شديد الاذى موطنه اوروبا. وهو كبير الجثة يملو نحو ١٢٠ سم. وذنبه ٢٠ أما ارتفاعه فنحو ٦٥ سم. اطوار اطوار السنور، يتسلق الاشجار. قوته الطير وصغير الحيوان.

٣٠٦٩١ - وَشَاكَّةٌ كَثِيرَةُ الزُّهْرِ

Exostemma floribonda (S).

Exostème floribonde (F).

نوع من الوشاكَّة. منبتها الانتيل. ساقها ترتفع نحو خمسة امتار. خواصها الطبية كخواص الوشاكَّة الكبيرة الزهر.

٣٠٦٩٢ - وَشَاكَّةٌ *

Cynogale (S). *Cynogale* (F). حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات. موطنه

جزر الزابج. ياتلف البحيرات ويجاري الماء. ملجئه الحيائي فري لا يجتمع الذكر والانثى الا في زمن الوداق والكوم || جسمه مستطيل الشكل، صغير القد، قصير القوائم، يملو نحو ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. راسه شبه مخروطي الشكل، مبسط الجرم. عيناه صغيرتان لوزيتان. اذناه صغيرتان مستديرتان. مخارجه مجهز بغلق ينطلق عند الحاجة. سباله كثيف الملب الطويل الاشر. قوائمه خاسية الاصابع. ذنبه وافر الوبر اللبد الجلل. ثوبه الى الكهبة السمراء يقيق في الرأس والظهر ويغير في الصدر والبطن || يسبح ويغوص في الماء ويمدو على الارض بسرعة وينسلق الاشجار. قوته الاسماك والسرطان وكل ما استطاع اليه سبيلا من الطير والحيوان.

٣٠٦٩٣ - وَشَعٌ

Fleurs des légumes (F). الوشع : زهر البقول.

٣٠٦٩٤ - وَشَعُ الْمَاءِ *، وَكَيْسَتَارِيَّةٌ

Vallisneria (S). *Vallisnerie*, *Vallisnerie* (F). *Eel grass*, *Tape grass* (E). *Sumpfschraube* (D). *Valisneria* (I).

جنس نباتات عشبية رثدية مائية المسكن من فصيلة كلويات الماء. تعيش وتكاثر في المياه العذبة الراكدة وفي الاحواض. أوراقها عصصية تطول من ٣٠ إلى ٨٠ سم. وتقرض من ٦ إلى ١٢ سم. أزهارها صغيرة القد، الذكرية منها ثنائية السداة تنفصل عن قاعدتها وتطفو على سطح الماء بانتظار الزهرة الانثى المركزة على زناد لولبي نابض يومه الزهرة عند ادراكها التناهي بالتالي الوابع العالم.

٣٠٦٩٥ - وَشَعَّةٌ

Centranthus (S). *Centranthe* (F). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النارديةيات. انواعها المعروفة ستة، مهدها حوض البحر المتوسط. سوقها نرسمة، أوراقها متعابلة، أزهارها سوية اللون الاحمر او الابيض. خواصها الطبية لا تختلف عن خواص سائر النارديةيات لكنها اضعف منها بالعناصر الفعالة || اشهر انواعها واعمها زراعة ما يتبع.

٣٠٦٩٦ - وَشَعَّةٌ حُمْرَاءُ *، وَالْيَرِيَّانُ أَخْمَرُ

Centranthus ruber (S). *Centranthe rouge*, *Valériane rouge*, *Behen rouge*, *Barbe de Jupiter*, *Lilas d'Espagne* (F). *Red spur-valerian*, *Jupiter's beard*, *Fox's brush* (E). *Baldrian*, *Rote Spornblume* (D). *Valeriana rossa*, *Barba Giove* (I).

بجلة سبروتية معمرة طيبة وزيينية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. اصرامها الزراعية عديدة. سوقها موقرة. أوراقها بيضية ذرية، نصلها كامل الصفحة سنن الحافة جميل انقشار يملو من ٨ إلى ١٢ سم. ويرض من ٤ إلى ٤. أزهارها عتقودي التجميع، صبوراني القمة. أزهارها عطرية العرف، مستطيلة الدائرة، اردوانية اللون || تنورها يستمر من أيار إلى آب.



وشاكَّة



وشع الماء



وشعة حراء



وشق أروبي

٣٠٦٩٥ - **وَشَقَّ الْفَقْرَ** هو عناق الارض ، اطلية .

٣٠٦٩٦ - **وَشَقَّ الْمَنَاقِعَ * ، شَيْب**

Lynx chaus (S). Lynx des marais (F). Chaus (E).
نوع من الشوق ، طوله نحو ٦٥ سم. وذنبه ٢٢. ثوبه
املح اللون الاغبر ، ابيض البطن ، اكلع العين ، اسمر
المراشف . موطنه شاسع الاطراف يعم الحبيشة والتونوية
ومصر ولبنان وسورية والعراق وبلاد فارس حتى بحر
قزوين .

٣٠٦٩٧ - **وَشَقَّ حَيْثِي * ، شَيْب**

Lynx caligatus (S). Lynx botté (F). Booted lynx (E).
نوع من الشوق ، طوله نحو ٦٧ سم. وذنبه ٣٠ ، ثوبه
اغبر اللون ابيض العنق اسمر الخد . رقشة الذكر عاقبة
لامعة وذنبه زرقاء الموالج . رقشة الانثى باهية وفيرتها وردية
المالج . موطنه افريقية الشرقية وبلاد فارس والهند . يكثر
في الحبيشة .

٣٠٦٩٨ - **وَشَقَّ قَهْدِي * ، نَهْه ، فُنْجُل**

Lynx pardus (S). Lynx pardé (F). Pardine lynx,
Southern lynx, Spanish lynx (E).
نوع من الشوق ، موطنه الشرق الاوسط واروية الجنوبية .
وهو اصغر جنس من الشوق الاروبي واشرس خلقاً . ثوبه
كثوب الفهد لوناً ورقشة . راجع نفه .

٣٠٦٩٩ - **وَشَقَّ كَنْدِي * ، شَيْب**

Lynx canadensis (S). Lynx du Canada (F). Canada lynx, Peeshoo (E).
نوع من الشوق الامريكي ، اصغر جنس من الاروبي واكبر
من القهدي . طوله نحو ١٠٠ سم. وذنبه ٥١ ، موطنه كندا
وبعض ارجاع امريكة الشمالية . ثوبه املح اللون ،
حنطلي الموالج ، اسمر الرقشة . ذنبه اغبر اللون احر الموالج
اسود الطرف .

٣٠٧٠٠ - **وَشَكَل**

Suint (F). Yolk (E).
هو تتورع او مصالة صوف الغنم . راجع نفس .

٣٠٧٠١ - **وَشَلِي * ، شَيْب**

Ambulacraire (F). Ambulacrum (E).
الجهاز الوطلي بمجموعة اقنية متشابهة تسمح بمرور الغذاء
عند الشوكيات .

٣٠٧٠٢ - **وَشَم**

اول ظهور النبات على سطح التربة . ج وشوم ووشام .

٣٠٧٠٣ - **وَشَمِيَّة * ، شَيْب**

Mastigosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الوطحيات يتميز بجهره الكتيبة
الاسطوانية ، القصيرة ، المتناوبة ، الشفافة التي تحمل في
اطرافها كنانة فردية ، مردنية ، وثرية الانقسام الوثيري .
يوسفاته مستطيلة عليية || انواعه قليلة ، اعرفها وشية
التجليل وشية التريس .

٣٠٧٠٤ - **وَشَمِيَّةُ الزُّفْمُسِ * ، شَيْب**

Mastigosporium lupini (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الترس فيسبب ذبولاً واعمالها
الباكس || مظهره الخارجي لطخ خفيفة مستطيلة سمراء
اللون ، زيتونية الموالج ، تركب الاوراق فتذويها وتقودها
الى الذبول والاعمال || ينشط في الموامق الظليلة الرطبة .

٣٠٧٠٥ - **وَشَمِيَّةُ التَّجِيلِ * ، شَيْب**

Mastigosporium calvum (S).
فطر مجهرى يصيب اكثر التجييلات البرية في اوراقها

فيجعلها ويذويها || مظهره الخارجي لطخ مستطيلة بيضاء
طويلاً يراوح من ١ الى ٨ سم. لونياً الى الجوزة العاقبة .
تركب نصل العصف فتقرحه وتذويه || ينشط في الموامق
الرطبة وتزيد نشاطه العوامل الجوية المواتية .

٣٠٧٠٦ - **وَشَنَ ، شَيْب**

Etiage (F). Low-water mark (E).
وشن ووشن الماء : قل . زين الشوق هو زين البروس اي
قلة المياه النابتة او الجارية .

٣٠٧٠٧ - **وَشَنَّة ، شَيْب**

Griotte (F). Morello cherry (E).
اسم شامل يطلق على مختلف ثمار غروب الكرز العادي
التي تتميز بصفرها وحوضتها .

٣٠٧٠٨ - **وَشَه**

طائر من الصقور وهو غريب من الشاعين او عرق منه .
كل ما قيل فيه : « طائر شبه الشاعين وليس به » .

٣٠٧٠٩ - **وَشَيْج ، هَلِكُونِيَا**

Heliconia (S). Héliconie (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات . انواعه
المعروفة ٩ ، اعطائها البلاد الاستوائية والحارة . تزرع
للزئين وهي قريبة الشبه من الموز تملو من ١٠٠ الى
٤٠٠ سم. اوراقها كبيرة القد ، نصلها اهليجاي الشكل
مالس الصفحة الجامدة الزاهية الخضار . كيانها كبيرة
القد تطول من ٤٠ الى ٨٠ سم. انواعها متراكبة ، كثيرة
العدد ، مختلفة الالوان البهية .

٣٠٧١٠ - **وَشَيْجَة ، شَيْب**

Racine secondaire (F). Secondary root (E).
من الجذور الثانوية التي تنشعب عن الرئيسية . ج وشائج .

٣٠٧١١ - **وَشِيْع ، شَيْب**

Palissade, Hale (F). Palissade, Hedge (E).
سياج من قصب او قضبان متشابهة وكل ما غرس او
وضع حول الحديقة من الشجر والشوك والاسلاك منسجماً
لإباحة الدخول .

٣٠٧١٢ - **وَشِيْع ، شَيْب**

هو سقف البيت وهو ما يبس وسقط من ورق الشجر .
ج وشائج .

٣٠٧١٣ - **وَشِيْعَة ، شَيْب**

Fuseau (F). Spindle (E).
شكل تشلذب هيكل شائع الاستعمال في بعض انواع الانجار
المشترية . والشكل الوشي يكون عادة اوسع قاعدة من المردني
واقبل ارتفاعاً منه .

٣٠٧١٤ - **وَشِيْعَة ، شَيْب**

Allantoide (F). Allantoid, Allantoic (E).
ملحق جنيني يظهر في اول الحمل ويستمر نحو ستون يوماً
ثم يتلاشى .

٣٠٧١٥ - **وَصَامَةُ * ، شَيْب**

Pathologie (F). Pathology (E).
علم يبحث في اسباب الامراض واعراضها .

٣٠٧١٦ - **وَصَامَةُ نَبَاتِيَّة * ، شَيْب**

Pathologie végétale (F). Vegetale pathology (E).
علم يبحث في اسباب الاوصام النباتية وعوارضها .



وشق الناقع



وشق حشبي



وشق فهدى



وشق كندي

Tuteur de fait وصي خاص
Tuteur légal وصي شرعي
Tuteur ad hoc وصي فعلي
Cotuteur وصي مع غيره

٣٠٧٢٧ - وصية، مؤسسى به
Legs, Testament (F). Legacy, Will (E).
هو كل موقوف في وصية مكتوبة .

٣٠٧٢٨ - وصية عهدية، وصية إستثنائية
Fidélcommiss (F). Fidé-commissus (E).
هي الوصية التي يشترط فيها دفع المال الموقوف الى شخص
ثان بعد مدة معينة . فالوصي له الاول يدعى المهدود أو
المكلف والموصى له الثاني يدعى المستحق المهدى .

٣٠٧٢٩ - وصيد
Athermane, Athermique (F). Athermanous (E).
نمت تعريفي يطلق على كل مادة لا تحترقها الحرارة المشعة .

٣٠٧٣٠ - وصيد
Dru (F). Thick (E).
الزراع الوصيد هو الزرع المتقارب الاصول . والزراعة
الوصيدة : المتقاربة النبات .

٣٠٧٣١ - وصيدة
حظيرة من الحجارة تتخذ للال بيتا الحظيرة تكون من
الفصص .

٣٠٧٣٢ - وصينغ
Cri des oiseaux (F). Cry of the birds (E).
صوت المصافير . راجع صقب .

٣٠٧٣٣ - وصيف
هو كزبرة الير ، اطلبها .

٣٠٧٣٤ - وضاء
Radiation nocturne, Rayonnement nocturne (F).
Nocturnal radiation, N. radience (E).
ونهم من قال الرضاء الليلي ، هو اطلاق الحرارة التي كانت
قد تجتمعت في النهار .

٣٠٧٣٥ - وضام
Rémanence (F). Remanence (E).
خاصة تتميز بها بعض الماشع التي يستمر انفعالها برعة
من الزين بعد زوال السبب الباعث .

٣٠٧٣٦ - وضع، ولادة
Mise bas, Part, Parturition (F). Parturition (E).
خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية مدة الحمل .

٣٠٧٣٧ - وضع الحدود
Abornement, Bornage (F). Delimitation, Fixing
limits (E).
وضع علامات بين ارضين للدلالة على الخط الذي يفصلها .

٣٠٧٣٨ - وضع اليد
Mainmise, Occupation, Possession (F). Seizure,
Possession (E).
الملك في المباح انما يثبت بالاستيلاء عليه . والآخر هو
المستولي أو الشاغل . راجع استيلاء .

٣٠٧٣٩ - وضعية
Assiette (F). Posture, Seat (E).
هي حالة الاسس التي تقوم عليها بعض الامور .
Assiette de droit (F). كوضعية الحق

٣٠٧١٧ - وصاية
Tutelle (F). Tutelage (E).
نظام قانوني لحماية القمتر .

٣٠٧١٨ - وصع ، وصع
Troglodytes parvulus (S). Troglodyte mignon (F).
Wren (E).
عصفور آبد من الجواثم . جسمه صغير القد يطول نحو
١٠ سم . منقاره دقيق حاد الطرف . جناحاه قصيران .
ذنبه متوسط الطول . ثوبه الى الاربدة السوداء يعلوها تجميع
معرض اسود . يالغ الحادائق والادغال والمواسج والسيجات .
قوته الديدان والناكبات والذباب والحوام . يدثن في الادغال
والجنبات الكثيفة . اثناء تخضن مرتان في السنة . حفسنها
تراوح من ٨ الى ٨ بيضات وتستمر ١٣ يوما .

٣٠٧١٩ - وصعيات
Troglodytidae (S). Troglodytidae (F). Troglodytidae (E).
فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل سنيات المناقير .
اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠٠ موطنها يشمل معظم
مناطق القاروتين القديمة والجديدة || معظم طيورها صغيرة
القد . تحبل المناقير القليلة الانعطاف . قصيرة الاجنحة
والاذناب المستديرة الاطراف . دقيقة الارباع الرفيعة ||
تألف الادغال . طيراتها قصيرة الشوط كثير التصعيد
والتهبيط . ترحل على الارض تحفة وتندو بسرعة . قوتها
النمل والحشرات الصغيرة والدويبات || اشهر اجناسها
اطلافاً الوصع .

٣٠٧٢٠ - وصف ، تعريف
Signalement (F). Description (E).
تحديد اشكال الحيوان وعلاماته الفارقة بعد ذكر اسمه
او رقه وتحدره وسلالته وعمره .

٣٠٧٢١ - وصف ، تعث
Qualification (F). Qualification, Title (E).
هو في القانون المدني تحديد طبيعة العلاقة القانونية . وهو
في القانون الجنائي تعيين وضع الجريمة في نطاق القاطع
وموجبات القانون .

٣٠٧٢٢ - وصل
Récépissé (F). Receipt (E).
محرد يدون فيه تسلم اوراق او اشياء للاطلاع او للحفظ .

٣٠٧٢٣ - وصم
Maladie (F). Disease (E).
الوصم هو المرض . ج . وصوم وأوصام .

٣٠٧٢٤ - وصم سكو
Mal secco
هو سندارية الحمضيات ، اطلبها .

٣٠٧٢٥ - وصنيتات
Périnosporées (F). Peronosporae (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصناتيات . تتميز بمشيجها
المزجي الخليوي الداخلي الذي لا يخرج من دعاماته .
تكاثرها ببني خارجي || اجناسها ستة . اربعة منها
تركب النبات فتؤذي بهي التنس والصناء والمصيل واللفحة .
واثنان لا يؤذيان .

٣٠٧٢٦ - وصي
Tuteur (F). Guardian (E).
هو الذي صامر تعيينته السهر على مصلحة القاصر وادارة
امواله وتمثيله امام القضاء وهو قد يكون :

وصي بالوصية
Tuteur testamentaire



وصع

وضعية الريهن
وضعية الضريبة
وضعية العقار

٣٠٧٤٠ - وَصَمَ غشبة الجزار يقطع عليها اللحم .

٣٠٧٤١ - وَصِيحِيَّ
هو أرغ الجزيرة ، اطلبه .

٣٠٧٤٢ - وَطَ Cri de la chauve-souris (F).
Cry of the flittermouse (E).
هو صوت مجنحات الايدي من وطواط وغفاش وسما الخ .

٣٠٧٤٣ - وَطَارَ * Cereopsis (S). Céréopsis (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من كفيات القدم وفضيلة صفيحات المنابر || ملجئه الحياتي جماعي . يكثر وجوده في جزر المحيط الهادي || جسمه متوسط القد . حجمه حجم البطة الصغيرة . رأسه معتدل الجرم . يتميز برجاء الزند الذي يفلغ الصفحة العليا من المنقاد . عنقه معتدل الطول . جناحاه كبيران لا سفان . ذنبه قصير مقطوع الطرف || ثوبه الى الوردية تعلوها ماجات بنفسجية وزرقاء بطنه الى البياض الاغبر .

٣٠٧٤٤ - وَطَائِفَ حَرْبَاءَ Stratiomyia chamaeleon (S).
Stratiome caméléon, Mouche armée (F).
حشرة من فصيلة الوطافيات . تألف المواقع الرطبة . جسمها متوسط القد ، بطول من ١٤ الى ١٦ م . رأسها كبير الجرم ، قليل التنشور . عيناها فارتقتان . زباناها مرفقيان . صدرها كثيف الخمل . حفيقتها صفراء اللون ، ثنائية المناخس الحادة . ثوبها الى الزرقوة السمراء يعلوها في بطنها تبيج اصفر هندسي الشكل || يرقتها دودية ، غبراء اللون ، سمراء الرأس .

٣٠٧٤٥ - وَطَافِيَّات Stratiomyidae (S).
Stratiomyidés (F).
فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجناسها متجنبة ، متوسطة القد او صغيرة ، شبيهة بالذباب . رؤوسها شبيهة مستديرة . عيونها لاقياسية الارتكاز متناكها هشة لا تصلح لمس . قرونها الاستعارية متباعدة الاشكال ، تكثر فيها الاستقامة ، عاد فصلها يراوح من ٤ الى ٨ . صدورها ملحوقة بجمل قصير ملهب اللون او قفي . حفياتها شاذكة او سرخة . قوائمها عريضة . بطونها خماسية او سداسية السكم الواضحة . رواشنها نشيطة ، شفافة ، مطيعة الاسترسال عند الراحة || اناثها اكبر من ذكورها . يرقاتها دودية الشكل ، غبراء اللون ، فسيحة الرؤوس التي تنتهبس في مقدم الجلوش . جميعها نائمة تعيش على المواد النباتية والمعضوية || اشهر اجناسها الوطافة والبرية والسمنة .

٣٠٧٤٦ - وَطَافَمَة * Monotoma (S).
Monotome (F).
جنس حشرات من فصيلة الوطافيات ورتبة غديات الاجنحة . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض اصقاع البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ م . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها

صغيرة ، ناعسة . تأثيرها وفكرها نظامية . قرونها الاستعارية دويسية الاطراف . كواسلها مستطيلة الشكل ، مسننة الحثار . انحدادها وشعبة ، لا تغلف كامل البطن . اثوابها وحيدة اللون ، يكثر فيها الاسمر والاصفر || جميعها دائمة تعيش على المواد النباتية المنحلة والساخرة الى الانحلال .

٣٠٧٤٧ - وَطَافِيَّات Monotomidae (S).
Monotomidés (F).
فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ م . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تأثيرها وبلاستها نظامية . قرونها الاستعارية دويسية الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها مسننة الحثار . انحدادها شبه مجنبة الشكل ، لا تلحف كامل البطن . قوائمها نشيطة . ارساها رباعية المقل . اثوابها ملونة || جميعها دائمة . بعضها يعيش في قرى التلل اعصها التلل الاكثف || اشهر اجناسها الوطافمة .

٣٠٧٤٨ - وَطَاطِيط Mégachiroptères, Grandes chauves-souris (F).
Megachiroptères (E).
مرتبة حيوانات من مجنحات الايدي ، تشمل فصيلة الوطاطيات والعديد من الاجناس والانواع . تتميز بأذنانها اللارندية ، بأنوفها اللازخرقية وبأذنانها ، عند وجودها ، المركزة تحت الفشاء الجلدي والقاعدة النخذية .

٣٠٧٤٩ - وَطَبَ هو الصرع العظيم في البقر والغنم والماعز .

٣٠٧٥٠ - وَطَبَاءَ الوطباء : المنظمة الفرع كقولك بقرة وطباء او عز وطباء .

٣٠٧٥١ - وَطَحَانِيَّات Mucedinées (F).
Mucedinas (E).
عارة فطور مجهرية من فصيلة الكفتيات . تتميز ببوغها الشفاف او القليل التلون || اجناسها عديدة ، فوارقها مرتكزة على تركيب شكل الكناكث . اعزها من الرسبة الاقتصادية الزراعية خسة : الخدون ، الدندام ، السليحة ، الكتن والكنتية .

٣٠٧٥٢ - وَطَحْنِيَّات Mucedinaceae (S).
Mucedinacées (F).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الحفانيات ورتبة الزروعات . تتميز بهيئها الالاقسي والترتيب والتخصيب فهو ضمي التجميع او مبشر وهو عادم اللون شفاف او مشع التخصيب الزاهي . كناكثها ممتدة الاشكال والالوان . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها خمس عمارات : الزيكيات واللسليات والفتيقيات والماصويات والزنوسيات والهوبيات .

٣٠٧٥٣ - وَطَدَ Tasser (F).
To compress (E).
وطد الارض ضربها بالبطلة لتصلب لاساس بناء او غيره .

٣٠٧٥٤ - وَطَضْرِيَّة Monotome (F).
Monotome (F).
جنس حشرات من فصيلة الوطافيات ورتبة غديات الاجنحة . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض اصقاع البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ م . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها

٣٠٧٥٥ - وَطَنَ راجع بلد .



وطار



وطانة

٣٠٧٥٦ - وَطَوَّاط

Chauve-souris (F).

Bat, Flittermouse (E).

اسم شامل عام يطلق على جميع حيوانات رتبة مجنحات الاليدى .

٣٠٧٥٧ - وَطَوَّاط

سمكة بحرية تدعى شفين العمق ، اطلها .

٣٠٧٥٨ - وَطَوَّاطِيَّات

Pteropodidae (S).

Ptérópodidés (F). Pteropodidae (E).

فصيلة من البطاريق . اجناسها ٨ وأنواعها ١١٠ جميعها ثامرة ، كبيرة ومتوسطة القد . تتميز بقوف أذنبا البوقي الشكل . انانها تنضع جرراً واحداً تحمله دائماً وترضعه في اناء طيرانها || اما اجناسها الثانية فهي : الحيت ، الحويون ، الرذاسة ، السرحاب ، السفلوم ، الشقاسة ، الثلاثة والساعة . (اطلها في مواضعها) .

٣٠٧٥٩ - وَطَب *

Isocardia (S).

Isocarde (F). Isocardia (E).

جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطريبات ورتبة الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل . أنواعها المعروفة عديدة اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها شبه قلبية الشكل معتدلة الحجم او صغيرة ، مائسة الصفحة او خافتة التخديد التحيل يلحفها غشاء ليفي المادة دقيق || تعيش في رمال واسحال مصبات الانهر .

٣٠٧٦٠ - وَطَبَة

Utricule (F). Utricule (E).

تجويف كالتفرة يوجد في جذرة الطلع يستوعب المادة المنصبة .

٣٠٧٦١ - وَطَبْدَة

Assise du mur (F).

وطبدية ج : مثالذ : هي قواعد البنيان اي اساسه .

٣٠٧٦٢ - وَطَبَة

حياء الاثنى من ذوات الحافر .

٣٠٧٦٣ - وَطَبِي

Canon (F). Shin (E).

عضو من قوائم أخيل وهو في الفرس بين الركبة والحوشب في القامتين الاماميتين ، وبين العروقوب والحوشب في القامتين الخلفيتين .

٣٠٧٦٤ - وَعَاء

Vaisseau (F). Duct (E).

هو الانبوب الكاثي في نسج النباتات الوعائية ، وهو يقع على اشكال مختلفة اشبهها بالخزوفي والشبكي والمنقط .

وعاء حلزوني

Vaisseau spirale (F).

Spirally duct (E).

وعاء شبكي

Vaisseau réticulé (F).

Reticulated duct (E).

وعاء منقط

Vaisseau ponctué (F).

Punctuated duct (E).

وعاء



٣٠٧٦٥ - وَعَات *

Melyris (S).

Mélyris (F). Melyris (E).

جنس حشرات من فصيلة الوعيات ورتبة غديات الاجنحة انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطائها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اجناسها شبه اهليلجية الشكل ، معتدلة الاحديداب ، تطول من ٨ الى ١٦ م . رؤوسها مستعرضة ، قليلة التشوز . عيونها صغيرة ، بارزة .

تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية . كواسلها مقببة الشكل . اغمارها لاحفة ، ثنائية الفلوع الناشرة القاطية . قوائمها نسيطة . اثنائها ملونة تكثر فيها الحوة والصحة || جميعها واسعة ومفترسة تعيش على رحيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات . يرقاتها مفترسة .

٣٠٧٦٦ - وَعَاتِيَّات °

Melyridae (S).

Mélyridés (F). Melyridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اعطائها بعض مناطق افريقية الشمالية وحوض البحر الابيض المتوسط || اجناسها شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ٦ الى ١٨ م . رؤوسها مستعرضة ، قليلة التشوز . عيونها صغيرة ، بارزة ، تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مقببة . اغمارها لاحفة ، ثنائية الفلوع القاطية ، قليلة الرخافة ، معتدلة الصلابة . قوائمها نسيطة . ارساغها خماسية المقل . اثنائها ملونة || جميعها واسعة ومفترسة ، تعيش على رحيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات . يرقاتها مفترسة || اشهر اجناسها الوعآت .

٣٠٧٦٧ - وَعَاط

Rosier jaune (F).

هو الورد الاصفر ، اطله .

٣٠٧٦٨ - وَعَاتِيَّات البُذُور

Angiospermes (F).

Angiospermes (E).

وعاتيات البذور او مستورات البذور او النباتات مغطاة البذور هي احد قسمي باديات الزهر . وهذا القسم يشعل النباتات التي تكون بيضها في مبيض ويزدها في ثمرة .

٣٠٧٦٩ - وَعَاتِيَة

Vascularisation (F).

تعير فيزيولوجي ، راجع قَسَوِيَة .

٣٠٧٧٠ - وَعَب

Terrain plac et vaste (F).

الموضع الواسع المستقر من الارض . ج : وعاب .

٣٠٧٧١ - وَعَث

Epiphytie (F). Epiphyty (E).

وعوث النبات : علها واصامها في منطقة معينة .

٣٠٧٧٢ - وَعَثَة °

Coleosporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوعيات يتميز بانباته المتراكبة المتشابكة وبدعاماته الاسطوانية المسطيلة الدقيقة القاعدة || انواعها قليلة تنطفل على نباتات الفصيلة الصنوبرية متركب الاحداب وتؤذيها || مظهرها الخارجي بطور مستدرة مبرنة متفرقة لونها الى الجوزة يحفشها اطار بنفسجي ، تثبت على النصل نحو السنة ثم تتطور بعد ذلك الى حويصلات مفلطحة القاعدة العريضة ، مستدرة القمة ، طولها من ١ الى ٢ م . لونها الى البياض التي يرشح منها عند اكمال دورها الفطري وبعد انفجارها . نطقة من الراتنج || اغزارها زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٣٠٧٧٣ - وَعَثِيَّات °

Coleosporiaceae (S).

Coléosporiacées (F). Coleosporiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بركبائها التي تحضن الدعامات . دعاماتها عويدي الانفاق ، رباعية الالغية ، شمعية الانقسام ، غليظة الجراب البوقي || اجناسها قليلة ، اعرفها الوعة والسبع .

٣٠٧٨٣ - وَعَلْ المَصْرِيَّ الحَارِيَّ *

Dactylopius adonidum (S). Pou blanc des serres (F).
حشرة صغيرة من القرميزات. حمارية الشكل، صفراء اللون، مركزية السرة، غبراء الترس الشمعي. تركيب نباتات المصاري وتفتك بها.



وعف التين

٣٠٧٨٤ - وَعَلْ صَيْتِي

هو قرمزية فورموزا، اطلبها.

٣٠٧٨٥ - وَعَلْ مَحَارِي

هو قرمزية التفاح، اطلبها.

٣٠٧٨٦ - وَعَلْ، وَعَلْ، تَيْسَ الجَبَلِ

Bouquetin (F). *Steinbok* (E).
جنس حيوان بري جبلي يجتر من فصيلة الغنميات. قريب الشبه من الماعز التي تحدثت عنه. أنواعه عديدة، جميعها ربعة الجثة، كبيرة القرون الغليظة المنحنية القوية. الاثنى ثنائية الاختلاف تقصع جذبا واحدا في اواخر حزيران يتبع امه بعد الوضع بثلاث او اربع ساعات || اعرف انواعه واشهرها: الوبل والبدن والثيلق والمخور والمزعز. ج اوصال ووصل.



وعف المصرى المبطل

٣٠٧٨٧ - وَعَلْ أُرُوْبَة *، وَعَلْ الألبِ

Capra ibex (S). *Bouquetin des Alpes* (F). *Steinbok of the Alps* (E).

نوع من الوبل. موطنه جبال الألب. جسمه ربع الجثة مسنوب القالب يطول ١٥٠ سم. يطو نحو ١٠٠ وزن من ٧٥ الى ١٠٠ كيلو. ثوبه سوي اللون يختلف مع العمر ومع فصل الصيف والشتاء. وهو يراوح بين الشبهة الصنابية والصخرة. خط ثيبه كهيب اللون. ابطاءه وبطنه اعيق من ظهره. قزناه ضليخان منحنيان كسيفين احدين. الاثنى اصفر قرنا من الذكر.

٣٠٧٨٨ - وَعَلْ القَفْقَاسُ، تُرْ

Capra cylindricornis (S). *Bouquetin du Caucase, B. à cornes cylindriques, Tur* (F).

نوع من الوبل قريب الشبه من الغنم. موطنه جبال القفقاس. طوله يراوح من ٦٠ الى ٦٥ سم. وارتفاعه كذلك. قرنه يطول نحو ٦٠ سم. وهو يشبه قرن الكبيش شكلا وانطلاقا. ثوبه الى الكهبة، لحته قليلة الشعر سواد اللون. إجله يعد من ١٠ ازواج.



وعف المصرى الحاربي

٣٠٧٨٩ - وَعَلْ حَبْتِي

Capra wail (S). *Bouquetin d'Abysinie* (F).
نوع من الوبل. موطنه جبال بلاد الحبشة من ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ م. وهو صغير الجثة احسن القرن محدب الجبهة. إجله يعد من ٧ الى ١٥ زوجا.

٣٠٧٩٠ - وَعَلْ سِيْبِرِيَّة

Capra sibirica (S). *Bouquetin de Sibirie* (F).
نوع من الوبل. موطنه شاسع الاطراف يمتد من حلايا الى شري سيبيريا. جسمه كبير القند قدره قدر الوبل الاروبي الا انه افتح ثوبا وهو كثيب اللحية مستطيل القرن. إجله يعد من ١٢ الى ٢٠ زوجا.



وعف اوروپ

٣٠٧٩١ - وَعَلْ عَرَبِي

ويدعى ايضا وعل التوبة، هو البدن، اطلبه.

٣٠٧٩٢ - وَعَلْ قَارِئِي

هو البزل، اطلبه.

٣٠٧٧٤ - وَعَسْ *Dryandra* (S). *Dryandre* (F).

جنس جنبات ابيدة معمرة من فصيلة القضييات. اوراقها لا نظامية الترتيب منها المتعاقبة والقصية والمبتمرة. ازهارها روئسية الجميع تغشها قلافة من القباب الغروطي الشكل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٣٠٧٧٥ - وَعَسْ ثَلْجِي

Dryandra nivea (S). *Dryandre blanc de neige* (F).
نوع من الوبس، جنيته تملو نحو ١٠٠ سم. اوروها مدادة. فرووها قصيرة عقداة. اوراقها مفصصة، نصلها يطول من ١٠ الى ٢٠ سم. مسفته السفل خلية البشرة فضية اللون. رؤسائها الزهرية بيضيه الشكل. ازهارها يفياء اللون، قناباتها خلية البشرة حنطية اللون والمواج. تنوره يستمر من آذار الى ايار.

٣٠٧٧٦ - وَعَسْ قَاخِرِ

Dryandra formosa (S). *Dryandre magnifique* (F).
نوع من الوبس، جنيته تملو نحو اربعة اشرار، ساقها عقداة. فرووها المروحية منتصبة مستطيلة. اوراقها خمبة متراكبة، نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٢ الى ٢٠ سم. ويعرض من ٦ الى ٨ سم. رؤسائها الزهرية بيضيه الشكل. ازهارها برتقالية اللون، قناباتها حر || تنوره يستمر من ايار الى تموز.

٣٠٧٧٧ - وَعَسْ كَثِيرُ الزَّهْرِ

Dryandra floribunda (S). *Dryandre multiflore* (F).
نوع من الوبس، جنيته تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها قزواء. فرووها لينة العود اللتين. اوراقها متعاقبة؛ نصلها اهليلجي الشكل، مسن الحافة، ملس البشرة على مسطحه. ازهارها صفراء اللون، قناباتها حنطية. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٧٧٨ - وَعَسَاء

الرملة البنية يصعب فيها المشي. ج وعاس وواعس.

٣٠٧٧٩ - وَعَسْ أَرْجَوَانِي

هو قرمزية الحفصيات، اطلبها.

٣٠٧٨٠ - وَعَسْ التَيْنِ *

Lepidosaphes minima, L. *conchyiformis*, *Mytilaspis minima* (S). *Cochenille virgule du figuier* (F).
حشرة صغيرة من القرميزات، جسمها كروي الشكل قله يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها ابيض اللون، ترسا الشمعي قليل الماد والانتشار. جبلها الحولي واحد. تمتع مكها تدريجيا طوال شهر نيسان فينتف عن يرقات نهبي انسلخاتها في اواخر الصيف. اقلها حوض البحر المتوسط. تركيب التين دون سواه تنوذبه اذا كثرت لانها تنثني الساق والاعصان.

٣٠٧٨١ - وَعَسْ الحُمْضِيَّاتِ

هو قرمزية الحفصيات، اطلبها.

٣٠٧٨٢ - وَعَسْ المَصْرِيَّ المَبْطَطْ *

Eucalymnatus tessellatus, *Lecanium tessellatum* (S). *Cochenille plate des serres* (F).
حشرة صغيرة من القرميزات، جسمها يفيي الشكل مبطل يطول من ٣ الى ٤ م. ويعرض نحو ٢. ثوبها الى البني الاسمر. اطرافها غبراء اللون مسنفة، جانباها شاذغان. تركيب مبطل نباتات المصاري اغصها التخليلات والسحليات.

Engraissement (F). **وَعْنٌ، وَعْنٌ** ٣٠٨٠٢

Fattening (E).

توعنت الغنم والإبقار : بلغت غاية السمن .

Latérite (F). **وَعْنَة** ٣٠٨٠٣

شكل من التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Latéritique (F). **وَعْنِيّ** ٣٠٨٠٤

صفة الوعة وهي التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Chacal du Sénégal (F). **وَعْنُوع** ٣٠٨٠٥

راجع ابن آوى الافريقي .

٣٠٨٠٦ **وَعَالٌ** البقال وكل بائع يغلي ثمن الاشياء .Aubergine (F). **وَعْدٌ** ٣٠٨٠٧

هو الباذنجان ، اعطيه .

Imperméable (F). **وَقَاضٍ** ٣٠٨٠٨

Impermeable, Impervious (E).

الوقاض : المكان يمسك الماء . والثرية الوقاض هي التي تحفظ الماء ولا تسرب .

Eplucher (F). To pick (E). **وَقَلٌّ، وَقَلٌّ** ٣٠٨٠٩

وقل وقفل الشيء قشره فهو واقل .

Philodendron (S). **وَقِيلٌ** ٣٠٨١٠

Philodendron (F).

الواحدة وقيلة . جنس نباتات جذمية مدادة معمرة من فصيلة التفلجاسيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منهاها بعض مناطق البلاد الاستوائية اغصنها امريكة الجنوبية ||
 سوقها جذمية مدادة . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، كبيرة ، القد ، شبه قلبية الشوزن ، جامدة النصل المفرض والمشرم .
 ازهارها طلحة كما في النخل . ازهارها شديدة الصغر ، عريفة ، مستحبة الارباع || تزروع قلائد في المراكن داخل المساكن .

Exalbuminé (F). **وَقِينٌ** ٣٠٨١١

نمت تعريفي يطلق على كل بزة او ثيظ عادم الاح اي الابوين .

Cri de la pie-grièche (F). **وَقِيٌّ** ٣٠٨١٢

الوق هو صباح الصرد .

Chronomètre (F). **وَقَاتٌ** ٣٠٨١٣

Chronometer (E).

جهاز ضبط دقيق الصنع يستعمل لتحديد الوقت الذي استوجبه العمل المطلوب .

Chronométrie (F). **وَقَاتَة** ٣٠٨١٤

Chronometry (E).

Combustible **وَقَادٌ** ٣٠٨١٥

ما توقد به النار ، اطلب وقود .

Cérthiola (S). Certhiole (F). **وَقَالٌ *** ٣٠٨١٦

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المغرثيات .
 انواعه المعروفة نحو عشرة منتشرة في معظم المناطق الحارة .
 اغصها امريكة الجنوبية || اجسامها متوسطة القد .

Commelina (S).

Commeline, Commelyne (F). Blue spiderwort (E). Commelina (D). Commelina (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوعلانيات . انواعها ٨٠ معظمها بري وبعضها طبي وزيني . سوقها منتصبة او مدادة . اوراقها لا قياسية الشكل تكثر فيها الاستطالة . ازهارها لا نظامية التجميع ، سوية الالوان تغلب فيها الزرقاء || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٣٠٧٩٤ **وَعَلَّانُ البَغْلَانِ**

Commelina benghalensis (S). Commeline du Bengale (F).

نوع من الوعلان ، ساقه وفروعها مدادة تنصب عند اطرافها .
 اوراقه بيضيه مقطوعة ، نصلها الى الخصار الزاهي ،
 اغنادها موشحة بالاحمر . ازهاره كثيرة العدد ، بنفسجية اللون ، صغيرة القد || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٧٩٥ **وَعَلَّانُ سَيَّوِيٍّ**

Commelina caelestis (S). Commeline céleste (F).

نوع من الوعلان ، قاعدة ساقه دوفصية الجنت المستطيل .
 ساقه فروع زياء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه لاطئة اهليجية الشكل . نصلها خلى الصفحة العليا ، املط السفل . ازهاره الى الزرقه السابجوية ، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٥ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٦ **وَعَلَّانُ فِيرَجِينَة**

Commelina virginica (S). Commeline de Virginie (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبة فروع تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم . اوراقه سنانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٧ الى ١٣ سم . ازهارها الى الزرقه المايقة الزاهية ، قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٧ **وَعَلَّانُ مُنْتَصِبٍ**

Commelina erecta (S). Commeline dressée (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبة قليلة الفروع تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه محدبة ضيقة النصل تطول من ٨ الى ١٥ سم . وتعرض من ١٠ الى ٢٥ سم . نملها خلى البشرة يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ازهاره الى الزرقه الجميلية ، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م . || تنوره يستمر من آب الى تشرين .

٣٠٧٩٨ **وَعَلَّانِيَّاتٌ**

Commelinaceae (S).

Commelinacées (F). Commelinacées (E).

فصيلة نباتية من رسيدات الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة . اشهر اجناسها الوعلان والمكايبة والزبرية والطينيسيا .

Bouquetin femelle (F). **وَعِلَة** ٣٠٧٩٩

Cow-bouquetin (E).

الوعيلة انثى الوعل .

Gazelle femelle (F). **وَعْنَة** ٣٠٨٠٠

Cow-gazelle (E).

الوعنة انثى الغزال .

Fourmière délaissée (F). **وَعْنٌ** ٣٠٨٠١

الوعن قرية النمل المهجورة . ج وعنان .



وعلان



وقل



وقال

منادبها مستطيلة، اذناها مستديرة الأطراف. انواطها
جيلة الاوران الزاهية يكثر فيها الاحمر والازرق البنفسجي
المزاج || قوتها اخشاش وبعض الثار الباتمة .

٣٠٨١٧ - وقائد
Tablettes en pierre (F).
الوقائد : الحجارة المفرشة في الحدائق والممرات ، واحدا
وقيد وقيدة .

٣٠٨١٨ - وقائع الدعوى
Points de fait (F).
في البيان باسما المتقاضين والحوادث التي نشأت عنها
الدعوى .

٣٠٨١٩ - وقاية
Prophylaxis (F). Prophylaxis (E).
في جماع وسائل الحيلة والعناية الممكنة اتخاذها لئلا
الامراض . راجع انتقاء واحتراز .

٣٠٨٢٠ - وقب ، حجاج العين
Orbite (F). Orbit, Socket (E).
في نفرة العين شبه هرية الشكل رباعية السطوح . وما
الثتان .

٣٠٨٢١ - وقبة
Orbitale (F). Orbital (E).
راجع مدارة .

٣٠٨٢٢ - وقبي
Orbital (F). Orbital (E).
راجع مداري .

٣٠٨٢٣ - وقبيات
Arcifères (F). Arciferous (E).
لغة من مرتبة السنويات عديمات الذنب سليات اللسان .
انواعها المعروفة كثيرة العدد جميعها خمس فصائل :
الشرغوفيات والمجبويات والصفاجيات والكداميات
والهكرسبات || تتميز جميع صفادع هذه اللمة بدم مساواة
سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز ثلاثيها || اشهر
صفادع هذه اللمة المعجوم والشرغوف .

٣٠٨٢٤ - وقبر
Charge (F). Load (E).
هو ثقل الحمل الذي يقع على اعمدة وسقوف وجدران
المباني . وهو يقسم الى ثقل ميت مستقر وثقل حي مفروض .
ونظراً لكثرة العوامل التي تدخل في حسابه فالوقر قد يكون :

وقر الكسر
Charge de rupture (F).
Breaking load (E).

وقر متحرك
Charge mobile (F).
Travelling load (E).

وقر مستديم
Charge permanente (F).
Permanent load (E).

وقر لامركزي
Charge excentrique (F).
Essentrick load (E).

وقر منفرد
Charge isolée (F).
Concentrated load (E).

وقر موزع بالتساوي
Charge uniformément répartie (F). Uniformly dis-
tributed load (E).

٣٠٨٢٥ - وقرة
Cicatrice (F). Scar (E).
هي الاثر في الجسم من اي سبب كان . ج وقرات .

٣٠٨٢٦ - وقس
Gale (F). Scab, Scurf (E).
اسم شامل يطلق على جميع انواع الجرب التي تتركب الحيوان
والنبات . ومن قاربه الجرب فهو مقوس وهي مقوسة .

٣٠٨٢٧ - وقسيات
Gymnosaceae (S).
Gymnosacées (F).
فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى مرتبة التفطيات ورتبة
الزقيات . تتميز بازقاق عريضة تلحمها غلفة السن البين
المزج || اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ثلاث عمارات :
الزقيات والظفريات والمجبويات .

٣٠٨٢٨ - وقف
Wakf
هو حبس العين ورصد ريعها على الوقائف وذريه او من
يحبس .

٣٠٨٢٩ - وقف
Suspension
٣٠٨٣٠ - وقف الأثر
Surannance (F).
وقف اثر المقد الموقوف الموقوف عند اجل ما اذا هو لم
يحدد في حينه .

٣٠٨٣١ - وقمل ، كميرويس
Chamaerops (S).
Chamérops (F).
جنس اشجار ليغية برية ورتيئة من فصيلة النخلات .
مهداها البلاد الحارة . انواعها عديدة معظمها اسيوي المنبت
ومنها الافريقي والامريكي . سوقها جالسة تعلو من متر
الى عشرة أمتار . اوراقها مدوارة ، كبيرة القد ، جيلة
الخضار ، مستطيلة الزناد || اشهر انواعه التريئة
ما يلي .

الوقل الخافض
Chamaerops humilis (S).

الوقل الشائك
Chamaerops hystrix (S).

الوقل الصلب
Chamaerops martiana (S).

الوقل الفاخر
Chamaerops excelsa (S).

الوقل الكوششي
Chamaerops cochinchinensis (S).

الوقل المنفرد
Chamaerops fortunei (S).

الوقل المنشاري
Chamaerops serrulata (S).

٣٠٨٣٢ - وقمل خاشع ، موزحة
Chamaerops humilis (S). Chamérops humble, Pal-
mier éventail, P. nain (F). Dwarf palm, European
fan-palm (E). Hanpalme, Schirmpalme, Europäische
Zwerpalme (D). Palma camerops, P. minore, P.
femmina (I).

نوع من الوقل لا ينحس البرد العادي يعيش على معظم
شطوط المتوسط . ساقه قصيرة . اوراقه مروحية جيلة
الخضار الرتي المزاج . يزود ثريين ويستخرج من
اوراقه الياق قوة تصلح لصناعة الحبال . يتكاثر بالبر .

٣٠٨٣٣ - وقن
Dénicher (F).
To take out of the nest (E).

وقن وأقن : اخذ الطير من مضانها .

٣٠٨٣٤ - وقنة
Nid (F). Nest (E).

الوقنة : حفن الطائر دثن في الشجرة .

٣٠٨٣٥ - وقواق ، ققب
Cuculus (S).

Coucou (F). Cuckoo (E).

جنس طير من عمارة الوقواقيات وفصيلة القيقوبيات . انواعه
نحو ٧٥ معظمها متوسط القد قدره الحماة . الواجا
قريبة الشبه من ثوب الباشق مع ابريدها ورشيته وحسن
تبيجه . تألف الاحراج . قوتها الخشاش . لا تحسن
بيضا ولا ترق فراخها بل تضع بيضا خلسة في اركان



وقل



وقوان

بالاسود الابرجواني وبالابيض . دوارجه ، من الحوافر الى الركب ، تبنية اللون . حوافره الى السواد الاحمر اللامع . ذنبه ذئب الزرافة والجلل || الاثنى اصفر قدماً من الذكر وانحل جسماً ، اما الذئب فنفسه .

٣٠٨٤٣ - وَكَّاحَة حَرْجِيَّة * ٥

Drassus silvestris (S). *Drassode sylvestre* (E).
Syla drassus (E).

نوع من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايب سداسية المشاقق تنتمي الى فصيلة الوكاحيات || جسمها متوسط القد بطول عند العنكب نحو ١٣ م . وعند العنكب نحو ١٧ م . صدراسها زرواني الشكل ، اشجع اللون حطفي المواج . عينها زعنبيان . شيفهاها غليسيان . فكاهها مستطيلان نشطان . جزامها كبيرة ، كثيرة الهلب . بطنها بيضي الشكل ، حطفي اللون ، احمر المواج ، اسود التقطع المجرى ، ينتهي بشلولة دقيقة فارقة || تألف الحراج والبراري . عكبتها وطاق تنسجها تحت الحجارة والجفوع المستلقية . مسرحها جدوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوتها الحشرات الصغيرة والاساريح . تسمى الى قصصها ركساً وتتميز بالمرارسة والخلع || بيابها الشتوي يستمر من ١٦ الى ١٨ اسبوعاً . تعيش نحو ثلاث سنوات . والاثنى تمتع المكان على دفء واحدة في غشاء من النواس متين الحيك تلفه وتحمله لاصقاً بمشائتها الى ان يمّ النقف . ثم تحضن الصغار على سطح بطنها نحو اربعة اسابيع || تعتبر من الدويبات النافعة للازودية .

٣٠٨٤٤ - وَكَّاحِيَّات * ٥

Drassidae (S). *Drassidae* (E).
فصيلة عناكب من رتبة الزيليدات . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع اقطار العالم . جميعها مفترسة ، متوسطة القد او صغيرة . تتميز بصدرها البيضي الشوزن ، المبطنة الجرم وبامتداعه اجهزتها الشفوية || اثنائها متبانية الالوان . شعها وطاقات تقعيها تحت الحجارة والجفوع المستلقية ولها الانجار والجمالة || اشهر انواعها الوكاحة .

٣٠٨٤٥ - وَكَّار * ٥

Coureur (F). *Runner* (E).
هو الداء ، اطلبه . رابع عقد الوكالة .

٣٠٨٤٧ - وَكَب * ٥

Coloré (F). *Coloured* (E).
وكب الثمر : لون وزهي وقد يكون ذلك عند الادراك .
Coloris (F). *Colouring* (E).
هو زعاه ماجة لون الثمر او اي لون كان .

٣٠٨٤٩ - وَكْسَة * ٥

Point (noir ou rouge) (F).
Point (black or red) (E).
نقطة سوداء او حمراء . اوراق موكوة : ظهر فيها نقط .
٣٠٨٥٠ - وَكُج * ٥
الوكج : هو المكان الصلب . يقال بلغ في سفره الوكج اي بلغ الصخر .

٣٠٨٥١ - وَكْر * ٥

Nid (F). *Nest* (E).
الوكر : عش الطائر وان لم يكن فيه .

بعض الطيور ولا تلقي في العش الواحد أكثر من بيضة واحدة . ذكرها أكثر عدداً من اناثها . وهي من الطيور شبه القواطع تسير في الليل . تحضي الربيع والصيف في الاقاليم المعتدلة والخريف والشتاء في الاقاليم الدافئة || اشهر انواعها : البوق المائلون والبوق المطرق والبوق المرقط والبوق الكبير الدارة والمقرض والقيقب والقيقبو والكوكو والكركر والكركر والكركر والفوقل والحمام القوال والهمو والطلطوى .

٣٠٨٣٦ - وَفَوَقِيَّات * ٥

Cuculinés (F).
عارة طير من فصيلة القيقوبيات . اجناسها اربعة وانواعها المعروفة ١٤٠ موطها احراج العالم القديم . وهي باكريتها من الطيور النافعة التي تلتهم الحشرات . من مزاياها الخاصة انها لا تحضن بيضها ولا ترق فراخها وصوتها يشبه الوقوة .
Combustible * ٥
في المواد التي تستخدم لتوليد الحرارة باسترقاقها في الهواء . تقسم الوقود من حيث حالتها الطبيعية الى ثلاثة اقسام تعرف بالصلبة كالقحم والسائلة كالنفط والغازية كغاز الاستسج . وتقسم ايضاً من حيث مصدرها الى طبيعية كالنفط والقحم ومحفرة كالكمحول .

٣٠٨٣٨ - وَكِيد * ٥

Brûlés (F).
Denshered, Patch of burnt (E).
ما توقد به النار من حطب ونحوه ؛ والارض التي احترق نباتها .
الموقع الذي اعتاد الطائر اتيانه والوقوف عليه .

٣٠٨٤٠ - وَكِيمَة * ٥

Lamelle (F). *Lamella* (E).
الوكيمة والسارة ، رأة صخرة من الزجاج متناهية في البقة تستعمل لتغطية المستعمية المطلوب فحصها تحت المهرج .
Dichroisme (F). *Dichroism* (E). * ٥
الوكاب غاصة تتميز بها بعض الاجسام فتنظر للناظر اليها كاتها مخضبة بلونين وذلك بالنسبة الى انعكاس النور او انكساره .

٣٠٨٤٢ - وَكَّاب * ٥ ، وَكَبِي * ٥

Okapia Johnstoni (S). *Okapi de Johnston* (F).
حيوان يون غاشب يجتر اكتشفه الرحالة الانكليزي السير جوستون عام ١٩٠٠ في غابات الكونغو المتاخمة لفضة الشالية من نهر « سلبكي » . يبدو ، من الهيكل والشكل الخارجي ، كأنه يتحد من الزرافة والمهاة وحمار الزرد . يألف الغابات المستعمية . مناطق مرتفعة عن سطح البحر نحو ٤٠٠٠ م . ملجئه الحيائي زروبي || جسمه بطول نحو ٢٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم . ارتقاعه الى الحاروك ١٥٠ سم . معادلته السنية ٣٢ كرا . هي الحال عند الزرافة . رأسه معتدل الجرم . قصبة انفه مخدبة . غنطه وشي الشكل . حاروكه ارفع من الظهر . عنقه عتق المهاة . ككله كفل حمار الزرد ودوارجه متساوية كدوارجه || ثوبه الى الجفوة القرمزية المواج . محصره الى البياض الاصفر . غنطه الى السمرة القانعة . جبهته الى الحمرة الدموية . سيالته سوداء تمتد حتى الجحفلة . اذناه اكبر من اذني الحمار ولها كاسيتان جؤويتا اللون . عنقه ومكيبا الى الجفوة السوداء المواج . فخذاه مجذعتان



وَكَّاب



وَكَاحَة حَرْجِيَّة

Curatelle (F). **٣٠٨٦٤ - وَلايَة ، قِوَامَة**
Guardianship, Trusteeship (E).
هي إدارة شؤون وأموال المجهور عليه .

٣٠٨٦٥ - وَلَث الولث هو القليل من المطر .

٣٠٨٦٦ - وَلَتَح
Herbes effilées (F).
الولح هو العشب المستطيل .

٣٠٨٦٧ - وَلَغ ، وَلُغ ، وَلَغَان
Lapement (F).
شرب السباع بالسنتها .

٣٠٨٦٨ - وَلُود
Vivipare (F). Viviparous (E).
مدلول التكاثر النسلي بالولادة ، بماكسها يبيض .

٣٠٨٦٩ - وَلُول * ، بُوَسَة الْأَطْلَال
Otus ascalaphus (S). Hibou ascalaphe (F).
طائر من البوم ينتمي إلى عمارة البوميات . موطنه إفريقية
الشالية وبعض مناطق حوض البحر المتوسط . جسمه
صغير القد يطول نحو ٣٠ سم . ثوبه أعين من ثوب البومة
وأكتف رقيقة . يألّف الأطلال والاحراج ولا يقرب إلا ما كان
الأكله إلا عند ميسر الحاجة . يتلصق قوته في الليل . يصيد
جميع أنواع القراصم والحشرات .

٣٠٨٧٠ - وَلِيسْتَارِيَة هي وشع الماء ، اطلبه .

٣٠٨٧١ - وَلِغ
Pollen
هو الصلح ، اطلبه .

٣٠٨٧٢ - وَلِغِي * ، وَلِينِي
Pollinique (F). Pollinic (E).
اطلب علمي .

٣٠٨٧٣ - وَمَاشَة النَّحْل
Braula coeca (S).
حشرة راشنة مؤذية من فصيلة البوميات ورثة ذوات
الجناحين || جسمها شديد الصغر يطول نحو ١ م . تعيش
كامل حياتها الحشرية معلقة بالنحل || مكنتها شديد
الصغر تحتحمه الاثنى فردياً في الخلايا فينقش عن يرقات
متناهية الصغر واللثة تعيش على المكبر الحزون والتغاريب .

٣٠٨٧٤ - وَمَاشِيَّات *
Braulidae (S).
Braulidés (F). Braulidae (E).

فصيلة حشرات راشنة مؤذية من رتبة ذوات الجناحين .
لها نومان يصممها جنس واحد || أجسامها صغيرة ، محدبة ،
شبه بيضية الشكل ، تطول من ١ إلى ١.٥ م . رؤوسها
صغيرة ، مبطنلة . عيونها دقيقة فارقة . قربها الاستشعارية
صغيرة ، قصيرة ، ثلاثية الفصل . كواسلها وبطنها
متناسقة . وهي عادمة الجناح والزران . قوائمها قوية ،
مشطية الأطراف || أشهرها ومشة النحل .

٣٠٨٧٥ - وَصَحَة *
Asterocystis (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصمغيات . تكاثرها
لاشي . تتميز بحمها البيضي المستطير الشكل العادم الرباط .
تنقل على عدة نباتات زراعية فتركب جذورها وتؤذيها
وقد تميتها .

٣٠٨٧٦ - وَصَحَة الْجُدُور *
Asterocystis radialis
نوع من الرمحة تركب جذور بعض النباتات اخصها
الكتان والسلمج واللث وأنس والكراث والشوان والتف

Parade (F). Pairing (E). **٣٠٨٥٢ - وَكَع**
الوكع هو مئاد الطيور الالهية . واكم الديك اللجاجة :
سعدا . وكمت الهامة والطة : خضمت لسفاد الذكر .

٣٠٨٥٣ - وَكَصَف
Vice (F). Defect, Viciousness (E).
هو العيب الظاهر في الشيء . ج اوكاف .

٣٠٨٥٤ - وَكَن
الوكن والوكنة : هي محض الطائر في حضن أو جدار .

٣٠٨٥٥ - وَكِنِغ
Menon (F).
الكيش أو الشاة تنبها النعم .

٣٠٨٥٦ - وَكِيل
Mandataire (F). Mandatory (E).
هو من استندت إليه الوكالة .

٣٠٨٥٧ - وَكِيل ، جَرِي
Régisseur (F).
Manager, Bailiff (E).
هو الذي يدير المزرعة ويقوم بشؤونها بدلاً من صاحبها .

٣٠٨٥٨ - وَكِيل ، خُولِي
Contremaître (F).
Overseer, Foreman (E).
هو رئيس العمال في ورشة معينة .

٣٠٨٥٩ - وَكِيل التَّفْلِيْسَة ، سَتْدِيك
Syndic de faillite (F). Syndic of bankruptcy (E).
هو الوكيل القانوني من كتلة الدائنين ويعتبره القانون
وكيلاً ايضاً عن المفسد ليدر امواله ويصفها .

٣٠٨٦٠ - وَلَاب *
Macropus (S). Wallable (F).
جنس حيوانات لبونة عاشية من فصيلة القنقرات .
انواعها المعروفة نحو ١٢ موطنها استرالية وتبانية . تألف
الاجام واللبايس والادغال . ملجئها الحيائي جماعي ||
اجسامها معتدلة القد تطول من ١٦٠ الى ١٨٠ سم .
فيه الذنب الذي يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . اثولها الى
الطحلة المتفاوتة السمرة . انثاها رباعية الاغلاف ||
اعرف انواعها واشهرها :

ولاب احمر العنق Wallable à cou rouge (F).
ولاب أسود الذنب Wallable à queue noire (F).
ولاب رشيق Wallable agile (F).

٣٠٨٦١ - وَلَادَة
Mise bas (F).
هي الوضع أي خروج الجنين من رسم الاثنى في نهاية
مدة الحمل .

٣٠٨٦٢ - وَلَادَة الْعَدَاكِي
Parthenogénèse (F).
Parthenogenesis (E).
هي الولادة التي لا يستتبعها كوم ؛ وقد تحصل في بعض
الحشرات منها الأزق .

٣٠٨٦٣ - وَلَانَة
Avellana (S).
Avellana (F). Avellana (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مئديات الارجل
وفصيلة الجليديات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
منشرة في بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة واخصها البحر
الابيض المتوسط . تألف الشطوط الحصبية والربلية ||
اعداها بتدنية الشكل والقد ، مستندرة القوفا الثلاثية
الاستنار . مالة الصفحة المعتدلة الساكنة ، الجميلة
الالوان الزاهية ، يكثر فيها المجزوي .



ول

للاستعمال إلا بعد مرورها بمدة مراحل تخميرية وتخميرية تستلزم الوقت الطويل الذي يراوح من ٨ إلى ٩ أشهر .

٣٠٨٨٩ - وَكِيلِين Vanilline (F). Vanillin (E).
عطر الونيلية يستخرج من الثمار التي تحوي ما يقارب ٢٪ من وزنها .

٣٠٨٩٠ - وَكِيمَة Sclérote, Stroma (F).
مشيمة نباتية صلبة المادة تتكون من بعض الفطور فتحفظها وتقودها . ج ونم .

٣٠٨٩١ - وَهَاجَة Photomorphose (F).
Photomorphosis (E).
الوهجة تأثير الضوء على النمو والانتشار عند الكائنات الحية .

٣٠٨٩٢ - وَهَآئَة Sénescence (F). Senescence (E).
هو الدور الذي يسبق الذبول في النجس الحية ان حيوانية او نباتية .

٣٠٨٩٣ - وَهَجَنَة Photologie (F).
Photology (E).
الوهجنة علم يبحث في وهج الضوء ومناخه ومعطياته .

٣٠٨٩٤ - وَهْد Terrain bas, encaissé (F).
الوهد والوهدة : الارض المنخفضة ايما كان مؤدها . ج أود ووهدان ووهاد .

٣٠٨٩٥ - وَهْر
الوهر : نوع يقع الشمس على الارض حتى ترى له اضطرابا كالبخار .

٣٠٨٩٦ - وَهْص Emasculation
هو انتزاع الخصيتين لانساد عمل التناسل في ذكر الحيوان .
الغاية منه حث الحيوان على التوطين .

٣٠٨٩٧ - وَهْط Bocage (F). Copse, Basket (E).
غابة صغيرة ظليلة وكل حرجية من عشر .

٣٠٨٩٨ - وَهْف Feuillage (F). Foliage, Leafage (E).
جاء اوراق الشجرة .

٣٠٨٩٩ - وَهَق Lasso
هو حبل في طرفه انشطة يطرح في عتق الدابة للقبض عليها . يقال صاده بالوهق . ج اوراق .

٣٠٩٠٠ - وَهْلَبْرِجِيَّة * Wahlenbergia (S).
Wahlenbergie (F). Wahlenbergia (E).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الجريسيات .
جنسها واوراقها متباينة الاشكال والاحجام . ازهارها مختلفة الالوان ، يكثر فيها الازرق || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٣٠٩٠١ - وَهْلَبْرِجِيَّة صَعْتَرِيَّة الْوَرَق *
Wahlenbergia serpyllifolia (S).
Wahlenbergie à feuilles de serpolet (F).
مهددا البلقان . ساقها قصيرة تملو نحو ١٠ سم . اوراقها

والقصبة || مظهرها الخارجي يقع كستنية اللون مستطيلة الشكل تنشق الجذور عند انتشارها . وعند تقاطع شراها تعطب الاوراق وتسبب يباسها .

٣٠٨٧٧ - وَدَيد الوديد والودة : شدة حر الليل .
٣٠٨٧٨ - وَدَس ووس وأوس المنب : لان وقرب النضج

٣٠٨٧٩ - وَدِيش Fulguration (F). Fulguration (E).
لمعان كالبرق يظهر في الطبقات العليا من السحاب لا يعقبه رعد .

٣٠٨٨٠ - وَدِيشير * Winters (S). Wintère (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الونثريات .
انواعها المعروفة خمسة . جميعها جنات معمرة فراء .
اوراقها معنقة ، جامدة النصال السنائية الشكل ، الجميلة الخضار اللامس . ازهارها جملة ، كبيرة ، خاسية البتلات الملونة ، عديدة الاسدية الصفراء اللون || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٨٨١ - وَدِيشِيرِيَّات * Winteraceae (S).
Wintéracées (F). Winteraceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القمالات .
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جزر الزوايح ||
جميع نباتاتها شجيرات وجنبات فراء . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، نصالها سنائية جامدة . ازهارها عثكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة جملة القالب ملونة ||
اشهر اجناسها الونثير .

٣٠٨٨٢ - وَدَس هو الغفاس المتوج ، اطلبه .

٣٠٨٨٣ - وَدَكَ ، وَدَكَ حَضَنَ Couver (F).
وندك الطائر : حضن البيض .

٣٠٨٨٤ - وَدَنَّا هي القضا ، اطلبه .

٣٠٨٨٥ - وَدَمَة ، وَدِيم سلح الذباب .

٣٠٨٨٦ - وَدِيلَة ، وَدِيلَة Vanille (F). Vanilla (E).
ثمر الونيلية وهي على شكل سفة مستطيلة يستخرج منها عطرها المشهور الشائع الاستعمال .

٣٠٨٨٧ - وَدِيلِيَّة ، وَدِيلِيَّة Vanilla (S).
Vanillier (F). Vanilla-plant (E).
جنس نباتات مدادة عارشة من فصيلة السحليات .
انواعها عديدة ، اعطائها المناطق الحارة ، معظما بري وبعضها
تربتي وصناعي || اشهر انواعها الزراعية الونيلية المنبسطة
الورق .

٣٠٨٨٨ - وَدِيلِيَّة مُنْبَسَطَة الْوَرَق *
Vanilla planifolia (S). Vanillier commun (F).
Common vanilla-plant (E). Echter Vanille (D). Vaniglia,
Vanigliero (I).

اشهر انواع الونيلية واعماها زراعة . جنبها قصبة عارشة متدلية . اوراقها معنقة متعاقبة منبسطة الصفحة قليلة العمل . حوافها دقيقة مستطيلة تقابل الاوراق . ازهارها عثكولي التجميع عمودي الارتكاز . ازهارها كبيرة القدر عطرية العرف . ثمارها سفينة الشكل مستطيلة لا تصلح



ونثير



ونيلية منبسطة الورق



وهلبريجيه

۳۰۹۰۶ - وَهَيْجِيَّة ٥
Faculaire (F).
نمت منسوب الى وهيجة الشمس .

۳۰۹۰۷ - وَئَلَار ٥
Carrière de terre glaise (F).
Quarry of clay (E).

هو محفر الطين الذي تلاط به الحياض وغيرها منها
لرشح الماء .

۳۰۹۰۸ - وَبِيَّة ٥
الويه طائر يعرف بالطيطوى الخيسال ، اطابه . وهي
ايضاً نبات غزام الصباغين .

۳۰۹۰۹ - وَئِج ٥
Age de la charrue (F).
Plough-beam (E).
هو سلب الخراش الجامع لساثر اجزائه .

۳۰۹۱۰ - وَرَاتَرِين ، وَرَاتَرِين ٥
Vératrine (F).
Veratrine, Veratria (E).

مادة نباتية شبه قلوية تستخرج من بذور الخربق
الابيض . تستعمل طبياً ضد الحميات والالتهابات .

۳۰۹۱۱ - وَغَنْدِيَّة ٥
Wigandia (S).
Wigandie (F). Wigandia (E).

نبات معقود التعريف عل اسم الطبيب « وغاند » . مجلة
معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة التجميات . مهدها
بعض مناطق بوليفية || مجلته تملو نحو ثلاثة امتار .
ساقها قليلة الفروع متكاثفة الغماء الجامد الشائك . اوراقها
متعاقبة ، معتقة ، متعجبة النصال الكبيرة التي يبلغ طولها
نحو ٩٠ سم . وعرضها نحو ٥٠ سم . صفحاتها العليا الى
الخضار البحري . صفحاتها السفلى كثيفة الغمل ، فضية
المواج || ازهارها سستيمى قرق . ازهارها كبيرة ، عقرية
الشكل ، بنفسجية اللون ، خليسة التويج || تنويرها
يستمر طوال شهر نيسان .

۳۰۹۱۲ - وَئِنْ ٥
Raisin noir (F). Black grapes (E).
هو العنب الاسود اللون من اي ضرب كان .

كاوراق الصمتر تطول نحو ٣ سم . نصالها خلية فضية
المواج . ازهارها بنفسجية التويجات ، حر الكؤوس ،
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال
فصل الصيف .

۳۰۹۰٢ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَشَقِيَّةُ الْوَرَقِ ٥
Wahlenbergia hederacea (S).

Wahlenbergie à feuilles de lierre (F).
منتجها يمتد من الشرق الادف الى اوروبا ، يكثر وجودها
في المناقع وعل الصفات الرملية . ساقها نخيلة مستقيمة
تطول نحو ٣٠ سم . اوراقها كاوراق المشقة شكلاً وقدأ .
ازهارها فردية ، مستطيلة المالحق ، زرقاء اللون ، قطرها
من ٢ الى ٤ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى
تشرين الاول .

۳۰۹۰٣ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَصَلِيَّةٌ ٥
Wahlenbergia graminifolia (S).

Wahlenbergie à feuilles de graminées (F).
مهدها يمتد من البلقان الى حوض البحر الابيض المتوسط .
ساقها تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها عصفية الشكل
كاوراق النجيليات وتطول نحو ١٦ سم . ازهارها زرقاء
اللون ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من حزيران
الى آب .

۳۰۹۰٤ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ كَرَوَاتِيَّةٌ ٥
Wahlenbergia croatica (S).

Wahlenbergie de Croatie (F).
مهدها كرواتية ودلاسيه . ساقها تملو نحو ١٠ سم .
اوراقها سنانية خفيفة تطول من ٣ الى ٥ سم . ازهارها
بنفسجية التويجات والكؤوس ، صغيرة القد ، قطرها نحو
٢ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

۳۰۹۰٥ - وَهَيْجِيَّة ٥
Facule (F). Facula (E).

الويجة بقمة اكثر تاجباً ولعناً من غيرها في القراص
الشمسي . ج وهائج .



وغندية



ي

٣٠٩١٨ - يَاسَم ، قَعُو ، وَثَافِيَّة ، نَوَّار أَبْيَض

Ligustrum (S). Troène, Prûne, Bois noir (F). Privet, Privy, Prim (E). Gemeiner Liguster, Liguster, Gewöhnliche rainweide (D). Ardivela, Baclare, Ligustro, Lamitra, Rovistica, Olivella, Mimolo (I).

جنس نباتات برية وريضية من فصيلة الزيتونيات . أنواعه نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها زُرْبِي . نباتاتها تختلف الأحجام منها الشجيرات والجنبايات والجنبايات . سوقها فراء فناء . أوراقها معنقة متقابلة أبيض صغيرة النصل اهليلجية الشكل . أزهارها مستحبة العرف صغيرة القذ عكوكية التجميع تاجية الارتكاز او هامة || زرع في الحدائق والبساتين للتسبيح وعلى جوانب الممرات . وهي سهلة الانقياد تأخذ جميع الاشكال المطلوبة وتصلح لصد الرياح حتى ارتفاع ثلاثة أمتار || اشهر أنواعه الزيزينية ما يتبع .

٣٠٩١٩ - يَاسَم بَيْضِي الْوَرَق

Ligustrum ovalifolium (S). Troène à feuilles ovales (F).

جنية صغيرة القذ فناء . أوراقها بيضية الشكل عابلة ، نصلها جميل الخضار الاصفر الموج . تكثر زراعتها في المراكن وفي الحدائق المرتبة المصممة الاشكال والالوان . تتكاثر بالتعجيل .

٣٠٩٢٠ - يَاسَم صِينِي

Ligustrum sinensis (S). Troène de Chine (F).

شجيرة سريضة فناء تملو نحو ٤ أمتار . تصلح للزئين ولصد الرياح . أوراقها ابيدة ، نصلها سناني الزام الاخير ، جميل الخضار المايق || تتكاثر بالتعجيل وبالزور .

٣٠٩٢١ - يَاسَم صَيِّق الْوَرَق

Ligustrum angustifolium (S). Troène à feuilles étroites (F).

جنية متوسطة القذ تملو نحو ٢٥٠ سم . ساقها فناء . أوراقها

Hortensia (F).

٣٠٩١٣ - يَابَانِيَّة

نبات زُرْبِي يدي ايرلسيا ، اطلبه .

٣٠٩١٤ - يَارُوز الْأَرْز *

Baoris zelleri (S). حشرة من الحسيرييات ، فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٣٠ م . فوها الى الي الزبي الموج . رواشها الامامية مبقجة بالابيض . رواشها الخلفية حطية اللون برتقالية الموج || يكثر وجودها في الربيع والصيف . رقاتها تنقف على عصف الارز فتلتهم النصال وتؤذي النبات .

٣٠٩١٥ - يَارُوز المَرَامِي *

Adopaea actaeon (S). حشرة من الحسيرييات ، فراشها تطول نحو ٢٨ م . جسمها مردي الشكل كسني الثوب . رواشها حطية اللون زيتية الموج زهو في الذكور وتيق في الاناث || يكثر وجودها من بموز الى آب . رقاتها تركب الزروع والمرامي فتؤذيها اذا كثر عددها .

٣٠٩١٦ - يَارُوز التَّجِيلِيَّات *

Adopaea lineola (S). حشرة من الحسيرييات فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٢٦ م . في الذكور ولاناث . جسمها مردي الشكل كسني الثوب . رواشها برتقالية اللون حطية الخمار والتسليج . يكثر وجودها من بموز الى آب . رقاتها تركب عصف التجيليات فتؤذيها .

Termite femelle (F).

٣٠٩١٧ - يَارُوزِي

She termite (E).

هي الارضة الاثى الكاملة الاعضاء التناسلية . وظيفتها منع المازن لاستمرار وجود الرمية .



يَارُوز الْأَرْز



يَارُوز المَرَامِي



يَارُوز التَّجِيلِيَّات

عروة. نصلها غريق الصفحة، اخضر اللون، جوي الملمح. تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

٣٠٩٢٢ - باسم كثيف الورق

Ligustrum compactum (S). *Troène compact* (F).
جنية زربية صغيرة القد كثيفة الالوان. اوراقها دائمة اهليلجية الشكل، نصلها جبل الخضار العابق || تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

٣٠٩٢٣ - باسم معروف*

Ligustrum vulgare (S). *Troène commun* (F).
جنية سبروتية شائعة الاستعمال التريبي. ساقها فراء فناء. اوراقها ابيدة اهليلجية الشكل مدببة الطرف جميلة الخضار القائم الجوي الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

٣٠٩٢٤ - باسم ياباني

Ligustrum japonicum (S). *Troène du Japon* (F).
جنية سبروتية شائعة الاستعمال التريبي ولصد الرياح. ساقها فراء فناء تملو نحو ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة نصلها اهليلجي الشكل، لسن الزام الاخير، اخضر اللون. فستى الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

٣٠٩٢٥ - ياسمين*

هو الياسمين، اطله.

٣٠٩٢٦ - ياسمين*

jasminum (S). *ياسمينون* (S). *Jasmin* (F). *Jasmine* (E). *Jasmin* (D). *Gelsomino* (I).
جنى نباتات معمرة برية وزراعية من سبط الياسينيات وفصيلة الزيتونيات. انواعه زهاء ١٠٠ معظمها بري وبعضها زراعي تريبي وصناعي || سوقها فراء عارشة. اقلها جالبة الانتداب. اوراقها متقابلة مركبة، وريقاتها لا قياسية التجميع والشكل. ازهارها جميلة المنظر مخفلة الالوان يكثر فيها الالبيض ثم الاسفر والاخر. بعضها فواح العرف العطري يستخرج منه دهن فاخر الصنف مرغوب فيه || يتكاثر الياسمين بالترقيع. يوجد في جميع الارضية اغصان الخفيفة المتوسطة الاندماج لانه يخفى الرطوبة المستحكة || اشهر انواعه ما يتبع.

٣٠٩٢٧ - ياسمين أبيض، ياسمين مخفري، ياسمين معروف

jasminum officinale (S). *Jasmin commun*. *J. blanc* (F). *Jasmine of poetry*. *White flowered Jasmine* (E). *Echter Jasmin*. *Weisser Jasmin* (D). *Gelsomino bianco* (I).

نوع من الياسمين السبروتي المبدول. اقله البلاد المعتدلة الحرارة المنفردة نحو الحارة. جنيته متقلبة تملو نحو ٩ امتار. فروعه متقابلة مضلفة المقطع والزاويا. اوراقه متقابلة، وريقاته وريته الترتيب لا قياسية التجميع والعدد منها الخامسة والسباعية والتساعية. لوها الى الخضار العابق. نصلها دمل الصفعة || ازهاره عثكولي التجميع عوري الارتكاز. ازهاره متفوعة العرف العطري المستحب، لوها ابيض بلق || تنوره يستمر من ايار الى ايلول.

٣٠٩٢٨ - ياسمين أزغب

jasminum pubigerum (S). *Jasmin à duvet* (F).
نوع من الياسمين السبروتي. يعيش في جميع الاقاليم المعتدلة. بجلة منتصبه تملو نحو ١٥٠ سم. افنادها مضلفة الزاويا. اوراقها متقابلة، مركبة، وريته الترتيب، خماسية او سباعية او تساعية الوريقات. وريقاتها اهليلجية الشكل، نصلها ازغب الصفعة السفلى، غلى العليا. ازهارها عثكولي

التجميع. عثكولها يمد من ٥ الى ١٥ زهرة. زهرتها صغيرة القد، صفراء اللون، خابطة العرف || تنورها يستمر من اذار الى تشرين الاول.

٣٠٩٢٩ - ياسمين إسباني، ياسمين كبير الزهر

jasminum grandiflorum (S). *Jasmin d'Espagne*. *J. à grandes fleurs* (F).
نوع من الياسمين السبروتي. زراعه الصناعية شائعة لاستخراج دهنه العطري. جنيته تملو نحو ٣ امتار اوراقه متقابلة، وريقاته وريته التجميع لا قياسية العدد. لوها الى الخضار اللامع. نصلها جامد الصفعة. ازهاره عثكولي التجميع، عحوري الارتكاز. ازهاره كبيرة القد، لوها الى البياض الموشع بالوردي، عريها فواح الرائحة الاخاذة || تنوره يستمر من حزيران الى تشرين.

٣٠٩٣٠ - ياسمين أصفر، ياسمين البر

jasminum fruticosum (S). *Jasmin à feuilles de cytise*. *J. frutescent* (F).
نوع من الياسمين المبدول. جنيته تملو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها متقابلة مركبة. وريقاتها لزاوية الشكل صغيرة القد تملو شفعية الترتيب، ثنائية او رباعية التجميع || تنوره يستمر من ايار الى حزيران.

٣٠٩٣١ - ياسمين آصوري

jasminum azoricum (S). *Jasmin des Açores* (F).
نوع من الياسمين، اقله البلاد المعتدلة المنفردة نحو الحارة. جنيته عارشة. فروعه متقابلة اسطوانية للمقطع. اوراقه مركبة ثلاثية. وريقاته شبه قلبية الشكل. نصلها جامد الصفعة اللامعة. ازهاره عثكولي التجميع عوري الارتكاز. ازهاره بيضاء اللون، متوسطة القد، فواحة العرف المستحب || تنوره يستمر من حزيران الى آب.

٣٠٩٣٢ - ياسمين صيني

jasminum beesianum (S). *Jasmin de Bees*. *J. de Chine* (F).
نوع من الياسمين السبروتي وهو بجلة معمرة صغيرة القد تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها بيضيه الشكل، سنانية الزام الاخير؛ نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وهو جامد الصفعة فستى اللون. ازهارها عطرية العرف، حراء اللون، متوسطة القد، ثلاثية التجميع او فردية. تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٩٣٣ - ياسمين عطري

jasminum odoratissimum. *J. suaveolens* (S). *Jasmin suave*. *J. jonquille* (F).
نوع من الياسمين السبروتي. منته جزر كناري وماويرا. جنيته تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وانفادها اسطوانية المقطع. اوراقها متقابلة، مركبة، وريته الترتيب، ثلاثية او خماسية التجميع، وريقاتها ابيدة، نصلها بيضى الشكل مقطوع القاعدة. ازهارها ثلاثية التجميع، صفراء اللون، فواحة العرف المستحب || تنورها يستمر من نيسان الى تشرين الثاني.

٣٠٩٣٤ - ياسمين آخر

هو الكموكلت، اطله.

٣٠٩٣٥ - ياسمين الليل

هو شرخات الليل، اطله.

٣٠٩٣٦ - ياسمين زنبقي

هو الفل، بجلة زربية عطرية، اطلها.



ياسم صيني



ياسم معروف



ياسمين

٣٠٩٥٢ - يَاسَمِين (F). Dextrorse (E). **يَاسَمِين** ٥

يامن م. يامنة. نمت تعريف يطلق على كل ساق نباتية متسلقة دورتها اللولبية من اليسار الى اليمين.

٣٠٩٥٣ - يَأْمُور *

Capreolus capra, Cervus capreolus (S). Chevreuil (F). Roeubuck, Roedeer (E). Rehwild (D).

حيوان لبون يجبر من فصيلة الايليات. جسمه يطول نحو ١١٥ سم. ويصلو ٧٤ سم. أما ذنبه فهو نحو ٢٥ سم. ثوبه الى الحمرة الخفيفة المواج وهو اغبر البطن، ابيض العجز. قرنه مثلث الشعب يتصله كالأليل. موطنه اجراج الشرق الاوسط وأوروبا الغربية والوسطى. يعيش جماعات قليلة العدد. اجله مؤلف من ذكر وثلاث او اربع اناث. الانثى تحمل ٥ اشهر وتضع من يعفور الى ثلاثة.

٣٠٩٥٤ - يَأَسُون **يَأَسُون** (F). Anis (F).

هو الياسون، اطليه.

٣٠٩٥٥ - يَأَسُون بَرِّي

هو الكمن الحبي، اطليه.

٣٠٩٥٦ - يَانَع **يَانَع** (F). Mature, Mûr (F).

نمت تعريف يوصف به جميع المحاصيل الزراعية التي اجازت دور الادراك ودخلت في دور الايناع.

٣٠٩٥٧ - يَأْتُون *

جنس حشرات فراشية من فصيلة المسيريات. انواعه المؤذية قليلة. اجسامها نحيلة القد تطول نحو ٢٨ مم. في الذكور والاناث. رواشن ذكورها حطيفة اللون يبيض التجذيع والزركمة. رواشن اناثها بنية اللون حر التقيج والتجذيع || يكثر وجودها من ايار الى حزيران. برقائها تركب النجيليات دون ان تؤذيها شديدة الاذى.

٣٠٩٥٨ - يَأْتُون النَجِيلَات *

Pamphila sidae (S). Pamphile des graminées (F). Pamphila sidae (E).

حشرة من فصيلة المسيريات ورتبة صغريات الاجنحة. موطنها الشرق الادنى وبعض الاصاقع الاوروبية. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها تميش على عصف النجيليات جسمها متوسط القد ودرني الشكل يطول نحو ١٤ مم. بسطها نحو ٢٩ مم. رأسها كبير الطرم. بني اللون. عينها كبرتان ناثرتان. زباناها صولجانيان. جوشها وبطنها الى الخنطي الشديد السرة. زغب طوقها السري الى الشقعة || رواشن الذكر الى الخنطي يملو تقيج وزركمة صناية. الزوج الاسامي اكثر زركمة من الخلفي الذي يتميز بنقطة كبيرة تطوقها نقط صغيرة جميعا الى السرة القائمة. رواشن الانثى الى البني يطلو تقيج احمر وتجديع اشجع اكلس وبعض نقط صغيرة غبراء اللون || لها جبل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في النهار. تعامل بل ظهورها بنحو سبعة اسابيع وتحت المكن مبيحاديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستقيم الوسط، مبهر الهلب، ارمك اللون يطلو تمشج اسم. رأسها ونديها ودواجها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو خمسة اشهر يتقفي داخل صليجة تحببها السرفة بين اوراق الاشجار الابيدة.

٣٠٩٣٧ - يَاسَمِين عَرَائِيلِي

هو صريمة الجدي الشائعة، اطلبها.

٣٠٩٣٨ - يَاسَمِين هِنْدِي **يَاسَمِين هِنْدِي** هو الفتنة، اطلبها.

٣٠٩٣٩ - يَاسَمِينِيَّات

Jasminacées, Jasminées, Jasminiacées, Jasminidées, Jasminariées (F).

سبط من فصيلة الزيتونيات، اجناسه وانواعه عديدة اشهرها أليابا، نباتاته جنبات وجنبات فرعاء السوق. ازهاره جميلة الشكل ثنائية السداة، خماسية التركيب، بعضها عطر فواح العرف المستحب.

٣٠٩٤٠ - يَاسْتَعُوس **يَاسْتَعُوس** (F). Jacinthe (F).

هو الجاستنت، اطليه.

٣٠٩٤١ - يَاسْكِيد **يَاسْكِيد** (F). Alzoon (F).

جنس نباتات برية وتريبتية من فصيلة الظهريات مشهور باسم حندق، اطليه.

٣٠٩٤٢ - يَإ عَرَال دُور دُور **يَإ عَرَال دُور دُور** (F). Erodion clutin (F).

هو ابرة الجوز، اطلبها.

٣٠٩٤٣ - يَإَلَع **يَإَلَع** (F). Adulte (F).

ياقع، بالغ، ملك، شوب، مشب، نعوت تعريفية لمقى واحد يوصف به طور الاستقرار الحياتي القائم بين طورى اللتوة والشيوخنة.

٣٠٩٤٤ - يَإَلُوح **يَإَلُوح** (F). Fontanelle (F).

فرجة غشائية في الجمجمة. Fontanel, Fontanelle (E).

٣٠٩٤٥ - يَإَلُوح **يَإَلُوح** (F). Sinclut

هو قة الرأس يقابله التفن.

٣٠٩٤٦ - يَإَلُوكَة **يَإَلُوكَة** (F). Ephémère (F).

حشرة تعرف بأبنة يوم، اطلبها.

٣٠٩٤٧ - يَإَلُوفِيَّات **يَإَلُوفِيَّات** (F). Procephemera (E).

رتبة حشرات صغيرة القد نحيلة الجسم من طبقة البيويات. فصائلها واجناسها وانواعها عديدة، جميعها من الحوام التي تقضي حياتها البرقية في الماء.

٣٠٩٤٨ - يَإَلُوت **يَإَلُوت** (F). Corindon (F).

حجر كريم شفاف، صلب الجسم رزينة، اجوده اصفاء. وهو يختلف الالوان فيه الاحمر والاصفر والاخضر والازرق.

٣٠٩٤٩ - يَإَلُوتِ أَحْمَر **يَإَلُوتِ أَحْمَر** هو اللعل، اطليه.

٣٠٩٥٠ - يَإَلُوتِ زَهْرَانِي **يَإَلُوتِ زَهْرَانِي** (F). Hyacinthe (F).

ضرب من سيليكات الزرقون، وهو حجر كريم زعفراني اللون يوجد عادة في بعض طلع البراكين.

٣٠٩٥١ - يَإَلُون *

Polymnia edulis (S). Yacon (Poir de terre) (F).

نبات حولي من فصيلة المركبات قريب الشبه من الدهلية. منته البلاد الحارة الامريكية. جذوره صغولية. ساقه فرعاء. اوراقه متعابلة منعقة سنائية النصل المزواني الحافة. يستخرج من عساقله مادة نشوية مأكولة وصناعية يستغل منها بعد تحميرها بعض الكحول الشائعة الاستعمال.



يَاسَمِين



يَاسَمِين



يَإَلُوت



يَإَلُوتِ النَجِيلَات



نباتية



بيد



بيروج مخزني



بترومة

٣٠٩٦٦ - بَترُوح، لَفْاح، مَندَرَجُور، مَندَرَاك لَفْاح المَجانين، لَفْاح الجِنِّ

Mandrake (S). Mandragore (F). Mandrake, Devil's apple (E). Alraun, Hundsapfel (D). Mandragora, Mano di gloria (I).

البيروح عبر التاريخ : اصل الاسم العلمي من المبروطاني ويطلق مندراغور . أما لفظة بروج فهي مبر يانية ومعناها ناقص الروح وذلك لان شكل جدر هذا النبات يشبه جسم الانسان . وقد ورد ذكر البيروح كسكن في بعض الاساطير الفروسيّة المألفة الى نحو ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد . وقد استعمل منوب عند الاشوريين وصنعت منه مرام مخدرة في عصر الولادة وآلام الانسان . وكان القدماء يستعملون الجذور والاوراق كخدر للاصصاب في العمليات الجراحية وفي بعض جبر الكسور المقلدة . وقيل ان جذره المشدودة اذا تقطعت في الخلل كانت مقوداً جنسياً عظيماً . وكان ايضاً شائع الاستعمال في السرور وفي طقوس افروديت .

تخليته العلمية : جنس نباتات مقرية ، عشية ، طيبة ، ممررة ، برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات . انواعه خمسة جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط . سوقها جنور لينة لحية تلتصق فيها الازداجية . شكلها شكل جسم الانسان اوراقها قرصية الارتكاز ، كبيرة القد ، معنقة . تصلها رافع الصفحة ، متباعد الحافة . ازهارها متصلة القد ، كثيرة العدد ، فردية التجميع تقوم على مائلي قرصية الانتشاب . الوانها مختلفة بين الابيض والازرق والاحمر والبنفسجي . ثمارها باذنجانية مستديرة . جذورها وثمارها واوراقها تحوي مادة مخدرة عنصرها كمنصر الاثروبين ان لم يكن اقل || اعرف انواعه واشهرها البيروح المخزني .

٣٠٩٦٧ - بَترُوح مَخزُني *

Mandrake officinarum (S). Mandragore officinal (F).

نوع من البيروح وهو نبات مقرى طبي بري وزراعي . مهدد المقدد الشرق الاوسط . ساقه جذرية ، حنارية الشكل ، فرقة ، لونها الى الحلي الاسمر . اوراقه قرصية الانتشاب ، معنقة ، كاملة ، مستطيلة . تصلها سبك الصفحة متباعد الاطراف . ازهاره فردية التجميع ، قصيرة الماعلي المنصبة . بيضاء اللون ، خضراء المواج . ثماره مستديرة ، كبيرة القد . راجع خواصه الطبية في المادة السابقة .

٣٠٩٦٨ - بَترُوق

Picrasma (S). Picrasme (F). Picrasma (E).

جنس اشجار حرجية طيبة وتزيينية من فصيلة السمروبيات . مهدد الشرق الاقصى . ساقها مسطحة الصاء حراء اللون مبقية بالاصفر ، ترتفع نحو عشرة امتار . اوراقها مركبة . وريقاتها تطول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . ازهارها عذلي التجميع . ازهارها الذكرية رباعية الفصل والنباتات والاسدية . ازهارها الانثوية خنسية المياس . احشائها صلبة صفراء اللون . لحاء السوق والاصقان مرة الطعم طيبة .

٣٠٩٦٩ - بَترُومَة * ، وَسَابِي *

Eutrema wasabi (S). Wasabi (F).

نبات بقل معمر من فصيلة الصليبيات . مهدد اليابان . ساقه حنارية مستطيلة . اوراقه قرصية الانتشاب ، غليظة الاضلاع ، كبيرة النصال القليلة الشكل . شراخه الزهري يملو نحو ١٠٠ سم . ازهاره عنقودي منتصب . ازهاره

Potomagalus velox (S). Potomogale véloce (F).

حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة البليات . اصطناعه بعض مناطق افريقية الشالية || جسمها كثيف الوبر الناعم ، يطول نحو ٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٣٠ سم . راسها شبه مخروطي الشكل ، مستدير الخلف . اسنانها صغيرة ، متراصة ، حادة الاطراف ، عددها ٤٠ . ساقها متوسط الكثافة والصلابة . عينها كبريتان لوزيتان . اذناها مستديرتان صغيرتان . ذنبها شبه مردي الشكل جلل الوبر . قوائمها قصيرة . ثوبها الى السمرة يملوها في الرأس والظهر مواج ارجواني . ابطاها ويطنها الى البياض البني || تتميز بخلو هيكلها العظمي من الترقوة || تألف ضفائ مجاري الماء . قوتها الاسماك والغطاء والافاعي والغشرات الكبيرة .

٣٠٩٦٠ - بَياتِيَّات *
Potomagalidae (F). Potomagalidés (E).

فصيلة حيوانات لبونة حائرة وحيمة الجنس والنوع تشبه القفصاعة تعيش على ضفاف مجاري الماء || نوعها الوحيد البياية .

٣٠٩٦١ - بَياتِيَّات *
Dothidéacées (F). Dothideaceae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة المشويات ورتبة الرقيات . تتميز بأساسها المركبة المحققة القائمة على رزمة لا جولية . انفلاقها يحصل في مق ساهها المستديرة || اجناسها التي تم الانتفاذ الزراعي قليلة وهي التبيكة والديمية والديوريون والنيخية .

٣٠٩٦٢ - سَيسِد *

Sesleria (S). Sestérie (F).

جنس نباتات عشية ممروعة من فصيلة النجيليات . انواعه قليلة العدد . سوقها خنسية او سداسية الاشطاء ، دقيقة القصب ، ثنائية او ثلاثية السلايات . عصفها ضيق التصل المستطيل . ساقها اسطوانية الشكل ، صغيرة القد . يكثر وجودها في الاراضي الجبلية الكلسية للمساة . اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٩٦٣ - سَيسِد اُزُوق

Sesleria caerulea (S). Sestérie bleue (F).

نوع من اليبس البروتي المبدول . عشية سداسية الاشطاء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . عصفها مستطيل التصل المحجن يعرض نحو ٤ م . ساقها قصيرة القد اسطوانية الشكل تطول نحو ٣ م . قطرها ٧ م . ساقها الى الزرق الجميلة . يوجد في الاثرية الكلسية القليلة او المتوسطة الرطوبة .

٣٠٩٦٤ - سَيسِد فُضِّي

Sesleria argentea, S. nitida (S). Sestérie brillante (F).

نوع من اليبس البروتي المبدول . عشية خنسية الاشطاء تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . عصفها مستطيل التصل المقعر يعرض نحو ٢ م . ساقها مستطيلة لونها الى الزرق العائقة يملوها مواج فضي .

٣٠٩٦٥ - بَيرُوقَة

Feuille de vigne (F).

البيرقة ورقة الكرمة . ج يرق . وتدعى ايضاً الحُلب .

الارتكاز . ازهارها وردية اللون مشيرة بالارجواني . بتلاتها مهدبة الحار || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٠ - يُثْمَر عَطِير (S). *Adenandra fragrans*
٣٠٩٨١ - يُثْمَر عَطِير (F). *Adenandra odorante*

نوع من اليثوم الزيني . ساقه تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم .
اوراقها اهليلجية مستطيلة . نصالها منبسطة مرطاه جملة
الخضار الزاهي . ازهارها عتي التجميع ، طري الارتكاز .
ازهاره مستطيلة المالحق ، وردية اللون ، مفرسة الفصل
والبتلات ، عطرية العرف المستحب || تنويره يستمر طوال
شهر ايار .

٣٠٩٨١ - يُثْمَر قَرْدِي الزَهْرَة

(S). *Adenandra uniflora*
(F). *Adenandra à fleurs solitaires*

نوع من اليثوم الزيني . ساقه ترتفع نحو ٤٠ سم .
اوراقه سنانية الشكل ، مدببة ، شاذكة . نصالها ملتفة
الاطراف . ازهارها فردية التجميع ، طرية الارتكاز ،
بيضاء اللون من الداخل ، وردية من الخارج || تنويرها
يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٢ - يَجُوح ٥ (F). *Halophile*
نمت تمرني يطلق على النباتات التي تعيش وتتكاثر لتلائم
في الارربة المالحة .

٣٠٩٨٣ - يَحْبُور (F). *Ourarde (mâle)*
ذكر الحبارى .

٣٠٩٨٤ - يَحْمُور (F). *Ourarde (mâle)*
قد يكون الياصور . قال الجاحظ في وصفه : « دابة
وحشية نافرة لما قران طوليان كأنها مشاران . وقرونه
كفرون الأيل وفي صامتة لا تجوف فيها وهو أسرع من
الأيل » .

٣٠٩٨٥ - يَحْمُور (F). *Hémoglobine*
(E). *Hemoglobin*
مادة آسية يتألف منها خضاب دم الفقريات .

٣٠٩٨٦ - يَحْمُور (F). *Hémoglobine*
طائر من الفقنق ، يدعى الفقع المدس ، اطلبه .

٣٠٩٨٧ - يَحْمُور (F). *Oena*
هو الحنسة ، طائر من الحاميات ، اطلبه .

٣٠٩٨٨ - يَحْمُور * (F). *Erythrinus*
(F). *Erythrin*

الواحدة عيشية . جنس اسماء نهرية من مفتوحات المائنة
وفصيلة القرصانيات . انواعها المعروفة اربعة موطنها انهر
وعجيرات امريكة الاستوائية || اجسامها مستطيلة ، شبه
اسطوانية الشكل ، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها
مستطيلة مقنونة كبيرة الاشداق . زعانفها الظهرية كبيرة
متبوعة بزعانفتها منخمية صغيرة . زعانفها الذيلية مستديرة
الاطراف . اوتابها تراوح من الخضار اللامس الى الغضار
الاسفم . بطونها فضية || لحوبها مأكولة ، متوسطة
الصف .

٣٠٩٨٩ - يَحْمُور (F). *Gazon*
هو الخضر والخضرة . ج يخاضير .

صغيرة القد ، بيضاء اللون . ساقه واوراقه مأكولة || يتكاثر
بالزبر والفصال ، يرغب في المواقع الرطبة الظليلة وفي
الارربة الصلصالية الرطبة الوارفة العناصر الغذائية .

٣٠٩٧٠ - يَتَوَح ٥ (F). *Euphorbiaceae*

٣٠٩٧١ - يَتَوَح السُحُور (F). *Euphorbiaceae*
هو فريون الفجر ، اطلبه .

٣٠٩٧٢ - يَتَوَح التَكْسِيك (F). *Euphorbiaceae*
هو الفريون الاسريكي ، اطلبه .

٣٠٩٧٣ - يَتَوَح هِنْدِي (F). *Euphorbiaceae*
هو فريون الاقدمين ، اطلبه .

٣٠٩٧٤ - يَتَوَحِيَات (F). *Euphorbiaceae*
فصيلة نباتية تعرف بالفريونيات . اطلبه .

٣٠٩٧٥ - يَتَمَّ (F). *Michauxia*
جنس نباتات عشبية برية وزراعية محولة ومعمرة من
فصيلة الجرسيات . انواعها المعروفة قليلة متبها الشرق
الاعد . سوقها متمسكة . اوراقها متعاقبة متباعدة قليلة
العدد . ازهارها ابيلة الارتكاز ، كبيرة القد ملتفة البتلات .
اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٩٧٦ - يَتَمَّ إِثْرَانِيَّة (F). *Michauxia levigata*
(F). *Michauxia à tige lisse*

نوع من اليثمة المحولة . مهدبا بلاد ايران ، ساقها مرطاه
فرداه تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها جامدة النصل
الاذغب . ازهارها بيضاء اللون ، فردية التجميع ، ابيلة
الارتكاز تملو الساق والفروع . تنويرها يستمر من تموز
الى آب .

٣٠٩٧٧ - يَتَمَّ سُوْرِيَّة (F). *Michauxia campanuloides*
(F). *Michauxia fousse-campanule*

نوع من اليثمة المحولة ، مهدبا الجبال السورية واللبانية .
ساقها فرداه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . بشرتها حلوية
الزغب الشاذك . اوراقها جامدة النصل الاذغب . ازهارها
وردية او بنفسجية اللون ، فردية التجميع ، ابيلة الارتكاز ،
مبشرة على الساق والفروع . تنويرها يستمر من حزيران
الى آب .

٣٠٩٧٨ - يَتَمَّ (F). *Adenandra*
(E). *Adenandra*

جنس جنبات برية وتربينية معمرة من فصيلة السذابيات .
موطنها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشمالية . سوقها
فرداه قصيرة تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ابيلة
متباعدة الاشكال . ازهارها خاسية الفصل والبتلات ،
عشارية الابدلة || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها
الثلاثة التالية .

٣٠٩٧٩ - يَتَمَّ صِيَوَانِي (F). *Adenandra umbellata*
(F). *Adenandra en ombelle*

نوع من اليثوم الزيني . ساقه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه سنانية الشكل صغيرة القد تطول من ٢ الى ٣ سم .
وتعمر من ٤ الى ٦ م . نصالها مهدبة الاطراف ، خلية
الصفحات السفلى . ازهارها صيواني التجميع ، طري



بخشوش



يَدُصُورُ الْحَوَرِ



يَدُصُورُ الْمَصْفَافِ



بَرَاة



يَرَبُود

الاجنحة . تألف الاماكن التي يكثر فيها الحلزون والبزاق والعريط . تتميز بلين القشار وبالعصيان في الظلام وبغارق الشكل الخاربي بين الذكر والانثى ، ذكرها بجمنه ، اناثها مداري || جسمها متوسط القد ، يطول عند الذكر من ١١ الى ١٣ م . ويطول عند الانثى من ١٤ الى ١٦ م . ثوبها الى البني الاسمر ، يتحرف الى الجوزي عند الذكر ويهبط عند الانثى . رأسها صغير الحجم كذاها ذربان . عيناها صغيرتان . زباناها غطيان صغيران . ظهورها عند الذكر مستطيل القد وهو عند الانثى جدمة تركيز على الترجمة الاولى . ارسافها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتميش حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تساقط في اوائل حزيران تتجمع المكن مباحدا تحت الجلاطة والحجارة || البرقة مبطله الشكل ، سداسية الرواجب سمره اللون ، تميش في اول عهدها على المواد العضوية ثم تم ما تقرسه من البزاق والحلزون .

٣٠٩١٧ - بَرَاة شَرْقِيَّة ، حُبَابِ شَرْقِيَّة ، بَصْبُوسُ اللَّيْلِ الشَّرْقِيَّة

Luciola orientalis (S). *Luciola orientalis* (F).
Orient Fire-fly, Orient Glow-worm (E).

حشرة مفترسة ناعمة من فصيلة البراعيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الاماكن التي ترتادها البراة السجوية وهي اكثر انتشارا منها واشد بصيصا في الظلام واناثها بجمنه كالكذكور || جسمها متوسط القد يطول عند الذكر نحو ١٤ م . ويطول عند الانثى نحو ١٦ م . ثوبها شاذي اللون ، جزوي الرأس والظهران ، حطلي الكويل والجناحة مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهورها يلحف كامل البطن . بطنها مبطل ، اسمر اللون . ارسافها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتميش حتى اواخر آب . تسرح في الليل . قوتها البزاق والحلزون والعريط . وهي كالبزاق السجوية تمارس الهضم الاستقبالي فتحقق ضيقها برضاب ذفاني المادة ثم تعقبه بسائل ليزيني يحل النسيج ويذيبها ثم تشربها بفكها الاجنوبي || البرقة مبطله الشكل ، سداسية الرواجب ، سمره اللون ، مقلده المواج وهي الحشرة الجملانة لا تخلو من الجهاز الضوئي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٦٠ يوما ينقضي في التربة تحت الحجارة .

٣٠٩١٨ - بَرَاةِيَّات

Lampyridae (S). *Lampyridae*, Fireflies, Glowworms, Lightning beetles (E). *Leuchkäfer* (D).

فصيلة حشرات مفترسة من عُمديات الاجنحة ، ليات البشرة . صغرات القد ، مستطيلة الشكل ، تنضج في الظلام لان تربيتهن الطرية تحمل عدداً سفورية بصيصها يشع في الظلمة . اجناسها المعروفة نحو ٥٠٠ أما انواعها فعدة مئات . معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز بذكورها الجمنه واناثها للمدري . وهي تعتبر من الحشرات الناعمة لانها تقضي على بعض الدويبات الفاسدة بالزراعة .

٣٠٩١٩ - يَرَبُود

Cyclamen (F). هو السكع ، اطليه .

٣١٠٠٠ - يَرَبُود

Rhizothorus (S). *Rhizothorus* (F). *Rhizothorus* (E).

طائر من الدجاجيات وفصيلة التدرجيات . موطنه ماليزيا .

٣٠٩١٠ - يَدِ الْجَوَزَاء

Baudrier d'Orion (F). يد الجوزاء ثلاثة كواكب وباصه من كوكبة الجوزاء . راجع تقار الجوزاء .

٣٠٩١١ - يَدِ صُورُ الْحَوَرِ *

Idiocerus tremulae (S). حشرة من فصيلة الزيديات ، طولها يراوح من ٥ الى ٦ م . جسمها غمرطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها خيطية قصيرة . ثوبها حطلي اللون . رأسها واطراف جناحها الى الخضار الاطلح الباهت . مدها حطلي اللون اسمر الحمار والطرف . تركب الحور من اذار الى تشرين .

٣٠٩١٢ - يَدِ صُورُ الْمَصْفَافِ *

Idiocerus ustulatus (S). حشرة من فصيلة الزيديات طولها يراوح من ٤ الى ٦ م . جسمها غمرطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها خيطية قصيرة . ثوبها الى الخضار الاسمع المواج . مدها اسمر تركب المصفاف دون ان تؤذيه .

٣٠٩١٣ - يَدِ صُورُ أَلَيْفِ *

Idiocerus socialis (S). *Idiocerus social* (F). حشرة من فصيلة الزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٥ م . رأسها مستعرض ، قليل النتوء اصفر اللون . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها قصيرتان ، غحيلان . كويلها قليل الاحتداد اصفر . حجبها بحرسه صفراء . ظهورها كامل الحنجية ، لاحف ، حطلي اللون يطولو مواج اسمر . وشناها غشائيات ، شفافة . بطنها اصفر اللون على صفحتيه . قوائمها بكيفة الملب الشائك || تألف جميع المواقع التي يكثر فيها الاشباب والاشجار . قوتها التسنج تحمص من الاوراق .

٣٠٩١٤ - يَدِ مَيْمُونَةٍ ، يَدِ مَيْمُونَةٍ *

Idesia (S). *Idésie* (F). شجرة برية ورتبة من فصيلة النضيات . مدها الصين واليابان . ساقها منتصبه تعلو من ١٢ الى ١٧ م . اغصانها فارقة نظامية الارتكاز . اوراقها عابله ، متعاقبة ، معنقة ، رعية الشكل ، مستطيلة المنق . فصلها جامد الصفحة بحري اللون . ازهارها وسيدة الشق ، عادية القلعة ، صغيرة القد ، خضراء اللون . ازهارها عشكولي التجميع ، بحوري الارتكاز . عشاها متدللة . ثمارها عنبة الشكل والقد يرتقاية اللون || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٩١٥ - بَرَاة * ، حُبَابِ *

Lampyrus (S). *Lampyre*, *Ver luisant* (F). *Firefly* (E). جنس حشرات مفيدة ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مبطله الجسم ، من فصيلة البراعيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ جميعها من ليات البشرة يضيئ في الظلام . معظمها من حشرات المناطق الحارة . ذكورها تسرح في الليل للاعتداه الى اناثها للمدري . اثنائها مختلفة . ثمارها مختلفة اللون يكثر فيسا الربادي والبي .

٣٠٩١٦ - بَرَاة دُجُوجِيَّة ، حُبَابِ دُجُوجِيَّة ،

Lampyrus noctiluca (S). *Lampyre nocturne*, *Ver-luisant* (F).

Firefly, *Glow-worm* (E).

حشرة مفترسة ناعمة من فصيلة البراعيات ورتبة مفدمات

جوي الرقطة الصناعية التبدل . رقلته لا قياسية الحجم والشكل صدره وبطنه الى البياض الناصع || موطنه يتعد من ايران والانفان واغند الى التبت . يألف الجبال العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٦٠٠٠ م .

٣١٠٠٧ - **يَرَبُوعُون** *
Pernoptère mâle (F).
He percnopterus (E).
اليربوع واليربوع واليربوعون هو الذكر من الربوع .

٣١٠٠٨ - **يَرْد** *
Yard
وحدة قياس الانكليزية تساوي ٠.٩١٤٣٨٢ م . يقال اخذت عن طول سيف الملك هنري الاول || كسور اليرد القدم والبوصة . القدم او الفوت يساوي ٣.٣٠٤٨ م . والبوصة او الانش تساوي ٢.٥٤٢ م . فاليرد يساوي أذا ثلاثة اقدام او ٣٦ بوصة .

٣١٠٠٩ - **يَرْدُونُم** *
Monstera (S). Monstère (F). Ceriman (E). Küstlicher, Kolbenriesse (D). Monstera (I).
جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة الفصليات . انواعه المعروفة ١٢ ، مهدها البلاد الامريكية . معظمها حول وبعضها معمر . اوراقها مزديجة التصنيف . ازهارها حرة . ازهارها صغيرة لاطعة وصيدة الشق . ثمارها لوزية مأكولة القشور في بعض الانواع .

٣١٠١٠ - **يَرُز** *
Pinasse (F).
هو الصنوبر البري ، اطلبه .

٣١٠١١ - **يَرُسُون** *
Erycina (S).
Erycène (F). Erycina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الرسونيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، جميعها من متحجرات الطليقات المسائية والبيسانية . اصدافها بيضية الشونز او عرسية ، متعدلة التبطيط ، رقيقة ، مالة .

٣١٠١٢ - **يَرُسُونِيَّات** *
Erycinidae (S).
Erycinidés (F). Erycinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة ، منها المعاصرة وهي من متحجرات الاراضي الثالثة ، ومنها المعاصرة || تتميز باصدافها الصغيرة الرقيقة الشافة . جميعها ثنائية المصارع ، مستطيلة الارجل القابلية الانحناء || اعرف اجناسها واشهرها اليرسون والبيتون والقلبية والمخطوة .

٣١٠١٣ - **يَرُع** * ، **تَبَاح**
Tragelaphus scriptus (S). Tragelaphus écrit, Guib (F). Bush buck, Hornessed antelope (E).
نوع من الجهل صغير القدر حجمه حجم الماعز . اصطفاه البلاد الافريقية من جنوب الصحراء الكبيرة الى الحيفة . ثوبه امفر كيت يعلو تحطيط ابيض وتبيح اسم لا نظامي الترتيب ولا قياسي الشكل . راجع نباح .

٣١٠١٤ - **يَرُغُون** *
Eriogonum (S). Eriogone (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الطليطيات . انواعه عديدة ، معظمها بري وبعضها ترابي . سوقها منتصبة عادة الفروع . اوراقها فمية التجميع لا قياسية الارتكان يكثر وجودها عند قاعدة الساق . ازهارها صغيرة القدر شديدة الانطواء ثنائية او رباعية التجميع تغلفها قلافة جرسية الشكل او اسطوانية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

يألف البراري والادغال . ملجئه الحياتي جماعي ، جماعته قليلة العدد . قوته اخشرات والتسل والبذور البرية || جسمه معتدل القدر قريب الشبه بالجلجل الا انه اطول عنقا ومبقادا واضفر رأسا . جناحه مستندرا الاطراف . ذنبه صغير القدر ، مخروطي الشكل . ثوبه الى اليردة الزرقاء المزاج يعلوه توشيم ابيض واسمر . زوره وسنوده وبطنه الى القيرة السمراء يعلوه موج وردي || يذثن اضموصه من الرية بين النباتات المتشابكة . الاثن تخشن وحدها من ١٤ الى ١٦ بيضة . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع . الذكر يئين الغذاء والحماية .

٣١٠١١ - **يَرَبُوع** * ، **أُدُوع**
Dipus (S). Gerboise (F). Jerboa, Jacculus (E).
جنس حيوانات لينة قاضمة جاسة من فصيلة اليربويات . انواعه عديدة موطنها جميع الاسقاع الصحراوية الحارة والمتندلة الحارة || شكله شكل فأرة كبيرة . طوله نحو ١٧ سم . وذنبه ٢٠ . عيناه جاحظتان . اذناه كبيرتان منتصبتان وهو طويل الرجلين قصير اليدين جدا وله ذنب مستطيل رفيع صعدا يحمل في طرفه خصلة صوف لونها يختلف عن لون ثوبه || ثوبه الى الصهبة الصفراء . ظهره بلون الرمل ، بطنه ابيض || يألف القفائي والمناطق الجافة يتخذ جحره من نثر الارض . انشاء تحمل ثمانية اطباء وتضع اربع مرات في السنة في كل مرة من ٤ الى ١٦ ادراص . قوته المواد النباتية على اختلاف انواعها ومصادرها واخشرات واليراد || اعرف انواعه واعماها ما يتبع .

٣١٠١٢ - **يَرَبُوع تَدْمَرِي**
Dipus macrotarsus (S). Gerboise macrotarse (F).
موطنه البلاد السورية . ثوبه بلون الرمل . طوله نحو ١٦ سم . وذنبه ١٩ || يكثر في البادية .

٣١٠١٣ - **يَرَبُوع دُورْمِيَّع**
Dipus sagitta (S).
Gerboise flèche (F).
موطنه العراق وتركية واروبية . ثوبه بلون الرمل . ظهره عايق السج . ذنبه اسود الخصلة ، ابيض النورة .

٣١٠١٤ - **يَرَبُوع مِصْرِي**
Dipus aegyptius (S).
Gerboise d'Egypte (F).
موطنه فسيح الاجزاء بينت من الجزائر الى تونس وليبيا ومصر والنوبة وفلسطين وشمال الجزيرة العربية || ثوبه الى الصهبة الصفراء . ظهره بلون الرمل الرطب . بطنه ابيض . خصلة ذنبه سمراء ، طرفها اغبر .

٣١٠١٥ - **يَرَبُوعِيَّات**
Dipodidae (S).
Dipodidés (F). Dipodidae (E).
فصيلة حيوانات لينة قاضمة جاسة من مرتبة قوقنديات الشوزب ورتبة القرواص . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة جرامها الخلفية وبصر الامامية . رؤوسها غليظة . آذانها ملعقية الشكل منتصبة . اعناقها قصيرة . اذنانها طويلة || موطنها العالم ، تألف القفائي والقيمان . قوتها الاشعاب والجذور والثار || اعرف اجناسها اليربوع والربود والموانة والهاقل .

٣١٠١٦ - **يَرَبُوعِيَّات** * ، **نَمِر اَبْيَض**
Felis uncia (S).
Irbis, Once (F). Snow leopard, Irbis (E).
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات . يشبه النمر كوتينا وشغلا . يقال انه ضرب منه . طوله نحو ٣٣٢ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبه ابيض الاساس




يربوع



يربوع



يردوم



يرسون



يرع

* ٣١٠٢٣ - يَرْغُونُ تَاعِمِ الْحَلَبِ *

Eriolus setosus (S). Eriolus soyeux (F).

حيوان لبون حاشر من فصيلة الداليات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف الحشبات والتجاذب التي تكثر فيها الأعشاب سرسعة دجوي . قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القد ، قريب الشبه بالفتنة ، يطول نحو ٢٤ سم . هليبه متدل الخشونة ، عديم المسال . ثوبه الى السمرة السوداء || الاثنى ثور تقصع في كل ربيع من ١٠ الى ١٢ جرأ || يياته الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر .

Larvae (F). Larval (E).

* ٣١٠٢٤ - يَرْبُ

راجع دعومي .

Pierre calcaire molle (F).

* ٣١٠٢٥ - يَرْبَعُ

هو كل حجر كلسي عديم الصلابة أو سريع الانفتاح .

Asperge (F).

* ٣١٠٢٦ - يَرْبَعُ

هو الهليون المعروف . ج رابع ، اطليه .

Sparmannia (S).

* ٣١٠٢٧ - يَرْمُومُ

Sparmannia (F). Sparmannia (E).

جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية تربيتين من فصيلة الزيزفونيات . منبتها البلاد الافريقية . سوقها منتعبة تملو من مَر الى ستة امتار . اوراقها متباينة الاشكال . ازهارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

* ٣١٠٢٨ - يَرْمُومُ الْفِرْقِيَّةِ

Sparmannia africana (S). Sparmannie d'Afrique (F).

نوع من البريوم . ساقه تملو نحو ستة امتار . اوراقه قلبية الشكل تطول من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض من ٨ الى ١٠ سم . نصالها مسننة الخفاف ، مزينة البشرة على السفحتين العليا والسفلى . ازهارها صغيرة الحجم ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طويلا شهر ايار .

* ٣١٠٢٩ - يَرْمُومُ كَفِّي الْوَرَقِ

Sparmannia palmata (S). Sparmannie palmée (F).

نوع من البريوم . ساقه تملو من مَر الى مَرَيْن . اوراقه كفية الشكل ، خماسية التلق المسننة المختار . نصالها عديم الزغب ، بحري الخصار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة الحجم || تنويرها يستمر من آذار الى تموز .

Henné (F).

* ٣١٠٣٠ - يَرْبَاءُ

هي الحناء ، اطليه .

Pedetes caffer (S).

* ٣١٠٣١ - يَرْبُ * ٥

Pédète cafre, Lièvre sauteur (F).

حيوان لبون قاصم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الداليات . موطنه بعض الاسواق الافريقية . طوله نحو ٤٠ سم . وذنبه ٤٠ . رأسه كراس الانب . عيناه كبيرتان جاحظتان . ذنبه جمل الصوف . جرامزه قصيرة ، خماسية الاصابع ، قوية الاطراف المقوسة . جرامزه الخلفية مستطيلة ، رباعية الاصابع ، قوية الاطراف القصيرة المستعرجة || ثوبه الى الصبغة السراة . بطنه وشوفاه بيض . يعيش جماعات كثيرة العدد || جحره ردة فسيحة تكتنفها اربعة انفاق متصالية مستطيلة . قوته الاعشاب والجلود والحطب .

* ٣١٠١٥ - يَرْغُونُ أَصْفَرُ * ٥ Eriogonum flavum (S). Eriogone jaune (F).

نوع من اليرغون التريبي . ساقه زياه تملو نحو ٣٠ سم . اوراقه معتقة ملقبة الشكل تطول من ٣ الى ٨ سم . نصالها خلى البشرة على صفحتيه . ازهاره هامة الارتكاز صيوانية التجميع ، خلية البشرة ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

* ٣١٠١٦ - يَرْغُونُ خَيْمِي * ٥

Eriogonum umbellatum (S). Eriogone en ombelle (F).

نوع من اليرغون الجبلي المنبت . ساقه تملو من ١٠ الى ١٥ سم . اوراقه معتقة ملقبة الشكل . نصالها بحري الصفحة العليا ، خلى السفلى . ازهاره هامة الارتكاز ، خميسية التجميع ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

* ٣١٠١٧ - يَرْغُونُ عَدَقِي * ٥

Eriogonum corymbosum (S). Eriogone en corymbe (F).

نوع من اليرغون التريبي . ساقه مزهرة تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقه معتقة اهليجية الشكل ، نصالها خلى البشرة ، متصع الاطراف . ازهاره هامة الارتكاز ، علقية التجميع ، لونها الى البياض الموشع بالوردي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

* ٣١٠١٨ - يَرْغُونُ مَرْكَب * ٥ Eriogonum compositum (S). Eriogone composite (F).

نوع من اليرغون التريبي . ساقه مرءاه تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه يوضية الشكل ، قلبية القاعدة ، نصالها اغصن الصفحة العليا خلى السفلى . ازهاره هامة الارتكاز ، خميسية الشكل ، مركبة الصفوف المتراكبة . لونها الى البياض الاغبر || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

Pterostyrax

* ٣١٠١٩ - يَرْفِيل * ٥

جنس نباتات برية وتريبتية من فصيلة الاصطركيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منها الاجبار والشجيرات . سوقها منتعبة فراء . اوراقها عابلة معتقة - متعاقبة . نصالها اهليجية جامدة الوتل ، مسننة الحواشي . صفحتها السفلى كفية الحمل الاطلل . ازهارها محورية الارتكاز ، عنقودية التجميع . ازهارها ربيعي . ثمارها جرأ يرمية الشكل ، رباعية الاجنحة .

Ictère, jaunisse (F).

* ٣١٠٢٠ - يَرْفَانُ

Icterus, jaundice (E).

حال مرضية تمرى نسيج الحيوان فتفسر ، سببها العادي تعدد الصفراء عن بلوغ المعى بسهولة فتختلط بالدم .

Chlorose (F).

* ٣١٠٢١ - يَرْفَانُ ، يَرْفَانُ

Chlorosis (E).

ومنهم من قال ارقان . علة فيزيولوجية تصيب النبات فتسبب اصفرار الارواق وتمنعها عن القيام بعملها التنشيطي على الوجه الاكمل كما يؤدي الى تأخير النمو والذبول الباكر . ويقلل للارواق والنباتات المصابة باليرقان ميوقة .

Larve (F).

* ٣١٠٢٢ - يَرْفَةُ ، يَرْفَانَةُ

هي الدعوص ، اطليه .



يرقول تاعم لللب



يرب

الاستشعارية قصيرة، ثنائية الفصل. أعضاؤها قصيرة. ملاسها دقيقة. كواسلها وبطنها شبه أسطوانية الشكل. رواشها معتدلة الحجم، شفافة. قوائمها نشيطة || تألف المواقع الجافة والمنازل الريفية. قوتها المواد العضوية المنحلة. يرقاتها عادمة البصر، نائلة ودائمة.

٣١٠٤١ - **بَرُوفِيلِيمَات** °
Scenopinidae (S). Scénopinidés (F). Scenopinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. أجناسها وأولاهها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تألف المواقع الجافة وتفضيئ المسكن الريفية || أجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٨ سم. رؤوسها كبيرة. عيونها متقاربة، متأللة عند الشقين. قربنها الاستشعارية قصيرة، ثنائية الفصل. أعضاؤها صغيرة. كواسلها وبطنها شبه أسطوانية الشكل. رواشها شفافة. قوائمها قوية || يرقاتها كبة، دودية الشكل. بعضها وأنج والبعض الآخر دامن || أشهر أجناسها البزركة.

٣١٠٤٢ - **بَرُوفِيلِيم** °
Georyssus (S). Géorysse (F). Georyssus (E).

جنس حشرات من فصيلة البزمويات ورتبة غديات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها من حشرات المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || أجسامها عادمة الراش الصغيرة القد، بيضية الشكل، تطول من ٢ الى ٥ سم. رؤوسها صغيرة، ملحوة. عيونها بارزة. أعضاؤها مستطيلة. تأثيرها وملاسها نظامية. قربونها الاستشعارية قصيرة، دبسية الاطراف. كواسلها شبه مخروطية. مقطوعة المقدم. امحادها لافة تقطعها خطوط من التغيرات الدقيقة. قوائمها نشيطة. اثوابها وحيدة اللون يكثر فيها الاسود ومشتقاته والجزوي والكسني || تألف غشاف المناقع ويجاري الماء حيث تنغم في الرمال والاسمال الرطبة. قوتها المواد العضوية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات وهوام.

٣١٠٤٣ - **بَرُوفِيلِيمَات** °
Georyssidae (S). Géoryssidés (F). Georyssidae (E).

فصيلة حشرات مقترسة من غديات الاجنحة. أجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || أجسامها عادمة الراش الصغيرة القد، بيضية الشكل، تطول من ٢ الى ٥ سم. رؤوسها صغيرة، ملحوة. عيونها بارزة. تأثيرها وملاسها نظامية. قربونها الاستشعارية قصيرة، تساعية الفصل، دبسية الاطراف. كواسلها شبه مخروطية الشكل، تلحف الرأس. امحادها لافة. قوائمها نشيطة، اثوابها سوية اللون || تألف الرياض وضفاف المناقع ويجاري الماء. تعيش على المواد العضوية المنحلة وعلى ما تستطيع قتصه من دوبيات وهوام || أشهر أجناسها البزمو.

٣١٠٤٤ - **بَرُوفِيلِيم** °
Ben (F).

هو البسان، اطلبه.

٣١٠٤٥ - **بَرُوفِيلِيم** °

شجر تصنع منه المساويك ومساويكه اشد المساويك إنقاء للفر ونابته بالسرعة وفيها شيء من مودة مع لين.

٣١٠٤٦ - **بَرُوفِيلِيم** °
Ostryer (F).

هي القناينة المشهورة بصلابة خشبها.

يسرح في الليل ويبعث في النهار. انثاء تحمل اربعة اطباء وتضع اربعة ادراص مرة واحدة في السنة.

٣١٠٣٢ - **بَرُوفِيلِيم** °
Eriophyllum (S). Eriophylle (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعها عديدة، معظمها بري وبعضها زربي. سوقها فروع مستطيلة الزغب الذي يشبه ندف القطن. اوراقها متعاقبة ورشية مخزمية. ازهارها رؤوسية صفراء اللون. يزورها منجبة بقنبية || أشهر انواعها ما يتبع.

٣١٠٣٣ - **بَرُوفِيلِيم** °
Eriophyllum confertiflorum (S). Eriophylle à corymbes (F).

نوع من البروفيليم، عشبته تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه صغيرة القد ثلاثية التفرغ او لخامية. رؤوساته الزهرية كثيفة التجميع، قصيرة الالان، هرية الملق. ازهاره يستمر من اوائل حزيان الى اواسط تموز.

٣١٠٣٤ - **بَرُوفِيلِيم** °
Eriophyllum cespitosum (S). Eriophylle gazonnant (F).

نوع من البروفيليم، عشبته تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه السفلى خامية التفرغ. رؤوساته الزهرية كبيرة القد، متوسطة العدد، مستطيلة الالان || ازهاره يستمر طوال شهر تموز.

٣١٠٣٥ - **بَرُوفِيلِيم** °
Yurumi (F).

حيوان لبون اردد مشهور باسم تمشور اعرف، اطلبه.

٣١٠٣٦ - **بَرُوفِيلِيم** °
Sperme des animaux féroces (F). البرون عصد الحيوانات المفترسة.

٣١٠٣٧ - **بَرُوفِيلِيم** °
داغ الفيل.

٣١٠٣٨ - **بَرُوفِيلِيم** °
Spermaphytes (F).

تعريف يطلق على جميع النباتات التي تلحف بزور حقيقي من اي قسم كانت ان من المستورات او العريانات او التسمجرات.

٣١٠٣٩ - **بَرُوفِيلِيم** °
Bioplane (S). Bioplane (F).

جنس حشرات لافظية من فصيلة البشيات ورتبة مفدمات الاجنحة. انواعها المعروفة خمسة مهددا الشرق الاذني يكثر وجودها في بعض مناطق سورية الداخلية || أجسامها صغيرة تطول من ٨ الى ١٢ سم. اثوابها وحيدة اللون منها الاسود والجزوي والاسفر والكسني والني. رؤوسها صغيرة مستديرة. قربونها الاستشعارية دبسية الشكل، كواسلها مخزمية، ناشرة الاطراف الامامية. امحادها غلدة، مقطوعة الاطراف لا تلحف كامل الجسم || تألف المرح وزرائب البقر والاعم والاعم. تعيش تحت القش على المواد العضوية والنباتية المنحلة.

٣١٠٤٠ - **بَرُوفِيلِيم** °
Scenopinus (S). Scénopine (F). Scenopinus (E).

جنس حشرات من فصيلة البزمويات ورتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها مستطيلة تطول من ٣ الى ٦ سم. رؤوسها كبيرة. عيونها متقاربة عند الشقين. قربونها



بروفيليم



بزوم

تركب النباتات المروعة والمتغذية || أشهر أنواعها البست
الفرار ويسف فرموزا .



يسف اثيق



يسف ثاني اللون



يسف فرموزا



يسف هزاز



يسع

Chenille (F).

٣١٠٤٧ - يُسْرُوع
هو الاسروع ، اطلبه .

٣١٠٤٣ - يَسُوع *
Tritonia (S).

Tritonie (F). Tritonia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مدنيات الاريل
خلفيات الخياشيم وفصيلة البسوقيات . انواعه المعروفة
كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على
النبوت البحرية || اجسامها غرابطية اعليجية الشكل
شبيهة بالزراق . رؤوسها قصيرة مقطوعة ، ثنائية اللواس
الجماحة . خياشيمها ظهريه الارتكاز ، ثنائية الصف ،
متشعبة . افواهها ثنائية الفكوك القرنية المسننة الاطراف .
الوانها ملونة يكثر فيها الاحمر والازرق والاصفر .

٣١٠٥٤ - يَسُوعِيَّات *
Tritoniidae (S).

Tritonidae (F). Tritonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مدنيات الاريل
خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
منتشرة في معظم بحار العالم : اكثرها عبي وبعضها يقترب
من الشطوط . اسرارها متفارقة العدد || اجسامها متعطيطة
عديمة الصدف . رؤوسها ثنائية او رباعية الملاص .
خياشيمها متساوية ، مركزها فوق الرءاء على الظهر او
على الجانبين || اعرف اجناسها واشهرها اليسوع والبرارة
وغلوكس .

٣١٠٥٥ - يَسُون *
Pimpinella (S).

Pimpinella (F). Pimpinella (E).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخبيثات . انواعه المعروفة
عديدة منها الحولية والهمولة والعمرة والشعرا الانسون ||
سوقها متعصبه فراء . اوراقها مركبة . ازهارها صرواني
التجميع ، ابطي الارتكاز او تاجية . ازهارها بيضاء
اللون . ثمارها يزور صغيرة || أشهر انواعه :

P. anisum (S).

يسون انيسي ، آنيون

P. cretica (S).

يسون اكرتي

P. viridis (S).

يسون اخضر

P. puberula (S).

يسون زغبى

P. anthriscoides (S).

يسون سرلي

P. eriocarpa (S).

يسون صدقي الثمر

P. corymbosa (S).

يسون عذقي

Jaspe (F). Jasper (E).

٣١٠٥٦ - يَسْجَب

حجر اليشب حجر صرواني التركيب مختلف الالوان
منه حجر الحك الاسود اي صدق الصافه .

٣١٠٥٧ - يَسْجَبِيَّة ، كَوَسْب افرقيبة

Agathaea amelloides, Aster capensis (S). Agathée,
Aster d'Afrique, A. du Cap, Marguerite bleue (F).
Cape daisy, Cape aster (E). Afrikanischer Agath (D).
Aster d'Africa (I).

بجلة زيبينة معمرة من فصيلة المركبات . مهدا افرقيبة
الجنوبية وقد عمت زراعتها معظم حدائق العالم . ساقها
فراء تملو من ٧٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاطلة ،
حاشية ، ملغفة الاطراف . نصلها يبغي الشكل ، خلي
الصفحة . ازهارها رويوية ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ،
زرقاء اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .

٣١٠٤٨ - يَسَفْ اَثِيْق *
Ortalis formosa (S).

Ortalide élégante, Otile élégant (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات .
جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١١ م . رأسها كبير ،
شبه مخروطي الشكل ، حنطي اللون ، اشقر الموج .
جبهتها برتقالية اللون . خطمها معتدل الطول ، صناعي
اللون . عينها مكورتان ، ناشزتان ، ارجوانيتان ،
مطوئتان بالفضي . زبابها قصيرة . رؤسها كيران ،
صنابيان ، مبقجان بالاسمر العابق . قوائمها الى الحنطي .
صدورها صناعي اللون ، فضي الحمل ، تقطبه بعض الخطوط
السر . بطنها يرسمي الشكل ، صناعي الخضاب ، اصفر
المراج ، تملو ستة اطواق سر || تظهر الحشرة الجملانة
من حزيران الى ايلول . مرتها المرعي والاعشاب المتغذية
حيث تقترس مختلف انواع الارق والهوام || يرقاتها خاضلة
تركب الارراق وتعيش عليها حتى الاكمال .

٣١٠٤٩ - يَسَفْ ثَنَائِي اللَّوْن *
Ortalis bicolor (S).

Ortalide bicolor (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات .
جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٧ م . رأسها محدب
الشكل ، صناعي اللون . خطمها معتدل الطول . زبابها
صغيران ، دقيقان . عينها كيرتان ، ذهبيتان . صدورها
الى الخضار الالوس . بطنها يرسمي الشكل ، ازرق اللون ،
اسف المراج . مرزا الى السمرة الخنطية العابقة . رؤسها
كيران ، شفافان . قوائمها الى السمرة الكتسية || تظهر
الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواسط تشرين الاول .
مرسها يشمل كل مكان حتى الاماكن المأهولة || قوتها
الهوام . يرقاتها نائلة .

٣١٠٥٠ - يَسَفْ فرْمُوزَا *
Ortalis formosa (S). Ortalide élégante (F).

ذبابية من اليسفيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٧
الى ١١ م . رأسها وقوائمها الى الحنطي الاشقر . عيناتها
فضية . جبهتها برتقالية . تسرح من حزيران الى ايلول .
مرتها المرعي الرطة والاعشاب المتغذية حيث تلتهم مختلف
انواع الهوام || يرقاتها خاضلة تركب الارراق وتعيش
عليها .

٣١٠٥١ - يَسَفْ هَزَّاز *
Seoptera vibrans (S).

Ortalide vibrante (F).

ذبابية من اليسفيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٥
الى ٧ م . جسمها ازرق اللون . رأسها الى الشقرة العابقة .
قوائمها سود . اسرارها حنطية تتميز باستمرار اهتزاز
جناحها . تسرح من حزيران الى آب . مرتها الاشجار
والمرعي حيث يكثر الارق والهوام || يرقاتها هاوكة
وخاضلة عند الحاجة .

٣١٠٥٢ - يَسَفِيَّات *

Ortalidae (S).

Ortalidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة
نعا ٤٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . حشرات ذبابية
الشكل . اناسها مسلحة بالبرقة حادة تستعملها للوخز . اثنائها
عديدة الالوان الزاهية المتراكبة || يرقاتها دامتة او خاضلة

Chevreau (F).

Small goat, Young roe (E).

٣١٠٦٤ - يغّر

هو الجدي والحلام والرغلة .

Diplax, Sympetrum (S). * ٣١٠٦٥ - يغروس

جنس حشرات من فصيلة البسويات، أنواعه عديدة جميعها مفترسة تقتضي على الحوام . طول اجسامها اراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . وبسطة اجنحتها تراوح من ٤٢ الى ٦٠ سم . ألوانها المتغيرة الى الخطي الصنابي المارح . اجنحتها وردية الجسم ، صفر القواعد يعطوها في أول زاماتها الاخرة غطوط معترضة صناعية اللون . رقباتها عارية عادمة الهلب مستطيلة الارجل تعيش في وسول المنائق وبحاري الماء .

Orthetrum (S). * ٣١٠٦٦ - يغس

جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسويات ، أنواعه عديدة، طول اجسامها اراوح من ٣٥ الى ٤٧ سم . وبسطة اجنحتها تراوح من ٥٥ الى ٧٠ سم . ألوانها الى الزرقه . رؤوسها خضر . اناثها ابيض ثوباً وجناحاً . رقباتها زياه الجسم تعيش في الاسمال .

Libellula (S). * ٣١٠٦٧ - يغسوب

Libellule (F). Dragon fly (E). جنس حشرات من فصيلة البسويات، أنواعه عديدة، اجسامها مستطيلة ، طولها اراوح من ٣ الى ٤٦ سم . وبسطةها تراوح من ٥٥ الى ٧٦ سم . ألوانها خطية او كستية اللون . اجنحتها شفافة رشيحية التزاويق . جميعها مفترسة، بعضها يعمل على التحل .

Libellulidae (S). ٣١٠٦٨ - يغسوبيات

Libellulidés (F). Libellulidae, Dragon flies (E). فصيلة حشرات من رتبة الرعاشات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها مفترسة تألف المنائق وبحاري الماء . ذكورها اصفر قدماً من اناثها واخرى لونها منها . اناثها تقتف بمكنها فردياً على سطح المنائق وعلى صفحة الماء . تنقبت عن دمايص جاسة تعيش كامل حياتها البرقية في الماء او في الرسل . حشراتها الكاملة تتميز بعدم انطباع اجنحتها في الاستراحة والرقاد || اشهر اجناسها اليمسوب واليسس واليعروس والكرؤلون .

Stachyurus (S). ٣١٠٦٩ - يغشيل

Stachyure (F). Stachyurus (E). جنس جنبات معمرة برية وزراعية تربيينة من فصيلة البشليات . سوفا تملو من مرتين الى اربعة اعمار . اوراقها عابلة متعاقبة ، مسنة الحصران ، تظهر بعد الازهار . ازهارها سبلي التجميع . ازهارها صفرة يضاء اللون او صفراء ، رباعية الفصل والبيلات واللياس ، ثمانية الاسدية . ثمارها عنبية صفيرة || اعرف اجناسها واشهرها التالية :

٣١٠٧٠ - يغشيل بكوري

Stachyurus praecox (S). Stachyure précoce (F).

نوع من البشيل . جنبة تربيينة تملو نحو ثلاثة اعمار . ساقها منتصبه . افانها قضيفة مرنة . اوراقها اهليجية تطول نحو ١٨ سم . وتعرض نحو ٩ سم . نصلها رفيقة . مسنة الحصار ، جميلة الحصار الزاهي . ازهارها سبيلة التجميع ، متدلية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من شباط الى نيسان .

Jade (F).

٣١٠٥٨ - يشم

حجر صواني التركيب شديد الصلابة .

Echites (S). Echitès (F). * ٣١٠٥٩ - يشيت

جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الدفليات . انواعها المعروفة قليلة . جميعها امريكية المنبت . معظمها لولبي متسلق وبعضها جبني . سوفا سرسة مالة . اوراقها معنقة ، بيضيه ، متقابلة . ازهارها كبيرة القذ زاهية الالوان منها الابيض والاصفر والاحمر . ثمارها جرابية الشكل نميلة القذ || يستخرج من سوفا بالحز عصارة لبنية يضاء اللون ، حريفة الطعم ، جحالية المادة لها استعمالها الطبي || اعرف انواعه واشهرها .

Echites biflore (F). يشيت ثنائي الزهر

Echitè à feuilles verticillées (F). يشيت ضميّ الورق

Echitès à corymbes (F). يشيت عدليّ الزهر

٣١٠٦٠ - يشظورة الباذنجان، نارية الباذنجان

Euzophora osseatella (S). Euzophore de l'au-bergine (F).

فراشة من الناريات ، صغيرة القذ . بسطها نحو ١٧ سم . ريشها الاماميان الى السمرة يتوسلها تبيج اسود داكن . ريشها الخلفيان مفضاض . رقبها مستدقة الجسم ، غبراء اللون ، كستية الرأس ، تركب نباتات الفصيلة الباذنجانية اغصها الباذنجان والقليلة والبطاطا فتشرب السويق وتدخلها مع جوام التربة وتتابع نغرها واذاها صمداً ما استطاعت .

Raie (F). Troat of the deers (E). ٣١٠٦١ - يعمار

صوت الابل . واليادر شجرة في الصحراء تأكلها الابل (السان).

Psophia (S). Agami (F). ٣١٠٦٢ - يشحمي

جنس طير من طوال الساق . انواعه المعروفة قليلة العدد تجمع بين الخلق والقلق . اعطائها ضفاف نهر الامازون . اجسامها ربعة . اعناقها متوسطة الطول . رؤوسها كبيرة . مناقبها غروبية ذرية حادة الملاقط . اجنحتها قصيرة . افانيتها شديدة القصر . ارساغها حجيقة مستطيلة . ارياشها ناعمة رعة . رؤوسها واعناقها وبطنها خلية الريش والزفر || اعرف انواعه واشهرها اليمجي اللجب .

٣١٠٦٣ - يشحمي جب ٥ * ، طائر البوق ٥

Psophia crepitans (S). Agami bruyant, Oiseau-trompette (F).

نوع من الياجيم صوته كطين البوق يردده أكثر من ٢٠٠ مرة في البار . وهو طائر كبير القذ طوله اراوح من ٥٢ الى ٦٠ سم . ثوبه شديد السمرة اللامعة . راسه وصفه وظهروه وصدره وبطنه واخنيكه سود . جناحاه الى الجورة السمراء يعطوها موج ازرق واخضر . صدقة عينه غروبية . زفده ورسناه حر . مقاراه السس || اعطانه ضفاف نهر الامازون اغصها الضفاف الثالية . يعيش زمراً واسراباً اراوح عدد افرادها من ٣٠ الى ٢٠٠٠ وأكثر قوته البار واليدور والحشرات والديدان . يش في الخموس قلدسي الشكل يخلقه بالمشاش الناعمة ويوطوه بجمار المنقش والطين . اثناء تقصم من ١٠ الى ١٢ بيضة تحضنها نحو ٣ اسابيع || يدين يدين عناء واذا عاش مع البط والاوز والدجاج والحيش حافظ عليها كالخارس الامين .



يشيت



يمجي جب



يعروس



يمس



يمسوب

٣١٠٧١ - يُغْشِيلُ صِينِيّ ٥

Stachyurus chinensis (S). *Stachyure de Chine* (F).
نوع من اليغشيل. جنبة تزيينية تملو نحو أربعة أمتار .
ساقها متراكبة الافناد المنبسطة . اوراقها اهليجية ، ذلقة
الزائم الاخير ، تطلو نحو ٢٠ سم . نصلها جميلة الخضار
المالين ، مسنة الحار . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها
بيضاء اللون ، صغيرة القد || تنويرها يستمر من ايار
الى تموز .

٣١٠٧٢ - يُغْشِيلَات ٥

Stachyuraceae (S). *Stachyuracées* (F). *Stachyuracées* (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلات القملات
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد مهدها بعض مناطق
الفرق الاقصى والجزر . جميع انواعها شجيرات وجنبات
معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || اشهر اجناسها
اليغشيل .

٣١٠٧٣ - يُعْصُومُ التَّجِيلَات ٥

Isosoma graminicola (S). *Isosoma des graminées* (F).
حشرة خاضعة من فصيلة السويليات ورتبة غشائيات
الاجنحة المخصورة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة
الحارة والمنحرفة نحو الحارة || جسمها صغير القد يطول
نحو ٣ م . رأسها مستعرض . جوشنها مستطيل . يطها
ضامر وقصير . زريقيتها الاخيرة محزائية الشكل . مرزاها
مدبب وقصير || تتطفل على التجليات ومنها القمح
تفتئها .

٣١٠٧٤ - يُعْصِفِيد * ، يُعْصِفِيز

Leontodon (S). *Léontodon*, *Dent de lion* (F). *Hawkbit*, *Lion's tooth* (E). *Löwenzahn*, *Kuhblume* (D). *Tarassaco*, *Dente di leone* (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة الحركات . اوراقها
كبيرة مفرصة زرعها المائشة وتسن عليها . ازهارها رؤيسية ،
صغيرة القد ، كثيفة التجميع ، لونها الى الصفار الكبير .
عصارته لزجة ، مرة الطعم ، طيبة .

٣١٠٧٥ - يُعْغُور ٥

Hère (F). *Young deer* (E).
صغير الايل لا يزال يتبع امه .

٣١٠٧٦ - يُعْغُورِب ٥

هو الحجل الرومي ، اطليه .

٣١٠٧٧ - يُعْغُورِيَّة * ٥

Jacobaea (S). *Jacobée*, *Herbe de St Jacques* (F). *Jacoby* (E). *Jakobsblume* (D). *Glacoea* (I).
نوع من الشرونة من فصيلة الحركات . وهو نبات عشبي
بري معمر يملول في معظم المناطق المعتدلة من العالم القديم .
ساقه تملو نحو ٧٠ سم . اوراقه حاضنة متعاطكة ، نصلها
مفرض الصفحة المستطيلة . ازهارها رؤيسية صفراء اللون .
يقال انه من النباتات النافعة . عصارته تملد الجرح .
وهنم من قال انه يقيد القرعة .

٣١٠٧٨ - يُعْغَمَلِيَّة ٥

Pragmatisme (F). *Pragmatisme* (E).
العملية مذهب فلسفي محوره معرفة الحقيقة من قدر
نتائجها العملية .

٣١٠٧٩ - يُعْغُور ٥

الجدي والصغير من الفأن . ج بعامير .

٣١٠٨٠ - يَمْعِمِيشَا ٥

هو الراوند الرياسي ، اطليه .

٣١٠٨١ - يَمْعِمِيشَا * ٥

Callichromus (S). *Callichrome* (F). *Callichromus* (E).

جنس حشرات من عذبات الاجنحة طول القرون وفضيلة
الزغقيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع
اصقاف البلاد الحارة . جميعها نائلة ودائمة تعيش على
المواد العضوية والنباتية المنحلة || تتميز باستطالة الاجسام
والقرون الاستشعارية والقوائم الخلفية . اجسامها معتدلة
التخطيط تطلو من ٢٥ الى ٤٥ سم . كواسلها مكورة
مخصورة . عيونها بارزة . اغدها محزاة لاحقة . ألوانها
عديدة الالوان السوية ، يكثر فيها الاخضر الاسفغ
والكتني الاشفع المالح .

٣١٠٨٢ - يَمْعِمِيشَا ٥

Coleonema (S). *Coléonème* (F). *Coleonema* (E).

جنس نباتات جنبة معمرة من فصيلة السذابيات . منها
بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية . سيقانها ترتفع
الى ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ابيدة متعاطكة خيشة النصال
المسنة الاطراف الجامدة . ازهارها خماسية الفصل والتلات ،
عشارية الاعدية ، مختلفة الالوان والتجميع || انواعها
المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٣١٠٨٣ - يَمْعِمِيشَا ٥

Coleonema album (S). *Coléonème blanc* (F).

نوع من اليفرة التزيينية . ساقها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
اوراقها تطلو نحو ١ سم . وتعرض نحو ١ م . ازهارها
بيضاء اللون ، فردية التجميع ، طرفية الاوتكاز ، مهدية
التوزيع والقنابات ، مقطوعة التلات || تنويرها يستمر
طوال فصلي الربيع والصيف .

٣١٠٨٤ - يَمْعِمِيشَا ٥

Coleonema pulchrum (S). *Coléonème superbe* (F).

نوع من اليفرة التزيينية . ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم .
اوراقها سنانية النصل تطلو من ٢ الى ٥ سم . عقصاتها
مدبية شالكة . ازهارها ثلاثية او رباعية التجميع ، طرفية
الاوتكاز ، حراء اللون ، خافتة العرف السطري || تنويرها
يستمر طوال فصل الخريف .

٣١٠٨٥ - يُغْشُورِب ٥

Hygrobia (S). *Hygrobie* (F). *Hygrobia* (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة اليغروبيات ورتبة
عذبات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في
بعض مناطق العالمين القديم والجديد || اجسامها صغيرة ،
شبه بيضية الشكل ، تطلو من ٨ الى ١٠ م . رؤوسها
صغيرة ، مستعرجة المؤخر . عيونها صغيرة ، بارزة .
قربها الاستشعارية خيطية . تأثيرها وكوكوها ولاسها
متوسطة القد . كواسلها مستعرجة ، قليلة الطول . اغدادها
معدبة ، لاحقة . قوائمها شديدة النشط . ألوانها وحيدة
اللون . تكثر فيها السمرة الحديدية المالح || تألف المناطق
والاوهوار والياه الراكدة . تعيش على النباتات المائية وفي
الاسمال . قوتها كل ما تستطيع قصه من دوبيات .

٣١٠٨٦ - يُغْشُورِيَّات ٥

Hygrobiidae (S). *Hygrobiidés* (F). *Hygrobiidae* (E).

فصيلة حشرات مائية من عذبات الاجنحة . اجناسها



يصوم التجليات



يعشيد



يعقوية



يعوس



يغروب

٣١٠٩٣ - يَقْن

اليقن: هو العجل اذا اربع. ج. يقغن.

٣١٠٩٤ - يَقْشَة

هي البقرة الحامل لأول مرة. ج. يقشانت.

٣١٠٩٥ - يَقْطَاط *٥

Strepera

Strépre, Réveilleur (F).

جنس طير من الجوارثم وفصيلة الغراييات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق استرالية. تألف الغابات وصفات الانهر. ملجئها الحياتي جماعي. افواجها تمد من ٣٠ الى ٨٠ زوجاً. قوتها الثار والبذور والحشرات والدويبات || تتميز بكثرة تعيها المزيج الذي تردده منذ الصبح الباكر || اجسامها شبيهة باجسام الشوق او غراب الزرع. مناقيدها مخروطية جالسة. اجنحتها لاحفة. اذناها شبه مخروطية. اثلواها الى السواد الاسفم وبعضها الى السواد الازرق المالح. اطفالها واجنحتها مبلقة ومطوقة بالابيض || تدئن في الاصحار الباسقة. اناثها تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمفردها بينا الذكور توفن لها الغذاء.

٣١٠٩٦ - يَقْصُوم *٥

Solva (S). Solva (F). Solva (E). جنس حشرات من فصيلة اليقصوصيات ورتبة ذوات الجناحين انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٨ م. رؤوسها شبه مزوانية الشكل، مستقلة. عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية القصل. تأثيرها صغيرة. ملابسها ثنائية العقل. كواسلها ضيقة. بطونها مستطيلة، صغيرة المراتز الدورية. رواشتها تبني الغضاب. افخاذ قوائمها الخلفية شديدة الضخامة || تألف الحراج والغابات. قوتها طلع الانهار ورحيقها. يرقاتها وأبجعة تغترس ما تستطيع من دويبات.

٣١٠٩٧ - يَقْصُومِيَّات *٥

Solvidae (S). Solvidés (F). Solvidae (E). فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف الغابات والحراج || اجسامها متفاوتة القد، تطول من ٥ الى ١٢ م. رؤوسها مزوانية. عيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية ثلاثية القصل. تأثيرها صغيرة. ملابسها ثنائية العقل. كواسلها شبه اسطوانية. بطونها مستطيلة. رواشتها شفاقة عند معظم الاجناس. افخاذ قوائمها الخلفية مستضخمة || يرقاتها وأبجعة، شبه دودية الشكل || اشهر اجناسها اليقصوم.

٣١٠٩٨ - يَقْطِين هو القرق، اطليه.

٣١٠٩٩ - يَقْطِين أَقْرَع *، قَاوُون المير

Cucumis melopepo (S). Pâtisson, Méléopéon, Bonnet d'électeur (F). Squash (E). Melonen-Kürbiss (D). Melopopeo (I).

نوع من القرق وهو نبات عشبي حولي زراعي شائع الاستعمال. ساقه مدادة لا قياسية الطول والارتفاع والتسلق ثماره متوسطة قلنسوية الشكل مستقيمة الخطار التخزين المفترض. لبها جامد المكسر، متوسط الحلاوة، جيد الصنن يطبخ ويربب || زراعتة لا تستوجب عناية خاصة.

وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المالحين القديم والجديد || اجسامها صغيرة، شبه يفسية الشكل، تطول من ٦ الى ١٥ م. رؤوسها مستقلة، مستقلة. عيونها ناشرة. قرونها الاستشعارية عيطية، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها مستقيمة، قليلة الطول. اغماها لاحفة. قوائمها شديدة النشط || جرمها مفترسة ودائمة تميش في اسال المياه الزاكمة || اشهر اجناسها القيروب.

٣١٠٩٧ - يَقَاع هو القحمة، اطلها.

٣١٠٨٨ - يَقْرُود *٥

Aphrodes (S). Aphrode (F). جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة اليزيديات. انواعه عديدة، اصطنها العالم، مرتمها اعشاب المراعي. اجسامها يفسية الشكل تطول من ٣ الى ٥ م. رؤوسها مثقلة ازوايا. اثلواها ملونة يكثر فيها التذهيب المعترض. اضرارها زهيدة لا تستوجب المكافئة.

٣١٠٨٩ - يَقْرُود الرِيَّاس *٥

Aphrodes histrionicus (S). Aphrode comédien (F). حشرة من فصيلة اليزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. رأسها كبير الجرم، لونه الى الخضار الالسم تملو زعرقه بياض. عظمها معتدل الطول. عيناها كبيرتان. زباناها قصيران. كوسلها مستطيل الشكل، ابيض اللون، اخضر الخطار كوسلها يتناح الحفظة. حقيقتها مخرمة، بنية مجذعة بالاسود. ظواهرها كامل الحنجية، لاحف، ابيض اللون، بني التذهيب والتذهيب. روستاها غشائية شفافان. بطنها اسير. قوائمها كثيفة الملب الشاك || تألف الرِيَّاس والمروج. قوتها التسع.

٣١٠٩٠ - يَقْعَة

Raphiolepis (S). Raphiolepide (F). Raphiolepis (E). جنس شجيرات برية وزراعية تزينة من فصيلة الورديات. مهدا يمتد من الشرق الاذن الى اليابان. سقها فروع، مبدرة الاقتان، تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، احليلجية الشكل او ستانية. نصلها جامدة، حيلة الجفار العايق. ازهارها عطرية العرف، عتقودية التجميع او عتقودية، مختلفة الالوان. ثمارها عتبية سوداء اللون || انواعها المعروفة قليلة، اشهرها التالية.

٣١٠٩١ - يَقْعَة البَنَحَال

Raphiolepis indica (S). Raphiolepide du Bengale (F). نوع من البلمة الزينة. ساقها تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، احليلجية، مستقيمة القاعدة والطرف. نصلها جيل الجفار الالسم. ازهارها بياض اللون بعلها تمشيع وردي واجر. اسديتها بنية اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

٣١٠٩٢ - يَقْعَة عَيْمِيَّة

Raphiolepis umbellata (S). Raphiolepide à ombelles (F). نوع من البلمة الزينة. ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، يفسية منعكة تطول نحو ٩ م. وتعرض نحو ٥ م. نصلها جلدية التسنج، مستديرة الاطراف تبدو كجمجمة من الخيام. ازهارها بياض اللون عطرية العرف، صغيرة القد، قطرها من ١٥ الى ٢٠ م. تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.



يقفود



يَقْطَاط



يقطين اقراع

إبطي الارتكاز أو طرني . ازهارها قمرزية اللون ، قطرها نحو ٢٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

lochroma (S).

lochrome (F). lochroma (E).

جنس جنبات معمرة من فصيلة الباذنجانيات . مهدها بنفس مناطق امريكة الجنوبية . سوقها تعلو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها كاملة ، متعقبة ، متعاقبة . ازهارها زرقاء اللون أو حراء || تزهر للآزبين في الحدائق وهي من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الاطربة || انواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

Citrouille, Courge (F).

Pumpkin, Gourd (E).

هي القرعة ثمرة القرع أو البقطين . اشكالها واحجامها عديدة شائعة . اوراقها متعاقبة تراوح من كيلو واحد الى ٥٠ كيلو . لبها غذائي يطبخ ويربب ، متوسط ما يحويه من مواد :

ماء

% ٩٥,٦٠

مواد ازوتية

% ٠,٢٨

مواد دهنية

% ٠,٢٥

مواد استخلاصية

% ٣,٨٧

٣١١٠١ - **بَقْلِيَّاتٌ** هي القرعيات ، فصيلة نباتية .

٣١١٠٢ - **بَقِي**

البقي : جبار النخل . القلمة منه يققه .

٣١١٠٣ - **يَكَّاسَة**

Sphaeralea (S).

Sphéralcée (F). Sphaeralea (E).

جنس نباتات جنية أو عشبية من فصيلة الخمازيات . مهدها بعض اصقاع امريكة الجنوبية ، اقليمها اقليم البرتقال . سوقها فراء تعلو من ٥٠ الى ٣٠٠ سم . شكلها شكل الخبازة . اوراقها مهدبة النصال ، حراء اللون أو بنفسجية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، أشهرها التالية .

٣١١٠٤ - **يَكَّاسَة حَمْرَاء**

Sphaeralea miniata (S).

Sphéralcée rouge (F).

نوع من اليكاسة . جنية تزيينية معمرة مهدها بلاد الاربعين . ساقها فراء تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها ثلاثية الفلق المنشارية المختار . نصالها خلية البشرة ، بحرية المخضار . ازهارها فردية حراء اللون زنجفيرة الموج || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٣١١٠٥ - **يَكَّاسَة صِيَوَانِيَّة**

Sphaeralea umbellata (S).

Sphéralcée en ombelle (F).

نوع من اليكاسة . جنية تزيينية معمرة مهدها المكسيك . ساقها رفيعة تعلو نحو ثلاثة امتار . اوراقها خاسية أو سباعية الفلق العادمة التسنين . نصالها بحرية المخضار . ازهارها صيواني التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بنفسجية اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف والشتاء .

٣١١٠٦ - **يَكَّاسَة قَبْقِيَّةَ الْوَرَق**

Sphaeralea acerifolia (S).

Sphéralcée à feuilles d'érable (F).

نوع من اليكاسة . جنية تزيينية معمرة مهدها بعض مناطق كاليفورنيا . ساقها فراء تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها ثلاثية أو خاسية الفلق ، قريبة الشبه بوق القيقب . ازهارها فردية ليلية اللون أو بيضاء ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف والخريف .

٣١١٠٧ - **يَكَّاسَة مُشْرُو**

Sphaeralea Munroana (S). Sphéralcée de Munro (F).

نوع من اليكاسة . شبة تزيينية سبروتية مهدها بلاد كولومبيا . ساقها فراء تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقها ثلاثية الفلق المسننة الاطراف . ازهارها عنقودي التجميع ،



يقطينة

٣١١٠٩ - **يَكُورِيَّةٌ اُنْبُوِيَّة**

lochroma tubulosum (S). lochome tubuleux (F).

نوع من اليكورية . منبتها كولومبيا . ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اهليجية مستطيلة . نصالها خلية البشرة . ازهارها عذقي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها مستطيلة المالحق ، متدلية ، لوها الى الزرقاة الجليلة . توجعها انبوية الشكل تعلو من ٣ الى ٤ سم . || تنويرها يستمر طوال شهر آب .

٣١١١٠ - **يَكُورِيَّةٌ سَنَائِيَّة**

lochroma lanceolatum (S). lochome lancéolé (F).

نوع من اليكورية . منبتها بلاد الشيل . ساقها ترتفع من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها سنائية الشكل تعلو من ١٢ الى ١٥ سم . وترعش من ٤ الى ٦ سم . نصالها كثيفة الخمل الاغبر اللون . ازهارها شبه صيواني الشكل ، محوري الارتكاز . ازهارها بنفسجية اللون ، توجعها تعلو نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١١ - **يَكُورِيَّةٌ قَرْمِزِيَّة**

lochoma coccineum (S). lochome écarlate (F).

نوع من اليكورية . منبتها بعض مناطق امريكة الوسطى . ساقها مزغبة اللحم تعلو من متر الى مترين . اوراقها سنائية الشكل مستطيلة الطرف . نصالها خلية الصفحات السفلى . ازهارها شبه صيواني التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها قمرزية اللون متوسطة القد ، قصبية المالحق . توجعها تعلو نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١٢ - **يَكُورِيَّةٌ كَبِيرَةُ الزَهَر**

lochoma grandiflorum (S).

lochome à grandes fleurs (F).

نوع من اليكورية . منبتها جبال البرير . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها اهليجية الشكل تعلو من ١٥ الى ١٧ سم . وترعش من ٧ الى ٩ سم . نصالها عادمة الخمل على الصفحات العليا ، مزغبة الصفحات السفلى . ازهارها كبيرة القد ، لوها الى الزرقاة السباعية . توجعها تعلو من ٥ الى ٦ سم . || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .



يكورية

٣١١١٣ - **يَكُفُورِي**

Camphorifère (F).

Camphoriferous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما ينتج الكافور .

۳۱۱۱۴ - یَکُوُس *

Ortalis (5).

Ortalide (F). Ortalis (E).

يكوس هو الاسم البرازيلي. جنس طير من رتبة الحجاجيات وفصيلة الغرنايات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مناطق أمريكا الاستوائية. تألف الغابات والأحراج والحقول القريبة من الماء. لجها الحياتي جاني. نباتاتها الامتصاصية القدية الذي يراوح من عشرة أزواج الى مئة وأكثر. قوتها الثمار والحبوب والبذور والحشرات. تختلف الفصائل والأنواع || اجسامها مستطيلة ريشة. رؤوسها صغيرة. مناقدها كبركة، جالسة، مذبذبة المظهر. اعناقها مستطيلة. اجنتها مستديرة. اذيها كبركة.



یگھوس

٣١١٢٠ - يَلُوكُو * ٥

Ullucus tuberosus (S).

Ulluco, Ulluque (F).

تنبأت عشي حولي وسيد الجنس والنوع من فضيلة السرقيات، اعطاهن البلاد الامريكية يتكرر في الاند وبوليفيه والير و. وروناطه الجديدة. جنوره عسقلية. ساقه عشية حمره اللون. اوراقه متعاقبة منعقة، نصلها قلبي الشكل غليظ الصفحة. ازهار صغيرة القند عشوية التجميع محورية الارتكاز. عناقله تستعمل اكل البطاطي اجاصية الشكل، جوزية الحجم، ودية القشور، صفراء اللبوب. يتكاثر بالبزور وبالعسل.

٣١١٢١ - يَمَام *

Columba intermedia (S).

Biset, Bizet, Petit ramier (F). Rock-dove, Stock-dove (E). Hohltaube (D).

نوع من الحمام البري الخفيف الطيران يقال ان الحمام
الأسنانج حينئذ من ابي الحيدونه. طوله نحو ٣٠ سم
قويه الى الرمادي الخشن. ابيضته الخلفه بالاسود. قوامها
رأس شديد السرة عابق الانحطاط. صدره جوي.
مقلته جالس دقيق. انفيه كما راس القوقب. طرفه الطير.
وقوته افراده من ٨ الى ٣٠. قوته الجوي والبري. يأنف
عشقه في تجاويف الاجنار وأقواف الصخور. اناله تحضن
من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. فضتها بيضتان.

٣١١٢٢ - يُمْبَاط *٥

Phascolomys (S).

Phascolome, Wombat (F). Wombat (E).

جنس حيوانات لبونة جاسنة من فصيلة البمباطيات أي
الجرذان الجارية ١. النواع المعروفة ثلاثة موطنها أستراليا
والجزر الماليزية واليابان. قصيرة الأذن، والذنب،
والجوارح من ١٥ إلى ٧٥ مم. رؤوسها مغطاة بغزوة الشكل،
بصيرة الاغصان المقنونة. عيونها صغيرة. أذنانها قصيرة
متشبثة. أوبارها ناعمة. أنثراها تروح من البصرة إلى
السواحل السوداء، أظفانها عريضة تكتمل من حفر التربة إلى
اللاشي تحمل رضيعيها في جراب رجب البم مركزه في مؤخر
البطن ٢. تسرح في الليل تبيت في النهار داخل افئاف
تختفئها في التربة ٣. قوتها الاشباب البرية والجالور. اما
الانواع الثلاثة فهي :

مطبوعات دہلی

Phascolomys ursinus (S).

Wonbat ourson (F).

لباط عريض الجبهة

Phascolomys latifrons (S).

Wombat à front large (F).

عباط مبدول

Phascolomys vulgaris (S).

Wombat commun (F).

۳۱۱۲۲ - مُبَاطِيَّات ۵

Phascolomyidés (F).

صيلة حيوانات لبونة جاسة تدعى جرذان جرابية ، اطلها .

۳۱۱۲- یُمخُور ، رعل

Abeille mâle (F)

Drone (E).

يتمحور أو الرجل الذكر من النحل . وهو كامل الشوار ششقي ، عادم الشذام اللاسع ، اطول قدماً من النحلة هاملة واغظل جسماً منها . يكوم الميككة ، اي الاثنى لكاملة الاعضاء التناسلية والمعروفة ايضاً بالجلجل ، مرة احادة في حياتها وذلك قبل ان تباشر متع المازن ، ثم موت عل اثرها . ج رَسَاخِر ورَسَال .

۳۱۱۷ - پلانچ

Unone odorant. (F).

هو النون ، اطلعه

٣١١٨ - يَلْقَا

ليلقة : البهيمة البيضاء من عنز أو بقرة . ج يلقي .

٣١١١٩ - يَلَنجُوج

Bois d'Aloès (F).

هو عود الند ، اطلبه .



محيط

Source (F). Spring (E).

هو الماء الذي ينبع من الارض . والينابيع عديدة الاشكال تختلف باختلاف مصادرها واسرارها . منها المنبجعة والمتقطعة والمستمرة والوقفية والارثوازية ، الخ .

Fontinal (F).

نعت تعريفي يطلق على ما يعيش في الينابيع او على ما يحويه مياهها من املاح ومواد معدنية .

Lelpoa

جنس طير من فصيلة الشقائيات . انواعه قليلة جميعا كبيرة الجثة قدرها قدر الحبيشة . رأسها قنبري الريش المستطيل . مناقرها صغير وضعيف . اجنتها عريضة مستديرة . ذنبها متوسط الطول . اسافها قوية . اطيها الى الزرقعة الزرقاء . اجنتها الى الزرقعة العابقة بدها تحطيط معرض فيه الابيض والاريد والاسود . ريش عنقها وبسوسها ابيض الانتشاب اسود الجسم || تألف السهل المنبسطة الكثيرة الادغال ، القليلة الشجر . تعيش ذكراً وأنثى كالحمام . اسرارها متوسطة العدد يراوح عددها من ١٢ الى ٢٠ زوجاً . قوتها الجبوب والخشرات من نصفيات الاجنحة وتستقيها || اناثها لا تحضن البيض بل تضعه في محضن من الرمل والورق تحضره على شكل كتلة صغيرة قطرها يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ سم . وعولوا من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . تصرف بيضها في التلة على عمق ٣ او ٤ سم . صفوها متتابعة ابتداء من الاسفل . وهي تبيض في موسمها الحولي الذي يستمر نحو خمسة اشهر من ١٠ الى ١٢ بيضة بمعدل بيضة واحدة كل ١٣ يوماً . اما البيضة فتفتق بعد وضعها باسبوعين عن فرخ نشيط كاسي الريش يدر امر نفسه بدون عناه .

Onychiurus, Lipura (S).

Onychiure, Lipure (F).

جنس حشرات دائمة من فصيلة النخوريات . انواعه المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، مبررة الهلب ، تطول من ٢ الى ٣ م . اطيها تراوح من المركة السمراء الى البياض الاغبر المواجه . رؤوسها مقلطحة منحرفة الى الاسفل . عيونها طامسة . بطونها مقلطحة ضيقة المؤخر . قوائمها قصيرة . ارسافها ثنائية الاظفار الذرية اللامتساوية || مبدولة في المواقع الرطبة وتحت الحجارة وفي الجلالة .

Onychiuridae, Lipuridae (S).

Onychiurids, Lipurids (F).

فصيلة حشرات دائمة من رتبة الكهدليات . اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مبررة الهلب ، تطول من ٢ الى ٤ م . رؤوسها مقلطحة ، مائلة . عيونها طامسة . قرونها الامتعاوية صغيرة رباعية الفصل . صدورها ثلاثية المقلطحات الامتساوية ، اصفرها الكليل . بطونها سداسية السكم . قوائمها قصيرة . ارسافها ثنائية الاظفار الذرية اللامتساوية القله || اشهر اجناسها الينخور .

Triton (S).

Triton (F). Trumpet-shell (E).

جنس دوبيات بحرية من الرخويات وفصيلة الينسويات .

Hymenanthera (S).

Hyménanthère (F). Hymenanthera (E).

جنية معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة الينسجيات . شكلها قريب الشبه بالبرنج . ساقها تمل نحو ١٠٠ سم . افتناها مزينة اللحاء . اوراقها صغيرة متعاقبة جلدية الاتصال الخروطية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم . ازهارها محورية الارتكاز ، قصيرة المالحق ، خاسية التركيب ، يبيضه اللون ، يعلوها موج اصفر . ثمارها عتيبة يصعب الحمص ، لوها الى الينسجي الموشح بالابيض || تنويرها ربيعي .

Ormosia (S). Ormosie (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة القرنيات القراشية . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها بعض المناطق الحارة والاستوائية من القارة الاسيوية وامريكا الجنوبية || سوقها منتصبة ، فروعها فروعه شبه افقية الانتشاب . اوراقها مركبة ، ريشية ، ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها كبيرة ، حيلة الالوان المتراكبة . مستحبة العرف الحلات .

Anadrome (F).

Anadromous (E).

نعت تعريفي يطلق على الاسماك التي تترك البحر الى التبر في زمن التشرية .

Anadromie (F).

Anadromy (E).

المنهجرة غريزة الاسماك التي تهاجر المياه البحرية الى الهيرة العذبة في زمن التشرية .

Pélagique (F).

Pelagic (E).

نعت تعريفي يوصف به كل ما له علاقة مباشرة بالبحر كقولك المعلم البحرية والنبوت البحرية .

Pélagisme (F). Deep-sea life (E).

البحرية حياة الكائنات الغضائية في غضم الم .

Anagris (S).

Anagyre (F).

جنس نباتات برية جنية ونجمية من فصيلة القرنيات القراشية . انواعها قليلة منها شواطي البحر المتوسط والبلاد العربية ويبرز كناربه . الواحدة ينبتة || اشهر انواعها النبوت التين .

Anagris foetida (S). Anagyre fétide, Bols puant,

Podis (F). Bean-clover, Stinking word (E). Stinkbaum, Stinkholz (D). Anagride foetida, Fascolaria, Laburno foetida (I).

نوع من النبوت وهو جنية برية طيبة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اورها مركبة عابلة ، وريقاتها ثلاثية التجميع ؛ فصلها سناني الصفحة ، خيل البشرة ، يطول نحو ٨ سم . ويعرض نحو ٢ . ازهارها عنقودي الترتيب . ازهارها كبيرة القند سفراء اللون . سفاتها خروطية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . يزورها بفسنجية اللون جمالية للمادة || القليل من نفع ازهارها واوراقها ينشط الايلاج والياه ، والكثير منه مقبى .



نبوت تين



ينح

اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها بقية الشكل ، حلزونية ، ذرة الاطراف ، جميلة الاطراف المرقشة والمجعدة || اشهر اجناسها اليسوع والهودعة .

٣١١٤٦ - يَنْطُوبَة شَهْبَاء *

Achroia grisella (S).

Petite teigne des ruches (F).

وتدعى أيضاً منطوبة شهباء || فراشة من فصيلة التاربات ورتبة حشرقيات الاجنحة . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٠ مم . روشاشا الاماميان وجوشها الى الصهبة الشهباء الخالية من التنشيش والتجديد . روشاشا الخلفيان وبطنها الى الثغرة الخنطية المواجه || الانثى اكبر قدماً من الذكر || البرقة عاجية اللون ، سمراء الرأس ، تعيش في خلايا النحل من ايار الى تشرين وتقلع ما يفعله صمل النحل من اذى واضرار || وهي من الحشرات الناهضة المؤذية لانها تدخل المنازل فتفرض الغرام والجلاود والقرطاسية والفلين ...

٣١١٤٧ - يَنْع ، يَنْع (F). *Maturité* (F). *Maturation* (E). *مَتْرَة* (F). *مَتْرَة* (E). هو بلوغ الثمرة كمالها الجسدي وقد يتم هذا الدور من حياتها بعد الادراك وقبل النضج .

٣١١٤٨ - يَنْع

ضرب من المعقن ، خرته جوية المواجه يملوها توشع اصفر .

٣١١٤٩ - يَنْع

Telopea (S). *Télopée* (F). جنبة برية وزينية معمرة من فصيلة الفصيات . ساقها فراء تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها معتقة ، نصلها اهليلجي الشكل ، غروطي الزام الاخضر ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ويعرض من ٣ الى ٦ سم . ازهارها عقودية التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها ارجوانية اللون ، كبيرة القد ، ثنائية الترتيب || تنورها يستمر من نيسان الى حزيران .

٣١١٥٠ - يَنْك هو السط الصنفي ، اطبله .

٣١١٥١ - يَنْمَة *Podanthum* (S). *Podanthe* (F).

جنس نباتات عشبية محولة او معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة عديدة ، معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط . ساقها منتصبه يكثر فيها الضلع . جلورها حزامية الشكل او لفتية . اوراقها مستطيلة النصل لا قياسية . ازهارها عقودية التجميع او سبيلية ، تاجية الارتكاز ، جريسية الشكل ، زرقاء اللون || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٥٢ - يَنْمَة بَيْهَاء

Podanthum canescens (S). *Podanthe blanchâtre* (F). نوع من البينة المعمرة ، ساقها دقيقة خالية البشرة تلمو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها لاطئة ، بيضيه الشكل ، سائبة الزام الاخضر . نصلها خلي البشرة عل صفحته السفلى . تاجية ازهارها عقودية التجميع ، بيضاء اللون . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٣ - يَنْمَة جَبَّارَة

Podanthum giganteum (S). *Podanthe géant* (F). نوع من البينة المحولة . مهدا جزر اليونان . ساقها ملسلة قليلة الفروع تلمو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . جلورها وتدي الشكل . اوراقها معتقة سائبة النصل جامدة الصفحة المسنة الحمار . ازهارها سبيلي التجميع ، هامي الارتكاز .

انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها بقية مجازنة وحلزونية تطول من ٨ الى ٥٠ سم . الوانها جميلة مرقشة ومجعدة || اعرف انواعها واشهرها اليسوع اليسوعي .

٣١١٣٩ - يَنْسُوع

Tritonia (S). *Tritonie* (F).

جنس نباتات دوفسية عشبية من فصيلة السوسنيات . انواعها عديدة برية وزراعية تزيينية . ساقها شراخسية تنشب بالازهار الاقاياسي التجميع . اوراقها عصفة سيفية الشكل او غيطية . ازهارها صغيرة القد او متوسطة ، الوانها عذبة تختلف باختلاف النوع || زراعتها لا تتطلب عناية خاصة وهو يرغب في الارربة المنسوية التركيب ، المعتدلة الاندماج ، الغنية بالمواد الازوتية || اشهر انواعها ما يتبع .

٣١١٤٠ - يَنْسُوع زَعْفَرَانِي *

Tritonia crocata (S). *Tritonie safranée* (F).

نوع من اليسوع التزييني . ضروبها الزراعية عديدة . شراخه الزهري يملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . عصفه سبي الشكل مستطيل النصل يعرض من ١٢ الى ١٥ سم . ازهاره سبلي الترتيب . ازهاره رباعية التجميع ، ثنائية التصنيف المتقابل لونها الى الصفار الزعفراني || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٤١ - يَنْسُوع عُنُقِي الزَهَر

Tritonia scillaris (S). *Tritonie à fleurs de scille* (F).

نوع من اليسوع التزييني . شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم . عصفه غيطي النصل محجن الطرف . ازهاره سبلي التجميع . ازهاره صغيرة القد ، ودية اللون متراكبة البلات الملتفة الاطراف || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١٤٢ - يَنْسُوع مُدْهَب

Tritonia aurea (S). *Tritonie dorée* (F).

نوع من اليسوع التزييني السبروتي الشائع الزراعة . شراخه الزهري يملو نحو ٦٠ سم . عصفه سبي الشكل يعرض من ١٨ الى ٢٠ سم . ازهاره سبلي التجميع . ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٦ سم . لونها الى البرتقالي الزاهي . تنوره يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

٣١١٤٣ - يَنْسُوع مَقُوس

Tritonia securigera (S). *Tritonie arquée* (F).

نوع من اليسوع التزييني . شراخه الزهري يملو نحو ٤٠ سم . عصفه سبي الشكل يعرض نحو ١٦ سم . ازهاره سبلي التجميع ، مقوس الشكل . ازهاره متوسطة القد تطول نحو ٣ سم . وقطرها ٤ سم . لونها الى البياض العاجي . تنوره يستمر طوال شهر ايار .

٣١١٤٤ - يَنْسُوع يَنْسُوعِي *

Triton tritonis (S).

اشهر انواع اليسوع . يبلغ طوله نحو ٥٠ سم . يكثر وجوده في المحيط الهندي .

٣١١٤٥ - يَنْسُوعِيَات

Tritonidae (S).

Tritonides (F). *Tritonides* (E).

فصيلة دوبيات بحرية من الرضويات مديات الارجل اماميات الحياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة .



يسوع زعفراني



يسوع يسوعي



منطوبة شهباء

ازهارها ضام متتابة لونها الى الزرقاء العافية يعلوها مواج بنسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٤ - بَيْتَة حَمْلِيَّة النَّاج

Podanthum trichocalycinum (S). *Podanthe à calice velu* (F).

نوع من البينة الممرة، مهدا اليونان . ساقها فروع علو من ٥٠ الى ٨٠ سم . جذرها لفي الشكل والمادة اوراقها بيضية ، نصلها لا قياسي التسنين المتباعد . ازهارها عنقودية الشكل ، ثلاثية الترتيب ، طرفية الارتكاز ، زرقاء اللون ، خلية التاج ، قصيرة الاذن . تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٥٥ - بَيْتَة عَرِيَانَة

Podanthum virgatum (S). *Podanthe à tige nue* (F). نوع من البينة المحولة الطوعية في جبال لبنان . ساقها عريانة ، غليظة ، مضطمة الزوايا ، فروع ، تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . فروعها قصيرة منتصبه . اوراقها ضيقة التجميع ، مركزها في أسفل الساق وفي سانية النصل ، جامدة الصفحة ، متباعدة التسنين . ازهارها بنفسجية اللون ، قصيرة الاذن ، فردية او ثلاثية التجميع . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٦ - بَيْتَة مَشْطِيَّة

Podanthum pinnatum (S). *Podanthe penné* (F).

نوع من البينة الممرة . مهدا الشرق الادنى . ساقها منتصبه فروع . جذرها حزائي الشكل ، مأكول المادة . اوراقها مشطية النصل ، ثلاثية او خاسية التفتيسن اللاقياسي التفرع . عتاقها الزهرية رمله التجميع . ازهارها الى الزرقاء الزاهية . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٧ - بَيْتُونِيَّة ، بَيْتُونِيَّة ، دَمْبُوز

Inosite, Dambosé مادة سكرية توجد في عضلات الجسم وفي اللوليا الخضر وفي مسطار النبق وورق الجوز والبنج .

٣١١٥٨ - بَيْتُون * ، بَيْلَانَج

Canang des Molluques, Unone odorant (F). *Ylang-ylang tree* (E). *Canangaebaum* (D). *Cananga* (I).

جنية برية وزراعية من فصيلة القشديات . ساقها منتصبه فروع تعلو نحو ٢ امتار . اوراقها متعاقبة اهليلجية النصل . ازهارها جملة الشكل ، متوسطة القد ، نارية اللون ، فواحة العرف المستحب ، يستخرج منها بالقطر ادهان عطرية فاخرة السنت شائعة الاستعمال . لاه ساقها وفروعها لوني التركيب مزين التيلة الناعمة الدقية يستعمل في صناعة بعض الاوتار الموسيقية .

٣١١٥٩ - بَيْتَة

Antholyza (S). *Antholysse* (F). جنس نباتات دوصية عشية من فصيلة السونيات . انواعها عديدة ، برية وزيينية . ساقها شراخية تنهي بالا زهار الاقياسي الترتيب . اوراقها شرفانية الشكل . ازهارها قريبة الشبه من ازهار الدلبون || زراعها لا تتطلب عناية خاصة لكنها تقفل الازرية الدبالية الوازة العنصر الازرقي || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٦٠ - بَيْتَة أَنْبُوبِيَّة

Antholyza aethiopica (S). *Antholysse éthiopienne* (F).

نوع من البينة التريينية . شمرها الزهرية يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . شرفانها مستطيلة تعرض من ٢ الى ٣ سم .

٣١١٦١ - بَيْتَة الْكُفْر

Antholyza caffra (S).

Antholysse cafre (F).

نوع من البينة التريينية . شرفانها الزهرية يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . شرفانها مستطيلة النصل المستطيل . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها ثنائية الارتكاز تمتد من ١٢ الى ٢٠ زوجا . لونها الى الحمرة الاريجونية || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٦٢ - بَيْتَة عُنْكَوِيَّة

Antholyza paniculata (S). *Antholysse en panicule* (F).

نوع من البينة التريينية . شرفانها الزهرية يعلو نحو ٩٠ سم . شرفانها تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . وترس من ٦ الى ٨ سم . نصلها لا نظامي الانسجام والتجعين . ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها كبيرة القد فردية الارتكاز . لونها مراكب الصفرة والحمرة البنفسجية || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٦٣ - بَيْتَة كُونُو

Antholyza cunonia (S).

Antholysse de Cuno (F).

نوع من البينة التريينية . شمرها الزهرية يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . شرفانها مستطيلة النصل المستطيل . ازهارها سنبل الترتيب . ازهارها فردية التجميع ، متعاقبة الارتكاز ، لا يفوق عددا ٦ ولا يتقص من ٤ . لونها مراكبة ، انابيبا كبريتية الصفار ، يتلاتها الى الحمرة الزاهية . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٦٤ - بَيْق

Monsonia (S). *Monsonie* (F).

Monsonia (E). *Monsonie* (D). *Monsonia* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الفرونيقات . انواعها عديدة ، مهدا بعض اكوار افريقية الجنوبية اعصها منطقة رأس الرجاء الصالح . ساقها مفصلي مستطيلة . اوراقها متعاقبة حافسة . ازهارها جملة الشكل ، مختلفة الالوان ، ذكية العرف الخافت || معظمها نبات بري وبعضها تربوي يزرع في المراكز والحداث . يتكاثر بالبذور وبالتعليل .

٣١١٦٥ - بَيْهَر * ٥

Anomalurus (S).

Anomalure (F).

جنس حيوانات قاضية من فصيلة البيريات . انواعها المعروفة تسعة موطنها البلاد الافريقية الحارة || اجسامها متوسطة الحجم ، طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . واذناتها من ١٢ الى ١٦ سم . رؤوسها صغيرة القد . اذنانها بيضية الشكل . اذنانها جللة الصفو . جوارها قصيرة ، ازهارها حادة مستطيلة . روافلها الجانحية مستعرضة . الالوان سوية اللون تراوح بين الصفه والصفرة || تألف الغابات ، تتسلق الاججار وتطير من واحدة الى اخرى . طيراتها دائم الانحراف نحو الارض ، شوطها لا يفوق ٣٠ م . || قوتها جميع المواد النباتية || اعرف انواعها واشهرها :

٣١١٦٦ - بَيْهَر بِل ٥

Anomalurus pelei (S).

Anomalure de Pele (F).

نوع من البير ، موطنه افريقية الشمالية . ثوبه الى السمرة تعيق مع اقربها من شبح الظهر .



ينون



بير

٣١١٧٩ - **يُوْكَا**
 Yucca (S). Yucca, Yuque (F).
 Yucca, Bear grass (E). Palmenille (D). Iucca (I).
 جنس نباتات معمرة من فصيلة الزنبقيات . أنواعها عديدة
 سويها غشوشية تملو مع المرمر وتوالي السنن . أوراقها
 جلدية ضمية التجميع . أزهارها عنقودي يرتكز على شاربخ
 منتصبه مستطيلة . أزهارها كبيرة القد متدلية الارتكاز
 لا متباعدة الألوان تلبف فيها الغبرة || أشهر أنواعه
 الزنبقية الممكن غرسها في أقاليم المتوسط ما يتبع .

٣١١٨٠ - **يُوْكَا أَلُوِيَّة**
 Yucca alofolia (S).
 Yucca à feuilles d'aloès (F).
 نوع من اليوكا، منبها البلاد الأمريكية . ساقها نخيلة
 مستنقة منتصبه تملو نحو ٥ أمتار . أوراقها الوية الشكل
 تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . وتعرض من ٣ إلى ٤ ، فصلها
 جلدي الصفحة ، باحت الخضر المادي، بحري المقصه،
 ينتمي بشوكه جوية اللون سادة الطرف . أزهارها بيضاء
 اللون تطول من ٤ إلى ٥ سم . أزهارها عنقودي الشكل،
 كثيف التجميع، يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . ثمارها حقية،
 لحمية السوذة، لا مأكولة . تنورها يستمر من أوائل آب
 إلى أواخر ايلول .

٣١١٨١ - **يُوْكَا بَحْرِيَّة**
 Yucca glauca (S).
 Yucca glauque (F).
 نوع من اليوكا، منبها امريكية الجنوبية . ساقها منتصبه
 قصيرة . أوراقها جلدية النصل ، بحرية اللون ، جوية
 الخضر، تعد من ٢٥ إلى ٣٠، طولها من ٦٠ إلى ٩٠ سم .
 وعرضها من ٦ إلى ١٢ سم . أزهارها الى البيضاء الاخضر
 اللون . أزهارها عنقودي ، كثيف التجميع، يملو من ٦٠
 الى ١٠٠ سم . ثمارها حقية جافة . تنورها يستمر من
 ايار الى حزيران .

٣١١٨٢ - **يُوْكَا رَجُلُ الْفِيل**
 Yucca elephantipes, Y. guatemalensis (S). Yucca
 pied d'éléphant, Y. du Guatemala (F).
 نوع من اليوكا، منبها الفواتيلا . ساقها منتصبه رافعة
 القاعدة النطيلة، تملو من ٥ الى ٦ أمتار . أوراقها
 جلدية الصفحة، بحيلة الخضر ، بيضاء اختار المسنن .
 فصلها يطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . ويعرض من ٥ الى
 ٨ سم . أزهارها تطول من ٦ الى ٨ سم . لونها الى البيضاء
 المساجي . أزهارها عنقودي، هرمي الشكل، يطول من ٧٠
 الى ١٠٠ سم . ثمارها حقية لحمية السوذة لا مأكولة .
 تنورها يستمر من آب الى أواخر ايلول .

٣١١٨٣ - **يُوْكَا عَشِيَّة**
 Yucca baccata (S).
 Yucca à baies (F).
 نوع من اليوكا، منبها امريكية الشالية . ساقها منتصبه
 تملو نحو ٣ أمتار . أوراقها جلدية النصل ثخينة الصفحة
 تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . أزهارها
 جرسية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم . لونها الى البيضاء
 المساجي . أزهارها متبدل العنقود يملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم
 ثمارها بلحية الشكل، قرمزية اللون، تطول من ٨ الى ١٢ سم
 وهي مأكولة مستحبة الطعم . تنورها يستمر من نيسان
 الى حزيران .

٣١١٨٤ - **يُوْكَا لِيْفِيَّة**
 Yucca filamenteux (F).
 راجع ابرة آدم .

٣١١٧٧ - **يَهْيَر زَاهِر**
 Anomalurus fulgens (S).
 Anomalure éclatant (F).
 نوع من الير ، موطنه افريقية الوسطى ابتداء من الصحراء
 الكبرى . ثوبه يرتقالي اللون . حصره وجهته بيض .

٣١١٦٨ - **يَهْيَر فِرَازو**
 Anomalurus fraseri (S).
 Anomalure de Fraser (F).
 نوع من الير ، موطنه الغابون . ثوبه الى الريدة السمراء .
 صدره وبطه الى الصبهة الصنابية .

٣١١٦٩ - **يَهْيَرِيَّات**
 Anomaluridae (S).
 Anomaluridés (F).
 فصيلة حيوانات لينة قاضية . انواعها تسمة تلتقي الى
 جنس واحد || موطنها البلاد الافريقية تتميز بزوايدها
 الجلدية الجناحية الشكل القائمة على كامل خوصها من
 ساعد الجرموز الامامي الى مفصل رضع الجرموز الخلفي .

٣١١٧٠ - **يُوْد**
 Iode (F). Iodine (E).
 جسم بسيط من اشياء المعادن شائع الانتشار في مياه
 البحر وفي بعض النباتات البحرية اعصها الصريع .
 صفائحها بلورية سريعة الطعب . لونه الى الجؤرة الكستنية
 البنفسجية الملوّج . اثره على الجلد اصفر الخضاب . رمزه
 (I -) وزنه الذاتي ١٢٦,٩٢ . ثقله الذاتي ١٩٨,٤٨
 ينصهر في ١١٣°س و يغلي في ١٧٥°س . يذوب
 في الماء بمعدل ١ الى ٧٠٠٠ و يذوب في الاثير والكحول .
 يستعمل في تطهير الجروح .

٣١١٧١ - **يُوْدَات**
 Iodate (F).
 هو ملح حمض اليودي .

٣١١٧٢ - **يُوُوس**
 Virus (F).
 هو الفيروس ، اطليه

٣١١٧٣ - **يُوُورِيْنَا** هي القريض ، اطليه .

٣١١٧٤ - **يُوُوزْبَاشِي**
 Roi des rougets (F).
 سمكة بحرية تدعى ملح احمر ، اطلبها .

٣١١٧٥ - **يُوُوسْتْ أَفْتَنْدِي**، **يُوُوسْتِي**
 هو الليمون الافندي ، اطليه .

٣١١٧٦ - **يُوُوسِي** *
 Hieracidea (S). Iéracide (F).
 جنس طير من عمارة الصقور . انواعه المعروفة اربعة .
 واحد افريقي ثلاثة امريكية واسترالية . جميعها من القواطع .
 اجسامها دبة . اثوابها ثمرة الريش، غبراء البطون . سواقطها
 مستطيلة . مناسرها حادة البهرة الحدية . ارساغها دقيقة .
 خالبها قوية . تعيش جاعات كبيرة سرها نحو اثمة .
 قوتها صغير الحيوان والظاء والاواني . تدثن اوكارها في
 اعالي الاشجار الشاخنة . مسكنها من ٣ الى ٤ فئات
 ترخصها الاثان دون اللآكور .

٣١١٧٧ - **يُوُوغَا**
 Yoga (F). Yoga (E).
 اليوغا نمط تهديبي هندي يرتكز على قواعد صوفية زهدية
 وتمازج عقلية وجسدية .

٣١١٧٨ - **يُوُوغِيَّة**
 Yogisme (F). Yogism (E).
 اليوغية مجموعة المصلحات التقنية الصوفية الزهدية والتأارين
 العقلية والجسدية التي يمارسها اليوفي .



٣١١٩ - يوكا

Dlaire (F). Dally (E).

تمت تعريفه ويطلق على كل ما لا يدوم أكثر من يوم واحد .

٣١١٩١ - يوكايات

Ephéméroptères (F). Ephemeroptera (E).

طبقة حشرات صغيرة القد نحلة تعيش في المناطق وعسل غفاف الماء . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها عدة فصائل تنتمي الى رتيبتين : الزغيفيات والياثوفيات . جميعها من الحشرات التي لا تطول حياتها الفراهية اكثر من بضعة ايام في حين ان مدة حياتها البرقية تبلغ الثلاث سنوات . اجسامها دقيقة مستطيلة . قرونها الاستشعارية قصيرة ، اجنسها الانامية كبيرة القد والخلفية صغيرة . مؤنثها ينتهي بمخيطين في الذكور وبثلاثة خيوط في الاناث . اثمها الى البياض الاغبر تشوبه خضرة او صفرة كبريتية .

٣١١٩٢ - يوليده

lonidium, Hybanthus (S).

lonide, Ionidie, Hybanthe (F).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة البنفسجيات انواعها المعروفة عشرة ، مهددا البلاد الاستوائية والحارة اخصها امريكة الجنوبية || بعضها اشباح نضادة والبيض الآخر جنات فرعاء . معظمها ينبت في رمال الشواطئ البعيدة عن مرمى المروج || جميعها طيبة جلورها مهددة .

٣١١٩٣ - يوشير

Cystoderma (S).

Cystoderme (F). Cystoderma (E).

جنس فطور غشائية من فصيلة الفاروقليات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض سفوح جبال المناطق المعتدلة الحرارة || تعيش على الدبال وعلى المواد النباتية المتحللة . جميع انواعها صغيرة القد ، كاعنة الصنت ، لاساكولة || تتميز باغشيتها التي تلحف الساق كالارنان القاعدية حتى اوائل الزمان الثالث || الوانها متباينة منها الالشح والامفر والاصفر والالطليل .

٣١١٩٤ - يويو

Wouwou

هو الجبون الروادي ، اطلبه .

٣١١٩٥ - يويو* ، جتو* ، جيرادي* ، صقر

الجيراد ، أبو رليح

Falco lithofalco, F. Cesalon (S). Faucon-émérillon, Emerillon, Rochier (F). Merlin (E).

طائر من الكونج وفصيلة الصقريات . كنيته أبو رليح ويدهي الجلم جناحيه وسرعة انقضاضه وهو حر المزاج ، قوي الشكية ، بطاش شجاع . جسمه صغير القد ، جميل القالب ، قصير الذنب . ثوبه اغبر امفر . صدره ويقلبه الى البياض الاغبر الفضي المورج تملوه رشفة قياسية الترتيب سمراء . رأسه مستعرض الشكل ، عيناه كالباقوت يكتنفها اطار اصفر || وهو من القواطع محبوب البلاد في طلب القوت والمصيف والمشي || قوته الطير والقواضم والنفاذ والجبراد . يذئن وكده في ارقاب الصخور وفي قنن الاشجار الباسقة . اناته تفيض وتغصن من ه الى ٦ رفقات . ترغيمها يستمر نحو اربعة اسابيع .

٣١١٩٥ - يوكا متجيدة *

Yucca gloriosa (S).

Yucca magnifique (F).

نوع من اليوكا السبرية الملبولة على شطوط المتوسط . ساقها منتصبة تملو نحو ٣ امتار . اوراقها جلدية النصل كثيرة العدد تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . لوها الى الخضار الباهت . حناها قليل العرض ، جوي اللون . ازهارها متوسطة القد ، يضاء اللون تملوها رشفة حمراء . ازهارها لبد التجميع يطول من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ثمارها حقية جافة . تنويرها يستمر من تموز الى اواخر ايلول . ضرورها واصرامها عديدة اشهرها القعدة والمقرة والحوضه ، جميعها جميلة القالب تعيش في المراكن .

٣١١٩٦ - يوكا مشعرة

Yucca arborescens (S).

Yucca arborescent (F).

نوع من اليوكا ، منهاها اريزونه وكليفورنيا . ساقها غليظة منتصبة تملو من ٦ الى ٩ امتار . قعرها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها جلدية النصل ، بحرية اللون ، شاذكة المعصنة تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . ازهارها الى البياض الاغبر المورج . ثمارها حقية الشكل ، جافة السوق ، سمراء اللون ، تطول من ٥ الى ٨ سم . تنويرها يستمر طوال الصيف .

٣١١٩٧ - يوكا مشعرة

Yucca radiosa (S).

Yucca rayonnant (F).

نوع من اليوكا ، منهاها بلاد الاريزونه . ساقها منتصبة تملو من ٥ الى ٧ امتار . اوراقها جلدية النصل ، رادية اللون ، تعد من ١٠٠ الى ٢٠٠ طولاً يراوح من ٤٥ الى ٦٠ سم . وعرضها من ٣ الى ١٠ م . ازهارها جرية الشكل غبراء اللون ، طولاً نحو ٥ سم . يجمعها شراخ يراوح طوله من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ثمارها حقية جافة . تنويرها يستمر طوال الصيف .

٣١١٩٨ - يوكا منقارية

Yucca rostrata (S).

Yucca à bec (F).

نوع من اليوكا ، منهاها المكسيك . ساقها منتصبة تملو نحو ٣ امتار . اوراقها جلدية النصل ، بحرية اللون ، صفراء المورج ، مسننة الحنا ، شاذكة المعصنة ، تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ١٠ الى ٢٠ م . ازهارها غبراء اللون غنصر المورج . ثمارها حقية الشكل ، جافة السوق ، تنتهي بمنقار غشي المادة احسن الطرف .

٣١١٩٩ - يوم

Jour (F). Day (E).

اليوم هو مدى اربع وعشرين ساعة تحسب من نصف الليل الى نصفه . وقد يحسب اليوم من شروق الشمس الى غروبها فهو النهار ولا يجوز تنفيذ المهام او اعلان اكثر العقود الا خلاله . وفي اعتبار الايام يمكن تحديدها كما يتبع :

Jour de planche (F).

يوم الشحن والتفريغ

Jour utile (F).

يوم صحيح

Jour férié (F).

يوم عطلة ، بطاقة

Jour ouvrable (F).

يوم عمل

Jour franc (F).

يوم كامل

Jour fixe (F).

يوم معين



يوكا مجيدة




يوشير



يويو

مُلْحَقُ الْمَجَلَّاتِ الثَّلَاثَةِ أ - ي

ملحق



عنصر معني نادر. يوجد في بعض الأثرية الخاصة. رمزه (Er) وزنه الانومي ١٦٧,٢٠ املاحه وردية اللون.

Synergides

٣١٢٠٣- آزران
اطلب عومران.

Homozygotie (F).

٣١٢٠٤- إسالة

Homozygoty (E).

الاسالة هي تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات. راجع جنس.

Strophisme (F). Strophism (E). ٣١٢٠٥- إغيكاس

طسم خاص بعض النبات يقود نصال الاوراق الى الالتواء الكامل.

Méiotique (F).

٣١٢٠٦- إنفدادي

راجع ميوزي.

Catabolisme (F).

٣١٢٠٧- إنهدام، إنقراض

Catabolism (E).

الانهدام تفاعل كيميائي يسمح بتحويل المواد السائلة في الأنسجة الحية الى طاقة جهد. وهو بذلك يشكل، في معاوضات الايض، الطور المعاكس للبناء.

Catabolique (F).

٣١٢٠٨- إنهدامي، إنقاضي

Catabolic (E)

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بمنشع الانهدام او الانتقاض.

Anabolisme (F).

٣١١٩٦- إنبناء، تشيد

Anabolism (E).

هو تحويل المواد المغذية الى نسج حية. وهو ما يشكل الطور الرئيسي من معاوضات الايض.

Anabolique (F).

٣١١٩٧- إنبنائي، تشيدي

Anabolic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالإنبناء او التشيد.

Plasmogamie (F). Plasmogamy (E). ٣١١٩٨- إباله

الاثالة حالة تأهب انحصابي يكون فيها وضع نوى الوناف شديد التقارب.

Plasmatique (F).

٣١١٩٩- ألي، بلاسمي

Plasmatic (E).

كل ما هو مشتق من الالة او ناجم عنها.

Macroptère (F).

٣١٢٠٠- أدفي

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة طويلة الجناح او الروشن او الغد. م. دفواء.

Aragonite (F). Aragonite (E). ٣١٢٠١- أراغونيت

الاراغونيت في علم المعادن صخر متبلور من كربونات الكلسيوم. تبلوره معيني قائم. ثقله النوعي ٢,٩٥ | وهو ضرب من الكلسيت الثنائي الشكل المتبلور. يستعمل في الزخرفة المعمارية والتزيينية.

Erbium (F). Erbium (E).

٣١٢٠٢- إربيوم

Protistologie (F). Protistology (E). **٣١٢١٦ - بِلَيْثِيَّة**
الديليَّة علم يبحث في اول وابسط الكائنات الحيَّة .

Exondation (F). Emergence (E). **٣١٢١٧ - بَرَاغَة**

البرازغة حصليًّا هي البروز فوق سطح الماء . وهي ظهور الحضيض او التربة بعد تقلص مياه الغمر .

Exondé (F) **٣١٢١٨ - بَرِغ**

نعت تعريفي يطلق على ما برز فوق سطح الماء . يقال اراض برِغة وصخور برِغة .

Surrection (F). **٣١٢١٩ - بُسُوق**

هو الشخصوس ، اطلبه .

Psilopilus (S). **٣١٢٢٠ - بِسِيلَاف**

Psilopile (F). Psilopilus (E).

جنس طحالب صرخوبية صغيرة القند تتميز بحوافها الحوذنية الشكل || أنواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض الاصقاع الباردة اخضها الشمالية .

Ceratophyllaceae (S). **٣١٢٢١ - بِشَّيَات**

Cératophyllacées, Cératophyllées (F).

Ceratophyllaceae (E).

فصيلة نباتات عشبية مائية من ثنائيات الفلقة . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها عشبية ، مائية ، معترّة ، عائمة الجذور ، ضمية الاوراق الحافلية . ازهارها وحيدة المسكن || اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة تعيش في المنافع والاهوار والمغاضى والحقائق المائية الماء || اعرفت أنواعها واشهرها بشت القرد المعروف ايضا بحامول الماء ونخشوش الحوت .

٣١٢٢٢ - بِعَالَة

البعالة من الحشرات والنويات هي الائنى التي تقضي على بعلمها فور الانتهاء من البعال او الكوم كالمعروفة والعقرب والرتيلاء ...

Plasmatique (F). **٣١٢٢٣ - بلاسمي**

راجع انلي

Bélidé (F). **٣١٢٢٤ - بِلْدُوس**

حيوان لون من الجرابيات الشاجرات يدعى بئروس ، اطلبه .

Hypopharynx (F). **٣١٢٢٥ - بُلْعْمَة**

Hypopharynx (E).

الجزء الداخلي من فم الكثير من الحشرات . وهي امتداد للبلعوم . وعلى هذه البلعمة ، الناشئة عند غددات الاجنحة وتستقيمتانها ، يوجد الكثير من العقد العصبية ممّا يدلّ علي انها مركز احساس خاص لا يزال مجهول الغاية حتى الآن .

Mésozoïque (F). **٣١٢٠٩ - أوستيبي**
Mesozoic, secondary stratum (E).

نعت تعريفي يطلق على ارضين الاباج الثاني المعروف ايضا بالاوسط .

Blastoceros (S). **٣١٢١٠ - اَبِل الغاياني**

Blastocère (F).

حيوان لون مجتزأ من فصيلة الابلجات . موطنه فاني امريكة الجنوبية . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من ذكر مانع وثلاث او اربع اناث مع ارشاهاء || جسمه بطول نحو ١٢٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥ سم . ارتفاعه ٧٥ سم . ثوبه الى الشقحة الممرء السفعاء الموج - عنبه مطوّنة بالابيض . قرنه مصمت ، ثلاثي الشعب ينصله كل عام || الائنى جماء ، ضرعها ثنائي الاختلاف ، تحمل نحو ٥ اشهر وتضع من يعفور الى يعفورين .

Petaurus, Belideus (S). **٣١٢١١ - بِلُوس ، بِلُوس**

Pétaure, Bélidé (F).

جنس حيوانات لونة من الجرابيات الشاجرات وفصيلة الفلجربيات . انواعه المعروفة ثلاثة . موطنها استراليه والجزر المجاورة . جميعها دجوية المسرح . تألف الغابات والحراج ، تثبت في النهار اما في تجاوبت الأشجار النخرة او على قننها || اجسامها صغيرة . آذانها كبيرة . اذنانها مستطيلة منعقة الاطراف - قوائمها الامامية أقصر من الخلفية - اصابعها خماسية حادة الاظافر . اصرفها ناعمة ، لينة . اغشيتها الاظلمية جلدية تمتد من الايدي الى الارجل . اناثها مجهزة بجراب عند اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى الفطام || اما انواعه الثلاثة فهي :

- بِلُوس أسترالي P. australis (S).
- بِلُوس سينجاسي P. sciureus (S).
- بِلُوس قصير الرأس P. breviceps (S).

Bathydrique (F). Bathydric (E). **٣١٢١٢ - بَيْد**

نعت تعريفي يطلق على كل كائن يعيش في غور الماء || تقول العلم البيدة والنبت البيدة .

Inné (F). Innate (E). **٣١٢١٣ - بَلْجوي**

نعت تعريفي يطلق على ما هو اثليل في المخلوق . وهو بذلك يرادف خلقي (Congenital) يقال صفة بجنية وعاة بجنية .

Bathybius (F). Bathybius (E). **٣١٢١٤ - بَجِيدَة**

اسم يطلق على كتل ملامية توجد في قاع البحر . يقول فيها العالم هوكسلي و بعض علماء الطبيعة انها الحالة الاولى من المادّة الحية .

Protiste (F). Protiste (E). **٣١٢١٥ - بُوِي**

كائن حيّ وحيد الخلية . مجمل وسومه المحققة حتى الآن تجعله متارجحاً بين النبات والحيوان . ومن العلماء من قال انه اقرب الى النبات منه الى الحيوان .

Isostasie (F). Isostasy (E).

٣١٢٣٨ - **تَعَادُلِيَّة** [○]
نظرية حصيلية تركز على تعادل القوى المحركة النابذة والمماسية.

Sporogonie (F). Sporogony (E).

٣١٢٣٦ - **بُوغَنَة** [○]
البوغنة، في علم الزوولوجية، طريقة لتلقيح خاصة ببعض التوالبي.

Enkystement (F).

Encystation, Encystment (E).

٣١٢٣٩ - **تَكْيُس** [○]
التكيس، في علوم التاريخ الطبيعي والبيولوجية والطب، هو الالتحاق الكلي بنشاء متين يدعى كيساً.

Sporophyte (F). Sporophyte (E).

٣١٢٣٧ - **بُوغِيَّة** [○]
طور من اطوار التكوين الشوئي عند النباتات اللاشعوية من ذوات البوغ وهي بذلك تعاكس الغيامة عند النباتات الشقية.

٣١٢٤٠ - **ثَانِي الْأَوَّلِي** [○]، **مِيُوزُون** [○]
Mésozoaire (F). Mesozoon (A).

كائن مركزة بين الاوولي والتوالي، يتربك من حبيرة مركزية تغلفها حجيرات مسطحة موزاة. أما الرغيلة فلا وجود لها.

Sporose (F). Sporose (E).

٣١٢٣٨ - **بِيَاغَة** [○]
البياغة في علم النبات هي ابراز البوغ ونشره عند السراخس واشباهها.

Loriqué (F). Loricate (E).

٣١٢٤١ - **جَدِيم** [○]
نعت تعريبي يطلق، في علم النبات، على كل حبة او بذرة غلافها الخارجي جامدة و يطلق في علم الزوولوجية على كل جسم تغلفه صفائح عظمية.

Hétérothallisme (F).

Heterothallism (E).

٣١٢٣٩ - **تَكَايُن مَشْرِي** [○]
التباين المشري، في علم النبات، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والانثوية متماثلة من غيامات مختلفة الشقية أيضاً.

Troncature (F).

٣١٢٤٢ - **جَزْر** [○]
حالة الشيء المقطوع جزء منه.

Autochtonie (F).

Autochtony (E).

٣١٢٣٠ - **تَبْلُك** [○]، **مُكُود** [○]
صفة الشيء الموجود طبيعياً وأساساً في مكان جغرافي معين.

Accouage, Accouage (F).

Lighterage (E).

٣١٢٣١ - **تَجْرِيم** [○]
التجريم هو نقل البضاعة من رصيف الميناء الى السفينة او من السفينة الى رصيف الميناء. لذلك فالتجريم يعني الشحن ويعني التفريغ أيضاً.

Lithocranien. Walleri (S).

Lithocrane, Généruc, Gazelle-Girafe (F).

٣١٢٤٣ - **جَزُونُوق** [○]، **جَزُونُوق** [○]
جزنونوق هو الاسم الصومالي. حيوان لون من الغنم، وحيد الجنس والنوع. موطنه يمتد من الصومال الى شرقي الكونغو. ملجنه الحيواني جماعي، اجله يمتد من ١٢ الى ١٥ يراشه ذكر مانع او ذكران وما تبقى فانث وطلّى. قوته الاعشاب خضراء وباسية، واوراق بعض الاشجار احصها السطوط | شوزنه يشبه الظفارة جسمه بطول نحو ١٦٥ سم. ارتفاعه ١٠٠ سم. قرنا الذكر منمققا الطرف المديب. عيناه كبيرتان، متوجتان بهيئة بنشاء. اذناه صغيرتان جالستان. عنقه شديدة الطول. خاروكه ارفع من كفه كما في الظفارة. ذنبه قصير وديق، ينتهي بخصلة من الشعر. الاشي جماء، ثنائية الاخلاف، فردية الطلى | توبه الى العفرة السوداء. رأسه وظهره شديدا السمرة. الاشي الى السمرة السوداء باستثناء البطن الابيض الاخير.

Terrigène (F). Terrigenous (E).

٣١٢٣٢ - **تَرِيْبِيَّة** [○]
نعت تعريبي يطلق على الرسوب المتركمة في قعر البحار والعايدة الى احتحات وانجحات الانربة القارية.

Homothallisme (F).

Homothallism (E).

٣١٢٣٣ - **تَسَاوِي مَشْرِي** [○]
التساوي المشري، في علم النبات، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والانثوية ناتجة عن غيامة واحدة.

Placitation (F).

٣١٢٣٤ - **تَسْمِيْحِد** [○]
هي السخندة، اطلبها.

Adéphage

٣١٢٤٤ - **جَزُورُ** [○]
نعت وصفي يطلق على كل مقترس يتميز بالشراعة ان حيوان او حشرة.

Anabolisme (F).

٣١٢٣٥ - **تَقْيِيد** [○]
اطلب ابتناء

Caroténolide (F).

Carotenoid (E).

٣١٢٤٥ - **جَزْرَانِي** [○]
نعت تعريبي يطلق على كل ما له صلة بالكاروتين المعروف أيضاً بالجزرين. الشفاحات الجزرانية شفاحات صفراء وبرتقالية وحمراء اللون يكثر وجودها في النبات والحيوان. وهي غير قابلة الانحلال في الماء انما تذلل في بعض الشحوم.

Anabolique (F).

٣١٢٣٦ - **تَقْيِيدِي** [○]
راجع ابتنائي.

Isostatique (F). Isostatic (E).

٣١٢٣٧ - **تَعَادُلِي** [○]
نعت تعريبي يطلق، حصيلياً، على كل ما له صلة بالتعادلية الارضية | وهو ميكانيكياً الاتزان المتعادل في الخطوط والسطوح.



جزنونوق

Abomasum (F). Abomasum (E). **حَافِصَة** - ٣١٢٥٣
الحافصة الجيب الرابع من معدة المجترت.

Cénozoïque (F). **حَظِيث** - ٣١٢٥٤
اطلب سنوي

Monécie (F). **حِصَاوَة** - ٣١٢٥٥
الحصاوة حالة فيزيولوجية عند المشربات تتسم بفردية الخلية.

Pédologue (F). Pedologist (E). **حِصَالَم** - ٣١٢٥٦
هو صاحب الاختصاص في الحصلة أي في علم التربة الزراعية من حيث تكوينها وطرق استثمارها.

Ovula (S). Ovule (F). **حَيْدَاء** - ٣١٢٥٧
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديبات الأرجل وفصيلة الدوعيّات. أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. أصدافها متوسطة القد، شبه بيضية الشكل، كطرفة، مقعرة الظهر، صقيلة الصفحة الخارجية، بيضاء اللون. أشهر أنواعها حيداء الزابج (Ovula ovum (S). طولها نحو ١٠ سم. لونها إلى البياض العاجي الاسفع المواج.

Charophytes (F). Charophytes (E). **حَيَاق** - ٣١٢٥٨
فئة من النبات معظم أنواعها يعيش في المياه العذبة الراكدة وبعضها في الماء الأجاج. حاضباها إلى الخضار القاتم ويخرج منها عند اللس صلبة كرهية. وهذه الفئة من النبات تشكل صلة الوصل بين المشربات والطحليّات.

Céramiste (F). Céramiste (E). **خَزَاف** - ٣١٢٥٩
الخزّاف من تعاطي صناعة الخزف من فخار ومطلي وصيني.

Céramique (F). Ceramic (E). **خَزَف** - ٣١٢٦٠
فن صناعة الآنية الفخارية وشيها.

Ginglymostoma **خَفَاشَة سَوِيَّة اللون** - ٣١٢٦١
concolor (S). Ginglymostome concolor (F).
Ginglymostoma concolor (E).

سمكة بحرية من السفنقيّات الاشلاقي. اعطائها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي. جسمها وشقي الشكل بطول نحو ٢٠٠ سم. تتميز بزغفتها الظهرية المتأخرة الارتكاز والمقابلة مع البطنية والشرجية. ثوبها سوي اللون الاصفر.

Cryptogènes (F). **خَفِيَّاتُ الجِين** - ٣١٢٦٢
Cryptogenus (E).

نعت تعريفي يطلق على الفئات الحية، من حيوان ونبات، التي تنصت بالتناسل اللامتطور.

Caryogamie (F). Caryogamy (E). **خِلَاط** - ٣١٢٦٣
الخلاط هو اعادة نشاط الاخصاب اللاشقي عند

Dermaptera (S). **جَلْبِيَّاتُ القَوَائِم** - ٣١٢٤٦
Dermapteres (F). Dermoptères (E).

مرتبة من الحشريّات. ينسبوا في الزمن الماضي الى الليموريّات ثم الى مجنّحات الادي. ووجدوا اخيرا انها اقرب الى الحشريّات. وهذه المرتبة تضم فصيلة واحدة تدعى كوبنيّات وجنسا واحدا يدعى كوبن.

Gymnura (S). Gymnure (F). **جَمْنُور** - ٣١٢٤٧
جنس حيوانات لونة من فصيلة التغذيات ورتبة الحشريّات. انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الزابج. اجسامها شبه اسطوانية الشكل تطول نحو ٦٥ سم. بها فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها صغيرة. اذانها مستديرة. اعناقها قصيرة. قوائمها معتدلة الطول. اصابعها مجعزة باظافر حادة. اثنائها الى الدسة الصناعية المواج. وبرها لبد ناعم يتخلله حلب جامد شائك. اذانها جرداء عارية. اثنائها اميز قفاً من ذكورها وابنت ثوبا منها، قوتها الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة.

Paritétienne (F). **جُولِي** - ٣١٢٤٨
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتمي الى فئة الجوليّات.

Pariétales (F). **جُولِيَّات** - ٣١٢٤٩
فئة نباتات من نثايات الفلقة مشيمتها تاوي الى جدار المدقة كما هي الحال عند البنفسجيات والالاميات وغيرها.

Gymnorhinus (S). **جِيْمَنُورِين** - ٣١٢٥٠
Gymnorhine (F). Gymnorhinus (S).
جنس طير من الجوائم سيات المناقير وفصيلة الغرابيات. أنواعها المعروفة ثلاثة اعطائها استرالية وجزر الزابج. اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم. مناقيرها مخروطية الشكل. اجنتحتها لاحة، زلقة. اثنائها مزخرفة. أشهر أنواعها الجيمنورين الزبار (G. fluteur (F). طولها نحو ٤٥ سم. ثوبه اسود اللون يطوح بفتح ابيض في القفن والجناح. يآلف حياة الاسر ويقلد جميع الانعام والاصوات.

Ginkgoales (E). **جِيْنْكُوَات**، **مَعَالِي** - ٣١٢٥١
قسم من عريانات البزور يعود ظهورها الى الحقبة الباليوئية من الاباح الاول. كانت، في الماضي الجيد، تعد الكثير من الأنواع الا انها اضمحلت مع مرور الزمن ولم يبق منها في عصرنا الحاضر سوى النوع المعروف بشجرة المعبد او الجينكو وهي شجرة مقنسة عند البوئين.

Actualisme (F). Actualism (E). **حَاضِرِيَّة** - ٣١٢٥٢
الحاضرية نظرية حصيلية تفسر المناشع والتطورات الارضية الغابرة بالمناشع الحاضرة مع اعتبار هذه التطورات مستمرة العمل الطبيء. والحاضرية بمعناها الحصيلي تعاكس النظرية الجلبية.



جمنور



جيمنورين



خفافة سوية اللون

Danaide, Danaids (F).

جنس حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة وفصيلة الدنيسيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطانها المناطق الحارة من العالم القديم باستثناء اربعة انواع، ثلاثة منها تعيش في امريكا الوسطى ونوع واحد اعطانه تشمل حوض البحر الابيض المتوسط وتمتد حتى اورورو الوسطى، يدعى تنيسية خريزيب D. Chrysippus (S) جسمها كبير القد. ووشها الى الصغار الاشعل تلعو زخارف بيض وسود واطار اسود منبج بالابيض | اساريها باقعة الخضار تعيش على اوراق الصقلابيات.

Ptéridermes (F).

٣١٢٧٣ - دُشَرِيَات
فئة من السراخس المتقرضة التي كانت ثمارها يزور بدقة مجنحة بدلاً من بوعه.

Diatomite (F). Diatomite (E).

٣١٢٧٤ - دِيَاتُومِيْت
صخور صوانية نباتية الاصل تكونت من تراكم وتكسب روبات الشذيرات العائدة الى المشطورات.

Dinantien (F).

٣١٢٧٥ - دِينَانِي
ساف من الحقبة الكربونية ويدعى ايضاً كلي، اطلبه.

Melanocetus (S).

Melanocetus (F). Melanocetus (E).

جنس اسماك بحرية لجمية من شائكات الزعائن وفصيلة الكواحيات. المعروف منها حتى الآن نوعان منتشران في لبحر المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط | اجسامها قصيرة، شبه صقية الشكل، طول نحو ٤٠ سم. تتميز برؤوسها المستضخمة وباشداها الكبيرة الفاغرة وبكثرة اسنانها الحادة وبانباها النافذة المسنمة. سكاها عرباط عادم السنف. عيونها علوية الارتكاز تحتل قمة الرأس. ويعلوها في مقدم خطها ملمس مستطيل، غسروفي المائدة ينتهي بشرة صغيرة تستعمله الذخاطة لاجتذاب الاسماك.

Acutangulif (F). Acutangular (E).

٣١٢٧٧ - ذَرِيْب
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو او شكل ضيق الزوايا.

Germigène (F). Germigen (E).

٣١٢٧٨ - رَاشِم
راشم او راشمة نعت تعريفي يطلق جسموريا، اي في علم الفيزيولوجية، على غديدة في الجهاز الشقي تحضن خلية الجبلة حتى الانغصاب وذلك عند المهزئات والعقيبات والمنطقيات.

Manubrium (F). Manubrium (E).

٣١٢٧٩ - رُدَيْن
الاسم الفرنسي والاكليزي من اللاتيني بمعنى ردن وكيم. والردين، في علم النبات، خلية من المشن التي ترتب منه اثيرة الخبيقات من الخثيات الحضر | وهو في علم الحيوان، شبه انبوب ادرم التركيب مركزه في وسط مظلة المنوس يحمل في طرفه قم الحيوان.

وحدات الخلية وذلك باتحاد نوى الوذائف المقاربة.

Dermatogène (F). Dermatogen (E) ٣١٢٦٤ - دُرَيْمَة

الدريمة هي نسج الطبقة الخارجية من غلاف التثيط في النبات.

Desmidées (F).

٣١٢٦٥ - دُوسِيْدِيَات
عمارة نباتات مائية من فصيلة الدغمات التابعة الى الخثيات الخضراء. اجناسها المعروفة قليلة العدد جميعها من وحدات الخلية تعيش في المياه العذبة | اشهر اجناسها اللسديد.

Périlème (F). Periblem (E).

٣١٢٦٦ - دُشِيْلَة
الخشبية: هي نسج الطبقة الوسطى من غلاف التثيط. مركزها بين الدريمة واللبسة.

Acrogamie (F). Acrogamy (E).

٣١٢٦٧ - دُعَاطَة
الدعاطة، في علم النبات، تطوّر بطراً على الانبوب الطلي فيدخل البيضة من السم.

Alléomorphisme (F).

Allomorphism (E).

٣١٢٦٨ - دُعَاشَة
الدغاشة، في علم النبات، طور من اطوار التناسل البدائي يتميز بالتقابل الشكلي والتخالف الوراثي.

Pérolème (F). Perolem (E).

٣١٢٦٩ - دُكَيْسَة
الدكيسة هي نسج الطبقة الداخلية من غلاف التثيط في النبات.

Bombyliidae (S).

Bombylides, Bombyliidés (F).

٣١٢٧٠ - دُنَانِيَات
فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٥٠ منتشرة في جميع اقطار العالم اخصها المناطق الحارة | اجسامها مبططة صغيرة القد او متوسطة. رؤوسها صغيرة وبرة، مستطيلة الاطظام الماصة. كولسلها وبطنها مزبزة. قرونها الاستشعاري قصيرة ودقيقة. اجنحتها ضيقة مستطيلة | يرقانها طفيلية تعيش في خشاوات واصقان ومحاجر غشائيات الاجنحة | اشهر اجناسها: الدنانة، العتروس، اللدسة.

Danaidae (S). Danaidés (F).

٣١٢٧١ - دُنَيْسِيَات
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة صولجانيات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد اعطانها المناطق الحارة في جميع اقطار العالم | اجسامها رشقة، متوسطة القد او كبيرة. ووشها مزوزقة، جميلة الالوان، مستديرة الاطراف. قرونها الاستشعاري صولجانية الشكل | اساريها خاضلة تعيش على اوراق النبات | اشهر اجناسها الدنيسية.

Danaïs (S).

٣١٢٧٢ - دُنَيْسِيَة



ذخاطة

ولو كان جزئياً ، الحاصل في البلاد السكنبانية منذ تقلص الميك او هبوطه .

٣١٢٨٩ - رَوْدَكِي (F) Ontogénétique, Ontogénique (F) Ontogenetic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالرويدة اي بنشوء الكائنات .

٣١٢٩٠ - رَوَقْشَة (F) Glyptognosie (F) Glyptognosy (E).

الروقة هي معرفة وتمييز الحجارة المنقوشة القديمة العهد .

٣١٢٩١ - رَوْمَد (F) Cinérîtes (F).

الرومد رماد بركاني منصّب .

٣١٢٩٢ - رُيْبَنَة (F) Soriculus (S). Soricule (F) Soriculus (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبائيات ورثة الحشرّيات . انواعها المعروفة خمسة اعطائها المناطق الجبلية الاسيوية اخصها الهند والصين | جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الذنب . قوتها الحشرات والديدان .

٣١٢٩٣ - رُجِين (F) Abortif (F). Abortive (E).

نعت تعريفي يطلق في علم المواليد والنبات على الاعضاء والثمار التي تسقط قبل اكتمال نموها .

٣١٢٩٤ - رَحَّالَة (F) Pyrrhocoris (F).

جنس حشرات ناهمة من نصفيات الاجنحة وفصيلة الزحّاليات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم | اجسامها اهليجية ، مبططة ، تطول من ٧ الى ١٢ سم . رؤوسها معتدلة الجسم . عيونها صغيرة ناشزة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصّل المستطيلة . بطونها سوداء اللون او حمراء . اجنتها ملوّنة بكثّر فيها التبقّع والتجذيع | تألّف بمعظمها الحياة الجماعية . شراندها تمذ بعض العشرات . قوتها اوراق النبات وما تستطيع اقتراسه من حشرات وهوام .

٣١٢٩٥ - رَحَّالِيَّات (F) Pyrrhocoridae (S). Pyrrhocorids (F).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة المختلفة | اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة .

اجسامها اهليجية او بيضية الشوزن ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٧ الى ١٥ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصّل . اجنتها مستطيلة ثلاثية العقل | اجنتها متفاوتة الطول ، معظمها نصفية وبعضها يلحف اكثر من زامين | قواصمها نشيطة معتدلة القد | معظم انواعها ناهم قوته النبات وما يستطيع اقتراسه من حشرات | اشهر اجناسها الزحّالة .

٣١٢٩٦ - زَكَوَاة (F) Diécie (F).

الزكاوة حالة فيزيولوجية عند المشرّيات تسمّ بازواجية الخلّة .

٣١٢٩٠ - رَيْبِس (F) Métabstable (F). Metastable (E).

نعت تعريفي يطلق فيزيائياً وكيمائياً على كل نظام او تركيب ثباته الظاهري يشكو من دقّة الوجوب .

٣١٢٩١ - رَصَيَّات (F) Lycopodiales (F).

فئة من النبات عاشرت بانواعها العديدة المختلفة الاشكال جميع الازمنة الحصلية منذ الحقبة الديفونية | انواعها المنقرضة شملت الكثير من الاشجار التي كان ارتفاعها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م . والتي كانت تشكّل معظم غابات مناطق الحقبة الكربونية | وما طبقات الفحم الحجري سوى بقايا هذه الاشجار المنصودة | اما الانواع المعاصرة فجميعها عشبية تجمعها فصيلة الخدرّيات .

٣١٢٩٢ - رَصِيْمَة (F) Batholite, Batholithe (F).

اسم يطلق في علم الحصلية على كل كتلة من الطّح او الصخور الثّائرة لا تيسية الشكل انما مستعرضة القاعدة .

٣١٢٩٣ - رَغِيل (F) Périgyne (F). Perigynous (E).

نعت تعريفي يطلق على توجع الزهرة واسديتها عندما تكون متدججة في الكأس حيث تشكّل طوقاً يحوق بالمبيض .

٣١٢٩٤ - رَغِيلِي (F) Périgynique (F). Perigynic (E).

نعت تعريفي يطلق على شكل من اشكال انماج الاسدية في كمّ الزهرة او حول المبيض .

٣١٢٩٥ - رَيْلَة (F) Enicurus (S). Enicure (F). Enicurus (E).

جنس طير من الجوائم سبّات المناوير وفصيلة الذعريّات . انواعها المعروفة عشرة اعطائها تسمّ في الهند الى ماليزية | اجسامها معتدلة القد ، تطول من ٢٥ الى ٢٨ سم . بما فيه الذنب الفارق المستطيل الرّفال | انوائها سوداء اللون ، مبلّقة بالابيض | تألّف ضفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات والديدان | تدنّ افاحيصها في المواقع الوعرة المنيمة الشارّة على مجاري الماء . انائها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٤ يوماً .

٣١٢٩٦ - رَقَّاش (F) Glyptographe (F). Glyptographer (E).

الرقّاش من تعاطى الرقاشة اي علم الحجارة المنقوشة القديمة العهد .

٣١٢٩٧ - رَقَّاشَة (F) Glyptographie (F). Glyptography (E).

الرقاشة هي علم الحجارة المنقوشة او المحفورة القديمة العهد .

٣١٢٩٨ - رَكَاجِي ، رَكَاجِيَة (F) Epirogénique (F). Epirogenic (E).

نعت تعريفي يطلق على الحركة العمودية التي تصيب بعض اجزاء الكتل القارّية . مثالنا على ذلك الارتفاع المستمر .



ريلَة



زينة

Étiétiens (F).

٣١٣٠١ - سَحْجُوجَة

اسم يطلق على رياح خاصة تهب فوق البحر الأبيض المتوسط وصفات حوضه. مصدرها تناوبي من الشمال ومن الجنوب، يحركها التبخر الشديد فوق الماء ووغرة حرارة الصحاري، من الصحراء الكبرى إلى الجزيرة.

Placentation (F). سَحْخُدَة

Placentation (E).

السخذة في النبات هي كيفية انتراج السخد داخل العض. وقد تكون على ثلاثة أشكال: محورية أو جولية أو مركزية.

Aboral (F). Aboral (E).

٣١٣٠٣ - سَرْوِي

نعت تعريفي يطلق في علم الزوولوجية على ما هو كان في الناحية المقابلة للثم عند الحيوانات الدنيا.

Géothermie (F). Geothermy (E).

٣١٣٠٤ - سَعَارَة

السعارة هي حرارة الأرض.

Géothermique (F).

Geothermic (E).

٣١٣٠٥ - سَعَارِي

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحرارة الأرض.

Sphenophyllum (S).

Sphénophylle (E). Sphenophyllum (E).

٣١٣٠٦ - سَفَنِيل

جنس نباتات متحجرة من فئة السفنيليات. جميع أنواعها جذمورية، عشبية، موقرة. منبتها المنافع والغدران.

Sphénophyllées (F).

٣١٣٠٧ - سَفَنِيلِيَّات

فئة نباتات متحجرة ظهرت في الحقبة الباليوينة وانقرضت في البرمية من الأياح الأول إلى بالان ان الأمسوخيات سوية البوغ تتحضر منها ذلك لأن نقط الشبه بينها لا تقل عن ٨٥٪.

Pinnule (F). Pinnule (E).

٣١٣٠٨ - سَلْفَة

السلفة ورقة لا لباسية الشكل، غالباً مستطيلة.

Sapropel, Sapropèle (F).

Sapropel (E).

٣١٣٠٩ - سَپِيل

السيل حمأة ننتة تنود إلى بقايا حيوانات مجهرية رست في قعر البحار ففسختها البكتيريا.

Sapropelique (F). Sapropelic (E).

٣١٣١٠ - سَپِيلِي

نعت تعريفي يطلق على المادة العضوية المعادة إلى العلم والنبت التي فسختها المياه الناعمة.

Cimbex (S). Cimbex (F).

٣١٣١١ - سَبِيلُ

جنس حشرات ماصة من غشائيات الأجنحة وفصيلة السبيليات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تألف الغابات والحراج الظليلة أجسامها كبيرة، شديدة النشط. اعطاطها ماصة، قرونها الاستعارة صلبة الأطراف. اثوابها

Melipona (S). Mélipone (F).

٣١٢٩٧ - زُعمَة

جنس حشرات عسالة من غشائيات الأجنحة وفصيلة الزمعيات. أنواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها المناطق الاستوائية والحرارة أجسامها معتدلة القد أو صغيرة، محببة البطون، خملية القشار، عادمة الشذام. ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. نولها يتكون من ثلاث فئات: الأولى ثم الذكور ثم فئة العاملات العامة الشوار الشقي. اثابها تطول، حسب الأنواع، من ١٢ إلى ١٧ مم. ذكورها تطول من ١٠ إلى ١٤ مم. أما عاملاتها فتطول من ١١ إلى ١٥ مم كوارتها أو محاجرها محرسه، شبه هرمية الشكل، نواعدها سطوحها. نخاريها صفوف افقية الارتكاز تستعملها الأولى لمتح السرة. أما رحيق الأزهار التي تجنيه العاملات فتخاربه اجرة بيضية الشكل مركزها في الزام الأول أي الأسفل من الكؤارة عسلها يختلف مع اختلاف الأنواع والمراعي. أما الإنتاج الحولي فيأروح من ٢ إلى ٦ كيلو أعرف أنواعها واشهرها الثلاثة التالية:

Melipona scutellaris (S).

زُعمَة السَّرَّازِيل
أكبر أنواع الزُعم وأعماها انتشاراً. عسلها جيد الصنف، غني بالعرف، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٦ كيلو.

Melipona fluviipes (S).

زُعمَة الفُراغواي
متوسطة القد والانتشار. عسلها جيد الصنف، عطري العرف، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٥ كيلو.

Melipona enxui (S).

زُعمَة أنكسوي
متوسطة القد. ترعى في كؤارات خاصة تعلق على الأشجار. عسلها طيب، مقو، ناعظ، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٣ كيلو.

Meliponidae (S). Méliponidés (F).

٣١٢٩٨ - زُعمِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحرارة من العالمين القديم والجديد أجسامها شبيهة بأجسام النحل لكنها اصغر قد ولا شذام لها. جميعها عسالة. معظمها يقيم كؤارته في جذوع الأشجار النخرة | ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. نولها يتألف من اثى كاملة الشوار الشقي وظليقتها منح السرة. ومن بعض الذكور وظليقتها كوم الأولى المالكة. ومن عاملات عادمة الشوار الشقي تشيد الكؤارات وتبني فيها النخاريب وتجني الرحيق والطلع | أشهر اجناسها الزُعمَة والصَّواعة.

Spermatie (F).

٣١٢٩٩ - زَبَيْف

الزبيف اسم يطلقه علماء النبات على البوغ الخارجي، الخطي الشكل، عند بعض الفطور والخليات.

Sigillariées (F).

٣١٣٠٠ - سِجِلَّارِيَّات

مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالهشوميات. تميزت بسوقها الضخمة الكبيرة وأوراقها المركبة المنتظمة التنسيق الطولي.

الزيمية عن رباطه الخنّي في بعض الالبيات اخصها المشطورات.

Stèle (F). Stèle (E).

٣١٣٢٠ - شَطَاب [○] الشطاب، في علم النبات، هو الجزء الداخلي من الجذر او الساق الذي يشمل الاعوية الخشبية واقنية النجب.

٣١٣٢١ - شَمَاح [○] Acrogène (F). Acrogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل فطر نوعية ساقه واروسسته رأسية الشماخ.

٣١٣٢٢ - شَيَاكَة [○] Hétérozygotie (F). Heterozygosity (E).

الشياكة هي عدم تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات || ومنهم من قال اختلائية الازدواج. راجع اشيب.

٣١٣٢٣ - صَالُوج [○] Travertin (F).

حجر من الغليس الجصي يصلح للبناء.

٣١٣٢٤ - صَتَّام [○] Pétrographie (F). Petrograph (E).

الصتّام من تعاطى الصنامة اي علم الصخور.

٣١٣٢٥ - صُفْر [○] Halistur (S). Halistur (F). Halistur (E).

جنس طير من الكواسير وفصيلته الصقريات. انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها الهند وآسية الشرقية واسترالية || اجسامها شبيهة باجسام العقبان إلا انها اصغر قدًا. اطوالها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. اناوبها ثنائية اللون. رؤوسها واعناقها وصدورها بيض. ارجبتها وسوافطها اطراف بطونها وافخاذها واذناها الى الشقعة السمره، مواجهها يختلف مع اختلاف الانواع || تألف الشطوط البحرية والمواني. تغطس في الماء كالنورس. قوتها الاسماك وكل ما تيسر لها من مواد عضوية.

٣١٣٢٦ - صَوَاعَة [○] Trigona (S). Trigone (F).

جنس حشرات عسّالة من غشائيات الاجنحة وفصيلته الزيميات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الاستوائية || اجسامها شبيهة باجسام النحل لكنّها اصغر قدًا ولا شدام لها انما تحضّ وضعتها مؤذبة || ملجنها الحياتي جماعي كسائر انواع الزيميات. تشيد كوّارنها على الاشجار وعلى الصخور. تبنيها بالطين وتغلّفها بمختلف المواد النباتية. مداخلها فردية انبوية الشكل، تسمح بمرور صواعة واحدة. نخاريها افقية الارتكاز. اجرة العمل بيضية الشكل، صغيرة القد، تحتل الزام الاول والثاني من الكوّارة || عملها دون الوسط. اتاجها الحولي نحو ٥ كيلو.

٣١٣٢٧ - صَوْغِي [○] Phylétique (F). Phyletic (E).

نعت تعريفي يطلق على التسلسل الكينوني في الحيوان والنبات.

٣١٣١٢ - سَبَكِيَّات [○] Cimicidae (S).

Cimicidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة. يكثر وجودها في الغابات والحراج الجبلية || اجسامها متوسطة القد أو كبيرة، مخاطمها ماصة. قرونها الاستشعارية معتدلة الطول، صفة الاطراف || يرقاتها خاضعة، مؤذبة عند كثرتها || اشهر اجناسها السبكب.

٣١٣١٣ - سُنُقُس ، سُنُور [○] Suncus (S). Pachyure (F).

جنس حيوانات لبونة جاسة من فصيلة الزبابيات ورتبة الحشرات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطائها بعض مناطق العالم القديم اخصها الهند وافريقية وجزيرة مدغسكر || اجسامها صغيرة القد تطول من ٧ الى ١٢ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها خرزية. اذنها صغيرة. جرامزها معتدلة الطول. اصابعها مجهّزة باظافر حادة. اذناها طويلة. اناوبها متباينة الالوان السوية تكثر فيها النبسة والسمره القاتمة || اناها اميز قدًا من ذكورها وابنت ثوبًا منها || قوتها الحشرات والديدان.

٣١٣١٤ - سُنُورِي [○] Cénozoïque (F). Cénozoic (E).

نعت تعريفي يطلق، حصليًا، على برهة من الزمن تشمل الاحقاب التي توالى منذ الحقبة النّوَلِيّة الى المعاصرة.

٣١٣١٥ - سَوِيّ اللَّوْن [○] Concolore (F). Self-coloured (E).

نعت وصفي يطلق على ما كان ثوبه متساوي اللون الواحد.

٣١٣١٦ - سَوِيلِ الْبَرُغ [○] Isosporé (F). Isosporous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائية بوغه متجانس الشق والشكل.

٣١٣١٧ - شَاوِخ [○] Atypique (F). Atypic (E).

نعت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل تسلسل خلويّ يشذ عن القبس المثالي.

٣١٣١٨ - شُخُوص [○] Surrection (F). Upheaval (E).

الشخوص، حصليًا، هو الارتفاع الذي يطرأ على مكان معين من سطح الأرض.

٣١٣١٩ - شُدِيرَة [○] Frustule (F). Frustule (E).

جسيم صوّاني التركيب. شديد الصفر، فصلته العوامل



سفر

الاولان المزخرفة الجميلة || مسرحها بحار المناطق الحارة. يكثر وجودها قرب وحاف وحشاف المرجان والرجان.

٣١٣٢٨ - صَبْوَة (F). Tobacco-pouch (E). الصبوة كيس من جلد يستعمل لحفظ التبن، التبغ المفروم، صغير القد يوضع في الجيب.

Pangium (S).

Pangie (F). Pangium (E).



ضجرة

٣١٣٣٦ - طَهَب ° جنس اشجار حرجية من فصيلة الطهباء. منبتها البلاد الحارة، يكثر وجودها في جاوا || سوتها فراء. اورثاها متعاقبة، متباعدة. ازهارها ثنائية السكن. ثمارها عنبية لوبية || اشهر انواعها الطهبة المأكولة (S). P. edule منبتها جاوا. جميع اجزائها من خشب ولحاء وقشور واوراق وثمار جعالي المائدة وافر الحامض السانديريكي || ثمارها مأكولة بعد تقمها ٤٨ ساعة في الماء. ويستخرج من بزورها بعد تقمها ايضا مادة زيتية مسهلة شائعة الاستعمال || اما اغشائها فتشدية الصلاة فاخرة الصنف.

Enicognathus (S).

Enicognathe (F). Enicognathus (E).

٣١٣٣٩ - صُجْرَة ° جنس طير من المتصلات وفصيلة البغاوات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها البلاد الحارة اخضها الهند وامريكا الجنوبية || ملجنها الحياتي جماعي، قوتها الثمار البرية وبعض الحشرات || اجسامها معتدلة القد. تتميز بمناقيرها المستطيلة الافاك العليا المخزوية الشكل || اشهرها ضجرة الشيلي نوبها الى الخضار الاسفح الموج. قمة رأسها واطراف قوامها الى الزرق العافية. محصرها وذننها الى الصخرة القرمزية.

Pangiaceae (S).

Pangiaceés (F). Pangiaceae (E).

٣١٣٣٧ - طَهَبَات ° فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منبتها البلاد الحارة والاستوائية من العالم القديم || اعرف اجناسها واشهرها الطهبة والعصرة.

٣١٣٣٠ - صُرَّاسَة ° Delphinula (S). Delphinula (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الصُرَّاسَات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة من العالم القديم || اصداها شبه مخروطية الشكل، للؤلؤة الصفحات الداخلية، كثيرة التضاريس والتلويحات الشائكة من الخارج || اشهر انواعها الصُرَّاسَة المعروفة (S). D. lacinata التي يكثر وجودها في بحار الصين.

Andrena (S). Andrène (F).

٣١٣٣٨ - عَذْرَيْن جنس حشرات حبوبية من فصيلة العذريبات. انواعه المعروفة بكثرة معظمها من عظم المناطق الشالية. ملجنها الحياتي فريدي. اوكارها محاجر تحفرها في التربة || اجسامها صغيرة شبيهة باجسام النحل. ألوانها متباينة منها السوية اللون ومنها المخضبة والمجعدة || قوتها رحيق الازهار وطلعها تختزن بعضه في تخاريب ورتبة المائدة تقمها في محاجرها كغذاء لدبها قبل ان تتحول الى حشرات جميلة سارحة || اشهر انواعها واعمها انتشارا - العذرية اليرمانية Andrena cineraria - والعذرية الصفراء Andrena fulva

Delphinulidae (S).

Delphinulidés

٣١٣٣١ - صُرَّاسِيَّات ° فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم الجعنية. اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اصداها شبه مخروطية الشكل، كثيرة التضاريس والاطانات والتلويحات الشائكة. فوهاتنا مستديرة. اجسامها صغيرة، رحية الاربية، معتدلة الارجل || اشهر اجناسها الصُرَّاسَة.

Andrenidae (S).

Andrénidés (F).

٣١٣٣٩ - عَذْرِيَّات ° فصيلة حشرات من الحبوبيات ورتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، اعطائها المناطق الشالية وبعض الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة شبيهة بالنحل. ألوانها ملونة تكثر فيها السمة المختلفة الماجاة وبعضها اصفر او مخضبة بالاصفر الاخضر || ملجنها الحياتي فريدي. الذكر يعيش حتى زمن النحاح فيكوم الاش وبتلاشي. الانثى تمتع مكانها في تخاريب خشاهما التي تقمها في محجر تحفرها في التربة || اعرف اجناسها واشهرها العذرين والسكود.

Stationnel (F).

٣١٣٣٢ - طَدَي ° نعت تعريفي يطلق، في علمي الحيوان والنبات، على كل هجين يستقر الصفات.

Paralique (F). Paralic (E).

٣١٣٣٣ - طَلِي ° نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالشطوط البحرية.

Glyptogénèse (F).

Glyptogenesis (E).

٣١٣٣٤ - طَلَّاسَة ° طور من اطوار المناشع الحصلية حيث العوامل الطبيعية الناقضة، اخضها المياه والرياح، قوّضت معالم القشامة الاولى.

Pluricellulaire (F).

Pluricellular (E).

٣١٣٤٠ - عَدِيمَاتِ الْخَلَايَا ° نعت تعريفي يطلق على كل كائن حي مركب من كتلت الخلايا.

Acronuridae (S).

Acronuridés (F). Acronuridae (E).

٣١٣٣٥ - طَنْزَرَات ° فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف، اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد، زاهية

Lipotypha (S).

Lipotyphes (F). Lipotyphia (E).

٣١٣٤١ - عَدِيمَاتِ الْمِرْعَةِ ° مرتبة من الحشريات تتميز بخلو اعمالها من المعرفة وشبه

طَرِيَّةٌ. ثمارها عَنَبِيَّةٌ لَبِيَّةٌ || أشهر أنواعها العصرة السامة H. venenata ثمارها سامة ذائعة.

٣١٣٤٨ - عِنَاكَة ° Gonochorisme (F).

Gonochorisme (E). العناكة هي الانفصال الشقي. وهي بيولوجياً عكس الخنثية.

٣١٣٤٩ - عَيْكٌ. Gonochorique (F). Gonochoric (E).

نعت تعريفي يطلق، بيولوجياً، على كل كائن وحيد الشق أن في الحيوان أم في النبات.

٣١٣٥٠ - عَوْس ° Eos (S). Eos (F). Eos (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. أنواعه المعروفة نحو ١٠ موطنها يمتد من الهند الصينية إلى جزر الزلابج. ملجنها الحياتي جماعي. افواجها تراوح من ٢٠ إلى ١٠٠ زوج || أجسامها معتدلة القد. أنواعها تراوح من الحمرة الأرجوانية إلى البرتقالية || اعرف أنواعها واشهرها:

Eos rubra (S). - العَوْسُ الْبَاثُونِي
Eos Cochinchinensis (S). - العَوْسُ الْكُوْشْنِيْنِي

٣١٣٥١ - عَوْزْمَان، آزْرَان Synergides (F).

العورمان أو الأزران اسم يطلق على خليتين توجان فصّ الملك أو ينتهي بهما جراب الطلع.

٣١٣٥٢ - عُثَارِيَات ° Psilophytales, Profilicales (F).

فئة من النبات تنتمي إلى مستورات الزهر الوعائية. مركزها التسلسلي يأتي بعد المشريات وبين الخثيات والطحليات || وهي من النباتات البسيطة التركيب العادة الجذور الحقيقية.

٣١٣٥٣ - عُثْجِيَّات ° Galeidae (S).

Galéidées (F). Galeidae (E). فصيلة أسماك بحرية من السفنجيات. أجناسها المعاصرة المعروفة ثلاثة، جميعها من الاشلاق الوشعية الشكل || تتميز بنسائها المغلوفة بغشية سادة متحركة. أشهر اجناسها وأعما انتشاراً الفطروس.

٣١٣٥٤ - عُثْبِيْتُون ° Glyptodon (F).

Glyptodon (E). جنس حيوانات احفورية من اللبونات الدرد. احافرها تعود إلى الياج الرابعي. جميعها من المفترسات الامريكية المهة || اجسامها ضخمة، كبيرة، مقلّعة بذبال عظيمة سمسة الزوايا. اطوالها بما فيه الرأس والذنب نحو ثلاثة أمتار || يقال أنها كانت تعيش حياة التاتو أو المنزوع.

٣١٣٥٥ - عُثْلِيل ° Dentalium (S). Dentale (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات وفصيلة الغليليات. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصداها بقوة الشكل أو مردنته. منها الجالسة والمنقطعة والمحجّنة. صفحاتها الخارجيّة مخدّدة السطوح.

اتعدام مرتفعها الحوضي. وهي تضم سبع فصائل الزبائيات والظوبنيتات واللبانيات والمفترسات والمذائبات والكسيتات والعسرنيات.

٣١٣٤٢ - عُثْرِب ° Chrysochloris (S).

Chrysochlore (F). جنس حيوانات لبونة من فصيلة العسرنيات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع افريقية الشرقية والجنوبية || شكله قريب الشبه بالخط. جسمه يطول من ١٢ إلى ١٦ سم. رأسه مخروطي الشكل، ذلق الخطم. عيناه صغيرتان مغلوفتان بغشاوة من الجلد متحركة. اذناه صغيرتان، ماسحتان، لا قومية التركيب. عنقه شديدة القصر. ذنبه جدعة. جرامزه قصيرة، مسلّحة باظافير ضليعة، جاسّة. الامامية منها رباعية الاصابع. الخلفية خصاستها. ثوبه قسطناني اللون كثيف الوبر الناعم القصير. الاثنى ابرز قدًا من الذكر || قوته الحشرات والبدان والزحافات الصغيرة || أشهر انواعه:

Chrysochloris aurea (S).

Chrysochlore doré, Taupe-dorée (S). العُثْرِبَةُ الْمَذْهَبُةُ
موطنه افريقية الجنوبية. ثوبه قسطناني اللون، ذهبي المواجه.

٣١٣٤٣ - عُثْرِيَّات ° Chrysochloridae (S).

Chrysochloridés (F). Chrysochloridées (E). فصيلة حيوانات لبونة حاشرة من عديمات المعرفة ورتبة الحشريات. انواعها المعروفة عديدة جميعها جنس واحد العثرب || اجسامها مكدرمة، اسطوانية الشكل، صغيرة القد. رؤوسها مستغلطة، مخروطية، ذلقة الاخطام. عيونها صغيرة مغلوفة بنشاء جلدي متحرك. اذناها صغيرة، ماسحة. جرامزها الامامية مسلّحة باظافير تشبّط، جاسّة. الاوها قسطنانية اللون، جميلة الماخذ. المترابكة، كثيفة الوبر الناعم القصير. اثنائها اكبر قدًا من ذكورها.

٣١٣٤٤ - عَصِيم ° Holométabole (F).

Holometabolous (E). نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تامة التطور الاكالي. م عسمة.

٣١٣٤٥ - عَثِيد ° Tractus (F). Tractus (E).

اسم يطلق على الخيوط والحزم اللبغية الموجودة في وثن النسيج النباتية والحيوانية.

٣١٣٤٦ - عَصَبُون ° Nevraxe (F). Nevraxe (E).

اسم يطلق على الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.

٣١٣٤٧ - عَصْرَة ° Hydnocarpus (S). Hydnocarpe (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الطهيبات. انواعها المعروفة ستة. منهاها البلاد الحارة والاستوائية || اشجارها كبيرة دائحة. اوراقها متعاقبة. ازهارها محورية الارتكاز،



عسرب



عوس



غليبتودون

Gal. tigrinus (S). **فُطْرُوسٌ بَرِّيٌّ**
يكثر وجوده في المحيط الهندي. طوله نحو ١٥٠ سم.
ثوبه بين الصهبة والشفقة المرقوشة بالسمرة العابقة. بطنه
الى الشهية العاجية.

Phyllite, Phyllithe (F). **٣١٣٦٣ - فِلَيْت**
Phyllite (E).
ورقة متحجرة او حجر نقشته الاوراق بوسوما.

Astrophysique (F). **٣١٣٦٤ - فِيزِيَاءُ كَوْكَبِيَّةٌ**
Astrophysical (E).
الفيزياء الكوكبية علم يبحث في طبيعة الكواكب وفي
المناهج والاساليب التقنية الخاصة بها.



فطروس

Bathyal (F). Bathyal (E). **٣١٣٦٥ - قَاعِي**
نعت تعريفي يطلق في علم الحصبلة (الجيولوجية) على
المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٢٠٠ الى ١٠٠٠ م
[من ميزات هذه المنطقة: عدم اضطراب المياه وتلقفها.
استقرار الحرارة وتساوبها. عدم نفاذ التور. قلة وجود
النبت في الطبقة العليا وانحائها في الطبقتين الوسطى
والسفلى. عظمها محصورة بالرخويات رأسيات الأرجل
والقشريات والاسماك المقترسة والسامة التي تعيش على
المواد العضوية العائنة الى البحث الراسية] اما الانثربة
الكثائية او الشسئية المنتشرة على سطح الارض فهي
بمعظمها تنمو الى الغفار او الصلصال القاعي الذي كان
راسياً على هذه الاعماق في الاباح الاول.

Xérophilie (F). Xerophily (E). **٣١٣٦٦ - قَنَانَةٌ**
القنانة منشع طبيعي يقود النبات القنن، الذي يرغب في
المناخات الجافة، الى تكاثف الائمة واغوارار الخلايا
السفوية في داخلها.

Dryopithecus (S). **٣١٣٦٧ - فِرْدُ الْعُصْ**
Dryopithecus (F).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قرد العُص. جنس قرد
مقرضة تعود احافيرها الى الزمن الميساني من الحقبة
النويوجينية [هيكلها العظمي شبيه بهيكل الغوريلى وشبهه
البعامة من حيث القد] وقد ثبت الآن ان لا صلة بينه وبين
السلالات البشرية.

Crossopus, Neomys (S). **٣١٣٦٨ - قُرُصُوب**
Crossope (F).
حيوان ليون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزبابيات
ورتبة الحشرجات. اعطاه تيمت من الصين الى اروية.
يألف صفات الانهار، ويوم ويغرس في الماء فيقتنص
الحشرات المائية واساربها والاربابين والاسماك
وبلاعيها [جسمه صغير القد، شبه بالزبابة. طوله بما
فيه الذنب نحو ٢٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، ولثق
الحظم، عيناه صغيرتان، مستديرتان، عتقه قصيرة.
قوائم كثة الاطراف، عاندة الاصابع، خنارها حلب لب
جامد. ذنبه الذي يبلغ طوله نحو ٨ سم. شبه بجاني
الشكل، بطوقه خنار من الهلب القصير الجامد. ثوبه الى

اجسامها اسطوانية. اردنبها قليلة الرحابة. ارجلها
قصيرة، ثلاثية القلق [تعيش متغمة في الرمال والاسمال.

Dentalidae (S). Dentaliids (F). **٣١٣٦٩ - غِثْلِيَّات**
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات.
اجسامها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع العالم.
اكبرها قد ابعدها غوراً [اصداها كلسية المائدة، متباينة
الاشكال والحجوم، منها المرنينة والوقية والانويوية
والكبيرة والصغيرة. جميعها مفتوحة الطرفين. صفحانها
الخارجية مخددة السطوح او ماسلة، الداخلية صقيلة
اشهر اجسامها الغمليل.

Gamétophyte (F). **٣١٣٧٠ - غِيَامَةٌ**
Gametophyte (E).

الغيامة، في علم النبات، طور من اطوار الانخصاب
الشري؛ يبتدئ مع التحويل الكروماتيني وينتهي عند
الانخصاب.

Anisotrope (F). **٣١٣٧١ - غَيْرُ مُتَسَاوِيِ الْإِتِّجَاهِ**
Anisotrope (E).
نعت تعريفي يطلق، فيزيائياً، على كل مادة صفاتها
الحكمية او الميكانيكية لانتساوية الاتجاه.

Chlamyde (F). **٣١٣٧٢ - فَحِيث**
اسم يطلق على كل زهرة ثنائية الكم. ويطلق أيضاً على
كل عضو ينفشاه غلات خارجي.

Tuniciers, Urochordates (F). **٣١٣٧٣ - فُصْصِيَّات**
Urochordata (E).

صفت حيوانات بحرية ركنية او طوحيّة ملحوقة ببناء يشبه
الثقلية [فصلاتها وانواعها المعاصرة متوسطة العدد.
اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل. تتميز بجهازها
العصبي الظهري الاكثار وهو مؤلف من مكاش شوكي
يمتد امتداد الجسم. اما التنفس فتؤمنه فلولج خيشومية
مركزها في جانبي البلعوم.

Interstellare (F). **٣١٣٧٤ - قَفْصَاءُ حُسْنِيَّات**
Interstellar (E).
اسم يطلق على الفضاء القائم بين النجوم والمجرات.

Galeocerdo (S). **٣١٣٧٥ - فُطْرُوس**
Galeocerdo (F). Galeocerdo (E).
جنس اسماك بحرية من السفنقات وفصيلة الغلجيات.
انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اما المقرضة المتحجرة في
الاراضي الطباشيرية والثلاثية فأربعة [اجسامها وشبهه
الشكل تطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. تتميز بانسانها
المحززة والتساوية العدد في الفكين] اشهر انواعها
المعاصرة فطروس الشمال والفطروس البوري

Gal. Arcticus (S) **فُطْرُوسُ الشَّمالِ**
يكثر وجوده في بحار الشمال. ثوبه الى الزرقة الخضراء.
طوله من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم.

Bittacidae (S).

Bittacidae (F). Bittacidae (E).

فصيلة حشرات قانصة من رتبة شارات الاجنحة
عصبيات الجناح. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الشمالية
اجسامها قضيبة متباينة الطول. قوائمها دقيقة مستطيلة.
اجنحتها ضيقة، مستديرة الاطراف | قوتها كل ما
استطاعة قصه من ذباب وهوام وحشرات. يرقاتها
بأكثريتها دائمة نائلة ومنها الواجبة والقِرْصَامَة | اشهر
اجناسها القِمَاصَة.

Xenophora (S). Xénophore (F). ٣١٣٧٤ - قِمَاصَة

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معنيت الارجل
اماميت الخياشيم وفصيلة القِمَاصَة. انواعها المعروفة
قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداها
شبه مظلة الشكل، كلسية المادة، متراكبة الاطراف
المتباينة الاشكال والالوان | اعرف انواعها واشهرها :

X. lithophora (S).

X. corrugata (S).

- القِمَاصَة المَحْبِيَة
- القِمَاصَة المَصْفُودَة

Xenophoridae (S).

Xénophoridés (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معنيت الارجل
اماميت الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة
العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداها
صغيرة القد، مظلية الشكل أو صوانية. صفحاتها
الداخلية عادمة المادة اللؤلؤة اما الخارجية فمدبجة
بالزخارف والاطراف المتباينة الاشكال والالوان | اشهر
اجناسها واعرفها القِمَاصَة.

Nomade (S). Nomade (F). ٣١٣٧٦ - قِمَاصَة

جنس حشرات حموية من غشائيات الاجنحة وفصيلة
القِمَاصَة. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منتشرة في جميع
اقطار العالم | اجسامها رشيقة هيفاء متوسطة القد أو
صغيرة. اوائها متباينة تغلب فيها الشقة فالصبة
والتجذيع بالاصفر أو الزنجري | الحشرات الجملانة
تمشي على رجليها الاقدام وظلها. يرقاتها طفيلية تعيش في
محاجر العذريّات والنّارِيات وغيرها.

Nomadidae (S). ٣١٣٧٧ - قِمَاصَة

Nomadidés (F). Nomadidae (E).

فصيلة حشرات حموية من رتبة غشائيات الاجنحة.
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع
العالم | نظامها الحياتي فردي. انائها تتمتع الممكن قرب
مداخل محاجر غيرها من غشائيات الاجنحة اخصها
العذريّات والهكوتسيّات والنّارِيات، فتصرح البرقات
فور نفقا الى داخل المحاجر حيث تعيش كامل حياتها
اليرقية على ما تجنيه العوائل | اشهر اجناسها القِمَاصَة.

Phénotypique (F).

Phenotypic (E).

٣١٣٧٨ - قَيْسِيّ

ويدعى النمط الظاهري. نعت تعريفي يطلق على كل ما له
صلة بالقنيس. التناسل القنيسي لا وراثي.

الشبهة السمراء تشدّ سمرتها في الظهر وتغير في الصدر
والطن | الاثنى اميز قدا من الذكر وتحلّي بالتوب نفسه.

Crocidura (S). Crocidure (F). ٣١٣٦٩ - قِرْصَامَة

Crocidura (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبائيات ورتبة
الحشرّيات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها البلاد
الحارة والمعتلة الحرارة من العالم القديم. جميع انواعها
جاسّة قوتها الحشرات والنباتان | اجسامها تطول من ١٢
الى ٢٦ سم. رؤوسها مخروطية، ذلقة الاخطام. عيونها
صغيرة، مستديرة. اذانها ماسحة. جرامها معتدلة القد،
خصاسية الاصابع، مستطيلة الاظافر الحادة. اوائها
تراوح من السمرة الحديدية العواج الى السمرة العابقة |
انائها اميز قدا من ذكرها، يعتقد ان مجلها يوم نحو
٢٠ يوما تضع في تمامه من ٣ الى ١٠ ادراص وذلك
حسب الانواع.

Embletonia (S). Emblétonie (F). ٣١٣٧٠ - قِرْط

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معنيت الارجل،
خلقيات الخياشيم، جلديات التنفس. انواعها المعروفة
قليلة العدد منتشرة في بحار النصف الشمالي من الكرة
الأرضية | اجسامها صغيرة، عريضة، عادية
الاصدا، مستطيلة الشكل | عنبدة اللوامس القموية
الاهليجية، المبطلة. | معظم انواعها يعيش على
الصخور البعيدة الغور.

Xyridaceae (S). ٣١٣٧١ - قِسُورِسيّات

Xyridacées (F). Xyridaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدة الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة
متوسطة العدد. مهدا بعض الاصقاع الاسيوية
والامريكية. جميعها من ثوت المناقع والمواقع الرطبة |
نباتاتها جنموية معمّرة. اوراقها قرصية الانتشاب عصفية
الشكل أو منصلبة. تنويرها شعراخي. سننلي التجميع،
هامي الارتكاز. ازهارها خنثوية، كبيرة القد، ملونة.
اكمامها مدغمة الراسات. ثمارها جراء ثلاثية الفلق.
بزورها آحية، نشوبة المادة.

Bittacus (S). Bittaque (F). ٣١٣٧٢ - قَمَاصَة

جنس حشرات قانصة عصبية الجناح من فصيلة
القِمَاصَة. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم
اقطار العالم | اجسامها قضيبة مستطيلة القوائم والاجنحة.
بكثر وجودها في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء |
جميعها مقترسة قوتها الذباب والهوام. يرقاتها دائمة وثلاثة
تعيش في الجلالة وتحت المدر.

B. tipuloides (S).

B. capensis (S).

القَمَاصَة القَصِيَة

اعطانها شرقي حوض البحر الابيض المتوسط

القَمَاصَة الافريقية

اعطانها معظم مناطق افريقية الجنوبية.

B. Blancheti (S).

القَمَاصَة البرازيلية

اعطانها البرازيل وخاصة حوض الامازون.



قِرْصَامَة

Colloïde (F). Colloid (E).

٣١٣٨٦ - كُولِيد

اسم يطلق في علم الكيمياء على كل جسم لا ينفص في الماء كاتناعم شبه المتبلورات.

Prothalle (F).

Prothallium, Prothallus (E).

٣١٣٨٧ - كُثْمَة

تنوء صغير، صفحي الشكل غالباً، يعلو بويضة ستورات الزهر الوعائية، تنمو عليه الاثيرة والسبين.

Condylura (S). Condylure (F). * ٣١٣٨٨ - كَنْدُل

حيوان لئون جاش وحيد الجنس والنوع من فصيلة الطوبينيات ورتبة الحشرات، موطنه امريكا الشمالية | جسمه صغير القد، اسطوانى الشكل، يطول نحو ٢٤ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١١ سم. رأسه مخروطي الشكل ينتهي بقنطيسية صلبة يطولها اكليل من الشعاع اللداسة الغضروفية التركيب. عيانه خريتان. اذناه طامستان. ذنبه مبخر الهلب القصير. جرابه خماسية الاصابع المجهزة باظفار قوية، مستطيلة. ثوبه انبس اللون، اشقق المواج | الانثى اميز قداً من الذكر واهت ثوبا منه. تحمل مرة واحدة في العام وتضع من درصين الى خمسة ادراص | قوة الحشرات والديدان. يعيش في تقف يخلده على عمق براوح من ٣٠ الى ٦٠ سم.

Terre non cultivée (F).

٣١٣٨٩ - كَنْكُث

الكثكث كل تربة غير مزروعة مستحالة كانت او غير مستحالة.

Exothermique (F).

Exothermic (E).

٣١٣٩٠ - لَاحِش

تعت تعربني يطلق على كل تفاعل كيمائى ينبذ الحرارة الناجمة عن تفاعله او تركبته.

Brassolis (S). Brassolis (F).

٣١٣٩١ - كَجَائِيَة

جنس حشرات فراشية صولجانيات القرون من فصيلة الكجائيات ورتبة حرشفات الاجنحة | انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة اجسامها كبيرة القد. رواشنها ملقطة جميلة التخضب. قروها الانتشاعارية صولجانية الشكل | اساربعها خاضلة. ملجنها الحياتي جماعي. مجموعاتها تعد بعض المئات. تعيش في جراب واحد غشائي المائدة. تسرح في الليل وتعود الى جرابها في النهار. ثلثم اوراق الكثير من النبات ومنها الموز فتؤذبه اشق الأذى.

Brassoliidae (S).

Brassolioides (F).

٣١٣٩٢ - كَجَائِيَات

فصيلة حشرات من رتبة حرشفات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة الانريكية والامريكية | جميع انواعها كبيرة القد، جميلة الالوان والتقيح والزخرفة | اساربعها خاضلة قوتها اوراق النبات. جميعها غرضمية الملين الحياتي تعيش مع بعضها البعض في اجرة كبيرة غشائية المائدة تبيت فيها من

Bathymétrique (F).

Bathymetric (E).

٣١٣٩٩ - قِيَاسِي

تعت تعربني يطلق على كل ما له صلة بالقياصة.

Castnidae (S).

Castnides (F). Castnidae (E).

٣١٣٩٠ - كَسْتِنِيَّات

فصيلة حشرات فراشية من حرشفات الاجنحة مختلفات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الاستوائية اخصها الامريكية | جميع انواعها متوسطة القد او كبيرة. تتميز بجمال رواشنها الخملية القشار الساطعة الالوان. وتتميز ايضا باسترسال رواشنها، عند الراحة، على شكل جملون | أشهر اجناسها الكستينية.

Castnia (S). Castnie (F).

٣١٣٩١ - كَسْتِينِيَة

جنس حشرات من حرشفات الاجنحة وفصيلة الكستينيات انواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم الاقاليم الاستوائية | اجسامها كبيرة القد تطول من ٣٥ الى ٤٥ سم. وبسطلها تراوح بين ١٠٠ الى ١١٥ سم. رواشنها خملية القشار جميلة الالوان الساطعة المواج يكثر فيها الاسمر الحنطي يعلوه تجذيع وتقيح براوح، حسب الانواع، من الاصفر الكبريتي الى الاحمر القرميدي | اساربعها مؤذبة تخلخ سوق الموز والانناس والصبار وغيرها من النباتات اللينة.

Atta (S). Atta, Atte (F).

Atta (E).

٣١٣٩٢ - كَطْبَة

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة وفصيلة النمليات. انواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها امريكية المهد. ملجنها الحياتي جماعي. كسائر انواع النمل | اجسامها معتدلة الجرم لكنها تتميز بكبر وبغلاظة رؤوسها، فكوكها حادة فاضمة، حماتها ذرية تهريق مادة مخترة.

Calemaríes (F).

٣١٣٩٣ - كَلَمَارِيَّات

فئة نباتات متجذرة يعود ظهورها الى الحقبة الكربونية. نباتاتها قريبة الشبه بالكنائيات. سوقها ليفية، مخشوشة، مجنوة، تطول من ٤ الى ١٠ امتار اوراقها حلقية الانتساب، عصية الشكل، مستطيلة. اعرف نباتاتها الكلمات والبصريات.

Culm, Dinantien (F).

Culm, Dinan (E).

٣١٣٩٤ - كَلْمِي، نِيَّانِي

كلمى من «كولم» اسم موقع في المانية. ونباتاني من «دينان» اسم موقع في بلجيكية | ساق او طبقة من الحفبة الكربونية تتميز بشسها الكثير المائدة النباتية.

Calamite (F). Calamite (E).

٣١٣٩٥ - كَلْمِيَّات

جنس نباتات متجذرة يكثر وجودها في الحقبة الكربونية من الاباح الاول | تعتبر من الاسوخجات الجبارة المنقرضة. شكلها قريب الشبه بالبوص. ارتفاعها براوح من ٧ الى ٨ امتار.



كندل

٣١٣٩٧ - لَوْرَنْتِيَّةٌ ^٥ (E). Laurentien (E).
نعت تعريفي يطلق على الطبقة السفلى من الحبة السحبية
العائدة إلى الأباح ما قبل الكمبري.

٣١٣٩٨ - لِيُتُوْرِيَّاتٌ ^٥ (S). Lithosiidae (S).
Lithosidés (F).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيّات الأجنحة. أجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الجبلية
والاقاليم الباردة من العالم القديم || اجسامها كثيفة الخمل،
شبه اسطوانية الشكل، تطول من ٢٢ الى ١٨ مم. سبطنها
تراوح من ٤٢ الى ٥٢ مم. رؤوسها مزوانية الشكل.
عيونها صغيرة. ملاسها ومراشفها دقيقة. قرونها
الاستشعارية خيطية. رواشنها الامامية ضيقة. اثوابها
عامة الزخرفة، الوانها تختلف مع اختلاف الانواع
|| اشهر اجناسها الليتوزية.

٣١٣٩٩ - لِيُتُوْرِيَّةٌ ^٥ (S). Lithosia (S).
Lithosie (F). Lithosia (E).
جنس حشرات فراشية من فصيلة الليتوزيات. انواعها
المعروفة نحو ٣٠ اعطائها جبال البلاد المعتدلة الحرارة
من العالم القديم || اجسامها متكاثفة الخمل الناعم تطول
من ١٥ الى ١٨ مم. سبطنها تراوح من ٤٥ الى ٥٢ مم.
رؤوسها معتدلة الجرم، صغيرة العيون، دقيقة الملاص
والمراشف. ازبنتها خيطية الشكل. رواشنها الامامية
ضيقة. مقطوعة الأطراف. رواشنها الخلفية رحيّة
الانفراج، مستديرة الأطراف || اساربها تعيش على
الحزاز.

٣١٤٠٠ - مَاحِشٌ ^٥ (F). Endothermique (F).
Endothermic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل تفاعل كيميائي يمتص الحرارة
الناجمة عن تفاعله || معظم المتفجرات من العناصر
الماحشة.

٣١٤٠١ - مَتَبَيَانُ المَشْرِ ^٥ (F). Hétérothallique (F).
Heterothallic (E).
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي
يجاري منشع المتباين المشري.

٣١٤٠٢ - مَقْصَاوِي المَشْرِ ^٥ (F). Homothallique (F).
Homothallic (E).
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي
يجاري منشع التساوي المشري.

٣١٤٠٣ - مَثْلُوْتٌ ^٥ (F). Triquètre (F).
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل سطح مستدير
تعلوه ثلاث زوايا ناشرة تتخللها ثلاث زوايا غائرة.

٣١٤٠٤ - مَحَاحٌ ^٥ (F). Vitellogène (F). Vitellogen (E).
محاح او محاحة نعت تعريفي يطلق في علم الفيزيولوجية
على غديّة تنشأ منها الخلايا المحيية المزودة بالمواد
الغذائية عند المنطقيّات والمغقيّات.

المصباح الى الغروب لانها تسرح في الليل سعيًا وراء الزاد
|| اشهر اجناسها للحّابة.

٣١٣٩٣ - لَحَازَةٌ ^٥ (S). Cuterebra (S). Cutérébre (F).
جنس حشرات من رتبة نوات الجناحين وفصيلة
الحزازيات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض
اقطار العالم اخصها امريكة الجنوبية والشرق الاقصى ||
اجسامها مكرمة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها وعيونها
ناشزة. ازبنتها نحيلة وقصيرة. اعظامها قسيحة. اثوابها
ملونة، مجذعة الكواسل والبطون || انائها تمتع المكن على
جلود معظم الحيوانات الوحشية والداجنة فينقت عن
يرقات دقيقة تنقب جلد المائل حيث تعيش كامل طورها
البرقي. طور الاكمال ينقضي في التربة وينتهي بظهور
الحشرة الجلجلة.

٣١٣٩٤ - لَحَازِيَّاتٌ ^٥ (S). Cuterebridae (S).
Cutérébridés (F). Cuterebridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة نوات الجناحين قصيرات
الاقرون. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ تألف الحراج
والغابات والمراعي. معظمها امريكي المهد وبعضها
اسيوي || اجسامها صغيرة مكرمة. رؤوسها معتدلة
الضخامة، ناشزة. عيونها كبيرة. قرونها الاستشعارية
قصيرة ونحيلة. اعظامها صغيرة القد، قسيحة. اثوابها
مجزعة || انائها تمتع المكن على جلود الحيوانات البرية
والالهيّة فينقت عن يرقات صغيرة، دقيقة تنتمن في جلد
المائل فتصّب له قروح ونمايل وتبقى حتى يحين زمن
الاكمال فتخرج عوائلها الى التربة حيث تتحوّل الى
حشرة جلجلة || اشهر اجناسها للحّابة.

٣١٣٩٥ - لَدَاسَةٌ ^٥ (S). Gracilaria, Caloptilia (S).
Gracilaire (F).
جنس حشرات فراشية من حرشفيّات الأجنحة وفصيلة
الدّاسيّات. انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها معظم
اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة نحيلة
تطول من ٤ الى ٦ مم. سبطنها تراوح من ١٠ الى ١٤
مم. قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة. مشرفها
وملاصها نشيطة. رواشنها جميلة التخضيب الزاهي،
مستعرضة التهذيب المختاري || اساربها تعيش على اوراق
الاشجار العائلة اخصها البليك والحوور والميزفون
والبتولا.

٣١٣٩٦ - لَدَاسِيَّاتٌ ^٥ (S). Gracilaridae (S).
Gracilaridés (F).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيّات الأجنحة. اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها معظم مناطق
البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد، مستطيلة
الزباني الخيطية الشكل، مهذبة الرواشن الجميلة
التخضيب. تتميز برؤوسها المزوانية الشكل وبمراشفها
النشطة وبملاسها الدكيّة القويّة || اساربها تعيش على
اوراق الاشجار النفضية اخصها الحرجية والتزيينية ||
اشهر اجناسها الدّاسة.

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرغيات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة ااجسامها مستعرضة، مبطلة، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها مستديرة، جاحظة. اخطامها ناشزة الفك الاسفل. اوابها فضية اللون يعلوها تعصيب ممتدس اسود. زعانفها الظهرية والشرجية شاككة. زعانفها الذيلية فارقة ااحومها مأكولة.

Ginkgoales (F).

٣١٤١٣ - مَعَابِل

اطلب جيנקوات.

Bathomètre, Bathymètre (F).

Bathometer, Bathymeter (E).

٣١٤١٤ - مِقْيَاح

المقياس جهاز يرتكز على الثقل النوعي يستعمل في سبر اغوار البحار.



مطادة

Syngamie (F). Syngamy (E).

٣١٤١٥ - مَكَاغَمَة

المكاغمة في علم النبات هي اتحاد الاشعاج في التناسل اللثني.

Autochtonie (F).

٣١٤١٦ - مَكود

راجع تيك.

Solenodon (S). Solénodon (F).

٣١٤١٧ - مَكِيس

Solenodon (E).

جنس حيوان لبون من فصيلة المكسيات. له نوعان يعيشان في جزر الانتيل. والمكيس هو اسمه في تلك البلاد ااجسمه بطول نحو ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٥ سم. شكله شكل الجرد الا انه اسفني الرأس عري الذنب االسنجته الحياتي فريدي. يسرح في الليل، قوته الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة وبعض الثمار البرية والجنود ااما نوعا فهما مكيس الانتيل S. Cubanus (S). Paradoxus (S). ومكيس كوبا. مكيس الانتيل كان كثير الوجود في جزيرة مايني الى حين ادخلوا على الجزيرة بعض الثموس للقضاء على الاناعي فقضت على الاناعي والمكيس.



مكيس

Enkysté (F). Encysted (E).

٣١٤١٨ - مَكِيس

المكيس، في علوم البيولوجية والطب والنبات، هو ما كان موجودا ضمن كيس.

Solenodontidae (S).

٣١٤١٩ - مَكِيسِيَّات

Solénodontidés (F). Solenodontidae (E).

فصيلة حيوانات من الثدييات عنيبات الممرغة ورتبة الحشريات. المعاصر منها الآن جنس واحد يدعى مكيس يشتمل على نوعين مهدهما جزر الانتيل الكبرى والصغرى.

Menotyphla (S).

٣١٤٢٠ - مِزْجِيَّات

Ménotyphles (F). Menotyphla (E).

مرتبة من الحشريات تتميز حيواناتها بوجود الممرغة

Endothermicité (F).

٣١٤٢٠ - مَحَاشِيَة

Endothermicity (E).

المحاشية، كيمائيا، هي امتصاص الحرارة الناتجة عن تفاعل بعض الاجسام او العناصر.

Panspermie (F). Panspermy (E).

٣١٤٢١ - مَقَاة

الزغامة، بيولوجيا، نظرية افتراضية تبحث عن اصل الحياة ومصدرها. ملخصها ان الحياة على الارض تعود الى جراثيم كونية انتقلت في الفضاء من بعض الكواكب الى القافة العلمية الحديثة تني هذه النظرية ذلك لأن اشعة ما وراء البنفسجي التي تهين على الفضاء الخارجي لا تسمح بالحياة لأي جرثومة كانت.

Marattiaceae (S). Marattiaceae (E).

٣١٤٢٢ - مَرَرِيَّات

Maratiées (F). Marattiaceae (E).

فئة نباتات من مستورات الزهر الوعائية تنتمي الى الشربيات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الازمنة الغائرة. اما المعاصر منها فنحو ٥٠ جميعها من ثبوت المناطق الحارة ااسوقها قصيرة، دونصية الشكل، منتصبة. اوراقها صمغ الاركتاز، تاجية الانتشاب، كبيرة القد، تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. نصلها مستعرضة يعلب فيها التفريض الريشي ثم الكفي.

Cipolin (F). Cipolin (E).

٣١٤٢٨ - مَرَرِيَّات

ججر من الجنس المتبلور تختزنه عروق من الطلق (ميك) مشتركة المركز. يستعمل استعمال الرخام وهو اصلب منه.

Tactisme (F). Tactism (E).

٣١٤٢٩ - مِيسَاس

تفاعل او ارتكاس الخلقة الحية من جراء تأثيرات مختلفة المصادر، كيميائية، حرارية، كهربائية، الخ... تأثيرات قد تكون جاذبة او دافعة فتدعى ايجابية او سلبية.

Thalloïde (F). Thalloid (E).

٣١٤٣٠ - مَشْرِي

هو في النبات ما كان تركيبه وشكله كالشعر.

Crossoptérygiens (F). Crossopterygii (E).

٣١٤٣١ - مَصْلَبَات الزَعَانِف

فئة من الاسماك اللامعات يعود ظهورها الى الحقبة الديفونية. اجسامها مستطيلة الشكل تتميز بزعانفها الخوضية والبطنية الشاذة عن القنوس المألوفة وذلك بانتشابهها عند مؤخر الصدر والبطن، وبارتكازها على مادة حشوية فاصلة. زعانفها الذيلية معددة ومصلبة اافصالها واجنسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها من متحجرات الحقبة الديفونية وما يليها. النوع الوحيد المعاصر والمعروف حتى الآن يدعى «لانيمرية» وهو من عظم ارنخيل الكومور في المحيط الهندي. يعيش بين منطقتان الصخور وفي تجاويها على اعناق براوح غورها بين ٣٠٠ و ١٢٠٠ م.

Glyphisodon (S).

٣١٤٣٢ - مَطَاة

Glyphisodon (F). Glyphisodon (E).

31427 - مُيُوزِي [○] , إِنْجِدَايِي Méiotique (F).
Meiotic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالموزة أو الانقسام.

31428 - نَاجِدٌ Propodite
اسم يطلق على الفصلة قبل الأخيرة من قوائم القشرينات عشاريات الأرجل.

31429 - نَاسِيعٌ Allométrique (F). Allometric (E).
نعت تعريفي يطلق في علم البيولوجية على كل عضو يتميز بنوهة لا تنسجم مع نوهة سائر الاعضاء الأخرى.

31430 - نَبِيثٌ Coccolithe (F).
النبيت جسيم مجهرى من كربونات الكلسيوم مشبع بالمواد العضوية يرسب في قاع البحر.

31431 - نَبِيلُ الْبُوعِ Hétérosporé (F).
Heterosporous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الواعائية كمنته متباعدة البوغ المختلف الشق.

31432 - نَثَاةٌ Gamétangie (F). Gametangy (E).
النثاة طريقة احصاب شائعة عند الفطور وبعض العنقيات. قوامها التحام النثاك الذكورية بالانثوية وانماجها فلتاتها واخصائها.

31433 - نَبِيدَةٌ Gamétange (F). Gametange (E).
النبيدة في علم النبات هي الخلية الأم أي أم الغامات عند النباتات الدنيا ومنها الفطور وبعض العنقيات.

31434 - نَسَاجٌ Histogène (F). Histogenous (E).
اسم يطلق على العناصر والمواد الحيوانية التي تتكون منها الانسجة الحية.

31435 - نَسَاجَةٌ ، هَيْسُوتُجِيَهَ Histogénèse, Histogénese, Histogeny (E).
قسم من النجارة، علم الاجنحة، يبحث في تكوين النسج الحية وفي تطورها.

31436 - نَسَاجِيٌّ Histogénique (F). Histogenic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنساجة.

31437 - نُسُوعٌ Allométrie (F). Allometry (E).
خاصة جسمية تتمتع بها عضو من الاعضاء فيسرع نشاط نوهته أو بانقاصها بالنسبة الى سائر اعضاء الجسم. وهو ما يميز عنه بالنسوع الإيجابي أو السلبي.

31438 - نُسَيْلَةٌ Chète (F).
زائدة دقيقة إبرية الشكل تملو زجان الحشرة في فصلته الأخيرة. يقال ان وظيفتها تماثل وظيفة الهلب الذي يملو الفصل عند بعض الحشرات.

والمرتقن الماني أو الحوضي. وهي تضم فصيلة الحاديات وفصيلة الطواجيات.

31421 - مُتَدَوِّلَةٌ Monedula (S). Monédule (F).
جنس حشرات قاصدة من الحويات وفصيلة الوراشيات. انواعها المعروفة نحو 30 معظمها امريكية المهد اجسامها متوسطة القد أو كبيرة، قربة الشبه بالزنابير. اتواها ملونة تكثر فيها الصفرة المجذعة بالاسود أو الاسمر تقم اصفاها في مجازر تحفرها في التربة الرملية على اعماق تراوح من 5 الى 7 سم قوتها ما تستطيع اقتناصه من حشرات اخصها الذباب والهوم ولا تعف عن العناكب والنحل.

31422 - مِيَزُوزُونٌ Mésozoaire (F).
راجع ناتي الاوالي.

31423 - مِيَكْرُوَجَهْدِيَّةٌ Microénergétique (F).
Microenergetic (E).
علم من علوم الفيزياء يبحث في بُدَد (كوانتا) الطاقة أو الجهد.

31424 - مِيَكْرُوْفِيزِيَاءٌ Microphysique (F).
Microphysics (E).
قسم من علوم الفيزياء يبحث في الذرة.

31425 - مِيَمَارٌ Mymar (S). Mymar (F).
Mymar (E).

جنس حشرات مطفلة من غشائيات الاجنحة وفصيلة الميماريات. انواعها المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اجسامها شديدة الصغر طول نحو 0.6 مم. تتميز باجنحتها المتباعدة الشكل والحجم، الامامية منها مجدافية مهتزة الاطراف، الخلفية ضيقة، معلاية الشكل، عادمة التزين. زباني ذكورها خيطية، زباني انثاء صولجانية جميع انواعها مطفلة تعيش على مكن الحشرات المختلفة الفصائل.

31426 - مِيَمَارِيَّاتٌ Mymaridae (S).
Mymaridés (F). Mymaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اجسامها شديدة الصغر طول من 0.5 الى 0.8 مم. رؤوسها مستعرضة، مقطومة الاقنية. قرونها الاستشعارية مستطيلة، عديدة الفصل، من 8 الى 13. زين الاناث صولجانية الاطراف. اعناقها دقيقة، صودرها شبه بيضية، خصوصها انبوبية، مستطيلة عند معظم الانواع. بطونها شبه مردنية. اجنحتها الامامية مجدافية الشكل، مهتزة الاطراف، مستطيلة الاهداب. اجنحتها الخلفية معلاية، ضيقة. قوائمها مستطيلة جميعها مطفلة تعيش على مكن الحشرات من مختلف الفصائل والترتب. ومنها التي تفوص في طلب مكن الحشرات المائية يرقاتها مرقاة وعادمة الرؤوس والمنافذ القوية، تتدنى بالانتافذ اشهر اجناسها واعرفها الميمار.

جنس حشرات من الحُمُوتِ وفصيلة الهلكتوسيات.
انواعها المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد
المعتدلة الحرارة حتى في جبالها || اجسامها مستطيلة
الشكل، متوسطة القد أو صغيرة. ذكورها اميز قداً من
اناثها. اوابها قليلة التباين بين الانواع، تكثر فيها الشهية
والشفقة والتزير البطني بالاصفر او الاطحل او الاسمر ||
جميعها تصغر في محاجر تحتفرها في التربة. قوتها رحيق
الازهار وطلعها || اشهر انواعها الهلكتوس السداسي الزناتير
H. sexcintus. اثنى به الى السمرة السوداء الموج، زناتيره
البطنية طحلاء اللون، ثلاثية الأزواج.

٣١٤٤٨ - هَلِكْتُوسِيَّاتٌ (F). Halictidae (S).

فصيلة حشرات من الحُمُوتِ ورتبة غشائيات الاجنحة.
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع
البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد أو صغيرة.
ذكورها اغلظ من اناثها واطول منها. قوتها رحيق الازهار
وطلعها || تقيم اصنافها في محاجر تحتفرها في التربة || اشهر
اجناسها الهلكتوس.

٣١٤٤٩ - هَلِكُونِيَّاتٌ (F). Heliconiidae (S). Héliconidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها
وانواعها المعروفة نحو ١٦٠ جميعها من علم امريكة
الجنوبية || اجسامها نيفة مستطيلة او معتدلة الطول.
رواشنها كبيرة، مستديرة الاطراف، جميلة الالوان الزاهية
والزخرفة المنسقة || معظم انواعها يفرز عند الدفاع عن النفس
مادة سائلة صفراء اللون كريهة الرائحة || اساريها تعيش
على اوراق النبات || اشهر اجناسها الهلكونيوس.

٣١٤٥٠ - هَلِكُونِيُوسٌ (F). Heliconius (S). Héliconius (S).

جنس حشرات من حرشفيات الاجنحة وفصيلة
الهلكتوسيات. انواعها المعروفة نحو ٩٠ اعطانها امريكة
الجنوبية || اجسامها نيفة تطول من ٢٢ الى ٢٨ مم.
بسطها تراوح من ٣٤ الى ٤٢ مم. رؤوسها شبه مكررة.
عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية خيطية معتدلة الطول.
رواشنها كبيرة، مستديرة الاطراف، جميلة التخضب
والزورقة || جميع انواع هذا الجنس تفرز، للدفاع عن
النفس، مادة سائلة صفراء اللون، كريهة الرائحة تهد
عنها الطير والحشرات المفترسة || اشهر انواعها واعها
انتشاراً ملكونيوس البرازيل. H. eucrate. اثنى به اصفر
اللون صنابي الموج مجنوع ومزخرف بالاسود.

٣١٤٥١ - هَلَوَازِيَتٌ (F). Halloysite (E). تسيليكات الالومنيوم الطبيعي المتنوء.

٣١٤٥٢ - هُورِيٌ (F). Lacustre (F). Lacustrine, Lacustrian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يعيش في
الاهوار والبحيرات والغدران || ويطلق حصلياً على تكوين
خاص او تربة خاصة فتقوّل تكون هوري وتربة هورية ||
ويطلق اركيولوجياً على الساسكر والقرى التي كانت تشاد
فوق الماء على ركائز واوتاد مفروزة في القاع.

٣١٤٣٩ - نَشْ (F). Bipartition (E). النَشْ في علم النبات هو الاقسام الى شطرين متساويين.

٣١٤٤٠ - نُشُوءٌ ذَاتِي (F). Abiogenèse (F). Abiogenesis (E). النشوء الذاتي نظرية بيولوجية قديمة كانت تسلّم بنشوء الحياة من مواد طبيعية خام.

٣١٤٤١ - نَقْلَةٌ (F). Pénéplaine (F).

نقطة ج نقات اسم يطلق على الجبال القديمة العهد التي
قضت عليها العوامل الارضية السحيقة فاصبحت
منبسطة كالسهول || اشهر هذه القاف وارجحها اتساعاً
سهول فنلند في شمالي اوروبة ونجد البحيرات الكبرى في
كندا.

٣١٤٤٢ - نُكْلَةٌ (F). Nucléus (E).

اسم يطلق، في علم التشريح، على نواة الحبيرة الحيوانية
او الخلية النباتية.

٣١٤٤٣ - نَبِيقٌ (F). Inlandis (E).

اسم يطلق على كُمة الجليد التي تلحف الاراضي القطبية ||
النبيق الذي يلحف بعض اجزاء الغرولند يقدر بنحو مليون
كيلومتر مربع || النبايق التي تلحف اراضي القطب
الجنوبي تقدر بملايين الكيلومترات المربعة || اما سماكة
هذه النبايق فتتراوح من متر واحد الى ٣٠٠٠ متر واكثر.

٣١٤٤٤ - هُبُوسٌ (F). Vellia (S). Vélia (F).

جنس حشرات قانصة من نصفيات الاجنحة وفصيلة
الهروسيات. انواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في جميع
انظار العالم || اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ٩ مم.
رؤوسها مخروطية الشكل، قليلة البروز. عيونها صغيرة
ناشزة. قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل. مخاطلمها معتدلة
الطول ثلاثية العقل. اجنتها متباينة الاشكال والحجوم.
قوائمها الخلفية مستنخمة الانحناء. اوابها ملونة || يكثر
وجودها في المناطق والاهوار وعلى ضفاف مجاري الماء.
جميعها قانصة تسرح على سطح الماء. قوتها الهوام وكل ما
استطاعت اليه سبلا من حشرات.

٣١٤٤٥ - هُبُوسِيَّاتٌ (F). Veliidae (S). Véliidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة المختلفة.
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في جميع
اصقاع العالم || تألف النماذج ومجاري الماء وضفاف
الانهر. تسرح على سطح الماء برشاقة الشايرات. قوتها
الهوام والحشرات الصغيرة || اشهر اجناسها الهروسية.

٣١٤٤٦ - هِرْسِينِيٌ (F). Hercynien (E).

نعت تعريفي او اسم يطلق على اقدم التضخيمات التي
حصلت في القشرة الارضية وما نجم عنها من سلاسل
جبلية.

٣١٤٤٧ - هَلِكْتُوسٌ (F). Halictus (S). Halicte (F).

Enzoïque (F). Enzoic (E). ٣١٤٦٠ - يُحْفُورِي

نعت تعريفي يطلق على كل موقع أو ارض تكثر فيها الاحافير الحيوانية أو النباتية.

Ammomanes (S). Ammomane (F). ٣١٤٦١ - يُرْمَل

جنس طير من الجوامث مخروطيات المناقير وفصيلة القُثْرِيَّات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الصحارى والبلاد الحارة. تألف الواحات والمواقع المبعثرة الاشجار وبعضها يرغب في البراري القاحلة || اجسامها شبيهة باجسام القُثْر، تطول من ١٤ الى ١٨ سم. مناقيرها مخروطية نرية. اجنتحها معتدلة الطول ذلقة. اذنانها فارقة. اتواها الى الصهبة المنمشة والمروشة بالاطحل والاسمر || ملجنها الحياتي جماعي. جميعها من الضواري التي تجوب البلاد في طلب الرزق. قوتها الحشرات وبعض البزور والثمار || افواجها متوسّطة العدد إلا في زمن القطاع حيث يتألف السرب من عدة مئات || اناها تثنى في التربة بين الاعشاب المتراكبة. حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات. ترخيها يستمرّ نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || اعرف انواعه واشهرها البرملة الانيقة

Am. cinctura (S). Am. élégante (F). اعطائها تمتد من الصحراء الكبرى الى جبال الاطلس، تجوبها كل عام.

Cassia (S). Casque (F). ٣١٤٦٢ - يَلِكَة جنس حيوانات بحرية من الرخويات معنّيات الارجل مشطّيات الخياشيم وفصيلة الخونويات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجّرات الاراضي الثالثية، المعاصرة منها الآن نحو ٥٠ منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تتميز بشخانة اصدانها الخونوية الشكل المتراكبة الاطناف والزخارف والالوان.

Lilliales (F). ٣١٤٦٣ - يُسْفِيَّات

اليسفّيات مجموعة نباتية من وحدات الفلقة تضمّ خمس فصائل وهي الزنقيّات والزمزاريّات والوعلاتيّات والقورسيّات والزغفليّات.

Corynantha Yohimba, Pausinystalia Yohimba (S). Yohimbé (F). Yohimbehe (E). ٣١٤٦٤ - يُوَهْمِيَّة

شجرة حرجية طيبة، كبيرة الحجم، دائحة، من فصيلة الفوفيات. منبتها بعض مناطق البلاد الاستوائية اخصها الكامرون والغابون والكونغو || ساقها منتصبه، رفيعة، عتية الاغصان. اوراقها معتقة، متقابلة، اهليلجية النصال. ازهارها عنكولي التجميع، طرفي الارتكاز. ثمارها جراء شبه بيضية الشكل تغلف العديد من البزور الصغيرة || يستخرج من لحاء ساقها واغصانها مادّة اليوهيمين المشهورة بخواصها الشاققة.

Lépidodendrées (F). ٣١٤٥٣ - هَيْشُومِيَّات

مجموعة نباتات متحجّرة قريبة الشبه بالخدريات. اجناسها المحقّقة متوسّطة العدد جميعها من نوات الحقيقة البفونية والكريونية العادة الى الاباج الاول || تميّزت هذه النباتات بضخامة سوقها المستطيلة ان كان قطرها يراوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وارتفاعها من ١٠ الى ١٥ متراً.

Achlamydée (F). ٣١٤٥٤ - وَالِيَّة

اسم يطلق على كل زهرة عادمة التويج والكأس. جهازها وزيم وعطيل.

Monodelphes (F). Monodelphia (E). ٣١٤٥٥ - وَحِيدَات الرُحْم

اسم يطلق على جميع الثدييات التي تضع اولادها كاملة الخلفة بخلاف نوات الرحمين او الجراييات التي تنتقل اولادها من الرحم الباطني الى الجيب الخارجي المعروف ايضا بالجرب حيث تقيم فيه حتى الاكتمال فالظالم.

Bembecidae (S). Bembécidés (F). ٣١٤٥٦ - وَرَاشِيَّات

فصيلة حشرات من الحمويات ورتبة غشائيات الاجنحة المنصورة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم خاصة في البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجم، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة، جميعها قريبة الشبه بالثحل والزناهير. اتواها ملونة بكثر فيها الاصفر المجزغ بالاسود || جميعها تصفّ في التربة. محاجرها رداء فسيحة تغور نحو ١٠ سم. مداخلها انفاق انبوبية الشكل منحرفة نحو السطح. اصغانتها متراكبة التخاريب المستسة السطوح || قوتها الذباب والهوم والصغير من نوات الجناحين تقتنصها فتخترها وتنقلها الى اصغانتها زادًا لها وليرقانها || اعرف اجناسها واشهرها الوراشة والمثولة.

Achlamyde (F). ٣١٤٥٧ - وَلِيَّت

نعت تعريفي يطلق على كل نبات عتي من نوات الالياف المحضونة بخلاف واحد بدلاً من غلافين.

Ytterbium (F). Ytterbium (E). ٣١٤٥٨ - يَتْرِيُوم

عنصر معدني بسيط. رمزه (Yb) وزنه الانومي ١٧٣,٠٤ رقمه الانومي ٧٠ يستخلص من الاثربة الاربية. اول من اكتشفه مارينلاك عام ١٨٧٨.

Yttrium (F). Yttrium (E). ٣١٤٥٩ - يَتْرِيُوم

عنصر معدني بسيط. رمزه (Y) وزنه الانومي ٨٨,٩٢ رقمه الانومي ٣٩ اول من اكتشفه غاولان عام ١٧٩٤.



يرمل

*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.*

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume III

2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

**ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**



Dar el-Machreq sari
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



Librairie Orientale - Boîte Postale 1986
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec


Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH